

傳氏眼科審視瑤函

傅氏眼科齊視瑤函方自

卷之六目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯 阿膠散 枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散 白蠟蠶散 真珠散

無時冷淚症

菊花丸 麝香散

無時熱淚症

青葙次子 椒朮丸

昔雌赤爛症

防風通聖散 東垣碧天丸 紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散 疏風散濕湯 治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯 半夏茯苓天麻湯 夜光柳紅散

加減地黃丸 豆淋酒法 爛花無比散

槐子丸 川芎石 散 摩風膏

因毒症

內疎黃連湯 還陰解勞湯

因他症

前胡犀角飲 乾薑子丸 明目大補湯

東垣清神益氣湯 順經湯 磁石丸 羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯 局方黑神散 經效散 一綠散

瞳目飛揚症

經効四法

虛人目症

經効三法

原復症

洗心湯 瀉肺湯 六味地黃湯

通明散 東垣羌活除翳湯 明目流氣飲

神仙退雲丸 天王補心丹 加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯 七宣丸 神功丸 小柴胡湯

二陳湯 溫白丸 川芎茶調散 四物湯

涼膈散 三黃丸 附子三黃瀉心丸

青州白丸子 瓜蒂散 藜蘆散 導痰湯

保命集當歸湯 保命集羚羊角散

傅氏眼科審視辨論卷之六

赫陵傅仁字允科纂輯

婿張文凱廷獻參閱

廣陵林長生聳震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵坊訂正

公猷 掄 全閱

大梁周靖公亮節較梓

體仁 齋 全閱

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣
天政布風乃時舉民病泣出是也

目淚心者五藏之精也淚者何氣使然岐伯曰

之通也口鼻者氣之門戶也故悲哀恐憂則心動心
動則五藏六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開

液道閉故涕泣由焉。液者所以養精補髓空發者也。故
 上液之道開則泣泣不止。則液竭液竭則精不灌精
 不灌則目無所見矣。故命曰膏精補天柱。經俠頸俠
 項中分也。又曰五臟六腑心為之主耳為之聽目
 為之視。肺為之相。肝為之榮。脾為之衛。腎為之主。故
 玉臟六腑之津液上滲於目。心悲氣并則心弄。急心
 系急則肺舉。肺舉則涕液上溢。夫心系與肺不能常
 舉。乍上乍下。故絲而泣出矣。素問經精露陰曰淚
 則目無所見。夫人廣則陽氣并於上。陰氣并於下。陽
 并於上則火獨光也。陰氣并於下則足寒。足寒則脈
 天。一水不勝五火。故目昏盲。是以氣衝風泣下而不
 止。夫風之中目也。陽氣內守於精。是火氣燭目。故風
 見則泣下。有喻比之。夫火疾。風生。乃能雨。此之類也。
 肺金之虛而用木寡於畏也。

迎風冷淚症

迎風冷淚。水木俱虛。血液不足。寒藥勿施。失治則重。宜早

神之

此症謂見風則冷淚流，若赤爛有障翳者非也。水木二經而液不足，陰邪之患，久而失治，則有內障視渺等症。生焉與無時冷淚不同，此爲痰虛因邪引邪之患。若無時冷淚則內虛，膽腎自傷之患也。此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目淚自出肌瘦汗不止

白朮

炒

白茯苓

乾薑

細辛

川芎

白芍藥

甘草

炙

官桂

陳皮

各一錢

當歸身

酒製

人參

各一錢

右爲瀉水二鍾，薑一片，黑棗三枚，煎八分，去滓，熱服，不

計時服再服

阿膠散治目有冷淚流而不結者用經受風冷故也

阿膠

馬兜鈴

各兩

紫苑

款冬花

糯米

各一兩

白茯苓

炒二錢半

甘草

五錢

右爲細末每服二錢水一鍾煎不拘時服

枸杞酒

治目視不明

枸杞子

揀肥者一斤杵爛再用絹袋盛貯須灰酒密封勿令泄氣候五七日取飲

陳無灰酒

十斤

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒一二盃勿

宜過饑若或過飲反佐濕熱爲害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝爲勞傷致目

視不明多由冷淚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰枸杞
子味厚故足以養厥陰之陰煮以純酒取其淡治氣血
而巳

迎風熱淚症

迎風熱淚由肝虛來火來水虧火隱伏久則成內災但此
症不論何時何風見之則流熱淚若有別症及昏蒙者
虛也乃肝膽腎水之津液不足故因虛變不密而風邪
出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治

有觸犯則有變矣宜服

羊三角散治肝臟受熱眼目昏花時多熱淚

羚羊角銜細末羌活 玄參 車前子 山梔仁炒

黃芩 瓜蒌去胡黃連 家菊花各三錢 細辛一錢

右爲細末每服二錢食後竹葉煎湯調下

白殭蠶散治衝風

白殭蠶炒 粉草 旋覆花 細辛

木賊草 荆芥二錢半 嫩桑葉一兩

右爲細末每服二錢白水煎食後溫服

珍珠散治肝虛見風淚出

珍珠另研 丹砂研各三分 乾薑研二分 貝齒火燬水淬研一兩

右共研極細令勻以熟絹帛飛三遍每仰臥以少許點

眼中閉少時爲妙。

無時冷淚症

無時冷淚。水木俱傷。此幽陰之深患。其爲病也。非常然斯疾。每出不意。非青盲。亦內障爲歟。

此症爲害。無赤痛也。只是時常流出冷淚。久則視瞻昏渺。非比迎風冷淚。因虛引邪之害者。此蓋精液耗傷。肝氣漸弱。精膏澀枯。腎水不足。幽陰已甚。久而失治。則有內障青盲之患。精血衰敗之人。及悲傷哭泣。久鬱。婦人產後。悲泣大過者。每多此症。且爲禍。又緩人不爲慮。往往罹其害。而禍成也。悔已遲矣。宜服。

菊花丸

治肝腎不足眼目昏睛腫視不明茫茫漠漠
常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花

去梗葉
四兩炒

巴戟

去心
三兩

肉蓯蓉

酒洗去皮燒
乾切二兩

枸杞子

搗焙
三兩

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽湯空心食前送下

麝香散

治眼冷淚
不止喘鼻

香附子

川椒

各等分

蒼朮

麝香

各少許

右爲細末合病者噙水一口將藥吹於鼻內

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中有伏火乃不足中之有餘

服寒涼則傷汗損血服熱藥則血壅難歸當以意消息之
非徒補益所能消除。

此症謂目無別病止是熱淚無時而常流也若有別病
而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎水
耗而陰睛虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汁也故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治
觸犯者變爲內障因其爲患微緩羅其禍也多矣宜服
當歸飲子。

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃

滑石

五分

右劉劑水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地九治目昏多淚

熟地黃切焙乾

川椒去目及閉口者微炒

生地黄切焙乾

右三味各等分爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五十

丸鹽米飲空心送下

江陵傅氏家貧貨紙爲業好接待遊士一日有客方中布袍邀傅飲傅目昏多淚客教以此方服不一月自能夜視物享年近九十聰明不衰

風治丹砂云風治眼

系上膈有積熱自飲食中挾怒氣

而成頑痰病寒濁氣不下降清氣不上升由是火益熾而水甚涸積而久也眼滑周膿潰而腫於中生細小虫絲遂年久不愈而多癢者是也用紫金膏以銀釵脚搽去油膩點之試問若果癢者又當去虫以絕根水益紫金膏只去濕與去風涼血而

若前所謂飲食挾怒成疾又須更與防風通聖
散去硝黃爲細末以酒拌勻晒乾依湯服之禁諸
厚米及水料物
方盡諸法之要

背帷赤爛症

背帷赤爛。背有之火。上燥濕病有重輕。重則背帷裂而
血出。輕則背赤爛而難。舒以清潤而爲治。何患病之不除。
此症專言背之赤爛。目無別病也。若目有別病而赤爛
者。乃因別病致傷其背。又非此比。赤勝爛者。多於勞心
憂鬱忿怒無形之火所傷。爛勝赤者。多於性燥嗜酒哭
泣過多胃火冲烟風熱蒸薰有形之火所傷。病屬心絡。
甚則火盛而生瘡於背邊也。要分大小二背。相火君火

風沿

審視瑤函

卷之六

虛實之症宜服點洗

防風通聖散

并治中風

一切風熱大便秘結小便赤澀眼

風刺癢疹而為肺風或成風癩即世呼大痲風或腸風或腸風為痔漏或陽鬱而為諸熱

防風

川芎

大黃

赤芍藥

連翹

麻黃

去節

芒硝

蘇薄荷

當歸

滑石

飛過甘草

炒樞仁

白朮

桔梗

石膏

荆芥穗

黃芩

各等分

右為粗末每服四錢薑三片水二鍾煎食前溫服按防

風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之出汗而泄荆

芥薄荷清上藥也風熱之在顛頂者得之清鼻而泄大

黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之出後而泄芫

石梔子水道藥也風熱之在次瀝者得之由瀝而泄風淫於膈肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之爲患肝木主之川芎當歸和肝血也而甘草白朮又所以和胃氣而健脾劉守真氏長於治火此方之旨詳具悉載

如目兩臉潰爛或生風粟白睛紅赤黑睛生翳障加菊花黃連羌活白蒺藜名白菊花通聖散虛弱大便不結燥者減去硝黃

東垣碧天丸治目疾屢服寒涼不愈兩目黑熱有如火煎

明畏日或上下臉赤爛或不脈水
士而內外說皆破以此洗之

瓦粉炒一

銅綠七分

枯白礬二分

右研銅綠白礬令細旋旋入瓦粉研勻熱水和之共爲丸如黃豆大每用一九熱湯半盞浸十二時辰洗至覺微瀼爲度少閉眼半個時辰許臨卧更洗之瞑目就睡尤爲神妙一九可洗二三日可在湯內燒熱此藥治其標爲表熱已去矣裏實者不宜用此當瀉其實熱

紫金膏

水飛過號丹密多水少
武火熬以器盛之點

迎風赤爛症

迎風赤爛邪在肌因虛被毒木相傳久不愈今成赤爛赤

爛風弦治文難

此症謂口不論何風見之皆赤爛無風則好者與風弦
赤爛八胞結之深者不向夫風屬木木強土弱則易
侵侵則引邪內外夾攻土受木剋是以有風其病無風
則愈赤爛者土木之病也赤者木之火症爛者土之濕
症若痰若濕甚者爛勝赤若火若燥甚者赤勝爛心承
肺人乘金珠痛而赤焉此章專言赤爛之患與前章迎
風冷熱淚入內之深者又不同宜服洗

藥散

治眼腫爛因風
而作川氣藥燥之

柴胡

防風

赤芍藥

荆芥

羌活

桔梗

生地黃

甘草

石各等分爲細末每服三錢白水煎溫服

疏風散濕湯

赤芍藥

黃連

防風各五分

銅綠另入

川花椒

歸尾

各一錢

輕粉一分

羌活

五倍子各三分

荆芥

六分

膽礬

明礬

各三

右爲一處水三鍾煎至一半去滓外加銅綠泡化後入

輕粉攪勻湯脚用綿紙瀝過澄清可用手蘸洗目爛濕

處

一方治爛眼

覆盆子葉不拘多少去梗日曬乾研令極細薄綿裹
之以明小兒所食之乳浸汁如人行八九

聖之時方雙目中飽仰臥不過三

四日視物如少年忌酒麵油膩

宋崇聖起太尉乳母苦胸弦風眼近二

老媪過門云此服有正其細加絲包赤而長久則滋

生乃入山取此藥咀嚼之而留汁滓存於竹筒內以

皂紗蒙乳母眼取羊靨雙日於紗上然後滴藥汁滴

眼下弦轉盼間重從紗中出其數十條後眼弦肉乾

如常太醫上直診誅聞之有辨婦亦患此症試之無

不立瘥考之本草陳藏器云此藥治眼妙品也

明令脈注不止及青盲等恙蓋治眼妙品也

治爛弦眼生蟲方

覆盆子葉爲末 一錢 乾草 煨灰 生礬各半 枯礬 一分

共研一處蜜調用絹片做膏藥貼眼上一夜次午揭起
其蠶目出粘在絹上次晚又將肥猪肉切片貼眼上

宿卽愈

敷爛弦眼方

蘆甘石

取飛過

飛丹

五錢

枯礬二錢
五分

明硃砂

研細

銅綠

二錢

共爲一處研極細爲度先用荆芥陳茶葉煎水洗患處

乘濕將藥敷上二三次立愈

諸因

內外諸因種種不一有因七情六淫傷感過度而

致者其症隨愈隨復最難調治有外受風邪燥火

隨症施之若因他症侵乘及物傷等症累目雖內外

輕重各分其類總之火鬱者宜疏之氣滯者宜導之

燥甚風邪宜審虛實調之庶不至客邪延久成痼疾

風兮風兮禍何多。未傷人身先損目。有因胞皮爛弦紅。有

致偏喎並振搖有成內障多齋肉內外輕重皆不同且之
常症猶難逐驅風活血養陰精勝似求仙去問卜

此症謂患風病人而目病也蓋風屬木木為肝之坡
在且木火一氣病風則熱盛何也木能生火也火盛則
血內生風久而不熄遂致耗損矣况久病必生鬱鬱極
則生火火性上炎火熱極而又生風展轉相生內外障
翳皆起于此故患風木之病各因其故而發之有目淺
而鬱未深為偏喎歪斜者有入脾眼胞反濕赤勝爛者
有血虛筋弱而振搖者有恣燥嗜熱火邪乖亂清和融
純之氣因鬱而為內障者有風勝血滯結為外障如努

此因

肉等症者，再加以服餌香燥之藥，耽酒縱辛，不善保養，以致陰愈虧而火愈燥，火愈燥而風愈勝，病變爲凝，瘵之重者，治當各因其證，而伐其本，且外內常變不同，大抵若因風病目者，當去風爲先，清火次之，不然源既不清流，何能止。目病今雖暫退，後必復來，治之雖至再至，三風不除而火不熄，目終無痊愈之期矣，宜服

正容湯

治口眼喎邪，能容不正，服此即能正之，故云。

羌活

白附子

防風

秦艽

膽星

白僵蠶

半夏

製

木瓜

甘草

黃松節

即茯神心，木各等分。

右剉劑，白水二鍾，生薑三片，煎至八分，去滓，加酒。

右方祛風以羌防化痰須星夏生草清熱秦艽榮筋面

部需白附、蠶蠶、舒筋急資木瓜松節、蠶散風邪、酒行藥

勢此方服十劑平服如故敢陳一得願獻知音

半夏茯苓天麻湯

治痰厥頭痛頭旋眼黑煩悶惡心氣短

中或頭痛如裂身重如山四肢厥冷

天麻 黃芪蜜製人參 蒼朮泔水橘皮 澤瀉 白朮

炒麴各五分白朮炒一錢半夏蜜製麥芽炒各一錢黃蘗酒製二分

乾薑炮二錢一方二分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食後服

此頭痛爲足太陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除天麻苗謂之定風草乃治內風之神藥內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣實表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火二朮甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中而升陽炒麴消食蕩胃中之滯氣麥芽寬中而助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦寒用酒洗以療之冬日少火在泉而發燥也

夜光柳紅散

治風邪傷胞臉致風車臉翻不收山淚狂者

人參

荆芥穗

川烏

炮川

白芷

南星

製吹石膏

川芎

各二兩

何首烏

草烏

去

石決明

煨

藥本

川細辛

雄黃

當歸身

蒲黃

蘇薄荷

防風

茅蒼木

炒

甘松

藿香葉

全蠍

各一兩

川羌活

三兩

右爲細末每服二錢或三錢茶清調下

加減地黃丸

治男婦肝臟積熱肝虛目暗膜入水輪漏睛
障及腎臟虛憊肝受虛熱及遠年近日暴熱赤眼風翳
氣眼並治之兼治乾濕脚氣消渴及諸風氣等疾

由腎氣虛敗者但服此能

補用益腎驅風明目神效

生地

乾者

熟地

乾者

石斛

去苗

防風

去

枳殼

炒

牛膝

酒洗

杏仁

泡去皮尖

麩炒

黃入

各四兩

右爲細末除杏霜另入勿犯鐵器煉蜜爲丸如梧桐子

大每服五十九空心以豆淋酒送下或飯後及青鹽湯亦可忌一切動風毒等物

豆淋酒法

黑豆半升揀揀炒令烟出以酒三斤浸之不用黑豆用此酒煮獨活卽是紫湯也

唐丞相李恭公在扈從蜀中日患眼或澀或生翳膜或疼痛或見黑花如豆大雲氣纏繞不斷或見如飛蟲見羽百方治之不効有僧智深曰相公此病由受風毒去五臟實則瀉其子虛則補其母母能令子實子能令母虛腎是肝之母今腎受風毒攻令肝虛肝虛則目中恍惚五臟亦然和氣清中消積諸風等症皆由腎虛地黃丸主之

蠟花無比散治大小男婦遠年近日一切風眼氣眼攻注眼目昏暗臉生風栗或痛或癢漸生翳膜遮

睛視物不明。及久患偏正頭風。牽掙兩眼。漸漸斜小。連
翳赤爛。小兒疳疹。人目白膜遮睛。赤腫癢痛。常服障風
明目。

白茯苓

防風去蘆

甘草

蛇脫

赤芍藥

十三

蒼朮

泔水浸去皮切

蟬脫

去頭足

白蒺藜

羌活

當歸

川芎

石決明

用鹽入東流水煮一伏時
攤出搗如粉另入各三兩

除石決粉條共為細末攪勻。每服二三錢。食後米泔調
下。或茶清亦可。忌食發風毒等物。

槐子丸

治肝虛風邪所
致致目偏視。

槐子仁

二兩

酸棗仁

去核

蔓荊子

覆盆子

栝子仁

白蒺藜

炒去刺

車前子

牛蒡子

羌藜子

各一兩

沙因

子見百病

卷之三十一

三

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十九空心

白滾湯送下

川芎石膏散

治風熱上攻頭目昏眩痛悶風疾喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥清神利頭目

石膏

散

防風

蕪薄荷

連翹

桔梗

甘草

寒水石

滑石

飛過各二兩半

川芎

人參

荆芥穗

當歸

黃芩

大黃

山梔仁

白米

菊花

赤芍

各五錢

縮砂仁

炒二錢五分

除寒水石石膏滑石各研細另入餘其為細末攪勻每服

一二三錢食遠滾白湯調服忌薑蒜辛熱等物

摩風膏

治風痺眼補邪

白芷 黑附子 廣木香 防風 細辛 骨碎補

當歸身 葉本各一兩 烏頭 赤芍藥 厚肉桂各一兩

牛酥即骨 鵝脂各四兩 猪板油半斤

除酥脂板油外以上諸藥各為細末用真麻油半斤浸一晝夜再入酥脂板油共熬以文武火熬如膏為度塗之於患處

因毒症

人為瘡瘍腫毒六陽壅塞勿寧血瘀氣滯不和平皆是元太甚水少不能制伏故致炎癰飛騰只緣肝膽未純綠邪濁擾侵致病

此症指人生瘡瘍腫毒累及目痛也。夫大陽火燥，餘
水不能制，以致妄亂無拘，氣滯血壅，而始發瘡瘍腫毒。
火性上炎，目竅高火之所從泄，濁能害清，理之自然。肝
膽清淨，屬和之腑，瘡瘍毒癰痘疹，濁邪熾盛，侵擾清利。
因其素所斲喪，肝腎有虧，陰虛血少，膽之清汁不充，因
化源竭，目絡無滋，火邪得以乘虛，故入目爲害。若病目
在於病毒之時，治毒愈而目亦愈。若毒愈而目不愈者，
乃邪入至高之候，處難以速退，當滌其流而澄其源。若
急迫治之，因而觸激甚者，必有瘀滯之變矣。宜服

內疎黃連湯

治諸瘡毒皮色腫硬發熱作嘔大便秘閉脈
洪實者攻及兩眼或一目赤痛紅腫并核

黃連酒

炒梔仁

黃芩

當歸身

桔梗

廣木香

檳榔

赤芍藥

甘草

蘇薄荷

各二分

連翹

製大黃

各錢二分

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓食遠服

還陰解毒湯

治梅毒毒未清後害於肝腎以致蒸灼肺水目腫眩赤絲繞白翳視物昏眩混濁不明

川芎

當歸酒洗

生地黃

金銀花

去葉

連翹

黃芩

酒炒

土茯苓

細甘草

減半

黃連

酒炒 苦參

麥門冬

去心

白芍藥

酒洗

玄參

各等分

三

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

審視瑤函

卷之六

五

因

因他症

因他之症爲別病。內外輕重總不定。內因七情。外緣六淫。不斲不爽。順天和。能守能安。頗清淨。五味四氣慎其宜。不獨目明亦長命。戒慎恐懼。如響如應。

此症專言因害別病而累及目也。所致不同。有陰病而陰白傷。有陽病而陽自損。有寒病熱藥太過。傷其神氣。熱病寒藥太過。耗其精血。補者瀉之。瀉則損其元。瀉者補之。補則助其邪。砭針之泄散。其氣炮灸之激動。火邪實。實虛虛損不足。益有餘之爲害。亦各因人觸犯。感受臟腑經絡衰旺。隨其所因而入。爲病內外輕重不等。當

以因

驗其標而治其本。譬如傷寒陽症熱鬱蒸損瞳神內症也。熱甚血滯赤瘀內澀者外症也。陰症脫陽而目盲內症也。服薑附溫劑多而火燥赤澀者外症也。瘧疾之熱損瞳神內症也。火滯於血而赤澀外症也。精瀉液耗而膏汁不得滋潤內症也。山嵐瘴氣而昏者邪氣蒙蔽乎正外症也。蠱脹中滿赤痛者陰虛難制陽邪內症也。氣滯拂鬱熱多昏花皆內症也。痰症之膩滯火症之赤澀皆外症也。餘飯此嗚呼身之精血有限人之斷空無窮。故虛者多實者少明者少而渺者多若能知愛養之方而不犯禁忌之戒外不縱性以傷於五味四氣內不放

心於六慾七情順時氣養天和頗立清淨之志而存恒久之心則三真不爽而六賊潛消血充精固神定氣清陰陽和而水火濟精華盛而目力全復何病之有哉若久久不輟綿綿若存不獨目無病而瞻視明命亦長矣若治之須看因何症爲害於目則以本症治之難執方括亦不可拘定眼科藥法治之如傷寒陽症熱鬱蒸損瞳神則看是何經之熱分表裏攻發使其熱退則目自愈若必用眼科之藥其症壞矣餘症倣此

前胡犀角飲

治傷寒兩目昏
睛或生浮翳

黃芪一錢二分 蔓荊子

犀角銚 青箱子

前胡 炒梔仁

防風

麥門冬性去

生地黃

細辛

車前子

菊花

草決明

炒各八分甘草

四分

右剉劑。白水二鍾煎至八分。去滓。食後溫服。

羌蔚子丸

治時氣後目暗及有翳膜

黃連

炒

枸杞子

枳殼

去穢炒

青箱子

生地

焙各一兩

羌蔚子

澤瀉

各一兩半

石決明

煨

細辛

麥門冬

去心

車前

各二兩

右為細末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服三錢。食後漿水

送下。

明目大補湯

治氣血俱損。眼目昏花。神光不足。及久患眼疾。服涼藥過多。氣血衰。流昏膜。服此以值陽。

光壯
腎水

乾熟地

酒蒸白木炒

白茯苓

焙人參

白芍藥

甘草

當歸身

酒洗川芎

白豆蔻

取肉黃芪

蜜製大附子

炮沉香

厚肉桂

各等分

右剉劑白水二鍾生薑一片黑棗二枚煎至八分不拘

時溫服。

東垣清神益氣湯

治因脾胃虛弱之人。誤服洗肝散。或服寒涼藥多。而日愈病者。宜此。

白茯苓

人參

白朮

製各一錢蒼朮

水製白芍藥

升麻

防風

黃蘗

監水製廣陳皮

青皮

各六分甘草

炙冬

五味子

肥者打破

各五分

右判劑白水二鍾煎至八分去滓溫服。

順經湯

治室女月水停久倒行逆上冲眼。紅赤生翳先服調氣則血通矣。

當歸身

川芎

柴胡

桃仁

皮去尖

香附子

雙烏藥

青皮

紅花

廣陳皮

蘇木

赤芍

玄參

右判劑白水二鍾煎至八分去滓加酒一盃食遠溫服。

熱甚加酒炒黃連煎服。

磁石丸

治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物昏暗欲成內障。

肉蓯蓉

刮去皺皮酒浸一宿焙乾一兩。磁石細研水飛過二兩。

鬼絲子

酒浸五日曝乾。另研為末三兩。巴戟心遠智肉。熟地黃。乾。

石斛

各一兩

桂心

遼五味

廣木香

甘草

各五錢

砂因

見諸書

卷之

七

除磁石兔絲子末另火餘共為細末和勻煉蜜為團仍
搗二三百杵丸如梧桐子大每服三四十九食前溫酒
送下。或新鹽湯亦可。

羊肝丸

治肥人酒色太過紅筋侵目。氣毒傷目白膜傷睛者并治。

白蒺藜

炒去刺

菊花

去根

石決明

各一兩

楮實子

槐角

炒

五味子

黃連

當歸尾

防風

荆芥穗

各二錢半

甘草

真川芎

三錢

豨薟

去殼油

右共為細末用雄羊肝一具滾水沸過共煎藥搗為丸

每服五六十丸空心薄荷湯送下。

忌椒薑辛辣燒酒等物。

物損真睛症

物損真睛症。傷之在目輪。白黃兩般。黃急白緩。行若然。傷得重。損壞在瞳神。縱然醫得。終必欠光明。

此症謂目被物觸打。傷在風輪之急者。故曰物損真睛。有黃白二色。黃者害速。白者善遲。若尖細之物觸傷者。淺小可治。若篋大之物傷大而深。內損神膏者重。雖愈亦有痕跡。若觸之破珠爲害已甚。縱然急治。瞳神雖在。亦難免欹側之患。物雖尖小而傷深膏破者。亦有細細黑顆如蟹睛而出。愈後有疤。每見耘苗之人。竹木匠輩。往往誤觸竹絲木屑苗葉。在風輪而病者。若飛流之物。

掩人而致破風輪者必致清菁珠出狀若稠痰白脂凝
在風輪欲流不流此是傷破神珠外邊氣分之精膏也
不可悞認爲障若神昏者瞳神有大小欲側之態久而
失治目必外凸大凡此症不論大小黃白但有流淚赤
障等病者急而有變珠痛頭疼者尤急也宜服

加味四物湯

治打損
眼目

白芍藥

川芎

當歸身

荆芥

熟地黃

防風

等

右段咀爲劑白水二鍾煎熟去滓再入生薑黃搗汁少
許溫服。

外又可以生地黃一兩杏仁二十粒泡去皮尖研爲細

末用水調稠綿紙攤藥敷在眼上谷乾。

局方黑神散

熟地黃

蒲黃

歸尾

乾薑炮

赤芍藥

肉桂

甘草猪各等分

右爲細末量病之輕重大小以單便生地黃汁相和多

寡調服

經効散治眼因撞刺生翳疼痛無時經久不安復破物之
所繫兼爲風熱所攻轉加痛楚不能睜眼見物等
症

柴胡二兩犀角錢末赤芍藥三錢當歸尾錢大黃各五錢

連翹各二錢甘草稍五分

右爲末每服二三錢白水送下鍾初食遠服

綠散

治打撲傷損眼胞赤腫疼痛。

芙蓉葉

生地黄

各等分

右二味共搗爛取眼胞土或爲末以雞蛋清調勻敷亦可。

瞇目飛揚症

瞇目多因出路行風吹砂土入人睛頻擦頻拭風輪散氣滯神珠膏血凝昏目不視漸漸病生成。

此症因風吹砂土入目頻多措擦以致血氣凝滯而爲病也初起尋澀赤脈次復淚出急澀漸重結爲暗障然

有輕重赤白亦因人之感
觸所致管障形症別經絡
其形症而治其本末也

經効四法

孫真人治瞇目鹽與或置於
水中浸之視水其物立出
于金箔相麥芒入眼以新布覆眼內
將鹽罽從布上摩之其芒自着布上
山居物落眼中用
新筆蘸水自出
又方用上好數厘
研最點之立出

飛絲入目症

偶被遊絲入目皆緣沒意隄防
模糊眸子淚如湯瀝急
癢腫眼那更羞明怕熱頭疼
珠痛難當金垂老鷓定珠傷

惡毒無如這樣

此症謂風颺遊絲偶然墮入目中而病痛也卽今人呼爲天絲打眼昔野垂蜘蛛等虫之絲其患尙遲若金蚕老鶴絲當日不出三日必珠裂破碎今人但患空風暴熱天行赤熱痛如鍼刺一應火實之症便呼天絲入目殊不知飛絲入目乃人自知者但迴避不及不意中被其人也入目之時亦自知之倏然而痛脹湧難開又非木偶人豈有不知今之愚人不得理之有無但以己意謬呼人疾失之甚矣

腎

凡溪治飛絲入眼紅腫如
全... 以新筆塗之入
絲自成一塊看眼白上
輕拭出則愈如未盡再塗
治飛絲入眼用拓樹漿點
裏筋頭蘸水入目內激拭
又方... 入目以水麻子
調一碗浸置却將舌浸水
中... 立效

時復症

若言時復症歲歲至期來莫言無後患終久變成災。

此症謂目病不治延捱忍待自愈或治不得法色慾有
犯觸其脈絡遂致深入又不急治致邪正擊搏不得發
越積積日久至其時且則如花如潮及期而發過期而
又愈久而不治及因激發者遂成其害未發問其所發

之既別其病本在何經絡既發者當驗其形色經絡以
別何部分別症候施治或

發於春宜服

洗肝散治風毒上攻暴作目腫

當歸尾酒洗 川芎 蘇薄荷 甘草炒 生地黃 羌活

炒梔仁 大黃制 龍膽草 防風各等分

石為細末每服三錢白滾湯送下

發於夏宜服

洗心湯治心經煩熱口

黃連 生地黃各半 木通 炒梔仁各一 甘草炙

當歸尾

菊花各二錢

右剉白朮二鍾煎至八分去滓溫服

發於秋宜服

瀉肺湯

節暴赤容熱外
隨台晴腫脹

川羌活

玄參

黃芩各一錢半 桔梗

地骨皮

大黃

芒硝各一錢

右剉白朮二鍾煎至八分去滓食遠服

發於冬宜服

六味地黃湯

治腎水不足
能制火

熟地黃

山茱萸二核

山藥

澤瀉

白茯苓

審視略函

卷之六

三

牡丹皮各等分

右劉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服。

以上四時雖定四方不必拘執仍須視其時症診其臍

臍相冠然後加減更變施治可也。

通明散

帶氣眼凡人之目必患後傷其經絡喜怒哀樂之情多有傷於心肺發作不時此乃氣輪受病之故

升麻 炒梔仁各一兩半 細辛 川芎 白芷 草決明

防風 白芩 白歛 夏枯草 羌活各一兩 蠅退去頭

烏梅皮 五倍子各五錢 甘草二錢

右爲細末每服三錢白水一鍾半淡竹葉七片同煎食

後溫服

腫痛赤脈從上而下太陽病者服

東垣羌活除翳湯

布太陽傷寒水睛腫翳睛不能視物

麻黃根

五分

薄荷

四分

生地黃

七分

川芎

當歸身各六分

黃蘗

酒製八分

荆芥

酒製方入

薤白

各一錢

川羌活

五分防風一錢

北細辛

二分

知母

酒製八分

川花椒

五分

右劉劑白水二鍾煎至八分加荆芥薤再煎去滓食遠

稍熱服忌酒辛熱濕麵等物

腫痛赤脈從下而上陽明病者服

明目流氣飲

治月經不足內受風熱上攻眼目昏暗視物不明常見黑花當風多淚怕熱羞明堆積赤

腫隱亂難開或生障翳刺曉拳毛眼眵赤爛及婦人血風眼及時行暴赤腫眼眼胞紫黑應作眼疾並宜服之

因

詳見醫山

卷之三

三

蒼朮

米泔水浸一宿土炒二錢

細辛

牛蒡子

炒大黃

川芎

各一錢

防風

白蒺藜

炒去刺

梔仁

黃芩

補骨

蔓荊子

甘草

木賊

玄參

各七

草決明

各一

右剉劑白水二鍾加酒一小盃煎至八分去滓臨睡溫服

服

腫痛赤脈從外走內少陽病者服

神仙退雲丸

治一切翳膜內外等障昏無光者

荆芥穗

蛇脫

密蒙花

各二錢此三味同甘草焙乾揀去甘草不用

川芎

當歸身

各一

枳實

蘇薄荷

不見

犀角

川練子

蟬退

各五

家菊花

生地

酒炒

焙乾

白茯苓

去節二兩並便

羌活

地骨皮

炒各三錢

煆仁

生用六錢

木賊草

去節二兩並便

右爲細末，煉蜜爲丸，每一兩重分作十九丸，米泔湯調服，日進二三丸，俱食後服。婦人用當歸湯化下，有氣者麝木香湯化下，使在人消息活絡。

天王補心丹

補心血不足，神志不安，津液枯竭，健忘怔忡，等症，能請三焦化痰瀉去煩熱，除驚悸，療咽乾，養育心神。

當歸身酒洗 天冬去心 柏子仁炒 麥冬去心 酸棗仁炒各二兩

丹參炒

揀人參去蘆

玄參炒

白茯苓

炒

遠志

去心炒

道五味

炒

桔梗各五錢

生地黄西洗

四兩

辰砂

五錢研

腎

審視瑤函

卷之六

重

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大空心每服三錢白
湯送下或龍眼湯俱佳

忌胡荽大蒜蘿蔔魚腥燒酒

心者神明之官也憂愁思慮則傷心神明受傷則玉不
明而十二官危故健忘怔忡心主血血燥則津枯故天
便不利舌爲心之外候心火炎上故口舌生瘡是尤以
生地爲君者取其下入足少陰以滋水主水盛可以伏
火况地黄爲血分要藥又能入手少陰也棗仁遠志相
仁養心神者也當歸丹參玄參生心血者也二冬助其
津液五味取其耗散參苓補其氣虛以桔梗爲使諸

載諸藥人心不使之速下也如日病日久不瘥以致虛甚可間服後加味地黃丸並進

加味六味地黃丸

滋陰固精明目不寒不熱平和之劑久服延年

乾生地

酒製八兩

茯苓

乳蒸晒乾

山萸肉

酒洗焙乾

山藥

各四兩

牡丹皮

酒洗炒

澤瀉

各三兩

枸杞子

焙乾

菊花

各六兩

遼五味

焙二兩半

茯苓

炒去刺五兩

除地黃膏另入條爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三四錢空心淡鹽湯送下虛甚者地黃丸內再加紫河車一具酒洗極淨磁罐內酒水煮爛搗如泥或焙乾爲末丸九臨晚睡服天王補心丹

眼科針灸要穴圖像

二方朝夕並服久入自効今之治目多
補腎不知補心然心者君火也

正頭風及腦痛



此症針後或一二日再發如前痛甚蓋頭為諸陽所會
宜先補後瀉又宜瀉多補少或錯補瀉再發愈重當要

口眼歪斜



針百會合谷上星三穴瀉之無不効也初發宜刺上星
太陽

正頭痛且發又外又發且外皆用心刺療如不然難治
也端的正頭風十死之症又名昏厥以痛

頭頂痛



此症皆因醉後睡臥當風。串入經絡。痰飲灌注。或因怒氣傷肝。房事不節。宜先刺額車合谷。地倉人中。如不愈。再刺地倉。合谷。承漿。童子竅。

此症乃陰陽不分風邪中人觸戶故刺不效先取其膝
後去其風自然効也宜先刺百會後以合谷不効再刺
風池合谷三項。

頭風日眩



此症多因醉飽行房未避風寒而臥賊風入於經絡直刺解筋合谷豐隆再發後刺風池上星三里

外障眼



此乃頭風灌注瞳人血氣湧溢上盛下虛故得此疾宜

刺太陽睛明合谷小骨空不效再刺臨泣攢竹三里

眼生翳膜

翳



此症受病既深未可一時便能針愈先刺睛明合谷不
效須是三次針之方可如法再刺太陽光明

迎風冷濕



此症乃醉後當風或暴赤眼痛不忌房事食雜物婦人多因產後當風坐視賊風串入眼中或待經與男子交感穢氣冲於頭目故成此疾宜刺攢竹兌谷大骨竅

小骨空如未愈全再刺小骨空

暴赤腫痛眼



此症乃時氣所作血氣壅滯當風睡臥饑飽勞役宜先
刺合谷三里太陽睛明不效後再刺攢竹太陽絲竹空

紅腫爛沿眼



此症乃醉飽行房氣血凝滯用手揩摸賊風津入故有
此症宜先刺合谷二圓不效再刺睛明三圓

羞明怕日眼



此症乃暴痛在路迎風巾入眼中血不就舍肝不藏血
觀燈則淚出見日則酸澁痛疾難與宜刺攢竹合谷小
骨空二間不愈再刺睛明行間

偏正頭風



此症乃痰飲停滯胸膈，賊風串入腦戶，偏正頭風發來，連半邊皮肉疼痛，或手足沉冷，久而不治，變爲癱患，亦分陰陽針之，或針力未到，故不効也。此症宜先針風池。

合谷絲竹空後可針三里瀉之以去其風針後穴前
 絲竹空鞋襪

紅腫疼痛眼



此症因傷寒未解却有房事上虛下虛氣血壅上或頭

風不阜治則血滯暗人或暴赤腫痛或怒氣傷肝房事
傷腎脾胃二經飲食不節饑飽醉勞皆有此症心火炎
上或不散及婦人產後怒氣傷肝產期未滿非一時可
療漸而爲之無不効也宜先刺晴明臨泣合谷不愈再
刺風池太陽行間

百會

一名三陽五會一名顛上一名天滿在前頂後一

寸五分頂中央旋毛心容豆許直兩耳尖上對是

穴○督脉足太陽之會手足少陽足厥陰俱會於

此○刺二分灸五壯甲乙經曰刺三分灸三壯

日灸頭頂不

得過七七壯

主治頭

合谷

一名虎口在手大指次指岐骨間陷中○手

風頭痛

陽明所過爲原○刺三分留六呼灸三壯

在手大指次指岐骨間陷中○手

刺三分留六呼灸三壯

刺三分留六呼灸三壯

刺三分留六呼灸三壯

主治偏正頭痛面腫目翳神氣鬱結去宿風
不明席弘賦云晴明治眼若未効合谷光明不可
缺千金十一穴云曲池兼合谷可徹頭痛馬丹陽
天星十二穴去療頭疼并面腫體熱身汗山目暗
視茫

然

上星

一名神堂在鼻直上人髮際一寸陷者中可容豆
刺三分留六呼灸五壯一云宜三稜鍼出血以

瀉諸湯
熱氣

神庭

主治頭風頭痛鼻塞日眩睛痛不能遠視三
稜鍼刺之即宜泄諸陽熱氣無令上衝頭目
直鼻上入髮際五分髮高者髮際并穴髮低者加
二三分○督脈足太陽陽明之會灸三壯禁刺利
之令人顛狂口失明

曰灸七壯至三七壯止

主治發狂登高妄走風癩疾角弓反張目上視
不識人頭風鼻淵流涕不止頭痛目淚煩滿喘渴

驚不
得度

瞳子膠

名太陽一名前關在目外去骨五分○手太陽

主治頭痛目廣外背赤痛翳

厥青背遠視流淚出多眵

頰車

一名機關一名齒牙在耳下曲頰端近前陷中側

七壯壯

如小麥

不治中風牙關不開失音不語口眼歪斜頰牙

痛不可嚼物頸強不得巨顛凡口眼歪斜者嚼則

左鶴右補斜則左補右瀉

王龍賦云兼地倉療口歪

地倉

一名會維夾口旁四分外如近下微有勁脉若

久患風其脉亦有不動者○手足陽明任脉陽蹻

之會○刺三分留五呼灸七壯或二七壯重者七

七壯病左治右病右治左及炷宜小如粗銀脚若

週大口反啞却

灸承漿即愈

主治偏風口眼喎斜牙關不開齒痛頰腫目不得

閉失音不語飲食不收水漿漏落眼閉動遠視眩

無見
瞽昏夜

後頂

一名交衝在百會後一寸五分枕骨上○刺二分灸五壯

主治頸項強急額顙上痛

偏頭痛惡風日眩不明

臨泣

在目上直入髮際五分陷中正睛取之○足太陽

小陽陽維三脈之會○刺三分留七呼主治鼻塞

目眩生翳多淚流冷淚眼目諸疾驚癩

反視百證賦云兼頭維可治目中出淚

足三里

即下陵出本輪篇在膝下三寸脰骨外廉大筋

內宛宛中坐而堅膝低附取之極重按之則踞

上動脈止矣○足陽明所入爲合○刺五分留六

呼灸三壯千金云灸二百壯至五百壯○一云小

兒息灸三里二十外方可灸不爾

則生疾○秋月不宜出血恐下虛

主治胸胃中脘熱與氣衝巨虛上下廉同素承瀕

白膝府痠痛日不明外臺明堂云人年三十世然

若不灸三里令上氣衝目使

眼無光蓋以去里能下氣也

在耳後顛顛後腦脊下。髮際陷中法之引耳。一
耳後陷中。後髮際。玄筋外廉。足少陽陽維之會。
刺四分灸三壯。

七壯注不用大。

主治中風偏正頭痛項如拔痛不得回。目
眩赤痛淚出通玄賦云頭暈目眩覺風池。

翳外空

一名目膠。在耳後陷中。甲乙經曰。足少陽脈
氣所發。刺三分留三呼。禁灸。灸不幸令人目

小及

真
主在頭痛目赤目眩視物眩暈。拳毛倒睫。風痙戴
眼發狂。吐涎沫。偏正頭氣通玄賦云。治偏頭難忍
一傳主眼赤痛。
鍼一分出血。

人中

一名水溝。在鼻下人中陷中。督脈手足陽明之
會。刺三分留六呼。得氣卽瀉。灸二壯。至七壯。疰

如小麥灸。

灸不及鍼。

主治中風口噤牙

關不開。口眼喎斜。

承漿

一名天池。一名懸漿。在頰前下唇稜下陷中。因

陽明任脈之會。刺三分。留五呼。灸三壯。百可七

壯。至七七壯止。其血脈即通。其風應晴。立愈。艾炷不必大。但令當脈。即能愈疾。

主治偏風。半身不遂。口眼歪斜。口

禁不開。一云療偏風。口喎而腫。

一名衝陽。在禾膠上一寸。鼻孔旁五

分。手足陽明之會。刺三分。禁灸。

主治鼻塞。不聞香臭。喘息不利。偏風。中

客主人

一名上關。在耳前起骨上廉。閉口有

口取之。手足少陽。皆陽明三脈之會。

刺之。則法不能欠者。即此穴。刺一

呼。灸三壯。甲乙經口刺上關。不得深。下關。不得久

角孫

在耳前中間上髮際下。開口有空。手太陰。手尼

脈之會。甲乙經曰。主治三陽。寒熱之病。

鳴。暗耳。目眩。齒痛。瘰癧。

又耳前太陽有八耳衝齒者名曰角孫則足太陽脈亦會於此。○刺三分灸三壯。

主治目生翳齒起腫不能嚼唇助燥頭項強。

光明

在耳下五寸。是少陽絡別走。

主治熱病筋脈引。云睛明治眼未効時合谷光明不可缺。標兩風云兼地五會治眼養痛。

地五會

在足小指次指本節後陷中。去使筭一寸。○刺一分禁灸。

主治標兩風云兼光明治眼養痛。

毫

尖如蚊喙取法於

鍼

毫毛長一寸六分治

式

寒凝痛痺在絡

解絡

一名鞋帶。在衝陽後一寸五分。足腕上繫鞋帶處。附中。一日在足大指大指直上附上。附者腕腕中。

刺癰論註曰在衝陽後三寸半氣血計日二寸
半甲乙經曰一寸半。足陽明所行。經。刺五
分留五呼。

灸三壯

主治風氣。商聲頭痛。目眩。生翳。神農經

云治腹脹。脚腕痛。目眩。頭痛。可灸七壯。

豐隆

在外踝上八寸下廉。胛骨外廉陷中。○
陽明絡別走太陰。○刺三分灸三壯。

主治頭痛。向肺氣逆。顛狂。見鬼。好

笑。百證賦云。兼強。開。治。頭痛。難。禁。

攢竹

一名始光。一名員柱。一名夜光。一名光明。在兩眉
頭。稍穴宛宛中。○刺一分留五呼。不宜灸。甲乙經

云。明堂用細三稜鍼。刺之宜泄。

熱氣。眼目大明。宜刺三分出血。

主治目視。眩暈。淚出。目眩。肺。瘻。眼中赤痛。及腮

臉。動。不。舒。主。龍。賦。云。兼。頭。暈。帶。目。疼。頭。痛。百。證

賦。三。車。三。間。可。治。目。中。翳。膜。

通。玄。賦。云。睛。昏。目。赤。煎。

印堂

在兩眉中間。○神農經。經。三。寸。小。兒。急。慢。驚。風。○
可灸三壯。艾炷如小麥。○王龍賦云。善治。驚。痛。

睛明

一名淚孔在目內眥明堂云內眥與外一分睛明氣府論註曰手足太陽足陽明於睛明睛明五分

乙經曰刺六分一日禁食

主治目痛視不明見風淚出努肉攀睛白睛昏痛疔眼頭痛目眩凡治雀目者可久留鍼然後速出之庶引氣云治眼若未效并台谷光明

巨膠

夾鼻孔八分直瞳子○陽蹻足陽明之會○由此入上齒中後出循地倉○刺三分灸七壯

大骨空

在手大指前二節前尖上屈指當骨節中灸二十七壯禁針

主治黃疸腹痛及吐瀉

小骨空

在手小指第二節前尖上屈指當骨節中灸二十七壯禁針

主治迎風冷淚風眼爛弦等症日

審視諸函

卷之六

看

後谿

在手小指末節後外側橫紋尖上以中節子傳

取之一云在手腕前外側拳尖起骨下陷中○云

太陽所注爲膈○刺一分

留二呼灸一壯一云三壯

主治日翳鼻衄耳聾通玄馬云治頭項立安捷法

云肺與三焦熱病腎虛頭痛肝厥頭暈及頭目昏

沉偏正頭風疼痛兩額顛眉角疼痛太陽痛頭項

拘急痛引肩背背後頭風嘔吐不止惡聞人言距

赤痛衝風

淚下不已

行間

在足大指間動脈應手指中一云在足大指次明

岐得間上下有筋前後有小骨尖其穴正居指

有動脈應手○足厥陰所溜爲

禁○刺三分留十呼吸灸三壯

主治中風口喎四逆隘乾煩渴腹不欲視目

中淚出百證賦云非晴明可治雀目汗氣

一各開谷在食指末節前內側陷中○手

陽明所溜爲榮○刺三分留六呼吸灸五壯

主治日黃口乾口眼喎斜

通玄賦云治目昏不見

張問曰：晴明迎香等穴，經竹空等穴，皆禁灸何也？曰：穴近目，目畏火，故禁灸也。以是推之，則知晴明不可灸。手足頭面之艾炷宜小，麥六不宜多灸。蓋頭面爲諸陽之首，故也。若四肢炷稍大，背腹則又大，不妨多灸。四肢多灸則枯細，瘦人春夏之月刺宜淺，肥人秋冬之月刺宜深。此行針灸之大法也。

古人灸艾佳火，使用洗法，以赤皮葱薄荷葉煎湯溫洗瘡週圍，約一時久，令驅逐風散於瘡口出，更令經脈往來不滯，自然痊愈。若灸火退痂後，用東南桃枝青嫩皮煎湯溫洗，能護瘡中諸風。若瘡內黑爛，加胡荽煎洗，若皮

不可忽加黃連煎洗神效

古人貼灸瘡不用膏藥要得膿水出多而疾除實生云春
用柳絮夏用竹膜秋用新綿冬用兔腹下白細毛或舊
腹細毛今人多以膏藥貼之日兩三易欲其速愈此非
治疾之本意也但今貼膏藥意在避風亦取其便惟
久貼之可也

鍼灸避人神論

千金云欲行鍼灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌
相犯即可故男忌除女忌被男忌戊女忌巳有日神忌
有每月忌有十二時忌有四季人神有十二部位人神

九部傍通人神有雜忌傍通人神有血支血忌之類凡
醫者不能知此避忌若逢病人危會男女氣怯下手至
困通人達主豈爲此哉若遇卒暴急患皆不拘禁忌許
希云卒暴之疾須速灸療一日之間止忌一時是也千
金云癰疽疔腫喉痺客忤尤爲急切凡作湯藥宜速不
拘忌避又曰凡卒暴急症并中風卒仆痰厥等症卽用
鍼灸治療若論忌神少緩則不可救此所以不可拘泥
也若平居從容治病於未形選吉日避人神可也

取十二建人神之忌時

建日在足禁哺時

除日在眼禁日入

滿日在腹禁黃昏

平日在背禁人定

定日在心禁半夜

執日在手禁雞鳴

破日在面禁平旦

危日在鼻禁日出

成日在唇禁食時

收日在頭禁寅時

開日在耳禁午時

閉日在目禁日昃

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯

治諸虛百損紫青不和形體羸瘦可色痿黃

熱丙煩心忪多汗飲食進退寒熱往來喘嗽吐衄遺精
失血婦人崩漏經候不調凡病後不爽及憂慮傷動血

氣此藥平
補有効

白茯苓

白朮

土肉桂

去麩皮

川芎

當歸身

人參

黃芪

蜜製

白芍

熟地黃

甘草

炙各等分

右剉劑水二鍾。生姜三片。黑棗一枚。煎至八分。去滓。溫服。不拘時候。

按經曰：氣主煦之，血主濡之。故用人參、白朮、黃芪、茯苓、甘草、甘溫之品以補氣，氣盛則能充實於肌肉矣。用當歸、川芎、芍藥、地黃、肉桂、味厚之品以補血，血生則能潤澤其枯矣。

七宣丸治風氣結聚，宿食不消，兼涉石皮毛在腹中，及積疔倒疔，背脊痛，心腹脹悶，胸膈閉塞，風毒腫氣，連及頭面，大便或秘，小便時澀，脈百氣痛，不能飲食，脾氣轉筋，神志不安等疾。

錦紋大黃

麩裏煨十五兩

甘草

炙三兩

柴胡

去苗洗

訶黎勒皮

枳實

煨

木香

各五兩

桃仁

泡去皮尖煨乾六兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二三十丸食速

臨臥米飲送下漸增至四五十丸取宜利爲度覺病勢

漸愈則止服不問男女老少並宜服之量虛實增減

神功丸

治三焦氣壅心腹痞悶大脚風熱大便不通腰腿
疼痛肩背重痛頭昏面熱口苦咽乾心胸煩燥

臥不安及治脚氣并
素有風人大便秘燥

火麻仁

二兩

人參

去蘆名

錦紋大黃

麩裏煨

詞梨

取乾皮
各四兩

右爲細末另入麻仁膏擦勻加煉蜜爲丸如梧桐子大

每服三三十九液曰湯或溫酒飲皆可送下食

臥時服如大便不通可倍丸數以通利爲度

小柴胡湯

治陽寒溫熱病身熱惡風頭項強急胸滿

嘔痰煩渴寒熱往來身高皆黃小便不利
秘澀或過餐不解或潮熱不除及產後勞復發熱瘧疾
婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及
產後傷風

并宜服之

柴胡

去蘆

人參

去蘆

甘草

炙

黃芩

各三兩

半夏

湯泡七次焙乾二兩五錢

右剉劑或爲麤末每服三五錢水二鍾生薑三片棗

一枚去核同煎七分去滓溫服不拘時候小兒分作二服

量其大小多寡

按邪在表則惡寒邪在裏則發熱邪在半表半裏則且

寒且熱故合寒熱往來少陽之脉行於兩脇故合脇痛
其經屬於膽膽汁上溢故曰苦膽者肝之腑在五行爲
木木有垂枝之象故脉弦柴胡性辛溫辛者金之味故用
之以平木溫者春之氣故用之以入少陽黃芩質枯而
味苦枯則能浮苦則降君以柴胡則入少陽矣然邪之
傷人常乘其虛用人參甘草者欲中氣不虛邪不得復
傳入裏耳是以中氣不虛之人雖有柴胡證而人參在
可去也初人表裏氣逆而煩嘔故用半夏之辛以除
嘔逆半夏半裏則榮衛爭故用薑棗之辛其以和榮衛

陳湯

治痰飲爲患或嘔吐泄瀉心或頭眩心悸或中
脘不快或發熱發寒與武之因食生冷脾胃不和

半夏

湯泡洗七次姜汁炒

廣陳皮

湯泡去白各一錢半

甘草

分白茯苓

石劉劑水二鍾生薑三片烏梅一箇同煎至六分去滓

不拘時溫服

按水穀入胃無非濕也脾土旺則能運化水穀上歸於肺下達膀胱無濕氣之可留也惟夫脾弱不能制濕則積而爲痰飲半夏之辛能燥濕茯苓之淡能滲濕甘草之甘能健脾陳皮之辛能利氣脾健則足以制濕氣利則積飲能行東南之人多有濕飲之痰

黃丹痰疔主之其曰加升提之劑者亦清氣升而濁

自降之謂

按此湯乃治一身之痰都管之要藥也欲下行加引下

藥黃柏木通防己之類欲上行加引上藥升麻柴胡防

風之類又曰二陳加升降之藥能使大便潤而小便

溫白丸

治心腹積聚久歲癰塊夫如杯碗黃疸宿食朝吐

攻兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食墮穿五種

淋瘕九種心痛積年食不消化或癰瘕連年不瘳及麻

一切諸風身體頑痺不知痛癢或半身不遂或癱瘓墮

密及療七十二種風三十六種癰疽疔毒性及癰癩或婦

人諸疾歸經不生帶下淋瀝五邪煩心愁憂思慮意思

不樂飲食無味凡水不調及腹中一切諸氣有以震孕

積年屢月虛瘦困癸或歌或哭如鬼所使也服此藥無不降愈

川烏頭

治去皮膚

錢

紫苑

柴胡

石菖蒲

厚朴

製木槓

皂角

吳茱萸

乾薑

黃連 人參 白茯苓 肉桂去粗皮 巴豆去心及膜

蜀花椒去目及閉口者 炒去汗各五錢

右爲細末另入巴豆并勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服
三九薑湯送下食後臨臥服漸加至五九七九通利則
止再縮減回服

川芎茶調散治男婦小兒諸風上攻頭目昏重偏正頭眩

動膈熱痰盛婦人血風攻注太陽穴疼但是感風者悉皆治之

蘇薄荷去梗取葉不見水 防風 三兩 白芷 川羌活

甘草炙各二兩 細辛去塵 川芎 荆芥穗各兩

右爲細末每服二錢食後茶清調下或薑葱煎服亦可

一方加菊花研蠶蠅退名曰菊花茶調散常服清頭目

四物湯

能調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調腹痛疼痛崩中漏下血瘕塊硬癥心疼痛維痲腹冷

將息失宜胎動不安血下不止及產後榮虛風寒

內搏惡露不下結生瘕聚少腹墜痛時作寒熱

當歸身

去鬚微炒

白芍藥

酒洗

川芎

酒洗

乾地黃

酒蒸各

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

按是方治血分之聖藥也。用當歸引血歸肝經，川芎引血歸肺經，芍藥引血歸脾經，地黃引血歸腎經。惟心生血，肝納血，脾統血，肺行血，腎藏血，男子化而為精，女子化而為月水。血有形之物，屬乎陰，故名曰四物湯。

經云：氣血人身之二儀也。天地之道，陽常有餘，陰常不

足人與天地相似故陰血難盛而易虧是方也當歸芍藥地黃味厚者也味厚爲陰中之陰故能生血川芎味薄而氣清爲陰中之陽故能行血中之氣然草木無情何以便能生血所以謂其生血者以當歸芍藥地黃能養五臟之陰川芎能調榮衛中之氣五臟和而血自生耳若曰四物便能生血則未也師云血不足者以此方調之則可若上下失血太多氣息機微之際則曰物禁勿與之所以然者四物皆陰陰者天地閉塞之令非所以生萬物者也故曰禁勿與之

涼膈散

治男婦小兒不膈積熱煩燥多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤疼痛鼻衄頰頰結硬口舌生

瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥不寧譫語狂妄腸
胃燥礙便溺秘結凡一切風壅等症并宜治之

黃芩

酒炒

梔子

炒

蘇薄荷

各三兩

連翹

四兩

大黃

酒炒

甘草

玄明粉

各二兩

右爲麤末每服四錢白水二鍾煎至八分去滓食遠熱

服

按是方黃芩梔子味苦而氣涼故瀉火於中連翹薄荷
味薄而氣穢故清熱於上大黃苦硝鹹寒而味厚故諸
實皆瀉用甘草者取其性緩而戀膈也
不作湯液而作散者取其泥膈而成功於上也

三黃丸

治三焦積熱上攻眼目赤腫小便赤澀大便
結燥五臟俱熱腸風痔漏等症并皆治之

川黃連

黃芩

黃蘗

川黃連
各等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三錢空心白滾湯送下忌煎炒椒薑辛辣等熱物

按少火之火無物不生壯火之火無物不耗經曰壯火食氣是也故少火宜升壯火宜降今以三物降其三焦之壯火則氣得其生血得其養而三焦皆受益矣黃芩苦而枯故清熱於上黃連苦而實故瀉火於中黃蘗苦而潤故瀉火於下雖然火有虛實是丸但可以治實火若虛者用之則火反盛謂降多亡陰也丹溪曰虛火宜補則虛實之辨若天淵矣明者當求之證焉

一各三補丸

三補云何以黃蓮黃芩黃蘗三黃能

陰生故曰三補

接是方乃瀉中之補非補中之

補也若真以為補是向

痴人說夢也程巖泉曰人皆知

補之為補而不知瀉之

為補知瀉之為瀉而不知補之

為瀉而不知言哉

四季三黃瀉心丸

治男婦三焦積熱

熱上焦有熱攻衝眼目

膈煩燥不美飲食下焦有熱小便熱而赤

赤生瘡中焦有熱心

小兒積熱亦宜服之

大黃 酒浸九蒸晒 春秋

黃連

酒炒春四夏五

黃芩

酒炒春四夏五

右為細末煉蜜為丸或用水盪

為丸亦可如梧桐子大

每服二三錢夜白湯送下

按味之苦者能降火黃其味苦而質甚黃連味苦而氣燥大黃苦寒而味厚質粘則上浮故能降火於腦氣燥則就火故能瀉火於心味厚則喜降故能蕩邪攻實此天地親上親下之道水流濕火就燥之義也

青州白丸子

治男婦半身不遂手足顛瘧口眼喎斜痰涎壅塞及一切風他藥所不能療者小兒驚風

大人頭風攪頭風婦人血風並宜服之

天南星

生三兩

白附子二兩半

以水浸洗過日大者用七兩

川烏頭

去皮臍五錢各生用

右爲細末以生絹袋盛用井華水攤末出者更以手揉

命出如有瘡更視再入絹袋搥淨爲度放磁盆中日曬
夜露至晚棄水別用井華水搥又晒至來日早再換新
水攪如此春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾後
加玉片碎研以糯米粉煎粥爲丸如棗豆大初服五
丸服至十五丸生薑湯送下不計時候如癩癩風以酒
酒下二十九日進三服至三日後當有汗便能舒展服
經三五日漸愈如痰癩服止次用吐法

右共爲細末每服三錢用薑汁調服吐痰爲度

大承氣湯

治腸胃積熱其日其脈沉實喘疼痛
連紅腫生翳果發果始久服寒涼之劑太過以
致寒裏火邪結熱未除積于腹內秘結
不通治宜通導行大便平實速可也

卷六

鋪殺大黃

酒洗

苦硝

各三錢

厚朴

去皮

枳實

各二錢

右爲劑水四鍾先煮厚朴枳實至二鍾入大黃煎二三

沸

溫服取利爲度如未利再投一服

按經云火淫所勝以苦下之大黃之苦寒以瀉實熱積
實之苦辛溫攻腸胃滯澀潤燥除熱又燥淫於內治以
苦溫厚朴之苦辛溫破腹中結燥又曰熱淫所勝治以
鹹寒苦硝之鹹以攻蘊熱之堅痞

白通湯

治少陰腎水客寒白利宜通陽氣溫中散寒故用葱白通氣助乾薑附子溫中散寒可也

乾薑

四錢

二錢

附子

製過

三錢

水二鍾煎服木方加人尿豬膽汁苦寒使熱藥不爲寒

乃內經所謂甚者從治之法是也

下寒治傷寒邪熱內蓄伏飲以致頭疼心下痞滿引脇

故用芫花之辛以散飲苦以泄之故用甘

遂大戟之苦以泄水大棗之甘以益脾土

芫花錢半 甘遂四分 大戟一錢 大棗六枚

共爲一劑白水一鍾先煎大棗至八分入前三味同煎

或共爲細末每服二錢用薑汁調服吐痰爲度

除痰湯治風痰
生薑製二錢 廣陳皮去白 枳實去穢 赤茯苓 甘草多

膽南星各一錢

右剉劑白水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

按風痰者濕土生痰痰生熱熱生風出耳耳膿及痰若
甘草前之二陳湯耳加南星以治風痰入積實白痰如
倒置

保命集當歸湯

治發狂
益瞳人

當歸身 黃芩

赤芍藥各一錢半

柴胡 川黃連各一錢

甘草六分 熟地黄二錢

右剉劑白水二鍾煎至八分去滓溫服

保命集羚羊角散治水發狂
下去白

羚羊角剉細末 升麻

北細辛各等分 甘草炙減半

右爲細末一半煉蜜爲丸每服五六十丸用一半爲散

以清氣通滌不九子食後送下

散服二錢空
心滾湯送下

濟陰地黃丸治三陰虧損虛火上炎致目睛散大胸物不
等症其功効與六

味遠少丹用俱

遠玉珠 當歸 山茱萸 菊花 肉蓯蓉 山藥

巴戟肉 枸杞 熟地黃 麥冬去心各
等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服四十九空心滾

湯送下

點眼藥法

凡治目點眼藥必按時候每日須過巳至午始點蓋人之
陰陽與天地同子後一陽生午後一陰生正是陽主之

此方在症
小兒上

際火亦生焉若點藥犯之則火勢難遏平後屬陰方宜
點藥或膏或散或鏡川犀管骨等如鏡膏必融水乳磨
化如散則乾挑俱先宜少點些微若目受藥再累多些
不妨不可令虛目者疼而怕點即係仙丹患者畏懼要
在醫者輕手徐徐對病投藥倘患者閉目仰面久坐不
聯切戒妄想多言輕則可點二三次重則點三四次每
次必用簪撥淨藥薄不可過點過多點則未必爽快恐
激動其火反復增其患矣。

秘製點眼丹藥諸方

飛散

治目疾痛腫止淚明目去翳退
赤疔痲收濕除爛一切等症。

一藍甘石

火煨通紅用童便淬如此七次

明珠砂

琥珀

珍珠

牛黃

真熊膽

以上俱各另研

麝香各一錢

右和極勻每次用牙簪挑少許點眼閉目片時再點又閉片時待藥性過然後用絳椀去藥昏溫水洗淨每日點二三次火閉為妙。

附靈藥方

水銀

黑鉛

各五錢

火硝

八錢

官礬

三錢

先將鉛化開入水銀作一家再加硝礬研勻入陽城罐內鹽泥封固打火二炷香先文後武待冷取出聽用按此靈飛散所宜製也且靈散也甘石收濕除爛點藥。

翳撥雲君砂珀珠末牛黃熊膽者解毒清熱止淚退赤

明目之品也凡目有此症者俱可用

熊膽膏

一切大熱赤眼流淚翳障眼
拍熱蒸明或痛或癢等

熊膽 鮑魚 鱧魚 豬膽 羊膽 川椒 等分

右將膽蜜入銀銚或銅銚中微火熬成膏取起用磁盒
藏之山火毒熱眼神良

夫目症因熱則臉赤肝熱則目泣微熱則癢熱盛則腫
痛或癢或痛皆火之故也氣熱則神濁昏目故合書不
能視物陽盛者喜水惡火故目不可以近燈光此經所
謂天明則日月不明邪害空竅也五膽之書是以清熱

用蜜之潤是以濟火且諸膽者乃甲木之精也蜜者百
花之精也皆有滋潤乙癸之妙焉

宋真宗皇帝勅封瓊液膏

治目一切年久
難療等病症

熊膽 牛黃 礞砂 麩仁

去殼皮
淨剉

黃連

各二錢

龍腦

蜂窠一兩

右熊膽牛黃麩仁黃連四味長流水

碗傾於砂鍋

之內熬至半碗用重綿紙濾過去滓

再用文武

火熬至紫色離火凝絲為度不可太過

取出

礞砂龍腦研極細末和勻入磁罐內封固

目

出水氣每餐服挑少許點於目內

目

方開每日點二三次仍忌一切動風之物

紫釜錠子

若眼疾不分遠年近日諸般翳障而諸障人多

肉翳睛翳毛倒收積年赤障暴發赤腫白睛腫脹沙障難開耗眼緊澀怕日蓋明較多物淚爛該

風痰濕物昏花迎刺淚出目中溜火諸般目疾

蘇甘石飛黃丹各半當歸各五川黃連

硃砂各二白礬生用硃砂製白丁香輕粉龍齒

右蟹蝦飛海螵蛸 熊膽 乳香 沒藥 白珍珠

麝香各一錢梅花片二錢其片麝久留氣味

走泄宜諸藥合畢加入右除脂膩外餘各另製為末秤合和勻次黃連水杵至

千萬餘下自乾次入麝香研細羅過又次入片脂再研

復羅入後膏搜和作錠子陰乾

猪胰子

四枚以稀草水洗去膏膜乾淨

生地黄

一斤

當歸

四兩黃連半斤防風

龍膽草

黃蘗

各二斤

柯子八枚

梨仁

去皮殼五錢

大鷲梨

八枚取汁

久蜜

入兩另熬待乾為度

右將黃連等八味洗淨剉碎以水浸於銅器內春夏三

秋四冬七日濾去滓復添水

次取盡藥力以蜜絹

綿紙重濾過澄去砂土慢火煎

乾各四十九條

互換一順攪不住手攪得此藥如餡餅

磁器盛旋湯瓶口上重湯蒸炮成膏復趁淨滴入水中

沉下成珠可丸為良待數日出火毒再溶化入未和包

杵搗為丸錠陰乾金銀箔為衣每以少許新汲水調化

開鴨毛蘸點眼大眦內又可以熱水泡化作洗眼藥亦
可如冰冷再煖用日洗五六次日點二三次大効
陶丹藥品法製

蘆甘石眼科之要藥也選輕白者佳四兩用

蘇薄荷 羌活 防風 麻黃 荆芥穗 川芎

白芷 細辛

發散之藥各二錢用清河水或雪水更妙四大碗煎至
二碗去滓將甘石槌碎入藥水中於瓶內煮乾爲度此
陰製用陽藥煎水法也又用

蒲翬草 黃芩 赤芍藥 大黃 生地黃 黃連

本草

連翹

劉寄奴

黃蘗

夏枯草

當歸

千里光

菊花

山枝仁

舌寒之藥各二錢用井水五碗春夏浸二日秋冬浸四

日常以手攪之浸畢去滓將藥水分作清濁二瓶將所

煮甘石入陽城罐內大火煨紅鉗出少時先以濁水淬

入再煨再淬以水盡爲度此陽製用陰藥浸水法也又

將前陰製煎水藥滓及陽製浸水藥滓共合一處浸水

二碗去滓濾淨再澄清將煉過甘石傾內研搗浸露一

宿飛過分輕重兩處晒乾上者爲輕下者爲重各研極

細收藏輕者治輕眼重者治重眼此陽丹合制用藥之

法也。蒸甘石經水煉。水陽藥也。又川發散藥製。麝香是
甘發散爲陽之象。故以陽丹名。又用陰藥爲陰。製者是
陽中亦有微陰之象。及治火毒法也。

陰丹藥品法製

銅絲

黃連水煮飛過一錢五分

青鹽塊

白水洗

乳香

各三分

礱砂

日草水洗六分

蜜陀僧

飛過二分

沒藥

三分五厘

又將前製陽丹。蘆甘石一兩。共七味。俱研極細。勿令犯
火。所以爲陰藥也。中用陽丹。甘石者爲陰中。有陽之象
也。但只用蘇州薄荷淨葉。川黃連龍膽草三味。各等分。
浸水三盞。露一宿。去滓。瀝淨水一盞。入前藥在內。調勻。

明月下露一宿而得月之陰氣次日晒乾又得日之陽
氣也候夜露日晒透乾再研極細入後藥此製陰丹之

法也

川黃連

去皮毛洗淨
乾六分三厘

草烏

新白者
六分
細辛去土
五分

胡黃連

條實者洗
淨乾四分

薄荷

要蘇州淨葉洗
淨晒乾三分

以上五味乃疏風退熱之藥取象於五輪之義也各研
極細拌勻用人乳爲丸如小豆大用絹袋盛之懸於東
屋角頭風乾再研極細篩過和前藥內共研勻又入後
藥

生薑粉用大面篩四五塊竹刀齊中切開剉孔以黃連
末與四錢紙包火烘取出爲明細出薑汁晒

乾一 硃砂明首能 黃丹黃連水飛過 白丁香首者

粉霜各一 螺蛳去粗皮研 輕粉各一分 製牙硝四兩

血竭艾葉研四分 雄黃飛過二分 珍珠五分

以上陰丹藥味其和一處研極細用磁罐收貯是為陰丹藥雖頗峻但合時有輕重緩急之分而有病輕則輕病重則重之法也如用者須當斟酌

配合陰陽法式

前所製陰陽二丹無獨用之理所謂孤陽不生孤陰不長之義然配合之法其名有五取陰陽生五行之義也開列於後

右藥研有先後。二丹為先後所配。如加粉砂礬味為次。而片磨則又候諸藥研至極細時。方可加入同研。凡合眼藥。皆依此法。而粗細須以舌嘗之。大抵女人眼藥。宜從右轉。男子宜從左轉。否則治目有反攻之患。須識此意。

九金丹

陽丹九分 陰丹一分 明砂一分 玄川粉一分 煨月桂一分

躑躅香二厘 水片三厘

二八木丹

陽丹八厘 陰丹二厘 粉霜二厘 玄明粉一分 煨月桂一分

明礬

麝香

梅花片

三厘

三七水

陽丹

陰丹

粉霜

礪砂

一分

麝香

一厘

冰片

此丹不用礬

四六火丹

陽丹

陰丹

粉霜

礪砂

一分

明礬

二厘

麝香

冰片

三厘

陰陽合配土丹

陽丹

陰丹

粉霜

礪砂

二分

明礬

二厘

麝香

冰片

三厘

俱研如前法

詳見前頁

卷之二

七二七

用丹頭大要

前所配合諸丹按陰陽生五行之義也其輕重之分則
金丹爲輕而木丹水丹則漸加重暴發赤眼近年翳膜
可以酌點者也至若火土二丹則爲峻重遠年老翳膜
努肉攀睛方可施亦可暫點數次不可常點所謂邪輕
則輕邪重則重又須量人眼內容受何如以意推裁不
必拘執故曰神而明之存乎其人然點眼宜飽治重眼
須用吹若翳膜在眼珠上必吹可到吹較點多有神效
眼輕則不可吹吹點後則以桑白皮側柏葉煎水稍熱
洗之一可以退散赤脈三可以洗去藥毒切勿用冷水

洗忌寒涼點至將愈時則不可過點蓋留有餘不盡之意恐過點以致復發須識此意

不損金撥雲丹

治一切遠年近日
翳障皆能復明

大石蟹

一個爲則
焙製法

大黃

桔梗

川黃連

黃蘗

黃芩

防風

荆芥穗

羌活

烏藥

陳皮

蘇薄荷

枳殼

乾薑

前胡

桑白皮

薑黃

細辛

當歸

水賊草

菊花

柴胡

各等分

右將二十二味細剉用水五大碗放銅器內浸三日將

布濾去滓却將石蟹微火煨令紫色入藥汁內蘸冷取

起細研爲末就將藥水淘飛淨清者以淨器盛淨水安

靜室勿動以物覆器上毋使塵垢入內俟其澄清傾去藥水以蟹粉曝乾取用配合後之諸藥

蟹粉

坯子

各五錢

熊膽

明礬砂

膽礬

各一錢

銀硃

輕粉

麩仁霜

硃砂

各錢

川椒

黃連

夜明砂

牛黃

珍珠

冰片

各五分

巴豆霜

血竭

金墨

各二分

右各依製法合礬一日極細無聲磁確貯之聽用名曰丹頭隨病輕重加減點眼其効如神

輕號

丹頭

五分

冰片

一分

麝香

三厘

坯子

一錢

古其蟻傳制專治一切風熱暴赤爛皮迎風冷淚怕熱

若用或兼半年一發或一年發發作無時悉以輕劑
無之不可輕用重藥病輕藥重反受其害內服合病之
劑爲助

次輕號

丹頭六分 冰片一分 麝香 三厘 煨子心
右共碾極細專治久患不瘥珠上必生薄翳或有紅筋
赤膜悉以此次輕藥點之 每日二四次若見退減日點
一二次愈則勿點

頂號

丹頭七分 冰片一分 麝香 三厘 煨子心 錢

石共蝸極細治眼患頗重或翳障垂簾或赤滯痛澀用
此吹點每日三四次目漸愈卽止吹藥點數亦減內服
稍輕藥爲愈

至重號

丹頭九分水片一分麝香三厘坯子一錢

右共蝸極細專治重眼厚膜遮睛釘白翳昏盲無見方
點此藥每日點二三次漸愈漸減

秘授製蘆甘石法

用好田泥做成大高球二箇外以硃砂硝石不拘多少
共爲末卽將所做高二箇中曝乾極透用上好羊腦

甘草一斤裝在窩內將球相合又用前礬醋鹽水調勻
固濟又州泥包過以乾爲度以大炭週圍架之居中煨
至三炷香盡色如松花樣爲度取出淨入童便內暴乾
蝸一遍淨土者通在一處重澆不碎者裝大照前後煨
又淨再蝸又通所沉者石脚不用細末須灸烘得極乾
再用三黃湯開列於後煮過曬乾收貯聽用

煮蘆甘石三黃湯藥味

川黃連 黃蘗 川羌活 黃芩 山梔仁 防風

木賊草 蟬退 家菊花 白芷 蘇薄荷 細辛

青歸身 川芎 荆芥穗 大黃 赤芍藥 連翹

寶觀齋函 藥卷之六

葵

右剉一劑白水四碗煎至二碗去滓澄清人煨過甘石
煮之

取永粉法

此粉如遇痰火症配痰火藥驚風症配驚一藥每劑中加四厘無有不効

汞一兩鉛二錢五分鐵杓鎔化另放冷定再將白礬牙
硝皮硝皂礬各五錢青鹽二錢炒乾再入鉛汞共研極
細入罐升打鐵蓋北好坳砂鹽泥固濟三釘駕於火上
先用文一炷後武二炷爲度武火時以新羊毛筆蘸水
蓋內畫圈香盡待冷開取用

製礬砂法

用好礬砂五錢以初生男兒乳汁濕透放古鏡背凹處

蓋密布包定埋土內四十九日取出走綠的是法砂聽

用

眼科取靈砒法

白砒五錢爲末用牙硝白煨子一箇切如豆大將砒拌勻用烏公雞一隻饑二日將煨喂之食盡半頓飯時殺雞取出淘淨入確內封固打火三炷香取升蓋靈砒再用多年老鷺洲拌砒封固放淨處四十九日去油加麩仁去殼皮五錢黃連三錢生砒五分俱爲末再入確內打火取出聽用

爛疔方

用虎掌草根燒灰點之努肉并點亦妙

點睛膜者障翳方

凡難退翳障須用是藥
熱除知畏痛勿用治之

國琴二兩要
上好者

人言七分

番礬砂一錢

共研細大陽城礬內打火先文後武礬口留一孔出烟
以烟盡爲度埋土中一宿去其火毒次早開出研極細
末加銀硃一分二厘再研勻似桃紅色收貯礬內聽用
收淚散治風淚
不止

綠蘆甘石

製散飛
細一錢

海螵蛸

五分

梅花片

少許

共研極細點出淚發處

凡墜睛不收捉大白花蜘蛛數箇用陰陽丸焙乾研細末

或滾於丸藥上或溫酒調服卽收神効

敷眼諸藥方

玉龍丹

治一切火眼赤腫

明礬

六分

沒藥

二錢

乳香

二錢五分

蘆甘石

飛過

珍珠

一袋

黃丹

飛淨一兩

蹄脊

七分

梅花片

三分

共研爲極細煉蜜爲丸銀硃五分爲衣收貯聽用如瘡將井花凉水磨塗眼皮外立効

散

治赤腫不能開睛痛熱淚如雨

紫金皮

白芷

生黃柏

大黃

赤小豆

南星

寒水石

薑黃

右各等分爲細末生地黄汁調成膏敷眼四圍

清涼膏

南星

生用

蘇薄荷

各五錢

荆芥

百藥煎

各三錢

右爲細末井水調成膏貼眼角上自然清涼

搜風散

治風熱眼及腫痛

川黃連

大黃

朴硝

黃丹

右等分爲末以苦參同煎湯外加煉過白蜜同調敷眼

四逆散

洗眼諸藥方

神仙護丹

能治內障諸症

當歸 沒藥各二錢 血竭 白丁香 珊瑚 片腦

麝香 馬牙硝 乳香各五錢 黃連三錢 銅綠一兩五錢 爲衣

右爲細末 熬黃連膏和丸如雞頭實大 每用新汲水半

盞 於磁盒內浸常用 每一丸可洗四五日 大病不過一

月 小病半月 冷淚流出 見効

洗珊瑚風赤眼方 其効如神 此藥人家不可少 無目病則以施人 價廉工省 濟人甚便

苦參 錢四 五倍子 荆芥穗 防風 黃連各三錢 銅綠五分

右爲細末 外以蘇薄荷煎湯 丸如彈子大 臨時用以熟

水化開 洗眼 每日三次 立愈 神効

洗眼紅聚兒 治不論年久眼

風眼俱可洗

皮硝一斤滾水泡化澄清去滓取上好紅棗兒一斤去
核入硝汁內浸一日取晒乾又浸如此數次以汁盡為
度子棗兒一箇裝黃連末三分小者二分將棗仍舊合
之勿令洩氣用時取棗一箇投白滾湯泡之不時洗眼
極妙

治眼吹藥諸方

立應散

治內外障翳昏澀多淚及暴赤眼

躑躅花

蘇中

香白芷

當歸

雄黃另用附子炮

鷺不食草

洗淨各等分

右為細末入麝香少許和勻令水隨鼻內去盡濁涕

淚為於

諸玉散

治眼赤腫痛淚紅赤長翳障眼目昏花一切眼症

王伯真一切眼症

羌活

歸獨活

連翹

川芎

枳殼

蔓荊子

細辛

荆芥

白芷

羌活

獨活

蔓荊子

黃芩

三棱

芍藥

白芍

蔓荊子

蔓荊子

白芍

芍藥

白芍

蔓荊子

蔓荊子

蔓荊子

青火金鐵

治一切眼症

饒神

青礬

蘇薄荷

川芎

各五

錢

右為細末

分作八口

湯水

煎服

內濁

神效

主治

醫見前

卷之二

七

淨爲愈

赤火金鐵

治赤眼頭風冷淚
並去耳鳴并赤者

微補用川芎

雄黃

乳石

沒藥

石

右爲細末每用一二分如神搗鼻取效

通頂散

治風毒交加
并喉腫風

香白芷

細辛

藿香葉

各七錢

踰躄花

右爲細末每令病人先噦

冷水

一口然後蘆筒吹

挑陷於鼻內以手擦兩太陽穴

止痛藥方

乳香

治眼疾
並痛藥
且皮

五靈脂二不乳香

沒藥

草烏

夏蠶砂

各五

木鱉子

五枚

右爲細末酒煮麴糊爲丸如梧桐子大每服七丸薄荷湯或茶清任意送下如頭疼痛甚三服卽止

按乳香沒藥總爲定痛之要藥也必審其痛之源而佐之以乳沒則其効速也如有風而痛者用散風藥中加乳香沒藥則痛可止如血滯而痛者當用行血藥中加乳香沒藥而痛卽止如熱鬱而痛者當用清熱藥中加乳香沒藥而痛卽止今人不工於此而惟恃乳香沒藥定痛服之而痛不止者不知治痛之所在也乳香沒藥

竟能奈之何哉而徒嗟其藥之不効弗思甚耳

神仙拈痛散

治一切暴發火眼
疼痛晝夜不止

生明礬

揀上白明透者佳
研極細如粉樣

右用雞蛋清共礬粉調勻將鷺翎毛搽腫眼胞疼痛之處如乾再搽數次其痛卽止

傅氏眼科審視瑤函卷之六終