

新編醫學正傳

醫學正傳卷之五目錄

○麻木門

甲

論

脈法

丹溪方法

一集

人參益氣湯

導氣湯

天麻黃芩湯

補氣升麻和中湯

麻黃桂枝升麻湯

神効黃芪湯

補氣湯

冲和補氣湯

祖傳三妙丸

○耳

病門

里

論

脈法

丹溪方法

丸散

東垣滋腎丸

柴胡聰耳湯

蔓荆子散

秦桔子湯

祖傳經驗方

○目

病門

甲乙

論

脈法

丹溪方法

丸散

滋陰地黃丸

撥雲退翳丸

羊肝丸

春雪膏

爛翳驗方

神効明目湯

明目細辛湯

復明湯

助陽和血湯

歸葵湯

救苦湯

益陰腎氣丸

當歸龍膽湯

瀉陰火丸

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

還睛紫金丹

重明散

石膏差活散

黃連膏

滌腎膏

金絲膏

地芝丸

眼捷方

點眼光明丹

丹溪活套

祖傳固本還睛丸

經驗復明膏

○口病門四十三論

脉法

丹溪方法

九條

益膽湯

柴胡地骨皮湯

又丹溪方法

半夏湯

鵝砂散

碧雪

祖傳經驗方

丹溪活套

○癰癥門四十四

論

脉法

丹溪方法

九十二條

通閑飲

又治喉痺方

普濟消毒飲子

桔梗湯

又治喉痺二方

吹喉散

聖煙筒

祖傳方

又祖傳方

○齒病門

早五論

脉法

丹溪方法

牛膝

灸牙疼法

治虫牙痛方

走馬牙痺神方

小兒走馬牙痺方

東垣射香散

草薢蔻散

羞活散

白牙散

獨聖散

立効散

牢牙散

清胃散

神功散

祖傳方

又祖傳方

擦牙止痛方

祖傳炎法

○鼻病門

早大論

脉法

丹溪方法

九條

鼻渊防風湯

麗澤通氣湯

溫肺湯

御寒湯

祖傳經驗方

又祖傳經驗方

○血

証門早七論

脉法

丹溪方法

卷十七

人參飲子

痰雜血出方

三黃補血湯

瘀嗽吐血方

黃芪散

痰帶血咳出方

雞蘇散

黃芪仁散

又丹溪方法

丸條

畢角地黃湯

四生丸

聖餅子

宣明地榆湯

結陰丹

椿皮散

烏梅丸

槐花散

加減四物湯

當歸和血散

枳殼散

酒煮黃連丸

秘方殼湯

槐角丸

升陽去熱和血湯

升陽補胃湯

生地黃散

王晉膏

龍骨散

射香散

經驗鴻血方

又方治前証

桃仁承氣湯

抵當湯

丹溪活套

祖傳經驗方

髮灰丸

大便下血經驗方

已試驗驗一卷

○痔漏門

單入

論

脉法

丹溪方法

九十一條

秦艽羌活湯

秦艽蒼朮湯

秦艽當歸湯

秦艽防風湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

七聖丸

秦艽白朮丸

脫症方

祖傳七花丸

又經驗祖傳方

○汗証門

單九論

論

脉法

九十一條

麥煎湯

調衛湯

丹溪方法

九十一條

黃芪建中湯

四制白朮散

正氣湯

河間白朮散

丹溪活套

祖傳經驗方

當歸六黃湯

○產証門平論

脈法

丹溪方法

九條

瓜蒌桂枝湯

葛根湯

麻黃葛根湯

大承氣湯

桂枝葛根湯

桂枝瓜夢根湯

小續命湯

防風當歸湯

當歸補血湯

舉卿舉敗散

丹溪活套

已試醫驗

○厥証門平論

脉法

丹溪方法

偶

活人書方法

五味子湯

桂枝麻夢草湯

茯苓甘草湯

通脉四逆湯

當歸四逆湯

吳茱萸湯

蘇合香丸

丹溪活套

○癲狂癇門平論

脉法

丹溪方法

九條

龍腦安神丸

神應丹

錢氏五色丸

元戎二白丸

拔萃妙香丸

硃砂滾涎丸

碧霞丹

控涎丹

牛黃清心湯

牛黃清心丸

丹溪活套

祖傳秘方

○和崇門

五十三論

脉法

丹溪方法

一集

素問五邪証

五邪刺法

丹溪治婦人方法

秦承祖灸鬼法

還竈丹

桃奴丸

蘇合香丸

治斃死方法

祖傳辟邪丹

已試鑒驗

一集

脉法

丹溪方法

一集

○怔忡驚悸門

善論

驚悸養心湯

東垣安神丸

治勞役心跳方

定志丸

朱雀丸

溫膽湯

歸脾湯

祖傳經驗方

八物定志丸

文祖傳經驗方

○三

消門

辛五論

脉法

丹溪方法

卽麻

猪肚丸

丈丹溪方法

二條

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

生津甘露飲

黃芪飲

人參白木湯

絳雪散

人參散

六味地黃丸

大黃甘草飲子

麥門冬飲子

丹溪活套

祖傳經驗方原藥

薑薑湯

新編醫學正傳卷之五

花溪恒德老人震搏天民編集

麻木四

論

內經曰風寒溫三氣合而爲痺故寒氣勝者爲痛痺溫氣勝者爲著痺河間曰留著不去四肢麻木拘挛也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行滯經絡時踈故不痛皮膚不榮故爲不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛痒如絶札縛初鮮之狀古方名爲麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是湿痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感溫麻木兼作者又有因虛而風寒

濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

脉法

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也

脉浮而緩屬溫爲麻痺脉緊而浮屬寒爲痛痺脉濶而芤屬死血爲木不知痛痒

方法

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白木桃仁紅花少加附子行經

○人參益氣湯治兩手指麻木四肢困倦急惰嗜卧熱傷元氣

也

黃芪

二錢

炙甘草

升麻

各半錢

五味子三十粒

柴胡

六分

生甘草

人參

各一錢
白芍藥七分

右細切作一服水二盞去粗稍熱服

導氣湯治兩腿麻木沉重

黃芪

二錢

甘草一錢半

青皮一錢

升麻

柴胡

當歸梢

澤鴻各半錢

陳皮

紅花

少許

五味子

半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

天麻黃芪湯治表有風証因連日醉飲其証復來右口角偏

眼牽引側視及左手腳腿麻木疼痛

天麻

芍藥

神曲炒

羌活

如支節不
痛不用

茯苓

各三分

人參

黃連

各四分

川芎

各五分

黃芪

甘草

升麻

葛根

黃柏

蒼术

澤鴻

柴胡

或加猪苓

分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦洪緩相合
按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其診閉
目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則
絕止常閉目則此証不作是以不敢合眼致不得卧身体
皆重時有痰嗽聾聾中不利煩燥氣短喘促肌膚充盛飲
食不減大小便如常此非風邪乃氣不行也治宜補益肺
氣自愈如經脉中陰火乘其陽分火動爲麻木者當兼去
其陰火則安矣

生甘草

去腎
熱

黃柏

酒炒除
濕

白茯苓

除湿
導水

澤鴻

除濕
導水

升麻

行經
濕

柴胡

已上各
二分

蒼朮

除溫
中

草豆蔻

至三分
去皮子
去核

陳皮

歸身

白朮

各四分

白芍藥

至三分
去皮子
去核

人參

各六分

佛耳草

炙甘草

各八分

黃芪

一錢

右細切作

一眼水

二盞煎至

一盞去粗食遠服

○麻黃桂枝升麻湯治婦人先患渾身麻木睡覺則小減開目
則已其証愈後又因心中煩惱遍身骨節疼痛身體沉重
飲食減少腹中氣不轉運

木香

生姜

各二分

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻

各三分

厚朴

姜制

黑附子

泡去
水

黃柏

各三分

炙甘草

升麻

白朮

泡去
水

茯苓

澤瀉

各四分

黃芪

麻黃

不去
節

人參各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○神効黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面手足附背腳麻木並皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視物昏花睛痛亦皆治之

蔓荆子

二分半錢

人參八分

灸甘草

白芍藥

一錢黃芪二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗臨卧稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黃柏只加黃芪一錢通三錢如麻木甚者加芍藥一錢通二錢如水便淋澁加澤鴻五分一服去則止如有大熱証加酒洗黃柏三分

○補氣湯治皮膚麻木神効

黃芪

陳皮

甘草

各二分

鐵澤鴻

六分

芍藥

八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○冲和補氣湯治目眼則麻木開則不麻四肢無力癢厥酸心

目昏頭眩神効

羌活

七分

獨活

川歸

黃柏

各三分

柴胡

各一分

桂枝

木香

澤瀉

草豆蔻

各二分

甘草

各一分

升麻

各半錢

芍藥

一錢

黃芪

二錢

荳木

各一錢

陳皮

各一錢

黃連

麻黃

不去節

二分

右細切分作二服每服用水一盞半煎至一盞溫服

○祖傳經驗三妙丸治濕熱下流兩脚麻木或如火烙之熱

黃柏

四兩切片

蒼术

六兩水沖浸一

宿麯切焙燒

川牛膝

去芦二兩

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服五七十丸空心姜
鹽湯下忌魚腥羮麥熟麪煎炒等物

耳病 四十二

論

內經曰腎者作強之官枝巧出焉又曰耳爲腎之外候一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳夫腎之爲藏水穀也天一生水故有生之初先生二腎而一陰藏焉而又有相火存乎命門之中也每挾君火之勢而悔所不勝經所謂一水不能勝二火是矣其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痺耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鍾鼓之響其爲可惡早而不治漸而至於龍鍾良可嘆哉治法宜瀉南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎有補而無瀉厥有旨哉

脉法

兩寸脉浮洪上魚爲溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛

法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

方法

丹溪方法
九九條

丹溪曰大病後耳聾及陰虛火動而聾者宜補陰降火四物湯加黃柏主之

○耳鳴宜當歸龍鬚丸多飲酒人宜木香枳榔丸

○耳聾以茱萸烏頭尖大黃三味爲末津調貼湧泉穴以引火下行

○又方治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰吹之皆効

○又方治耳痛及聾耳用桑螵蛸炙黃爲末加射少許吹入耳

中極効或用臘脂胚子蛀竹末加射香少許吹入妙

○又方治諸蟲入耳用香油滴入耳中其蟲即出或死於耳內
或用駢牛乳或雞冠血滴入皆好

○又方治諸蟲入耳用桃葉捲作角子切齊其頭納入耳中其
蟲從角中走出

○大補丸治耳鳴欲聾用黃柏一味不拘多少細切鹽酒拌新
瓦上炒褐色爲細末滴水丸如梧桐子大每服一百丸如
氣虛以四君子煎湯下血虛以四物湯下

○丸耳鳴耳聾皆是陰虛火動或補腎丸或虎潛丸或滋陰大
補丸皆好

○滋腎丸治耳鳴耳聾

黃柏

一兩
鹽酒
知母去毛酒

肉桂半錢

垣東

○柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴而聾

連翹

四錢

柴胡

三錢

炙甘草

當歸身

人參

各一錢

水蛭

五分

另研

蜜虫

三錢去頭去足

另研

射香

少許
另研

右除後

三味別研外其餘細切作一服

加生姜

三片水二

盞煎至一盞去粗

一三味末子再煎一二沸食遠服

○蔓荊子散治上焦熱耳鳴而聾及出瞓汗

炙甘草

升麻

木通

赤芍藥

桑白皮

蜜制

麥門冬

生地黃

前胡

甘菊花

赤茯苓

蔓荊子

蜜各半

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水一盞半煎至

盞去粗食後服

○黍粘子湯治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍胆

各二分

黍粘子

連翹

生地黃

當歸梢

黃芩

炙甘草

黃連

各三分

柴胡

黃芪

桔梗

桃仁

三箇去皮尖另研

紅花

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱食後服忌寒藥利

大便

○祖傳經驗秘方治耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水流岀或乾痛不可忍者用蛇退皮燒存性細研以鵝翎管吹入耳中立愈

論

目病

四十二

東垣曰按陰陽應象論云諸脉者皆屬於目又曰目得血而能視五藏六府之精氣皆上注於目而爲之睛睛之窠爲眼骨之精爲瞳子筋之精爲黑眼血之精爲目窠之總絡氣之精爲目眼肌肉之精則爲約束裏櫛筋骨血氣之精而與脉併而爲系上屬於腦後出於項是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽故陰陽合德而爲晴明也是以五藏六府十二經脉三百六十五絡其血氣皆稟受於脾土而上貫於目而爲明故目者心之使也心者神之舍也故精神亂而不守卒然見非常之怪若邪中其睛則精散精散則視歧視一物爲兩也因事煩擾飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛

則百脉沸騰血脉逆行經曰天明則日月不明邪害空竅是也夫脾者諸陰之首目者血脉之宗也故脾虛則五藏之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主藏神明宜靜而安相火化行其令相火乃包絡之火主百脉皆榮於目既勞後妄動又因邪氣所併而損血脉是故諸病生焉醫目者若不先理脾胃及養血安神乃治標不治本是不明至理者也學者其可不用心乎

脉法

左寸脉洪數心火炎也閑弦而洪肝火盛也

右寸閑俱弦洪肝木挾相火之勢而來侮所不勝之金而制已所勝之土也

方法
丹溪方法

丹溪曰目病屬風熱血少神勞腎虛

○河間曰在府則爲表當除風散熱在藏則爲裏當養血安神如累失明昏澁翳膜眵淚班入眼皆風熱也一云班入眼此肝氣盛而發在標也宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳子散皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

○瞳子散大背辛熱所爲也辛主散熱乘之當除風熱涼血益血以收耗散之氣芩連苦寒除邪氣之盛爲君當歸身生地黃養血涼血爲臣五味子酸寒體浮收瞳子散大地骨皮天門冬瀉熱補氣或用滋陰地黃丸最妙

○火病昏暗以熟地黃當歸根爲君羌活防風甘菊花之類佐

之

○暴發赤腫以黃芩防風爲君以鴻之黃連當歸爲臣以養血
羌活柴胡升麻白芷甘草爲使白睛紅加白芷蔻少許

○又方治血熱壅痛四物湯加草龍胆防已防風羌活一云實

熱上衝眼痛用黃連鴻火當歸補血

○勞後飲食不節內障昏暗蔓荆子湯

蔓荆子

人參

甘草炙

黃芪

黃柏

白芍藥

酒炒

右細切水煎服

○又方治眼痛用生地黃酒浸鴆爛盦眼上又用草烏南星乾
姜桂枝爲末醋調貼兩足心時用牛膝膏洗眼

○肥人風熱上壅眼目疼痛

防風

羌活

荆芥

酒芩

水煎服

○瘦人目痛乃是血少兼熱須用養血藥少加風藥

當歸

生地黃

酒洗

玄參

川芎

防風

荆芥

菊花

細切水煎服之

○滋因地黃丸陰

熟地黃

壹兩

生地黃

一兩半

紫胡

八錢

天門冬

茺蔚草

枳殼

地骨皮

黃連

五味子

各三錢

人參

二錢

當歸身

酒浸

黃芩

各五錢

右爲細末煉蜜爲丸如棗豆大每服一百丸茶清下

○秘傳撥要退翳丸又名神仙退雲丸治一切内外障膜遮睛昏暗大

効

瓜萎根

枳實

茺蔚草

蔓荆子

菠蘿各五錢

川芎

木賊

童便浸一宿去節焙乾

密蒙荳

荆芥穗

地骨皮

甘菊茶

煩熱

煩熱

白蒺藜

羌活各一兩

蛇蛻

蟬蛻

黃連各三錢

川椒七錢半去目

當歸酒浸洗

草決明五錢炒

右為細末煉蜜為丸每兩分作十九每服一丸食後臨臥

服日進三服翳障米飲下睛暗當歸湯下內障木香湯下

退雲丸有犀角五錢乾地黃一兩無蔓荆子甘草川叔歸人當歸湯下有氣木香湯下

局○羊肝丸治一切目疾不間內外翳障青盲等証

白乳羊肝真以刀去膜

黃連一刃

甘菊花

防風

薄荷去梗

荆芥穗

羌活

當歸

川芎各三錢

右為細末將羊肝蒸熟同藥末杵爛為丸漿水下
局○春雪膏點赤眼効

朴硝不拘多

置豆腐上蒸化待流下以瓷器盛之

壠

○爛翳驗方

用茜草根燒灰以燈心點之須臾大痛以百節草刮之

○神効明目湯治眼楞繫急致倒睫拳毛及上下臉皆赤爛睛
疼昏暗晝則冷淚常流夜則眼澁難開

細辛三分

蔓荆子半錢

防風一錢

葛根一錢半

甘草二錢

一方加黃芪一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去相臨卧溫服

○明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火光眼

睫成紐脹糊多隱晦難開眉攢腫闊鼻塞涕唾稠粘大便

微硬

川芎二分

生地黃酒浸

蔓荆子各三錢

當歸

身梢各四分

白茯苓

藁本各四分

荆芥穗五分

防風

麻黃根

羌活各八分

細辛少許

紅花少許

川芎四粒

桃仁七粒

細研去皮

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗滓卧稍熱服忌

酒醋濕麪

○復明散治內障

青皮去

三錢

陳皮去白

川芎

蒼朮各半兩

炙甘草

三分

生地黃

連翹

柴胡各一錢

黃芪

一錢半

當歸身二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服忌酒醋濕

麴辛熱大料物之類

○助陽引血湯治眼發赤後有上熱白睛紅隱澁難開瞓多

眵淚

蔓荆子

一分 香白芷 三分

柴胡

黃芪

炙甘草

當歸身

酒湯

防風

各半錢

升麻

七分

○歸葵湯

一言傳
翹飲子

治目中溜火惡日與火光隱澁難開小角緊

視物昏花迎風有淚

柴胡

三分

生甘草

蔓荆子

連翹

生地黃

當歸身

紅葵花

人參

各四分半
各七分半

黃芪

酒黃芩

防風

羌活

各七分半

升麻

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去相食後服

○叔苦湯治眼暴發赤腫臉高苦疼不可忍者

桔梗

連翹

紅花

細辛

各二分

三

當歸身

夏月減半

甘草

炙各一錢

蒼朮

草龍胆

各一分

羌活

太陽、升麻各二錢

陽明

各二錢

柴胡

少陽二兩

防風

藁本

黃連

各三分

生地黃

黃柏

黃芩

知母

各三分

川芎

六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服若苦疼則多用苦寒藥薰治本經之藥再行加減如睛昏加知母黃柏。

○益陰腎氣丸

此壯水之主以鎮陽光

澤瀉

茯神

各二錢半

生地黃

酒先牡丹皮

山茱萸

當歸梢

酒洗二兩

五味子

乾山藥

柴胡

各五錢

熟地黃

二兩

右烏細末勿犯鉄器蒸搗練密丸如梧桐子大每服五十

丸空心淡鹽湯下

東垣

○當歸龍胆湯治眼中白翳

防風

石膏各二分

柴胡

羌活

五味子

升麻各三分

甘草

酒黃連

黃芩各半分

黃芩酒炒

黃柏酒炒

當歸身酒洗

草龍胆酒洗

芍藥各七分半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗入酒少許熱服

東垣

○瀉陰火丸一名連柏益陰丸

石决明三錢

蜜

羌活

獨活

甘草

當歸梢

五味子

防風各五錢

草決明

條黃芩

黃連酒炒

黃柏鹽酒炒

知母各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如棗大每服五十丸茶清下

垣東
○療本滋腎丸

黃柏酒炒 知母酒炒

各等分爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服一百丸至二

百五十丸空心淡鹽湯下

○加味滋腎丸

肉桂三分 黃連一錢 姜黃一錢 苦參三錢

苦芩蘆酒洗

石膏燒成粉用 貴肚冷

黃柏酒炒 知母去毛酒炒

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服一百丸白湯送下
空心服以食壓之

○退翳膏治黑白翳

蕤仁

升麻各三分

連翹

防風

青皮

各四分

甘草

柴胡各半錢

當歸身六分

荆芥穗水半盞浸 生地黃一錢半 黃連三錢

右細末水一碗煎至半碗去粗更上火煎半盞入荆芥水兩匙入蜜少許再上火熬勻磁器盛貯頻點之

○龍胆飲子治癬眼流濃生疳翳濕熱爲病

穀精草炒半錢 川芎一錢半 蛇蛻各半錢

麻黃一錢半 升麻二錢 青蛤粉各半錢

黃芩炒半錢 卷活

右爲細末每服二錢溫茶清調下

○還睛紫金丹治目眶歲久赤爛俗呼爲赤翳是也當以三棱

計刺目眶外以瀉濕熱如眼生倒睫拳毛兩目緊蓋內伏火熱而攻陰氣法當去其熱內火邪眼皮緩則毛立出翳膜亦退用手法攀出內瞼向外以針刺之出血

白沙蜜

半兩

火燒甘石

一兩水內連水浸半日

黃丹六兩水研

烏賊骨

二錢

硝砂小盒

內放於瓶口上薰乾

射香

各一錢

白丁香

五分直者

輕粉一字

右將白砂蜜於砂石器內慢火熬掠去沫下甘石次下丹以柳枝撓次下餘藥以不粘手爲度作丸如雞頭實大每用一丸溫水化開洗之

○重明散治一切風熱內外障膜眼疾

川獨活

川羌活

川芎

吳射干

仙靈脾

防風

甘草

井泉石

蒼朮

兩各半

丹參

白朮

石決明

草決明

兩各三

石爲細末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日三服

○石膏卷活散治久患双目不明遠年近日內外翳障風熱昏暗倒睫拳毛一切眼疾頭風並皆治之

羌活

治風熱頭風

蜜蒙花

治虛明目

木賊

退翳

白芷

清利頭目

細辛

治風寒

乾菜子

二味起

麻子

起拳毛

川芎

治頭風

蒼朮

明日水藏

黃芩

退熱洗心

甘菊花

解藥毒

荆芥穗

治目瘡

石膏

治頭痛退熱

藁本

治偏頭風

一甘草

解藥毒

右各等分爲細末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水調下茶清亦可日進三服服至十日漸明二十日平安

○黃連膏治一切眼目疼痛瘀肉拔晴風痒淚落不已

朴硝

半斗以水淘淨

白丁香

五升以水一斗淘淨去土質細用

黃連

半斤

右量水入硝香金內熬至七分濾出令經宿水面浮牙者

取出控乾以帛袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清
汁晒乾入風硝更加猪羊膽和蜜令勻點眼極妙

○滌昏膏治一切風壅眼目疼痛不可忍者

白砂蜜一斤黃連一兩

沒藥半兩

黃丹

茶金兩

右以蜜同黃丹熬黑以水二大盞煎黃連成稠汁去粗入
前丹蜜內煎熬稠更入淡藥末同煎數沸濾去粗洗眼甚
妙

○金絲膏治一切目疾昏暗視物如絲羅所遮或痒或痛

宣黃連

半

內細切水一盞

浸一宿

取汁再添水

浸半日

許取斗升發

斗升發

白砂蜜一兩白礬一字

井鹽一分

如無以情益代之

山梔子

二錢

糖碎入前

黃連汁

浸半日

許取斗升發

斗升發

右用銀鑄器煎藥十餘沸用上細生絹加帛數重再濾過

細生絹加帛數重再濾過

銀罐子盛貯時常點眼

○地芝丸治不能遠視而能近視以此除風熱

生地黃

天門冬

各四兩

枳殼一枚

甘菊花各二兩

右爲末煉蜜丸茶酒任下

○眼睫方

即倒睫拳毛也

木鱉子一箇去殼爲末綿裹塞鼻中左目塞右右目塞左
一二夜其睫自正

○點眼光明丹治一切風熱上壅兩目赤腫澀痛風弦爛眼及

內外翳障算証

白僵

甘石一錢

所以黃連半兩煎濃汁去粗用炭火燒

白僵半兩黃連一錢

石通紅涼黃連半錢者七次研

至

辰砂一錢

鵬砂二錢

五分

輕粉三分

片腦三分多至

五分

射香一分

如赤眼腫痛加乳香沒藥各五分內外翳障

加珍珠半錢鴨觜膽礬二分態膽二分爛弦風眼加銅青
半錢飛丹半錢或以諸藥摠合爲一以治諸般眼疾右各
研爲極細末一處和勻再研一二日無聲銀瓶盛貯密封
口不可令泄氣點眼極妙

○丹溪活套云東垣謂目能遠視不能近視火盛而水虧也法
當補腎六味地黃丸主之目能近視而不能遠視有水而
無火也法當補心定志丸加茯苓主之又曰不能近視良
服地黃丸不能遠視卧服定志丸是皆道手足少陰經也
是以知不能近視者腎水虧火也不能遠視者心血不足
也。凡目暴發赤腫宜用羌活防風柴胡白芷升麻酒制
芩連甘草生地黃當歸身白睛紅少加白芷蕤又曰凡眼
暴發赤腫須以防風黃芩爲君當歸生地黃黃連和血濁

火藥爲臣使。凡目久痛或內障昏暗須以熟地黃當歸根爲君以羌活防風菊花荆芥穗生甘草之類爲佐使也。○祖傳經驗固本還睛丸治遠年一切目疾内外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眵多糊迎風冷淚視物昏花等証悉皆治之。

天門冬

去皮心酒浸一宿另作爛如泥

麥門冬

去心培乾

生地黃

酒浸培缺勿犯

熟地黃

勿犯

乾山藥

半一兩

枸杞子

一兩半

川牛膝

一兩酒先用

石斛

一兩酒先用

勿犯

草決明

微一兩

杏仁

一兩去皮另研

甘菊花

一兩用米鹽水

兔絲子

一兩酒浸三宿另研

羊角

半一兩細剝取

烏犀角

八錢生用

五味子

七錢半八錢

防風

八錢去苗

甘草

七錢炙

白蒺藜

七錢去刺

黃連

七錢去根

枳殼

一兩黃色

川芎

七錢

青葙子

八錢微

右爲細末燥蜜丸如梧桐子大每服五十九益湯下

○經驗復明膏去翳膜立効

人參一錢半川歸一錢半 鵬砂一錢半青塙一錢

乳香研一錢另沒藥研一錢另 芳薈一錢 珍珠半錢

射香研一錢後黃丹放兩水飛海漂硝五錢黃連四錢

黃柏六錢 赤爐甘石淬次白沙蜜半斤熟仁五錢去壳

白欽一錢半右件各研爲極細末先將白蜜煎沸掠去上
不
沫再熬滴水中沈碗底方散可用然後入前藥末畧沸掠
勻磁罐收貯日三五次點之効

口病

四十三

論

內經曰中央黃色火通於脾開竅於口藏精於脾故病在舌

夫口之爲病或爲重舌木舌或爲糜爛生瘡或見酸苦辛
鹹味原其所因未有不由七情煩擾五味過傷之所致也經
曰陰之五宮本在五味陰之五宮傷在五味是也是以肝熱
則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹
有口淡者知胃熱也外有謀慮不決肝移熱於膽而口苦者
亦有脾胃氣弱木乘土位而口酸者或膀胱移熱於小腸腑
腸不便上爲口糜生瘡潰爛則傷寒孤感之証上唇生瘡或
食其藏下唇生瘡或食其肝其爲口之爲病種種不同醫者
宜各類推而治之無有不安者也

脉法

經曰左寸洪數心熱口

右寸浮數肺熱口辛

左關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸

右閔沉實脾胃有實熱口干無洪熱者口瘡或然重舌木舌脉虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈宜理中湯

方法

丹溪方法
九三條

丹溪曰脾熱口干三黃丸主之

三黃丸煎治五勞七傷消渴不生肌肉

黃芩

春四兩
夏秋三兩
冬二兩

黃連

春四兩
夏三兩
秋二兩

大黃

春三兩
夏五兩
冬五兩

和

右三味煉蜜爲丸如梧桐子大每服五丸未知加至七丸

日三服一月病愈久服行及奔馬愚按此方惟實熱者可用虛者勿用

○膽熱口苦譙慮不決所致小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨

一皮遠志煎服

○益膽湯治謀慮不決肝胆虛氣上溢則口苦証

垣東

黃芩去梗

甘草炙

人參一錢

官桂半錢

苦參

菝葜各三分

遠志

取肉去
骨七分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去相溫服

○柴胡地骨皮湯治膀胱移熱於小腸膈腸不便上爲口糜生瘡潰爛心胃壅熱水殼不化等証

柴胡去芦

地骨皮各等分

右細切每服五錢水一盞半煎至一盞食後溫服如病人大便實者加大黃朴硝以利之

○治口瘡用西瓜漿水徐徐飲之無瓜時以瓜皮燒灰付之

○又方細辛黃柏炒各等分爲末捲舌上吐涎乃愈

○又方用焰硝鵬砂含口勿開外以南星爲末醋調貼足心湧

潔亢上神効

○又方用好酒煮黃連成汁呷下即愈

○又方用五倍子一兩黃柏蜜炙滑石各半兩銅錠半兩射香一字爲末摻之極効

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣不足虛火泛上無制用理中湯反治之而愈甚者加附子或用官桂噙之亦妙

○又方治赤口瘡

白礬

桔

沒藥

乳香

銅綠

右爲細末摻之

○又方治白口瘡

雄黃

沒藥

乳香

各一錢輕粉

巴豆霜

右爲細末摻之

○治實熱口中生瘡用

涼膈散

甘桔湯皆効

- 一小兒口瘡不下食衆以狐惑治之必死後以礬湯於脚上浸半日頃寬更以黃柏蜜炙殼麥炒爲末付之而愈
- 又方治唇緊燥裂生瘡用青皮燒灰付之立愈
- 又方治唇緊以皮硝擦於刀上薰取瀝付立効
- 又方治口瘡用野薔薇花根煎湯漱之一云白薔薇根并汁付之
- 又方治口內生瘡用

明礬

桔

黃丹

妙

鹽白梅

燒存性各一錢

人中白

蠟半

射香

另研

- 右爲細末乾摻口內甚者加鵬砂半錢片腦一分
- 鵬砂散治口舌生瘡及咽喉腫痛皆効

鵬砂

馬牙硝

活石

寒水石

枯白礬

蜜

片腦

二分

右爲細末每服半錢許食後新汲水調下

○碧雪治口瘡及咽喉腫痛神効

蒲黃

青黛

鵝砂

焰硝

生甘草

各等分爲細末付之咽喉腫痛槐管吹入

○祖傳經驗方活腫大塞口不通飲食者

真蒲黃

末

煩刷舌上自退若能嚥藥即以黃連一味煎

濃汁細細呷之以瀉心經之火則愈

○丹溪活套云肝膽有實熱令人口酸而苦小柴胡湯加甘草
龍胆青皮之類甚者當歸龍骨丸若謀慮不決肝膽虛而
苦者人參遠志茯神甘草爲君柴胡草龍膽爲佐使甚者
錢氏地黃丸虛者補其母也○心熱而口苦或口舌生瘡
黃連瀉心湯牛黃清心丸涼膈散之類○脾熱而口甘者

三黃丸平胃散之類○肺熱而口辛者甘桔湯瀉白散金沸草散之類○腎熱而口鹹者滋腎丸大補陰丸滋陰大補丸之類

論

內經曰一陰一陽結謂之喉痺王註謂一陰即厥陰肝與胞絡是也一陽即少陽膽與三焦是也四經皆有相火存焉子和曰膽與三焦尋火治肝和胞絡都無異東垣曰火與元氣不兩立一勝則一負蓋元氣一虛則相火隨起而喉痺等累病作矣夫喉之爲會厭者經謂之吸門是也以其司呼吸主升降爲人身緊關之橐籥門戶也若夫卒然壅隔水漿不入言語不通死在須臾誠可經駭其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾步治會厭之一邊腫者俗謂之单乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳經曰一水不能勝二火又曰一水不能勝五火甚言其真水之易虧而相火之易動也如

大怒則火起於肝房勞則火起于腎飲食失節則火起于脾
胃之類是故知火者痰之本痰者火之標火性急速故病發
則暴悍治之之法必先大湧其痰或以鍛鍼刺其腫處此急
則治標之法也用藥者必湧以內經從治之法而以桔梗甘
草玄參升麻防風羌活荆芥人參白朮茯苓之類少加乾姜
附子等藥爲嚮道徐徐頓與不可頓服此爲治之大法也切
不可驟服寒涼之藥非徒無益而且促其死耳俗人未諳此
理而峻用芩連梔柏之類而正治之又甚者雜進以大寒草
藥頻與頓服但覺腫勢稍退語言畧通而曩者病者皆爲獲
効而喜殊不知上熱未除中寒復生其毒氣乘虛而入腹漸
而至於發喘不休不可治矣良可嘆哉外有天行一種名曰
大頭病俗呼爲裡頭瘟其証甚爲凶惡染此者十死八九宜

推運氣治之治法亦不甚相遠也東垣普濟消毒飲子甚妙
實爲百發百中之劑學者再宜詳究而擴充之務活人於斯
世也幸甚

脉法

兩寸脉浮洪而溢者喉痺也 脉微而伏者死

方法

丹溪方法

重者

丹溪曰喉痺多屬瘻宜用吐法或只以桐油灯脚用鵝翎探
吐之病輕者新取園中李實根噙之更研水於項上付之

蘆氏曰按本草蠶實根即馬闌草根也龍治喉痺此方多有
之此又日園中李實根未如孰是

○繼喉風屬痰熱亦宜吐之

○又方用遠志去心爲末水調付項上

○又方用燈心草燒灰吹入喉中

○一方治咽喉痛腫

荆芥穗 當歸身

桔梗

甘草

各等分

右細切水煎放溫漱而服之有熱加黃芩枳殼宜刺少商出血立愈

○又方治喉乾燥痛用四物湯加桔梗荆芥黃柏知母立已
○又方治喉瘍痛者多屬虛火逆行無制用人參黃柏

蜜炙

荆芥

虛火用人參竹瀝血虛用四物加竹瀝

○又方治黃擦郎根谷名倒刺入好酒少許研汁滴入喉中愈

○又方以燈籠草炒焦爲末酒調付喉中

鴻寶熟火黃連荆芥波奇硝石爲末姜汁蜜調噙化

○喉舌之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以緩治甚而急者惟用砭針刺血最爲上

東垣

○通關飲治喉痺腫痛不能語言者但可進藥無不愈者此從治之法也

一 方有參桔子無白木共名利膈湯治一切咽喉生瘡腫痛

人參

白木

茯苓

各一錢炙甘草一錢半

桔梗

去芦二錢

防風

去芦七分錢或加附子

荆芥

半錢

波奇

半錢

右細切作

一眼水

二盞煎

七分徐徐與之

○又方治喉痺用鴨嘴膽礬三分或半錢吹入喉中吐痰愈
○普濟消毒飲子治天行喉痛等証

方見瘟疫門

○桔梗湯治咽喉微覺腫痛聲破難語

當歸身

馬勃

各一錢

白僵蚕

炒

黃芩

各三分少許

麻黃

去節五分

桔梗

去芦

甘草

炙各一錢

桂枝

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○又治喉痺方新取青父葉杵汁灌入喉中即愈

○又方治蛇床子於有嘴瓶中燒令病者以瓶嘴布口中吸煙入喉內立愈

○吹喉散治咽喉一切腫痛

綠礬

半兩
另研

用青魚膽一箇以礬研細入胆內

巴豆

半錢
另研

輕粉

五分
另研

青代

紫少
另研

右將膽礬同巴豆肉於銅鉗內飛過去巴豆合朴硝巴下四味再加射香少許研勻每用一字吹入喉中吐出痰血立愈

○聖煙筒治喉痺草房子取肉搘碎帛捲作筒燒煙吸之

○祖傳經驗秘方治喉痺神効

馬蘭菊

五介龍草

車前草

信名培養衣

右以三物杵汁徐徐飲之

○又方治喉痺及喉中熱痛等証用上好消梨杵汁頻頻飲之

如患者能自嚼嚥下亦可多食爲良大解熱毒惟金瘡產婦及諸脫血証不可食以其破血故也其餘一應癰亦發

背等証多食極妙

齒病

四十五

論

內經曰百病之起有生於本者有生於標者夫齒者腎之標骨之餘也足陽明胃之脉貫絡於齒上齦手陽明大腸之脉貫絡於齒下齦手陽明惡寒飲而喜熱飲足陽明惡熱飲而喜寒飲故其爲痛有惡寒惡熱之不同也有開口呻吟則痛

甚者腸胃中有風邪也。有開口則穢臭不可近者。腸胃中有積熱也。或謂痛而齒動搖。或謂痛而蟲侵蝕。又有齒縫踈豁飲食不便者。比比是也。大抵齒齦宣露而動搖者。腎元虛也。治宜滋陰補腎爲要。憎寒惡熱而口臭穢者。胃氣熱也。治宜安胃瀉火爲良。其所謂風邪蟲蝕之証。蓋因熱生風而風生虫也。腸胃之火既平。更加以擦牙誅蟲之藥以治其標。無有不安之理也。學者詳之。

脉法

右寸關脈洪數或弦而洪。腸胃中有風熱齒痛。

尺脉洪大而虛者。腎虛主齒動搖。疎豁相火上炎而痛。

方法

丹溪方法
九二陰

丹溪曰。牙疼或出血屬熱。胃中有熱有風寒。有蟲。有濕熱實。

熱腫痛調胃承氣加黃連又用升麻白芷防風荆芥菝葜甘草桔梗之類外用梧桐決射香擦之

○灸法上引痛灸足三里二冗

在足陽明經遠下三寸筋骨外大筋內暗中灸七壯

下引痛灸手三間二冗

在手太陽明大指次指本節後內側暗中手陽明大腸經灸七壯

○治虫牙痛用韭菜子以黃蠟包之外以瓦片燒紅將韭菜子蠟丸置爲其上又別糊一布袋如巨螺樣上以小竹管爲袋嘴將袋覆於蠟丸上以竹管插於齒叢中接匣薰之其虫即死而愈

○治走馬牙疳方其効如神

乾姜

南棗各燒存性枯白礬

右件各等分爲末付之即愈

○小兒走馬牙疳床一齊腐爛即死此方神効

婦人尿桶中白垢火煅一錢入銅線三分射香一分半付之立愈

○射香散治熱多寒少牙齦露肉脫血出齒動欲落疼痛妨食
忤寒少忤熱多

熟地黃二分益智仁二分半當歸身

生地黃

麻黃根

酒漢防已

人參

各半錢

升麻

一錢

草荳蔻

黃連錢半

羊脛骨灰

二錢

射香

少許

右爲末先用溫水漱口淨擦之

○草荳蔻散治寒多熱少牙齒疼痛

細辛葉

防風各二分

羊脛骨灰

熟地黃

各半錢

當歸

六分

草荳蔻

黃連各一錢

升麻

二錢半

右爲細末如前法擦之

○羌活散治客寒犯腦及風寒壅襲腦痛項筋急牙齒痛動搖

肉齶袒脫疼痛

藁本

香白芷

桂枝

各三分

蒼术

升麻

錢各半

當歸身六分

草荳蔻

一錢

羌活

一錢

羊脰骨灰

錢二分

麻黃去根莖

防風

錢三

芦各半

柴胡

錢五

細辛

少許

右爲細末如前法擦之立愈

○白牙散

白芷

七分

升麻一錢

石膏一錢

半

羊脰骨灰

二錢

射香

少許

右爲細末如前法擦之立效

○獨聖散治一切牙痛風痺等証

北地蒺藜

不拘多
火陰乾

右爲細末每用刷牙以熱漿水漱牙外鹿末熬漿水刷牙大有神効

墳東

○立効散治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡熱飲其脉上中下三部陰盛陽虛是五藏內盛六府陽道脈微小小便滑數

細辛

三分

炙甘草

半錢

升麻

三分

防風

一錢

章龍胆

酒洗

三錢

作

右爲細末切壹服水一盞煎至七分去粗以匙抄在口中
嚼痛處待少時則止○如多惡熱飲更加章龍胆一錢此
法不定隨寒熱多少臨時加減若更惡風作痛加荳蔻
黃連各五分勿加章龍胆

○牢牙散治牙齦肉綻有根牙痒腫痛牙齒動搖欲落牙齒不

長牙黃口臭

羌活

一兩

草龍胆

酒洗
一兩半

羊脰骨灰

二升麻

四兩

細末臨臼牙貼牙齦上

○清胃散治因服熱藥或食辛熱之物致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛足陽明之別絡入腦喜寒惡熱乃是手陽明經中熱盛而作也其齒喜冷惡熱

當歸身

黃連

夏月
倍用

生地黃

酒制
各三分

牡丹皮

半錢

升麻

一錢

右爲細末作一服水一盞半煎至一盞濾去粗帶涼服

○神功丸治多食肉人口臭不可近牙齒痺蝕牙齦肉得脫牙

齒落血不止

蘭香葉

如無蘆香代之

當歸身

蘆香葉

木香

各一錢

升麻

二錢

生地黃

酒洗

甘草

生各三分

黃連

酒洗

續砂仁

各五

右共爲細末湯浸蒸餅爲丸如棗大每服一百丸或加至二百丸止白湯下食遠服○此藥兼治血痢及血崩及血下不止血下褐色或紫色或黑色及腸澼下血空心服米湯下其膝洪大而緩者及治麻木血氣上衝逆氣上行妄聞妄見者皆効

○祖傳經驗秘方治胃有實熱齒痛或上引痛尤甚者用涼膈散以大黃酒蒸爲君加知母石膏升麻爲佐頻頻含嚥即

愈

○又方治胃熱齒痛口臭穢不可近者用大黃荆條一二十斤於火上烹瀝入姜汁六分之一時時含嚥甚効

○麗澤通氣湯治鼻不聞香臭

黃芪八分

蒼朮

羌活

獨活

防風

升麻

葛根各六分

炙甘草四分

麻黃

冬月加鄭川椒

白芷各二分

右細切作一服加生姜三片棗一枚葱白三寸水二盞煎至一盞溫服食遠忌一切冷物及風寒涼處坐卧

○溫肺湯治鼻不聞香臭多眵淚

丁香二分

防風

炙甘草

葛根

羌活各半錢

升麻

黃芪各七分半

麻黃不去薑半錢

右細切作一服水二盞葱白三根煎至一盞食後溫服

○御寒湯治寒氣風邪傷于皮毛令鼻壅塞咳嗽上喘

黃連

黃柏

羌活各二分

炙甘草

佛耳草

款冬花

白芷

防風

各三分

升麻

人參

陳皮

各半錢

蒼术

七分

黃芪

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後服

○祖傳經驗秘方治鼻中時時流臭黃水甚者腦亦時痛俗名
控腦砂有虫食腦中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性爲
細末酒調服之即愈

○文方用治白牛毛張葉如白楊木葉者是焙乾爲末吹入鼻中立

愈

論

血証

四十七

內經曰大怒則形氣絕而血菀於上又曰怒則氣逆甚則吐血又曰陽明厥逆喘欬身熱善驚衄吐血又曰溫逕汗出爲孰衄又曰脾移熱于肝則爲驚衄胞移熱于膀胱則癃而溺血又曰結陰者便血一升再結二升三結三升又曰卟則血歸肝肝受血而能視肝之目得血而能視此云肝者蓋目爲足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝又曰心出血肝納血肺出氣腎納氣夫人身之氣血者精性之所依附並行不悖循環無端經曰一息不運則機絀窮一毫不續則害壞判若夫暴喜傷心則氣緩而心不出血故肝無所受或暴怒傷肝則氣逆而肝不納血故其血無所歸又苦房勞過度

以致陰火沸騰血從火起故錯經而妄行也是以從肺而上溢于鼻者曰衄血從胃而上溢于口者曰嘔血夫所謂各血嘔血者出于腎也咳血嗽血者出于肺也又有痰帶血絲出者或從腎或從肺來也其血出于小便者曰溺血曰血淋出于大便者曰腸風痔血糞前來者曰近血糞後來者曰遠血流結于腸胃之間而成積者曰血癥血癓大抵血從下流者爲順易治血從上溢者爲逆難治丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經又曰諸見血爲熱証正經所謂知其要者一言而終不知其要者流散無窮此之謂也

脉法

內經曰脉來如懸鈞爲衄血常脉脉至而搏血衄身熱者死

陽澼下膿血脉弦絕則死滑大則生血溫身熱者死

脉經曰脉得諸澁濡弱爲亡血 脉來輕輕在肌肉尺中自

浮目睛暈黃衄血未止

太陽脉大而浮必衄吐血 病人面無血色無寒熱脉沉
弦者衄也

脉浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血

脉極虛芤遲爲清殺亡血失精

脉芤爲失血 滂爲少血 脉弦而緊脇痛肝藏傷主有

瘀血 吐血嘔血脉滑小弱者生實大者死

嘔血脉堅強者死滑濡者生

方法

丹溪方九

丹溪曰口鼻血出皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出

血

上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

按此語雖見前論蓋一章之大旨故重以示學者

○衄血涼血行血爲主犀角地黃湯入麝金

○一方用荆芥穗研服或用蘿蔔上半段杵汁服又以汁滴入鼻竇中或灸大椎及啞門穴二三壯俱可止之

○本草衍義以壹草葉洗淨研汁一盞入生姜汁三分之一細細呷之治大熱衄血

○吐血是火載火上錯經妄行脉必大而芤大則發熱芤則虛血失

○大法四物湯加炒梔子童便姜汁竹瀝

○一方用薤汁一云九血逆行或止血或清血
或止血醒氣用生汁服之最妙童便姜汁磨入麝金飲之其血自清如無麝金以山茶花代之一云用麝金末以姜汁童便和好酒調服

○吐血大全良方四生丸甚妙亦治衄血

○又方童便調姜附末服之

○又方童便二分酒一分搗側柏葉溫飲之

○吐血因有亦怒而得者經曰怒則氣逆甚則嘔血

○一方治吐血不止用乾姜炮爲末童便調服

○山梔子最能清潤脫之血

○有先吐血後有痰者是陰虛火盛四物湯爲主加痰火藥若先吐痰而後血多者是積熱降痰火爲急

○有暴吐紫血成塊者是熱傷血結于中吐出爲好用四物湯

加清熱等藥調之

○吐血鮮血隨而出于腎亦有瘀血內積肺氣壅遏不能下降用

天門冬來門冬知母具母桔梗黃柏熟地黃遠志或加乾

姜

○咳血挾出寒內有血痰盛心熱多是血虛用青代瓜萎仁訶子具母海石山梔子爲末姜汁蜜丸噙化嗽盛者加杏仁後以八物湯加減調理寒盛者宜更加涼藥

○咯血用姜汁童便青代入血藥中用四物湯地黃膏牛膝膏之類有客血寒帶血絲出者同治但宜加寒藥

爲末付之極妙

○大便下血有熱有虛熱用四物湯加炒山梔子升麻秦艽阿膠虛用四物湯加乾姜炮升麻

○便血用白芷五倍子爲丸服効

○便血有風邪下陷者蓋風傷肝肝生血故也宜升提之四物

湯加防風荆芥升麻柴胡秦艽槐花條芩地榆只壳煎服

○有濕傷血者宜行濕消熱蒼朮白朮黃連黃柏當歸川芎芍藥

欒地榆槐花水煎服之

○因積熱下血用蒼朮陳皮各一兩半連翹五錢黃連黃芩黃柏各七錢半炒爲末生地黃膏大服

○腸風下血獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青代升麻

○一方用大黃煨堯仁去殼研各三錢當歸枳榔皂角仁黃柏荊

芥穗只壳各五錢黃連炒秦艽槐角子各一兩

右爲末麴糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下如

鮮血下甚者棕柏灰蓮房各五錢

○久經血逆行或血腥或吐血唾血用韭汁服自清

○人參飲子治衄血

麥門冬

一錢當歸身

一錢

人參

黃芪

各一錢半

白芍藥

甘草各一錢

五味子九枚

右細切作一眼水

一盞半煎至一盞溫服

○瘀涎雜血出于脾葛根黃芪芍藥黃連川歸沉香末甘草水

煎服

○三黃補血湯治吐血

黃芪

川歸

柴胡

各一錢熟地黃

川芎

各一錢半

芍藥

生地黃

各一錢半

牡丹皮

升麻

各半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○一方治瘀欬吐血

紅花

杏仁去皮煎

枇杷葉

拭去毛姜汁塗後煎

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○一方治瘀欬吐血

紫苑

鹿茸酒

木通各

大黃半兩

右爲細末蜜丸龍眼大噙化

○黃芪散治咳血成勞

黃芪

麥門冬

熟地黃

桔梗

白芍藥錢各一

甘草半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○一方治癰帶血咳嗽出

白朮

半錢一錢

川歸

芍藥

牡丹皮各一錢

桃仁研

錢

梔子七分半

黑色

甘草三分

麥門冬半錢

右細切水一盞半煎至一盞去粗溫服

○雞蘇散治勞傷肺經咳嗽有血

雞蘇即荳

黃芪

生地黃

阿膠珠

濟生

垣東

垣東

具母

白茅根各一錢

桔梗

麥門冬

蒲黃

炒黑色

甘草各半錢

細切水煎服

○意苡仁散治肺損嗽血

薏以仁

不拘多少

右一味研爲細末以

積猪肺一箇

煮熟蘸藥食之

薏以仁

不拘多少

右一味研爲細末以

積猪肺一箇

煮熟蘸藥食之

○又方用猪心一箇竹刀批開入沉香末一錢重大半夏七箇

入在心中席包數重外以童子小便沃濕塘火煨熟取去

半夏吃之嗽血吐血皆効

○一方治弱血山梔子飲

梔子

不拘多少

炒黑色

右爲細末水煎連粗服之

○一方用小薊根琥珀二味爲末水煎服之蓋二物能治下焦

熱結血淋

○又方治溺血神効

生地黃四錢二分

小薊根

滑石

通草炒

蒲黃炒

淡竹葉

藕莖

當歸酒浸

山梔子炒黑

甘草炙各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

○治溺血因血虛者用四物湯加牛膝膏服

○一方治溺血用五苓散合四物湯煎服効

○凡用血藥不可單行單止又不可純用寒涼藥必加辛溫升

藥如加涼藥用酒煮酒炒之類乃寒因熱用之法也

○一方治小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散

○犀角地黃湯治衄血及吐紅

犀角

赤芍藥

牡丹皮

生地黃

各一錢

右細末切作

一服水煎食後服

局

○四生丸治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生荷葉

生艾葉

生地黃

生側柏葉

右各等分細研爲丸如彈子大

每服一丸水煎或鹽湯下

化

○聖餅子治咯血

青代

一錢

杏仁

四十粒以黃藥煎以黃色

右研杏仁細入青代裡作餅子用時以柿餅一箇破開以
藥餅置於柿中合宜濕布炮包煨連柿研細米飲調
○地榆湯治結陰便血不止漸而極多

地榆

四錢

生甘草

一錢半

炙甘草

一錢宿砂

七枚另研

方溪丹

酒東

酒東

陳

○右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服
○結陰丹治結陰陽風藏毒下血等証

枳壳

炒

歲靈仙

黃芪

陳皮

樗根皮

何首烏

荆芥穗

各等分

右細末酒糊爲丸如梧桐子大每服五七十九清米飲入
醋少許送下

○椿皮散治血痢及腸風下血神驗

樗根白皮

二兩

槐角仁

四兩

枯白礬

二兩

炙甘草

一兩

右爲細末米每服三錢清水飲調下

○烏梅丸治大便下血如神

蠶蚕

一兩炒

烏梅肉

一兩半

右爲細末醋糊爲丸醋湯下三五十丸空心服

生

本

醫經 卷之二

卷之二

三

○槐花散治腸風藏毒下血

槐花

側柏葉

荆芥穗

枳壳

楚綠黃色
許

右各等分爲末每服二錢空心米飲調下

○加減四物湯治腸風下血

側柏葉

生地黃

當歸

川芎

各八分

枳壳

荆芥穗

槐花

甘草

炙各四分

地榆

條黃芩

防風

各六分

烏梅

大者一箇

右細切作一服加生姜三片煎至一盞去粗空心溫服

○當歸和血散治腸澼濕毒下血

槐花

青皮

各六分

當歸身

升麻

各一錢

川芎

四分

荆芥穗

熟地黃

白朮

各六分

右爲細末每服三錢米飲調下

東垣

○枳壳散東垣曰血清而色鮮者腸風血濁而黯者爲藏毒糞前來者爲近血糞後來爲遠血此藥並皆治之

枳壳

上研末
从黃色甘草三錢炙

右爲細末每服一錢空心米飲調送下酒煮黃連丸

○酒煮黃連丸

黃連

去鬚十好酒五升

右將黃連細切以銀石器盛酒煮黃待乾盡爲度焙乾爲末麴糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心服

○秘方枳壳湯治大便脹氣下血

枳壳

一兩慈
从黃色黃連一兩
同炒去黃花不用

右二味量水煎濃汁食前溫服

○槐角丸治五種腸風下血痔漏脫肛並皆治之

槐角二兩

地榆

黃芩

當歸

防風

枳壳麸

右各等分爲細末酒麴糊爲丸如梧桐子大每服五十九空心清水飲送下

○升陽去熱和血湯治腸澼下血另作一派其抑抑然出者有力而遠四散如篩腸腹中作痛熱毒所作也

陳皮二分

熟地黃

當歸身

蒼朮

秦艽

肉桂各三分

生地黃

牡丹皮

生甘草

各五錢半

升麻七分

炙甘草

黃芪各一錢半

白芍藥

一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

○生地黃散治癰熱衄血咯血吐血等証

枸杞子

柴胡

黃連

地骨皮

天門冬

白芍藥

甘草

黃芩

黃芪

生地黃

熟地黃

各半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○玉脣膏治熱血

黃芪

人參

右二味各等分寫末用蘿蔔大者切片厚一指許四五片
蜜淹少時煎蜜炙乾尽蜜二兩寫度勿令焦點藥末吃不
拘時仍用益湯送下

○龍骨散治衄血不止丸九竅出血皆可止之

龍骨多火不拘

右一味細研吹入鼻中即止

○射香散治鼻衄不止

傳祖

白藜柏

龍骨各五錢

射香一分半

一
三

右各另研和勻每用時先以冷水洗鼻孔淨然後用藥吹入孔內或以濕帛捲蘸入亦妙

○經驗方治鴟血

百藥煎

燒灰存性一兩以半兩

右共研細飯丸如梧桐子大每服三四十丸或以米湯調下末子二三錢亦可

○又方治前証用乾柿餅燒灰存性清米飲調下二三錢立止
○桃仁承氣湯治男子婦人血結宵手不可近及中焦畜血妄言見鬼昏迷如狂反久病胃脘疼痛畜血等証

○抵當湯治下部蓄血臍下結痛滿硬等証

寒傷門二方並見

○丹溪活套云凡諸見血証皆是陽盛虛陰君相二火尤甚煎

人活

迫其血而出諸竅也悉宜四物湯加知母黃柏補陰降火之劑爲主治○如衄血咳血或痰帶血絲出者皆從肺中來也本方加酒洗薄黃芩茅花等藥以瀉肺火如嘔血吐血此從胃中來也本方加石膏知母等藥以瀉胃火○嘔血咯血及潮熱咳血此血從腎中來也本方用梔柏皆當以益酒炒更加肉桂一分許以瀉腎火如小便血於溺竅中出澁數成淋作痛或雜尿而出者從此膀胱中來也本方加梔子仁瞿麥牛膝滑石之類以瀉膀胱之火○如小便出血不痛者此心移熱於小腸故曰血從精竅中出也本方加黃連梔子條苓之類以瀉本經之火○大便未糞而血先來者謂之近血知其從大腸中來也本方加枳榔枳實槐花條苓之類以瀉大腸之火○如大便糞而血來

者謂之遠血知其從小腸中來也本方加木通黃芩連
之類以瀉小腸之火○夫血出於口鼻者或加犀角芩連
之類以清之或加茅花蘿蔔節棕柏灰炒蒲黃之類以止之
或加韭汁童便山茶花牡丹皮之類以消之○其血出於
大便者或加槐花側柏葉條芩之類以清之或加地榆荆
芥白芷茅根之類以止之○其血出於小便者或加瞿麥
麥門冬梔子仁之類以清之或加滑石木通大小薊之類
以行之或行之或清之或止之皆當視其新緩急而施治
之俱以四物爲君主之藥也

○祖傳經驗秘方

治小便溺血用車前草葉金陵草葉僵蠶草二味搗取自然
汁一盞空腹飲之立止

○又髮灰丸

用小兒胎髮如無以壯年無病人頭髮剪下者爲上自落者次之燒灰細研別用新取側柏葉搗汁調糯米粉打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯送下或煎四物湯送下尤妙空心服之

○又方治大便下血用箋竹葉燒灰存性米糊爲丸如梧桐子大每服七八十九空心米飲送下

○一男子四十余素年飲酒無度得大便下血証一日如廁二三次每次便血一升許予以四物湯加條芩防風荆芥白芷槐花等藥連日與服不効後用豫斗燒灰二錢七分調入前藥汁內服之又與灸脊中對臍一穴血遂止而平安其病自此不發

痔漏四十八

論

經曰因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔又曰脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉若夫飽食太過則脾氣倦甚不能運化精微朝傷暮損清濁混淆故食積下流於大腸之間而爲病也蓋脾胃一虛肺氣亦乏而大腸之氣亦從而虛其肝木得以乘虛下流而爲腸風病則是皆金失所養木寡子畏之所爲耳其爲變見名狀種種不同曰牛妳曰鼠妳曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸曰外痔曰雖爲狀不一而其因則同焉治法以苦寒瀉火芩連梔子槐花之類以辛溫和血川歸川芎桃仁之類風邪在下以秦艽防風升麻之類提之燥熱佛欝以大黃枳壳麻仁之類潤

之遘此疾者自宜慎口節欲依法調治無有不安者也

脉法

脉沉小實者易治 漸洪而轚弱者難愈

方法

丹溪方法
九十一條

○一丹溪曰痔病因風熱燥歸于大腸也治血爲主大法用芩涼大腸人參黃連生地黃槐角涼血生血當歸和血川芎升麻枳壳寬腸

○漏瘡先須用補藥以補氣血參芪歸朮爲主大劑服之外以附子爲末津和作餅子如錢厚以艾多灸之漏大者艾炷亦大漏者艾炷亦小灸令微熱不可令痛餅乾即易之再和再灸又以補氣血藥作膏藥貼之

○一方治痔瘡腫痛用蠅牛一名陰乾爲末付之即愈或用香

油浸蠅牛月餘而以其油沫之亦効

○洗藥用五倍子朴硝双寄生蓮房煎湯先薰後洗

○又方治痔瘡風腫疼痛用胡麻子煎湯洗之其腫即消

○又方用木鳖子五倍子共爲細末調付

○塞藥用爐甘石煅以童子尿淬之牡蛎煅共爲末付之

○又方用馬蘭草根研細付上片時看肉平樂稍遲恐肉反

○腸風獨在胃與大腸出用黃芩秦艽槐角青代升麻

○一方用大黃

燬桃仁去尖各一

三錢

蠅皮

黃連秦艽槐角子

各二兩當歸梔榔皂角仁黃柏

炒荆芥枳壳各五錢爲末

糊爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下如下鮮血者加

棕梠灰蓮房灰

○秦艽羌活湯治痔漏成塊下垂不任其痒

卷活

二分

秦艽

黃芪

各一

防風

去芦
七分

升麻

三份

炙甘草

麻黃

各少許

藁本

三分

細辛

紅花

各少許

右爲細

切作

一服水煎服

忌寒風處大小便

○秦艽蒼木湯治痔核已破謂之痔漏大便秘澁必作大痛此濕熱風燥四氣合而爲病故大腸頭成塊者濕也作大痛者風也大便燥結者兼受火邪也其西方肺金主氣其體收下亦助病爲邪湏當用破氣藥薰之其効如神

秦艽

去芦

桃仁

去皮炙

皂角仁

燒桂

蒼木

米泔浸

防風

各七分

黃柏

另研酒洗

當歸梢

酒洗

澤鴻

各三分

枳榔

另研二分

大黃

小許雖大便過澁不可多用

右件除

枳榔桃仁皂角仁三味另研外餘藥細切作一服

水三盞煎至一盞二分去粗入枳榔等三味末子再上火
煎至一盞空心熱服待少時以美膳壓之不犯胃氣也服
藥日忌生冷硬物及酒濕麪大料椒姜等物若犯之其藥
無効如有白膘加白葵花頭五朵去萼心青皮半錢入正
藥中同煎木香三分爲細末同枳榔等三味依前煎服餌
古人治此疾多以歲月待除之惟此藥一服即愈

○秦艽當歸湯治痔漏大便結燥疼痛

大黃

煨四錢

秦艽

去芦

枳實

各一錢

澤瀉

當歸梢

研細

皂角仁

白朮

各五分

紅花

少許

桃仁

研細

去皮

右細切作一服水三盞煎至一盞食前服

忌如前

○秦艽防風湯治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔

東垣

東垣

漏也此藥主之

秦艽

防風

當歸身

白朮

各半錢

炙甘草

澤鴻各六分

黃柏

酒洗五分

大黃

燜去皮另研

陳皮

各三分

柴胡

升麻

各二分

桃仁

三十箇去皮

紅花

少許

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熱空心服之避

○當歸 郁李仁 沖治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛
風寒忌房事酒濕麪大辛熱之物

郁李仁

各一錢

皂角仁

七分

枳實

七分

秦艽

六分

麻仁

各半錢

當歸梢

各三分

生地黃

各半錢

蒼朮

各半錢

大黃

燜

澤鴻

各三分

右細切作一服除皂角仁爲末用水三盞煎至一盞去粗

水

水

各三分

水

各三分

水

各三分

入皂角仁末和勻空心服忌如前

○紅花桃仁湯治痔漏經年因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔治法當補北方鴻中央

黃柏一錢半

生地黃一錢

澤瀉八分

蒼朮六分

當歸梢

漢防已

防風稍

雀膽各半錢

麻仁二分

紅花少許

桃仁十個

右細切作一服水三盞煎至一盞去粗稍熟服忌如前

○七聖丸治大腸疼痛不可忍脉訣云積氣生於廁藏傍大腸疼痛陣難當但令稍瀉三焦火莫慢多方立紀綱

羌活一兩

郁李仁湯煎去皮尖另研五錢

大黃八錢

枳榔

桂心

木香

川芎各五錢

右除郁李仁另研細入外其餘共爲細末凍蜜爲丸如梧

桐子大每服三五十丸白湯下食前服取微利一服而愈
切禁不得多利大便其痛滋甚

○秦艽白术丸治痔疾并漏有膿血大便燥硬疼痛不可忍

秦艽去节

桃仁去皮大研

皂角仁燒存性各一兩當歸梢酒浸

澤鴻

枳實黃色去心

白术錢各五錢

地榆三錢

右爲細末和桃仁泥再研勻麪糊爲丸如雞頭實大令藥光滑焙乾每服五七十丸白湯空心下待少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水冷菜之類并酒濕麪及辛辣大料熟物犯之則藥無驗也

○脫疽證

在音工下部病也
谷作肛牀

屬氣血虛與熱氣虛參芪升麻川芎血虛四物湯熱加黃柏外以五倍子爲末托而上之一次未收至五次七次必

收

○又方以陳壁土炮湯先薰後洗

○又方以鰲頭燒存性爲末真麻油調付即收龜頭亦可

○祖傳經驗秘方七花丸治腸風下血久痔皆効

山茶花

芙蓉花

石榴花

檢漆花

松花

白茅花

槐花

枳壳

甘草

炙半两

地榆

一錢

枳榔

二錢

右爲細末醋調麪糊爲丸梧桐子大每服七八十丸煎烏

梅湯下

○又方治腸風下血等証

乾柿餅

燒有性秤灰二兩

酒瓶箸

三年者或二

年者或二

年者或二

年者或二

烏梅

燒

存性已上各秤

百藥煎

一兩如無以五倍子

之

之

之

槐花

半兩炒
焦黑

松壳

半兩
炒黃色

右爲細末醋糊爲丸如梧桐子大每服七八十九醋湯下
或加枳榔半兩

汗証

四十九

論

內經曰心之液爲汗原病式曰心熱則出汗東垣曰西南坤土也在人則爲脾胃夫人之汗猶天地之雨陰滋其濕則爲露露爲雨也據內經獨主於心而東垣又指脾胃而言何也蓋心爲君火主熱脾胃屬土主濕上熱相搏爲汗明矣亦如地之濕氣爲雲霧而上升其天地若不下降則不能成霖雨也又如瓶中燒酒若非湯火熬淘則不能成汗液也夫各藏皆能令人出汗獨心與脾胃主濕熱乃摶司耳故內經又曰

飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於
腎疾走恐懼汗出於肝搖躰勞苦汗出於脾若夫自汗與盜
汗者病似而實不同也其自汗者無時而戢止然出動則爲
甚屬陽虛胃氣之所司也盜汗者寐中而通身如浴覺來方
知屬陰虛榮血之所主也大抵自汗宜補陽調衛盜汗宜補
陰降火則大法心虛冷汗自出者理宜補肝益火之原以消
陰翳也陰虛火炎者法當補腎壯水之主以制陽光也靈者
宜詳辨之毋錯

脉法

脉大而虛浮而濡者汗 在寸爲自汗在尺爲盜汗
傷寒脉陰陽俱繫當無汗若自汗者曰亡陽不治

方法

丹溪方法

丹溪曰自汗屬氣虛屬濕與熱盜汗屬血與陰虛

○火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之

○治自汗用人參黃芪少佐以桂枝陽虛者附子亦可用

○痰病亦有汗者

○麥煎湯治諸虛不足及新病暴虛津液虧欠體常自汗夜卧則甚久而不止體瘦心忪驚惕短氣疲倦

牡蛎

黃芪

麻黃根

各一錢

右細切作一服入小麥百餘粒水煎服

○調衛湯治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任風寒証

黃芪

麻黃根

各一錢

羌活

二分

生甘草

當歸梢

各五分

生地黃

錢

麥門冬

各三分

生黃芩

半夏

各五分

猪苓

二分

蘇木

一分

紅花

各一分

五味子七錢

忍自汗陽虛之証不應下羌活半夏生姜

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞去粗稍熱

服

○當歸六黃湯盜汗之聖藥也

當歸

一錢

生地黃

各七分

熟地黃

各七分

黃柏

各七分

黃芩

一錢

黃連

各七分

黃芩

各七分

右細切作一服水二盞煎至一盞食前溫服小兒減半又
曰小兒不須治小兒雖能自愈然不治

○黃芪建中湯治自汗及盜汗皆効方見傷寒門桂枝湯或浮

○四制白木散治盜汗

白木

四兩內一兩以黃芪同炒一兩以石斛同炒一兩以杜仲同炒一兩以桂皮同炒凡同炒者皆去之

右取白木一味爲末每服三錢粟米湯調下

東垣

○正氣湯盜汗

黃柏

知母
各一錢半

甘草
二錢半

右細切水煎服之

東垣

○白朮散治飲酒中風多汗食即汗出如油漏又不治必成消渴

牡蠣

三錢炒

白朮

一錢半

防風

二兩半

右爲細末每服一錢溫水調下不計時候如惡風倍停風防白朮如多汗面腫倍牡蠣

○丹溪活套云仲景桂枝湯治外感風邪自汗之聖藥也黃芪建中湯治外感挾氣虛自汗之劑也東垣補中益氣湯內治傷寒氣虛自汗之妙劑也甚者六脉浮濡而虛本方加附子以治陽虛其効如破塵桴○如左寸脉浮洪而自汗

者心火炎也本方倍參芪加麥門冬五味子黃連各半錢
○如左關脉浮弦而自汗者挾風邪也本方加桂枝芍藥
各半錢若不陰虛只有桂枝湯可用也○右關脉浮洪無
力而自汗者只因本方倍參芪而自愈○右盡脉洪數無
力而自汗者或盜汗相火挾君火之勢而犯伐肺金也本
方加黃連黃芩黃柏各半錢只用當歸六黃湯○左尺脉
浮洪無力而自汗者水虧火盛也本方加知母黃柏各半
錢熟地黃一錢壯水之主以制陽光也○凡內傷及一切
虛損之証自汗不休者總用補中益氣湯少加附子麻黃
根浮小麥其効捷如影響但升麻柴胡俱用蜜水製炒以
殺其升發勇悍之性又欲其引參芪等藥至肌表故不可
缺也○凡上所云皆指內傷虛損自汗之証故皆以補中

益氣爲主治之藥也。

○上湖呂俊文得內傷虛証發熱自汗如雨不止服補中益氣湯十數貼不効予以前方加減每貼用蜜制黃芪一錢半人參一錢白朮甘草陳皮各七分當歸白芍藥各一錢升麻柴胡各一分加桂枝三分麻黃根七分浮小麥一撮炮附子三分三貼而汗止熱亦退而安

症病

五十

論

內經曰諸痙

滑氏曰痙屬作痙

項強皆屬於濕

王注云太陽濕色

又曰諸瘓

王注云太

強直皆屬於風

王注云陽明屬而陰行於分上

原病式曰筋勁強直而不柔

和也夫肝木屬風而主筋經曰諸暴強直屬風理宜然也其所謂諸痙項強而屬於濕者何與蓋太陽陰濕甚則兼風化

亢則害承廻制也是故知瘡之爲病濕爲本風爲標耳故仲景有剛柔二瘡之分不可不辨蓋剛爲陽瘡而柔爲陰瘡也若夫太陽發惡熱無汗惡寒脉弦長脰急脅滿口噤手足挛急咬牙甚則搐搦角弓反張此爲剛瘡太陽微熱多汗不惡寒脉遲濶弦細四體不收時時搐搦閉目合口此爲柔瘡大抵因風濕二氣襲於太陽之經亦有輕重之分其風氣勝者爲剛瘡風性剛急故也濕氣勝者爲柔瘡濕性柔和故也外有諸瘡之候表瘡不任風寒亦能成瘡是以或產後或金瘡或跌仆撲傷癰疽潰爛之後一切去血過多之証皆能成此疾也是乃瘡爲本而風爲標耳亦有絕無風邪而亦能使人筋脉挛急而爲角弓反張之候者血脫無以養筋故也丹溪甚言不可作風治而用風藥恐反燥其餘血而致不救也可

不慎與

脉法

脉經曰太陽病發熱其脉沉而細者爲痺

痺脈來按之築築然而弦直上下行

痺家其脉伏堅直上下

痺病發其汗已其脉濶濶然而蛇累腹脹大爲欲解脉如

故反伏弦者必痺

此痺字恐當作死字

太陽脉其証備身體強几几然脉沉遲此爲痺瓜萎桂枝湯主之

方法

舟溪方法
九二條

丹溪曰大率癰癧相似比癧爲虛切不可作風治而純用風藥多屬氣血虛有火有痰宜補兼降痰火參芪芍歸竹歷

之類

○一方治少年痘瘡醫後成瘻口噤不開四肢強直時或癲癎如腹痛一陣則冷汗而兩癟定汗止脉極強緊如真孩先因

勞倦傷血瘡後血愈虛而又感風寒當用溫藥養血辛涼散風芍藥當歸爲君川芎青皮釣釣藤爲臣白朮甘草爲佐桂枝木香黃連爲使更加紅花少許水煎服愈

○括萎桂枝湯治太陽傷寒成瘻

括萎根

甘草炙

各二兩

桂枝

芍藥

生姜

各三兩

大棗

十二枚

右六味細切作一服以水九升煮取三升作三服連飲取微汗如汗不出少頃以熱粥湯發之

葛根湯治太陽病無汗而小便反少氣上衝胃口噤不得語

欲作剛瘡方見傷寒門

○麻黃葛根湯治剛瘡無汗惡寒

麻黃

赤芍藥

各三錢

乾葛

四錢半

甘草

半合

右細切作一服水二大盞葱白三莖煎八分稍熱服

○人參氣湯治剛瘡大便實熱

方見傷寒門

○桂枝葛根湯治柔痓有汗不惡寒

方見傷寒門

○桂枝栝蒌根湯治柔痓通用

方見中風門

○小續命湯治剛柔二痓通用

方見中風門

○防風當歸散治發汗過多發熱頭搖口噤背反張者宜去風

養血

防風

當歸

川芎

生地黃

各二錢

右細切作一服水煎服

金匱人活

活人

活人

垣東

麻經傳正傳

卷六十五

四

○當歸補血湯治一切去血過多因無血養筋令人四肢痺急
口噤如瘧

黃芪一兩
當歸五錢酒浸洗淨

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服○如挾風或薰破
傷風者加防風羌活各一錢荆芥穗一錢半甘草半錢減
去黃芪一半煎服

○活人舉卿舉敗散治新產血虛發癆者汗後中風發熱亦然
荆芥穗不拘多少火微炒

右爲末每服三五錢外以大豆黃卷以熱酒沃之去黃卷
用汁調下其効如神

○丹溪活套云昔之所謂剛柔二瘻者當以虛實論之是也一
屬外感一屬內傷屬外感者爲剛瘻宜用麻黃葛根湯括

萎桂枝湯小續命湯在裏者大承氣湯之類○屬內傷者爲柔症宜用補中益氣湯八物湯四物湯之類如以風濕二事分剛柔而治恐誤醫者不勝其多今以虛實分治其理昭然無疑矣

○陶氏婦年三十餘身材小瓊形瘦弱月經數忽後日發產口噤手足牽縮角弓張予知其去血過多風邪乘虛而入用四物湯加防風羌活荆芥少加附子行經二貼病減半六貼病全安

厥証

五十一

論

內經曰陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥又曰寒厥者此人質壯以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣

腹脹滿

溢下邪氣因從之而上也氣因於中由陽裏不能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨在故手足爲之寒也熱厥者此人必醉飽入房精氣中虛酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主爲胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不能滋營其四肢也氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相薄熱盛於中故熱遍於身內熱而溺赤也胃氣日衰陽氣獨盛故手足爲之熱也又陰氣盛於上則下虛下虛則腹脹滿則下氣重上而邪氣厥厥則陽氣亂陽氣亂則令人暴仆不知人或至半日遠至一日乃知人也名曰口厥考之張仲景傷寒論陰陽二厥之証皆指手足逆冷而言也河間原病式曰陰厥者原病脉候皆爲陰証身涼不渴脈遲而微陽厥者原病脉候皆爲陽証煩渴譖妄身熱而脉

謂此

數若陽厥極深或失下而至於身冷反見陰証脉微欲絕而死者止爲極熱而然俗醫妄謂變成陰証急用熱藥助其陽氣以致十無一生也愚按內經所載熱二厥者皆常病虛損証也並宜補益之法但熱厥補陰寒厥當補陽耳正經所謂壯水之主以鎮陽光之益火之原以消陰翳也若夫傷寒論所謂陰二厥者冰炭殊途治法亦異診察之間死生反掌醫者其可不盡心乎

脉法

脉經曰寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入於藏則死入於府則愈此爲卒厥不知人唇清身冷爲入藏即死如身溫和汗自出爲入府而後自愈

活人書云陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏

方法

○丹溪曰厥因氣虛血虛者多氣虛脉細血虛脉大如葱管熱厥脈數外感脉浮而實有痰者脉弦熱用承氣湯痰用白术竹瀝外感宜解散藥中加姜汁服

○活人書曰初得病身熱頭痛大便祕小便赤或畏熱或飲水或揚手擲足煩燥不得安卧譁語脣憤而厥此陽厥也大柴胡湯大小承氣湯治之渴者白虎湯妙○手足厥冷脉乍熱結此邪氣結在肾心下煩滿肌不能食瓜蒂散吐之○寒熱而厥面色不澤冒昧兩手忽無脉或一手無脉必是有正汗也多用綿衣包手足急服五味湯或兼與桂枝麻黃各半湯湏更大汗而解○傷寒厥逆心下怔忡者宜羌活水矣參甘草湯主之○如得病後四肢逆冷脉沉而

細足牽卧而惡寒引衣蓋覆不欲水或下利清穀而厥逆者陰厥也四逆湯白通湯厥逆脉不至者通脈四逆湯手足指頭微寒者謂之清理中湯無熱証而厥當歸四逆加茱萸生姜湯喘促脉伏而厥五味子湯吐利手足厥冷煩燥欲死吳茱萸湯

○五味子湯治陽厥脉伏手足逆冷 隱

五味子一兩

麥門冬

杏仁

陳皮半兩

各

右細功用水三盞生姜十片棗二枚煎至一盞半去粗分作二服

○桂枝麻黃各半湯方見傷寒門

○茯苓甘草湯治陽厥怔忡手足厥逆心下有水氣

人活

人活

茯苓

桂枝各二錢

甘草一錢

生姜三兩

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○通脉四逆湯治証陰厥下利清穀四肢逆冷脉微

甘草半錢

附子一枚生用

乾姜一兩

如面赤者加葱九莖嘔者加生姜咽痛加桔梗利止脉不出

出加入人參用水三大盞煎至一盞半去粗分作二服

○當歸四逆加茱萸生姜湯治無熱証而厥

當歸

芍藥

桂枝

細辛各一兩

甘草

通草半錢

茱萸三錢

生姜六錢

右細切水三升煮至一升半分三服

○吳茱萸湯治陰厥吐利手足逆冷煩燥欲死

吳茱萸

生姜各五錢

人參二錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞半大棗一枚服

○蘇合香丸治卒厥不知人未詳風痰氣厥先與此藥極妙每用一丸以湯調化灌之即醒後察脉後而用他藥

丹溪活套云熱厥四肢煩熱蓋濕熱鬱于脾土之中治用東垣升陽散火湯火鬱湯之類寒厥手足逆冷者多是氣血不足補氣血藥加附子飲酒人或體肥盛人手足熱者濕痰鬱火盛也二陳湯加芩連梔子之類若忽然手足逆冷卒厥不知人者多屬痰火亦有陰先虧而陽暴熱者宜多用參膏兼竹瀝姜汁與之人瘦弱者雖無痰而火亦盛也服竹瀝亦能養血而降火

癲狂癇証

五十二

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發爲昫仆日而累

也是蓋陽氣逆亂故令人卒然累仆而不知人氣復則甦此

則癇之類也又曰陽明之厥則顛疾欲走呼腹滿不得卧面

赤而熱妄見妄言又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋

罵詈不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火

鬱結于中而爲之耳此則顛狂之候也曰顛曰狂分而言之

亦有異乎難經謂重陰者顛重陽者狂素問註云多喜爲顛

多怒爲狂然則喜屬爲心而怒屬於肝乃二藏相火有餘之

証難經陰陽之說恐非理也大抵狂爲痰火實盛顛爲心也

不足多爲求望高遠不得志者有之癇病獨主乎痰因火動

之所作也治去癇宜乎吐狂宜乎下顛則宜乎安神養血薰

降痰火雖然此三証者若神脫而目瞪如愚痴者縱有千金

我酬吾末如之何也已矣

脉法

脉大堅疾者顛狂

脉虛弦爲驚爲風癇

脉沉數爲痰熱

脉大滑者自己

沉小急疾者死

虛而弦急者死

寸口沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏入藏則死入府則愈

丹溪曰癲狂脉虛易治實者難治

方法

丹溪方法
五條

丹溪曰癲証大率屬痰與經不必分五等大法行痰爲主藥用黃連南星瓜萎半夏尋火尋痰分多少治無不愈者有熱者用涼藥以清心有痰者必用吐吐後用東垣安神丸及平肝之藥青代柴胡川芎之類

○癲狂原病式所論甚精蓋以世以重陰爲癲重陽爲狂誤也

大槩皆是熱耳

謂素問

盧氏曰重陰重陽之分離經之言也河間

發皆爲熱也心熱甚則多喜火狂制金不得平木則肝實而多怒火又發於中則多干陽明經謂陽明之厥則頭

疾又謂膏梁芳草石藥則熱氣躁悍發爲癲狂此原病

式本素問之論以明頭狂俱是熱病而重陰之說非也

和法治之

○神不守舍狂言妄作經年不愈如心經蓄熱當清心除熱如
痰迷心竅當去痰寧心宜大吐大下愈

○一方治癇証用大蝙蝠一箇以硃砂三錢填入腹內以新瓦
盛火炙令熱酥爲度候冷爲細末每一箇分作四服氣弱
及年幼者作五服空心白湯調下

○龍腦安神丸治男女五般癇癪無間遠近發作無時

扶神三兩 人參

地骨皮

甘草

麥門冬

桑白皮各二兩

馬牙硝二錢

龍腦

麝香各三分半黃五錢

硃砂二錢半

烏犀角一兩

金鉢片三十五

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大金鉢爲衣如風癇病冬月溫水化下夏月涼水化下不拘時二三歲者日進二服大人每服一丸小兒一丸分作二丸服虛勞發熱咳嗽新汊水化下

○神應丹治諸癇

辰砂不拘多少研細

右以豬心血和得所以蒸餅裹劑蒸熟取出就丸如梧桐子大每服一丸食後臨卧煎人參湯下

○錢氏五色丸治諸癆

硃砂半兩 水銀二錢半

雄黃一兩 珍珠一兩

研末另用

鉛

水同熬三兩用

右和勻再研極細麪糊爲丸如麻子大每服三四丸別煎金銀波瀾湯送下

○元戎二白丸治痰涎爲病患以致癲癇狂妄驚悸等証

白礬

一兩

輕粉

一字或半錢量虛實加減

右用生蒸餅劑裹蒸熟去皮可丸入輕粉丸如梧桐子大每服二三十丸生姜湯下小兒如黍米大

○拔萃妙香丸治時毒傷寒解五毒潮熱積熱及小兒癰癧等

証

辰砂

九兩另研

龍腦

膩粉

射香

研各五錢

牛黃

五錢

金箔

九片

巴豆

二百二十粒去皮心

右合研勻煉蜜爲丸每兩分作三十九米飲下

○子和

硃砂

滾涎丸治五癇等証

硃砂

白礬

生用

赤石脂

硝石

各等分

右爲細末研蒜膏爲丸如黍豆大每服三十九食後荆芥

湯下

○局方

碧霞丹治痰涎壅塞牙閼緊急目睛上視癲癇狂妄等

証

石綠

半兩研

度

飛附子尖

烏頭尖

蟬梢

各二十箇

右爲末入石綠令勻

麪糊爲丸如鷄頭尖

大

每服一丸

波奇汗化下更以溫酒半合飲之須臾吐出痰涎然後隨証

以他藥治之如口噤者擗開灌之

三
震驚

○控涎丹治痰迷心竅狂言譫語如有所見

方見痰飲門

○牛黃瀉心湯治心經邪熱狂言妄語心神不安

腦子

另研

牛黃

另研

硃砂

另研各一錢半

大黃

生一兩

右各研爲細末和勻再研每服三錢涼生姜蜜水調下

局方

○牛黃清心丸治心氣不足神志不定驚恐顛狂語言譫妄虛

煩少睡甚至乘衣而走登高而歌踰垣上屋等証

羚羊角末

一夫人參去芦二兩半

白茯苓

一兩二錢

川芎

一兩半

防風

去芦二兩半

阿膠

炒七錢半

乾姜

炒七錢半

白术

一兩半

牛黃

研二錢

射香

研二兩

犀角末

一兩

雄黃

研飛八錢

龍腦

另研一兩

金箔

一十四百肉茶四百斤爲衣

白芍藥

一兩半

紫胡

去芦一兩二錢

甘草

剉炒五兩

乾山藥

七兩

麥門冬

去心一兩半

桔梗

去芦一兩二錢

杏仁

去皮尖及雙仁者炒一兩二錢半另研

黃芩

去一兩半

神麴

炒二兩半

大棗

一百箇
去皮核研膏

白欽

七錢半

蒲黃

炒二兩半

大荳黃卷

一兩七錢半炒

當歸

兩半去頭

肉桂

去皮一兩七錢半

右除棗杏仁金箔外牛黃龍腦射香雄黃四味研為細末入餘藥和勻煉蜜入棗膏為丸每兩作十九金箔為衣每服一丸食後溫水化下

○丹溪活套云五志之火因七情而起鬱而成痰故為頭澀狂妄之証宜以人事制之非藥石所能療也湏診察其由以平之怒傷於肝者為狂為癲以憂勝之以恐解之喜傷于心者為顛為澗以恐勝之以怒解之憂傷於肺者為澗為顛以喜勝之以怒解之思傷于脾者為澗為顛為狂以怒勝之以喜解之恐傷于腎者為顛為澗以思勝之以憂解

之驚傷于膽者爲顛以憂勝之以恐解之悲傷于心胞者爲顛以恐勝之以怒解之此法惟賢者能之耳

○祖傳經驗祕方治顛狂神効

九節菖蒲一味

不拘多少去毛焙乾

不聞雜大声者用

右以木臼杵爲細末不能犯鐵器用黑犢猪心以竹刀批開沙灌蒸湯送下每日空心服二三錢

邪祟

五十三

論

內經曰邪氣盛則實正氣奪則虛夫經之所謂邪者風寒暑濕燥火有餘之渥邪耳非若世俗所謂鬼神之妖怪也病有心虛經惕如醉如痴如爲邪鬼所附或陽明內實以致登高而歌棄衣而走皆痰火之所爲實非妖邪祟之所迷也古雖

塞

有禁呢一科及龍樹說法之治皆移精變氣之術但可解疑
釋惑以使心神之歸正耳何邪祟之可祛哉丹溪曰血氣者
心之神也神既衰之邪因而入理或有之按此恐指少陰之孤逆而言

若夫血氣兩虛痰虛心育妨得升降不得運行以致十二官
各失其職視聽言動皆爲虛妄以邪治之其人必死可不審

乎

脉法

乍

脉乍疎乍數大乍小或促或結皆邪脉也

脉緊而急者適屍

方法

丹溪曰俗云衝惡者謂衝肝邪惡鬼祟而病也如病此者未
有不因氣血先虧而致者焉

○素問遺篇曰人憂慾思慮則傷心又驚而奪汗出於心或遇

少陰司天天所不及因而三虛神明失守蓋心爲君主之

官神明出焉神既失守神光不聚却遇火不及歲有黑屍

鬼見之令人暴亡治去刺手少陽之所過陽池穴也復刺傷心榆即生○人飲食勞倦則勞脾又飲食飽甚汗出於胃

醉飽入房汗出於脾或遇太陰司天天數不及因而三虛脾神不守蓋脾胃諫議之官志意出焉神既守失神光不聚却遇土不及歲有青尸鬼見之令人暴亡可刺足陽明之所過衝陽穴也復刺脾榆即生○人久坐溫地強力入水則傷腎又遇持重遠行汗出於腎或遇太陽司天天數不及因而三虛腎神不守蓋腎爲作強之官伎巧出焉神既失守神光不聚却遇水不及歲有黃屍鬼見之令人暴

亡可刺足太陽之所過京骨穴也復刺腎俞即生○人喪怒氣逆則傷肝又遇疾走恐懼汗出於肝或遇厥陰司天數不及因而三虛肝神不守蓋肝為將軍之官謀慮出焉神既失守神光不聚却遇木不及歲有白屍鬼見之令人舉亡可刺足少陽之所過丘墟穴也復刺肝俞即生○人形寒飲冷則傷肺復登高疾走喘出於肺或遇陽明司天數不及因而三虛肺神不守蓋肺為相傳之官治節出焉神既失守神光不聚却遇金不及歲有赤尸鬼見之令人舉亡可刺手陽明之所過合谷穴也復刺肺俞即生

乃按人見五色非常之鬼皆自己精神不守神光不定故
非外邪所侮乃元氣極虛之候也因患者視目所視

足可矣信真為邪鬼所迷但當推其同行同坐者不見者

五邪刺法

○肝虛見白屍鬼而後累厥不知人名曰卒屍名並同目中神彩不变四肢雖冷心腹尚溫口中無涎舌不卷鼻不縮者可刺之復甦

丘墟二穴在足外踝下如前陷中去臨泣穴五寸足少陽之原也以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼徐徐出鍼按口中閉氣腹中鳴者可治更刺肝腧

肝腧二穴在背第九椎下兩傍各一寸半以毫鍼刺三分得氣則補留三呼次進二分留三呼復取計至三分留一呼徐出鍼氣及即甦

○心虛見黑屍鬼而後累厥不知人四肢雖冷目中精彩不变氣雖閉絕舌不卷鼻不縮未出一時可治刺之復甦陽池也二穴在手表腕陷中手少陽之原也用毫鍼刺入二分

得氣則補留七呼次進一分留三呼復退留一呼徐徐出

鍼手捫其穴更刺心俞

○心俞二穴在背第五椎下兩傍各一寸半用毫鍼刺入七分得氣則補留一呼次進一分留一呼退至二分留三呼徐徐出鍼以手捫其穴即甦

○脾虛見青屍鬼而後黑厥不知人四肢冷而身溫唇溫不出一時可治

衝陽二穴在足昧上骨間動脈去陷谷三寸足陽明之原以毫鍼刺入三分得氣則補留三呼次進二分留一呼徐徐退鍼以手捫之復刺脾俞

脾俞二穴在背第十椎下兩傍各一寸半以毫鍼針刺入三分得氣則補留二呼進二分動氣至徐徐出鍼即甦

○肺虛見赤死鬼而後暴厥不知人雖無氣手足冷心腹溫鼻
微溫目中神彩不变口中無涎舌不卷鼻不縮者未出一
時可治

合谷二穴在手大指次指兩歧骨間手陽明之原也用毫
針刺入三分得氣則補留三呼復退一分留一呼徐徐出
鍼以手捫其穴復刺肺腧

肺腧二穴在背第三椎下各一寸半用毫鍼刺入一寸半
氣得其則補留三呼次進二分留一呼徐徐出鍼以手捫穴
即甦

○腎虛見黃屍鬼而後暴厥不知人氣絕四肢厥冷心腹微溫
目中精采不变唇舌不黑口中無涎可救

京骨二穴在足外側大骨下赤白肉際陷中足太陽之原

氣

用毫鍼刺入一分半得氣則補留三呼進至三分留一呼

徐徐出鍼以手捫宛復刺足少陽之輸

足少陽之輸在背第十四椎下兩傍各一寸半用毫針刺入三分得氣則補留三呼次又進五分留三呼徐徐出針以手捫其宛即甦凡以上刺法必先以口含鍼緩而刺之則經脉之氣無拒逆也

○丹溪治一婦人如癇或作或輒恍惚不省人事一日畧蘇醒診視間忽聞床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂以秦承祖灸鬼法灸治病者哀告曰我自去我自去即愈

○秦承祖灸鬼法治一切驚狂譖妄踰垣上屋罵詈不避親疎等証

以病者兩手大拇指用細麻繩扎縛定以大艾炷置於其中兩介甲及兩指角肉四處着火一處不着即無効灸七壯神驗

○還窺丹治中惡已死

麻黃 三兩

桂枝 二錢

杏仁 十二粒

右作一服水煎灌下即醒

○桃奴丸治心氣虛怯有熱屍注驚夢驚癇等証

桃奴即桃木上不落乾花
十二月收七箇另研

辰砂 半兩另研

桃仁 十四箇另研

玳瑁鏹一兩另研

琥珀 另研三錢

烏犀角 五錢石水上磨

牛黃

一錢另研

龍腦 二錢另研

射香 一錢另研

雄黃

桃葉羹水三錢另研

安息香

一兩酒研飛無

右以安息香同桃仁琥珀共熬成膏和諸藥末爲丸如雞子

頭實大陰乾每服一丸人參湯化下

○蘇合香丸治諸般怪疾

方見氣門

○一方治斃死不還用半夏末不拘多少吹入鼻中即醒

○祖傳經驗辟邪丹治衝惡怪疾及山谷間九尾狐精爲患

人參

茯神

遠志

鬼箭羽

九節菖蒲

白术

蒼术

當歸各一兩

桃奴

焙乾五錢

雄黃

另研

辰砂

各三錢另研

牛黃

一錢另研

金箔

藥二十

或如射香

錢一

右件以桃仁奴已上諸藥爲細末入雄黃辰砂牛黃三味
末子和勻以酒調米粉打糊爲丸如龍眼大金箔爲衣臨
卧以木香湯化下一丸諸邪不敢近體更以絳紗囊盛五

七丸懸床帳中尤妙

○一婦人年二十七美貌得一証如醉如癡頰赤面青畧有潮
熱飲食不美其脉乍躁乍數而虛每夜見白衣少年與睡
一驛與八物湯服數十貼不効召予治之見其家有白犬
卧枕戶闕予曰必此犬作怪命殺犬取其心血及膽汁丸
安神定志之藥以八物湯吞下服藥十數貼丸藥一料以
安其丸藥用遠志石菖蒲川歸黃連茯神硃砂側柏葉草
龍胆等藥也

論

內經曰心者君主之官神明出焉夫怔忡驚悸之候或因怒氣傷肝或因驚氣入膽母能令子匿因而心血爲之不足又或遇事繁冗思想無窮則心君亦爲之不寧故神明不安而怔忡驚悸之証作矣夫所謂怔忡者心中惕惕然動搖而不得安靜無時而作者是也驚悸者驚然而跳躍驚動而有欲厭之狀有時而作者是也若夫二証之因亦有清痰積飲留結於心胞胃口而爲之者又不可固執以爲心虛而治醫者自宜以脉証參究其的而藥之毋認非以爲是也慎之慎之

脉法

寸口脉動而弱動爲驚弱爲悸

跌陽脉微而浮

浮爲胃氣虛微則不能食此恐懼之狀憂迫所致也

寸口脉緊跌陽脉浮胃氣則虛是以悸

肝脉動暴有所驚核

方法

升溪方九四條法

有痰

丹溪曰驚血虛有虛便動驚虛時作時止者痰因火動瘦人多是血少肥人只是痰多時覺心跳者亦是血虛怔忡無時驚悸有時而作

○大法四物湯安神丸之類有痰者用痰藥

○驚悸者屬血虛用硃砂安神丸最好或用痰迷心竅者宜用

治痰藥

○一方治勞役大虛心跳

硃砂

白芍藥

當歸身

側柏葉

各三錢

川芎

甘草

陳皮

錢各一

炒黃連

錢半

右爲細末猪心血爲丸如黍米大每服五六十九津嚥
下或少用白湯一口送下食後臨卧服

○驚悸養心湯治肥人因痰火而心惕然跳動驚起

黃芪

茯神

半夏麴

川芎

各半錢

遠志

桂心

柏子仁

酸棗仁

炒

五味子

人參

各二分半

甘草

四分

右細切作一服生姜三片大棗一枚水一盞煎至七分服
如停水加枳殼換柳各三味同煎

○安神丸

黃連

酒洗一錢半

硃砂

水飛一錢

生地黃

酒洗

當歸身

酒洗

甘草

炙各半錢

陳皮

桂心

右爲細末湯浸燕餅爲丸如黍米大每服十五丸食後津
唾嚥下 珠砂安神丸無地黃當歸用生甘草

○溫膽湯治心膽怯怔忡易驚

半夏

竹茹

枳壳實各二錢

生姜四錢

陳皮三錢

甘草一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食後溫服

○定志丸治心氣不足恍惚多忘及怔忡驚悸等証

人參

白茯苓各三兩

遠志去心

石菖蒲各二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大珠砂爲衣每服五十九
食後白湯下

○朱雀丸治怔忡驚悸等証

茯神

二兩

沉香半兩

硃砂

半兩另研爲衣

右爲細末燕餅丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下

○入物定志丸平補心氣安神鎮驚除肺間痰熱等証

遠志

去皮心兩

石菖蒲

麥門冬

姜神

白茯苓

各一兩

白木

半兩

人參

一兩半

牛黃

二錢另研

煉蜜丸

如梧桐子大硃砂爲衣每服二十九白湯送下

○歸脾湯治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

白木

茯神

黃芪

龍眼肉

酸棗仁

以各一錢人參

木香

各半錢

甘草

炙二分半

右細作一服水二盞加生姜三片大棗一枚煎至一盞去
粗溫服

○祖傳經驗秘方治憂愁思慮傷心令人惕然心跳動驚悸不
安之証

川歸

酒洗
用身

生地黃

酒洗

遠志

去心

茯神

各五錢

石菖蒲

九節

黃連

各二錢

牛黃

一錢另研

辰砂

二錢另研

金箔

十五片

右以前六味研細入牛黃辰砂二味末子猪心血丸如黍米大金箔爲衣每服五十丸煎湯心湯送下

三消

五十五

論

內經曰二陽結謂之消又曰脾成爲消中東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液若消則自黃口乾乃津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤者燥熱爲病也此因數食甘美而多肥故其氣上溢轉爲消渴治當以前薦除陳氣也不可服膏梁

芳草石藥其氣慄悍能助燥熱也岐伯曰脉實病久可治脉
弦小病久不可治當分三消而治之高消者舌上赤裂大渴
引飲經云心移熱於肺傳爲胸消者是也以白虎加人參湯
治之中消者養食而瘦自汗大便硬小便數叔和云口乾飲
水多飢墜薄成爲消中者是也以調胃承氣湯三黃丸治之
下消者煩渴引飲耳輪焦乾小便如膏叔和云焦煩水易虧
此腎消也以六味地黃丸治之總錄所謂未傳能食者必緩
腦疽皆癰不能食者必傳中滿鼓脹皆爲不治之証也張瀉
古分而治之能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢
氏白木散倍加葛根治之上中既平不復傳下消矣先哲用
藥厥有旨哉然臟腑有遠近亦宜斟酌如心肺位近宜制小
其服腎肝位遠宜制大其服者適其志所爲故如過與不及

皆誅罰無過之地也治斯疾者宜審焉

脉法

脉經曰厥陰之爲病消渴氣上衝心心中疼熱肌而不欲食食則吐下之不肯止寸口脉浮而遲浮則爲虛遲則爲虛勞則衛氣不足遲則榮氣竭

趺陽脉浮而數浮則爲氣數則消穀而槩

要畧作消吳矢垂

氣盛則溲數溲數則槩

莫界則堅

槩數相搏則爲消渴男子消

渴小便反多以致一斗小便一斗腎氣丸主之

心脉滑爲渴滑者陽氣勝心脉微小爲消婢消婢脉實大病

久可治懸小堅急病久不可治

脉數大者生沉小者生實而堅大者死絀而浮短者死結硬

方法

冊溪方法

丹溪曰養肺降火生血爲主分上中下治

上焦者肺也多飲水而少食小便如常

中中消者謂也多飲食而小便赤黃

下消者腎也小便濁淋如膏之狀

○大法黃連天花粉二味爲末藕汁人乳汁生地黃汁佐以蜜
姜汁爲膏和二末留舌上徐徐以白湯少許送下能食者
加石膏

○猪肚丸

黃連五兩

麥門冬

知母

桔梗根

各四兩

之藥右爲細末入雄猪肚內縫熟粟熱於石臼中搗爛如乾加
煉蜜丸如梧桐子大每服一丸食後米飲下可以清心

止渴

○天花粉治消渴之聖藥也 凡消渴藥中大禁半夏及不可

發汗

○三消者瓊玉膏最妙

方見燮齋門

○和血益氣湯治口乾舌乾小便數舌上赤脉此藥生津液除
乾燥生肌肉

柴胡

炙甘草

生甘草

麻黃根

各三分

當歸梢

酒洗四分

知母

酒洗四分

漢防已

酒洗四分

羌活

各半錢

石膏

六分

生地黃

酒洗六分

黃連

酒洗八分

黃柏

酒洗八分

升麻

六分

杏仁

去皮另研六分

紅花

少許

桃仁

去皮另研六分

○當歸潤燥湯治小便多大便秘滯乾燥枯梗燥渴喜好溫飲
陰頭退縮舌燥口乾眼澀難開及於黑處見浮雲

細辛 分

生甘草

炙甘草

熟地黃 各三分

柴胡 去芦 六分

黃柏

酒光

知母

酒洗

石膏

桃仁泥

當歸身

麻仁

防風

荆芥穗

升麻 一錢半

紅花 少許

杏仁 研爲泥 七箇另

小椒

三粒

右細切作一服水二盞煎至一盞熱服食處忌辛熱物
○生津甘露湯一名清涼子飲 治消中能食而瘦口舌乾自汗
大便結燥小便頻數

升麻 四分

防風 去芦

生甘草

漢防已

生地黃

各三分

當歸身

六分

柴胡

羌活

炙甘草

黃芪

酒知母

酒黃芩

各一錢

酒草龍胆

石膏

黃柏

錢半

紅花

少許

桃仁

五箇另研

杏仁

十箇研

右細作

一服水二盞煎至一盞加酒一起稍熱服

○辛潤緩脈湯

各清神氣湯補

前消渴証總愈止有口乾腹不能努

此藥主之

生地黃

細辛

各一分

熟地黃

白膏

四分

黃柏

百克去皮洗

黃連

生甘草

知母

各半錢

柴胡

去芦

當歸身

荆芥穗

各一升錢

升麻

一錢半

桃仁泥

防風

各二錢

紅花

少許

杏仁

六箇另研

小椒

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熱服食遠

○生津甘露飲子治消渴上下齒齶疎舌根強硬腫痛食不能
下時有腹脹或泄黃如糜名曰飧泄渾身色黃目睛黃甚

四肢痿弱前陰如水尻臀腰背寒面生黧色協下急痛甚
噫喜怒不常健忘

霍香

二分

柴胡

黃連

木香各三分

白葵花

麥門冬

當歸身

蘭香各五分

澤澄茄

生甘草

山梔子

白豆仁

白芷

連翹

姜黃各一錢

石膏一錢

杏仁去皮

酒黃柏

錢半

炙甘草

酒知母

升麻

人參各二錢

桔梗三錢

全蝎五箇

右爲細末湯浸蒸餅和勻成劑捏作片子日中晒半乾擦
碎如米多大每服一錢津嚥下或白湯送下遠服

○黃芪飲治三消

黃芪蜜煎

炙甘草

兩

每服二錢水煎服

六味地黃丸

方見虛損門

人參白朮湯治胃膈壅熱煩渴漏飢不欲食痺成爲消中善食
而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲水而小便數無療一切陰
虛陽實風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒渴積毒腸胃燥
澁併傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參

白朮

當歸

芍藥

大黃

梔子

荆芥穗

薄荷

桔梗

知母

澤瀉錢各五

茯苓

連翹

桔萎根

乾葛錢各一

甘草

蘆香葉

青木香

官桂錢各二

石膏四兩

寒水石兩

白滑半斤

右爲細末每服抄五錢水一盞入盆砂半两生姜三片煎

至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘盞得臟府流利
取効如常服以意加減如腸胃鬱結溫熱內甚自利者去

大黃芒硝服

○絳雪散治消渴飲水無度小便數者大有_之効

黃芩

黃丹

漢防已

括萎

實_各
_{分等}

右爲細末每服二錢溫漿水調下臨卧時併進三服即止

○人參散治腎消善飲而食小便頻數白濁如膏

人參_{一分}

白朮

澤瀉

括萎

根

桔梗

梔子

連翹_{各二}

葛根

黃芩

大黃

波竒

白朮

苓_{各五}
_分

甘草_{七分}

石膏_{一錢}

滑石

寒水石

_{各一}
_{錢半}

縮砂

右細切作一服爲末水一盞半煎至一盞入蜜少許再煎
三兩沸腎消食前上消食後服

○大黃甘草飲子治男子婦人一切消渴不能止者

大豆

五升先煮二三沸出淘去苦水再煮

大黃

半

甘草

四兩長四指厚切碎

右用井水一桶將前藥同煮三五時如稠強更添水煮豆
軟羹爲度盛於盆中放冷令病人食竟渴飲湯汁無時候
食盡如燥渴止罷藥未止依前再煮食之不過三劑其病
悉愈

○麥門冬飲子治心移熱於肺名曰脯消心脯有熱久則引飲
爲消渴

麥門冬

去心一錢括萎根

知母

甘草

五味子

生地黃一錢

人參

葛根

茯神各半錢

右細切作一服加竹葉七片用水一盞煎至七分溫服

○丹溪活套云三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯爲主治上消者本方加入參五味子麥門冬天花粉煎入生薑汁生地黃汁人乳飲酒人加生葛汁○中消者本方加知母石膏滑石寒水石以降胃火○下消者本方加黃柏知母熟地黃五味子之類以滋腎水又間當飲繅綠湯爲上策

○經驗原委蟹湯治腎消白濁及上中二消飢渴不生肌肉其効如神蓋此物寓火有陰之用大能鴻膀胱中祖火引陰水上潮于口而不渴也

利尿
原委
却再養陰委也其繆綠湯極効如無繆
銀湯火藥散銀錠火藥湯皆可代之

國學正傳卷之伍

終