新編醫學正傳

醫學正傳卷之六目錄

便濁門 五十六　論　脉法　丹溪方法凡十九條

治便濁丸藥方　二陳加升提藥方　珍珠粉丸

半夸丸　虛癆便濁方　張子元氣血兩虛

燥濕痰白濁方　妙香散　秘真丸

華蓋分清散　治濁固本丸　九龍丹

水陸二仙丹　定志珍珠粉丸　丹溪活套

祖傳經驗秘真丹　已試醫驗一條

○淋閉門 五十七附關格　論　脉法　丹溪方法凡九條

參苓琥珀湯　琥珀散　傷寒後脫陽方

老人氣虛淋閉方　小便黃澁方　下焦無血小便澁方

通關丸 即滋腎丸　清肺飲子　導氣除燥湯

腎疸湯　小蒯湯　八正散
牛膝膏　茯苓湯　倒換散
葵子散　濟生葵子湯　琥珀散
鐵鄰丸　廣濟雞蘇飲子　又方治小便不通
集驗治小便淋瀝方　石韋散　祖傳經驗方
治小便溺血方　又治溺血方　治沙淋塗痛方
孕婦轉胞方　又治血淋方
附丹溪關格方法 凡三條　祖傳經驗方　關格雜經法語
已試醫驗一條
○秘結門 五十八　論　脉法　丹溪方法 凡二條
脾約丸　通幽湯　潤燥湯
潤腸丸　麻黄白术湯　升陽瀉熱湯

活血潤燥丸　潤腸湯　潤體丸
備急大黃丸　枳殼丸　枳實導滯丸　已試驗二條

○黃疸門 五十九

論　脉法　丹溪方法五條

治黃疸方　又治氣實黃疸方　小溫中丸
大溫中丸　調胃承氣湯　治黃疸法語 凡四條
大黃栢梔芒硝湯　又治疸法語 凡四條　硝石礬石散
治酒疸方　茯苓湯　治穀疸方
胃苓湯　腎疸湯　茵陳五苓散
茵陳茯苓湯　梔子大黃湯　半溫半熱湯
茵陳蒿湯　茵陳大黃湯　梔子栢皮湯
茯苓滲濕湯　小茵陳湯　茵陳四逆湯
導滯苦參散　當歸白术湯　抵當湯 見傷寒門

針砂丸　綠礬丸　棗礬丸
祖傳經驗褪金丸　已試醫驗一條
○瘡瘍門六十論　脉法　丹溪方法凡二十二條
取剩膏方　升陽益胃散治背疽　當歸羌活湯治腦疽
槟榔散飲瘡口　千金托裏散治背疽　丹溪治背疽方
丹溪治附骨疽法　羌活防已湯治附骨疽　托裏黄芪酒煎湯
黄芪連消毒飲治附骨疽　黄芪柴胡湯治附骨疽　丹溪治腎癰方法
内托羌活湯治腎癰　丹溪治内疽方法　丹溪治肺癰方法
又治肺癰方法　黄昏湯治肺癰　葶藶大棗瀉肺湯
薔薇湯治肺癰　桔梗湯治肺癰　又治肺癰方
又治肺癰方法一條　吐膿血如肺癰方　丹溪治腸癰方法
千金論腸癰法語　要畧治腸癰方　腸癰灸法

薏苡附子敗醬散　大黃牡丹湯　已試驗一條

丹溪治乳梗方法　治乳癰方　又治乳癰方法

升麻托裏湯　程石香治妳岩法　十六味流氣飲

單煮青皮湯　橘葉散　丁香散治妳頭鞕裂

丹溪治囊癰方法　野紫蘇治囊癰方　丹溪治便毒方法

又治便毒方　又便毒成膿方　石香程氏便毒方法

蘇方木散治便毒　玉燭散治便毒　牡蛎大黃湯治便毒

丹溪治瘰癧方法　又治瘰癧方法　又丹溪治瘰癧法

治血少馬刀瘡方　程石香論治癧方法　蟾酥膏治瘰

綠雲膏治癧　金寶膏治癧　龍珠膏治瘰

救苦化堅湯　柴胡連翹湯　消腫湯

柴胡通經湯　散腫潰堅湯　升陽調經湯

連翹散堅湯　龍泉散　三聖丸
立驗大聖散　玉屑妙靈散　六丁神散呈二十一方俱治癰
濟生破結散治瘦瘤癰　南星散治瘤　又治瘤方法
龍珠膏見前條　流氣飲見前條　丹溪治瘦氣方法
丹溪治結核方法　又治臂核方　耳後頂門有核方法
程石香論疔腫方法　返魂丹　拔疔法
奪命丹　雄黃丸　化毒丸　獨蟾丸　雄射湯　二活散
取疔散　解毒丸　賀藍先生解毒丸
萬病解毒丸　千金漏蘆湯　取疔腫方
破毒散　灸疔腫法　祖傳經驗秘方
活魂丹治惡瘡　治諸惡瘡方　又治諸惡瘡方
又治惡瘡方　天泡瘡方凡二條　脚上沙瘡方

裏外臁瘡方九四條　桃花散生肌長肉　火燒湯泡瘡方
又治火燒湯泡瘡方　下疳瘡方二條　頭瘡方
金絲瘡方　手痴瘡方　沙瘡方
瘡痛不可忍方　疥瘡方　白癜風癬方
風瘡疙瘩方　癬瘡方　身虛痒方
又通身虛痒方　秘傳一擦光方　又治疥瘡及癩頭方
五香連翹湯　內托復煎散　白芷升麻湯
托裏散　又托裏散　烏金散
黃芪六一湯　治一切瘡癤方　內托護心散
小五香湯　復元通氣散　金銀白芷散
正鐵箍散　大鉄箍散　三消散
雲母膏　太乙膏　神異膏

祖傳萬槌青雲膏、又經驗治癰腫方　豨薟散
又治諸般癰腫神効方
○癩風門六十二　論　脉法　丹溪方法凡五條
換肌散　醉仙散　通天再造散
愈風丹　一家治癩疾法　又一家治癩疾法
又治手指挛曲法　加減通聖散　神仙紫花丸
治跌撲傷損方　治骨損方　元戎接骨丹
論損傷宜補氣血　治金瘡方　又治金瘡方
治損傷腹痛方　當歸導滯湯　雞鳴散
沒藥乳香散　杖丹膏藥方　河間沒藥散
○破傷風門六十二　論　脉法　丹溪方法一條
羌活防風湯　白朮防風湯　小芎黃湯

大芎黃湯　發表雄黃散　大蜈蚣散
大羌活湯　防風湯治破傷風　小蜈蚣散
左龍丸　小羌活湯　養血當歸地黃湯
雄黃散治表藥　地榆防風散　白朮湯
江鰾丸　祖傳經驗秘方　附翻花瘡

醫學正傳卷之六目錄終

新編醫學正傳卷之六

花溪恒德老人虞摶天民編集
姪孫虞守愚惟明校正

便濁遺精五十八

論

內經曰諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱夫便濁之証因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便溲或白或赤而渾濁不清也原病式曰如夏月天氣熱甚則水液渾濁林木流津是也血虛而熱甚者則為赤濁此心與小腸主病屬火故也氣虛而熱微者則為白濁肺與大腸主病屬金故也丹溪曰大率妄是濕痰流注宜燥中宮之濕又曰治宜燥濕降火兼升舉之法此皆至要之語也外有遺精滑泄之候與濁相類不可一

例而推夫遺精者多夢與鬼交而泄名曰夢遺或隨溲溺而出謂之精滑亦有思想無窮所願不遂而得之者治宜安心神以降火又有因好色太過房勞致虛而得之者治法宜滋水藏以復真陰是皆千古不易之定論也學者詳之

脉法

兩尺脉洪數必便濁失精

女人尺脉濇而弱者或洪數而促者皆爲便濁白帶

心脉短小因心虛所致必遺精便濁

方法 丹溪方法凡十九條

丹溪曰便濁屬濕熱有痰有虛赤屬血由小腸屬火故也

白屬氣由大腸屬金故也

○大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕赤者乃是濕傷血

○胃中濁氣下流滲入膀胱

○肥白人多痰

○治宜燥濕降火兼升提之大法二陳湯加二木升柴赤者加

勻芍藥煎服

○一小便濁嘗有半年或時夢遺形瘦作心虛主治以琢珠粉

丸和定志丸服效見怔忡門

○夢遺主熱精滑主濕熱熱則流通故也

○內傷氣血虛不能固守當補以八物湯加減吞樗木根丸

○大法用青代海石黃柏

○精滑用知母黃柏降火牡砺蛤粉燥濕白濁固法治

○一方用良姜三錢芍藥黃柏炒焦各二錢樗根白皮一兩伍錢

爲末糊丸每服三十丸

○思想而得病在心治當安心神以帶補一法用溫膽湯去竹茹加人參遠志蓮肉酸棗仁茯神煎服

○一方治便毒丸藥　濁

樗白皮　黃栢炒　青代　乾姜炒　滑石

蛤粉炒　神麯糊爲丸服之

戴氏曰黃栢治濕熱青代解熱蛤粉鹹寒入腎滑石利竅炒干姜味苦歛肺氣下降使陰血生且能監制

○二陳湯治濁加升提之藥使大便潤而小便長

○珎珠粉丸治精滑白濁等証

黃栢　真蛤粉各一斤　珎珠三兩一方無此味而有青代

右爲末水和丸如梧桐子大每服一百丸空心溫酒下或加樗根白皮滑石青代等藥

○半苓丸治白濁

神麯　半夏燥濕　猪苓分水　麯糊丸服

○虛勞者用補陰藥胃弱者兼用人參及升麻柴胡升胃中之清氣

○張子元氣血兩虛有痰濁陰火痛風秘傳曰氣血兩虛便濁有痰痛風時作陰火間起小分便白濁或帶下

人參一兩　白朮半兩　熟地黃　黃栢炒黑色二兩

山藥　海石　瑣陽各半兩　乾姜半兩燒存性

南星一兩煨裂　龜板酥炙二兩

右為細末酒麪糊為丸如梧桐子大每服一百丸姜鹽湯下

上巳

○燥濕痰治白濁方如肝脉弦者須以青代瀉肝大槩不可純涼藥盧氏曰病因濕熱藥誤矣然亦不可純用寒涼藥故用炒栢之類又以干姜之溫而佐之也輕

局方

○妙香散治心虛遺精白濁

麝香一錢另研　人參半錢　木香二錢半煨　茯苓

茯神　黃芪　遠志去心炒各一兩　桔梗

甘草各五錢　辰砂二錢另研　山藥二兩姜汁炙

右為細末每服二錢溫酒調服不拘時

○秘真丸治思想無窮所願不遂意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫及白物隨溲而下或憂與陰人通河間泄耳

白龍骨一兩另研　訶子皮大者五枚　縮砂仁半兩去殼　硃砂一兩另研次壹分為衣

右為細末麪糊為丸如菉豆大每服一丸空心溫酒下一本可字冷水亦不可多服大秘或用葱白茶湯下

○萆薢分清飲治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度漩面如油光彩不定漩脚澄下凝結如膏糊之狀

石菖蒲　烏藥　益智仁　川萆薢

白茯苓各一錢　甘草稍半錢

右細切作一服水一盞半入鹽一錢煎至一盞空心服

東垣

○治濁固本丸

蓮花鬚　黄連炒各二兩　白茯苓　砂仁

益智　半夏　黄柏炒各一兩　甘草炙三兩

猪苓二兩五錢　為末煮餅為丸空心湯酒下五十丸

冊溪

○九龍丹治精滑

拘杞子　金櫻子　山果子又名山查　蓮肉

佛座鬚蓮花心也熟地黄　芡實　白茯苓

川歸各等分

右為末酒麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸或酒或

鹽湯送下如精滑便濁者服二三日溺清如水飲食倍常行步輕健婦人厭產者二三服便往孕如仍欲產以

○水陸二仙丹治遺精白濁夢泄脫精等証

金櫻子一斗　芡實二斤

右以芡實去殼杵為細末取金櫻子黃熟者用盤盛於水中杵去刺又於石臼中杵碎去核淨再杵細絞取自然汁煎熬成飴糖和芡實末為丸如梧桐子大每服五一七十丸空心姜鹽湯送下

○定志珎珠粉丸治心虛夢泄

人參　白茯苓各三兩　遠志去心　石菖蒲各二兩

海蛤粉　黃栢炒焦色各三兩　檉根皮二兩　青代二兩

右為細末麪糊為丸青代為衣如梧桐子大每服五十

丸空心姜鹽湯下

○丹溪活套云赤白濁乃胃中痰積下流滲入膀胱宜用二陳湯加升麻柴胡防風之類以提之肥白人屬濕熱加蒼朮白朮炒黃栢黃荊子之類或有挾寒者本方加炒乾姜肉桂甚者加附子○有心虛不能固守及平素虛寒之人本方加萆薢石菖蒲益智炒乾姜牡蛎龍骨之類○氣虛者本方加黃芪白朮人參或加附子之類○赤者多者血虛瘦弱之人得之宜四物湯加酒知母酒炒黃栢煎湯送下珎珠粉丸○赤白濁小腹疼痛不可忍者宜作寒治東垣酒煮當歸丸最妙方見婦人門

○祖傳經驗秘真丹治好色腎虛遺精夢泄白淫白濁等証

兎絲子　韭子　栢子仁各一兩　龍骨

牡蠣　山茱萸去核取肉　赤石脂各半兩　補骨脂一兩

遠志　巴戟　覆盆子　抱杞子

黃柏鹽酒炒黑色　山藥各七錢半　芡實　杜仲姜汁炒絲各壹兩

金櫻子半青黃者去刺核取肉焙乾貳兩　乾姜炒黑色一兩　鹿角膠一兩半炒成珠

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一百丸空心姜鹽湯下

○蓮塘朱顯二里病遺精潮熱不起床三月矣召予治脉之左右寸關皆浮虛無力兩尺洪大而軟與補中益氣湯加熟地黃知母黃柏地骨皮煎吞下珠粉丸外做小篾籠一箇以籠陰莖勿使搭肉服藥三十餘貼一月平安

淋閉門附閉格五十七

內經曰飲食入胃游溢精氣上輸於脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱夫膀胱者主足太陽寒水之化其体有下口而無上口者也長生在申是故西方肺金以為之母而資其化也肺金清肅則水道通調而滲營於下耳然肺金又藉脾土健旺以資化源而清氣得以上升而歸於肺以運行也故經又曰清陽出上竅濁陰出下竅故清陽不升則濁陰不降而成淋閉之患矣先哲以滴水之器譬之上竅閉則下竅不出此理甚明故東垣使灸百會穴丹溪使吐以提其氣之橫格是皆開上竅之法也原其為病之由皆膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類鬱遏成痰以致脾土受害乏力不能運化精微清濁相混故使肺金無助而水道不清漸成淋閉之候或謂用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制清

陽不升濁陰不降而成天地不交之否皆先哲之法言也古方有五淋之別氣砂血膏勞是也若夫氣淋為病小便澁滯常有餘瀝不尽砂淋為病陰莖中有砂石而痛溺不得卒出砂出痛止膏淋為病溺濁如膏勞淋為病遇房勞即發痛引氣衝血淋為病遇熱則發甚則溺血候其鼻準色黄者知其為小便難也東垣分在氣在血而治之以渴與不渴而辨之耳如渴而小便不利者熱在上焦氣分肺金主之宜用淡滲之藥茯苓澤瀉琥珀燈心通草車前子葵子篇蓄之類以清肺金之氣瀉其火以滋水之上源也不渴而小便不利者熱在下焦血分腎與膀胱主之宜用氣味俱陰之藥知母黄柏之類滋腎丸是也除其熱泄其閉塞以滋膀胱腎水之下元也治淋之法無越於此學者不可不知

脉法

脉經曰少陰脉数婦人則陰中生瘡男子則為氣淋脉細而数○脉盛大而實者生虚細而澁者死

方法 丹溪方法凡九條

丹溪曰淋雖有五皆属於热宜解熱利小水山梔子之類不可發汗汗之必便血

○老人氣虚淋閉參朮中帶木通梔子之属

○有腎虚極而淋者當補腎精而利小便不可獨用利水藥

○有死血作淋者用牛膝膏一云牛膝膏能損胃不食宜斟酌用之

○一方治淋用益元散加梔子仁木通或用梔子一合炒為末白湯調下夏月以茴香煎湯調益元散服效

○痰熱隔滯中焦淋澁不通二陳湯煎大碗頓服探吐之以提

其氣

○淋澁有血因火燥下焦無血氣不得降而滲泄之令不行也宜補陰降火以四物湯加知母黄柏或用四物湯煎下滋腎丸

○陰莖痛乃厥陰氣滯兼熱用甘草稍蓋欲緩其氣耳

○小便因熱鬱成淋不通用赤茯苓黄芩澤瀉車前子麥門冬肉桂滑石木通甘草稍氣虛者加黄芪木香淋痛加黄柏生地黄夏月煎調益元散

○參苓琥珀湯治小便淋澁莖中痛相引脇下痛不可忍者

人參　茯苓各半錢　川練子去核　生甘草稍

玄胡索各七分　琥珀　柴胡　川歸尾

澤瀉各三分

右細切作一服水一盞半加燈心十数並煎至一盞服

齊生

○琥珀散治五種淋澁疼痛小便有膿血出証

琥珀　沒藥　海金砂　蒲黃各一兩

右為細末每服三錢空心煎萱草湯調下

丹谿

○傷寒後脫陽小便不通用生姜自然汁調茴香末敷貼小腹服上又復益志茴香丸調益元散送下　智

丹溪

○老人氣虛而小便不通四物湯加黃芪人參吞滋腎丸下焦血氣乾者死

○小便黃用黃栢如澁数加澤瀉若濕熱流注下焦而小便黃赤澁数用梔子澤瀉切當濕多者宜用滑石利之

○下焦無血小便澁数而黃者用四物湯加黃栢知母牛膝甘草稍

○通關丸 即滋腎丸 治不渴而小便閉熱在下焦血分

黃栢酒洗焙乾 知母酒洗焙乾各一兩 肉桂半錢

右為細末熟水如梧桐子大每服一百丸空心白湯下服後須頓兩足令藥易下行也如小便已利莖中如刀刺痛當有惡物下為驗

○清肺飲子治渴而小便閉澁不利邪熱在上焦氣分

燈心一分 通草二分 澤瀉 瞿麥

琥珀各半錢 萹蓄 木通各七錢 車前子炒另研

茯苓去皮 猪苓去皮各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞空心稍熱服

○導氣除燥湯治小便閉塞不通乃血澁致氣不運而竅澁也

茯苓去皮 滑石各一錢 知母去毛酒浸炒 澤瀉各一錢半

黃栢二錢酒炒

右細切作一服水二盞煎至一盞空心稍熱服

東垣

○腎疸湯治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤

羌活　防風　藁本　獨活

柴胡各半錢　升麻一錢已上治目黃渾身黃　白茯苓二分

澤瀉三分　猪苓四分　白朮五分　蒼朮一錢已上治小便赤澁

黃栢二分　人參三分　葛根五分　神麯六分

甘草半錢

右細切作一服水二盞煎至一盞食前稍熱服

東垣

○小薊湯治下焦熱結血淋

生地黃　小薊根　通草　滑石

梔子仁　蒲黃炒　炙竹葉　當歸梢

生藕節　甘草稍各五分

右細切作一服水煎空心服

○八正散治大小便俱閉

大黃　瞿麥　木通　滑石

萹蓄　車前子　梔子仁　甘草各等分

右細切每服五錢重入燈心七莖水煎服

○牛膝膏用川牛膝一合細切以新汲水五大盞煎耗其四入

麝香少許空心服或单以酒煮亦可

○茯苓湯治胃疸陽明積熱食已輒飢面色黃瘦胃滿脇脹小

便閉澁

赤茯苓　陳皮去白　澤瀉　桑白皮各三分

赤芍藥　白朮　人參　官桂各二分

石膏八分　病甚者加大黃朴硝各一錢

右細切作一服加生姜五片水一盞半煎至一盞溫服

○倒換散治無問久新癃閉大小便不通小腹急痛肛門腫痛

大黃小便不通減半　荊芥穗大便不通減半各等分

右各別研為細末每服二錢溫水調下臨時加減服

○葵子散治小便不通

黃蜀葵子研細　赤茯苓各二錢

右作一服水一盞煎二三沸食前服

○濟生葵子散治膀胱實熱小便不通方見疝氣門

○琥珀散治五淋

滑石二錢　木通　當歸　木香

蔚金　萹蓄各一錢　琥珀

右作一服為末用芦葦葉同煎水一盞半煎数沸食前

濾服

河間

○鐵服丸治大小便不通神效

大皂角燒存性

右一味不拘多少煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸

白湯下

外臺

○廣濟雞蘇飲子治小便不通

雞蘇一別本握二兩　生地黃　通草各四兩　滑石

杏仁去皮尖各二兩　冬葵子一兩半　石葦炙去毛壹兩

右七味細切以水六升煎至二升半去粗分三服空心

進一服如人行四五里又進一服必通

外臺

○又方治小便不通

冬葵子　滑石各三兩　通草　赤茯苓各一兩

茅根二兩半　芒硝一兩半

右細切以水六升煎取二升去柤納芒硝分作三服連

進即通

○集驗方治小便淋瀝不通

滑石半斤　石葦三兩　通草四兩　榆莢

冬葵子各一升　一方加黃芩三兩

右細切以水一斗煎取三升分作三服頓飲

○石葦散治小便不利莖中作痛

石葦去尾二兩　瞿麥一兩　滑石五兩　車前子三兩

冬葵子二兩

石爲細末每服方寸匕日三服

○祖傳經驗秘方治小便淋閉莖中作痛神效

石葦去毛　滑石　瞿麥　萹蓄

冬葵子　木通　王不留行　地膚草各等分

右爲細末每服三錢白湯調下

○又經驗治小便溺血立效

金陵草一名旱蓮草一名黑斗草　車前草倍名蝦蟇衣

右二物各等分杵自然汁每服半茶盞空腹服

○又方治前証用壯年無病人頭髮不拘多小燒灰存性以側栢葉搗汁入糯米糊爲丸如梧桐子大每服一百丸白湯下或四物湯下尤妙

○又方治沙淋乃莖中有砂作痛

石首魚腦骨五臂火煅出火毒即白鯗腦中骨也　滑石半

之勢故結散而疎通矣仍多服補血生津之劑助其真陰固其根本庶無再結之患切勿以巴豆牽牛等峻劑攻下雖暫得通快必致再結愈甚反釀成病根膠固卒難調治或有血虛脉大如葱薈發熱而大便結燥者慎不可發汗汗之則重亡津液閉結而死此醫殺之耳活人書有脾約証謂胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱故小便数而大便難制脾約丸以下脾之結燥使腸潤結化津流入胃而愈丹溪曰然既曰脾約必陰血枯槁內火燔灼熱傷元氣故肺受火邪而津竭必竊母氣以自救夫金耗則土受木傷脾失轉輸肺失傳化宜其大便閉而難小便数而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不熾金行清化脾土健旺津液入胃大小腸潤而通矣今以此丸用之於熱甚而氣實與西北人稟賦壯實者無

有不安者用之於東南方人與熱雖盛而氣血不實者雖得
暫通將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在西北以開結為主在
東南以潤燥為要學者其可不知此乎

脉法

脉多沉伏而結　陽結脉沉實而數　陰結脉伏而遲或結
老人虛人便結脉雀啄者不治

方法 丹溪方法九二條

丹溪曰有虛有風有濕有火有津液不足者有寒者有氣結
者切不可例用芒硝大黃及巴豆牽牛等利藥

○久病腹中有實熱大便不通宜用潤腸丸微利之不宜用峻
利之劑

○脾約丸

麻仁一兩半用生絹袋盛百沸湯連袋泡浸湯冷堂垂井中與水面差一指許次日濕乾藥之極粉皆完

枳實麩炒黃色　厚朴姜制炒　芍藥三錢　大黃四兩酒蒸

杏仁去皮尖炒另研一兩二錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸溫水下

東垣

○通幽湯治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草　紅花各一分　生地黃　熟地黃各半錢

升麻　桃仁泥　當歸身各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去柤調檳榔細末半錢食前稍熱服

東垣

○潤燥湯

升麻二分　生地黃二分　熟地黃　當歸稍

大黃酒溫煨　生甘草　桃仁泥　麻仁各一錢

紅花五分

右除桃仁麻仁另研細外餘細切作一服水一盞半入桃仁麻仁煎至一盞去柤空心稍熱服

○潤腸丸治脾胃中伏火大便閉澁或乾燥閉塞不通全不思食及風結血閉皆能治之

桃仁湯泡法皮畧炒　麻仁去殼各一兩　當歸稍　大黃酒溫煨

羌活各半兩

右除桃仁麻仁另研如泥外其餘杵為極細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下○如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之○如脉澁瘡身有氣澁而大便結者加郁李仁大黃以除氣澁燥

○麻黃白朮湯治大便不通五日一次小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促不安

青皮去穰　酒黃連各二分　黃芪　人參
桂枝　白朮　厚朴制　柴胡
蒼朮　猪苓各四分　酒黃柏　陳皮去白
甘草半炙半生　升麻各三分　吳茱萸　白茯苓
澤瀉各五分　白豆蔻　炒神曲各六分　麻黃一錢不去節
杏仁四箇

右細切分作二服每服水二盞先煎麻黃令沸掠去沫入諸藥同煎至一盞去柤稍熱服

○升陽瀉熱湯治鼻塞不通逆氣裏急大便不行

青皮　槐子各二分　生地黃　熟地黃

黃栢各三分　當歸身　甘草稍各四分　蒼朮五分

升麻七分　黃芪一錢　桃仁十箇去皮尖另研

右細切作一服入桃仁泥水二盞煎至一盞食前熱服

○活血潤燥丸治大便風秘血秘常〻燥結

當歸稍五錢　防風三錢　大黃酒煨　羌活各一兩

皂角仁燒存性一兩五錢　桃仁二兩去皮另研　麻仁二兩半去殼另研

右除桃仁麻仁另研外共爲細末煉蜜爲丸如桐桐子

大每服五十丸白湯下三兩服後須以麻子仁煮粥每

日早晚食之大便須日久再不結燥也此丸藥以磁罐

盛之紙包封毋令見風

○閏腸湯治大便結燥不通

東垣

生地黃　生甘草各三分　大黃煨　熟地黃

當歸稍各半錢　升麻　桃仁　麻子仁各一錢

紅花三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤空心服

○潤体丸能潤血燥治大便不通

麻仁　當歸稍　生地黃　桃仁

枳殼各等分

右爲細末煉蜜爲丸服

東垣

○備急大黃丸治胃中停滯寒涼之物大便不通腹痛方見內傷門

○河間枳殼丸治三焦約大小便不通穀氣不得下行

枳殼二兩　陳皮一兩　檳榔半兩　木香二錢半

黑丑四兩一半生用一半炒熟作頭末一兩半余不用

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸姜湯下

○枳實導滯丸治傷熱物大便不行氣滯胷腹作痛（方見內傷門）

○本邑趙德秀才之母年五十餘身材瘦小得大便燥結不通飲食少進小腹作痛召予診治六脉皆沉伏而結澁予作血虛治用四物湯加桃仁麻仁煨大黃等藥數服不通反加滿悶與東垣枳實導滯丸及備急大黃丸等藥下咽片時即吐出蓋胃氣虛而不能久留性速之藥耳遂以備急大黃丸外以黃蠟包之又以細針穿一竅令服三丸蓋以蠟匱者制其不犯胃氣故得出幽門達大小腸取效也明日下燥屎一升許繼以四物湯加減作湯使吞潤腸丸如此調理月余得大便如常飲食進而平安

○予族姪有二通判之子因出痘大便閉結不通兒醫云便實爲住兆自病至痘瘡愈後不如厠者凡二十五日肛門達大腸不勝其痛叫號声達四隣外醫及予二三人議藥調治用皂角末及蜜煎導法服以大小承氣湯及枳實導滯丸備急丸皆不效計無所出予曰此痘瘡餘毒鬱熱結滯於大小腸之間而然以香油一大盞令飲自朝至暮亦不效予畫一計令侍婢口含香油以小竹筒一箇套入肛門以油吹入肛内過半時許病者自云其油入腸内如蚯蚓漸上行再過片時許下黑糞一二升止困睡而安

黃疸 五十九

論

內經曰中央黃色入通於脾又曰諸濕腫滿皆屬脾土夫黃疸爲病肌肉必虛腫而色黃蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也蓋脾主肌肉肺主皮毛毋能令子虛母病子亦病矣是故有諸中者必形諸外耳其証有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞疸雖有五者之分終無寒熱之異丹溪曰不必分五同是濕熱如盒曲相似正經所謂知其要者一言而終是也外有傷寒熱病陽明內實當下而不得下當汗而不得汗當分利而不得分利故使濕熱鬱蒸內甚皆能令人發黃病也先哲制茵蔯五苓散茵蔯湯茯苓滲濕湯之類无不應手獲效故曰治濕不利小便

非其治也又曰濕在上宜發汗濕在下宜利小便或二法並用使上下分消其濕則病無有不安者也學者詳之

脉法

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治

脉沉渴欲飲水小便不利者必發黃也

酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之

酒疸下之久久為黑疸目青面黑心頭如噉蒜韲之狀大便正黑皮膚四肢不仁其脉浮弱顏黑微黃故知難治

穀疸寸口脉微而弱微則惡寒弱則發熱當發不發骨節疼煩痛當煩不煩而極汗出跌傷脉緩而遲胃氣反強飽則煩滿已則發熱咳熱消穀食已則飢穀強肌瘦名曰穀疸

陽明病脉遲者食難用飽〻則發寒熱頭眩者必小便難此故作穀疸雖下之腹滿如故

趺陽脉緊而数〻則爲熱〻則消穀緊則爲寒食則滿也

尺脉浮爲傷腎趺陽脉緊爲傷脾風寒相搏食已則眩穀氣不消胃中若濁〻氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身体尽黄名曰穀疸

方法 丹溪方法凡五條

丹溪曰不必分五同是湿熱如盦麯相似輕者小温中丸重者大温中丸熱多加黄連濕多者茵陳五苓散加食積藥

戴氏曰食積者量其虚實下之其餘但利小便小便清利則黄自退或曰黄疸宜用剉倉法又曰黄疸捲怠脾胃不和食小胃苓湯小便赤加滑石

○一方治黄疸

黄芩　黄連　梔子　茵陳

猪苓　澤瀉　蒼朮　青皮

草龍胆各五分　穀疸加三稜莪朮縮砂陳皮神麯

右細切作一服水煎服之

○又方治氣實傷濕渾身發黄宜吐法

撫芎　梔子　桔梗各二錢

右細切作一服加姜煎入薤汁服探吐之

○小湿中丸治黄疸與食積又可制肝燥脾脾虛者須以白朮

作湯使

針砂十兩醋炒七次令通紅另研　若參夏加冬減

山查各二兩　朱萸一兩夏減　蒼朮半斤　白朮五兩

川芎夏減　神麯各半斤　香附米一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食前鹽湯下○一方無白术山查若參茱萸有梔子

○大溫中丸

針砂十兩如前制　陳皮　蒼术　青皮

厚朴薑制　三稜醋煮　莪术醋煮　黃連

若參　白术各五兩　生甘草二兩　香附一斤童便浸一宿

右為細末醋糊為丸一方无黃連若參白术一方又无甘草名溫中丸

活人

○調胃承氣湯方見傷寒門

叔和曰腹滿舌痿煩燥不得臥屬黃家又曰病黃疸發熱煩喘胸滿口燥者以發病時火劫其汗而熱相搏然黃家所得從濕故一身盡發熱而黃如胠熱者熱在裏也當下之安用調胃承氣湯

○又曰黃疸之病當以十八日為期治之十日以上為差又劇者為難治○又曰病疸而渴者其病難治疸而不渴者其病易治發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱也師曰諸黃家病但宜利小便假令脉浮當以汗解之宜桂枝加芪湯又名黃芪建中湯方見傷寒門

○又曰男子黃小便利自當冀小建中湯○又曰黃疸腹滿小便不利而利自汗出此為表和裏實當下之用大黃黃柏梔子芒硝湯

○大黃黃柏梔子芒硝湯

黃柏　芒硝　大黃各四錢　梔子三枚

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○又曰黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除熱上除

必噦上者宜服小半夏湯方見傷寒門

叔和

○又曰夫病酒發黃疸必小便不利其候心中熱足下熱是其証也又心中懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒疸又曰酒疸心中熱欲嘔者吐之即愈又曰酒疸黃色心中實熱而頂

叔和

○又曰額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便自利名曰女勞疸腹如水狀不治

叔和

○又曰黃家日晡所當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之

叔和

○硝石礬石散

右以二石各等分虎煅爲末每服貳錢以大麥粥汁和服日三服取汗愈若小腸滿急小便不利用滑石石膏各二錢入粳米一撮同煎服之

○治酒疸用小柴胡湯加茵蔯豆豉大黄黄連葛根煎服效

○茯苓湯治胃疸消穀善飢面色痿黄心中煩熱胷脇脹滿小便赤澁方見淋秘門

○一方治穀疸以柴胡穀芽枳實厚朴梔子大黄等分水煎服効

○胃苓湯治脾胃不和黄腫如小便赤澁加滑石五苓散合平胃散是也

腎疸湯治腎疸目黄或渾身黄小便赤澁

升麻　羌活　防風　藁本

獨活　柴胡各半錢　蒼朮一錢　猪苓四分

葛根五分　澤瀉三分　黄芩二分　甘草三分

神曲炒三分　黄柏二分　白术五分　人參三分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去柤温服

活人

○茵蔯五苓散治傷寒或伏暑發黄小便不利煩渴等証

本方倍加茵蔯入姜棗煎服之

活人

○茵蔯茯苓湯治發黄脉沉細数四肢冷小便澁煩躁而渴

茯苓　桂枝　猪苓各一錢　滑石一錢半

茵蔯二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服如脉未出加當

歸一錢半

活人

○梔子大黄湯治酒疸心中懊憹或熱而痛

梔子十四枚　大黄一兩　枳實五枚　豆豉一升

右作一服用水五升煎至二升分三服

○半温半热湯治酒疸身黄無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩足熱或有瘀痰心中懊憹其脉沉弦緊細

半夏　茯苓　白术各七分　前胡

枳殼麸炒黄色　甘草炙　大戟各五分　黄芩

茵蔯　當歸各三分

右細切作一服入生姜三片水二盞煎至一盞温服

○茵蔯蒿湯治身熱鼻乾汗出陽氣上奔小便赤澁不利濕熱發黄

茵蔯蒿一兩　大梔子三枚　大黄三錢半

右細切作一服水三盞半温服

○茵蔯大黄湯治傷寒大熱發黄面目俱黄小便赤澁

茵蔯蒿　梔子　柴胡　黄柏

黄芩　升麻　大黄各七分　草龍膽三分半

右細切作一服水一盞半煎至一盞温服

○梔子柏皮湯治身熱不去大便利而煩熱身黄

梔子　黄柏　黄連各三錢半

右細切一服水一盞半煎至一盞温服

○茯苓滲濕湯治黄疸寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黄小便不利不思飲食方見温証門

○小茵蔯湯治發黄脉沉細而遲遍身冷

附子一枚作八片炮　甘草炙一兩　茵蔯二兩

右細切作三服每服用水二盞煎至一盞温服

○茵蔯四逆湯治發黄脉沉細而遲肢体逆冷腰以上自汗

甘草炙兩　乾姜炮一兩半　附子一枚作八片炮　茵蔯二兩

右細切分作四服水煎服

活人

○葶藶苦參散治濕熱內甚小便赤澁大便時秘飲食少進諸藥不效因為久黃

苦參　黃連　瓜蔕　黃柏

大黃各一兩　葶藶子二兩

右為細末每服一錢匕清米飲調下以吐利為度隨時看虛實消息加減

活人

○當歸白术湯治酒疸發黃心下有痃癖堅滿身体沉重妨害飲食小便赤黃此因內虛飲食生冷脾胃痰結所致

白术　茯苓各一錢　當歸　黃芩

茵蔯各三分半　前胡　枳實　甘草炙

杏仁各六分 半夏八分炮透

右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服

○抵當湯治傷寒熱鬱瘀血內結身黃脉沉細狂言譫語小便自利大便黑方見傷寒門

○針砂丸治穀疸酒疸濕熱發黃等証

針砂半斤醋炒紅 蒼朮四兩米泔浸 香附四兩童便浸 神麯炒微黃

茵蔯姜汁炒 麥蘗取麪炒各二兩 芍藥 當歸酒洗去頭

生地黃 川芎 青皮去穰炒各一兩半

陳皮去白 莪朮醋煮 三稜醋煮各二兩 梔子去殼炒

姜黃 升麻 乾漆各半兩炒烟尽

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服六七十丸姜湯送下

則成

○綠礬丸治黃腫病最捷

五倍子半斤炒黑 綠礬四兩姜汁炒白 針砂四兩醋炒紅色 神麯半斤炒微黃色

右爲細末生姜汁煑紅棗肉爲丸如梧桐子大每服六七十丸溫酒下不能飲酒米湯亦可終身忌食蕎麥麪犯之再發難治

○棗礬丸治食勞身目俱黃

綠礬半斤火煅通紅

右研細紅棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸或酒或姜湯下

○祖傳經驗槌金丸治黃腫絕妙

蒼朮半斤浸 白朮各二兩半 甘草炙半兩 厚朴姜汁拌砂一兩

陳皮去白一兩半 針砂醋炒紅色 香附童便浸各六兩 神麯炒黃色

麥蘖麩炒微黃各一兩半　有愧加三棱醋煮　莪朮醋煮各一兩半

右為細末麩糊為丸服忌魚醒濕麩生冷水菓等物

○一男子年三十餘得穀疸症求予治以胃苓湯去桂加茵蔯數十貼黃退自以為安不服藥十數日後至脫目盲不見物予曰此名雀目蓋濕痰盛而肝火有餘也用猪肝煮熟和夜明砂作丸服之月遂明如故來謝予曰未也不早服制肝補脾消痰之濟必則蠱脹但不信半月後腹漸脹痞滿復來治予仍以胃苓湯倍二朮加木通麥門冬煎湯下褪金丸一月平安

瘡瘍六十

論

內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又曰膏粱之變足生大丁榮氣不從逆於肉理乃生癰腫東垣謂榮氣即胃氣也蓋胃也調和則榮衛之氣皆順流而無逆於肉理耳若夫飲食失節肥甘過傷以致濕熱蘊積于腸胃之間燒爍府藏煎熬真陰此經之所謂陰之五宮傷在五味味焉發熱久而增氣故濕熱之氣聚於下焦陰火熾盛蓄於八脉八脉沸騰逆於經縫氣凝血滯故其滋養精微之氣不能如常榮於肉理是以結聚而成癰腫矣經曰熱勝則肉腐是也法當視其所發之地各從其經而處治焉夫發於身之表者其名一十有七曰腦發督脉足太陽經曰背發中屬督脉餘皆足太陽經曰髮發手足少陽經曰眉發手足太陽

氣

經手足少陽經曰頤發手足陽明經曰顋頷發手陽明經曰髭發手足陽明經曰腋發手太陽經曰穿當發督衝任三脉曰椳發表足三陽裏足三陰曰腎癰足厥陰經曰腠癰任脉陽明經曰臍癰任脉陽明曰乳癰內陽明經外少陽經乳頭足厥陰經曰腎癰足太陽經曰騎馬癰足厥陰經曰囊癰足厥陰經發於腔子之內者其名有

曰四內疽曰肺癰手太陰經曰腸癰手太陽經手陽明經曰胃脘癰足陽明經夫十二經有氣血多少之不同癰疽淺深之有異是故為治之法或疎散或消毒或針烙或內托或外消或瀉利或補益是故腫瘍為實宜瀉利潰瘍為虛宜補益浮露而淺者為癰宜外消藏伏而深者為疽宜內托此千古不易之定議也雖然其証有善而易治者為順惡而難消者為逆其為眼白睛黑目緊小者一逆也不能飲食納藥而嘔食不知味二逆也傷痛渴甚三逆也膊項轉動不便四肢沉重四逆也聲嘶色脫唇

鼻青黑面目四肢浮腫五逆也煩燥時咳腹痛甚泄利無度小便如淋六逆也膿血大洩㤼腫尤甚膿水臭敗莫近七逆也喘鹿氣短恍惚嗜卧八逆也未潰先黑陷下青唇黑便污九逆也又如噫氣痞塞喘咳身冷自汗目瞪耳聾恍惚驚悸語言錯乱皆是惡証若夫動息自寧飲食知味一順也便利調勻二順也神彩精明語聲清朗三順也膿潰腫消色鮮不臭四順也体氣和平五順也凡五順見三則吉九逆見六則危矣先哲垂訓班班可攷學者其可不詳察乎

脉法

脉經曰脉数身無熱内有癰也一云腹無積聚身無熱脉数此爲腸中有膿薏苡附子敗醬湯主之

諸浮数脉應當發熱而反洒淅惡寒若有痛處當發癰膿脉

微而遲反發熱弱而數反振寒當發癰腫

脉浮而數身体無热形嘿ㄈ胷中微燥不知痛之所在此人當發癰腫

脉滑而数ㄈ則為热滑則為實滑則主榮数則主衛榮衛相逢則結為癰热之所過則為膿也

羽林婦病豎者脉之知婦人腸中有膿為下之即愈蓋寸口脉滑而数滑則為實数則為热滑則為榮数則為衛ㄈ数下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澁或時汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊聚為瘀血下之則愈

腸癰之為病其身体甲錯腹皮急按之軟如腫狀

大腸癰者小腹腫按之則痛小便数如淋時ㄈ發热自汗出

復惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血脉洪數者膿已成不可下也大黃牡丹湯主之

方法 丹溪方法凡二十二條

丹溪曰癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脉內氣行脉外相並周流寒與濕搏之則凝泣而行遲為不及熱與火搏之則沸騰而行速為太過氣得邪而鬱津液稠粘為痰為飲積久滲入脉中血為之濁此陰滯於陽也血得邪而鬱經道阻隔或溢或結積久滲出脉外氣為之亂此陽滯於陰也百病皆由於此又不止於癰疽而已

○癰疽因積毒在藏府當先助胃壯氣使根本堅固而以行經活血藥為佐參以經絡時令使毒氣外發施治之早可以內消此內托之意也

東垣

○或問內托之法予曰河間治腫焮于外根盤不深形証在表其脉浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便閉及寒熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也

丹溪語

○外科精要謂排膿內補十宣散治未成者速散已成者速潰誠哉是言也若用之於小瘡癤與冬月亦可轉重就輕移深居淺若潰瘍與夏月用之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗比見世人用此不分輕重時令經絡前後正若育人騎瞎馬半夜臨深池危哉

丹溪

○諸經惟少陽厥陰二經生癰疽宜預防之以其多氣少血也血少而肌肉難長瘡久未合必成死証苟不知此遽用驅

逐利藥以伐其陰分之血渦不旋踵

○腫瘍內外皆壅宜以托裏表散為主如欲用大黃者宜戒猛浪之非

○潰瘍內外皆虛宜以補接為主如欲用香散者宜戒虛上之失

○外科精要一書惟務紀錄舊方應酬輕小証候耳

○癰疽始發即以艾多灸之可使輕淺騎竹馬灸法最妙蓋艾火暢達拔引聲毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若身上必痛灸至不痛不痛灸至痛亦有因艾而死者蓋虛甚孤陰將絕其脉必浮數而大且不皮精神必短而皆無以抵當火氣宜其危也○按河間灸刺法曰凡瘡瘍潰分經絡部分血氣多少腧穴遠近從背出者當從

太陽經五穴選用至陰通谷束骨崑崙委中是也從髮出者當從少陽經五穴選用竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉是也從髭出者當從陽明經五穴選用厲兌內庭陷谷衝陽解谿是也從腦出者則以絕骨一穴治之各穴點法俱見銅人針灸經茲不再具

○蜞針之法可施於輕小証候吮出惡血若積毒在藏府者徒竭其血於外無益也

○外施貼藥亦發表之意精要謂貼冷藥有神効夫氣得熱則散得冷則斂何謂神効經曰發表不遠熱是也貼冷藥惟輕小痈毒可也

○外科用針烙得膿後服神仙追毒丸此藥能下積取毒無取膿之功若血氣壯实則膿自出當以和氣活血藥佐參芪

補瘡肤之

○腫瘍用手按之熱則有膿不熱則無膿

○膿出而反痛者此為虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛者宜和解之風冷所逼者宜溫養之

○疽發深不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

○腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不食又宜參芪白术膏粱補隨証加佐使藥

河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵于胃也宜倍白术

○癰疽發渴乃血氣兩虛用生芪以補氣當歸地黃以養血或

忍冬丸黃芪六一湯皆効

○如味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有迴生起死之功但不分經絡

不載時令豎者觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以爲安慢不知省無補接調養之功愈後虛証復見因而轉爲他病而危劇者多矣

○蒲公英化熱毒消惡腫散結核有奇功田間路側皆有之二四月開黃花似菊花味甘衍義補遺云四時常花卜罷飛絮節葉間折之有白汁出者是能解食毒散滯氣可入陽明太陰二經同忍冬藤煎以少酒佐而服之禍爛盒之亦妙

○白蠟屬金禀收斂堅凝之氣外科之要藥也生肌止血定痛接骨續筋補虛當與合歡皮同入長肉膏藥用之有神効但未試其可服否若合歡皮常服之驗矣

○單蘇子性善收能追膿取毒亦要藥也

○癰疽已破未破用皂角刺能鑽引至痛處

取剩骨法

已上出丹溪

○取久疽久痔漏中朽骨（俗名刺骨）用烏骨雞脛骨以信砒實之塩泥固濟火煅通紅地上出火毒用骨研細飯丸如粟米大以皮紙撚送入竅內外以拔毒膏藥封之其骨自出

惡瘡發背腦疽等証方法

東垣

○升陽益胃散治一切惡瘡發背腦疽等証

羌活一錢半　獨活五分　防風五分　藁本一錢半

知母一錢　生地黃一錢　黃芩一錢　黃連半錢

黃柏半錢　當歸三錢　防風稍半錢　連翹二錢

人參半錢　黃芪一錢半　生甘草一錢　陳皮半錢

當歸稍半錢　蘇木半錢　炙甘草一錢半　酒防己半錢

澤瀉七分　桔梗一錢

右細切分作二服每服用水二大盞浸半日煎至一盞滴酒數十點去柤臨卧温服忌飲水再作膿劾遲初患二三日者服之立消作膿者立潰隨病上下食前後服一人患腦疽第八日腫硬如拳即日脫服此藥一劑次日便平復腫勢消更不疼痛又服半劑七日全愈如常明之言凡瘡皆除中之陽上中之陰二証而已我治此瘡陽藥七分陰藥三分名曰升陽益胃散勝十宣也老人宜之亦名復煎散或加乳香沒藥各一錢尤妙

○當歸羌活湯治腦疽証

黄芩酒炒　黄連酒炒各二錢　黄柏酒炒一錢　澤瀉半錢

連翹一錢　當歸身二錢　防風　羌活各一錢

甘草炙一錢　山梔子一錢　獨活七分　藁本七分

右細切作一服水二盞先浸一時許入酒一起煎至八分去柤食後稍熱服日進二服三日尽六服俱將藥清汁調下後項槟榔散

○槟榔散大歛瘡口

槟榔　木香各三錢

右爲細末用前湯調下或歛瘡口用之决無疼痛以蠟油調塗瘡口生肌歛肉甚速别無悪肉瘡口易合平復背梁熱瘡所宜用也貧人寒地及寒湿外来之寒瘡禁不可多用

背疽方法

○千金托裏散治背疽併諸悪瘡如三日以裏未針灸双利大

便者則可消矣

羌活一錢半 防風酒洗半錢 防風稍半錢 藁本一錢半

當歸身三錢 當歸稍半錢 連翹三錢 黃芩三錢酒浸

黃芩一錢半 人參一錢半 炙甘草一錢半 生甘草半錢

陳皮半錢 蘇木 五味子 酒黃栢

酒防已各半錢 桔梗 梔子 生地黃酒洗各一錢

酒大黃三錢 酒黃連一錢 木猪苓一錢半 麥門冬二錢

右細切分作二服每服用水三大盞浸半日煎至一盞稍熱服後一服如前併柤再煎服忌冷水此方如瘡病即便忙服無不効者若瘡勢已發三四日或成膿則不消也崔經歷二次發背疽皆得此方而愈

○丹溪治背疽方用大黃防風羌活甘草節生地黃當歸身具

母白芷赤芍藥皂角刺黄芩作大劑煎服氣虛加人參黄芪瘡潰後亦宜加之

附骨疽方法

○丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止防生附骨疽以蒼术為君佐以黄柏之辛行以青皮冬加桂枝夏加條芩体虛者加杜仲牛膝以生甘草為使作大料煎入姜汁食前飲之痛甚者恐前藥十數貼發不動少加麻黄一二貼又不動者恐疽將成急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便令患赤体坐於坑中以帶或綿衣圍抱下体使熱氣熏蒸腠理開氣血通暢而愈

○羌活防風湯治附骨疽初發於太陽厥陰太陰分者

羌活　川芎　蒼术　防已
木香　連翹　射干　甘草
白芍藥　木通　當歸尾　蘇木各七分
右細切水酒各一大盞煎至二分食前服美膳壓之

○托裏黃芪湯治骨疽初發於足少陽上明分者
柴胡一錢二分　連翹八分　肉桂八分　荼粘子八分
黃芪八分　當歸尾一錢半　黃柏四分　升麻四分
甘草炙四分　白芷一錢
右細切作一服酒一盞水一盞半煎至一大盞空心服
美膳壓之

○內托黃芪酒煎湯治瘡生腿外側或因寒濕得附骨疽於足
少陽經分傲侵足陽明經堅破漫腫行步作痛或不能行

柴胡六錢半　連翹八分　肉桂八分　大力子炒

黄芪各四錢　當歸尾八錢　黄柏五分　升麻七分

甘草炙五分　白芷二錢

右細切水酒各一盞煎至一盞食前温服

○黄連消毒飲治附骨疽

黄連一錢　黄芩　黄柏各半錢　生地黄四分

知母四分　羌活一錢　獨活四分　防風四分

藁本五分　當歸尾四分　桔梗五分　黄芪二分

人參二分　甘草三分　連翹四分　蘇木二分

防己五分　澤瀉二分　陳皮三分

右細切作一服水煎服一老人年七十因寒濕地氣得附骨疽於左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分

濶六七寸長一小尺餘硬漫腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日堅軟腫消而愈

○內托黃芪柴胡湯治附骨疽

生地黃一分　黃柏二分　肉桂二分　羌活五分

當歸稍七分半　土瓜根酒洗　柴胡稍一錢　連翹三分

黃芪二錢

右細切作一服酒一盞水二盞煎至一盞去祖空心熱服賈德茂小男於大腿近膝股內出附骨疽不辨肉色漫腫光澤木硬瘡勢甚又其左脚乃肝之髀上也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左二部細而弦按之洪緩微有力與此藥而安

臀癰方法

○丹溪曰臀癰者臀居小腹之後在下此陰中之陰道遠位僻雖曰太陽妄血然氣運不到血亦罕來中年後尤慮患此繆有腫痛參之脉証但見虛弱便與滋補血氣可保終吉若無積補之功其禍多在結痂之後或半年已來乃病妄致失手慎之慎之

○內托羌活湯治足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻臀生癰堅硬腫痛太作

羌活　黃柏酒炒各二錢　防風　藁本

當歸尾各一錢　肉桂三分　連翹　甘草炙

蒼朮　陳皮各五分　黃芪一錢半

右細切作一服水二盞酒一盞煎至一盞去粗稍熱空

心服以衣覆蓋雍上使藥力行去衣

內疽方法

○丹溪曰內疽者皆因飲食之火挾七情之火相鬱而發飲食者陰受之七情者藏府受之宜其發在腔子而頭向內非干腸胃肓膜也宜以內托之藥托出于外以針開之而愈先用四物湯加桔梗香附生姜煎服膿出後亦用四物湯調理而安

肺雍方法

○丹溪肺雍先須發表千金方曰病咳嗽膿血其脉數實或口中咳胷中隱隱痛脉反滑數者為肺雍其脉緊數為膿未成緊去而但數者膿已成也

○要畧治肺雍先以小青龍湯一貼以解表之風寒邪氣然後

以葶藶大棗瀉肺湯桔梗湯薯蕷湯隨証用之以取膿此治腫瘍之例也終以宇宙獨行方名黃昏湯以補裏之陰氣此治潰瘍之例也

○黃昏湯治胸中甲錯隱痛知為肺癰

合歡木皮一掌大

右以水三盞煑取一盞半分二服

○葶藶大棗瀉肺湯治肺癰或肺脹喘促不得卧

葶藶一兩炒黃研為細末煉蜜丸如彈子大　大棗十枚

右以水三盞煎大棗至二盞去棗入葶力一丸再煎至一盞擣勻服之

○薯蕷湯治欬有微熱煩燥胷心甲錯出千金方

薯蕷二升　薏苡仁半斤　桃仁五十箇　瓜瓣半升

右以水一斗先煮薯蕷至五升去粗入諸藥煮取二升分溫再服當吐痰如粥而愈

○桔梗湯治肺癰心胸氣壅咳嗽膿血心神煩悶咽乾多渴兩脚腫滿小便赤黃大便多澁

桔梗　貝母各一錢　當歸　瓜蔞子各八分

枳殼炒五分　薏苡仁八分　桑白皮五分　防己五分

甘草鄭三分　黃芪五分　杏仁去皮炒別研　百合各三分

右細切作一服水一盞半加生薑五片煎至八分去粗溫服不拘時若大便秘者加大黃小便澁者加木通

○又方治前証

瓜蔞子　當歸　桔梗　貝母

白芷　甘草各一錢

右細切作一服水一盞食後服一方無具母白芷有葶
藶子

○肺癰已破入風者不治或用太乙膏丸服以搜風湯吐之

○有吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入無病男
子髮灰清米飲調下可二服而愈

○祖傳經驗秘方治肺癰未成膿者立消已成膿者立潰其効
如神用章漆樹葉一名接骨木又名繼骨樹又名野黃楊
酒田塍路側皆有之右一味細研畧入濾過以好調服不飲
酒人入生姜研服

腸癰方法

○丹溪曰腸癰當作濕熱積治入風難治

○千金謂腸癰妄治必殺人其病小腹重強按之則痛小便數

淋時時汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脉數者微有膿也巢云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或遶臍生瘡或膿自臍出或大便膿血羽抹婦証具前脉法下

丹溪

○腸癰治法要畧以薏苡附子敗醬散千金以大黄牡丹湯

○灸法屈兩肘正肘頭銳骨端灸一百壯下膿血而安

金匱

○薏苡附子敗醬散

薏苡仁一錢炮附子一分敗醬三分

右為細末每服方寸匕水二盞煎至一盞連粗頓服之小便當下膿血而愈

千金

○大黄牡丹湯

大黄四分　牡丹皮一兩　桃仁五十枚去皮煎另研尖

芒硝三分　瓜蔞子半升

右細切用水六升煎取一升去柤入芒硝再煎一沸分三服頓服之有膿即下膿無膿即下血

○東陽呂俊文得潮熱微似瘧狀小腹右邊有一塊大如雞卵作痛右脚不能伸縮一豎作膹豚氣治十餘日不驗召予診候其脉左寸芤而帶濇右寸芤而洪實兩尺兩関俱洪数予曰此大小腸之間欲作癰耳幸膿未成猶可治療與五香連翹湯加減與之間以蜈蚣炙黄酒調服之三日内平安

乳梗方法

○丹溪曰乳梗多因乳母不知調養所致蓋乳房陽明所經乳頭厥陰所屬忿怒所逆鬱悶所遏羣味所釀以致厥陰之

氣不行故竅閉而汁不通陽明之血沸騰故熱甚而化為

乳

膿或因所浮之子膈有滯痰含乳而睡口氣焮熱所炊而成結核初便忍疼揉令核軟吮令汁透可散否則結成矣治法以青皮疎厥陰之滯石膏清陽明之熱生甘草節行汚濁之血瓜婁子消導腫毒或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸身或湯或散須以少酒佐之若加艾火二三壯於痛處灸之尤妙彼粗工便用針刀必成拙病

○乳癰用蒲公英同忍冬藤入少酒煎服即欲睡是其効也

乳癰未潰以青皮瓜婁桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨証加減煎服已潰以人參黃芪川芎當歸白芍藥青皮連翹瓜婁甘草節煎服

○東垣升麻托裏湯治婦人兩乳間出黑頭瘡七頂陷下作黑

眼子其脉弦洪按之細小

黄栢二分　肉桂三分　黍粘子五分　黄芪

炙甘節　當歸身各一錢　連翹　升麻

葛根各一錢半

右細切作一服水一盞酒半盞同煎至一盞食後熱服

妳岩方法

○石香程氏曰妳岩始有核腫結如鱉碁子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之凹或如人口有唇赤汁膿水浸淫胞脇氣功疼痛用五灰膏金宝膏去其蠹肉生新肉漸漸收斂此疾多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終不可治

局方

○十六味流氣飲治妳岩、

人參　黃芪　川歸各一錢　川芎

肉桂　厚朴　白芷　甘草各半錢

桔梗三分　防風　烏藥　檳榔

芍藥　枳殼　木香各半錢　紫蘇一錢半

右細切作一服或加青皮一錢水二大盞煎至一盞服

丹鑑

○單煑青皮湯治婦人百不如意久積憂鬱乳房內有核如鱉

碁子、

每服用青皮四錢細切以水一盞半煎至一盞日二服已

上二方間服至核消住藥

丹鑑

○橘葉散治証如前

青皮　石膏煅　甘草節各半錢　瓜蔞子一錢

當歸頭五分 皂角刺一錢半去尖畧炒 金銀花五分

沒藥 蒲公英各五分

右細切作一服加青橘葉一小握以酒一盞半煎至一

淺盞食後或卧時服

○丁香散治乳頭破裂或因小兒吹乳血乾自裂開多痛

丁香不拘多少

右一味為末乾付裂處如燥嚥津調付

囊癰方法

○丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入

滲道因陰道或虧水道不利而然膿尽自安不藥可也惟

在善於調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

睾丸懸掛水出以輔炭末付之外以紫蘇葉包裹仰臥卷

之

丹溪

○癰疽入囊者曾治數人悉由濕熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫舉丸懸掛者皆不死

錄驗

○一方用野紫蘇葉面青背紅者是也焙乾為細末付之如燥以香油調付囊脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生

丹溪

丹溪便毒方法

○便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸同生姜煎食前服得利二三行効射干開紫花者是紅花者勿用

丹溪

○一方用破故紙黍粘子微炒黑牽牛炒大黃酒蒸焙乾各等分為末每服一兩酒調下

○又方已結成膿者用大黃酒拌蒸連翹各五錢枳實三錢厚朴甘草節各二錢桃仁二十一箇

生姜三片分三服水煎服之

○石香程氏曰便毒一名騎馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經多血又名血疝或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜踈利之即散變膿後如常用托裏內補之藥

瘡瘍集

○蘇方散治便毒

木鱉子去殼　當歸尾　芍藥　白芷

汾甘草　川芎　射干　忍冬即金銀花

大黃　川山甲唐火煅胖　沒藥　蘇木各六分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞食前服

瘡瘍集

○玉燭散

川芎　當歸　生地黃　赤芍藥

朴硝　大黃　甘草炙各八分

右細切作一服水煎食前服

○牡蠣大黃湯

大黃　牡蠣半各二錢　甘草一錢　瓜蔞一箇去皮

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

瘰癧方法

○丹溪曰瘰癧必起於少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食味之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端拓引變換須分虛實虛者易治實者可慮以其屬膽經主決斷有相火且氣多血少婦人見此若月經不作寒熱便生稍久轉為潮熱危矣自非斷慾食淡神仙不治也

○治瘰癧用立效散與瓜蔞散相間服神効

○本草云夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功而經不言觀其能退與熱虛者可仗若實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

○治血少馬刀癧瘡肚泄以四物湯倍酒炒芍藥牡蠣粉陳皮柴胡甘草黃連玄參炒神麯桑椹膏

○石香程氏曰瘰癧之証內經謂之結核者是也結核有大小如大豆銀杏連串而生者形大如馬刀者謂之馬刀瘡經別為火類夫火亢之甚必燕水化制之其核故堅也凡瘰癧之起始生於耳後足陽明少陽二經浸淫于太陽之經漸隨經流注于腋脇手足皆有也治法以火針刺入核中不可透底納蟾酥膏于中外用綠雲膏貼之三日後取去核中稠膿尽取去核外薄膜先破初起之核一枚以絶

其源服藥後出者皆愈或不肯收如銀杏者尺皆開了用藥取之其自潰者猶如木菓之腐熟肉雖潰而核猶存故膿水淋漓久難得愈治者用鐵烙燒赤烙去其破核猶存者併肉潰處次用金寶膏龍珠膏等藥追去蠱惡之根遂能長肉而愈隨經絡証候服除風熱兼引經之藥以除根本可獲全功也

○蟾酥膏

蟾酥如大豆許　白丁香十五枚　寒水石少　巴豆五粒

寒食麪少

右各另研和作一處再研煉蜜為丸如豌豆大每用一丸或二三丸納入針竅中如膿未尽再用數丸以膿尽為度

○綠雲膏

黃連　大黃　黃芩　玄參

黃栢　木鱉子去殼以上各一錢

右細切用香油一兩同煎焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏濾入水中扯拔令金色入銚再熬放溫入後藥

猪膽汁三箇　銅綠三錢醋浸一宿綿去粗

右用竹鉈帶溫攪勻然後如常攤貼兼治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙

○金寶膏去腐肉朽肉不傷良肉新肉

桑柴灰五碗用沸湯十碗淋汁用草紙一層皮帋二層放罗底次置灰於上淋之

穿山甲二兩煨胖　信砒二錢　杏仁七枚去皮同信石穿

山甲研細　生地黃二兩　辰砂一錢　粉霜另研

射香各半錢

右將灰汁濾澄清下鍋煎濃下甲末候焦乾一半下射香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下炒石灰末以成塊子即收入小罐子內勿見風

○龍珠膏

龍牙草五兩　棘束根半兩　海藻二錢半　蘇木半兩

右細切量水二十碗煎至十二三碗濾去柤又用桑柴灰二碗半　石灰二碗半　蒼耳草灰二碗半

以草紙二層皮帛二層放羅底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁十碗許澄清入鍋內煎成膏用巴豆霜白丁香石膏射香輕粉磁罐子收貯每用取付核上再付即去旧藥併醫丹上新藥其核即潰而愈根小者但只塗

藥於根上其核自潰

○救苦化堅湯治瘰癧馬刀挾癭在耳下或耳後下頸至肩上或入缺盆中乃手足少陽之經分其瘰癧在頦下或至頰車乃陽明之經分受心脾之邪而作也今將二証合而治之

黃芪一錢護皮毛間腠理虛及活血氣為瘡家之聖藥又實表補元氣之妙劑也

人參三分補肺氣之藥也如氣短不調及喘者宜加之

炙甘草半錢能調中和諸藥瀉火益胃氣亦能去瘡中之邪

真漏芦 升麻各一錢 葛根半錢此三味俱足陽明本經藥也

連翹一錢此一味乃十二經瘡中之藥不可無也能散諸血結氣聚此瘡家之神藥也

牡丹皮三分去腸胃中留滯宿血 當歸身三分

生地黃三分 熟地黃三分此三味諸經中和血生血涼血藥也

白芍藥三分如夏月倍之其味酸氣寒能補中益氣之匱治腹痛必用之冬寒不可用

肉桂二分大辛熱能散結積陰証瘡瘍須當少用之此寒因熱用之意又為寒陰覆蓋其瘡用大辛熱去浮凍之氣亦有煩燥者去之

柴胡八分功同連翹如瘡不在少陽經則去之

黍粘子三分無腫不用　羌活一錢　獨活　防風半錢

已上三味必問手足太陽証脊痛頭強不可回顧腰似折頭似拔者是也其防風一味辛溫如瘡在膈已上雖無手足太陽經証亦當用之為能散結去上部風邪

昆布二分其味大鹹若堅硬者宜用蓋鹹能軟堅也　荊三稜炮二分

廣朮炮三分此二味若瘡堅硬甚者用之如不甚堅硬者不須用

益智二分如唾多者胃不和也或病人吐沫吐食胃中寒者加之無則勿用也

麥蘖麪一錢腹中縮急又能消食健脾　神麯炒二分食不消化者用之

黃連三分治煩悶　厚朴姜制一錢二分如腹脹者加之　黃栢炒三

分如有熱或腿脚無力加之如有煩燥欲去衣者腎中有伏火也更宜加之無則勿用

右件共為細末湯浸蒸餅捏作餅子日乾搗如米粒大每服三錢白湯送下○如氣不順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實臨時斟酌與之毋令藥多妨其飲食此為大治之法也○如止在陽明分者去柴胡黍粘子二味餘皆用之○如在少陽分為馬刀挾癭者去獨活漏芦升麻葛根更加瞿麥三分○如本人素氣弱其病勢來時氣盛而不短促者不可考其平素宜作氣盛而從病變之權也宜加黃芩黃連黃栢知母防已之類視邪氣在上中下而用之○假令在上焦加黃芩半酒洗半生用在中焦加黃連半酒洗半生用在下焦則加酒制黃栢知母防已之類選而用之○如大便不通而滋其邪盛者加酒

制大黃以利之○如血燥而大便乾燥者加桃仁泥酒制大黃二味○如風結燥不行者加麻仁大黃以潤之○如風澁而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之○如脉澁氣身有氣澁而大便不通者加郁李仁大黃以除風燥也○如陰寒之病為寒結秘而大便不通以局方中半硫丸或加炮附子干姜煎水冷服之○大抵用藥之法不惟瘡瘍一家諸疾病重人素氣弱者當去苦寒之藥多加人參黃芪甘草之類瀉火而先補其元氣餘皆倣此

東垣○柴胡連翹湯治男子婦人馬刀瘡

中桂一分　當歸稍五分　黍粘子　炙甘草

酒黃柄　生地黃酪一　柴胡一錢半　黃芩炒

酒知母　連翹各一錢半　瞿麥二錢

右細切作一服水二盞稍熱服

○消腫湯治馬刀瘡

黍粘子炒　黄連各五分　當歸稍　甘草各七分

瓜蔞根　黄芪各一錢　生黄芩　柴胡去芦各一錢二分

連翹二錢　紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤稍熱服

○柴胡通經湯治小兒項側有核堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡去芦　連翹　當歸稍　生甘草

黄芩　黍粘子　荆三稜　桔梗各二分

黄連五分　紅花少許

右細切作一服水二盞煎至一盞去柤食後稍熱服忌

苦藥泄大便

○散腫潰堅湯治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或肩上或脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頸或至煩車堅而不潰裹足陽明經中所出或二証瘡已破流膿水並皆治之

黄芩 八分酒洗半炒半生 草龍膽 酒先炒四變

瓜蔞根 酒先 黄柏 酒制炒 知母 酒炒 桔梗 去芦

昆布 酒洗各五分 柴胡 四分 炙甘草 荆三稜 酒洗

廣木 酒拌炒 連翹 各三分 葛根 二分 白芍藥 二分

當歸稍 二分 黄連 升麻 一分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去柤食後稍熱服於臥處伸足在高處頭低晝每含一口作十次

東垣

嚥下服畢少頃依常安臥取藥在膈上停蓄故也另攢一料作細末煉蜜為丸如菉豆大每服百餘丸以煎藥送下或加海藻五分炒入亦妙以海藻灰甘草此東垣用藥妙處世醫莫曉也

○升陽調經湯治瘰癧遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻八分　葛根　草龍膽用酒四次制炒

黃芩　廣木　荊三稜三味俱酒制炒

炙甘草四分　當歸稍　芍藥各三分　黃柏酒炒二分

知母酒炒一錢　一本有黃連酒洗　連翹桔梗各五分　生黃芩四分

右細切作一服水二盞先浸半日煎至一盞去柤臨臥

稍熱服外另称十貼之数為細末煉蜜丸如菉豆大每服一百丸服藥時足高去枕仰臥噙一口作十次嚥之

畱一口在後送下丸藥服畢寢臥如常

○連翹散堅湯治耳下或至缺盆或肩上生瘡堅硬如石動之無根名曰馬刀瘡從手足少陽經中來也或生兩脇下或已流膿作瘡未破並皆治之

柴胡一錢二分　草龍膽酒制四次　土瓜根酒制炒各一錢

黃芩酒炒二次七分　當歸梢　生黃芩　廣朮

荊三稜酒炒　連翹　白芍藥各五分　炙甘草三分

黃連酒炒二次　蒼朮米泔浸各二分

右細切作一服外另秤十貼之数為細末煉蜜丸如菉豆大每服百余丸煎者用水二盞先浸大半日煎至一

盞去柤臨臥稍熱服去枕仰臥每口作十次嚥之畱一口送下丸藥服畢如常安臥更以後藥塗之

○龍泉散

龍泉粉炒即磨刀石上粉也　瓦粉　廣木

荊三稜酒洗炒　昆布各五錢

右同為細末煎熟水調塗之用此藥去疾尤速

○三聖丸治瘰癧神効却藥

丁香五十粒　班猫十箇去翅及頭足炒　射香一錢另研

右為末用鹽豉五十粒湯浸爛研如泥和前藥末丸如菉豆大每服七丸食前温酒送下日三服至五七日煑小便淋瀝是藥之効便如服或小便下如青筋膜之狀乃病之根也忌濕麪毒食

○立驗大聖散治瘰癧劫藥

斑猫大者三十箇去頭及翅足用糯米一合同炒米黄色去米用斑猫

白姜蚕一錢去絲嘴炒　黑牽牛半生半炒共三錢取頭末一錢

荆芥穗一錢

右為細末每服一錢空心無灰老酒下服此藥須忌鹅肉酒醋鹽醬及發風動氣等物止可吃菜蔬白粥且如次早服藥隔夜不吃夜粥黄昏煎川木通湯調下玉雪妙灵散二錢重次日五更酒調立驗大聖膏一貼如不能飲酒用燈心木通湯調下至日中煮小腹攻痛小便澁痛又用燈心湯調下琥珀末一錢或玉屑妙灵散亦可當利恶物從小便中出如蒲萄肉狀中有凝血一點或未下三日後可再服至日中前用六丁神散一服催

之必然自下五六日後再催一服以病根除尽為度如項上有瘰一枚取下惡物十枚則尽病根如有小腹攻急至中澁痛之惱不必驚恐過後便自平復無事

○玉屑妙灵散

活石細研為末每服一錢煎川木通湯調下

○六丁神散

苦丁香六枚或秤半錢重 白丁香一錢 苦參末五分

赤小豆一錢 磨刀泥青石者佳一名龍泉粉 大班猫七箇去頭足炒

白姜蚕去系觜炒各一錢

右共為細末每服一錢重空心無灰酒調下

癭瘤方法

○破結散治石癭氣金癭血癭肉癭馬刀瘰癧等証

海藻酒洗淨 龍胆草酒洗 海蛤粉 通草

貝母去心 昆布酒洗淨 礬石枯 松蘿各三錢今以桑寄生代效

麥麯炒四錢 半夏麯二錢

右為細末每服二錢熱酒調食後服忌甘草鯽魚雞肉五辛生菓○有人於項上生瘰大如茄子潮熱不食形瘦日久百方不效後得此方去松蘿加真桑寄生一倍服三五日後其瘡軟而散熱退而愈屢驗數人皆效

○南星散治皮膚頸項面上瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不痒不痛宜用此藥切不可輙用針灸多致不救

生南星大者一枚

右細研爛入好醋五七點杵如膏如無生者即以乾者為末醋調如膏先以細針刺患處令氣透却以膏藥攤

貼覺痒則頻換貼取効

○癗者氣血凝滯結聚而成或如桃李或如瓜瓠其名有六曰骨癗曰脂癗曰膿癗曰血癗曰筋癗曰風癗以其中各有此物而名之也已上諸癗通用龍珠膏治之

○龍珠膏方見前瘰癧條下

○癗宜服十六味流氣飲方見前妳岩條下

○凡癭氣先須断厚味用海藻一兩黄柏二兩為末置掌中時時舐之以津唾嚥下待消三分之二止藥

結核方法

○丹溪曰但凡結核在項在臂在身如腫毒不紅不痛不作膿者多是痰注不散名曰痰核用二陳湯加酒炒大黄連翹桔梗柴胡煎服

○又方治臂核作痛用二陳湯加連翹川芎皂角刺防風黃芩酒炒蒼朮煎服

○治耳後頂門各有一核用炒姜蚕酒蒸大黃青代牛膽南星為末蜜丸噙化

疔腫方法

○石香程氏曰疔腫之証皆蓄熱毒之深而成者也近者多見因食災牛疫馬之肉而成此証其形有十三種皆以形而名之耳一曰麻子疔二曰石疔三曰雄疔四曰雌疔五曰火疔六曰爛疔七曰三十六種疔八曰蛇眼疔九曰塩膚疔十曰水洗疔十一曰刀鐮疔十二曰浮鷗疔十三曰牛拘疔惟三十六種疔最為可畏其狀頭黑浮起形如黑豆四畔大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十數丸

為可治若滿三十六則為不治之証也夫十三種疔其形狀雖各不同而其所由皆熱毒之甚也治法並急用奪命丹下之去其毒之銳勢次服化毒丸及內托散二活散雄射湯隨証經絡病勢緩急用引經藥斟酌施治如無他証有熱即退热有腫則退腫如身冷自汗嘔逆燥喘狂唱妄語直視者皆毒氣入內不可治矣如疔已拔去用金銀白芷散加減十宣散調之方獲全安也

今將十三種疔証候開列于後

○一曰麻子疔其狀肉起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子近油衣布衣并入麻田中行

○二曰石疔其狀皮肉相連色如黑豆甚硬刺之不入肉微痛忌瓦礫磚石之屬

○三曰雄疔其狀皰頭黑靨四畔仰皰漿起有水出色黃大如錢孔形高者忌房事

○四曰雌疔其狀瘡稍黃向裏靨亦似灸瘡四面皰漿起心凹色赤如錢孔者忌房室

○五曰火疔其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有煙焰又如赤粟米者忌火燒烙

○六曰爛疔其狀色稍黑有白班瘡中潰有膿水流出瘡形大小如起面者忌沸熱食爛物

○七曰三十六疔其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起赤色今日生一明日生二及至十數未滿三十六猶可施治若滿三十六藥所不能治也忌嗔怒蓄積怨恨

○八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼大

硬忌惡眼人看并嫉妬人見忌毒藥

○九曰塩膏丁其狀大如起面四邊皆赤有黑粟粒起大忌食

塩味

○十曰水洗疔其狀大如錢形中如錢孔瘡頭白裏黑膿汁出

中硬忌飲漿水ヒ洗渡河

○十一曰刀鎌疔其狀闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒

烙忌刺及刀鎌切割鉄刃所傷可以藥治不可乱攻

○十二曰浮漚疔其狀瘡体曲圓少許不合長而狹如薤葉大

内黄外黑ヒ處刺之不痛黄處刺之痛

○十三曰牛狗疔其狀肉色皰起掐不破

右十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱ヒ定則

寒多如肢沉重心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難

治其麻子疔一種始末惟痒初錄忌者不得觸犯比比者發作難治其浮漚疔牛拘疔兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸疔不同皆宜將護依法治療禁忌不得觸犯若或觸犯脊強瘡痛極甚不可忍者是也又云疔腫初發時突起如釘故謂之疔令人惡心惡寒四肢強痛一日瘡變為焦黑色腫大光起根硬刺之不覺痛皆其候也在手足頭面胸背骨節間最急其餘處則可治毒入腹則煩悶恍惚似醉如此者三二日間死矣皆不可不速治也

○返魂丹經云汗之則瘡愈必用此藥汗之

乳香　没藥　硃砂　雄黃各一錢半

輕粉　片腦　射香各五分　海羊即蝎牛也不拘多少

蟾酥　青代　粉草　朋砂各一錢

右為細末用海羊搗膏為丸如難丸加酒麪糊些少丸如彈子大每服一丸兼生葱頭二三箇細嚼嚥下疔腫及癰腫毒氣入膈者得微汗即解○一方加銅綠寒水石輕粉枯礬各一錢重按上藥皆非發汗之藥蓋能解毒又能追逐毒氣從腠理為汗化也

○拔疔法以黑牯牛牽於石塔上必撒糞候糞上生菌取焙乾與稀薟草葉等分為細末先用竹筒兩頭去節一頭解十字路將不解頭套在疔上以線緊縛竹筒陷入肉內為度以前藥末一匙滴水和之放於筒內少時藥滾起則疔自拔起若一次未效漸加度數其疔必拔也

○奪命丹

巴豆一兩去殼醋煮一伏　黃丹三錢　硃砂

雄黃各三錢　乳香　麝香各五錢　大黃一兩

輕粉二十录　蟾酥一錢或半錢　飛羅麪三兩

右為細末蠟水糊為丸如菉豆大隨身年分虛實加減丸數服之以下其毒如無奪命丹雄黃丸代之亦效

○雄黃丸

雄黃　麝香各一錢　巴豆十四枚去殼　射香少許

皂角　全蝎各一錢

右為細末滴水為丸如菉豆大每服二十丸清茶送下亦看大小虛實斟酌加減丸數

○化毒丸

片腦　射香各五分　硇砂　硃砂

雄黃各二錢　輕粉十录　蟾蜍二十枚洗去土

右爲細末新取蟾酥爲丸如菉豆大每用一丸放於舌上取涎而愈

○獨蟾丸　附取蟾酥法　蝦蟇一本

拿取活蟾即大壯蝦蟇通身有傀儡者居名癩疙麻又名風雞大者重五六兩不拘幾箇捉住後脚以大桑葉或油單紙包掩其頭用鉄釘一箇括取屑間白汁濺於葉上凝結如濕真粉就丸如菉豆大一蟾或作一丸多者作二丸懸當風處陰乾如患疔腫者即以一二丸置舌尖上仰臥片時其苦水滿口就以此水嚥下或以鈹鍼刺開疔腫頭上納藥一丸於中外以薄皮紙貼護之勿令藥脫落背癰及一切癰腫初起時亦可依此法治之神效已上取蟾酥法切防濺入眼入人眼即瞎

○雄射湯解疔毒如神凡解毒不可無雄黃硃砂

雄黃另研　硃砂另研各一錢　真菉豆粉二錢　射香另研

乳香另研各一錢　白芷　茜草根　地丁草各二錢

牡蠣　姜蚕　牛旁子炒　大黃

金銀花　青木香　梔子　荊芥穗

朴硝　甘草各一錢　胡桃二箇去殼膜

右以白芷以後一十四味細切用無灰酒一碗浸少時擂細又加水一碗同煎至一碗去柤及濁脚入前雄黃等五味調勻作一服更審患處經絡分野依東垣引經瀉火藥加之尤妙欲利倍加大黃朴硝二味臨後下○茜草即過山龍地疔即大薊也一云剪刀草開黃花者名黃花地丁開紫花者名紫花地疔

○二活散

羌活　獨活　當歸　烏藥

赤芍藥　金銀花酒洗　連翹　天花粉

甘草節　白芷各四錢半　紅花　蘇木

荆芥　蟬蛻　乾葛各三錢　檀香二錢

右為細末每服三錢煎蒼耳湯調下

○取疔散

雄黃　硇砂　蟾酥　信石各一錢

巴豆十粒　輕粉十錢

右將疔四畔用針刺破醋調塗付疔落後用長肉拔毒膏藥貼之

○解毒丸

白芷十兩　木香五兩　蘿蔔子去殼醋浸炒另研細末杵四兩

貫衆取新者去皮切晒乾杵末秤四兩　朴硝四兩　硇砂一錢六分

京墨八錢各另研

右和勻糯米糊丸如龍眼大青代為衣陰乾每服一丸

無灰酒磨化下

○賀藍先生解毒丸解諸藥毒及山嵐瘴氣災牛馬猪羊肉毒

魚腥麪菜毒暑熱濕毒傷寒濕毒小兒斑疹喉痺急証紅

赤癰腫及諸般無名腫毒

黃柏　貫衆　茯苓　藍根

葛根　生地黃　雄黑豆　甘草

滑石　宿砂　陰地蕨　波茜各三兩

益智　大黃　寒水石　紫河車即金線重樓

馬勃　草龍胆　姜蚕炒　百藥煎

山枝子各一两

右為細末煉蜜丸每一两分作十丸細嚼新汲水送下小兒驚風菠苛汁下蜜水浸蒸餅為丸亦可或加黄連白芷

○萬病解毒丸

射干　文蛤即五倍子　杏仁　石膏

續随子去殼去油　蚕沐即金線重樓　土硃　大戟

山豆根　山茨菰　白藥子　大黄酒蒸各二两

射香二錢　青代　威灵仙　白芷各一两

黄連　風化硝各半两

右為末糯米糊為丸如彈子大青代活石細研為衣陰

乾此藥解一切毒蠱毒鼠莽毒河豚毒魚毒菌毒疫死牛馬肉毒喉痺骨鯁竹木刺毒並用急流水磨下雁疽發背疔腫瘡瘍毒蛇犬咬蜈蚣蜂蝎蠶毒刀斧湯火傷並用井花水磨下併塗傷處婦人鬼胎惡氣積塊虫積心胷痞滿肚腹膨脹並用好酒磨下

○千金漏芦湯治疔腫神効

漏芦　連翹　黄芩　白歛

枳壳　升麻　麻黄去根節　朴硝各一兩另研

大黄　地丁　金銀花各半兩

右除朴硝外為細末後入硝和匀每服三錢水一盞生姜三片薄荷三葉煎至七分空心温服利下恶物止藥

○取疔腫方

青木香根五錢 木香 雄黃 甘草各一錢

右為末湯調下以利去毒氣四五行即愈

○破毒散

信石 硇砂 黃丹 雄黃

乳香各一字 班猫五箇去翅足炒 射香少許

右為末取新蟾酥和丸如菉豆大以鈹針破開疔頭納藥一丸在內外以膏藥護之如無蟾酥加麪糊些少

○灸法以大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度如不爆稍難愈宜多灸百餘壯無不愈者

○祖傳經驗秘方治食炙牛馬肉成疔腫欲死者以柏油木柒搗絞取真汁一二碗頭服之得大瀉毒氣而愈如冬月無葉時取嫩根研水服之亦效未利再服以利為度

諸瘡方法

○活魂丹治一切惡瘡大有神效

血竭　乳香　沒藥　銅綠

枯白礬　黃丹　穿山甲煨脾一錢　輕粉

蟾酥各五分　射香少許

右為細末用蝸牛搗膏為丸如菉豆大每服一丸重者二丸又用葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下食前服

○又方用真姜蚕蟬蛻二味等分為末香油調付拔疔効

○治諸般惡瘡

經霜芭蕉葉為末香油調付先用忍冬藤葱椒蒼耳草煎湯洗瘡淨挹乾付藥外以油紙掩之

又方治諸般惡瘡用松木上白蠔泥黃丹各等分炒黑香油

調付用油紙夾上日易後用龍骨沒藥斂瘡口收肉

○又方治惡瘡用黃丹入香油煎入朴硝抹之

○天泡瘡服防風通聖散及用蚯蚓糞炒蜜調付之從肚皮上起者裏熱發外還用通聖散藥炒

○又方治天泡瘡用野菊花束木根煎湯洗黃栢滑石末付

○治脚上沙瘡清水出者用紫燕窠泥畧炒黃栢二味共為末香油調付

○治臁瘡用白膠香一兩黃栢石膏各一兩青代五錢龍骨半錢為末香油調付

○又治臁瘡方以香油一兩入胎髮如梅大煎焦烊去柤入白膠香黃蠟各一兩烊化入生龍骨赤石脂血竭炒各一兩攪勻候冷磁器盛捏作薄片貼瘡上外以竹箬包之三日

後番過藥再貼以活血藥煎湯洗之

○又治臁瘡方用箭箬剪去兩頭以黃栢煑汁令稠和白膠香草麻子同搗成膏攤箬糙面折縛光面貼之先以清茶放温洗挹乾貼之

○又方治外臁脚瘡用電心黃土研極細入黃栢赤石脂黃丹各半兩輕粉乳香沒藥各一錢細研和勻以清油調如膏以油絹攤藥將絹面貼於瘡上外以油紙掩之札縛定縱痒不可開視數日後未愈再換藥緊縛直待結痂去藥先必以茶清洗瘡淨付藥

○桃花散治一切瘡生肌藥

白芨　白歛　黃栢　黃連

乳香另研　射香另研　黃丹各等分

右為細末摻於瘡上二三日生肌平滿如故

○治火燒及湯泡瘡用經霜桑葉焙乾燒存性為細末香油調付或乾付二三日結痂平復

○又方治火燒湯泡瘡時取黃蜀葵花以香油浸之其花日漸烊於油中以此油付瘡即愈或只收花焙乾為末香油調付亦妙

○下疳瘡用青代海蛤粉蜜陀僧黃連為末付之○又方以雞內金燒存性為末付之

○又方治下疳瘡用鳳凰退燒存性研極細香油調付外看瘡大小剪殼中白膜貼之須靜坐一日不動即結痂矣

○頭瘡用猪油二錢半生雄黃水銀各二錢五分和勻付之

○金絲瘡其狀如繩線巨細不一上下行至心即死可於瘡頭

且截經刺之以出血後嚼萍草根付之立愈

○手痴瘡用皂角枯礬輕粉黃連黃栢為末付之

○砂瘡用搨地藤燒灰付之

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥可施於資稟厚者若稟氣薄者宜於補中益氣湯中加苦寒藥也若血熱之人瘡痛宜四物湯加黃芩鼠粘子連翹在下加黃栢若肥人濕熱瘡痛宜防風羌活荊芥白芷蓋風能勝濕故也

○疥瘡併馬疥瘡用馬鞭草不犯鉄器搗取自然汁半盞飲尽十日內愈神效

○白廢風癬以小麥攤石上以鉄器燒紅壓出油搽之立效

○治風癬疙瘩用梓樹葉木綿子羯羊屎鼠屎盒瀝付之

○治癬瘡用浮萍末一兩蒼耳子蒼朮各二兩苦參一兩半香

附二錢半黃芩五錢水煎洗之

○身上虚痒用四物湯加黃芩煎調浮萍末一錢服

○又方治通身痒用凌霄花為末酒調服一錢

○秘傳一擦光治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡天火丹諸般惡瘡神效

蛇床子　苦參　蕪荑各一兩　雄黃半兩

枯凡一兩二錢　硫黃五錢　輕粉二錢　樟腦二錢

大風子五錢取肉　川椒五錢

右為細末生猪油調付

○又方治証如前兼小兒癩頭瘡治之

蛇床子一兩　雄黃五錢　硫黃一兩　枯凡二兩

大風子半兩取肉　川椒半兩　黃栢一兩　輕粉二錢另拌入

已上諸瘡方法皆試效錄驗者

外科精要

東垣

牛皮岸 薰牛皮煙岸也如無以香炉岸代之一兩

黃丹 一兩

右為細末生猪油調付

○凡先哲治癰疽要方俱採摭于後以備選用

○五香連翹湯治癰疽未成膿者服之可散但當看時令及資稟加減用之

乳香　木香　沉香　丁香

連翹　射干　升麻　木通

桑寄生　射香　獨活　大黃 各等分

右細切每服三錢水一大盞煎七分去柤溫服

○內托復煎散托裏健胃

地骨皮　黃芩　茯苓　芍藥

人參　黃芪　白术　桂心

甘草　防己　當歸各半兩　防風一兩

蒼术半斤

右細切先以蒼术用水五升煎至三升去术入前十二味再煎至三四盞取清汁作三四次終日飲之又煎蒼术粗如前再煎諸藥粗服之

○白芷升麻湯治手陽明經分臂上生癰左右寸部脉皆短得之俱弦按之洪緩有力此得之八風之變者

白芷一錢半　升麻　桔梗各一錢　甘草炙半錢

黃芪四錢　酒黃芩四錢　生黃芩三錢　紅花五分

右細切分二服水酒各一盞煎至一盞溫服

○托裏散治一切惡瘡發背疔腫便毒始發脉洪數弦緊腫甚

將作膿者三服消尽

大黃　牡蠣　瓜蔞根　皂角刺

朴硝　連翹各六分　金銀花　當歸各二錢

赤芍藥　黃芩各四分

右細切作一服水酒各一盞煎至一盞四分服

瘡瘍集

○又托裏散

黃芪　當歸　金銀花　甘草各等分

右細切每服一兩酒水合煎更詳部位各加引經藥尤妙

瘡瘍集

○烏金散治癰疽疔腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑陷如石堅四肢冷脉細或時昏冒譫語循衣煩渴危篤服此汗之即瘡起

蒼耳頭五月五日午時收拌　草烏頭　火麻頭大月收拌

木賊去節　蝦蟇頭　樺皮節酥炙　麻黃去根節

右晒乾各等分同入磁器內鹽泥固濟烈火煅從早至申時如黑煤色為度研為末每服二錢病重者三錢熱酒調下未汗再進一服如汗已乾却服解毒疎利之藥如修合此藥必選天時清明好日於靜室中合勿令雞犬猫畜及陰人孝子見之

○黃芪六一湯治癰疽發渴

黃芪六兩蜜炙　甘草一兩炙

右細切水煎不拘時服

○一方治一切瘡癤癰疽發背殊効亦能下瘀血

大黃三錢　甘草　辰砂　血竭各一錢

精要

右為細末酒調服

○內托護心散

乳香一兩　真蓽荳粉四兩一方用二兩

右為細末每服二三錢煎甘草湯或新汲水調下

瘡瘍集

○小五香湯

木香　沉香　乳香　藿香

連翹各二錢　射香研少許

右為細末每服二錢水一盞煎七分溫服

局方

○復元通氣散

當歸　穿山甲煨肝半兩　川芎　天花粉炒各一兩

青皮　陳皮各一兩　大黃　甘草

黑丑頭末各半兩

右為細末每服二錢溫酒調

○金銀白芷散

黃芪　當歸各一錢　梹榔　川芎各五分

甘草一錢　天花粉五分　乳香　沒藥各三分

皂角刺去尖東炒　金銀花各一錢半　防風三分　白芷一錢

右為細末分三服每服水酒各半盞煎連柤服

○正鉄穗散

貝母去心五兩　白芷　蒼耳草灰醋拌晒干各二兩

或加龍骨二錢尤妙

右為細末水調或香油調貼瘡上

○大鉄穗散

芙蓉　猪卷皮　木鱉子各四兩　白芷

黃栢　寒水石各二兩　大黃　紫荊皮各一兩

赤豆　白斂各二兩　白芨一兩　防風半兩

貝母二兩　真地青　羌活各一兩

右為細末涼水調圍癰四畔如肉脆去白芨白斂加生地黃地榆用芭蕉油調付熱甚者用三消散

○三消散退極熱証赤腫焮開者

朴硝　硇硝　大黃　梔子炒黑色

寒水石　南星各等分

右為末生地黃汁調塗貼芙蓉葉汁調亦可

瘡瘍集

○雲母膏治一切癰疽瘡癤折傷等証

蜀椒去目及閉口者微炒　白芷　沒藥

赤芍藥　肉桂　當歸　鹽花

菖蒲　麒麟竭　黃芪　白芨

芎藭　木香　龍胆草　白[illegible]

防風　厚朴　射香　桔梗

柴胡　松脂　人參　蒼朮

黃芩　乳香　附子　茯苓

良姜　合歡皮各五錢　硝石　甘草

雲母各四兩　栢葉　桑白皮　槐枝

柳枝　水銀以絹另包待膏成以手細彈鋪在上名養膏母

陳皮各二兩　清油四十兩　黃丹二十兩

右除雲母硝石麒麟竭乳香沒藥射香黃丹塩花八味另研外余藥並細切入油浸七日文火煎以柳枝不住手搽候匝沸乃下火沸定又上火如此者三次以藥黑

色為度去柤丹熬後入丹與八味末仍不住手以槐柳枝攪滴水中成珠不軟不硬為度磁器收貯候温將水銀彈上用時先刮去水銀或服或貼隨宜用之其功甚大也

○太乙膏治一切癰疽瘡癤貼之神効亦可內服須詳証經絡作湯使送下

玄參　白芷　當歸　肉桂

大黄　赤芍藥　生地黄酩一兩　黄丹

真麻油斤二

右細切入油浸夏三日冬十日春秋七日文火煎黑色去柤入黄丹再熬以槐柳枝不住手攪滴水中成珠不軟不硬磁器收貯

神異膏治諸般癰腫癤毒殊效

露蜂房有蜂巢多者佳一兩　玄參半兩　黃芪七錢半

金蛇退半兩用水鹽洗淨細乾　杏仁一兩去皮尖　黃丹五兩飛

香油十兩　乱髮如雞子大一塊无病壯年男子者佳皂水洗淨

右先將香油入乱髮於銚中文火熬候髮焦烊尽以杏仁投入候杏仁黑色用真綿濾出祖再將油入銚內然後下黃芪玄參二味文火熬一二時久住火候片時火力稍息旋入露蜂房蛇退二味以柳枝不住手攪慢火熬至紫黑色又再用綿濾過去柤入爐中文武火熬下丹急攪千餘轉滴水中成珠子膏即成矣冬月畧嫩些夏月畧硬些磁器盛貯隨意攤貼

○萬槌青雲膏治諸般癰腫未成膿者貼散已成膿者拔毒

膿腹中瘡塊上瘡疾貼大椎及身柱其效如神

白松香一斤去木胥　草麻子三百粒去殼

杏仁三百粒去殼　銅青三兩　乳香一兩半　沒藥一兩半

輕粉二錢

右共作一處用鐵槌木砧於日中搗成膏如燥少加香油杵之或用石臼木杵搗亦可用磁器盛紙帛攤貼湯中煮不見火

○一方治背癰附骨疽乳癰及一切癰腫未成膿者發散極效

槐花一兩炒焦色　胡桃十箇新鮮不油者連殼燒火煨熟去殼

右二味於沙盆內研爛如泥熱酒調和相溫服如飲酒人多飲愈效一醉後而癰腫散矣

○蒺藜散治癰疽發背及一切瘡毒等証效如神

豨薟草 其葉長如牛舌其氣如猪臭者 小薊根

五瓜龍 即五葉藤 生大蒜

右四味各等分細研用酒和勻濾去柤服一碗得大汗通身而愈

○又方治諸般癰腫神效 已上並祖傳方

新掘天門冬一味約三五两洗淨入沙盆内研細以好酒盪起濾去柤頓服未效再服一二服必愈

癘風 癘與癩通六十一

論

內經曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癩風又曰癩者因菜衛熱腐其氣不清故使其鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰厲風丹溪曰是受天地開殺物之風故也然近見病此者原其所由多是熱血得寒所致或夏月勞甚而入寒泉澡浴或冬月酒後而乃踢冰履霜及入水取魚由是濕熱鬱于內而不散風寒客于外而不行內外怫鬱既久而慚成肌內之敗腐矣經所謂熱勝則肉腐是也大抵此証肺歸重於手足陽明之經蓋手足陽明者胃與大腸主之脾肺二經之府也脾主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也經又曰腸胃為市無物不受無物不包故其

熱毒積于中而形於外耳故治法必先取陽明而後及於太陰亦本而標之之兼也又濕热甚必生風七甚則生虫如腐草為螢之類又治法必先殺其虫瀉其火然後生血凉血祛風導滯降陽升陰皆為治之急務也治雖多門大畧不越乎此也學者詳之

脉法

脉两寸浮而緊　或浮而洪　陽脉浮弦陰脉實大

脉浮緩者易治　洪大而数者難愈　沉實者難愈

脉溢者病在上　脉浮者病在下皆為不治之証也

方法 丹溪方法九五條

丹溪曰大風病是受天地間殺物之風古人謂之厲風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之分在上在下氣受之則在上

血受之則在下氣血俱受則在上復在下然皆不外乎陽明一經陽明者胃與大腸也無物不受治之者須致意看其疣瘡與瘡上体先見者多者在上也下体先見者多者在下也在上者以醉仙散取涎血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物至積於穀道中出後用防風通聖散調之更用三稜針於委中出血夫上下同得者甚重自非醫者神手病者鐵心罕能免此夫從上或從下以漸而來者皆是可治之證人見其病勢之緩多忽之以法治之雖已全愈若不絕味斷飲皆不免再發而終於不救也予治五人矣其不死者惟一婦人因貪甚無物可食耳余皆三四年後再發孫真人云嘗治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋無一人能守禁忌耳其婦於本病外又

服百餘貼加減四物湯半年之上月經行十分安愈

○醉仙散須量人大小虛實與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得完復與此藥須斷塩醬醋諸魚椒菓煎炒燒炙等物止可淡粥及淡煮熟時菜雖茄亦不可食惟烏梢蛇菜花蛇淡酒蒸熟食之可以助藥力也

○外科精要為諸瘡立法而不及癘風盖風為百病之長以其殘害膚体去死不遠一有染此鮮能免者比之瘡瘍治法為難乃不言及夫八方之風起因於八方應其時則物生違其時則殺物人之稟受有殺氣者則感而受之如持虛受物後又因起居飲食男女游成鬱氣二氣積于厥躬脾先受之乃為濕病濕積之久火氣出焉火氣滋蔓氣濁血污一云血熱凝結其氣不清化生諸虫以次傳歷臟府必死之病而有

可生之理其始病者胃氣微傷脾主肌肉流行甚緩傳變以漸或可藉医藥之功而免謂之必死非惟医不知藥悉是不能禁終可哀也夫

○近見粗工用藥佐以大風子油殊不知此藥性熱有燥痰之功而傷血至有病將愈而先失明者

○宋洞虛云大風有五黑色不治余皆可治虫食肝眉落食肺鼻崩食脾声啞食心足底穿膝虛腫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或痺或痛如針刺狀食身則皮痒如虫行自頭面來為順風自足起者為逆風多因感寒熱與痰濁雜氣而成治法先以雷公散（即再造散）下之以稀粥養半月勿妄動作勞後以醉仙散中間或吐或利不必怕怯但顋喉頭面腫吞不得下旋出惡水或齒縫中出臭水血絲或言不得或悶

而死難以飲食只以稀粥用管灌入或一旬或半月一月面漸白而安重者又與換肌散

○換肌散治大風年深不與者以致眉毛脫落鼻梁崩塌服此藥不踰月取効如神

黑花蛇　白花蛇皆蘄黃來者並用酒浸一宿　地龍去土各三兩

當歸　細辛　白芷　天麻

蔓荊子　威灵仙　荊芥穗　甘菊花

苦參　紫參　沙參　木賊

不灰木　炙甘草　白蒺藜　天門冬

赤芍藥　定風草按本草即天麻也今皆用野天麻即益母草未知可否再宜詳之

何首烏　石菖蒲　胡麻子　草烏頭去皮臍

蒼朮去皮水泔浸　川芎　木鱉子各兩

右為細末每服五錢温酒調下酒多為妙

○醉仙散

胡麻子　牛旁子　蔓荊子　枸杞子四味俱炒紫色

白疾藜　苦參　瓜蔞根　防風各五錢寶鑑前四味各一兩

右為細末每一兩半入輕粉一錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫内出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡臭屎為效

○通天再造散

鬱金半兩　皂角刺往生黑大者去尖　大黄炮各一兩

白丑頭末六錢半生半炒

右為末每服五錢日未出時以無灰酒調面東服之當

日必利下惡物或臭膿或虫如虫口黑色乃是多年赤色乃是近者數日後又進一服無虫積乃止

○愈風丹治癘疾手足麻木毛落眉脫遍身瘡疹皮膚瘙痒爬之成瘡及一切疥癬風疾皆效

苦參一斤研取頭末四兩　土桃蛇一條酒浸二三日去骨炙內日乾

烏稍蛇　白花蛇各一條並同上制

右爲細末以皂角一斤剉長寸許段無灰酒浸一宿去酒以新水一碗搓取濃汁去粗銀石器內熬膏和前末丸如梧桐子大每服六七十丸煎防風通聖散送下粥飯壓之日三服三日浴以大汗出爲應再三日又浴取大汗三浴乃安浴法見後條

○一法用桃柳桑槐楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日候

湯如油安矣○本草治惡疾遍身生瘡濃煎萍湯浴浸半日大效此神方也○又以荊芥穗大黃梔子蔚金地黃杜仲防風羌活獨活白蒺藜等分爲細末以大風子油入熟蜜丸如梧桐子大每服茶清送下四五十丸一日三服須守戒三五年日誦觀音千萬声以攝其心禁其慾乃安也

○一法以苦參五斤好酒三斗漬一月每服一合日三服常與不絕瓷脾既安細末服之亦良尤治癮疹方出圖經陶隱居以酒漬飲治惡瘡久服輕身日華子以爲殺虫本草除伏熱養肝膽氣予常以蒼耳葉爲君以此物爲佐更以酒煮烏蠡魚代補蛇之或缺研細糊丸如梧桐子大每服五六十丸加至七八十丸熱茶清送下日三服一二月而安

君入紫萍尤捷紫萍多水蛭須寒月於山沼取之淨洗去

已上皆丹溪法

泥畧蒸透乾用

○一法治手指弯曲節間痛甚漸至斬落用草麻子去殼黃連剉如豌豆大各一兩水一升小瓶浸春夏三日秋冬五日取草麻瓶破平旦時面東以浸藥水服一粒漸加至四五粒微利不妨忌猪肉魚腥宜茹淡累獲神效

○一法先服加減通聖散大瀉惡毒穢積又用三稜針看肉黑處及委中紫脉刺出死血不可令出太過恐損真氣後服神仙紫花丸

防風五錢去芦　連翹三錢去蒂　川芎五錢　白芍藥三錢

當歸三錢酒浸洗　薄荷二錢　荊芥穗五錢　麻黃三錢去根節湯泡

梔子三錢去殼　桔梗五錢　枳殼去穰麩炒　石膏各五錢

甘草三錢　滑活石三錢　黃芩三錢去朽　紫胡五錢

外錄試驗方

黃連五錢　黃栢三錢　生地黃三錢半酒　羌活五錢

熟地黃三錢半酒　錦大黃六兩　芒硝一兩

皂角刺一兩獨生者去尖

右細切分八服每服用水一碗半煎至一碗空心服日進二服五六日後又進二服待補養完又行二次然後服後丸藥

○神仙紫苍丸治癘風及諸般惡瘡風瘡其效如神但要藥真無有不效者輕者一料可愈重者二三料除根

白花蛇一具出蘄黃州黑質白絞龍頭虎口背上二十四箇方勝花尾尖有一佛指甲新鮮者佳蛀腐者不堪用去頭尾各四五寸許一兩為率連皮骨用一兩半

何首烏　荊芥穗　威灵仙各四錢　麻黃連根節二錢

胡麻子一錢　蛇床子二錢

右六味細切同蛇用無灰酒一大碗浸一宿去蛇皮骨通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度待晒極乾共為細末另包

木香　沉香各二錢半　人參一兩　當歸七錢半

胡

明天麻　猪牙皂角各五錢　射香一錢半鼻塞声重者倍之　乳香　沒藥各一錢　明雄黃

辰砂各五分大塊者佳　肉荳蔻一枚煨　定風草二錢半即天麻

還瞳子即草决明一兩

右射至辰砂五味各另研極細不見火其餘草木味亦另研細羅過連前五味和勻另包

防風去芦　羌活　甘草　細辛

川芎　獨活　蒼朮米泔浸一宿　批把葉去筋毛焙干

白芍藥　白蒺藜　金銀花　五加皮

香白芷　苦參各五錢　胡麻子　白附子米泔浸晒

麻黃　川牛膝　草烏頭米泔浸炮　川烏米泔浸炮

石菖蒲各二錢半

右為細末另包

捻合法治用大風子三斤新者佳發油黃色者不堪用去殼以磁罐一箇盛之火入無灰酒以皮紙竹箬重七包口勿令泄氣頓滚湯中勿令沒罐口外以物蓋鍋口密封固文武火蒸候黑爛為度拆無香滓成油分作三分每一分入第二號藥八錢重第一號藥六錢重第三號藥一兩五錢重和勻加糯米飯搗極膠粘如梧桐子大晒乾勿見火每服二十丸漸加至五六十丸雞鳴時午時臨臥時各一服茶清送下忌房

勞醎酸酒醋糟滓猪羊雞馬驢肉魚腥煎煿水菓五辛姜椒大料辛辣热物蕎麥菉荳之類若不忌口斷慾則藥無功雖愈再發其余肉味病愈後一年可食但猪羊雞肉終身用忌此法乃治癩之神方也不可輕忽

跌傷方法

○治跌撲損傷用蘇木以活血黃連以降火白朮以和中童便煎為妙在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲悲汁或和粥吃切不可飲冷水盖血得寒則凝但一絲血入心即死

○骨損者用古文錢五分醋浸乳香浸藥各一錢酒研服或用接骨散

○无戒接骨丹

沒藥　乳香　當歸　川椒

自然銅火煅醋淬　赤芍藥　骨碎補酒炙　敗龜板酥炙

虎脛骨　白芷　千金藤即郁李仁已上各等分

右為細末化蠟五錢丸如彈子大每服一丸好酒半升化開煎用向東南柳枝攪散熱服○一方加龍骨川芎

○凡治損傷妙在補氣血倍工不知惟在速効多用自然銅以接骨然此藥必煅煉方可服新出火者其火毒與金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍戒之戒之

○治金瘡急以石灰厚傅裹之如瘡深不宜速合者加滑石末付之

○又方老杉木皮為末付之

○凡跌蹼損傷腰痛者知有瘀血用桃仁承氣湯加蘇木紅花下之

東垣

○當歸導滯湯治跌蹼損傷瘀滯不行等証

大黃　當歸在上用頭在中用身在下用尾並身痛者全用酒浸洗焙干

右細切等分每服一兩重酒煎服

大成方

○雞鳴散治從高墜下及木石所壓一切損傷瘀血凝積痛不可忍並以此藥推陳致新

大黃一兩　杏仁二十一粒去皮尖另研

右研為末酒大碗煎七分濾去柤雞鳴時服至曉必取下瘀血即愈愚按此方用杏仁而不用桃仁者蓋跌刃血入氣分故用杏仁以行氣中之血矣

河間

○沒藥乳香散治跌蹼損傷痛不可忍

白术炒五兩　當歸焙　玄草炙　白芷

沒藥另研各一兩半　肉桂去皮　乳香另研各一兩

右為末和勻再研極細每服二錢溫酒調下

○杖丹膏藥方治受杖責後如死血瘀腫宜先刺出惡血然後以此膏貼之三四日平復或早失調理成癰者貼之即散

又治諸般癰疽瘡癤毒已潰未潰貼之無不神效

甘草　肉桂　蛇蛻　蟬蛻

露蜂房　連翹　白芷　白芨

白斂　白朮　蒼朮　人參

玄參　苦參　乾漆　南星

升麻　厚朴　梔子　百合

金銀花　天花粉　川歸　川芎

穿山甲炮熟末　羌活　獨活　黃連

黃芩　黃栢　大黃　生地黃

紅花　蘇木　柴胡　鱉甲酥炙為末

青木香　何首烏　防風　荊芥穗

藿香　雲母石　花蕊石各一兩　亂髮壯年無病男子者一

塊　乾蟾一隻即風雞　鳳凰胎一隻即兗中不轉頭月雞黃也陰干用

桃柳桑枝各五莖

右各細切用香油六斤重浸藥三五日入鍋內熬色去

粗入黃丹三斤別用槐柳枝不住手攪膏成候溫入後

藥末

乳香　沒藥　龍骨各一兩　輕粉五錢

血竭一兩　射香二錢

右攪勻磁器收貯臨期看瘡大小攤貼

○沒藥散治刀箭傷止血住痛

定粉　風化石灰各一兩　枯白礬二錢另研

乳香五分另研　沒藥一字另研

右各研為細末同和勻再研乾摻之

破傷風 六十二

論

內經曰風者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也若夫破傷風証因事擊破皮肉往往視為尋常殊不知風邪乘虛而客襲之漸而变為惡候又諸諸久不合口風邪亦能內襲或用湯淋洗或着艾焚灸其湯火之毒氣亦與破傷風邪無異其為証也皆能傳緒經絡燒爍真氣是以寒熱間作甚則口噤目斜身体強直如角弓反張之狀死在旦夕誠可哀憫治之之法當同傷寒處治因其有在表在裏半表半裏三者之不同故不離乎汗下和三法也是故在表汗之在裏者下之在表裏之間者宜和解之又不可過其法也間間野人多不識此証殺人之易早不求醫治療而

袖手待斃哀哉

脉法

表脉浮而無力太陽也　脉長有力陽明也

脉浮而弦小者少陽也

河間曰太陽宜汗陽明宜下少陽宜和解若能明此三法而治不中病者未之有也愚按河間先生論破傷風脉証詳明甚矣何其但云三陽而不及於三陰蓋風邪在於三陽之經便宜按法早治而愈若得傳入三陰其証已危或腹滿自利口躁咽乾舌卷卵縮皆無可生之証故置而弗論也

方法

丹溪曰破傷風同傷寒壞証治看在何經而用本經藥驅逐之誤則殺人劉河間有法有方宜選而用之

河間○羌活防風湯治破傷風邪初傳在表

羌活　防風　川芎　藁本
當歸　芍藥各一錢　甘草　地榆
細辛各五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去柤熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則加大黃一錢大便秘只加大黃五分緩緩令遍

○白术防風湯若服前藥太過令自汗者宜服此藥

白术一錢　防風二錢　黃芪一錢半

右細切作一服水一盞半煎至一盞温服不拘時藏府和而有自汗可用此藥破傷風藏府秘小便赤自汗不止者因服熱藥汗出不休者故知無寒也宜速下之先用小芎黃湯二三服後用大芎黃湯下之

河間

○小芎黃湯

川芎二錢　黃芩一錢半　甘草五分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候三服即止再用後藥

河間

○大芎黃湯

川芎一錢　羌活　黃芩　大黃各一錢半

右細切作一服水一盞溫服宜和為度

河間

○發表雄黃散

雄黃一錢　防風二錢　草烏一錢

右為細末每服一字溫酒調下裹和至愈可服裹未和不可服

河間

○大蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一條　江漂五錢即魚膠炒　鰾

左蟠龍五錢炒烟盡為度即歸藏囊

右為細末每服一錢清酒調下治法依前用裏和至愈可服但有裏証不可服次當下之用蜈蚣散四錢巴豆霜半錢飯丸而菉豆大每服一丸漸加至六七丸清酒調蜈蚣散少許送下宜利為度內外風去可服羌活湯緩緩而治不拘時候服之羌活湯者治半在表半在裏之藥也

○大羌活湯

羌活　菊花　麻黃　川芎

石膏　防風　前胡　黃芩

細辛　甘草　枳殼　白茯苓

蔓荊子各四分 薄荷 白芷各二分

右細切作一服入生姜五片水一盞半煎至一盞稍熱

服不拘時日進二服

○防風湯治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜服此藥

防風 羌活 獨活 川芎各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○小蜈蚣散

蜈蚣黃赤足各一条 江漂三錢

右爲細末用防風湯調下如前藥解表不已煮轉入裏

當服左龍丸漸漸看大便硬軟如巴豆霜服之

○左龍丸

左蟠龍五錢炒 白殭蚕五錢炒 江漂半兩 雄黃一錢

右同爲細末飲丸如梧桐子大每服十五丸温酒下如裏証不已當於左龍丸末一半内入巴豆霜半錢餘丸如梧桐子大每服一丸漸加至以利爲度若利後更服後藥若搐痙不已亦宜服後藥羌活湯也

○小羌活湯

羌活　獨活　防風　地榆各一錢二分

右細切作一服水一盞半煎至一盞温服如有熱加黄芩有痰加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血爲度

○養血當歸地黄湯

當歸　地黄　芍藥　川芎

藁本　防風　白芷各一錢　細辛半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞服

河間

○雄黃散治表藥

南星三錢　半夏五錢　天麻五錢　雄黃二錢半

右為細末每服一錢溫酒調下如有涎於此藥中加大黃為下藥

河間

○地榆防風散治破傷風中風半在表半在裏頭微汗身無汗不可發汗宜以表裏治之

地榆　防風　地丁香　馬齒莧各等分

右為細末每服三錢溫米飲調下

河間

○白木湯治破傷風大汗不止筋牽手足搐搦

白木　葛根各二錢　升麻　黃芩各二錢

芍藥四錢　甘草半錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服不拘時候

○江鰾丸治破傷風驚悸發搐藏府秘澁知病在裏宜以此藥下之

江鰾半兩炒　野鴿糞半兩炒　雄黃一錢　白殭蚕半兩炒

蜈蚣一對黃赤足　天麻半錢

右為細末分作三分用二分以燒飯為丸如梧桐子大

硃砂為衣用一分入巴豆霜一錢同和亦以燒飯為丸

如梧桐子大不用硃砂為衣每服以前硃砂衣丸子二

十丸巴豆霜丸一丸第二服二丸加至利為度再單服

硃砂衣丸子病愈止藥

○祖傳經驗秘方治初破傷風發熱紅腫風邪將欲傳播經絡

而未入深者藥

杏仁去皮研細　羅白麪各等分

右以二味和勻用新汲水調和如膏付傷處腫消熱退

○一方治破傷風發熱用蟬蛻炒研細酒調一錢七服效

○安文陳珎四兄因勸鬬毆眉稜骨被打破得破傷風頭面大腫發熱予適在彼家以九味羌活湯服取汗外用杏仁搗爛入白麪少許新汲水調付瘡上腫消熱退而愈後以此法治若干人皆驗

○附翻花瘡一名綿花瘡一名廣東瘡

川芎　天花分各五米錢　輕粉二錢半　佳黃　辰砂一錢二分半　各

射香五分　右為細末蒸餅丸如菉豆大每服八分溫酒下日三服

○一方無川芎天花粉二味亦效

新編醫學正傳之六終