

醫

學

綱

目

醫學綱目卷之十五

肝膽部

頭風痛

產頭痛

偏頭痛

雷頭痛

大頭痛

眉痛

頭重

頭風屑

頭痛

四頭痛

多主於痰痛甚者火多有可吐者亦有可下者

火

金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣

東垣天

者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目

內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少

陽膽之脈起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從

上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重

惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之

則愈此傷寒頭痛也

治法見傷寒論

頭痛耳鳴九竅不利者腸胃

之所生乃氣虛頭痛也

治法見氣虛條

如氣上不下頭痛顛疾者

下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也

治法

見寒有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦  
濕餘有厥逆頭痛齒亦痛治見寒餘有心煩頭痛者病在膈中過在  
手巨陽少陰乃濕熱頭痛也治見寒餘

頭痛分三陰三陽陽陰

諸血虛頭痛當歸川芎主之 諸氣虛頭痛人參黃芪主

之 主者主治也兼見何證以佐使藥治之此立方之大法

也 血氣俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子細

辛其効如神 諸濕厥頭痛清空膏主之即風濕熱頭痛也方見濕氣條

諸痰厥頭痛半夏白朮天麻湯主之方見脾土條 諸厥逆

頭痛羌活附子湯主之方見寒條 如濕熱在頭者以苦吐之

不可執方而治方見實條

三陽散  
頭寒之

三陽頭痛

羌活

防風

荊芥

升麻

葛根

白芷

柴胡

川芎

芍藥

細辛

蔥白

連翹分兩  
旋加

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類也

凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高巖之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦

有三陰三陽之異太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨

活之類為主少陽經頭痛脈弦細往來寒熱柴胡黃芩

主之陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升

麻葛根石膏白芷主之太陰經頭痛必有痰體重或腹

痛為痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之少陰經頭痛

三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脈沉細麻黃

附子細辛湯主之厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其

脈浮緩吳茱萸湯主之方見傷寒

三陰燥而溫之

清空膏治偏正頭痛年深不愈者及療風濕熱頭痛上壅損目及腦痛年深不止

羌活

防風各一兩

柴胡七錢

川芎五錢

甘草

炙一兩半

黃連炒一兩

黃芩

三兩一半酒製一半炒

右爲細末每服二錢熱蓋內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯送下臨臥如苦頭痛每服中加細辛二錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛加羌活防風川芎甘草又加半夏一兩半如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴正陽明頭痛只與白虎湯加白芷

濕熱宜清之

東垣云諸濕熱頭痛清空膏主之丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂頭顛痛也

四小清空膏治諸般頭痛惟血虛頭痛不治用片苓細切酒拌勻晒乾爲末茶清調下酒亦可

五清上瀉火湯昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見烟火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活

三錢

防風

七分

升麻

七分

柴胡

五分

藜蘆

半錢

細辛

少許

川芎

二分

荆芥

二分

蒼朮

三分

蔓荊子

二分

黃芩

酒製一分

黃連

酒製半錢

黃栢

酒製一錢

甘草

五分

知母

酒製一錢半

當歸

三分

生地

半錢

黃芪

一錢

紅花

少許

右剉如麻荳大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣

稍熱服食遠

補氣湯服前藥之後服此藥

黃芪

八分

甘草

炙

歸身

各二錢

柴胡

升麻

各二分

細辛

許少

麻黃

炒

苦丁香

各半錢

水煎服

安神散治頭旋眼黑頭痛

羌活

兩一

防風

二錢半

柴胡

五錢

升麻

五分

酒黃柏

兩一

酒知母

半錢

酒生地

兩半

黃芪

兩一

甘草

炙三錢

生甘草

三錢

右咬咀每服半兩水二大盞煎至一盞半加蔓荊子半

錢川芎三分再煎至一盞臨臥去查熱服

右東垣丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒苓酒連酒柏加

風劑也

川芎散治頭風偏正頭痛昏眩

川芎

細辛

羌活

槐花

甘草炙

香附子

石膏炙半兩

荊芥

薄荷

菊花

防風

茵陳各一兩

右爲細末每服二錢食後茶清調下日三服

石膏散治頭疼不可忍

麻黃去根

石膏各一兩

何首烏半兩

葛根七錢半

右爲細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服

石膏散治頭疼

川芎

石膏亂紋

白芷研者

右各等分爲細末每服四錢熱茶清調下

荊芥散治頭風王太醫方

荊芥

石膏煨存性

右爲細末每服二錢薑三片蔥白三寸和鬚使水一盞



煎至七分食後服

治丈夫婦人風虛頭疼氣虛頭疼婦人胎前產後傷風頭疼一切頭疼並皆治之

茵陳

揀淨

麻黃

石膏

煨存性  
各二兩

右爲末每服一錢酒茶調下食後服服畢仰臥霎時

寒濕

玉真丸治腎氣不足氣逆上行頭疼不可忍謂之腎厥其脈舉之則弦按之則堅

硫黃

二兩

石膏

煨通

半夏

湯洗

硝石

研各一兩

右爲細末研勻生薑汁糊爲丸如桐子大陰乾每服二十九薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾乳粉一兩

新出則  
明前用  
帶

素問云頭疼巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入

肝下虛者腎虛也故腎虛則頭痛上虛者肝虛也故肝虛則頭暈徇蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暈之狀也故肝厥頭暈腎厥頭痛不同如此治肝厥釣藤散見厥門

神妙丸治頭疼及腦風

食鹽

硫黃各等分

右爲末水調生麪爲丸如桐子大每服十五丸用薄荷茶食前下荆芥酒亦得

**附** 孫兆口訣治頭疼附子炮石膏煨等分爲末入腦麝少許酒茶下半錢妙

右硫附中加石膏之劑

治頭風如神附子一枚生去皮臍用菴葶一合同煮葶熟爲度去附子只喫葶立立瘥每附子一枚可煮五次後末服之修真秘要

**本**治氣虛頭疼用大附子一枚剝去心入全蝎二箇在內取前附子末同鍾乳一分麪少許水和裹炮熟却研爲末以焦黃爲度蔥茶調下一錢或半錢

又方用大附子

一枚和皮  
躑生爲末

大川芎

一箇剝  
作四片

以水和附子末如麪劑裹川芎作四處如附子末少入少麪裹畢以針穿數孔子用真腦射薰其穴內覺附香再捻合穴子如未覺內有香卽再薰一炷細羅成灰用銚子內熟灰炮熟末之每服半錢蔥茶調下不拘時候

右酒醫揚吉  
老二方神効

右附子純熱例

大寒犯  
腦頭痛  
齒亦痛

**帝**曰人有病頭痛數歲不已此安得之名爲何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆奇病論

腦風出奇病論中  
羌活附子湯治冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰

防風

分二

黃芪

錢一

麻黃

錢一

蒼朮

錢半

升麻

分二

甘草

分二

黑附子

分一

羌活

錢半

白芷

白僵蚕

黃柏

各三分

右咬咀水煎去渣溫服食後若有寒噉加佛耳草三分  
川芎神功散治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新並  
皆治之

川芎

兩一

甘草

錢二半

川烏

生去皮臍

白芷

天南星

麻黃

去根各半兩

右爲末每服三錢水二盞生薑三片煎至七分投清酒  
半盞和查溫服密室避風如人行五七里再服汗出爲  
度其病立愈

救苦神白散治男子婦人偏正頭痛眉骨兩太陽穴痛及  
熱上攻頭目赤赤不已項筋拘急耳作蟬鳴

川芎

甘草炙各八錢

甘松去土

赤芍藥

白芷

兩頭尖

川烏頭去皮臍各六錢

右為細末每服二錢溫茶調下服藥後飲熟水半盞

**黑**治一切頭疼黑龍丸

天南星洗

川烏各半斤黑豈并蒸三次

石膏半兩

麻黃

薄荷各四兩

藜蘆

白芷各二兩

京墨兩半

右為細末煉蜜杵丸彈子大每服一九薄荷茶湯調下

治傷寒頭疼太陽頭疼及一切頭疼

川烏炮

草烏各半兩

麻黃

川芎

防風

羌活各一兩半

地龍去土

全蝎一箇

雄黃三錢

右爲細末，每服半錢，食後茶清調下。

**國**麻黃 吳茱萸 煎湯 治頭痛 胸中痛 食減少 咽噎不利 寒入脈左寸弦急

麻黃半錢

吳茱萸三分

黃芩二分

川烏一分

羌活五分

細辛少許

蔓荊子一分

藜蘆

柴胡

黃芪各二分

蒼朮錢一

黃連二分

半夏一分

黃柏

升麻各二分

紅花少許

當歸二分

右咬咀，作一服，水二大盞，煎至一盞，去渣，稍熱服，食後。

**國**東陽陳允，露筋骨，體稍長，患體虛而勞，頭痛甚，至有訣

別之言，予察其脈，弦大而帶數，以人參爲君，川芎陳皮爲

佐，至五六日，未減，衆皆訝之，以藥之不對也，予曰：藥力有

次第更少候一二宿當自安忽其季來問曰何不少加黃  
芪予不答又經一宿忽自言病頓愈予脈之覺指下稍盛  
又半日病者言胃上滿不覺飢視其腹紋已隱矣予曰藥  
中莫加黃芪否曰然止與三貼遂連與二陳湯加厚朴枳  
殼黃連以瀉其衛三貼而安

血虛

血虛頭痛自魚尾上攻頭痛必用川芎當歸湯有失後逆  
尾

**大**一奇散治血虛頭痛神效即芎歸湯也方見前頭痛條又方用川芎

半兩為末每服二錢臘茶調下甚効曾有產後頭痛者一

服即愈

**外**治頭痛欲裂當歸一兩酒一升煮取六合飲至醉効

氣虛  
**藥**頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也通評虛實論○東

也用人參黃芪主之

氣虛頭痛治驗 參謀栢仲實年六十一歲二月間患

頭痛不可忍晝夜不得眠邀性視之其人云近在燕京患  
頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加後汗解病轉  
加而頭愈痛遂歸每召醫用藥雷同到今病甚不得安臥  
惡風寒而不喜飲食診其脈弦細而微氣短而促懶言語  
內經曰春氣者病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面  
故昏悶此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不  
能上榮亦不能外固所以頭苦痛而惡風寒不喜飲食氣  
短弱宜升陽補氣頭痛自愈名之曰順氣和中湯

黃芪

半錢

人參

錢一

白朮

分五

陳皮

分三

當歸

分五

芍藥

分五

甘草

分二

升麻

分三

蔓荊子

分二

柴胡

分三

川芎

分二

細辛

分二

內經曰陽氣者衛外而為固也今年高氣弱又加發汗



衛外之氣愈損故黃芪甘溫補衛實表爲君人參甘溫  
當歸辛溫補氣補血芍藥味酸收衛氣爲臣白朮陳皮  
炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理爲佐  
柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脈灌漑周  
身者也川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅爲使  
右件咬咀作一服水二盞煎至一盞去查溫服食後服  
之減半再服而愈

氣虛  
調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛治氣血俱虛頭痛方  
治法

膏

和膏黛散治頭風

猪牙皂角 玄胡索 青黛

右爲細末水調葢許鼻內灌之其涎自出先仰臥灌鼻  
俟喉中酸味卽起身涎出口咬銅錢一文任流下

**頭痛搐鼻取涎**

萹撥

川芎

薄荷

白芷

細辛各等分

爲末入猪膽內與汁拌勻陰乾再爲末用無根水爲丸如菘荳大青黛爲衣每一丸茶清化灌鼻中口噙銅錢三文其涎來如泉一方有玄胡索葉本青黛無薄荷細辛

**本**治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問年深日近尅日取效名透頂散

細辛

表白者三莖

瓜蒂七箇

丁香三粒

糯米七粒

腦子

麝香各一黑壹大

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻另自治爲末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻用瓦甌子盛之謹閉

觀口患人隨左右搖之一大荳許良久出涎一升許則

安、

濕熱在  
頭必吐  
之

東垣云濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之若用上項搖鼻藥而涎少者必兼下項吐法治之、

聖治痰厥頭痛以烏梅十箇取肉鹽二錢酒半盞合水煎至七分去渣非時溫服吐即住、

四頭痛難忍支風痰所致梔子末蜜和濃塗舌上吐即止

集  
兵部

頭痛非冷非風此膈有痰也濃煎茶啜一二升探吐之吐

而又吐候苦汁出乃止不損人待渴自止妙

外臺  
經要

子和茶調散瓜蒂好茶二味等分爲末每服二錢薑汁調下空心用之丹霞僧病頭痛常居暗室不敢見明其頭熱痛以布圍其巔上置冰於其中日易數次熱不能已諸

醫莫識其證求見戴人戴人曰此三陽畜熱故也乃置炭  
火於煖室中出汗涌吐三法併行七日方愈常仲明之  
子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一二次發必  
頭痛痛則擊數百拳出黃綠涎一二盞方愈此年發益頻  
目見黑花昏不知人三四日方省諸醫皆用南星半夏化  
痰之藥終無一效戴人以雙解散發汗以苦劑吐痰病去  
八九續以分劑平調自春至秋如此數次方獲全瘥

邪在胃  
必下之

邪在胃而頭痛者必下之其證必兼隔痞或動作則痛甚

或右手脈滑盛者是也治法並見脾胃條

東風生於春病在頭命在頸項全文五臟春氣者病在頭惡風

頭面多  
汗為首  
風

**新沐中風**為首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚  
至其風日則少愈大川芎丸主之治見諸  
風條

大川芎丸治首風旋暈弦急外合陽氣風寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘攣

川芎

一斤  
天麻四兩用  
鄆州者

右為末煉蜜丸每兩作十九每服一九細嚼茶酒下食後服

腦戶極  
李為腦  
風

風氣循風府而上則為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之

神聖散治腦風邪氣留飲不散項背怯寒頭痛不可忍者

麻黃

去節  
細辛

去苗  
乾葛

生炒  
生半  
藿香葉  
各等分

右為末每服二錢茶煎芥薄荷酒調下茶亦得并治血風證

又方治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多少於鼻中搐於痛處揉之相兼前藥可用也

頭痛  
最爲風  
痰

**世**頭疼連眼痛此風痰上攻須用白芷開之

兩前茶

川芎

白芷

防風

台烏

細辛

當歸

爲末湯調服

**世**偏正頭風川芎細辛防風白芷烏頭尖全蝎稍南星薑  
製麝香少許爲末每一字溫酒調服

**世**頭風方

羌活

細辛

川芎

乾葛

甘草

防風

半夏

右除川芎細辛二味外研爲末用酒和炒曬乾入川細  
二味末和勻每服一錢茶清調下

又方

荆芥

草烏尖片

防風

甘草

台芎

蔓荊子

桔梗

麻黃

右爲末茶調服。

治頭疼面赤煩悶咽乾上膈風痰頭目暈昏百節疼痛背項拘急芩辛丸。

川芎

防風

僵蚕

獨活

各一兩

桔梗

麻黃

細辛

白附子

羌活

甘草

薄荷

荆芥

各一兩半

右爲細末煉蜜丸如彈子大每服一粒茶酒吞下食後

微清膏

川芎

蔓荊子

細辛

藜木

各一錢

薄荷

生甘草

炙甘草

稍

半錢

右爲細末食後茶清調下一錢或半錢。

治頭目風荆芥穗細辛川芎等分爲末飯後湯點二錢

凡治頭痛皆用芩芷羌防辛等溫氣藥升散者由風木

風虛則  
無寒而  
痛且辛  
散之

風濕則  
踈後而  
去病宜  
救之

風濕痰

虛不能升散而土寡于畏得以壅塞而痛故用此助肝

木散其壅塞也若風盛踈散太過而痛服辛散藥反甚

者則宜用酸溢收而降之乃愈後乳香蓋落散是也

**乳香蓋落散**治男子婦人偏正頭疼不可忍大有神效

御米殼去蒂陳皮

甘草炙

桔梗去

柴胡去苗各一兩

右為細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長四指同煎

七分去查食後溫服

**半夏白朮天麻湯**治太陰痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩

亂方見

東垣先生壯歲病頭痛每發時兩頰青黃眩暈日不欲開

懶於言語身沉體重兀兀欲吐數日方過潔古老人曰此

厥陰太陰合而為病名曰風痰宜以局方王壺丸治之少



風濕藥二味可加雄黃白朮以治風濕更有水養金花丸  
更灸俠溪二穴各二七壯不旬日愈是知方者體也法者  
用也徒知體而不知用者弊體用不失可謂上工信矣哉

金花丸方  
見咳卷

**丹**徐舍人因作勞頭與目眶痛足冷身熱脈大而不甚數  
作勞瘵治之

半夏二錢

川芎

黃芩

白朮

陳皮一錢半

木通一錢

甘草少許

分二貼煎薑一片下保和丸三十九

**羅**茯苓半夏湯治風熱痰逆嘔吐或眩運頭痛

半夏三箇稍大者製赤茯苓一錢

陳皮一錢湯洗

黃芩一分

甘草一錢

右用水二鍾生薑三片煎一盞分三服作一日溫服無

時

丹 又治濕痰頭痛、

黃芩

酒炒  
三錢

蒼朮

酒炒  
一兩

川芎

細辛

各二錢

甘草

一錢

為末，搗生薑一片，和勻，茶清調服。

賈孺人脈沉有痰，頭痛。

川芎

一錢

澤瀉

酒炒  
一錢

白朮

半酒

煎下茯苓丸三十粒。

茯苓丸方  
見疾飲門

治偏正頭疼，併夾腦風，連兩太陽頭痛，以白僵蚕細研

為末，用蔥茶調服，方寸匕。

右濕痰頭痛，用半夏南星及酒朮酒芩燥其痰也。風痰

頭痛，用風藥餘者，並見風頭痛條。

陽明所謂客孫脈，則頭痛鼻鼾腹腫者，陽明并於上上

鼻鼾腹腫  
腫邪在

者則其孫絡太陰也故頭痛鼻齕腹腫也脈解篇

**醫**館職學士張居易嗜酒散誕不為名利拘束忽發熱頭  
疼俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫孫至脈  
之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多痰食所  
傷也今疾非傷寒而右手脈其數左手脈平和此必傷酒  
食而作頭痛宜喫食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂  
用食藥經食久膈漸寬頭痛遂減再進利膈藥遂獲安大  
凡陽邪頭疼經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒  
乃食病之過也

**四**胡孺人因喫冷粉與肉頭痛自汗膈痞小便赤

白朮二錢半 陳皮一錢半 木通 川芎

黃芩各半錢

薑水煎熟吞下草薺丸阿魏丸保和丸各五十粒

脈動作頭重痛熱氣潮者屬胃

謂胃有酒食及痰飲之類也

頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服。

右以酒炒大黃下頭痛蓋病在胃而頭痛者必下之方愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛詳見本條郭茂恂以黑龍丹下其嫂金華君產後汚血頭痛詳見產後頭痛皆下咽即安是也。

心火

心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰東垣清空膏之類

腎水

治之全文見治虛實後法頭痛顛病下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎頭痛全

見治虛實法

許學士謂之腎厥頭疼也用玉真丸治之東垣云此寒濕

頭痛氣上而不下也

玉真丸方見寒熱條

運氣

運氣頭痛有四

一曰火鬱於上而痛經云少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛又云少陽司天火淫所勝民病頭痛發熱惡寒而瘡治以寒劑爲君也

二曰寒氣逐熱氣上行而痛經云歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱又云太陽之勝熱反上行頭項頂顛腦戶中痛目如脫又云太陽之復心痛痞滿頭痛治以熱劑爲君也

三曰濕邪傷腎膀胱而痛經云太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛時眩又云太陰在泉濕淫所勝病衝頭痛目似脫項似拔又云太陰之復頭項痛重而掉懸尤甚亦治以熱劑爲君也

四曰陽明復氣兼非位之心病而痛經曰陽明之復欬噦

煩心病在膈中頭痛治以溫劑也。

雜方

**白芷散**治風頭痛搐鼻。

石膏二錢

薄荷三錢

芒硝二錢

鬱金

右細末口噙水搐鼻若症在太陽加羌活二錢防風一錢紅芷二粒爲末搐之。

川芎散搐鼻。

青黛二錢半

蔓荊子

川芎各一錢二分

鬱金

芒硝各一錢

石膏二錢三分

細辛根一錢

薄荷葉二錢

紅芷一粒

右爲末搐鼻。

**瘦人搐鼻藥**

軟石膏

朴硝半錢

腦子

檀香皮

荊芥

薄荷葉各一錢

白芷

細辛各三錢

羅如聖散治眼目偏痛頭風

麻黃

燒灰  
半兩

盆硝

二錢  
半

麝香

腦子

各少  
許

右件爲細末搗之神效

又方

楊梅青

硝石

伏龍肝

等分

右爲末搗鼻立効

河瓜蒂神妙散治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

煇硝

雄黃

川芎

薄荷葉

道人頭

即蒼耳子

藜蘆

各一分

天竺黃

一錢  
半

右爲細末含水鼻中搗一字神驗

右六方搗鼻治頭痛屬熱者也

本治八般頭風

草烏尖

細辛

等分

黃丹

炒

右爲細末葦管插入鼻中立効。

**丹** 治卒頭上痛皂莢末吹鼻嚏則止。

斗門方

**世** 火筒散治頭風應驗方。

蚯蚓糞

錢四

乳香

錢二

麝香

許少

右爲末用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內神効。

**仲** 頭風摩散方。

大附子

一枚

食鹽

分

右二味爲末以方寸七摩疹上令藥力行。

**聖** 治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩爲末以

酒調如膏用傳頂上并額角。

治頭風餅子。

五倍子

全蝎

土狗

七箇

右爲末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤透貼太陽



穴上灸熱貼之驗甚仍用帕子縛之吸濃茶睡覺卽愈  
聖治時氣頭痛不止用朴硝二兩爲末生油調塗於頂上  
經患頭風山荳根搗末油調塗之  
食治熱風頭痛燒杏仁令烟盡去皮尖以亂髮裹之咬於  
所患處齒下其痛便止

世偏正頭痛風醉頭風以草麻子九粒先用米調成膏塗  
茶碗底却用火燒草麻仁烟出以茶碗覆薰烟上俟烟盡  
用少湯衝開服之覺額上痒是効

針灸

因頭內如虫蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中周氏

厥頭痛面若腫起而煩心取之足陽明太陰厥病篇

厥頭痛頭脈痛心悲善泣視頭動脈反盛者刺盡去血後

調足厥陰頭痛項脾盛者厥頭痛貞貞耕頭重而痛

瀉頭上五行行五先取手少陰後取足少陰厥陰頭痛

意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭

痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽

經云頭日苦兩筋間蓋風府穴也又云足太陽脈是動則衝頭痛目如

脫項似按所生病者頭顛項痛故應頭痛取足太陽也

厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其血後取足少

陽

經云足少陽脈從耳後入耳中出走耳前所生

頭痛者頭痛故耳前後脈湧熱者取足太陽也

真頭

痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治頭痛不可取于

脰者有所擊墮惡血在于內若肉傷痛未已可側刺不可

遠取也頭痛不可刺者大痺爲惡日作者可令少愈不

可已陽迎頭痛腦滿不得息取之人迎

陽迎即陽逆也又云肝氣逆則

頭痛耳聾煩腫取血者是寒血腫滿處取之也

摘偏正頭風 絲竹空 沿皮向外透率谷 風池 橫針入寸半透風府 合

谷 半寸已上穴 解溪 三里 中脘 中脘一穴灸五十壯

集正頭風 百會 七分灸 上星 二分灸七壯 合谷

不愈 神庭灸七

太陽在兩額角眉後紫脈

再取 醉頭風內攢竹一

印堂五分灸

攢竹一分沿皮 三

里 寬中灸 風門沿皮向

摘頭風面腫項強不得回顧 天牖五分留七呼不宜補

血腫腫合 當取下穴 意言六分留三呼瀉五吸後取天

潔頭風 後谿 京骨

右手足太陽

玉頭痛嘔吐 神庭一分 印堂在兩眉中沿皮透左攢竹

皮透右攢竹補三吸

摘風痰頭痛 豐隆五分灸 腎厥頭痛 湧泉三分彈

嘗治一老婦人頭痛久歲不已因視其手足有血絡皆

紫黑遂用三稜針盡刺出其血如墨汁者數盞後視其

受病之經灸刺之而得全愈即經所謂大痺為惡及頭

痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也

**甲**腦風頭痛惡見風寒熱衄鼻窒喘息不通承靈主之

頭痛身熱引兩頰急一作痛腦空主之 頭痛目窻天衝風

池主之已上諸穴在頤部第三行也善噉頭痛身熱頰厭主之 熱

病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頰齒面赤皮疼懸

釐主之 熱病偏頭痛引目外眥懸釐主之 醉酒風熱

發兩角眩兩目痛不能飲食煩滿嘔吐率谷主之此條在

風在耳前也頸額播瀨引牙齒口喞不閉急痛不能言曲鬢主之

及足不收失履口喎僻頸項搖蕩牙車急完骨主之已上

皆在耳後也頭目腫子痛不可以視俠項強急不可以顧陽

白主之 頭痛目眩頸項強急胸脇相引不得傾側本神

主之已上諸穴皆在面部也頭痛振寒清冷淵主之 頭痛項背

急消樂主之。頭風痛鼻衄。眉頭痛善嚏。目如欲脫。汗出寒熱。面赤頰中痛。項強不可左右。顙目系急。惡癢。潰竹主之。頭眩痛重。目如脫。項似拔。狂見鬼。目上反。項直不可顧。暴擊足不任身痛。欲拆天柱主之。風眩頭痛鼻不利。時嚏涕。涕自出。風門主之。暴病頭痛。身熱。痛肌肉動。耳聾。惡風。目眇。爛赤。項不可以顧。髀攣痛。泄腸。辟束骨主之。風眩頭痛。少海主之。厥頭痛。面浮腫。煩心。狂見鬼。喜笑不休。發於外。有所大喜。喉痺不能言。豐隆主之。陽厥。淒淒而寒。少腹堅。頭痛。脛股腹痛。消中小便不利。善嘔。三里主之。厥頭痛。面腫起。商丘主之。厥頭痛。孔最主之。頭重。頂痛。目不明。風到腦中。寒重。衣不熱。汗出。頭中惡風。刺腦戶主之。頭重。目瞑。厥寒。熱項強。難以顧。汗不出。陶道主之。頭痛如破。身熱如火。汗不出。惡痰。裏急。腰

診

股相引痛命門主之

素寸口之脈中手短者曰頭痛平人氣象論

推而下之而下

不上頭項痛

脈診頭痛目痛久視無所見者死久視不見見諸脈病雜法下而上甲乙經作

卒視上而不下者是病若頭痛目痛脈急短澇死未詳其義

產後頭痛

血虛

大一奇散治產後頭疼用當歸川芎為細末每服二錢水

一盞煎七分溫服

寒熱

產婦年三十餘身熱頭痛肚痛

陳皮

白朮

白芍各二錢

黃芩二錢半

川芎錢一

乾薑

牡丹皮

甘草各一錢半

荆芥錢半

分四貼煎服

**保**治產後頭痛血虛痰癱寒厥皆令頭痛加減四物湯

蒼朮

一兩  
六錢

羌活

川芎

防風

香附炒

白芷醋

石膏二兩  
半

細辛乙兩  
半

當歸

甘草各五  
錢

右麩末每一兩水煎服無時如有汗者知氣弱頭痛也  
方中加芍藥三兩桂一兩半生薑煎如痰癱頭痛加  
半夏三兩茯苓一兩生薑煎如熱痰頭痛加白芷三  
兩石膏三兩知母一兩如寒厥頭痛加天麻三兩附  
子一兩半生薑三片煎服

敗血

**大**芎附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不效

右大附子一枚醃醋一碗用火四畔灸透蘸醋令盡去  
皮臍加川芎一兩並為細末每服一錢茶清下

郭茂怕嫂金華君產七日不食始言頭痛頭痛已又心痛

作既而目暗痛如割如刺更作更止相去無瞬息間毋頭痛甚欲取大石壓良久漸定心痛作則以十指抓壁血流滿掌痛定目復痛又以兩手自剜取之如是十日不已衆醫無計進黑龍丹半粒疾少間中夜再服下瞑目寢如平常至平且下一行約三升許如蝗蟲子三疾減半已刻又行如前則頰愈矣黑龍丹方見前後血不下除

### 偏頭風

頭半邊痛者是也當與前頭痛相參用之

大法

**丹** 偏頭風 有痰者多

左屬風 荆芥 薄荷 左屬血虛 川芎 當歸

右屬痰 蒼朮 半夏 右屬熱 黃芩

熱 **羅** 川芎散治偏頭痛神效

甘菊 石膏 川芎 白僵蚕生各六錢



右爲極細末每服三錢茶清調下

**潔** 治頭痛連睛痛

石膏

鼠粘子炒

右爲末茶清食前調下

**垣** 細辛散治偏頭風

細辛

分二

川芎

分七

柴胡

錢二

黃芩

酒炒  
錢一

生黃芩

分五

瓦粉

分二

甘草

錢半

黃連

酒炒  
七分

芍藥

錢半

右咬咀每服三錢水煎食後溫服之

寒濕

**經** 治偏頭痛絕妙葦椽爲末一兩於食前用清粥飲調半錢服

**本** 治風寒客於頭中無時疼痛牽引兩目遂至失明宜白

附散

白附子

分一

麻黃

節  
不去

川烏

南星

各半  
兩

全蝎五箇

乾薑

硃砂

麝香各一分

右爲細末酒調一字服畧睡少時效一族人患頭痛不可忍一服瘥

治偏頭風

猪牙皂角

去皮筋

香白芷

白附子

各等分

右爲末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

**中** 偏頭風草撥猪膽搗鼻中

**大** 治偏頭風用好蘿蔔自然汁一蜺殼許令患人仰臥左疼注左右疼注右或兩邊皆疼皆注之雖十年患者亦效王荆公患十二年用之立效後醫數人皆愈此禁中秘方

雷頭風

針灸

頭痛而起核塊者是也。

**下和**凡雷頭懶于俗呼之謬名也。可用茶調散吐之。次用

神芩丸下之。然後服烏荊丸及愈風餅子之類。衰者可用

涼膈散消風散熱。

茶調散方。見上下部解  
二仙散是也。

大黃

黃芩各二兩

牽牛

滑石各四兩

右為細末。滴水為丸。如小豈。大溫水下十五丸。每服加

十九。以利為度。日三服。

表散

愈風餅子。

川烏炮半兩

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荊芥

薄荷

甘草炙已上  
各一兩

右為細末。水浸蒸餅為劑。捏作餅子。每服三五餅。細嚼。

茶酒送下不計時候

涼膈散

方見前  
寒熱除

**雷**夫治雷頭風者諸藥不效爲與證不相對也蓋雷頭風者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉者象震之形其色又青乃述類象形當煎局方中升麻湯主之升麻湯治頭面疔瘡增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻

蒼朮

荷葉

右爲細末每服五錢水一盞煎七分溫服食前後或燒全荷葉一箇研細調藥服之妙

針灸  
**子**和雷頭風者是頭上有赤腫結核或如酸棗狀可用排針出血則愈矣

**雷**雷頭風

上顛

百會

風池

大頭痛

上熱

頭痛如腫大如斗是也大率多是天行時疫病

國泰和年東垣以監納濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重大傳面目腫盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦得此證至五六日醫以承氣湯加藍根下之稍緩翌日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤或曰李明之存心於醫可以請治遂命診視具說其由曰夫身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而為腫盛以承氣下之瀉胃中之實熱是誅罰無過殊不知適其病所為故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以為君橘紅玄參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以為臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬尾勃白僵蚕味苦平散腫消毒定喘以為佐新升麻柴胡苦平行

少陽陽明二經不得伸，桔梗味辛溫，為舟楫，不令下行，共為細末，用湯調時時服之，拌蜜為丸，喻化之，服盡良愈。因歎曰：往者不可追來者，尤可及。凡他所有是病者，皆書方以貼之，全治甚眾。

普濟消毒飲子

黃芩

黃連

各半兩

人參

三錢

橘紅

玄參

甘草

生各二錢

連翹

七錢

鼠粘子

七錢

板藍根

馬尾勃

各一錢

白僵蚕

炒七分

升麻

七分

柴胡

桔梗

各二錢

右為細末，服如前法，或加防風、薄荷、黃芩、川芎，當歸身、咬咀，如麻荳大，每服五錢，水煎，去渣，熱服之，食後時時服之，如大便硬，加酒煨大黃一錢，或二錢，以利之，腫熱甚者，宜砭刺之。

**海**大頭病者雖在身半以上熱伏于經以感天地四時非節瘟疫之氣所着以成此疾至於潰烈膿出而又染他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太其實資少陽相火爲之熾多在少陽或在陽明甚則逆傳視其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者爲主爲根治之宜早藥不宜遲恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自外而之內者是爲血病况頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上着無形之部分既着無形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失緩體則藥不能除病矣當徐徐清無形之邪或藥性味形體擬象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之類皆是也

後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部非於有形質之所若不速去反損陰也此却爲客邪當急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各爲本家病也若急治之不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之此治急以客也假令少陽陽明之爲病少陽者諸邪出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香咬咀煎去查肉芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已卽止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蒌根湯陽明行



經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荆芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也

**黑**白散治大頭病如神

烏黑蛇

酒浸

白花蛇

去頭尾酒浸

雄黃二錢

大黃

煨半兩

右為極細末每服一二錢白湯調無時

**避**疫赤頭腫者其枯湯加鼠粘子大黃芒硝

**丹**大頭天行病

羌活

酒岑

酒蒸大黃

厥

**素**巨陽之厥則腫首頭重

全文見厥

**頭**大頭風用井底泥調大黃芒硝塗之

此方在表者忌之在裏者宜之

運氣

運氣大頭病皆屬火蓋經所謂上腫者即其屬也經云少

陽司天之政風熱參布大陰橫流寒乃時至民病上怫腫

色變又云少陰司天之政熱病生於上清病生於下民病  
噎乾腫上終之氣燥令行餘火內格腫於上咳喘其治方  
東垣普濟消毒飲子得之矣

眉痛

**四**眉痛屬風熱與痰作風痰治類頭風用白芷酒黃芩末  
酒調下

又方

川烏

草烏二味為君  
童便浸炒

細辛

羌活

黃芩

甘草各等分  
為佐

**五**選奇湯眉骨痛不可忍

防風

羌活各三錢

酒黃芩一錢冬不用如能  
食熱瀉者加之

甘草

三錢夏生  
冬炙用

右咬咀每服三錢水煎稍熱服食後時時

針灸

保嬰  
摘英眉攢內痛 解溪

眉間痛 攢竹

瀉出血石  
皮透魚腹

頭維

一分沿皮斜向下  
懸懸而用之不必

取盡

眉稜骨痛

攢竹

合谷

神庭

頭重

濕氣

紅豆散治頭重如山此濕氣在頭也

麻黃根

沙半錢

苦丁香

半錢

紅荳

十粒

羌活

燒

連翹

各三錢

右五味為細末鼻內指之

又方

羌活根

燒

連翹

各三錢

紅荳

半錢

右為末搐鼻

針灸

督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩胛左右別

走太陽虛則頭重高搖之挾脊之有過者取之所別也

見針灸心長強穴在脊際即尾骨端也

撮頭重如石

印堂

一分沿皮透橫竹先  
左後右彈針出血

頭風屑

去風

羅肝經風盛木自搖動尚書云滿招損老子云物壯則老故木凌脾土金來克之是子來為母復仇也使梳頭有屑皮見肺之證也謂肺主皮毛大便實瀉青丸主之虛則消風散主之

瀉青丸方見  
治虛實法

消風散治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩痛肌肉蠕動目眩旋運耳聾蟬鳴眼流好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癩疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰逆惡心

芎藭

羌活

人參

茯苓

去皮

白僵蚕

藿香

荆芥

甘草

炒

蟬殼

去土各

厚朴

去皮

陳皮

去白各

防風

雜方

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛身重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞不拘服之小兒虛風目澁昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

**四**頭痺風屑發黃用酒炒大黃茶調服

**五**萬病紫死丸治頭多白屑每服三九至五七九薑湯下

方見程  
塊降

**六**治風屑極燥痒無時此乃氣虛風邪侵於皮表而生用藜蘆不拘多少爲末先洗頭須避風候未至十分乾時用末糝之須用入髮至皮方得緊縛之兩日夜次日即不燥痒如尚有些少可再用一次立效

禹錫按陳藏器云鹽麩子主頭風白屑俗名麩鹽搥其末結五倍子

**七**患頭上白屑極多山荳根油浸塗以孩兒乳汁調塗效

本又方

白芷

零零香各等分

右爲末如前法用之候三五日筭去傳三二次終始不生

多臥 不得臥

陰陽榮衛

黃帝曰病而不得眠者何氣使然岐伯曰衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑矣又曰病目不得視者何氣使然岐伯曰衛氣留於陰不得行於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也大惑論

足太陽有通項入于腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳眥以睛脈考之當作目內皆陽氣盛則瞋目陰

陰盛則瞑目

論

帝問曰夫邪氣之客入也或令人目

不瞑不臥出者何氣使然伯高曰衛氣者晝日行於陽夜

行於陰常從足少陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於

五臟六腑則衛氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽

則陽氣盛陽氣盛則陽蹇陷

陷常作滿

不得入於陰陰氣虛故

目不瞑黃帝曰治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調

其虛實以通其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通

其臥立至黃帝曰善此所謂決瀆壅塞經絡大通陰陽和

得者也愿聞其方伯高曰其湯方以流水千里以外者八

升揚之萬遍取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一

升治半夏五合徐炊令竭爲一升半去其渣飲汁一小杯

日三稍益以知爲度故其病新發者覆杯則臥汗出則已

矣久者三飲而已也

邪客篇曰按本草秫米即所謂糯米是也

黃帝曰人之

多臥者何氣使然岐伯曰此人腸胃大而皮膚濕則分肉不解其行遲夫衛氣者晝常行於陽夜行於陰故陽氣盡則寐陰氣盡則寤故腸胃大則衛氣行留久皮膚濕分肉不解則行遲留於陰也久其氣不清則目瞑故多臥矣其腸胃小皮膚滑以緩分肉解則衛氣之留於陽也久故少瞑焉黃帝曰其非常經也卒然多臥者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉而不通已食若飲湯衛氣留久於陰而不行故卒然多臥焉

膽寒熱

**膽虛不眠**寒也酸枣仁炒竹葉湯調服

聖惠方

膽實多

睡焦也酸枣仁生用末茶薑汁調服

濟衆方

○一法酸枣仁一兩生用鴨茶二

兩以生薑汁煮炙微焦搗羅爲末每服二錢水七分煮煎六分溫服無時

不得臥



虛勞

**仲** 虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

酸棗仁

仁 甘草 兩

知母

茯苓

芍藥

各二兩一方 加生薑二兩

右以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫

三服

**本** 治膽虛不得眠四肢無力驚甲丸

驚甲

酸棗仁

羌活

牛膝

黃芪

人參

五味子各等分

右爲細末煉蜜杵爲丸如桐子大每服三四十九溫酒

送下

**聖** 治骨蒸勞煩心不得眠用酸棗仁一兩水一大盞半研

絞取汁下米二合煮粥候熟下地黃汁一合更煮過不計

時服之

**帝**曰人有臥而有所不安者何也岐伯曰藏有所傷及

精有所寄之則安故人不能懸其病也精有所寄之則安太素作精有所寄

則臥不安是也

**海**胡洽治振悸不得眠人參白朮茯苓甘草生薑酸棗仁

六物煮服

肝虛**本**真珠母丸治肝經因虛內受風邪臥則寬散而不收狀

若驚悸

珠母三分研細用強當歸

熟地各一兩半

人參

酸棗仁 栝子仁

犀角

茯苓各一兩

沉香 龍齒各半錢

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大辰砂爲衣每服四五十

丸金銀薄苛湯下日午後臥服

獨活湯

獨活

羌活

人參

前胡

細辛

半夏

五味子

沙參

白茯苓

酸棗仁

甘草略一兩

右為粗末每服四大錢水一盞半薑三片烏梅半箇同

煎至七分去渣不拘時候

紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不寧每臥則鬼  
飛揚覺身在牀而神鬼離體驚悸多驚通夕無寐更醫不  
效予為診視詢之曰醫作何病治董曰衆皆以為心病予  
曰以脈言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝  
藏冤者也遊魂為變平人肝不受邪臥則冤歸於肝神靜  
而得寐今肝有邪冤不得歸是以臥則冤飛揚若離體也  
肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之間雖未服藥已  
覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此說與衆醫議所

治之方而徐賢之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用真珠母爲君龍齒佐之真珠母入肝經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以爲鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治鬼不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

肝虛則  
浮之水  
飲作

**調**羌活勝濕湯加柴胡治臥而多驚邪在少陽厥陰也方見

痛

諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也全文見水腫

內經半夏湯治不得臥乃去飲之劑也方見前陰陽條

**無**溫膽湯治大病後虛煩不得眠兼治驚悸方見

**丹**煩不得眠六乙散加牛黃服之即益元散

肝虛則  
思

虛勝

診

**子和**一富家婦人傷思慮過甚二年不得寐無藥可療其夫求戴人治之戴人曰兩手脈俱緩此脾受邪也脾主思故也乃與其夫議以怒激之多取其財飲酒數日不處一法而去其婦大怒汗出是夜困眠如此者八九日不寤自是食進其脈得平此因膽虛不能制脾之思慮而不  
**逆陽**明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得臥也下經曰胃不和則臥不安此之謂也逆調

喘不得臥 以喘法治之

厥不得臥 以脚氣法求之

**帝**曰人之不能偃臥者何也岐伯曰肺者藏之蓋也肺氣盛則肺大肺大則不能偃臥

針灸  
**膽寒**不得臥 竅陰一分補

【目驚不得眠善斷水氣上下五臟遊氣也陰交主之。不  
得臥浮郄主之。

多臥

濕熱

【子和】陳州長史一小兒病寐而不寤三日諸醫作睡驚治

之或欲以艾火灸之或以大驚丸及水銀餅子治之其父  
曰此子平日無疾何驟有驚乎以子之病問戴人戴人診  
其兩手脈皆平和戴人曰若驚風之脈當洪大而強今則  
平和非驚風也戴人竊問其乳母爾三日前曾飲酒醉否  
遽然笑曰夫人以煮酒見餉酒味甚美三飲一罌而睡夫  
陳酒味甘而戀膈酒氣滿乳兒亦醉也乃剉甘草乾葛  
花縮砂仁貫衆煎汁啜之立醒

連氣

連氣多睡皆屬內熱經云陽明司天之政初之氣陰始凝  
氣始肅病中熱善眠是也

針灸

怪穴困睡多

無名指第一節尖

灸一壯屈手摘取之

咽喉

喉痺

咽噎痛

乳蛾

喉中

介介如梗

諸物梗咽

項頸強痛

咽喉大法

經云一陰一陽結謂之喉痺又云肝者中之將也取決於

膽咽為之使故以喉咽入肝膽部

**咽**主天氣咽主地氣

太陽陽明論

地氣通於噎全文見五藏口咽食

下接連胸中肺葉之間喻即咽之低處也咽即噎之高處也

咽喉者水穀之道也喉嚨者氣之所以上下者也會厭者

音聲之戶也懸壅者音聲之關也

全文見瘡

**子**咽與喉會厭與舌此四者同在一門而其用各異

以納氣故喉氣通於天咽以納食故咽氣通於地會厭管

平其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之其喉錯必舌

抵上齶則會厭能閉其喉矣四者交相為用闕一則飲食

瘖而死矣

喉痺

喉痺大法

凡經云喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天氣閉塞也云咽痛云噎痛者謂咽喉不能納唾與食而地氣閉塞也云喉痺咽噎痛者謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋病喉痺者必兼咽噎痛病咽噎痛者不能兼喉痺也今以喉咽俱病諸方並入喉痺門中

亞寒寸脈小者

皆為表証

喉痺惡寒及寸脈小弱於關尺者皆為表証宜甘桔湯半桂枝甘草湯詳寒熱發散之若水漿不得入口者用解毒雄黃丸四五粒以極酸醋磨化灌入口內吐出濃痰却服之間以生薑自然汁一蜆殼噙下之神效

按喉痺惡寒者皆是寒折熱寒閉於外熱鬱於內薑汁散其外寒則內熱得伸而愈矣切忌膽礬酸寒等劑點



喉反使其陽鬱結不伸又忌硝黃等寒劑下之反使其陽下陷入裏則禍不旋踵矣韓祗和云寸脈弱小於關者宜消除助陽垣云兩寸脈不足乃陽氣不足故用表藥提其氣升以助陽也或三部俱小弱亦可用其法也喉痺鄉村病皆相似者屬天行運氣之邪治必先表散之亦大忌酸藥點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也其病有二

運氣  
熱邪以  
寒表之

其一屬火經云少陽所至爲喉痺又云少陽司天之政三之氣炎暑至民病喉痺治宜仲景桔梗湯或面赤斑者屬陽毒宜陽毒諸方汗之

寒邪以  
熱表之

其二屬濕經云太陰之勝火氣內鬱喉痺又云太陰在泉濕淫所勝病隘腫喉痺治宜活人半夏桂枝甘草湯或面青黑者屬陰毒宜陰毒諸方汗之

**仲**桔梗湯治傷寒客熱咽痛。方見傷寒咽痛。○海養治咽痛。其桔梗加鼠粘子竹茹妙。

**無**荆芥湯治咽喉腫痛語聲不出。嘔之痛甚。

荆芥兩半

桔梗兩

甘草一兩

右剉散每服四錢水一盞薑三片煎六分去渣溫服。

**活**半夏桂枝甘草湯治暴寒中人咽痛。方見傷寒咽痛。

**無**治卒喉痺不得語小續命湯加杏仁七箇煎甚妙。續命湯方

見中見門

**和**五香散治喉咽腫痛毒氣結塞不通。

木香

沉香

雞舌香

薰陸香各一兩

麝香另研三錢

右爲末入麝香研勻每二錢水一盞煎服不拘時。

**本**治中風急喉痺欲死者白僵蚕搗篩爲末生薑自然汁

調下喉立愈。丹溪云僵蚕傷火而有土與木老得金氣而僵治喉痺者取其火中清化之氣以從治相

火散濁逆  
結滯之疾

**陳**附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入內含之勿咽  
其汁主喉痺

**和**如聖勝金錠治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾結喉重舌  
木舌

硫黃

細研  
兩半

川芎

一兩

鵝茶

薄荷

去根梗  
各半兩

貫衆

二兩

硝石

研四兩

荊芥

二兩

右爲末生蔥汁搜和爲錠每服先用新汲水灌嗽次嚼  
生薄荷五七葉却用藥一錠同嚼極爛并水嚥下甚者  
連進三服并以一錠安患處其病隨藥便消

**羅**

征南帥不隣吉亥病咽痛下利

方見表熱  
裏寒門

洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚衆蓋前年終之氣及當  
年初之氣二火之邪也予累用甘桔湯加黃連半夏薑

喉閉者  
先取痰

蚕鼠粘子根等劑發之挾虛者加參芪歸茸水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用上項藥無不神驗若用膽礬等酸寒點過者皆不治蓋邪鬱不出故也

**解**

毒雄黃丸治纏喉風及急喉閉卒然倒仆牙關緊急

雄黃

鬱金各一

巴荳

去皮油  
十四箇

右為細末醋糊為丸菴荳大茶清下七丸吐出頑痰立甦未吐再服如至死者心頭猶熱灌藥不下斡口開灌之下咽無有不治如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九量小大加減一法用雄黃丸三粒醋磨化灌之尤妙其痰立出即甦

**大**

治纏喉風雄黃一塊新汲水磨急灌吐痰

**丹**

纏喉風屬熱痰宜用鷲翎蕪桐油搽吐之又法用射干

逆流水吐之

世遠志去心爲末每半錢水小半盞調服口含竹管吐痰涎極捷治喉痺如神

烏犀角膏治咽喉腫痛及一切結喉爛喉道尸纏喉痺喉急喉飛絲入喉重舌木舌等證

皂莢

兩條子揀碎用水三升浸一時久按汁去渣入瓦器內熬成膏

好酒合

酸硝

百草霜研一錢同皂角膏攪勻令稠

人參爲末

鵬砂

白霜梅各少許並研入膏中

右拌和前藥用鷲毛點少許於喉中以出盡頑涎爲度却嚼甘草二寸嚥汁吞津若木舌先以籠布蘸水揩舌冷次用生薑片擦之然後用藥

山纏喉風皂角揉水灌下得吐愈

治纏喉風喉痺飲食不通欲死者用反寬草根一莖淨洗內入喉中取寒痰出卽瘥神驗更以馬牙硝津蘸之卽

絕根反莧草一名紫苑

治咽喉用土烏藥卽矮樟根以醋兩盞煎一盞先噙後嚥吐出痰涎爲愈

治纏喉風束氣不通用蛇蛻炙黃當歸等分爲末溫酒調下一錢七得吐愈

牙關閉者插鼻取痰

備急如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

堆黃細研

藜蘆生用

白礬飛

猪牙皂角去皮

右等分爲細末每用一荳大鼻內搐之立效

一字散治喉閉氣塞不通飲食不下

雄黃另研

蝎梢七枚

白礬生用

藜蘆各一分

猪牙皂角七枚

右爲末每用一字吹入鼻中卽時吐出頭涎爲愈  
治喉咽痛牙關緊急用巴荳去殼以紙壓出巴荳油在紙  
上以此紙作捻子點火吹滅以烟薰入鼻中卽時口鼻涎  
流牙關開矣、

不帶皮寸脈大者皆屬下証

喉痺不惡寒者及寸脈大滑實於關尺者皆屬下證宜硝  
石青黛等寒藥降之或白礬等酸劑收之也韓祗和云寸  
脈大於關尺者宜消陽助陰東垣云兩寸脈實爲陰盛陽  
虛下之則愈故予每用此法治急喉痺如鼓應桴或三部  
俱實亦可用其法也

玉鑰匙治風熱喉痺及纏喉風

硃砂半兩

鵬砂半兩

腦子半兩

白僵蚕半兩

右爲末以竹管吹半錢入喉中立愈

治喉咽痛用蒲葶甘草青黛芒硝等分爲末時時嚥

荳許神効

療喉痺神驗朴硝一兩細細含嚥汁立愈

玉屑無憂散治纏喉風咽喉疼痛語聲不出咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癪小兒疔癩或悞吞骨屑哽塞不下

玄參

貫衆

滑石

砂仁

黃連

甘草

茯苓

山荳根

荊芥

各半兩

寒水石

煨

鵝砂

各三錢

右爲末每服一錢先抄入口以清水嚥下此藥除三尸去八邪辟瘴療渴

治喉痺呼吸不通須臾欲絕絡石草二兩水升半煎取

二盞去查細細呷之立通

外臺和要口本草云絡石味甘苦溫微寒無毒主風熱

治喉痺白瑞香花根寸許研細調灌之妙

白瑞香藥性未詳



卒喉痺取黃栢片含之又黃栢一斤咬咀酒一斗煮二  
沸去渣恣飲便愈

世喉痺水穀不下難言汁咽之甚佳

難言下  
氣甚急

又方李實根一片噙口內佳治風熱痰喉痺先以干  
柿湯次以四物湯加黃栢知母養陰則火降矣

治急喉閉速巡不救者鱘魚膽臘月收陰乾爲末每  
用少許點患處藥至卽瘥病深則水調灌之

用李實根研水傅頂上一遭治喉痺卒不語羊蹄獨  
根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭  
喉令赤傅之

千金方

又方

硫磺

枯礬

各五  
分

鵬砂

一  
錢

杜牛膝調傅

右降之劑

**羅開關散**治喉風氣息不通

白僵蚕

炒一兩

枯白礬

各等分

右爲細末每服三錢生薑蜜水調下細細服之

**本**治纏喉風用白礬末半錢烏雞子清一箇二味調勻灌入喉中立効如神此方活人不計數幸毋忽

**山**喉閉用枯礬末吹納喉中急用燈盞底油腳灌下

**聖**治喉痺馬屁勃白礬等分爲細末以鷄翎吹入喉中吐

痰二升愈

馬屁勃

治喉閉一握金一握燒灰拌白礬末

炒青色爲度用筋三四根壓下舌看喉中端的吹入患處

妙此藥一名八角荷一名山荷葉如川芎樣生深山詩云

一葉一枝花深山是我家疏黃怕我死水銀化成砂

**無**神効散荆芥草麻肉等分爲末蜜九皂子大綿裹含化

治喉痺語聲不出者佳

**海** 又方猪牙皂角和霜梅爲末噙之

**世** 治喉癰咽腫手足不和惡寒者用鴨嘴膽蒜末以筋蘸藥點患處藥至卽瘥神效

右收之之劑

汚血

**海** 治喉痺取蟻螬垂汁點在喉中下咽卽開

**龍** 治喉痺難寒不通取紅藍花搗絞取汁一小升服之以瘥爲度如冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗咽喉寒服之皆瘥

**四** 又方用茜草一兩煎服降血中之火

**世** 治咽腫杜牛膝搗自然汁和醋服之

本草云杜牛膝主血結及血痺

**無** 馬鞭草散治患喉痺咽腫連頰吐氣數者

馬鞭草

本草云馬鞭草味辛涼破血去瘀無毒

右搗自然汁每服噉一合許又一法用馬啣鐵煮汁服

亦妙

治喉痺射干切一片含嚙汁

外臺秘要云射干  
破血消積治癆老血在心

脾間味辛涼  
微溫有毒

押班都知潘元從喉閉急召孫至於夾袋中取藥末半  
七吹入喉中少頃潘吐出膿血立愈翌日潘詣孫謝曰火  
急之難非明公不能救救人之急非藥不能療贈金一百  
兩願求方以濟非常之急孫以其方授之用猪牙皂角白  
礬黃連等分細剉新瓦上焙乾爲末每用半錢吹入喉中  
因曰此方無價安用以利易哉遂不受所贈

肺絕

急喉痺其聲如鼯有如痰在喉嚨者此爲肺絕之候速宜  
參膏救之用薑汁竹瀝放開服如未得參膏或先煎獨參  
湯救之服早者十全七八次則十全四五遲則十全一  
也

雜方

**一陰一陽結謂之喉痺**陰陽別論

**治喉閉送巡不救方**

皂莢

去皮弦子生半兩爲細末以筋面點少許在腫痛處更以麝香調藥末厚塗項上須臾便破血

出立療口丹溪以雞

毛蘸傳腫處尤妙

又用遠志去心水調傅項上一遭

**治喉痺青艾和莖葉一握用醋同杵傅痺處冬月用乾**

者李師方

一法用青艾汁灌下

**喉閉用蛇床子燒烟薰入喉中愈**

**喉中卒被毒氣攻痛者切商陸根炙熱隔布熨之冷輒**

**易立愈**

**有人患纏喉風食不能下大麥麩作稀糊嚥之滑膩容**

**易下嚥以助胃氣**打義云以此代粥食也若能食者不必用此

針灸

山控喉氣不通者以冷水徐灌之。

內經刺灸喉痺法有二。今以經脈所過咽喉取之驗者。及他病相干而致喉痺取之者。通六經也。

其一取手足陽明經云。喉痺不能言。取足陽明。能言。取手陽明。又云。胃足陽明脈。從大迎前下。人迎附循喉嚨。所生病者。頸腫。喉痺。視盛虛熱。寒陷下取之。又云。足陽明之別名曰豐隆。去踝八寸。別走太陰。其病氣逆則喉痺。卒瘖。取之所別也。又曰。大腸手陽明脈。所生病者。喉痺。視盛虛熱。寒陷下取之也。

其二取手少陽經云。三焦手少陽之脈。出缺盆。上項繫耳。後是動則病隘腫。喉痺。視盛虛熱。寒陷下取之。又曰。邪客手少陽之絡。令人喉痺。刺手中指次指爪甲上去端如韭葉。各一疇壯者立已。老者頃已。左取右。右取左。是也。

其三以經絡所過喉咽者有二經云肝足厥陰之脈循喉嚨之後故喉之後疼者取之累驗也又云腎足少陰之脈上貫肝高循喉嚨竇漢卿所謂必准者照海治喉中之閉塞是也

其四他病相干致喉痺者有一經云心欬之狀喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺取心之俞蓋太陵穴是也

**文潞公**一日喉腫翰林咽喉科治之經三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水露筆管點藥入喉便愈孫隨手便刺相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須臾嘔出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫召良醫甚有手段予嘗治一男子喉痺於大溪穴刺出黑血半盞而愈由是言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散發散不

愈次取痰取痰不愈次去汚血也

**治喉痺**

豐隆

湧泉

關衝

甚者以小三棱針或筆鋒中許言點於喉痺

上乃刺出紫血如下立愈

**喉痺乳蛾**

少商

針入一分臥針向後三分

照海

太衝

**喉閉不通**

少商

隱白

少衝

湧泉

**喉痺頰腫如升水粒不下**

少商

出血

手太指背頭筋

三棱折刺

陽谷

三分

**喉痺完骨及天憲氣舍天鼎尺澤合谷商陽陽溪中渚**

前谷商丘然谷陽交悉主之

喉痺胸中暴逆先取衛脈

後前三里雲門

皆瀉之

**喉痺刺少陰少陰在手腕當小指掌後動脈是也針入**

三分補之

**喉痺咽如梗三間主之**

喉痺不能言溫留曲池主之



喉癭氣逆口喎咽喉如扼狀行間主之 喉痺咽腫水

漿不下璇璣主之 喉痺食不下鳩尾主之

白色養理者肺大肺大則多飲善病喉痺全文見診 心脈大

甚為喉吟全文見治虛實法

咽噎痛咽噎不能納唾與食是也

大法 形苦志苦病生於咽噎治之以百藥全文見治法

咽痛必用荊芥 陰虛火炎上者必用玄參

氣虛人參加竹瀝 血虛四物加竹瀝

久病養陰解鬱

咽痛有陰氣大虛陽氣飛越痰結在上遂成咽痛脈必浮

大重取必瀉去死為近宜補陰陽人參一味濃煎湯細細

飲之此証皆是勞嗽日久者有之如用煎喉痺條下諸方非徒無益而反害之 咽瘡多虛火游行無制客於咽喉宜用人參蜜炙黃柏荆

芥治之

潤喉散治氣鬱夜熱咽乾梗塞用、

桔梗二錢

粉草

紫荷車

香附各三錢

百藥煎一錢半

右爲細末傳口內

咽喉生瘡損了不用生薑用之辛辣痛又能散不收

咽痛實熱者

黃連

荆芥

薄荷

蜜薑汁調噲

咽中瘡腫草麻子一粒去皮朴硝一錢同研新汲水作一

服連進二三服效

丹溪云草麻子爲金性善散能通毒腫又似屬水瀰是外利要藥

龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫頭痛或

成喉痺或結硬不消愈而復發經久不瘳或舌本腫脹滿

口生瘡飲食難咽並宜服之

川芎一兩

生地

犀角屑

羚羊角

煎過熱祛邪

琥珀

研各五錢

馬牙硝

研三錢

鵬砂

研一兩

人參

赤茯苓

各三錢

玄參

桔梗

升麻

鉛白霜

研

連翹

各五錢

硃砂

水飛二錢

牛黃

研二錢

麝香

研三錢

腦子

研三錢

金箔

爲衣

右爲細末煉蜜爲丸每兩作十九用金箔爲衣每服一

丸薄荷水化下或細嚼或噙化如無薄荷新水亦可臨

臥用之

祛毒牛黃膏治大人小兒咽喉腫痛舌本強硬滿口生瘡

涎潮喘急飲食難進咽膈不利

牛黃

研三錢

人參

琥珀

犀角

取細末

桔梗

生地

鵬砂

各半兩

雄黃

一兩

玄參

升麻

各三錢

蛤粉

水飛四兩

寒水石

煨二兩

硃砂

飛研七錢

鉛白霜

腦子

各一錢

金箔

爲衣

實熱  
水之

咽喉備急丹

右爲細末煉蜜丸如小彈子大金薄爲衣用磁石器內收貯每服一九濃煎薄荷湯化下或新汲水服亦得日進二三服噙化亦得

青黛

芒硝

白僵蚕

各一  
甘草

右爲細末用臈月內牛膽有黃者盛藥其中陰四十九日多時爲妙

患喉痛含山荳根一片細咽津極妙

咽痛鵬砂或和膽礬白僵蚕白霜梅和噙又方百藥煎去黑皮鵬砂甘草生白礬等分爲細末每服一錢食後米飲調細細咽下

咽喉卒腫食飲不通黃栢搗傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

浮熱表散之

婦人患咽疼用桔梗一兩生甘草半兩分三貼水二碗煎取一小盞稍熱飲之先與蚤休末細咽之蚤休末即金線重樓是也增損如聖湯治風熱攻衝會厭語聲不出咽喉妨悶腫痛並治之

桔梗二兩

甘草炙一兩

枳殼湯浸去穢

防風各半兩

右件爲細末每服三錢水一大盞煎至七分去渣入酥如麥許攪勻食後溫服

治虛煩上壅脾肺有熱咽喉生瘡利膈湯

雞蘇葉

荆芥

防風

桔梗

人參

牛旁子隔紙炒

甘草各一兩

右爲細末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加僵蚕一兩

桔梗湯治咽腫微覺痛聲低冬季合之

麻黃

不去節

桔梗

一錢

黃芩

三錢

甘草

一錢

白僵蚕

馬尾勃

桂枝

少許

婦身

三分

右吹咀水二盞煎去查稍熱服食後可徐徐呷之

發聲散治咽痛妨悶咽物則微痛不宜寒涼藥過泄之

此妨悶虛熱也

瓜蒌

一箇

白僵蚕

微炒

桔梗

七錢

甘草

炒二錢

右爲細末每用少許乾糝咽喉中若腫痛左右有紅或

只一壁紅紫長大水米難下用此散一錢朴硝一錢和

勻糝喉中咽津如喉中生赤腫或有小白頭瘡用前散

一錢七白礬細研半錢乾糝

薑汁調僵蚕末治咽痛神效詳見喉痺

蜜附子治感寒咽門閉不能咽大附子一枚生去皮臍

切作大片蜜塗炙令黃含熱津其味盡更以附子片塗蜜

之  
寒邪溫

灸用之

汚血破之

治咽痛用諸藥不効者此非咽痛乃是鼻中生一條紅線如髮懸一黑泡大如櫻珠垂掛到咽門而止口中飲食不入須用深取牛膝根直而獨條者洗淨入好醋三五滴同研細就鼻孔滴二三點入去則絲斷珠破其病立安

肝者中之將也取決於膽咽爲之使奇病論

轉方

咽痛用倒摘刺根淨洗入好酒醋同研滴在喉中耳若痒卽安 范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿水飲下方寸七

主咽喉寒鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一箇開頭取白去黃著米酢煨拌泔火頓沸起擊下沸定須頓三度就熱飲酢盡不過一二次瘥

運氣

運氣咽喉噎痛皆屬寒經云太陽在泉寒溼所勝民病噎

針灸

痛頷腫是也

內經灸刺咽喉有二

其一取足少陰經云腎足少陰之脈所生病者咽腫上氣  
噎乾痛又云噎中腫不能內唾時不能出唾者刺然骨之  
前出血立已左刺右右刺左又云邪客足少陰之絡令人  
噎痛不可納食無故善怒氣上走贛上林億云贛膈也  
刺足下中央之脈各三疢凡六刺立已左刺右右刺左是  
也

其二取手太陽經云小腸手太陽之脈是動則病噎痛頷  
腫視虛實寒熱陷下取之也

咽中痛不可納食湧泉主之 咽腫難言天柱主之  
喉痛瘡不能言天突主之

法同喉痺

乳蛾



性熱者  
收之

咽喉乳蛾方

雄黃

鬱金各五錢

白礬生用二錢半

麝香五分

右爲細末以竹管吹入喉中立能言語

實熱者  
降之

粉香散吹乳蛾卽開

白礬三錢

巴豆三粒去皮油

輕粉

麝香各少許

右於鐵器上飛白礬沸入巴豆在礬上枯去不用巴豆爲細末三味和合吹喉中

治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰鹽花一兩二味細研以筋頭點藥在上

羅靑散治單雙乳蛾

蒲黃五錢

羅靑

盆硝研各三錢

甘草二錢

右爲細末每服一錢冷蜜水調細細咽之吞不下雞翎蘸藥喉內掃之立效

**不**玄參散治懸壅痛不下食

玄參兩

升麻

射干

大黃各半兩

甘草

右爲細末用水煎至七分放溫時時含咽良驗

有表者散之

**無**乾薑散治懸壅熱卒暴腫大

乾薑

半夏湯洗去屑等分

右爲細末以少許著舌上嚥津

汚血破之

**世**乳蛾用杜牛膝根紅者研調男用女乳汁女用男乳汁納鼻吸之

**丹**治喉中卒生肉綿裹筋頭蘸鹽搯一日六七次易之真

方人

咽中介介如梗狀

雜方

**仲**婦人咽中如有炙燔半夏厚朴湯主之

半夏斤

厚朴三

茯苓

生薑各四兩

蘇葉二兩

右五味以水七升煮取四升分溫四服日三夜一

**丹**痰結核在咽此濕痰必用痰藥中醎能軟堅之味

瓜蒌實

青黛

杏仁

海蛤粉

桔梗

連翹

風化硝

右爲末薑蜜丸噲化

針灸  
內經灸刺咽噲介介如梗狀有二

其一取陽陵泉經云膽病者善太息口苦嘔宿汁噲中介

介然數唾取陽陵泉是也

其二取太陵經云心欬之狀喉中介介然如梗狀取心之

俞是也

諸物梗喉

出之  
法

治諸哽煮薤白令半熟以線縛定手執線頭少嚼薤白咽之度薤白至哽處便牽引哽即出矣 又法用綿一小塊以蜜煮用如食薤法

世治骨哽入喉

磁砂

甘草各等分

右爲末以綿裹少許噙之旋旋咽津久之即出

骨哽以乳香燒烟吸入喉即吐出

本治諸魚骨哽久不出方以皂角少許吹入鼻中得嚏哽出多秘此方

獺主魚骨哽不可出者取獺足於項下爬之亦可煮汁食之

治哽蟻蝨膽一枚吞下亦治刺不出傳之刺即出

古今錄療魚骨橫喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作

屑水服之卽出未出再服。

右治骨哽

**子和** 一小兒誤吞一錢在喉中不下諸醫皆不能出亦不能下乃命戴人戴人熟思之忽得一策以淨白表紙令卷實如箸以刀縱橫亂割其端作鬚髻之狀又別取一箸縛針鈎於其端令不可脫先下咽中輕提輕抑探之覺鈎入於錢竅然後以紙卷納之咽中與鈎尖相抵覺鈎尖入紙卷之端不得肌肉提之而出

**醫** 誤吞釵取薤白曝令萎黃煮使熟勿切食一大束釵卽隨出

**丹** 治誤吞錢釵及鏤用飴糖一片漸漸食之自出外臺秘要

右治錢哽

**世** 治骨哽槿樹葉油馬尾勃砂糖三味熬膏爲丸噙化累

下之之法

効

治骨哽喉痛用水牛屎上生出草曬乾爲末用砂糖爲丸徐徐嚥吞下仍用砂糖爲衣不然損牙

外治魚骨哽在喉中以少礪砂口咀嚙咽之立下

世治魚骨哽用玉簪花根研細取汁竹管灌喉中不可著

齒着則齒酥骨哽用萱草根汁服之傳者云可立視骨

下 御云萱草卽鹿蔥也又名宜男又方魚骨哽細嚼蘿蔔徐徐咽之愈

世治魚骨哽百法不能療者錫糖丸如鷄子黃大吞之立

出方  
用後

治諸哽生艾數升水酒各五升煮取四升稍熱服之

世魚骨哽楮子搗自然汁濾去渣服或收曬乾爲末水和

汁服亦可楮子卽谷子也一方用楮樹皮

世橄欖味澁食久則甘嚼汁咽治魚哽

**外**治哽以瞿麥爲末水調方寸七服。

**治**骨哽白茯苓一味臨時細切爲末以所哽骨煎湯調

下、

**治**雞骨哽用水簾草搗汁飲之骨自消。治骨哽以野

苧根洗淨搗爛如泥每用龍眼大如被雞骨所傷以鷄羹

化下如魚骨所傷魚湯化下。治一切骨哽用金鳳花子

嚼爛嚙下無子用根亦好。

**山**誤吞稻芒麥芒咽間者急取鵝口中涎灌之或取薦頭

草嚼亦妙。

**丹**魚骨在肚中刺痛煎茱萸汁一盞飲之骨軟而出食

**丹**治吞錢艾一把水五升煎至一升頓服便下錢氏方

治吞錢及鐵物在喉者不得下南燭根燒細末湯調一錢

下之。

診

誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿溫服一升日再服

之外臺

又方誤吞銅錢用家茨菰取汁呷飲自消見山

誤吞錢併金銀等物以糊粉一兩搗調之分再服如吞

金銀物在腹中以水銀服之令消烱

凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽礞石治針哽髮灰治髮哽狸虎治骨硬亦各從其類也

項頸強痛

缺盆之中任脈也名曰天突當缺盆中央一次任脈

側之動脈足陽明也名曰人迎按喉二旁之二次脈手

陽明也名曰扶突按喉動脈之後世三次脈手太陽也

名曰天窻手陽明之後當四次脈足少陽也名曰天容

曲頰之後當五次脈手少陽也名曰天牖耳後當完

六次脈足太陽也名曰天柱按項大筋七次脈頸中央



針灸

之脈督脈也名曰風府。足陽明挾喉之動脈也。其脰在膺中。手陽明次在其脰外不至曲頰一寸。太陽當曲頰。足少陽在耳下曲頰之後。手少陽出耳後上加完骨之上。足太陽挾項大筋之中。俱本輪篇

內經刺灸項頸痛有二

其一取足手太陽治項後痛經云足太陽之脈是動則病項如拔視虛盛寒熱陷下取之又云項痛不可俛仰刺足太陽不可以顛刺手太陽又云大風項頸痛刺風府風府在上椎又云邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛刺足小指爪甲上與肉交者各一痛立已不已則刺外踝下三痛左取右右取左如食頃是也。

其二取足手陽明治頸前痛經云足陽明之脈所生病者頸腫又云手陽明之脈是動則病頸腫皆視盛虛寒熱陷

下取之也

**玄** 頸項痛 後懸

**玉** 項強 承漿 風府

**甲** 頭項痛重 暫起 偃仆 鼻塞 齁齁 喘息 不得 通通 天主之  
頂上痛風 頭重目如脫 不可左右顧 百會主之 頸痛  
項不得顧 目泣出 多眦 鼻齁 齁目內皆赤痛 氣厥 耳目不  
用 咽喉 儻引項 筋攣不收 風池主之 項腫不可俛仰 頰  
腫引耳 完骨主之 項強刺瘡門 頸項痛不可以俛仰  
頭痛 振寒 瘕瘕 氣實則腸滿 俠脊有并氣 熱汗不出 腰背  
痛 大杼主之

東風生於春 病在肝 膺在頸 項全文見五藏

**本** 治筋急 項不得轉側 木瓜煎

木瓜 兩箇取 蓋去鹽 沒藥 煎二 乳香 煎一分

肝筋急

右二味內木瓜中用蓋子合了竹簽簽定飯上蒸三四次研爛成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黃汁半盞無灰酒二盞和之用八分一盞熱煖化服有人患此證自午後發至黃昏時定予曰此患先必從足起經言足十二經絡各有筋惟足太陽之筋自足至項大抵筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至兌陰壯陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣故發於是時予授此方三服而愈

熱痰

**男子**項強不能回顧動則微痛診其脈弦而數實右手爲甚予作痰熱客太陽經治之用二陳湯加酒洗黃芩羌活紅花服後二日愈

虛熱

**項養神湯**治精神短少不得睡項筋腫急難伸禁甘溫宜

苦寒

黃芪錢一

人參分三

甘草分七

蒼朮分五

白朮分三

柴胡錢四

升麻錢四

歸身分五

麥芽分五

木香分一

川芎分三

半夏分七

橘皮錢一

黃連分五

黃芩分二

黃柏分一

右哎咀每服五錢水二盞煎去渣稍熱服不拘時

**本**治腎氣上攻項背不能轉移椒附散

大附子

一枚六錢上者炮去皮臍末之

右末每二大錢好川椒二十粒用白麩填滿水一盞半

生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親戚患

項筋痛連背髀不可轉移服諸風藥皆不效予嘗憶予

金髓有腎氣攻背強一證予處此方與之一服頓瘥自

爾與人皆不驗蓋腎氣自腰夾脊上至曹溪穴然後入

表寒

泥丸宮曹溪一穴非精於搬運者不能透今逆行至此不得通用椒以引婦經則安矣氣上達椒下達故服之愈。

治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷納生桃葉鋪其席下臥之令項在藥上以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良久即瘥

又方治頭項強不得顧視蒸大苳一升令變色納囊中枕之

諸瘕項強皆屬於濕

全文見診法治法見傷寒項強條