

醫

學

綱

目

醫學綱目卷之三十八

小兒部

脾主濕

吐瀉

吐

吐水吐

泄

瀉

乳食不化

赤白痢

腹脹

附丁

水腫

疳

虛羸

鶴節

宿食

痞

疳

疳

脾弱多困

渴

大小便秘

黃疸

腹痛

驚口

口

瘡

見心主熱門

口噤

滯頤

撮口

瀉痰

**四**白附丸通治小兒咳嗽有痰感冒發熱吐瀉心神不安

神效

南星二兩

半夏

白附子

白礬各一兩

右為細末薑汁糊丸如桐子大一歲兒服八九丸用薄荷

湯化下

南星半夏用冬藏雪水於六月六日浸起曬乾又浸九次方用

吐瀉

小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有五臟兼見證 肺睡露睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡 肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼臟症先瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二症多病於秋夏也

五月身  
熱瀉黃  
九分下  
一分補

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒臟腑十分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露散主之

玉露散一名甘露散

寒水石

半兩軟而微青  
黑中有細紋者

生甘草

錢一

石

半兩堅  
白而有

燻壁手不可折者如無以方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方者是

右同爲細末每服一字或五分一錢食後溫湯調下

云非腎熱相火太盛者不宜服此

六月身溫瀉黃

日色六分補四分下

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信衆醫皆用補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大吐瀉也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當其衆師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯三服更以白

七月瀉  
身溫涼  
三分下  
七分補

餅子下之一日減藥二分二日三日又與白虎湯各二服  
四日用石膏湯一服及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺  
黃茯苓以硃砂爲衣服五九竹葉湯化下熱退而安

七月立秋後吐瀉身溫臍中三分熱七分冷也不能食  
乳多似睡悶亂噁氣長出氣睡露睛唇白多噦欲大便不  
渴食前多服益黃散食後少服玉露散 廣親宮七太尉  
七歲病吐瀉是時七月其症全不食而昏睡睡覺而悶亂  
噁氣乾嘔大便或有或無不渴衆醫作驚治之疑睡故也  
錢曰先補脾後退熱與史君子丸補脾石膏湯退熱次日  
又以水銀硫黃末研和以生薑水調下一字錢曰凡吐瀉  
五月內九分下而一分補八月內九分補而一分下此者  
是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之卽死卽當補脾若以  
史君子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

食而噦錢曰脾虛津少即嘔逆曰何瀉青楊水曰腸胃至  
虛冷極故也錢治而愈

六月身  
公瀉青  
一分下  
九分補

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉青楊  
水當補脾益黃散主之不可下也

下後不  
命通証  
用藥

凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐亡津  
必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈 如身熱

脈大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫服之 如身涼

脈細小便青早晨益黃散午後玉露散 如過四五日困

弱宜異功散和中丸開胃丸

如有風而瀉用防風羌活謂吐瀉兼肝病  
風搐拘急也 有熱而瀉

用黃連黃芩大黃謂吐瀉兼心  
病身熱也 有寒而瀉用附子謂吐  
瀉兼

腎病身冷或足  
脛寒而逆也 有濕而瀉用白朮茯苓謂吐瀉兼本  
脾病多腫體重

皆倦也 有肺病而瀉用芍藥桂心定喘麥冬人參甚者多

橫榔大便不通加大黃

謂吐瀉兼肺病喘嗽也

更詳看病新舊新

則止之久則有腸風之患宜推陳致新法宜風散導過

後用入臟君臣藥調之宜益黃散

**傷寒吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣短大便黃白色嘔吐**

乳食不消時咳嗽更有五臟兼見症當煎入臟君臣藥先

服大青膏後服益黃散如先曾下或無下證慎不可下此

乃脾肺受寒不能入脾也

濕古云身溫吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子亦弱法當煎

橫榔荳蔻湯下大

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水此

為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發

散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

濕古云吐瀉身熱而渴小便少者五苓散主之身熱而嘔者當服白朮散後煎橫榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴哽氣長出氣睡

冬春治

身瀉瀉

黃白痰

嘔沫衣

後瀉

身熱瀉

黃而瀉

先止渴

後表

身涼瀉

青不瀉

先補後表

露睛此傷風在再輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益

黃散發散大青膏主之此二證多病於春冬也

深古云此證吐瀉不

渴者則知爲寒煎附子桂枝湯下大青膏

先表不

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼

解者利

藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛

內不能散外不能解至十餘日其証多睡露睛身溫風在

脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則痢止宜風

散主之後用史君子丸補其胃亦有諸吐痢久不瘥者則

脾虛生風而成慢驚矣

吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減

半生薑煎服

玉露散

方見

和中散和胃止吐瀉定煩渴治腹痛

身熱瀉黃多白濁爲熱



人參

茯苓

白朮

甘草

乾葛

黃芪

白豆蔻

藿香

右爲細末每服三錢水一盞半棗二枚去核生薑五片

煎八分食前溫服海藏云和中散四君子湯加減法

四 小兒周歲吐乳腹瀉

滑石煨二錢 白朮炒三錢

乾葛一錢

陳皮分三

右爲麤末煎飲之

吐瀉身熱瀉黃多渴錢氏作熱病治在夏秋用玉露散兼

益黃散相間服在春冬用白朮散大青膏亦相間服

四 萬安膏方見吐瀉

四 吐利四肢脹逆腦門低陷四君子加藿香丁香芍藥等

分煎服○錢氏益黃散方見小兒大法條

四 和胃丸治吐瀉不止欲生慢驚

肢冷瀉  
青不渴  
甚矣

丁香

白木

各一兩

半夏

錢五

藿香

蝎尾

錢一

右爲末薑汁打糊爲丸如小豆大三歲兒三十九薑湯

下

**關**理中丸治吐利不歇米穀不化手足厥冷

方見傷寒

金液丹治吐利日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡  
露睛口鼻氣涼欲成慢驚風又治大人陽虛陰盛身冷脈  
微自汗吐利小便不禁

船上硫黃

十兩先飛煉去砂石秤研爲末用砂盒子

露地先埋一水礮盛水滿坐盒子在上又以泥固濟

取藥

右以柶木搥乳鉢研爲末每服二錢生薑米飲調下多  
服取效大人藥末一兩蒸餅一兩水浸去水餅和九桐

子大晒乾每服五七丸至百丸米飲空心下

關氏云吐瀉虛極當速生胃氣宜與理中丸併研金液丹末煎生薑米飲調灌之惟多服乃效俟胃氣已生手足漸熱然猶瘳瘳即減金液丹一二分增青州白丸子一二分同研如上服兼用異功散羌活膏溫白丸釣藤飲子之類仍類與粥雖至危者往往死中得生十救八九沈存中論金液丹見小兒吐利劇氣已絕服之得活者數人須多服方驗

**芫薺散**治吐瀉煩渴腹脹小便少

舶上硫黃

一錢五分

丁香

各半

右爲細末每服一字至半錢米飲調下無時

芫薺散治虛寒而渴

方見本條

白朮散治虛熱而渴

方見本條

吐瀉身溫瀉黃白似渴錢氏作寒熱雜合病治在夏秋用

玉露散益黃散相間服在冬春用益黃散大青膏相間服

之

虛

異功散溫中和氣治吐瀉不思乳食凡小兒虛冷病先與數服以正其氣

一方加木香

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮

各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片葱二枚同煎

云此方四君子湯補脾湯加減法也

溫中丸治小兒瀉白胃寒故也腹痛腸鳴吐酸水不思飲食霍亂吐瀉

人參

白朮

甘草

各等

右為末薑汁麪糊丸如菽苳大米飲下二三十丸無時

吐瀉昏睡露睛者胃虛熱吐瀉昏睡不露睛者胃實熱

虛熱  
實熱

胃虛熱治法錢氏白朮散和中散是也胃實熱治法錢氏玉露散河間益元散是也

寒痰 半粟散治小兒脾胃虛寒吐瀉等疾及治寒痰

半夏湯浸切陳粟米陳粳米亦得用三分

右咬咀每服三錢水一大盞半生薑十片同煎至八分食前溫服

**四** 白附丸方見上脾主濕條 錢氏吐瀉乳不化傷食也宜下之

乳不化 傷食 微瀉清 之其則 上之 馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食飲錢氏見兒目中黑睛

少而白睛多面色眇白曰此子必多病面色眇白者神怯也黑睛少者腎虛也黑睛屬水本怯而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不奈寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可

下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但宜以消積丸磨化之為微有食也如傷甚則可下不下則成癖也若實食在內亦可下也下畢補脾必愈隨其虛實無不效者

**丹** 小兒吐瀉黃疸

三稜

蓬朮

陳皮

青皮

神麩

麥芽

黃連

甘草

白朮

茯苓

右為細末生薑燈心湯調服傷乳食吐瀉加山查時氣

吐瀉加滑石發熱加薄荷

吐

虛  
**聖** 萬安膏調脾順氣定驚脾胃不足吐乳黃疸治小兒一切等疾

木香錢一

沉香錢二

檀香錢二

香附兩一

檳榔兩半

白朮兩二

肉蓯兩半

薄芎兩二

人參兩半

甘草兩二

辰砂錢三

琥珀

真珠

青黛

犀角各二錢半

黃芪兩一

麝香分五

史君子兩一

天竺黃兩半

右爲末煉蜜九臨臥服薄芎汁或蜜水米飲化下

④萬安膏治小兒脾胃虛弱腹生疳虫癥瘕食積泄瀉常服消疳去積助胃氣和中踈氣滯

人參兩一

木香

沉香

藿香各半兩

厚朴薑製

甘草兩半

陳皮

青皮

乾薑

肉桂各一兩

史君子兩一

澤瀉冬不用

半用

右爲末煉蜜九如芡實大食前米飲化下如熱薄芎湯

下一方無木香沉香藿香青皮四君子有白朮蒼朮

苓猪苓

**參**吐沫及痰或白綠水皆胃虛冷吐稠涎及血皆肺熱久  
則虛吐痰涎冷者溫之

寒吐

**回**朱沉丹治小兒嘔吐不止

硃砂二錢半

沉香二錢

藿香三錢

滑石半兩

丁香粒

粒

右爲細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油滴成花子

抄藥在上須臾墜瀝去水却用別水空心送下

定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止

半夏湯洗七次人參

白朮

木香

丁香

藿香名二錢半

右爲細末稀麪糊爲丸如李核大後用沉香一錢爲末



硃砂一錢水飛二味同研勻為衣陰乾每服一九用小  
棗一枚去核納藥在內濕帛裹燒熟嚼與小兒服後以  
米飲壓之

**香銀丸治吐**

丁香

乾薑各一錢

半夏湯浸切焙

水銀各半兩

右上一三味同為細末將水銀與藥研勻生薑汁丸如麻  
子大每服一二九至五七九煎金銀花湯下無時

**白朮散治小兒吐嘔脈遲細有寒**

白朮

人參

半夏麩錢各二錢 茯苓

乾薑

甘草各一錢

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去渣  
溫服日二三一方無半夏麩  
有木香當歸

**湯** 小兒寒吐者由乳母當風取涼解脫致令風冷入乳變

敗兒若飲之故嘔吐也乳母當食後捏去傷宿敗乳急服  
理中湯次用釀乳法其候是寒清痰夾乳吐出是也凡有  
此候服藥不效胃氣將絕藥不能下當服靈砂丸如大便  
通宜來復丹二藥常用驗

**四**吐乳尋田中蚯蚓屎研如泥食前米飲下五分不過三  
四次妙聖惠方

**服**熱吐藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔吐涎嗽及轉過度者宜  
服

麥門冬

去心

半夏炒

甘草

炙各半兩

藿香

一兩用葉

石膏

半兩

右爲末每服五分至一錢水一盞半煎七分食前溫服

**本**治小兒嘔吐脈數有熱麥門冬散

麥門冬

半夏

人參

茯苓

各二錢

甘草錢一

右爲末每服二錢水一盞薑三片煎至五分去渣溫服

日二三服

錢氏玉露散

方見吐瀉

**湯**治小兒伏暑嘔吐清膈飲子

香薷

淡竹葉各一

白茯苓

人參

半夏

檀香

甘草各半兩

白粳米合

右咬咀薑煎溫服大小加減

小兒秋夏伏暑多有熱吐其吐黃涎頭額溫五心熱小便

或赤而少乃熱吐也或乾嘔而無物宜香薷飲方見中暑

**本**治小兒疳積黃瘦吐食

川烏錢一

定粉錢三

艾灰錢二

龍骨錢二

右爲末滴水丸如龍眼核大捏作餅子每服一餅米飲

磨下

風寒吐

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀砂下

硃砂一分

鐵粉

天南星

各一分

去皮時

輕粉二分

右同研水銀星散盡為度薑汁糊丸如粟米大煎生薑

湯下十五丸至二三十九無時

藥方

田氏朱沉煎

紫金核方見上

治小兒吐不定用五倍子二箇一生一熟甘草一握濕

帛裹炮過同搗為末每服米泔調下半錢匕瘥

二氣散治虛實冷熱霍亂吐逆

硫黃

不夾石者  
細研半兩

水銀

一分與硫  
黃同研

右同研如墨煤色不見星為度每服一字至五分乾薑

水調下不拘時量兒大小加減此散浮泛難調先酒少

水以指緩緩研之稍稍增湯調之治大人小兒一切吐逆諸藥不效者服此頃刻如神

禁忌

凡小兒乳哺不宜飽滿飽滿而必溢故嘔吐 生下吐

見胎病

針灸

吐乳 灸中庭一壯

吐水吐虫

胃冷

面眈白無精光口中氣冷不思食吐水當補脾益黃散

主之

冬月吐鱿多是胃虛寒而重作吐用錢氏白朮散加丁香二粒

吐水不止者傷心痛胃冷 吐水心痛者虫痛 口中

吐沫水者後必重痛

泄瀉

虛

**萬安膏**治吐瀉腹痛吐乳

方見吐門

**海**吐瀉四君子加陳皮厚朴等分同煎

一法加陳皮薑棗

滑瀉

臟腑滑泄四君子加訶子五分米飲調下

傷食瀉

**黃承務子**二歲病傷食而瀉衆醫與止之十餘日便青

白乳食不消身涼加噤氣昏睡咸謂困篤召錢錢先與益

黃散補肺散各三服三日身溫而不噤氣後以白餅子微

下之又與益脾散三服利止何以然利本脾虛傷食初不

與下之留連十日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子

母故也今先補脾則肺病自退卽身溫不噤氣也然後下

其所傷或曰何不先下後補曰便青爲下臟冷若先下必

大虛今先實脾而後下則不虛矣後更與補之乃安

益黃散方

見小兒

大法

寒瀉

溫中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴

方見吐瀉

四瀉青亦是寒宜用蘇合香丸平胃散各等分蜜湯調服

四便青者因驚風內臑脾氣不和治宜白朮湯

四凡大瀉引飲者其病不以新久皆宜服白朮散癘病亦

同治

熱瀉

四小兒夏月泄瀉用益黃散 瀉黃赤黑皆熱用益元散

黃栢丸之類

疳瀉

四史君子丸治疳瘦泄痢腹脇脹滿

方見疳門

診

四小兒大便青澀飧泄脈小手足寒難已脈小手足溫易已

### 乳食不化

胃冷

四食不消脾胃冷故不能消化當補脾益黃散主之

四乳食不消初病忽然氣出冷四肢亦冷面白無光澤精

神不定此乃胃氣不和可以大溫藥治之史君子丸益黃

散主之 若病泄瀉日久不瘥乳食不化是脾胃有風冷  
先服益黃散二服後用宣風散導之胃宜再補

赤白痢

熱痢切宜下

治小兒痢疾

黃連

黃芩

大黃

甘草

右煎服赤痢加紅花桃仁白痢加滑石末

有積宜取

治痢之法若欲取積只用官局進食丸其穩雖取積又

能治痢萬無一失積已下急以四君子湯加荳蔻訶子補

之次服厚腸香連丸得效

證物不

治小兒赤白痢多體弱不堪下大困重者麻子一合炒

香熟為末

每服一錢七蜜漿水和服效

痢瀉痢日久不瘥

痢瀉痢日久不瘥

與積雜

瀉黃紅赤黑者皆熱瀉瀉青白穀不化者胃冷



白附香連丸治腸胃氣暴傷乳哺冷熱相雜渴痢赤白裏  
急後重腹痛扭撮晝夜頻併乳食減少

黃連

木香各錢

白附尖二錢

右末飯丸如粟米大每服十九至三十九米飲下食  
前日夜各四五服

萱薹香連丸治泄瀉不拘寒熱赤白陰陽不調腹痛腸鳴  
切痛立效如神

黃連炒三錢

肉荳蔻

木香各一錢

右爲細末粟米飯丸如米粒大每服十九至三十九  
日夜各四服食前米飲下

回木香丸治小兒泄瀉青白膿血相雜

黃連

吳茱萸同炒  
法棗羹一兩

肉荳蔻二錢

木香一錢

右爲細末麩糊丸如黍米大赤痢粟米飲下白痢厚朴

湯下空心

**錢**小香連丸治冷熱腹痛水穀利腸滑

木香

訶子肉各一分黃連兩

右爲細末米飲和丸如菖葦大每服十九至三十九  
食前頻服之

**湯**赤痢四君子加赤芍藥當歸入粟米少許同煎

熱痢

**湯**治熱痢備急方用井花水調騰茶蜜磨生薑湯則飲之

**錢**黃栢丸治小兒熱痢下血

黃栢半兩 赤芍藥四錢

右爲末飯和丸如麻子大每服一二十丸食前米飲下  
量兒加減

**本**治小兒赤痢搗青藍汁二升分四服

聖惠方治小兒中壘下血

**湯**治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去渣一歲

見一日服令盡

冷痢

白痢四君子等分加乾薑減半入粟米少許同煎

雜方

治小兒久痢淋瀝水穀不消枳實六分搗末以米飲調

二錢七二歲兒服一錢

小兒噤口痢酸乳法

厚朴

枳殼各五分

白朮

芍藥各半

滑石兩

木通

陳皮

甘草各五分

右分四貼細研桃仁七枚水二盞半煎取一盞與母服

服時去宿乳令盡為妙

黃連例錢氏

加黃栢為二聖丸

加橘皮為橘連丸

加榆仁為榆連丸

加黃芩大黃為三黃丸

加阿膠茯苓為阿膠丸

加訶子木香為小香連丸

加荳蔻木香為荳蔻香連丸

加木香白附子為

白附子香蓮丸治痢

加阿膠當歸乾薑為駐車丸治痢

對灸  
田小兒脇下滿瀉痢體重四肢不收痲癧積聚腹痛不嗜

食痰瘧寒熱 脾膈二穴在背十一椎下兩旁相去各一寸五分

明秋深冷痢不止 臍下二三寸間動脈中二壯 痢下赤

白脫肛 十二椎下節間三壯 又法翠尾骨上三寸骨陷

間三壯 又法龜尾一壯 脊端

腹脹附丁

虛家  
腹脹虛實 凡久病吐瀉之後虛則其脈微細肺主目

胞及腮脾主四肢若色淡黃目胞腮虛腫手足冷先服塌

氣丸後服異功散和中丸四君子湯益黃散之類用諸温

藥養真氣異功散和中丸方見吐瀉四君子湯方見治虛實法

塌氣丸

胡椒兩 蝎尾兩

右爲末糊丸如粟米大每服五七丸至一二十九陳米

飲下無時一方有木香一錢

**調中丸**治小兒久傷脾胃腹脹

乾薑

橘紅

白朮

茯苓

木香

砂仁

官桂

良薑各等分

右細末糊丸如麻子大每服二三十丸食後熟水下

**實則脈洪實**不因吐瀉久病後亦不因痢下腹脹而喘

急悶亂更有痰有熱及有宿食不化而腹脹者宜服白餅

子大黃丸解餅丸下之兼須詳認大小便如都不通先利

小便後利大便白餅子方見解○解毒丸方見喉痺○大黃丸方見傷寒

**小兒熱結於內腹脹壯熱大便赤黃躁悶煩亂者宜瀉**

奇丸

**腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂喘滿可下之用紫**

實者可下虛者

不可下

霜丸白餅子

此言未下而喘者爲實故可下若誤下而喘者爲虛氣附肺不可下也紫霜丸白餅子二

方見

不喘者虛也不可下若誤下之則脾虛氣上附肺而

行肺與脾子母皆虛肺主目胞腮之類脾主四肢母氣虛

甚卽目胞腮腫四肢黃色治之用塌氣丸漸消之未愈漸

加丸數不可以丁香木香橘皮荳蔻大溫散藥治之何以

然脾虛氣未出故雖腹脹而不喘可以溫散藥治之使上

下分消其氣則愈矣若氣虛已出附肺而行卽脾胃內弱

每生虛氣入於四肢面目矣小兒易爲虛實脾虛則不受

寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此勿誤也胃久虛熱

多生疔病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣上行於四

肢而目腫若水狀腎氣漫浮於肺卽大喘也此當用塌氣

丸病愈後面未紅者虛衰未復故也

此下後喘故宜塌氣丸若未下而喘宜下

之○治腹脹者譬如行兵戰寇於林寇未出林以兵攻之

服未下而喘爲實已下而喘爲虛

虛脹用  
塌氣丸  
不愈宜  
下

痰積脹

必可獲寇若出林不可急攻攻則必有失當以意漸收之  
卽順也寇未出林謂虛氣未出而不喘不目胞腫故可  
用丁香木香大溫散藥上下分清其氣而愈也寇  
已出林謂虛氣已出爲喘爲  
目胞腫須用塌氣丸漸消之

治小兒虛腹脹先服塌氣丸不愈腹中有食積結糞小便  
黃時微喘脈伏而實時飲水能食者可下之蓋脾初虛而  
後有積所治宜先補脾然後下之後又補脾卽愈也不可  
補肺恐生虛喘

阿魏丸治小兒食積腹如蜘蛛狀肚痛小便白濁

阿魏醋浸一宿研  
如此半兩

黃連炒半兩 花碱研如粉  
三錢

山查肉一兩 連翹半兩 半夏皂角水浸  
一宿一兩

右爲末炒神麴糊丸如荀子大每服二十九空心米飲  
下喫果子多者加胡黃連米食多者加神麴山查肉食  
多者加阿魏

又阿魏丸

阿魏

一兩

黃連

六兩

右爲末醋浸阿魏一宿研如泥湯浸蒸餅丸如元氣不足加人參

小阿魏丸

山查肉

三兩

石碱

三錢

半夏

一兩

右爲末阿魏半兩醋浸糊丸白湯下

小兒疳病或腹大

胡黃連

二錢去果

阿魏

一兩半

神麩

二錢去

食積

黃連

二錢去熱積

麝香

四粒

右爲末每服十二粒白木湯下

**無**肥兒丸治小兒病多因缺乳喫食太早所致或因久患臟腑胃虛虫動日漸羸瘦腹大不能行髮豎發熱無精神



黃連

神麴各一兩

麥芽炒半兩

木香二錢

檳榔

三箇不見火

史君子

肉苳蔻

各半兩

右爲末糊爲丸如桐子大每服三二十九量兒加減熟水吞下

六神丸治如前證

丁香

木香

肉苳蔻

用麴裹煨各五錢

訶子

煨去核半兩

史君子

蘆薈

研各一兩

右爲末以棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米飲下食前

疳積  
名治法

丁奚者腹大頸小黃瘦是也無辜哺露三候大體相似輕

重立名宜服十全丹

十全丹治丁奚哺露神效方

檳榔

枳殼炒

青皮

陳皮

三稜炒

蓬朮炒

砂仁各半

丁香

木香各一

香附兩

右爲末神麴糊丸如黍米大空心食前米飲下百丸一方去香附砂仁丁香三稜枳殼加五靈脂白蔻史君子

蘆薈蝦蟇川芎

**四**治小兒腹如蜘蛛四肢瘦者用黑骨雞子破頂入蜘蛛一枚於內以濕紙糊竅用文武火煨熟去蜘蛛食其雞子累效必數枚方愈

實者分氣消積

**四**中滿分消丸

黃連

枳實

厚朴各五

乾薑

藜蘆

猪苓

砂仁

澤瀉

茯苓各三

陳皮

白朮各一

半夏四

黃芩二兩

甘草一

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九丸溫酒送下  
消痞丸快利之劑

黃連

半斤

枳實

黃芩

甘草

人參

各三錢

厚朴

七分

乾薑

四分

橘皮

錢一

薑黃

五分

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三十九丸隨乳下

母腹脹

蘿蔔子

蘇梗

乾葛

陳皮

各等分

甘草

半斤

如食減加白朮煎服

虛者升  
陽氣血

升陽滋血湯二月間一小兒未滿百日病腹脹不大便

二日便瘦弱遍身黃色宜升陽氣滋血和血補血利大便

蝎稍

二分

神麩

三分

厚朴

當歸

錢

桃仁十

升麻三

右作一服水一盞煎至半盞去查食前服

麻黃升麻湯治小兒面色痿黃腹脹食不下正月四月小兒服之神效

麻黃二

桂枝一

杏仁

吳茱萸

草薺五

厚朴

麩末

羌活各一

柴胡根五

白茯苓一

白朮

青皮各五

升麻根

蒼朮

澤瀉

豬苓

陳皮各一

黃連五

黃栢一

右咬咀作一服水一大盞煎七分去查食前熱服

寄子年五歲痘後肚急

白朮一

陳皮

木通各五

犀角屑

川芎

白芷

蘇梗

甘草各三分

右咬咀水煎服

針灸

田治腹脹引背食飲多漸漸羸瘦黃可灸脾脘二穴七壯在十一頰下兩傍相去各一寸五分黃疸灸三壯

小兒腹滿不能食飲懸鍾主之

丁奚即服治見張門丹溪條

水腫

滲氣

白文舉兒五歲身面皆腫尿多

山梔炒

桑皮炒各一錢

黃芩二錢半

白朮

蘇梗各一錢半

右咬咀作三貼水一盞半煎至半盞食前溫服

退腫散氣方

赤小豆

陳皮

蘿蔔子

甘草灸各半兩

木香炮七分

右為瓮末薑蔥煎服大小加減

又方

白朮炒

木香炮

甘草炙

茴香炒

青皮

各半兩巴豆三十粒去膜同青皮炒去巴豆不用

右為末米飲調下

又方用錢氏益黃散加木香去丁香加蘿蔔子去訶子為末大小加減米飲調下

水腫加喘難治

**錢**腫病腎熱傳於膀胱熱盛逆於脾胃脾虛而不能制腎水反尅脾土脾隨水行脾主四肢故流走而身面皆腫也若加喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土反勝心火心又勝肺肺為心尅故喘或問曰心刑肺肺本見虛今何喘實曰此有二一者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍侵於肺故令大喘此皆難治

針灸

明水氣浮腫 分水三壯

疳

大法

疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易  
為虛實致令胃虛而三津液內發虛熱外消肌肉一臟虛  
則諸臟皆弱其病目胞腫腹脹痢色無常漸加瘦瘠久不  
痊可是腸胃有風積法當宣風散導之後各依本臟補其  
母

諸疳皆依本臟補其母及與治疳藥冷則木香丸熱則  
胡黃連丸主之疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸  
瘦弱此冷證也宜史君子丸

疳在內  
脈滿

史君子丸治臟腑滑及疳瘦下痢腹脹滿不思乳食常  
服安虫補胃消疳肥肌

厚朴

去麩皮薑汁  
半兩

史君子

去殼一兩  
麩裹煨

陳皮

去白一分

甘草

炙到半兩

訶子

半兩半生

半兩半生

青黛

半兩是兼驚及帶熱渴者宜此方如只藏府不調不用青黛

右爲細末煉蜜和丸如小雞頭大每服一九米飲化下  
兒生百日已上三歲已下服半丸乳汁化下元无青

黛

厚腸丸治小兒失乳以食飼之不能化或生腹脹四

肢瘦弱或利色無常

陳皮

三分

麥蘖

五分

半夏

三分

枳殼

五分

蒼朮

三分

青皮

二分

人參

三分

厚朴

二分

麩末

五分

右爲細末麩糊丸如麻子大每服二十九溫湯送下忌

飽食

本等朴丸治小兒疳瘦瀉白水腹脹



茅竅

厚朴各一兩

白朮半兩

右爲細末煉蜜丸如小彈子大每服一九米飲化下三歲已下半丸

**治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵爲散每服以猪肝一兩散子一錢七塩少許水煮熟空心頓服**

**小兒腹大泄瀉水穀不化喫食不知飢飽累效**

神麩炒

麥芽炒

三稜

青皮

香附

山查

厚朴

甘草

藿香

枳實

地黃

砂仁

黃連

棗子各等分

右爲末白湯調下量兒加減

**一富家子年十四歲面黃善喫易飢非肉不飽泄瀉一**

以而安  
食爲主

月來求治脈之兩手皆大怪不甚瘦倦以爲濕熱當脾胃而食少今反形健而多食且不渴予意其疾必疳作痢也取大便秘之果蛭所爲適往他處有一小兒醫在側教其用治虫藥治之禁其勿用去積藥約回途當爲一看診而止痢也偶勿果至次年春夏之交其瀉復作腹不痛而口乾予曰此去年治虫而不治疳故也遂以去疳熱之藥濃煎白朮湯下三日而瀉止半月後偶過其家見其子甚瘦予教以白朮爲君芍藥爲臣川芎陳皮黃連胡黃連入少蘆薈爲丸白朮湯服之半月而止禁其勿食肉與甜物三年當自愈

**蘆薈**大蘆薈丸治疳殺虫和胃止瀉

胡黃連

黃連

白蕪荑仁用

蘆薈

木香

青皮

雷丸

破開白者佳赤者勿用

鶴虱微炒各一錢 麝香另研一錢

右爲細末粟米飲和丸如菴荳大米飲下一二十九不拘時

胡黃連麝香丸治疳氣羸瘦出白虫

胡黃連 白蕪荑仁各一兩半

黃連

木香各半兩 辰砂另研一分 麝香另研一錢

右爲細末麪糊丸如菴荳大米飲下五七丸至十九三五歲已上者十五丸至二十九服無時

榆仁丸治疳熱瘦悴有虫久服充肥

榆仁去皮 黃連去鬚各一兩

右爲細末用猪膽七箇破開取汁與二藥同和入碗內甑上蒸九分每日一次候日數足研麝香五分蒸餅湯浸一宿同和成劑丸如菴荳大每服五七丸至一二十

九米飲下無時

右四方治瀉而多食爲重症也

**木香丸**治時時下利唇口青白 如聖丸治冷熱痢瀉

瀉而少食爲重

二方並見本條

没石子丸治洩瀉白濁及痢利滑腸門痛

木香

黃連各一分

没石子一枚

葶藶仁二箇

訶子肉三箇

右爲細末飯和丸如麻子大米飲下十五丸量兒加減

食前

**休息痢**及痢瀉痢遷延日月百藥俱試飲食不妨便痢不止用雞子一枚打破鎔黃蠟一塊如指大以雞子和炒空心喫盡百發百效無不獲安

**小兒疳痢**垂死者取益母草炙食之取足瘥止甚佳

右治瀉而少食爲冷疳也

獨脹不瀉治法見脹門

疳在外

疳在外鼻下臭爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸透耳生

瘡

走馬牙疳神效乾薑白礬炙子燒焦存性爲末傅患處

鼻疳治法先用甘草白礬湯洗淨後糝蘆會黃連黃柏

末日三傳一方用米泔洗黃連末傳日三四次亦佳

紅鉛散治走馬疳綠礬不以多少色鮮明者入乾鍋用

炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻再入鍋如此數遍色紅

研作細末入麝香少許先以溫漿水洗嗽淨用指蘸藥有

疳處貼之

乳香丸治走馬牙疳如神

乳香

輕粉

砒研各五分

麝香少許

右先將乳香研細入輕粉麝共再研勻用薄紙一張葉潤去藥內按過搽紙少許丸如黃米大臨臥將藥填在患處至明則愈忌食醬醋鹽等物

**蘭香散治鼻瘡爛**

蘭香葉

燒灰  
二錢 銅青

五  
分 輕粉

二  
錢

右末令勻看瘡大小乾貼之

**龍骨散治口疳走馬疳**

砒霜

一  
錢 粉霜

一  
錢 龍骨

一  
錢 定粉

龍腦

半  
錢 蟾酥

右先研砒粉極細次入龍骨等研次入定粉等同研每

用少許傳之

**經** 治小兒走馬疳蝕透損骨及小小攻蝕必效方天南星

一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麪裹燒候雄黃作

汁以蓋子合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘡驗  
白粉散治諸瘡

烏賊魚骨末七

白芨末七

輕粉七

右末先用清漿水洗拭過貼之

**山**小兒牙疳用茴香桔梗燒灰存性傅之如乾油調傅

**湯**五福化毒丹治腫鼻清膈涼血

玄參

桔梗去蘆各一兩

赤茯苓

人參

牙硝

青黛

甘草各一分

麝香五分

一方有龍腦五分

右除麝香牙硝另研一處爲末次和青黛等煉蜜丸如

芡實大金銀箔爲衣薄荷湯化下瘡疹餘毒磨生犀角

水下上焦熱壅口齒鮮血宣露臭氣用生地黄汁化下

食後

寒熱

大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥熱疳久病者為瘦冷疳是也冷者木香丸熱者黃連丸主之冷熱之疳尤宜服如聖丸

胡黃連丸

胡黃連

黃連

各半

硃砂

一分

右上一二物為細末研入硃砂末都填入猪膽內用淡漿於砂銚子內懸胎煮一飯時久取出研入蘆薈麝香各一分飯丸如麻子大每服五七丸至一二十九丸米飲下食後一方加蝦蟇半兩不燒

木香丸

木香

青黛

檳榔

肉蔻

去皮各一分

麝香

另研一分

續隨子

一兩

半少蝦蟆

三箇先用繩繫

兩乾絲存性

右末蜜丸如棗大每服三五丸至一二十九丸薄荷湯



下食前

如聖丸治冷熱疳瀉

胡黃連

川黃連

白蕪荑

去皮炒各三兩一本作一兩

史君子

去殼一兩麝香五分

乾蝦蟆

五箇酒浸煮成膏

右前藥為末與膏丸如麻子大每服人參湯下二三歲

五七九已上十九至十五九無時

**小兒冷疳**多渴好臥冷地煩躁啼叫飲食不進漸成羸瘦其候難明有若熱證但大便滑泄百藥不效是也因女子百藥俱試而無偶中者竟與錢氏木香丸不數服而愈  
自後凡有此證無不獲驗

攝

錢氏肝疳白膜遮睛

湯氏肝疳眼白青兩眼睛痒

萌

錢氏筋疳瀉血而瘦並當補肝地黃丸主之

方見勞瘵節六味地黃丸

驚疳疔香丸治小兒一切驚疳等病

草龍膽

胡黃連各半

木香

蟬蛻去頭足洗淨各

一錢

瓜蒂

龍腦

麝香

牛黃

各一錢並各自研

右猪膽爲丸如桐子及芟豈大驚疳或秘或瀉清米飲送下小兒五七粒至一二十粒眼疳猪肝湯下疳渴燂猪湯下猪肉湯下亦得驚風發搐眼上窺薄苛湯下一九更水研一九滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼疳痛苦練根湯或白蘘蕪湯送下百日內小兒大小便不通水研封臍中有虫候乾漆麝香各少許并入生油一兩點溫水化下一大丸慢驚勿服

睡驚丸治小兒一切驚疳食積風癩之證

史君子

五十塊香墨大塊

金銀箔各七片膩粉二錢

右先將史君子存性同墨研細次入金銀箔乳鉢內研  
次入膩粉并麝香少許研令極細稀糊丸如桐子大陰  
乾每服一九薄苛湯磨下一歲已下半九一名青金丹  
極效

田氏涼瀉丸治小兒驚熱疳瘦乳癖方見

錢氏心疳面黃頰赤身壯熱當補心安神九主之方見治

湯氏心疳口内生瘡

田氏安神九治心虛疳熱面黃頰赤壯熱驚啼神志恍惚

不寧方見治

煎甲散治疳勞骨蒸

煎甲九助者湯浸

黃芪蜜炙

白芍藥各一

生熟地

地骨皮

當歸

人參去蘆各

右咬咀每服二錢水半盞煎服

猪肚丸治骨蒸疰勞肌體黃瘦

木香半兩

黃連

生地

青皮

銀柴胡去蘆

鱉甲

九肋者湯浸用童便塗炙各一兩

右爲末猪肚一枚入藥於內以線纏之於沙碓內懸胎煮熟取出細研猪肚爲丸如麻子大米飲送下大小加減不拘時服

龍膽丸治疰病發熱

龍膽

黃連

史君子肉

青皮

各等分

右爲末猪膽汁和丸如桐子大每服三十粒量兒加減臨臥熱水下

右四方治疰熱安神丸其寒補心鱉甲散其溫補脾後二方苦寒瀉脾瀉濕熱也

烏犀丸治小兒疰熱腹内生虫肚大手足疲弱丁奚疰

羸此方治疳  
熱如神

黑牽牛二兩

史君子七錢

青皮二兩

雷丸二錢

苦練皮半兩一方不用練皮用蓋二錢半

鶴虱五錢

右同入鍋內炒焦為末麪糊丸如黍米大三歲見二十

九米飲下食前烏犀丸食後黃龍丸

二丁丸治乳癰食癰疳熱如神方見神錄

疳熱當服進食丸磨積仍間服化虫丸後服驚甲散退

熱次服肥兒丸進食丸方見癰疳甲散方見前

治疳熱化虫丸

白蘗英

黃連

神麴

麥芽各炒等分

右末糊丸如黍米大空心米飲下猪膽汁尤佳

肥兒丸方見前

右疳熱當以積熱門參用如熱有作止者與潮熱門參

用可也

脾疳

脾疳面黃腹大食泥土當補脾益黃散主之

方見治虛實法

脾疳食不消胃疳多吐

大胡黃連丸治一切驚疳腹脹虫動好喫泥土生米不

思飲食多睡吼嚔臟腑或瀉或秘肌膚黃瘦毛焦髮黃飲

水五心煩熱能殺虫進飲食兼治瘡癬常服不瀉痢

唯泥如切

飲喉

胡黃連

黃連

苦練子各一兩

白燕去扁半兩

秋初三錢

乾蟾頭燒存性另研一分

麝香另研一錢

青黛另研一錢半

蘆薈另研一分

右先將前四味爲細末猪膽汁和爲劑每一丸如胡桃大入巴苳仁一枚置其中用油單紙一重裹之同米一升許蒸米熟爲度入後四味爲丸少入麪糊丸如麻子

大與十九或十五九清米飲下食後臨臥日三服

**大蕪薹湯**又名梔子茯苓湯治黃疸土色為熱當小便

不利今反利者知黃色髮黃脫落知膀胱腎俱受土邪乃濕熱之症鼻下

斷作瘡者土逆行營中能乳者胃中有熱故也喜食土者胃氣不足面色

黑者為寒大便青屬褐色血黑色熱高血中問黃色腸胃治法

當滋營潤燥內除寒熱外致津液

山梔三分 黃柏二分 甘草二分 大蕪薹五分

黃連一分 麻黃一分 羌活一分 柴胡各三分

防風一分 白朮五分 茯苓三分 當歸四分

右件剉如麻荳大作一服水一盞半煎至一盞去查稍

熱服食前

右三方治疰黃食土前一方便多者宜服後二方便多

者宜之

疳黃食積

白朮

黃連

苦參

山查

各等分

右用糊丸如麻子大食後白朮湯下十五丸

小兒疳黃雞彈劍一小窠入巴荳淨一粒紙糊孔煨熟去巴荳食之隔一日再喫一二箇

小兒喫泥石膏黃芩陳皮茯苓甘草白朮散煎服

治小兒喫泥及臍肚膩粉一分用沙糖搜丸如麻子大

空心米飲下一丸瀉出土瘡

腹如掌切服也

初病疳津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多則

妙

龍粉丸治疳渴

草龍膽

定粉炒

烏梅肉焙

黃連各二分

右為細末煉蜜丸如麻子大米飲下一二十九無時



三稜散治小兒尿白濁久則成疳宜疎脾土消食化滯

三稜

蓬朮炒

益智仁

甘草各一兩

神麩炒

麥芽炒

橘紅各半兩

右爲末白湯調下

黃龍丸治停食化積磨積

三稜

蓬朮各三兩

青皮

陳皮各一兩半

山楂

乾薑各七錢半

檳榔兩

右晒乾爲末糊丸黍米大三歲兒每二十九食後薑湯

下食前烏犀丸相間服此治小兒疳積等證無不效者

烏犀丸方  
見疳熱條

膽礬丸治疳消癥進食止瀉和胃追虫

綠礬真者二兩

膽礬真者爲麩末一錢

大棗四十箇去核

好醋升

已上四物同熬令寒爛候和後藥

史君子

去殼  
二兩 枳實

炒三 黃連

訶子

去核  
各

各一  
兩

巴荳

二十七箇  
去皮破之

已上五味同炒黑約三分乾入後藥

夜明砂

蝦蟆

燒存性  
各一兩 苦練根皮

已上三味再入炒候乾同前四物杵羅爲末同前膏和

入臼中杵千下如未成旋入熟熏肉亦不可多恐服之

難化太乾卽入溫水亦可丸如棗荳大每服二三十丸

米飲溫水下不拘時

**肥兒丸**治小兒疳積

蘆薈

另研

胡黃連

各二錢 神麩

四錢 黃連

白朮

山查

炒各  
半兩

蕪荑

炒二錢  
半

右爲末將蘆薈末拌勻猪膽汁丸如粟米大每服六十

丸食前白湯下

**本**蘆薈丸治小兒疳積秘方

蘆薈

荊芥

黑丑

青皮

各等分

右治炮爲末麪糊丸如粟米大一歲兒已下一丸或二丸亦不妨量大小加減

肺疳

**肺**疳氣喘口鼻生瘡當補脾肺益黃散主之

方見治虛實法

腎疳

腎疳極瘦身有瘡疥當補腎地黃丸主之

方見勞瘵卽六味地黃丸

**湯**腎疳齒爪黑

右腎疳羸瘦瘡疥治法當與虛羸門相參用之

骨疳

**骨**疳喜臥冷地

**湯**木香丸治渴好臥冷地

疳方

**世**五疳保童丸治小兒乳食不擇冷熱好食肥膩恣食甘

鹹臟腑不和生疳

青黛

苦練根皮

夜明砂

五倍子

蘆薈

黃連

龍膽草

白蕪荑

乾蟾各一分

麝香少

蟬腿去嘴瓜一分

猪膽大者五分

藥焙

右件粟米煮糊爲丸如麻子大一歲兒三九不拘時米飲下日三服忌猪肉

屠者

治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連滴三五日效

小兒腦疳者是胎熱所爲但頭皮光急頭髮作穗或有頭瘡腫至顙顙腫則多損眼此疾因兒在胎中母臨月房事不已而成項軟倒肥而不瘦天柱骨倒也

附子生去皮 南星

右末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青丸

疥項瘡

四小兒久患疥疾體虛久不進飲食患久諸候退只是天柱骨無力醫者不識謂之五軟用白殭蚕真者去絲炒爲末每服五分或一錢薄苛酒調下日三更須貼藥貼藥生筋散

木鱉子

三箇

草麻子

三十粒

右各取肉同研用一錢津調先烘上令熟貼之

右疳五軟蓋痿屬也不若用地黃丸及黃柏龜板之類爲愈

髮疔

四小兒無辜疔者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無辜疔也言天有烏名曰無辜晝伏夜游洗浣衣褥露之經宿或過此烏飛從上過將衣褥與小兒穿臥便令兒有此疾如禽獸生下有鱗魚若不速去當損其命又腦後有核初生軟而不覺痛其中有

垂如米粉得熱氣漸長大則筋結定重隨氣血流散所以  
停留子母相生侵蝕臟腑肌肉作瘡或大便泄膿血致使  
小兒漸漸黃瘦頭大髮堅手足細弱生十二件無辜疾症  
天吊 胡孫燐 鷺口 木舌 懸癭 重齶 着癩  
臍風 撮口 重舌 乳淵 龜胸

驚甲散

驚甲

醋炙三分

檳榔

沉香分

漏蘆

甘草

炙

牛蒡子

炒

史君子 赤芍藥

訶子

炮去核各半兩

右為碗末每服一錢水半盞煎六分去渣溫服

針灸

多疔者

願會

壯 瘡蝕斷斷具穢衝人

勞官

壯

診

疔疔皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐瀉後醫又  
以藥吐下致脾胃虛弱亡失津液且小兒病疔皆愚醫之

所壞病假如潮熱是一臟虛一臟實而內發虛熱也法當  
補母而瀉本臟則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲  
心母法宜先補肝母肝實而後瀉心心母氣則內平而  
潮熱自愈醫見潮熱妄謂其實乃以大黃牙硝葶諸冷藥  
利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如癰病  
發作寒熱飲水脇下有形硬痛法當用藥漸消磨之醫反  
以巴豆礪砂葶駛熱下之小兒易虛易實下之既過胃中  
津液耗損漸成疳瘦又有病傷寒五六日間有下證以冷  
藥下之太過致脾胃虛而津液少即便引飲不止而生熱  
也熱氣內耗肌肉外消他邪相干証變諸端亦成疳病又  
有吐瀉久病或醫妄下之其虛益甚津液煩燥亦能成疳  
也

小兒病癰由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不止或

喘而嗽與潮熱相類若不早治必成勞瘵以其有癥瘕則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多卽蕩滌脾胃亡失津液不能傳化水穀其脈沉細益不能飲食致脾胃虛衰四肢不舉諸邪遂生羸瘦而成瘵矣

肥瘵卽脾瘵也身瘦虛黃乾而有瘡疥其候不一種種異端今畧舉言之目濇或生白膜唇赤身乾黃或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬚作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也

不治症

心瘵者

苦要驚啼常只喫水少食辛味耳邊有青脈舌

上有焦點者不治○肝瘵者目帶青左脇下硬多吐沫眼

頭黑者不治 脾瘵者肚大青筋脛口無血色人中平下

痢不止者不治 肺瘵者咳逆氣急瀉白水身上黑斑者

不治 腎瘵者要與鹹醋喫水不住小便如粉汁齒黑有



瘡骨出耳乾腦焦不治

虛羸

寒熱

虛羸脾胃不和不能食乳致肌瘦亦因大病或吐瀉後

脾胃尚弱不能傳化穀氣有冷者時時下痢唇口青白有熱者身壯熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸主之夏月不可服如有證則少服之熱者胡黃連丸冬月不可服如有證則少服之

虛羸與疳同治也○木香丸胡黃連丸方並見海錄

小兒疳積其狀漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸乃積而生熱成疳也宜服蘆薈丸露星膏

蘆薈丸

龍膽草

黃連

燕薹

去皮先炒黃色次入前二味一處炒赤色

各一兩

右爲末另入蘆薈一分和勻細飯丸如黍米大二歲兒

服三十九空心米飲送下

露星膏

黃芪

蜜水灸

胡黃蓮

地骨皮

柴胡

各等分

右爲末煉蜜丸如芡實大隔宿酒浸露一宿次日澄去酒薄許湯浸服之

**橘**連丸治疰瘦久服消食和氣長肌肉

橘皮

兩

黃連

米泔浸一宿一兩半

右爲細末另研入麝香五分用猪膽七箇分藥入膽內漿水煮候臨熟以針微刺破以熟爲度煮粟米粥和丸如菜豆大每服十九至三十九米飲下量兒加減無時每歲云黃連若燥可以湯煎火氣加也

二聖丸治小兒臟腑或好或瀉久不愈羸瘦宜常服

黃連

兩

黃栢

去粗皮各一兩

右爲細末入猪膽內重湯煮熟丸如菖荳大每服二三十九米飲下量兒加減頓服無妨

左 濕 小兒疳病肌羸血氣不足同大人勞瘵之疾治之

右以潔古此言論之不拘冷熱虛羸皆用四君子地黃丸與前藥相兼服爲得也

雜方

又方治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鰲頭一枚燒灰杵末新汲水下五分匕立可

針灸

羸瘦不生肌膚 胃脘灸一壯

小兒疳瘦於胸下骨尖上灸三壯次於脊下端尾翠骨尖上灸三壯

小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦悴諸方不瘥者取尾翠骨上三寸骨陷中灸三壯

小兒身羸瘦黃脈腹腫四肢懈惰肩背不舉章門二穴各

灸七壯

母氣不足則羸瘦肉極

鶴節即虛羸之異名也

虛

小兒鶴節由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦瘠則骨節皆露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故治法宜錢氏地黃丸加鹿茸牛膝

宿食

脾

消食丸治宿食不消又名消乳丸

砂仁

陳皮炒

三稜炒

神麩炒

麥芽

炒各半兩

香附炒

右末麩糊丸如麻子大食後白湯送下大小加減

七聖丸

三稜

蓬朮

川練

青皮

陳皮

芫花

杏仁

右件等分先用醋浸芫花一宿炒漸乾次入蓬蘽同炒赤色又入陳練等再同炒一處令微焦取出爲末前藥如各半兩杏仁亦用半兩湯浸去皮尖雙仁不用細研入巴菝二十粒去油和勻醋糊丸如黍米大一歲兒常服二丸臨臥溫熱湯送下使日間所殮之物一夜而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒今之小兒可去巴菝只入杏仁名七聖丸是也

痞

虛

枳朮丸

方見內傷飲食

○飲食不進四君子加薑棗煎○枳實

理中丸

方見傷寒

實

痞者塞也其病腹內氣結脹滿壯熱是也當疎利大便破結散氣常服進食丸

**甘遂散**治小兒痞結雖服湯藥暫利而滯實不去心下堅脹按之輒啼內有伏熱破結

甘遂

炒

青皮

黃芩

大黃

炒各

右咬咀煎去渣服量大小加減以利則止用之無不效

**醫**戶部張侍郎小娘子患此蘊積結聚已經年矣其候腹滿壯熱大小便閉不食諸醫皆作虛熱潮熱或作胃寒不食治然既不食大小便自然少又欲作疴熱治百藥俱試而無一中勢已窘迫招予視之問曰合服何藥答曰當服甘遂大黃張驚駭曰前諸醫者皆用補劑此女不進食久矣不宜利動腸胃予答曰信我者生逆我者死張曰更有無甘遂而次於此藥方者可否予令即服大承氣湯二服而愈次日診之尚有餘滯積實其症必過數日而腹閉須服前藥始可除根數日後果再閉腹滿痞結再投此藥一

服而痊

小兒急欲乳不能食由客風熱入兒膈流入心脾經卽  
舌厚唇燥口不能吮乳當涼心脾

哺露

虛

哺露者因乳哺不消脾胃衰弱漸不能食血氣減損肌  
肉不榮柴骨巖露吸吸苦熱謂之哺露也宜麝香進食丸  
方見  
本條

癖

診

湯小兒積症而黃腫

肚脹

面合臥地

小便

如油

多嘔

眼暗黃

腹內虛鳴

多睡

眼白黃

赤白痢下

髮黃

眼赤

多瀉

瘵

凡有積滯須辨虛實况孩兒虛瘦長短黑白南北古今不  
同不可一槩論也予今之法實者可服進食丸虛而微白

及疳瘦者宜服肥兒丸

肥兒丸方見疳門心疳條爲丸如黍米大兒一歲十九飯飲下

小兒腹中有癖不食但飲乳是也當漸用白餅子送下

白餅子

滑石

輕粉

半夏湯洗焙乾

南星各一錢

巴菝

二十四箇去皮膜水一升煮水盡爲度

右研勻巴菝後入衆藥以糯米飯爲丸如小菘荳大捏作餅子兒三歲已上三五餅四歲已下一二餅蔥白湯下臨臥服

固進食丸治乳食不化心胸脹滿疳積肚疼

木香

地枳殼去白炒

當歸

代赭石

硃砂

另研三錢

巴菝去油膜一錢

麝香另研五分

右爲細末麪糊爲丸如黍米大一歲二丸量兒大小加減米飲送下



雙聖丸治小兒身熱頭痛飲食不消心腹脹疼痛大小  
便不利或下重數起未瘥可再服

巴菝

六十箇去皮  
心膠研去油

甘遂

麥門冬三兩  
去心

五錢

甘草炙一兩

硃砂另研一錢

牡蠣二兩

生核取仁四兩  
半另研

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味爲細末入巴豆硃砂麩  
仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸兒半歲服  
如蘇子大兒一歲服如麻子大分爲二丸兒二歲服如  
麻子大一丸兒三四歲服如麻子大二丸五六歲服如  
麻子大三丸兒七八歲服小葶大二丸兒十歲微大如  
小葶大三丸以雞鳴時分服之如至日出不下者熱瘳  
飲散合投之卽下丸藥皆雙出也若利甚濃而冷粥數  
合與之卽止

魚

**珠珀丸**治小兒一切積聚驚涎宿食乳癖大小便澀滯  
療腹脹行滯氣

巴豆仁

十四箇水浸  
一宿細研

木香

白丁香

丁香

各五分

滑石

二錢

輕粉

五分留少  
許為衣

右為末研勻濕紙裹燒粟米飯為丸如麻子大一歲兒  
一丸八九歲至十五歲服八丸枣子煎湯放冷下如挾  
風熱難動者先服涼藥一貼乳癖者臨臥服數丸

**消積丸**治小兒食積氣濕氣面黃白多腫大便黃赤酸  
臭

砂仁

十二箇

丁香

九粒

烏梅肉

三箇

巴豆

去油  
三粒

右細末糊丸如粟米大三歲已上五六丸已下二三丸  
用溫水下無時服大凡小兒身溫壯熱非變蒸之候大  
便白而酸臭為胃有畜冷宜此藥消下後服溫胃藥若

身溫壯熱大便赤而酸臭爲胃有畜熱宜此藥下後服

涼胃藥無不愈

方有史  
君子七散

乳癖

**乳癖**丁香化癰散治乳癖

白丁香

蜜陀僧

硫黃

已上各  
錢二錢 礪砂

五分

輕粉

少許

右研細末每一歲兒服五分男病女乳調女病男乳調  
出下黑糞爲度後用通膈丸泄之

**四**二丁丸治小兒乳癖

白丁香

兩半

丁香

蜜陀僧

各一兩 韶粉

錢一

硫黃

錢三

右細末糊丸如小荳大三歲兒十九日哺時米飲下飲  
乳者乳汁下次日當取下惡物熱即隨退加黃芩屎一  
錢尤妙

紫霜丸

代赭石

細研水飛二錢

巴豆

二十一粒去油心皮膜

杏仁

二十一箇去皮尖

右爲細末飯丸如粟米大每服三五丸至十九丸皂莢子

湯下無時海藏云五色加減並見治法

**湯驚癇**須用礞石藥方可治之

右七方治癇皆峻劑若稍涉虛者必用四君子及益黃散之類兼服之

氣癇

**氣癇**治小兒氣癇取三稜針作羹粥以米麪爲之與乳母

食每日取一匙大與兒喫亦得作粥與羹熟食之治小兒

十歲已下及新生百日無問癩熱無辜疔癇等皆理之妙

不可言者

針灸

**田**小兒癇氣久不瘥者灸中脘一穴章門二穴各七壯章

門在大橫外直臍季脇肋端側臥曲上足伸下足舉臂取  
之 中脘在上脘下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中  
從髑髀下取病人四指定穴併灸臍後脊骨中二十七壯無  
不驗

脾弱多困

虛

脾胃不和四君子加白朮一倍薑棗煎 脾困四君子  
加木香砂仁人參各半錢煎 脾胃虛弱生氣多困四君  
子加炒半夏麩沒石子等分爲末入冬瓜子少許同煎

治脾風多困用人參散入慢驚參用

人參

冬瓜仁

各半

南星

切片用漿水薑汁黃存性一兩

右爲細末每一錢水半盞煎二三分溫服

渴

渴有三種 一者乘熱積於心脾煩燥大渴引飲宜白

湯謂不因吐瀉大病忽然而作

虛熱

二者因久病或取轉過度致脾虛引飲宜白朮散

方見消藥

海藏云治發渴四君子加乾葛枇杷葉

先以薑湯煎過又乾用

各等

分入木瓜少許同煎服亦治虛渴法也

濕熱

三者因患濕熱病熱結膀胱小便不利大渴引飲有表裏症者宜五苓散主之

### 大小便不通

發方

**無**小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人以溫水

先嗽口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次嗽口吸咂取赤紅爲度須臾自通不爾無生意有此證者遇此方可得再生矣

**回**生下不大便治法先以硬蔥針縫入肛門如大便不下後用牛黃散送硃砂丸一時自見

握宜丸治小兒便難燥結或服瀉藥腹脹悶亂命在須臾  
可用此丸不移時大小便自利

巴荳一錢半

硫黃

良薑

附子

檳榔

甘遂各等分

右爲細末粟米飯和丸如菽豆大用椒湯洗小兒男左  
女右手握之用綿裹定看行數多少置藥洗去不用卽  
止

**○**郁李仁凡治權標小兒大小便不通并驚熱痰實欲得  
漚動者

大黃

一兩酒浸半日  
炒乾爲細末

郁李仁

去皮研  
二兩

滑石

細研  
十兩

右先將郁李仁研成膏和大黃滑石丸如黍米大二歲  
兒服三二丸量大小與之或乳汁或薄荷湯下食前

黃疸

**陽黃**則大小便赤澀身熱是脾土與心火相搏爲陽病  
法當先利小便後下大便

凡治黃病腹脹當用茵陳蒿湯調下五苓散若欲利小便  
去大黃欲利大便則加大黃之類有陽證可服謂面赤飲  
水者是也茵陳湯五苓散  
方俱見傷寒

**陰**身疼體背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黃小便如屋  
塵色利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳煎湯調又  
宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者服承  
氣湯

**田**小兒身體蒸熱胸膈煩滿皮膚如青橘之黃白睛亦然  
濕熱所致也宜加減瀉黃散主之此藥能退脾土復腎水  
降心火



黃連

茵陳各五分

黃柏

黃芩各四分

梔子

茯苓

澤瀉各三分

右㕮咀都作一服水一大盞煎至六分去渣稍熱服食

前

陰黃

陰黃則清便自調面目及身黃四肢冷是脾虛不能制

腎水當用益黃散下史君子九益黃散方見治法

淡黃白者胃不和也平胃散調中丸渴者人參白朮散平

散方見泄瀉○調中丸方見腹見胎○月裏生黃見胎

針灸

明飲水不渴面黃 陽剛穴一

診

黃相似 身皮目皆黃者黃病也身痛轉背強大小便

澀一身盡黃面目指爪皆黃小便如屋塵色着物皆黃渴

者難治此黃疸也此一證多發於大病後又有一證不因

病後身微黃者胃熱也大人亦同又有面黃腹大食土渴

者脚疳也又有自生而身黃者胎疔也又書云錢疸皆然  
色深黃者是也若淡黃兼白者胃怯不和也

蘇子栝皮湯 治傷寒身黃發熱

梔子散

黃栝

甘草

右水煎去渣溫服

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃

犀角

茵陳

乾葛

升麻

龍膽草

生地

寒水石

右咬咀白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉盡乾

黃以乾葛汁和蜜調服

補珍方無乾葛用瓜萎

連翹赤小豆湯 治小兒傷寒發熱身黃

麻黃

連翹

甘草

生薑

赤小豆

生梓白皮

各二兩

杏仁

大棗十二

右咬咀水煎服一方生小麥苗搗汁服之立效

消食丸 治小兒脾胃不和常服寬中快氣消乳食正顏

色 砂仁 陳皮 三稜 蓬朮

神麴炒 麥芽炒 香附米泔浸炒 枳殼

檳榔 烏梅各半兩 丁香二錢半

右爲末麪糊丸如菉葢大食後紫蘇湯下二三十丸

茯苓滲濕湯 治小兒黃疸寒熱嘔吐而渴欲飲水身體

面目俱黃小便不利不得安臥不思食飲

茯苓五分 澤瀉三分 茵陳六分 猪苓

黃芩 黃連 山梔 防已

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳殼各二錢

右以咀水煎徐徐溫服

**母** 治小兒吐瀉黃疸

三稜

蓮木

青皮

陳皮

神麩

麥芽

黃連

甘草

白朮

茯苓各等分

右為末溫水調服若傷乳食吐瀉加山查時氣吐瀉加

滑石發熱加薄荷

瓜蒂散 治小兒忽發心滿堅硬脚手心熱變為黃疸不

急治則殺人

瓜蒂七粒

赤小豆七粒

秫米七粒

右為末用一字吹兩鼻內令黃水出餘末盡水調服之  
得吐出黃水即愈一方瓜蒂一兩赤小豆四兩為末每  
服一錢溫水調服藥下即臥當吐清黃汁為效虛者不

宜服

腹痛

曲腰乾  
節折為  
內節

**湯**小兒腹痛曲腰乾哭無淚面青白唇黑肢冷為盤腸內  
疝凡有此證急煎蔥湯淋洗其腹揉之蔥慰臍腹間良久  
尿自痛中出其疼立止續次服藥

乳香

沒藥

各少許透  
明者細研

右件木香一塊於乳鉢內磨水一分滾數沸調乳沒末  
此藥只一服效

**錢**釣藤膏治小兒腹中極痛乾啼後偃名盤腸內疝

乳香

沒藥

木香

薑黃

各四

木鱉子仁

二十箇

右先將後三味同為細末次研入上二味煉蜜和成劑  
收貯每一歲兒可服半皂子大餘以意加減煎釣藤湯

化下無時次用魏香散

魏香散

蓬木半斤

阿魏錢一

右先用溫水化阿魏浸蓬木一晝夜焙乾爲細末每服一字或半錢煎紫蘇米飲空心調下

**無**蒜乳丸治冷證腹痛夜啼

大蒜

一握慢火煨香熟研爛

乳香

另研五分

右研爲丸如芥菜子大每服七粒乳汁送下

右四方治寒腹痛屬盤腸內弔其候曲腰乾哭是也

**不**思飲食者爲胃冷

**胃**虛冷面觥白色腹痛不思食當補脾益黃散主之若不下利者調中丸主之

調中丸

益黃散治下利而痛也調中丸治下利而痛也

白朮

人參

甘草

炒各半兩

乾薑炮四錢

右爲細末蜜丸如菉豆大每服五七丸至十五丸食前

溫水下

海藏云仲景  
理中例也

當歸散凡小兒夜啼者臟寒而腹痛面青手冷不吐乳是也宜此方服之效

當歸去蘆

白芍藥

人參各一

甘草分五

桔梗

陳皮各一

右咬咀煎五分時時少服愈

右三方治寒腹痛為胃虛其候不思食是也

熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便赤黃與三黃丸人

參湯下

二黃丸方見  
治發熱法

腹痛夜啼服牛黃如豆大乳化喫之於臍下書田字立

安聖惠方

積痛口中氣溫而黃白目無精光或白睛多及多睡畏

食或大便酸臭者當磨積宜消積丸甚者白餅子下之後

如黃白  
大便酸  
臭為積  
痛

由赤綠  
黃便黃  
身熱痛

和胃用白朮散

消積丸白餅子方見  
白朮散方見消渴

食積腹痛硬必用紫蘇蘿蔔子之類

小兒好喫粽成肚痛用黃連白酒藥等分爲丸服

三稜散治積氣肚痛

砂仁

甘草

益智炒去

三稜

蓬朮

青皮炒各

爲末白湯點下

虫痛面皴白心腹痛口中沫及清水出發痛有時安虫散

主之小兒本怯者多此病

田比云虫痛啼哭俯仰坐臥不  
安自按心腹時大料而無正

色或青或黃唇白又日無  
精色口吐涎沫此爲虫痛

安虫散治小兒虫痛

胡粉炒

鶴虱炒

川練子

去皮

白礬

枯二

右爲細末每服一字大者五分米飲調下痛時服

治虫動痛極不可忍用乾漆半兩檳榔一枚生用窰老



一塊再煨細研三件一處爲末空心熱酒調良久取下

立愈驗靈老爲靈中如過此物也○又方用乾漆一兩搗碎炒令烟盡

出用新汲水入生麻油空心調下

安虫丸治上中二焦虛或胃寒虫動及痛

乾漆

炒烟盡

雄黃一分

巴豆霜一分

右爲細末糊丸如黍米大量兒大小服之取東引石榴根煎湯下或苦練根或蕪荑湯下五七丸至三十九

發時服

蕪荑散主治同前凡小兒痛時便高聲啼叫人中上鼻頭唇口一時黑色脈法當沉弱而弦今反脈大是虫症也

白蕪荑

乾漆各一分

右爲細末每服一字或五分或一錢米飲調下發時服

蛔虫用練樹根爲君佐以二陳湯煎下

診

積痛食痛虛痛大同小異惟虫痛者當口淡而沫自出治之隨其症用藥虫與癩相似小兒本怯故胃虛冷則虫動而心痛與癩畧相似但目不斜手不搐也安虫散主之辛氏女子五歲病虫痛諸醫以巴豆乾漆礪砂之屬治之不效至五日外多哭而俛仰睡臥不安自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無光而慢唇白吐沫至六日胸高而臥轉不安召錢至錢詳視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大困若更加瀉則為逆矣至次日辛見錢曰夜來三更果瀉錢於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有元藥錢曰此子肌厚當氣實今證反虛不可治也辛曰何以然錢曰脾虛胃冷則虫動而今反目青此肝乘脾又更加瀉知其氣極虛也而元藥隨糞下卽脾胃已脫兼形病不相應故知死病後五日昏篤七日而死

鴛口

胎毒

巢氏病源鴛口候者小兒初生口裏白屑滿舌上如鴛口故曰鴛口此乃胎熱而心脾最盛薰發於口也治用髮纏指頭蘸井花水揩拭之睡時黃丹煨出火氣搽於舌上唐氏如用前法其舌上白屑不脫可煮粟稈汁令濃以綿纏指頭拭之若春夏無粟稈可煮栗木皮如用井花水法小兒初出腹有連舌下有膜如石榴子者中隔連其舌下後令兒言語不發舌不轉也可以爪甲摘斷之微有血出無害若血出不止燒髮灰傅之即止

口瘡

風痰

大人小兒口瘡不開牙關緊者諸藥勿效天南星末一錢腦子少許相和研勻用指蘸生薑自然汁蘸藥於左右大牙根上擦之立開

**調**初生口噤不開不收乳用赤脚蜈蚣去足炙末猪乳汁調下五分三四服愈

**聖**小兒生下七日口噤年黃此少竹瀝調下一字以猪乳滴口中 口噤搗鼻法用欖金藜蘆瓜蒂為末水調搗之

滯頤口角垂  
延是也

**聖**清心導痰九治舌縱涎下

方見大人門  
中用甚妙

**湯**小兒滯頤者多涎流出積於頤上此由脾胃冷涎多故

也脾之液為涎緣脾胃虛冷不能制其津液故流出於頤

法當溫脾按內經云古難涎下皆屬熱此恐  
屬氏之偏見今兩存之以備參考

張渙溫脾丹 治滯頤效

白朮 青皮各半 半夏麴 丁香各一

乾薑炮半

右為細末糊丸如黍米大一歲兒十九二歲二十九米

飲下

臍風撮口

**方** 小兒洗浴拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是胃虛氣不和口頻撮調氣益黃散主之

赤脚金頭蜈蚣一條

蝎稍尾

蠶七條

瞿麥五分

右爲末先以鷲毛管吹豆大入鼻內嚏噴啼叫可醫更用薄許湯下

**雜方**

**方** 栝墨散治斷臍後爲水濕所傷或柵枹濕氣傷於臍中或解脫風冷所乘致令小兒四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜速療之

黃栝

釜下墨

亂髮燒各五分

右爲細末每用少許傅之

○**臍風濕鹽**二兩**鼓**二合杵成餅子如錢炙熱熨臍上安  
又以黃栢末傳之

**姚**小兒臍腫桂心炙熱熨之日四五

**秘**臍風瘡用年久東壁泥研傳之

○**臍風**久者成瘡不乾伏龍肝傳之 又馬齒莧燒葉末  
傳之千金

**子母**治小兒臍赤腫杏仁杵如脂傳臍腫上

○**聖**治小兒臍中汁出不止并赤腫用枯白礬研細傳之

**世**治嬰兒因剪臍傷外風致瘡不乾用白礬煨白龍骨各  
等分同爲末每用少許傳之 又方綿燒灰研細每少許  
乾摻之

○**聖**撮口夜合花枝煮汁拭口并洗愈

○**聖**撮口治法用白殭蚕爲末蜜調塗兒穀道又牛黃一錢

竹瀝一合時時抹口中卽瘥

**㊟**小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一效坐視其死良可憫也有一法世罕知者凡患此證看兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹指輕輕擦破卽開口便安不藥神效

針灸小兒初生臍風撮口諸藥不效者灸然谷穴在內踝前起大骨下陷中可灸三壯鍼入三分不宜見血立效

**㊟**臍風目上插刺絲竹空

**㊟**臍腫 腰對臍骨節間三非

診**㊟**臍風撮口在百日內不治