

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元彙集七卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國

校

龔安國

南雍太學生藍印周文卿光霽堂鐫

婦人科

婦人之病有可治有不可治。苟皆由其心性善惡所關也。則有德性未良。舉止端重。克盡婦道。恭敬翁姑。相夫教子。凡內助理家。女工井臼。桑麻之事。無不盡善者。必無疾病。雖或有之。亦易為治。也有等逆妬。嫉妒。尊凌卑。惟其衣食自私。全無宗祀之念。犯有七夫。助無一能。天數將入膏肓。雖盧扁亦難治療。予因痛識此病。借立醫方。以為勸戒。其真胎前產後等病。各自有方。開具于後。

婦人總論

夫婦人乃衆陰所集常與溫居榮衛和平諸疾無由而生榮衛虛弱則百病生焉經云二七而天癸至任脉通太衝脈盛月事以時上下交感則有子矣其天癸者不一生求也任脉通者陰用之道泰也太衝脈盛者血氣俱盛也何謂之月經月者陰也經者經絡也過期而行經者血寒也未期而先行者血熱也經行作痛者氣之滯也來後或作疼者氣之虛也其色紫暗者爲風黑者多熱淡者多痰如煙塵水者血不足余考古方耗其氣以調其經則以爲人之正氣不宜耗也太衝者氣也任脉者血也氣升則升氣降則降血隨氣行無暫息若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝故百病生焉其經安得調乎况心生血脾統之胃爲之元也養其心則血生實其脾則血足氣勝則血行矣安得獨耗其氣哉此調經之要法也行經之時保如產母一失其甚其爲病不淺當戒甚

怒莫如於衝任。逆色然莫損於血海。一有抑鬱。宿血必停。定於腰脇。注於臍。臍遇新血擊搏。則疼痛不已。散於四肢。則麻木不仁。入於血室。則寒熱不定。或怔忡而煩悶。或入室而狂言。或湧上出。或歸太陽。皆四氣七情之所致也。余考產後一科。胎前血氣用藥。溫暖於理。最當治法。至於子和論。產後出血數斗。世人皆以血氣兩虛。妄用溫熱之劑。養血補虛。止作寒治。舉世皆然。故有悞者。殊不知妊孕如天地之孕。物陰陽和合。人物俱生。陰陽偏勝。豈得孕乎。譬如瓜果。值水旱。花實落。故文秋後十八日。寸草不結。乃寒不發生也。今婦人終於十月。而產者。反爲寒治。則非理矣。若子和之法。當行溫涼。溫熱之劑。實所禁也。以余常用和暖之劑。使血得暖。以流通其氣。露自盡。故無後患耳。况生產有難。易血氣有盛衰。豈可偏執一法。能盡產後無窮之變焉。余每經歷新產。月裏用溫暖治。効者十多。八九用溫涼治。効者百無十三。此若子和之法。施於月外。蘊熱自甚。陰虛潮熱。往來寒熱。行溫涼之劑。故無禁耳。其月裏可

不慎哉。人子受胎。雖係陽精所注。實賴母血而成。亦若瓜果。賴枝葉以
蔭也。今婦人終於十月而產者。卽瓜熟蒂懸。脫空之意。雖冒寒暑。傷食
調理。不宜急迫。則隨手而愈。間有失珍。重不滿十月而動胎產者。猶若
枝蔓瓜果有所傷也。胞係腐爛。胎始墮落。故此得病。則難愈矣。昔人所
謂小產傷如大產者。此也。凡婦人新產。榮衛俱虛。腠理不密。或冒風寒
或傷飲食。或惡露不通。或血行過度。如此四者。俱能移寒熱於胞。胞痛
又不可相類。而用藥也。又如產後。脾胃既虛。或多食鷄子。冷物所傷。脾
胃遂成傷食。以致身熱。氣口脈盛。當行消食之藥。世人多因身熱。便爲
外感。然行溫涼之藥。發汗退熱。胃氣轉傷。豈無死者。產後半月之前。雖
去內外之邪。亦當兼行血氣。如過半月已後。若有雜症。不可專執產後
下門治療。又當各類中求之。庶無訛誤。病體矣。

調經諸方

○一論此方調益榮衛滋養氣血。治衝任虛損。月水不調。膈腹痞痛。崩中

漏下血瘕塊硬發歇疼痛妊娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱婦病頭四物湯

當歸身酒洗川芎

白芍藥酒炒懷熟地黃各二錢

右剉丁劑水煎溫服者病加減

一經候將來腹中陣陣作痛乍作乍止者血氣實也用生地加黃連香附桃仁紅花玄胡索牡丹皮莪朮

一經水常不及期而行者血熱也用生地加黃連黃芩白芍

一經水常過期而來者瘦人多是血少倍當歸地黃加黃芩甘草少佐以紅花桃仁泥以爲生血之引用也肥人大槩是氣虛挾痰阻滯升降然也去地黃加參朮甘草茯苓半夏陳皮香附

一常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛用生地加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥

一 約頰而血淡色者，痰多血少也。用生地黄合二陳湯煎服。

一 肥盛婦人經水或三二個月一行者，痰盛而軀脂閉塞經脈，以煎痰湯加芎歸香附蒼朮白朮。

一 經水適來適斷，往來寒熱如瘧者，合小柴胡湯煎服。

一 經行過三五日，腹中綿綿走痛者，此血行而滯氣未盡行也。加木香檳榔煎服。

一 經水行後而作疼者，氣血俱虛也。加四君子湯煎服。

一 經事欲行，臍腹絞痛，臨經者血澁也。加川練子、小茴木、香檳榔、玄胡索。行經時，忍着氣，然後得心腹腰脇痛不可忍，脈弦急不勻，乃瘀血作痛也。加桃仁、紅花、玄胡、莪朮、青皮，行血即愈。

一 經行不止，加炒阿膠、地榆、荆芥穗。

一 婦人因經血過多，得五心煩熱，日晡潮熱，加胡黃連，二三服效。

一 婦人筋骨肢節痛及遍身頭疼，兩手脈弦，增寒加瘧，每以散風止痛之。

劑固效。加羌活防風羌官桂立効。

血崩初起不問虛實加荆芥穗燒過防風升麻如不止加蒲黃炒

白朮炒升麻炒

治血崩加荆芥黃芩香附炒

治崩漏加沙參益母草香附炒阿膠炒 蒲黃炒 陳皮 白朮

甘草去苗歸不用

赤白帶下加柴胡升麻酒炒各半夏薑汁炒白茯苓 蒼朮酒浸炒

黃柏酒炒知母酒炒乾薑炮升陽除濕帶自除也。

胎動下血不安加艾葉阿膠炒黃芩 白朮 砂仁 香附 糯米炒

胎死腹中加官桂白芷麝香 一產後惡露不行加益母草桃仁蘇木

產後血虛昏暈不醒加入參白朮白茯苓乾姜香附甘草

腹中氣塊加木香檳榔 一血積塊痛加三稜莪朮官桂乾漆炒

口乾煩渴加麥門乾葛烏梅 一骨蒸發熱加知母地骨皮柴胡

小便閉澀加澤瀉木通

一太便不通加桃仁大黃

虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁炒

心神恍惚加遠志酸棗仁白茯苓辰砂另研

嘔加藿香半夏砂仁陳皮

一瀉加白茯苓白木蓮肉山藥炮乾姜

婦人經水先期而至血紫有塊腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞本方加

條芩荆芥香附小茴玄胡續斷杜仲地榆甘草

婦人血塊作痛不可忍者加三稜莪朮青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄

胡索木香甘草煎服

婦人經不下行甚經吐血不止本方下兩加川大黃酒浸炒一兩水煎

入童便同服立効

婦人女子經信愆期以致鼻衄錯經妄行本方去地黃加桃仁山梔炒

大黃酒炒甘草共七味水煎服入童便同服

婦人經行三日後來多不止本方加伏龍肝地榆蒲黃黃柏側柏葉黃

連白茯苓甘草梔子十三味。○內氣虛加香附。○脾胃虛少食加白朮。
一論婦人經不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦者頭目眩暈面色
痿黃四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠沉香小茴
香吳茱萸。

○一論室女十四歲經脈初動名曰天癸水至失於調理心腹脹滿惡寒
發熱頭身遍疼此感寒血氣不順宜服小溫經湯和氣散主之。

小溫經湯

桂枝三分 白芷四分 羌活四分 柴胡四分 白朮五分
砂仁四分 當歸酒洗一分 香附炒一分 川芎七分 黃芩七分
熟地黃一錢 甘草二分 枳殼去穢一分 小茴酒炒四分 白芍酒炒一分
刺心腹難忍加玄胡乾漆炒各五分 咳嗽加杏仁七 去穢失 五味子
附桔梗射右剉丁劑生薑三片水煎熱服。

和氣散

香附炒五錢 黃芩四錢

枳殼去穢炒

陳皮

藿香

小茴酒炒

白朮去蘆

玄胡索

砂仁

草果去殼

甘草八分

厚朴 去皮五錢

右爲細末每服二錢空心米湯調下酒亦可

○一論室女十五六歲經脈不通日夜寒熱手足麻痺飲食少進頭眩惡心嘔吐腹中忽然結塊痛者此症悞食生冷所傷可服

加減四物湯

香附炒一錢 當歸酒洗

川芎

枳殼去穢

柴胡

白芍酒炒各黃芩

陳皮

三稜醋炒

莪朮醋炒各

熟地黃一錢 白芷

玄胡索

小茴酒炒

白朮去蘆炒

青皮去穢

砂仁

肉桂

甘草各五分

右剉作一劑水煎空心熱服身痛加羌活

○一論室女十七八歲經脈不通或百白或半年顏色青黃飲食少進寒

熱往來四肢困倦頭眩目眩眩痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹此乃脾胃
受傷血氣俱弱慢食生苓急宜和氣血扶脾胃先以逍遙散次服加味
八物湯後服調經丸

逍遙散

當歸酒洗一分 白芍酒炒一分 柴胡二錢 黃芩一錢 川芎七分

熟地黃七分半夏姜炒七分 人參五分 麥門冬五分 甘草四分

右剉散生薑三片水煎熱服後服八物湯下劑又可服調經丸數服

若少睡加酸棗仁炒以欬心血

加味八物湯

香附 當歸 白芍酒炒 白朮去蘆 川芎

人參 熟地黃 小茴香炒 黃芩 柴胡

白茯苓去皮 甘草腹瀉加玄胡索枳殼乾漆 嘔吐加良姜

砂仁手足麻痺 桑葉加肉桂 咳嗽加杏仁五味子 欬多花

右對水煎膠

調經丸

香附

醋浸三兩

當歸酒洗

白朮

去蘆槓半如腹痛以存槓代之

枳殼

麩炒

赤芍

陳艾醋炒

陳皮

小茴酒炒

川芎

厚朴

姜汁炒熟地黃

酒蒸各一兩半

青皮

法二錢

玄胡索

砂仁

三錢

醋浸煨牛膝

法二錢

白芷

粉草各一兩

右爲細末醋打米糊爲丸如梧子大每百粒空心米湯送下

○一論婦人二十歲後遇經脉動來沿身發痛手足麻痺寒熱頭暈

加減五積散

厚朴

法姜

蒼朮

米泔浸川芎

白茯苓

去皮

當歸酒洗

半夏

法炒

白芍

酒炒

獨活

羌活

牛膝

去蘆

桔梗

白芷

枳殼

麩炒

麻黃

去根

陳皮各等分

甘草三分

右制散，薑湯煎，熱服。○咳加五味、杏仁。○瀉去，枳殼、加肉冠。

○一論：婦人二十三四歲，經水不調，或赤白帶下，或如梅汁淋漓，或成片有塊，三四月者，此乃氣血虛弱，漸生潮熱，咳嗽，飲食少進，四肢倦怠，日久變生骨蒸，即成勞瘵。急當調治，可服前加味八物湯，四劑，溫經散，大溫經湯。

香附 八分

當歸 酒洗 八分

白芍 酒炒 七分

熟地黃

人參

白茯苓

去皮

白朮

去蘆

吳茱萸 炒

玄胡索

川芎 各五分

砂仁

陳皮

小茴 酒炒 各四分

沉香 三分

黃芩 鹽炒

阿膠 炒

肉桂

甘草 各三分

右制，下劑生薑二片，水煎，空心熱服，如汗不止，加酸棗仁炒，黃芪蜜炒，咳嗽加杏仁五味半，夏枯草各五分，潮熱加柴胡、黃芩。○一論：婦人二十四五歲，所服藥餌，加味四物六君湯。

加味四物六君湯

厚朴煨汁

半夏錢汁

當歸酒洗

香附絡五

枳實煨炒

白茯苓去皮川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白木去蘊各砂仁

紅花

黃連酒炒各

全胡三分

陳皮四分

甘草二分

右判散。生薑三片。水煎。空心熱服。

○一論婦人二十五六歲。血海虛冷。經水不調。或時小腹疼痛。或下白帶。如魚腦。或似米泔。不分。信期。每日淋瀝不止。面色痿黃。四肢無力。頭暈眼花。目眩。宜服四物補經湯。兼服烏雞丸。調理。

四物補經湯

香附

當歸

白芍酒炒各熟地黃

川芎各五分

黃芪蜜炒

白茯苓去皮白木去蘊

黃芩

玄胡索

陳皮各四分砂仁

小茴酒炒。人參

阿膠炒

沉香另研 吳茱萸各二粉草二分

右剉生薑三片水煎空心煎服

烏雞丸

海金沙

側柏葉鹽水浸焙乾

香附砂三

厚朴姜炒三

當歸酒洗

白朮去蘆

川芎各二兩

白芍酒炒

熟地黄二兩

羌活一兩半 防風各一兩 人參一兩 砂仁各一兩 粉草三錢

右剉用白毛烏肉膳雞一隻不問三五年老俱好殺淨去腸屎毛將藥

一半入雞肚中放銅鍋內好酒五盞水二瓶文武火煮至乾收淨去骨

取肉切細同藥晒乾為末用粟米粉酒水煮糊為丸如梧桐子大每服

九空心米湯吞下酒亦可

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不調淋漓或成片或下黑水白

色青黃虛帶眼花四肢用倦其服此四五劑後服前大溫經湯一劑

正經湯

手上一下二

七一三

一

常歸酒洗三分

白朮去麩

白芍酒炒

川芎

熟地黃

香附

阿膠炒

黃芩

蒲黃炒

側柏葉

砂仁各七

甘草炒

右劉生薑前後心熱服○咳加五味子杏仁去皮○肚痛加枳殼玄胡

蜜乾漆○氣急加半夏蘇子各五分

一治婦人經水來多不止用蘼艾一兩好生酒炒三次礬鹽清入水煎

滾去濁濕服立止

一治婦人三十二歲年年生育敗血過多以致經水不調不時腹中

疼痛結塊飲食少進困倦目眩潮熱往來五心煩燥此血虛胃熱也服

紅花當歸散兼用八物湯

紅花當歸散

常歸酒洗八川芎

赤芍藥

熟地黃

黃芩

香附各六分枳殼五分

玄胡索五分厚朴姜炒

小茴香酒炒

柴胡

陳皮

三稜醋煨

莪朮醋煨

牛膝酒洗

紅花三分

甘草二分

右列生薑水煎空心熱服。

○一論婦人三十四五歲因經水來時覺身坐不能夫於迴避，脈理空虛，計引乘入遍身麻痺，不能轉側，肺經受感咳嗽痰盛，宜服五積交加散，以痛又服八物湯十餘劑。

五積交加散只可服一二劑勿多服。

羌活一錢

當歸酒洗

川芎

獨活

白芷

厚朴姜炒

蒼朮

米泔炒防風去苗

枳殼姜炒

陳皮

半夏姜炒

麻黃

桔梗

白茯苓

柴胡名八分

桂皮四分

甘草三分

右列薑葱煎熱服再服去柴胡加烏藥炮炙各一錢酒煎熱服。

○一論婦人三十六七歲經行太過血氣虛耗胃氣不足故經水來則

進八珍湯同烏雞丸治之

八珍湯

當歸酒洗

白朮

去蘘各一錢

白茯苓

去皮八分

川芎

熟地黃

白芍

酒洗各八分

甘草

三分加香附八分

右剉生薑水煎熱服

○一論婦人三十六九歲經脈不行腹中有塊疼頭暈眼花不食飲食勞血漸耗餘血未盡不時攻痛成疾宜我朮散逐去餘血

我朮散

香附三兩

當歸酒洗

我朮醋浸

玄胡索

赤芍藥

枳殼麩炒

熟地黃

青皮大炒

白朮土炒

黃芩各一兩

三稜醋炒

小茴香炒

砂仁

各八錢 乾漆炒盡州

紅花各五錢

川芎八錢

甘草一錢

右爲細末每服二錢空心好米酒調服

○一治婦人腹中常當作痛上下不定經年積血也。

青皮

陳皮

三稜

莪朮

香附

烏藥

乾姜

右各等分醋煮焙乾爲末加心陳皮湯調下。

○一治婦人四十二歲經水斷絕五十二歲復來或淋漓或成疔或流下不止或脹和經湯兼四物補經湯烏雞丸相間服之可好和經湯甚。一帖即去熱氣乃香附陳皮小茴是也。

和經湯

白芍

酒炒一分當歸酒洗

熟地黃

白茯苓

黃芩

香附

白朮去蘆

川芎

酸棗仁炒

蒲黃炒

阿膠

每炒各八分 白芷一錢

陳皮

小茴酒炒各七分

甘草

右剉每服一兩薑蔥煎熱服四物補經湯烏雞丸方俱見前。

○一凡婦人經水不調或前或後或多或少時常頭暈眼黑耳鳴赤白帶。

下。腰腹疼痛，五心煩熱，四肢沉困，胸膈痞滿，不思飲食，肌膈減削，一切百病皆治，宜此。

調經滋補丸

香附米

酒醋童便益湯各浸一兩，各炒乾共四兩

當歸

酒洗二兩

川芎

白芍

酒炒各一兩

懷生地黃

有浸砂鍋蒸黑二兩

白朮

去蘆炒二兩

白茯苓

去皮一兩

陳皮

一兩

懷山藥

一兩，山茱萸酒蒸去核一兩

牡丹皮

一兩

小茴

酒炒一兩

玄胡索

一兩，阿膠蛤粉炒一兩

右爲細末，酒醋打麩糊爲丸，如梧子大，每服百丸，空心米湯送下。

○一論婦人五十歲以外，經水猶不斷，顛顛倒倒，不准而來，當預防恐成敗血症也。此丸甚妙。

千金丹

當歸頭

二兩

懷山藥

三兩

白朮

去心皮一兩

白朮

二兩

人參

二兩

懷生地黃

酒拌烘乾四兩

綿地榆

二兩

黃芩

酒炒二兩

鹿角霜二兩黃柏酒炒黑二兩

右共爲細末用艾葉三兩水二觔煎至一觔去渣入淨小麥粉六兩煎勻若熟糊和藥爲丸每日空心二百五十丸補精氣前湯送下

○一治婦人因怒吐痰胸膈疼痛四物二陳本連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸攣搐四肢痿軟日晡益甚因熱口乾形體倦怠急予以爲辭及傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

○一治婦人晡熱肢體痠倦飲食少無味月經不行或鼻衄或血崩久矣或用順氣消熱等劑不愈更加寒熱且時欲作嘔此乃鬱怒傷脾胃虛火錯經妄行而然耳以補中益氣湯加六味丸

○一治婦人多怒經行旬餘方止後淋瀝無期肌體瘦瘦口乾肉熱盜汗如洗日晡熱甚皆由肝脾虧損無以生後元氣以補中益氣湯加茯神遠志麥門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉

道遠散方見後唐書補中益氣湯方見內傷天味丸方見補益十全大補

湯方見補益

斷產方論

婦人欲斷產者不易之事雖曰天地太德曰生然亦有臨產艱難或生而
不已或不正之屬爲尼爲娼不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以備所
用然其方頗衆且多有用水銀蚘虫水蛭之類孕不復懷難免以病此
方平和而有異驗具于後

○一婦人斷產驗方

故蚕紙方圓一尺燒爲末酒調服終身不復懷孕也。

○一千金斷產方

油煎水銀丁日方息空心服如棗大一箇永斷不孕且不損人。

○一斷子法

用白麵麩一升無灰三斗打作糊煮至二升半絹袋濾去渣分作二服

候月經來日晚吃二服五更吃一服天明吃一服經事即行終身無病

經閉

脈女人尺脈沉而右手脈大者其常也若腎脈微瀦或浮或滑而斷絕
不孕或月經沉而急者經閉不調之候也

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與逾期者有妄行者有血色紫黑及
淡紫者有成塊者有作痰者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因心
潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而亦生血或
因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因七情傷心
心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心竅使血生而經自行矣

一治婦女經閉不論虛實寒熱新久即服此方有殊効

清熱通經湯

當歸

酒洗 川芎 八分

白芍 酒炒 一錢

生地黃 一錢

大黃 七分

壽世保元

庚集七卷

十一

官桂四分

厚朴漢抄

枳殼一錢

枳實一錢

黃芩一錢

蘇木一錢

紅花五分

桃仁夫皮六

烏梅一個

右剉生薑三片水煎空心溫服不效劑即奏效

○一論婦女經水不通腹中積塊癥瘕攻注別痛氣服

歸木破癥湯

歸尾酒洗

赤芍

白芍

青皮

三稜醋炒

莪木醋炒各

香附醋炒

烏藥七分

官桂

蘇木

紅花各五分

右剉一劑水煎入酒下為碎心腹

○一論婦女經閉下年不通勝下下塊如碗口大間或吐血或便血

發熱咳嗽吐痰盜汗等症宜

養血調經丸

當歸酒洗

川芎兩

白芍酒炒

熟地黃四兩 山茱萸酒洗

白茯苓二兩 懷山藥二兩 牡丹皮一兩 澤瀉半兩 梔子仁半兩

益母草二兩 生地黃三兩 香附米二兩 陳皮半兩

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服三錢空心淡薑湯送下

○一治婦人血痕作痛膝下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸八分 桂心六分 玄胡索四分 白芍六分 血竭六分

蒲黃炒六分

右爲末每服二錢空心酒調下

消積通經丸

香附米醋炒 艾葉醋炒 當歸酒洗 川芎一兩 赤芍一兩

生地黃二兩 桃仁去皮一兩 紅花酒洗 三稜醋炒 莢木醋炒

乾漆炒一兩

右爲細末醋糊爲丸如梧子大每八十九臨卧淡醋湯送下

○一治婦女月經不通鼻衄出血不止 付卅張玉陽傳

當歸半錢

川芎一錢

白芍半錢

生地黄

清沙知母一錢

黃柏

蒸木炒

桃仁去皮尖

紅花一錢

牡丹皮

一錢

大黃

用紅花蘇木

黃芩酒洗

黃連酒洗

茅根

側柏葉各二錢

右剉一劑水煎空心服

○一治室女經水不行 翰林張明宇傳

當歸

川芎

赤芍

生地黄

荆芥穗

枳殼

麩炒各

馬鞭草一錢

牡丹皮

杜牛膝

生蒲黃各五分

桂心二分

烏梅半個

右剉一劑水煎服日二劑○過期不行加澤蘭葉

○一治室女經閉咳嗽發熱屬虛弱者宜

養血通經湯

牡丹皮

當歸五錢

白芍

生地黄

陳皮

白朮去蘆

香附各一錢

川芎八分

柴胡

黃芩各七分

甘草四分

右列一劑水煎空心溫服。

通經調氣湯 治症同前

當歸酒洗 川芎

白芍酒炒 生地黃 香附米醋煨炒

牡丹皮八錢 柴胡六錢 黃柏酒炒六錢 知母酒炒八錢 牛膝酒洗八錢

桃仁去皮尖 紅花二味量加

右列十劑水煎空心一服食後一服。

○一治婦人經閉不通不論新久下取良法。

下取通經丸

乳香 沒藥 孩兒茶 巴豆去殼 血竭

葱白各五分 斑貓五個

右爲末共搗爲丸每丸如梧子大三層緊封筒口上將綿繫住送入陰戶內三四

寸許俟一炷香經水即下

○一治婦人胃氣素弱，爲胎母吐血咳嗽，發熱盜汗，經水三月不行，此乃悲則傷肺，以補中益氣湯加桔梗貝母，兼進六味丸。

○一婦人經閉八月，肚腹漸大，面色或青或黃，用臉疰之藥，不應，余診視之，曰：面青脈滯，寒熱往來，肝經血病也。此驚怒傷脾，肝之症，非胎也不信，仍用治胎散，不應，余用加味歸脾逍遙之藥，各二十餘劑，諸症漸愈，彼欲速效，別服通經丸，藥下腹下血，昏憤自汗，惡寒手足俱冷，慄吐，不食，余用人參炮姜一劑，漸愈，又用十全大補湯五十劑而安。

○一婦人久患癰形體怯弱，內熱，補熱自汗盜汗，飲食少，思月事不行，或用通經丸，虛症悉具，此因虛而致癰，因癰以閉經也，用補中益氣湯及六味地黃丸，癰愈，經行。

○一婦人性沉多慮，月經不行，胸膈食少，或作脹，或吞酸，予以爲中氣虛寒，用補中益氣加砂仁香附煨姜一劑，而胸膈和飲食進，更以六君加芎歸貝母桔梗生姜大棗數劑，脾胃健，而經自調矣。

經不行此胃火消燦陰血用逍遙散加牡丹皮炒梔子以清胃氣用八珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣。

補中益氣湯方見內傷六味丸方見補益十全大補湯方見補益逍遙散

方見婦人虛勞歸脾湯方見婦人虛勞六君子湯八珍湯俱見補益

崩漏

婦人漏血下赤白且下血數升脈急送者死遲送者生○又曰脈小虛滑者生太緊實數者死○又云尺寸脈虛者漏血滑血脈浮不可治也

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈虛損故也衝脈任脈皆經脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水婦人經脈調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而下淋漓而不止謂之漏下也致五臟傷氣虛也

色隨脈不同。若五臟皆虛損者，則其色隨血下。診其脈寸口弦而大，弦則為藏大，則為芤，芤則為寒，芤則為虛，虛寒相搏，其脈為牢。婦人即半產而漏下。又云：尺脈急而弦，大風邪入少陰之經，女子漏自下，赤又漏下，赤白不止。脈小虛滑者生，脈大緊實數者死也。又漏血下，赤白，日下血數斗，脈急疾者死，遲者生也。又云：尺寸脈虛者漏血，漏血脈浮不可治也。若經候過多，其色瘀黑甚者，崩下吸吸，少氣，臍腹冷，振則汗出如雨，尺脈微小，由衝任虛寒，為風寒客乘，胸中氣不能固，可灸關元百壯。在臍下當中三寸。

○一論女子漏下，惡血月事不調，或暴崩不止，或下血紫之物，皆因飲食不節，勞倦所傷，或素有心氣不足，致令心火乘脾，必怠惰嗜卧，困倦乏力，氣短氣急，脾主滋榮周身者也，脾胃虛而心胞乘之，故漏下月事不調也。况脾胃為血氣陰陽之根蒂也，當除濕去熱，抑風氣上衝，以勝其濕。又云：火鬱則發之，宜用。

當歸酒洗五錢 黃芪一錢半 蒼朮未用浸柴胡一錢半 升麻一錢

藥本一錢 防風一錢 羌活一錢半 獨活五分 蔓荊子七分

甘草炙一錢

右剉作一劑水煎空心溫服少時以酒飲之可平服而愈又灸足太陰脾經血海穴二十七壯此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以收其血之暴崩也往後必須服黃芪入參當歸炙甘草之類數服以補之

○一治婦人崩漏多因氣脈使而下者

黃芪蜜炒五分 人參五分 白朮去蘆一錢 當歸身酒洗一錢 川芎五分

白芍酒炒一錢 熟地黃一錢 香附黑一錢炒 蒲黃炒五分 地榆五分

升麻三分

右剉一劑水煎空心服

○一治婦人經水過多不止者

樗根皮七錢 白芍炒一兩 黃芩炒一兩 龜板炙一兩 黃柏炒三錢

香附子童便浸一宿二錢半

右爲末酒糊爲丸如梧子大每服五十丸空心溫酒白湯送下

○一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者

當歸酒洗一錢 川芎七分 人參一錢 黃芪蒸炒一錢 防風八分

荆芥一錢 白芍酒炒八分 真阿膠炒成珠一錢 艾葉醋炒一錢 蒲黃炒

黃連酒炒一錢 黃芩酒炒一錢 白朮去蘆土炒一錢 生地黃姜汁炒一錢 甘草生三分

地榆一錢 山梔子炒黑一錢 甘草生三分

右剉下劑水煎空心溫服或臨漿煎服

○一治婦人血崩或作肚腹刺痛者

蒲黃炒 五靈脂 官桂 雄黃 甘草各一錢

右爲細末每服一錢姜湯調下

一治血崩漏去多心神恍惚虛損者宜

復元養榮湯

遠志肉五分人參一錢半酸棗仁炒一錢黃芪蜜炒一錢荆芥八分

白芍

酒炒一當歸頭一錢地榆一錢

白朮

去蘆一甘草三分

右剉棗一枚水煎服○如虛極發喘不省人事口噤者以醋搗其血

又將鐵錐燒通紅浸入醋碗內沸起醋氣重者即止此產後消法也

○一治婦人經候疑結黑血成塊左廂有血瘦水泄不止食有時下化後

血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭于下既久經候猶不

調水泄日三四行食罷煩心飲食減少人形瘦弱血脫者氣虛聖人之

法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先務也其

能生血陽生陰長之理人身以穀氣為寶故先理胃氣為要

益胃升陽湯

黃芪蜜炒一錢人參一分二錢甘草炙一錢陳皮一錢白朮去蘆二錢

當歸一錢 柴胡五分 升麻五分 神曲炒一錢 生黃芩二分

右剉一劑水煎服。○腹痛加白芍三分中桂少許。○如口乾作渴加葛根五分。

○一異人傳授秘方治血崩如神。

金鳳膏

白毛烏肉雄雞一隻用死水泡去毛去腸雜不用將金櫻子之根洗淨切片裝入肚內酒煮令熟去藥將雞酒任意食之。

○一治血崩試効方

雲萊翁傳

懷生地黃用砂仁陳皮煎水蒸黑大分 牡丹皮 六分 石棗酒蒸去核大分 懷山藥 五分

條苓酒炒八分 蒲黃 六分 炒阿膠 八分 香附醋炒六分 白芍 酒炒八分

白木去蘆炒六分 黃連姜汁炒八分 陳皮 五分 甘草 一分

右合一劑生姜三片棗一枚不拘時服。

○一治婦人五十以上經脈暴行內經曰火主速不可以冷病治之如丁

峻藥即死，此可謂黃連解毒湯以清其上，加棕灰蓮殼灰以透其下，然
後用四物湯返血和經可也。

一方治血崩，用槐花二兩，百草霜半兩，爲末，每服二錢，燒紅，研鍾石酒下。

一方治風熱血崩，荆芥穗、燈火、燒焦，爲末，每服三錢，酒下。

一方治血虛肉熱，血不歸元而崩，桂心、燒存性，爲末，每服二錢，米飲調下。

一方治血崩，枯參爲末，麪糊爲丸，指頂大，每服一九，好酒下。

一方治血崩，棕灰一撮，好酒調空心下服立止。

一方治血崩，用益智仁爲末，每服二錢，以燒紅，研雞子黃酒調服。

一方治血崩，用猪肉四兩，百草霜二兩，酒過，燒成炭，爲末，每服二錢，酒下。

一方用乾鹽麩爲粗末，入罈內燒，冷，煎婦坐其上，煙薰久，自止。

一方用雞子一個，去黃，入銀朱三錢，攪勻，燒存性，溫酒下。

一方鶴沙揀淨爲末，每服三錢，空心溫酒調服。

一方五靈脂炒，晝煎，爲末，每服一錢，溫酒調下。一方半生牛炒。

一方香附米炒黑，爲末，每服三錢，空心熱酒調服，米飲亦可。

一婦人崩漏，面色黃或赤，時覺腰間瀉下，痛四肢困倦，煩熱不安，其經行先發寒熱，兩脇如束，此脾胃虧損，元氣下陷，與相火濕熱下迫所致，以益氣湯加防風、白芍、黃柏炒，兼服歸脾湯，而愈。

一女子漏下惡血，月經不調，或赤或白，不止，多下水漿之物，或白帶，或漏不止，皆因飲食不節，勞倦所傷，或素有心氣不足，致令心火乘脾，急怒嗜臥，困倦乏力，氣短氣急，脾去滋榮，過身者也。脾胃虛而心胞乘之，故漏下月水不調也。况脾胃爲血氣陰陽之根蒂也，當除濕去熱，抑風氣上伸，以勝其濕，又云火鬱則發之，以益氣湯去參、木、陳皮，加蒼朮、蒼朮，防風、羌活、蔓荊子。

一婦人經行太過，血氣虛耗，胃氣不足，故經水妄來，可以平公大補湯去桂、芪、加香附。

一婦人患崩過服寒涼之劑其症益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱燥脈洪大而虛此脾經氣血虛而發燥也急用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不救不信乃服止血降火之劑虛症蜂起始信予言緩不救論

帶下

婦人帶下六極之病脈浮則爲腸鳴腹滿緊則爲腹中痛數則爲陰中疼痛則生疔弦則除戶掣痛帶下脈浮惡寒漏下者不治

婦女下白而不甚稠者曰白淫與男子白濁同也係出於相火如龍膏之擾而不澄清然耳屬於足少陰太陽治當清補爲主其下赤白帶者謂之帶下屬於心胞手厥陰少陽即若男子自遺之精甚即如磁石之淋原乎心胞係於脊絡于帶脈通於任感下提帶水上至泥丸耳只和云崩中日久爲白帶漏下多持骨木枯槁一切矣治宜和肉之劑以和之此乃窮源探本之論百世不易之法時以背脊於常春作湯後以

及以牡蠣龍骨地榆落文之類，以因物藥以升其氣，不爲寒不損傷，以致腐敗而來，彼滯滯不消之物，則益加其滯，升提不正之氣，則增遂其鬱，或非醫者之過，抑求治者之不賢也。凡遇是病，必以六龍內固九十六味保元湯主之。

十六味保元湯

黃芪一錢

人參二錢

山藥一錢

白茯苓一錢 當歸身一錢

巴戟肉二錢 石斛七分

川獨活一錢 升麻七分

黃柏酒炒八分

杜仲小苗 鹽煎湯炒

貫仲去根土

蓮蕊一錢

圓眼肉三枚

骨碎補先以猪草水浸一錢

上煨去毛

生甘草三分

右剉一劑，水煎，空心溫服。潮熱加柴胡八分，黃芩酒炒一錢。帶甚

者，月經必少，其有聚而反多者，或紫適來，適斷，離離落落，而不淨者，加

荆芥一錢，黃連酒炒七分，地榆八分。若五心煩熱，而口舌乾者，加知

母一錢，麥門冬一錢，地骨皮。大便澀而燥者，乃血少火燥，陽明也。四

能奏效者宜六龍固本丸大效。

○一論此藥能坐臥固真補心益腎帶不漏則經水自調月經調則有孕男婦元氣充足產子少弱而且壽矣此方不特赤白帶下有効凡小產後虛者血山崩虛者五勞七情女勞怯者一切不足之症并欲求嗣得孕婦女諸虛皆有殊効者也。

六龍固本丸

懷山藥 四兩 巴戟肉 四兩 山茱萸肉 四兩 川楝子肉 二兩 黃芪 二兩

小茴香 一斤至二錢黃藥 補腎脂 二兩青油 木瓜 一斤至二錢黃藥

人參 二兩 蓮肉 二兩 木瓜 一兩 用水三碗煎至二鐘拌上三味

同微炒乾為度

當歸身 二兩 生地黃 二兩 白芍 一兩 川芎 一兩

四味用童便二鐘好酒一鐘拌蒸下日烘又湯又烘乾

右爲末用斑龍膠一斤和丸如梧子大每服百丸空心淡鹽酒下
斑龍膠方見補益人多難得予常用煉蜜爲丸服之亦効

○一治婦人經水不調臍腹疼痛赤白帶下子宮虛冷久無子息先宜服
五積散加香附吳茱萸小茴入米糖一塊煎服減麻黃後服此丸藥
白鳳丹

嫩黃芪蜜水炒

人參去蘆

白朮去蘆微炒

白茯苓去皮當歸身酒洗

川芎

白芍酒炒

肉桂

大附子剉麥麩去皮膽

川乾姜炒

胡椒

小茴香鹽酒炒

破故紙鹽酒炒艾葉醋炒

烏藥

已上各二兩

吳茱萸炒

甘草炙各一兩

香附米醋炒六兩

蒼朮米泔浸炒四兩

右剉片用白毛烏肉雞一隻重二斤或三斤吊死水泡去毛屎并頭尾不用放
鍋內將藥片蓋上入好酒煮爛爲度取去骨同藥在鍋焙乾爲末將
雞酒汁打稀米糊爲丸如梧子大每服五十九丸空心好酒送下

一治婦人赤白帶下宜

補中益氣湯加黃柏知母香附半夏川椒薛川練子肉薑煎先服此湯

次進後丸藥

歸附地黃丸

當歸酒洗

川芎一兩

白芍酒炒

熟地黃酒蒸

香附子酒便浸

黃柏去皮重一斤

知母大七兩

陳皮一斤半

五味子半斤

蒼朮米泔浸

知母大七兩

陳皮一斤半

一方有白朮化

一方無五味

有山茱萸去

人鹿自

右爲細末酒糊爲丸如梧子大每服五十丸空心淡鹽湯下後用乾物

壓之忌葱白蘿蔔胡椒煎炒發熱之物

一治婦人赤白帶下用

溯源丹

當歸酒洗

熟地黃酒蒸

斷艾醋炒

香附醋浸炒

川芎

人參各一兩

白芍酒炒

阿膠蛤粉炒

白朮去蘆

茅朮米泔製

椿根皮酒炒

黃柏酒炒

地榆各一兩

白茯苓去皮

白石脂火焙六

右爲細末，米醋糊爲丸，如梧子大，每服五、六、七、九，空心米湯送下。

○一治婦人赤白帶下，上熱下寒，口出惡氣，或咽乾，或牙痛，或耳鳴，或流身流注，或痛或發熱，增寒或口吐酸水，或心腹氣痛，或下五色膿，其用清玉散。

當歸酒洗

川芎

赤芍

生地黃

陳皮

半夏姜製

白茯苓

蒼朮米泔浸

香附

黃連

黃芩

柴胡去蘆

升麻

牡丹皮

甘草

右剉，下劑，生薑煎服。

○一治婦人白帶，其効如神。

心身疑傳

硫黃不拘多少，將豆腐副去中一塊，入硫黃居上，仍用豆腐蓋住，砂鍋底放稻草鋪之，放豆腐於內，上仍用草蓋入水，煮一日，頻添水。

至豆腐黑爲度取出硫黃研爲末將白芍紙包水濕火煨切片爲末各等分合下處和勻水打麪糊爲丸如梧桐子大每早空心用五分好燒酒下鍾送下服五日後卽愈如未愈每早服一錢服至五日止愈

○一治婦人白帶男子白濁下淋

乾薑炮一兩百草霜一兩爲末每服一錢溫酒調下

○一治婦人赤白帶下不論年月深久不瘥

乾薑炒黑五錢

白芍酒炒二兩

右爲細末每服二錢空心米飲調服

又方 白雞冠花爲末每服三錢空心酒調下赤帶用赤雞冠花

又方 用鹿角燒灰存性爲末好酒調下空心服二匙

又方 雞子開頂入硫黃末三分濕紙裹火煨嚼吃好燒酒下

又方 蒼朮米泔浸焙乾乾姜炮各等分爲末每服二錢空心酒調服

又方 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰炒焦爲末清米飲空心調服

又方

硫黃五錢炒花胡椒四十九箇爲末好酒調服

又方

硫黃五錢用烏梅肉三錢搗丸黃豆大每五丸空心酒送下

又方

黃荊子炒焦爲末空心米飲調服以能燥濕痰也亦可治心痛

治赤白帶下

五倍子炒桃仁炒去皮尖各等分爲末每服二錢空心燒酒調服

○一治婦人久患白帶瘦削無力倦怠欲睡腰膝腫痛飲食無味面黃目
脯煩熱小便淋瀝以十全大補湯去耜加車前子地骨皮鹿角膠大獲
全効

○一婦人帶下四肢無力蓋四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中

益氣湯兼歸脾湯二藥治之愈

○一婦人年踰六旬內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰行氣前症
益甚飲食愈少肢體或麻或木恪服祛風化痰肢體常麻手足或冷或熱日
漸消削此症屬脾氣虛弱而不能生肺祛風之劑復損諸經也當滋化

源以補中益氣湯加白茯苓半夏炮乾薑。

如聖丹

白礬

蛇床子各等分

右爲末醋糊爲丸如彈子大，胭脂爲衣，薄綿裹，留指線二尺許，煎藥汁，深入五戶中，定坐半日，熱極再換，衣抵此，痰多，因子宮不熱，服藥於○一治婦人帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛，此蓋爲敗膿所致，卒無已期，須以排膿乃已。

白芷一兩

單葉紅荻根二兩，芍藥白者

白礬各五錢，枳殼另研

除爲末同以粥丸，梧子大，空心飯前米飲下十九，或十五九，經閉者仍別他藥補之。

五積散方見中寒

補中益氣湯方見傷

十全大補湯方見補

婦人

歸脾湯方見婦人

虛勞

夫人之生以氣血為本人之病未有不先傷其氣血者世有室女童男橫
想在心思慮過當多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以
致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水
先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虛故發嗽
嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒髮焦筋脈變五臟至此
成勞最為難治或有以為血熱用涼藥解殊不知血得熱則行冷則凝
九經水少漸至不通手足骨肉煩疼漸至羸瘦漸生潮熱脈來微數此
陰虛血熱陽往乘之水不能滅火火逼水涸當養陰血慎勿以藥洩之
○一論治婦人以血旺氣衰為本心生血肝藏血今血衰而氣盛者由心
氣虛耗又不能生血又不能制乎肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虧
損則不能藏血漸至枯涸不榮經絡因月信不調矣此藥專補心元之
虛抑其肺金之盛調和榮衛滋養血脈其疾自愈謹治氣血過多虛勞
發熱及吐血衄血咳嗽喘滿上壅胸膈不舒虛勞熱嗽痰喘無汗等症

茯苓補心湯

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

懷熟地黃

陳皮

半夏

湯泡切
香姜炒

白茯苓

去皮
桔梗去蘆

枳殼

去核炒

前胡

去蘆各
一錢

乾葛

紫蘇各七分

木香各五分
甘草三分

右剉一劑生薑棗子煎服。

○一論婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦此藥專調經水滋
血脈補虛勞扶元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭目定心驚安神魂起
潮熱除骨蒸止喘嗽化痰涎及盜汗在血滿開胃氣利胸膈除痰瀉積
煩渴散寒熱祛體疼大有奇效不能盡述。

濟陰至寶丹

當歸酒洗

白木

去蘆炒
各八分

白芍酒炒

白茯苓

去皮各
八分

生知母

去毛

貝母去心

香附酒炒

地骨皮

麥門冬

去心

陳皮各八分

薄荷

柴胡

甘草各三分
右剉一劑生薑棗子煎服。

壽世保元

庚集七卷

十四

○一論婦人經絡失血少，殊終熱盜汗，或思慮傷脾，不能攝血，以致妄行，或經行心忪驚悸不寧，或心脾虛弱，痛嗜則少，或夢思傷脾，思慮過度，或肢體作痛，太便不調，或經候不准，補熱肉熱，或癩癩流注，治婦人歸脾湯。

黃芪蜜水炒 人參

白朮去苦

白茯苓去皮

當歸酒洗

遠志酒洗 冰酸棗仁炒

龍眼肉絡

木香

甘草炙 各五分

右剉下 剉下 薑棗煎服

加味歸脾湯

治瘀血已去，或經失血，小腹脹痛，無窮熱盜汗，或脾傷不能攝血，或心脾傷痛嗜則少食，或夢思傷脾，血虛發熱，或肢體腫痛，太便不調，或經候不准，補熱肉熱等症，依前方加柴胡、梔子、是也。

○一論婦人血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏沉，心忪煩赤，口燥咽乾，發熱盜汗，減食嗜臥，及血熱相搏，用水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧，及

治室女血弱陰虛榮衛不和痰涎潮熱肢體羸瘦以致骨蒸勞熱宜
逍遙散

當歸

白芍酒炒

白朮去蘆炒 白茯苓去皮 柴胡

甘草多一錢

右剉煨薑一塊入薄荷少許水煎溫服。○加牡丹皮山梔仁炒名加味逍遙散。

一婦人發熱齒痛日晡甚甚月水不調此脾經血虛加升麻炒黃連炒後因怒復痛仍以前藥加川芎而瘳。

○一論婦人虛勞血氣脾胃虛損之極發熱瘵瘵喘急之甚相火妄動肌肉消削四肢沉困夜出盜汗精神短少或大便稀澀或腹中積塊或癯母癯瘵面黃肌瘦百藥罔效宜

五仙湯

嫩黃芪蜜水炒 揀參去蘆

白朮去蘆炒

當歸酒洗各二錢 甘草炙一錢

右剉丁刺龍眼五個蓮肉七個水煎溫服○有熱加地骨皮知母○嗽
加五味子桑白皮○痰加貝母半夏○渴加五味子麥門冬○吐血加
生地黃犀角玄參茅根汁○血虛加熟地黃白芍藥

○一論婦人血氣兩虛五心虛熱或白帶頻頻注下先賢有云婦人性悍
必多姪火且少有不如意處心中燥急感池之火上燔五心如烈也宜
十珍飲子

懷山藥

一錢半

杜仲

錢半

人參

一錢

白朮

去蘆一錢

懷生地黃

一錢半

白茯苓

去皮七分

當歸

一錢

川芎

七分

白芍

酒炒一錢

甘草

三分

右剉棗二枚燈心七莖水煎空心服

○一治肝膽經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲食或怒火口苦其

準咳嗽發熱或脇痛肢滿轉側不便兩脇痞悶或渴煎或嘔吐酸水宜

小柴胡湯

柴胡二錢

黃芩

一錢半

人參

七分

半夏

一錢

甘草

五分

右劉一劑薑棗煎服。

加味小柴胡湯

治肝膽經風熱耳前後腫痛。或結核炊痛。或寒熱晡熱。或經候不調等症。卽小柴胡湯加梔子牡丹皮。

○一論腎虛發熱作渴。唾痰。小便淋瀝。頭暈眼花。咽燥唇裂。齒不堅固。腰腿酸軟。自汗盜汗。便血諸血。失瘖水泛。爲痰之聖藥。血虛發熱之神劑。六味丸。

懷生地

自製入兩用酒蒸至黑

山茱萸

酒蒸去核乾山藥各四兩

牡丹皮

白茯苓

去皮澤瀉各三兩

右爲末煉蜜爲丸。梧子大。每服三錢。空心白滾水下。

○一論婦人經水不調。或不通。虛勞吐血。衄血。咳血。便血。發熱。咳嗽。盜汗。痰喘。心慌。一切虛損勞怯。骨蒸。危篤等症。並皆治之。此方作湯服亦可。滋陰地黃丸。

懷熟地黄

姜汁浸焙乾

懷山藥

二兩山茱萸酒蒸去核二兩

白茯苓

去皮

牡丹皮

澤瀉一兩半

去心 麥門冬 去心

生地黄

酒洗

知母去毛 貝母 去心

當歸酒洗

白芍酒炒

香附米

童便浸炒各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下痰唾淡痰

湯送下。

○一論婦女五勞七情所傷骨蒸五心煩熱心虛怕驚絳水或崩或後或淡白或紫色時常注帶下或因煩勞性氣惱怒產後失調致赤白帶滲及夜卧身體上下疼痛及午後神疲腰腿酸倦或心嘈又時飽悶及夢寐不消或衝任二脈結癥瘕隱隱又服大有功效。

白鳳丹

真正白絲毛烏骨雄鷄一隻先以黃芪末二兩當歸末二兩甘草末五錢三味和米粉七合勻作七分調成小塊雞食之約有六七日即死不

出血去毛腸不用。

當歸身酒洗川芎二兩

白芍酒炒三兩 懷生地黃酒洗五兩

天門冬去心人參一兩

丹參水洗淨山藥三兩

山茱萸酒蒸去核三兩

小茴酒炒懷牛膝去蘆酒洗

木瓜半一兩

鹿角霜四兩

知母炒去毛酒三兩 秦艸去蘆二兩

銀柴胡二兩 胡黃連一兩 鱉甲醋炙一兩

生甘草一兩 麥門冬去心二兩

右俱製如法，剉勻，將雞切作小塊，俱盛於磁罈內，用水二分，好酒二分。

米醋一分，罈口用柿漆紙封固，置大鍋內，桑柴火煮三晝夜，取出，日晒

夜烘一乾，又入汁，拌又烘，晒以汁盡為度，為極紳末，煉蜜和，杵千餘下。

丸如梧桐子大，每服百丸，空心淡鹽湯送下。

○一婦人為契母，吐血咳嗽，發熱盜汗，絳水不行，此悲傷脾，以補中益氣

湯加桔梗貝母知母，夕服歸脾湯，送下六味丸。

○一婦人熱來復去，晝見夜伏，不時而動，或無定處，而作，口舌生瘡，在蒸

從脚起，乃無根之火也。以下全大補湯加麥門五味子。

○一婦人患勞嗽，不時發熱，或時寒熱，或用清熱之劑，其熱益甚，盜汗口乾，兩足如炙，遍身皆熱，昏慣如醉，良久熱止，方甦，或補熱至旦方止。此陰血虛而陽氣弱也。朝用六味丸料，夕用十全大補湯，月餘，諸症稍愈。更兼以補中益氣湯，兩月餘而愈。

求嗣

易曰：天地絪縕，萬物化醇；男女媾精，萬物化生。則絪縕者，升降凝聚之謂也。媾精者，配合交感之謂也。必二氣合則生，且生矣，否則獨陰不成，孤陽不生，理有必然者。知此，則人之不成孕育者，豈無由哉？抑以夫婦竟無一交媾之遇哉？遇而不適，其會是亦獨陰孤陽之謂也。不知者，誘於天命，則泥矣。間雖有鴛鴦為資，藥餌以養精血，候月經以種孕育之說，又多峻補以求詭遇，則求嗣未得而害已隨之，予之痛惜也。又矣夫。種子

之道有四。一曰擇地。二曰養種。三曰乘時。四曰拔虛。是也。蓋地則丹之血也。種則父之精也。時則精血交感之會也。虛則去舊生新之初也。予嘗聞之師曰。母不受胎。氣勝血衰故也。衰則傷於寒熱。感於七情。氣凝血滯。榮衛不和。則經水先後不一。多寡不均。謂之陰失其道。何以能受父不種子。氣虛血弱故也。弱則原於色慾過度。傷損五臟。五臟皆有精而藏於腎。精既弱。譬之射者力微。矢在安能中的。謂之陽失其道。何以能施。究斯二者。皆由已之不能自寬。以至真元耗散。陰涸陽枯。遂成不孕者多矣。動輒歸咎天命。不亦誤哉。故必地盛則種可授。又必時胎虛俱得焉。則未有不懷孕而生子者矣。雖然。至難養者精與血。至難過者時與虛。苟不憑以藥餌之力。示以調攝之宜。候以如期之法。則養與過者竟茫然矣。是知種子之法。以調經養精為首。而用藥須審乎和夫婦尤必各相保守。旬月之間。可便精與血俱盛。所待者時也。當夫月經一來。即記其時而等。以三十時辰。乃兩月半也。至此積穢湯滌既新。血

初生所謂時與虛者俱會矣當此時而有公道之感雖平生不孕者亦
孕矣尚何疑哉是乃屢試屢驗百發百中者也嗚呼是說也豈非道云
乎哉蓋若植元氣顧養天真特資藥力以佐助之所謂人定亦可以勝
天者是也及其既孕將欲要定生男女先以父生年一爻在上母生年
一爻在下以受胎月居中是乾坎艮震陽象也是巽離坤兌陰象也可
預立其年某月為生男某年某月為生女可預定焉予敢統為圖後嗣
者告。

書生男女歌

父母之年上下舉，坐胎之月為中主。乾坎艮震定是男，巽離坤
兌決是女。筮男却生女，三五九歲死。筮女却生男，終以鬼來
纏。若是正胎者，書考不須言。

乾三 坎三 艮三 震三 巳上是男胎 巽三 離三 坤三
兌三 巳上是女胎

千金種子方

進火之時至陰節間而止不爾則過子宮矣蓋深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺不在深也非經後不可用事經後十日男二百女三百男此外皆不成胎大風大雨大寒大暑陰晦日月蝕皆不可交致生子疇孽瘖瘡四體不亮且自損壽

○一論九婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜進此藥而効可通神

調經種玉湯

安齋姚范川傳

當歸身

酒洗

川芎

四錢

白芍

酒炒

三錢

熟地黃

酒蒸

白茯苓

去皮三錢

陳皮

三錢

香附米

炒

六錢

吳茱萸

炒

四錢

玄胡索

三錢

牡丹皮

三錢

若先期三五日色紫者血虛有熱也加條芩三錢

若過期經水色淡者血虛有寒也加官桂乾薑炒艾葉醋炒各二錢
右剉作四劑每劑用生薑三片水一碗半煎至一碗空心溫服此
煎臨昨服待經至之日服起一且服一劑藥盡經止則當藥燒即成孕
矣若未成孕經當對期候經來再服四劑必孕無疑矣百發百中
○一論此方常服順氣養血調經脈益子宮療腹痛除帶下種子屢效不
可盡述。

種子濟陰丹

香附米四兩 一兩醋浸

一兩酒浸

一兩米泔浸

一兩童便浸

各浸三日焙乾爲末

益母草二兩已上二味忌鐵器

艾葉醋浸炒 真阿膠 蛤粉炒成珠

二兩當歸酒洗一錢

川芎一兩

白芍鹽酒炒一兩

懷熟地黃

姜汁炒二兩

陳皮去白一兩

半夏湯泡姜汁浸香枳

白茯苓去破

白朮去蘆土條炒一兩

牡丹皮酒洗

吳茱萸湯泡

玄胡索四錢小茴香

鹽酒炒五錢

沒藥五錢

川續斷一兩

麥門冬一兩

甘草炙三錢

右爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服白丸空心米湯送下溫酒家

俱可氣虛加人參一兩○下左加山藥石棗各一兩

○一論孕育子嗣全在調經理脾血氣充旺調其經候去其妬忌再服空

方自然有子。

調經育子湯

當歸酒洗

川芎七分

白芍酒炒

熟地黃姜汁陳皮 八分

白朮去蘆

香附酒炒 一砂仁三分

丹參五分

條苓酒炒 一錢

甘草多四分 水煎空心服。

先期者熱加黃連姜汁炒七分倍黃芩後期者假虛加黃芪參

一錢倍黃歸○腹痛者現加玄胡索炒牡丹皮各一錢○發熱加軟

柴胡地骨皮○赤白帶下六加柴胡升麻俱酒炒各七分半及姜汁炒

白茯苓蒼朮米泔炒黃柏知母俱酒炒乾薑炮升陽除濕也○肥膩

者瘀脂滿子宮加南星半夏蒼朮茯苓○瘦怯者血少不能攝精倍
 芎歸○經血過多加炮姜五分荆芥穗炒八分地榆九分○經閉不
 通加桃仁紅花蘇木○氣盛者倍加烏藥陳皮香附柴胡

○一治婦人陰血不足久無子者能便胎孕

六味地黃丸方見虛勞依本方全料加重便炒香附二兩煉蜜為丸服

○一治婦人無子仙方

烏鳳丸

香附米

一斤口製酒清者便米州
各四兩

白茯苓

去皮當歸二兩

川芎二兩

白芍一兩

陳皮

白朮

去蘆陳土炒一兩

山藥一兩

小茴香二兩

吳茱萸

蓮肉

酸棗仁

一兩 大附子一個看取

黃芪

阿膠

黃柏一兩

知母一兩

懷生地黃

酒拌砂錫自蒸黑

右用雄烏骨雞一隻

吊死去毛

屎淨

洗淨

搗爛

同煎

丸每服二錢臨經之日每日二服半月見効多服恐生雙胎

補天育嗣丹 太方伯王如水傳

嫩鹿茸酥 虎脛骨酥 敗龜板酥 補骨脂 鹽水微炒二兩

懷生地黃去雜碎者不用 沉實者八兩好酒浸一宿 山茱萸酒蒸去核

懷山藥四兩 白茯苓去皮切片乳汁浸晒乾再浸 牡丹皮去骨

澤瀉去土 天門冬去心皮 二兩 甘枸杞子 酒當歸身酒洗四

右忌鐵器爲細末用

紫河車一具此乃混沌皮也又名濕元衣取首男胎者佳先用米泔水洗淨此乃初結之真氣也再入長流水浸一刻以取其氣取回入碗內放砂鍋內蒸一日極爛如糊取出先傾自然汁在藥末內略和勻此水元正氣汁也將河車放石臼內杵如泥却將藥末亦同杵勻爲丸如乾如些煉蜜和勻爲丸如梧子大每服二錢空心溫酒送下忌二百此至天元真氣以入補之素妙不可言也

續嗣壯元丹

種子天下第一方

嫩鹿茸

一兩

真沉香

一兩

肉從容

酒洗去甲一兩

天門冬

麥門冬

去心一兩

揀參

一兩

熟地黄

酒蒸一兩

巴戟

山藥

四兩

栝子仁

去殼四兩

白茯苓

去破透五味一兩

山茱萸

當歸

酒洗一兩

川杜仲

酒炒一兩

牛膝

去蘆酒洗一兩

兔絲

小茴香

鹽炒一兩

鼈甲

酥炙一兩

破故紙

炒一兩

何首烏

石菖蒲

去毛一兩

朱砂

五錢

右為細末酒打麪糊丸如栝子大每服四十九空心溫鹽湯下忌燒酒

胡椒乾姜煎炒之物專治虛損弱事不舉少弱多情弱冷心腎不交難

成子嗣遺精白濁五勞七傷一切虧損之疾無不應驗臨臥再進三服

魯府退仙傳種子藥酒方

白茯苓

去皮

大紅棗

去核

胡桃肉

去殼

去粗

白蜂蜜

又加

補藥

有二十斤

歸米

白酒

十斤

黃芪 蜜炙

人參

白朮 去蘆

當歸

川芎

白芍 炒

生地黃

熟地黃

小茴

甘枸杞子

覆盆子

陳皮

沉香

木香

官桂

砂仁

甘草 各五錢 乳香

沒藥

遼五味子 銹三

右為細末共入蜜罐內和勻築葉封口麪外固入罐內木柴火煮三炷香取出埋于土中三日去火毒每日早晚三時男女各飲數合勿令大醉安寢定魄改易容顏添髓駐精補虛益氣滋陰降火保元調經壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目視有光心力無倦行步如飛蒸暑不傷能除百病交媾而後生子也神秘不可傳與非人竇之寶之。

一治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢酸痛倦怠無力飲食減少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更宜戒氣惱怒必生為其効如神

艾附暖官丸

卷之六

三十一

香附米

炒研麥葉三兩

當歸酒浸三川芎二兩

白芍酒炒二兩

懷生地

酒蒸黑一兩

黃芪蜜炒二兩

川芎斷一兩

吳茱萸三兩官桂五錢

右爲細末醋糊爲丸如梧子大每五十丸空心淡醋湯下

○一論婦人氣盛於血變生諸症所以無子尋常頭暈腦滿怔忡皆服

抑氣散

香附米童便白茯苓去皮木二

陳皮二兩甘草炙二兩

右爲末每二錢空心滾水調下

○一論婦人妬嫉悞夫無子蓋正土公朝小人忌之美色入室求婦妬之

咸宜此可免妬忌之病也

夫妬丸

天門冬去心赤黍米去殼微炒

慧苡仁去殼炒各四兩

右爲末煉蜜爲丸每服百丸食遠白湯送下婦人常服則不妬也

姪娠

經云陰脾陽別謂之有子。此是氣血和調陽施陰化也。診其手少陰脈動甚者，姪子也。少陰心脈也。心主血脉，又腎名胞門子戶。尺中腎脈也。尺中之脈按之不絕者，姪娠脈也。三部沉浮正等，按之無斷絕者，有娠也。又左手沉實為男，右手浮大為女。左右俱沉實，生二男。左右俱浮大，生二女。又尺脈左偏大為男，右偏大為女。左右俱大，產二子。又左右手尺脈俱浮為產二男，不兩女。作男生俱沉為產二女，不兩男。作女生又左手尺中脈浮大者，男。右手尺脈沉細者，女。又得太陰脈為男，得太陽脈為女。太陰脈沉，太陽脈浮，欲知男女遺面，南行還復呼之。左迴首是男，右迴首是女。又看上圍時，夫從後急呼之，左迴首是男，右迴首是女。婦人姪娠，其夫左邊乳房有核是男，右邊乳房有核是女。

姪娠一月名曰始形。飲食精熟酸美受御宜食大麥。無食腥辛之物。是謂

水貞足厥陰養之足厥陰者肝之脈也肝主血一月之時血流滋如不出故足厥陰養之足厥陰穴右足大指歧間白肉際是

姪娠二月名曰始養無食腥辛之物居必靜處男子勿勞百節首痛是謂始藏也足少陽養之足少陽者膽之脈也主於精二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足少陽穴在足小指間本節後附骨上一寸陷中者是

姪娠三月始胎當此之時血不流形像始化未有定儀見物而變故令見貴盛公主好人端坐莊嚴不欲令見僂僂佻儒醜惡形人及猿猴之類無食姜兔無懷刀繩欲得勇者操弓矢射雉鷄乘肥馬於田野觀虎豹及走犬其欲得女者則著簪珂環珮弄珠璣欲令子美好端正者數視白璧美玉看孔雀食鯉魚欲令兒多智有力則啜牛心食木皮及飲以子腎良盛德則端心正坐清虛和一坐無邪席立無偏倚行無邪態且無邪視耳無邪聽口無邪言心無邪念無妄喜怒無得思慮不無邪觸

肝無藏足思欲瓜果噉味酸殖好芬芳惡見穢臭是謂外象而變者也
手心主養之手心主者脉中精神內屬於心能混神故手心主養之手
心主穴在掌後橫文是診其妊娠脈滑疾重以手按之散者胎已三月
也

妊娠四月之時始受水精以成血脉其食宜稻稊其羹宜魚雁是謂盛養
以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽養之手少陽者三焦之
脉也內屬於府四月之時兒六府順成故手少陽養之手少陽穴在手
小指間本節後二寸是也診其妊娠四月欲知男女左脈疾爲男右脈
疾爲女左右俱疾爲生二女當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂
也是手少陽三焦之脉內屬於三焦靜形體和心志節飲食

妊娠五月始受火精以成其氣胎必晏起洗浣衣服深其屋室厚其衣
朝吸天光以避寒殃其食宜稻麥其羹宜牛手和以菜蕒調以五味是
謂養氣以定五臟者也一本云宜食魚鼈足太陰養之足太陰脾之脉

主四季五月之時兒四肢皆成故足太陰受之足太陰穴在足肉腠上
三寸也診其妊娠脈重手按之不能任疾不滑者五月也又其脈必
必向懷脈脈者必胞頃脈遲者必腹滿喘脈浮者必水懷爲腫
妊娠六月始受金精以成其筋欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及
視走馬宜食熱鳥猛獸之肉是謂變滕臂筋以養其爪以牢其骨臂足
陽明養之足陽明者胃之脈主其口自六月之時兒口自皆成故足陽
明養之足陽明穴在大衝上二寸是也

妊娠七月始受木精以成骸勞躬搖支無使定止動作屈伸居處必燥飲
食避寒常宜食稻稊以密滕理是謂養骨牢齒者也手太陰養之手太
陰者肺脈主皮毛七月之時兒皮毛已成故手太陰養之手太陰穴在
手大指本節後白肉際陷中是診其妊娠七月脈實大牢強者生男細
者死懷軀七月而不可知時時變而轉筋者此爲軀軀時變而動者非
軀也懷軀七月蒸下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也

妊娠八月始受土精以成膚肉。肝心精氣是，謂之胎理而光澤。顏色手陽明養之，手陽明者大腸脈。大腸主九竅。八月之時，兒九竅皆成。故手陽明養之，手陽明穴在大指本節後宛宛中，是診其妊娠八月脈實大牢強弦緊者生，沉細者死。

妊娠九月始受石精以成皮毛。太府百節莫不畢備，飲醴食甘，緩帶自持，而待之。是謂養毛髮多才力。足少陰養之，足少陰者腎之脈，腎主續續。九月之時，兒脈續續皆成。故足少陰養之，足少陰穴在足內踝後微近下筋動脈是也。

妊娠十月五臟俱備，六府齊通，納天地於丹田，故使關節入神感備，然可預修滑胎方法也。

○一論婦人經脈不行，已經三月者，不脈不止，則是胎也。

驗胎散

川芎爲末，每服一錢，空心艾葉煎湯調下，覺腹內微動，則有胎也。若服

後下日不動非胎必是經閉。

○一治婦人經水過月不來難明有無胎孕

艾醋湯

用好醋炆艾服半盞後腹中脊太痛是身孕不為痛定無孕

○一論婦女經候不行身無病似疴狀胸大而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎

保生湯

人參二錢 白朮五錢 橘紅五錢 香附子五錢 烏藥五錢

甘草二錢 每剉一兩水一盞半 生姜五片 水煎七分去渣溫服不

拘時候或為米姜湯調亦可

○一論惡阻 謂婦人有孕惡心阻其飲食也宜服

養胃湯

當歸酒洗

白芍酒炒

白朮去麩炒

白茯苓去皮 陳皮

半夏

湯泡洗切片用香油炒

香附炒各等分

砂仁

神麩炒

甘草減半

右劉生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

○一婦人有孕嘔吐不止。子用。

半夏薑汁炒用。一半。陳皮茯苓甘草用。一半。生姜七片煎服立止。

○一論妊娠三月。其經月來三五次。但不多。飲食精神如故。此血盛有餘。

見大能飲。自不來矣。後果然。

○一論子煩。謂妊娠煩燥而亂心神也。宜進

竹葉湯。

白茯苓去皮 二錢 防風去蘆 一麥門冬去心 各一錢半

右剉。下劑竹葉五片。水煎溫服。

○一論子癇。謂妊娠痰涎潮熱。自用口禁。不省人事也。

癸羊散

當歸酒洗

川芎

防風

獨活

白茯苓去皮

五加皮

薏苡仁

杏仁去皮

酸棗仁炒

木香

癸羊角

甘草

右剉薊生薑五片水煎溫服

○一論見在腹中突用多辛辛空房下鼠火中土下塊念孕婦胎之即止

○一論子懸謂姐娘心胃腹筋兼胎胎氣不和心腹脹滿疼相或臨產

驚恐氣結連白不下及胎前一切諸疾悉宜此方加減治之

紫蘇和氣飲

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

人參

紫蘇

陳皮

大腹皮

甘草

右剉薊生薑五片葱白七寸水煎溫服○腹痛如香附木香○咳嗽加

枳殼桑白皮○熱加黃芩○嘔吐加砂仁○泄瀉加白朮去蘖炒白茯苓

苓去皮。○感冒加羌活麻黃。○傷食加山楂香附。○氣惱加香附烏藥。

○一論子腫，謂姙娠七八個月前後面自虛浮，肢體腫滿也。宜。

茯苓湯。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

白朮去蘆炒

白茯苓

澤瀉

條芩

梔子炒

麥門冬去心

厚朴姜炒

甘草

右剉劑水煎服。

○一論子氣，謂姙娠自三月成胎之後，兩足自脚而漸腫，腿膝以來行步艱辛，以至喘悶，似水氣之狀，至於脚指間有黃水出者，謂之「子氣」。

天仙散

天仙藤 續斷 木香 藤

紫蘇

陳皮

香附炒

烏藥

木瓜

甘草

右剉生薑煎服，加蒼朮尤妙。

○一論子淋，謂姙娠小便澀痛頻數也。宜後方。

子淋散

麥門冬去心 赤茯苓

大腹皮

木通

甘草

右剉淡竹葉下皮煎空心服。

○一論轉胞

謂姪娠卒不得小便也。因胎長逼近於胞，胞爲所逼而側

令入數瘦胞，卽膀胱也。然子淋與轉胞相類，但小便頻數，點滴而痛，爲

子淋，頻數出少而不痛，爲轉胞。間有微痛，終是與淋不同，並宜五苓散

加炒阿膠，又宜冬葵散治。孕婦轉胞，小便不通，及男子小便不通，比男

冬葵散

冬葵子半兩 山梔子半兩 炒研木通三錢 滑石半兩 研此藥燥熱，胎前且可

右剉，下劑水下盡半煎，八分溫服。外以冬葵子滑石梔子爲末，田螺肉

搗膏，或生葱汁調膏，貼臍下立通。

○一姪娠轉胞不得小便者，用八物湯加半夏陳皮名三合湯服之，探吐

以升提其氣，上竅通而下竅自利也。

○一論胎漏，謂姙娠有胎而血漏下，屬氣血虛而有熱也。
芎歸湯

當歸尾 川芎各五錢

右剉下剉好酒煎。入童便下瀉同服。一服立止如神。

膠艾四物湯 治症同前

當歸酒洗一錢 川芎八分

白芍酒炒一錢 懷熟地黃酒蒸一錢

真阿膠炒成珠八分

條芩一錢 白朮去蘆炒一錢 砂仁炒一錢

香附炒一錢 艾葉少許 粳米一撮水煎服。

丁方加蒲黃炒一錢 陳皮七分 杜仲鹽水炒一錢 續斷一錢 甘草炒四分 去艾葉不用 只用水煎服。

○一治胎動出血產門痛，黃連為末，酒調一錢，服三服。

○一論胎動，謂姙娠因事跌仆，子死腹中，或寒疾下，瘖痛小已，口噤欲死，用此藥探之，若子死腹中，立便逐下，若腹痛隨止，子母俱安，又治臨產。

難生胞衣不下。及產後血暈不省人事。狀似中風。血崩漏下不止。腹中
血刺疔痛。血帶浮腫。血入心經。語言顛倒。如見鬼神。血氣相搏。身熱而
疼。或似瘡非瘡。下切胎前產後。狼狽垂死等症。並宜治之。其
佛手散。

當歸酒洗一兩

川芎七錢

右剉。下劑水煎。將熟再入酒煎。濕服。○如口鼻押開。灌之。如人行五里
許。再灌之。便醒立產。○如胎漏下血不止。以海狗入重便下。濕服。

○一方治胎氣動用鯉魚下筒水煮熟。并湯食之。立刻下。

○一因重動胎致胎不安。動搖不已。及下血。欲墮者。四物湯合四君子湯
加條芩阿膠砂仁白芷桑寄生。

○一論安胎。謂安胎有二。有因病而胎動者。但療母病。其胎自安。有胎
不安。因顯母病。但安胎氣。母病自瘥。

○一論孕成之後。覺氣不安。或腹微痛。或腰間作癢。或飲食不美。或胎動

下血及五六箇月常服數劑甚妙

安胎飲

當歸身

酒洗

川芎八分

白芍

酒炒

熟地黄

酒蒸

條芩一錢半

白朮

去油

砂仁微炒

陳皮一錢

蘇梗八分

甘草四分炒

右剉下劑水煎溫服

○下血不止加蒲黃炒阿膠炒各一錢○腹痛加

香附醋炒枳殼炒各一錢

○一論半產謂婦人懷孕血氣虛弱不能營養以致數月而墮也。

芎歸補中湯

黃芪裏水炒人參

白朮

去蘆炒當歸

川芎

白芍炒

乾薑炒

阿膠炒

五味子

杜仲姜酒炒

木香

甘草炙

水煎溫服

一論陽痿陰化胎孕乃成血氣虛弱不見榮養其胎則墮又有勞傷情肉火便動亦能墮胎火能消物造化自然子見一婦人有孕至三個月

月左右必墮胎其脈左手大而無力重按則澀知其血少以其壯年只
補中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢與數十
劑得保全而生一子也蓋孕至三月上屬相火所以易墮

安胎丸 妊娠宜常服之

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

條芩略一

白朮

去蘆炒五錢

右爲細末酒糊爲丸如梧子大每服五十丸茶湯任下空心日服三次
清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素慣孕產者皆宜服之以治其
源而後無患也○一婦人小產常服此以保胎爲十月完足潮運肉去
心四兩砂仁炒二兩共爲末每二三匙米飲調下日服三四次

○一論婦人常慎小產久而不育者可服過七個月不必服

千金保孕丹

當歸酒洗

熟地黄

酒蒸

人參

一兩

白朮

去蘆炒

條芩

二兩

陳皮一兩

香附子

童便浸

一兩

續斷

酒浸

杜仲

酒炒

一兩

右為細末糯米飯蜀九楮子大每服七十丸白湯下。

一方去人參加砂仁川芎阿膠艾葉益母草棗肉為丸。

○一論婦人當經小產今有孕預先培補為妙大凡婦人墮胎只是育經廢弛衝任帶服受虧而然宜服此湯大有益也。

加味八珍湯

黃芪二錢

人參二錢

白朮去蘆一錢

甘草炙三分當歸酒洗一錢

川芎七分

白芍酒炒一錢

知母一錢

熟地黃酒洗一錢

防風七分

山藥一錢

升麻四分

黃柏酒浸炒褐色四分

益智仁研八分

已上剉一劑水煎溫服

○一治婦人每懷胎至三四月必墮不肯服藥。

用四五年老母雞煮湯入紅殼小黃米煮粥食之不數而胎竟固全至月滿而生。

○一論妊娠身居置其口厭甘肥愛樂不常食物不節既飽便卧致令胎

胎肥厚根蒂堅牢行動艱難因致臨產必是難生。八月可服此藥。且產
二服補其血而順其氣使子易生而胎易落也。又治小產瘀血腹痛及
胎衣不下。

保生無憂散

當歸

川芎

白芍各七分乳香

枳殼各一錢
麩炒

木香

甘草各五分血餘琥珀四

右剉下痢水煎溫服。

○一治胎肥壅隘動止艱辛臨月服之續胎易產。

瘦胎散

枳殼五錢

香附子三錢

甘草一錢半

右爲末每服二錢百沸湯調服。

○一論姙娠至八九個月服數劑甚好令易產腹亦少痛。

達生散

當歸身酒洗白芍酒炒

白朮

夫油薑炒各一錢

人參

陳皮

紫蘇各五分大腹皮

洗錢甘草

各三分

或加砂仁

五分枳殼炒八

分尤妙

右對一劑葱五根水煎服

如胎肥氣喘加黃楊腦七箇此黃楊樹梢兒也此物能瘦胎不宜

夏加黃芩春加川芎冬加砂仁○氣虛倍加參朮○氣實倍陳皮香

附○血虛倍當歸加地黃○性急多怒加柴胡○有熱加蔥全○食

少加砂仁神曲○渴加麥門冬○食易飽多加黃楊腦○有聚加半

夏姜湯泡切片香油炒黃芩○腹痛加木香

○一論妊娠七八月間服此胎氣欬束令人易產凡患產難者多由內熱

灼其胞液以致臨產之際乾澀而難或脾氣怯弱不能運化精微而令

胞液不足亦產難之道也故用白朮茯苓益其脾土而培萬物之母用

黃芩清其胎熱其胎熱瀉火而存胞液乃陳皮者取其辛利能流動中

氣化其肥甘使胎氣不滯兒身不肥耳此束胎之義也

東胎丸

茯苓七錢

陳皮三兩

黃芩

夏二兩 春秋七錢 冬五錢

白朮二兩

右爲末酒糊丸梧子大每五十丸米湯送下

一孕婦胎痛

當歸

川芎

條芩酒炒

阿膠炒

香附

玄胡索

水煎溫服

治孕婦心痛

玄胡索五錢 當歸一錢

乳香五分

甘草一錢

右剉水煎溫服

治孕婦腹痛或胎動不安

砂仁炒二兩 條芩炒 紫黑一兩半

白朮去蘆炒一兩

右爲末每服三錢紫蘇湯調服

一治孕婦腰痛狀不可忍

補骨脂不拘多少，瓦上炒令香熟，爲細末，嚼核桃肉半箇，空心溫酒調下二錢。

○一治姙娠偶因所觸，或墮高傷，致胎動不安，腹中痛，不忍荷。砂仁不拘多少，研平，內盛慢火炒令熟透，去皮，搗羅爲末，每服二錢，用熱酒調下，頓覺腹中胎動，虛極熱，卽胎已安，神效。

○一治姙娠太使閉澁艱難

當歸

川芎

白芍

生地黃

枳殼去穢

黃連

右剉水煎溫服

○一論姙娠下痢赤白腹中疝痛

當歸五分

白芍一錢

白朮五分

白茯苓五分 澤瀉五分

木香三分

檳榔三分

黃連五分

黃芩五分

甘草三分

右切作丁服水一盞半，煎至一盞，空心溫服。如白痢腹痛甚，者恐有寒也，去苓連加乾薑炒三分。

○一治妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連八分

厚朴姜炒

阿膠炒

當歸各六分 艾葉

黃柏

乾薑各五分

右爲末空心米飲調下方寸匕日三服

○一論妊娠泄瀉腸鳴腹痛手足厥逆

人參

白朮炒

乾姜炒

甘草炙

加肉桂砂仁

右切生薑三斤棗二枚水煎空心溫服

○一論孕婦癰疾寒熱相半并產後瘡疾

當歸

川芎

白芍

青皮

陳皮

半夏

白茯苓

棋柳

草果

良薑

紫蘇

乾葛

甘草

右剉薑棗煎服日服

○一論妊娠風壅咳嗽痰喘胸悶

百合蒸

貝母

紫苑

白芍

前胡

赤茯苓

去皮 桔梗

甘草

生薑五片水煎服

○一論孕婦咳嗽用貝母麩炒為末

研砂糖拌勻丸如雞頭實大口蛤泥

○一論姪娠忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂

二合湯

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

懷生地黃

陳皮

半夏煨炮青

白茯苓去皮麥門冬去心遠志甘歸心石菖蒲

竹茹

甘草

右劉生薑水煎服

○一論姓張不語非病也聞有此者不須服藥臨產日且服

○一論婦人懷鬼胎如抱三兔

○脉經云設令官中人若寢婦無失常夜夢寐交過和氣或懷似胎而成

癆瘵之疾急當在下宜留

斷鬼丹

下下下下下

下下下下下

吳茱萸

川烏頭

秦艽

柴胡

白殭猪炒

巴戟夫心

右爲末，煉蜜爲丸，加梧桐子大，每服七丸，蜜酒送下，出惡物即愈。

○一論，妊娠癥瘕痞塊，及二者疑似之間者，久服安養胎氣，消散經絡，消補丸。

枳殼 麩炒

檳榔

黃連

黃柏

黃芩

當歸

阿膠 炒

木香 各一兩

右爲末，水化梧子大，不拘時，溫米飲下，二十九日進，二三服。

○一論，妊娠或時有白濁白帶而下。

四物湯，合二陳湯，加蒼朮、牡蠣、龍骨等藥。

○一論，妊娠遺尿失禁。

白薇

白芍 酒炒 各等分

右爲末，酒調，方寸匕，日三服。

○一論妊娠痰嗽見紅

當歸身

熟地黃

天門冬去心

麥門冬去心

紫苑

各五分

桑白皮蜜炙

杏仁去皮

甘草炙

桔梗

片苓

五味子

阿膠

炒各二分半

右剉加竹茹下團水煎服入小煎汁同服

○一婦人每孕不數月即墮忽又孕三月患嘔吐吞酸暖氣嘈雜腸鳴泄

瀉胃脘疼痛

陳皮一錢

半夏麩

七分

白茯苓一錢

白朮去蘆

一錢米泔炒

神曲炒五分

香附炒六分

藿香四分

黃連

姜汁炒三分

川芎

一錢

甘草

炙四分

右剉薑棗煎服

○一治胎孕九個月將產消息用猪肚下隨依法煮葱五味煮乾食之

不盡再服不與別人食

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

白扁豆生去皮為細末，清米飲調，方寸匕，神効。

○一 妊婦下血，脹涼血之藥，下血益壯，食少體倦，此脾氣虛而不能攝血，

以補中益氣湯治之乃能。

○一 治婦人墮胎昏憤不時吐痰，自用養血化痰之劑，昏憤不食，白汗，

擦痰涎壅出，故以為中風，欲用祛風化痰，予曰：此屬脾氣虛寒所致，遂

用十全大補湯去程，加知母、防風、山藥、升麻、黃柏、熟地、知仁。

○一 妊婦氣喘痰盛，諸藥不應，問治於余，詢之云：素有白帶，始於目下，淨

兩月餘，其面亦然，此陰虛有痰飲也，用六味丸料數劑而愈。

○一 妊婦每至五月，肢體倦怠，飲食無味，先兩足腫，漸至遍身，後及頭面，

此是脾肺氣虛，朝用補中益氣，夕用六君子，加蘇梗而愈。凡治妊婦，毋

泥其月數，但見其病，症候，便用某藥，為善。

妊婦傷寒治法

○一治妊娠傷寒護胎法

井底泥

青黛

伏龍肝

右爲末調勻塗於孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也。

○一治妊娠傷寒傷風勿輕服藥發熱頭疼惡風身痛。

紫蘇

陳皮

香附

川芎

白芷

甘草

右剉一劑薑葱煎服。

加味四物湯

專治妊娠傷寒諸症。

當歸身

川芎

白芍

熟地黃各等分

右剉每服五六錢水煎溫服。

如妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊加麻黃細辛。

如妊娠傷寒中風表裏自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱加黃芪地骨皮。

如妊娠中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛加防風蒼朮。

如妊娠傷寒胸膈滿痛脈弦加柴胡黃芩。

如姪娠傷寒太便硬小便赤氣滿而脈沉數加大黃生桃仁去尖炒

如姪娠傷寒小便不利加茯苓澤瀉如姪娠傷寒小便赤赤者加

如姪娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲加附子去脂桂少用

如姪娠傷寒畜血症加生地黃大黃酒浸

如姪娠傷寒身熱太渴蒸蒸加熟脈長而大者加石膏知母

如姪娠傷寒下後過篩而不愈強發加錦紋加升麻連翹

如姪娠傷寒下後咳嗽不止者加人參五味子

如姪娠傷寒下後虛痞腹滿加厚朴非製枳實炒

如姪娠傷寒不得眠者加梔子黃芩

如姪娠傷寒汗後血痛不止者胎氣損者加阿膠及甘草黃芪

如姪娠脈浮頭腫自利腹中痛去地黃加桂枝炒

如姪娠傷寒自利腹中痛飲食不下脈沉者去地黃川芎白朮黃芪

如姪娠傷寒頭暈項強身熱口乾胸脇疼用生地黃加柴胡前胡人參

妊娠食忌

一受孕之後不可食之物切宜忌食非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設戒不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形母頭可驚

食雞肉糯米合食令子生寸白蟲
食鯉魚鱸魚及鷄子令兒成疳多瘡
食羊肉合子缺唇蓋鬼乃不能而孕生子則口中吐出是以忌焉
鴨子共桑椹同食令子倒生心寒
雀肉合豆醬食之令子面生黧黑子
食米漿絕產
食山羊肉合子多病
食螃蟹合子傾生
食驢馬肉延月難產

食羊肝令子生多厄
食羊肉合子無聲音
食蟹合子項短及損胎
食豆醬合霍食之墮胎
食牛肉合子不耻多產
食子薑合子多指生瘡
食蝦蟇鱈魚令兒瘡癩

如此之類無不驗者則知聖人胎教之法豈非慮有自其然乎

產育

○一產母面赤舌青毋活子死毋面青舌赤口沫出子活毋死毋唇青
口兩邊沫出身重寒熱舌下青黑反舌上冷過此症者子毋活治不可
○一胎產橫逆多因淫草太早努力過多兒身未轉或已破水其血必乾
致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫當以小絹紮於兒手足心
針入工二分三四刺之以鹽塗其上輕輕送入兒得痛驚轉下縮卽當
回順而生矣

○一論產難或橫或倒死胎爛脹於腹中者幾絕腹痛或腰重欲生草時
將神非飲卽溫飲下蓋便覺心下開豁如渴又飲下蓋覺下重便難更
無諸苦橫生倒逆不過三服卽正子死腹中不過三服卽下能保母子
兩全最爲神驗有下婦人橫產手出至臍腫脹但欲截其手不保其生

屢服催生藥，本功以此藥濃煎一碗與服，少頃甦醒，再與一碗，用時忽云我骨節都拆開了，快扶起我，血水俱下，拔出死胎，全不費力，可謂更生，以此救入百登百中。

催生神柞飲

生柞樹刺枝如小指大者，一握淨洗半碎，丁葉丁刺者處處有之。

甘草五錢 右剉，丁大劑，新汲水一碗半，入新瓦罐內，用紙三重密封之，文武火煎八分，溫服。

○一治胎婦臨產艱難，或十二日不下者，服此自然轉動下生。

三合濟生湯

當歸 五錢 川芎 二錢 枳殼 去穢 蘇八分 香附 炒 一錢半

大腹皮 半 姜汁 洗 一錢 甘草 七分

右剉水煎，待腰痛甚，服之即產。

催生如意散 臨產腰痛方服之。

人多一錢 乳香一錢 辰砂五分

右爲末臨產之時急用雞子清下個調藥用生薑自然汁調開冷服如橫坐倒產卽時順正子母均安。

○一論妊娠子死或未死胎已動身歸湯加紫蘇酒水煎服死者卽下未死者卽安。

○一論胎衣既破其血已涸或元氣困憊用八珍湯斤許再加益母草半斤水數碗煎熟時時飲之飲盡再煎。○孕婦臨月預服此藥自進一服則子易生而胞易落也。

○一論橫坐逆產須更不救子母俱亡。

蛇退一條 蟬退十四箇胎髮一丸並燒灰

右爲末分作二服酒調下須更進一服仰臥寢時卽下。

○一治產難澀心不下者蛇退燒灰同麝少許研細溫酒調下立產。

○一論臨產破水三五日不下將死未絕者 江月池傳

魚鱗用大者三十，香油浸過，燈上燒之，滴下油，入酒內，其灰研末酒調服立下。

○一論難產，漿胞乾胎不得下。

香油蜂蜜各一兩，和勻，入銅鉢內，慢火煎，一二沸，掠去沫，調白滑石末，一兩，攪勻，頓服，外以油蜜摩坊服，上下。

○一婦人分娩艱難，產子已死，元氣勞傷，用油紙捲，燒斷臍帶，取其陽氣，以補之，俄間兒啼作聲，若以刀物如常斷之，其母亦難保生。

夫子死腹中者，多因驚動，大阜或觸犯禁，或抱腰太重，或頻揉拭，赤胞衣先破，血水先盡，而胎乾涸，故耳。其候產母唇舌皆青者，子母俱死。若舌黑，或脹悶甚者，然其子已死矣。先以平胃散一兩，酒水各半煎，却投朴硝半兩，即熟皮硝服，或用硝一兩，以童便調下，亦妙。

○一治胎衣不下，雞子清三個去黃，以酸醋一合和之，吸入口中，即下。

○一方治胞衣不下，即嚼生葱百數根，即下。

○一治胞衣不下

紅花二兩炒，清酒五爵，沃之，溫服。此乃氣弱而瘀血，故於胞也。故用清酒壯其氣，紅花敗其血。

○一胞衣不下，因產母元氣虛薄者，用芎歸湯倍桂以溫之，自下。

○一治婦人難產及橫生逆產，如神。用蛇退炒焦為末，每五分酒調下。

○一治赤胎不下，兼治難產及橫生倒生。

用桂心為末，每一錢，痛隱密時用溫酒調下。

○一方用麝香五分為末，加桂末二錢，酒和服。

○一治產後胎衣不下，惡血沖心，腹中血塊。

錦紋木黃二兩為末，以好醋半升熬成膏，丸如梧子大，以醋化，五丸服。

之須臾即下。又治月經不調。

○一治橫生逆產胎死腹中不下。

公老畢腰子一付。輕粉一分。松香一分。共搗作三四丸。辰砂爲衣。埋之。
○一治胎衣不下。令產婦啜自己髮尾。放口中。令嘔。衣即下。
○一論婦人分娩交骨不開。或五七日不下。垂死者。
活命芎歸湯

川芎

當歸各一兩

生男女婦人髮

一握燒灰存性

自死龜殼

一個如無古龜者亦可酥炙

右爲末。每二兩水煎服。良久不問生死胎即下。

○一論妊娠十月滿足。或因恚情內傷。或患潮熱之症。又兼產前多飲熱毒之物。瘀血相搏。七情怒氣所傷。臨產頓逆之厄。惶怕不謹。輒用藥攻下。手取胎觸死。胎見在腹。不能所治。今傳妙方。防此之禍。但服一二帖。加烏金丸二顆。甚効。

活水無憂散

益母草

二兩

大枳殼

一兩當歸

四錢

川芎

一錢

白芍

二錢

生地黄二錢 官桂一錢 急性子四錢 陳皮一錢 甘草八分
生鯉魚一箇

右各剉分二服。每用水三碗煎至一碗臨服之時加好醋一匙。每三碗加烏金丸一顆。如其死胎不下。急取無根水再煎藥渣連進二服。卽救其性命。果妙不可輕傳。

○一論臨產艱難橫生逆產胎死不下及產後諸病。

烏金丸

真阿膠炒一兩八錢 蛤粉 蘇木一兩 艾葉端午日收去梗二兩

穀麥二芽 晒乾各二兩 龍衣卽花退要全者下條焙乾又要蛇頭

右共爲細末煉蜜爲丸如芡實大每用一丸童便和酒化下

九修合此藥揀天月二德天醫生氣吉月疑神安廬酒掃淨室此太極而生兩儀九宮而分八卦所忌婦人雞犬聲喊音要在棧間寂靜齋戒至誠先念淨口淨心淨身淨天地神呪又念呪曰天精精地靈靈精精

露饗左朝北右朝北辰入逢此藥各保安寧急如律令

○一治橫生逆產并三五日不下死在須臾姜師師問傳

用從往下蛇退一條長尺餘者燒灰存性鴛鴦等分為末黃蠟為丸

一箇皮硝化水吞下

○一治姪婦交骨不開產門不開皆由元氣虛弱胎前失於調攝以致血

氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用活命芎歸湯補中益氣湯

產門不開者氣血虛也用十全大補湯活命芎歸湯方見前

○一治難產兼胞衣不下及死胎不下

巴三輩七脫空錢細研如泥入麝香搗作餅兒臍下貼

須臾子母便分張

○一方用草麻子十四粒去殼研塗兩脚心衣卽下可卽浣去如不去則

腸出如此時就以此藥貼頂心縮回其腸多用此藥不妨如婦人則

一治難產或橫或逆或血游乾涸或胎死不下惶惶無措死在須臾

存者傳 皮硝五分 煨熟者或寒天可加大附子煨去皮筋三

右用好酒半鍾重便半鍾入硝煎一二沸溫服立下百發百中

○一治胎死腹中或產母氣乏安頓產道乾澀或手足冷腹痛

卽五積散見中集依本方去麻黃加川烏附子南星阿膠炒木香各半

補中益氣湯方見內傷十全大補湯方見補益

○一治女人出生腸用腳盆盛貯其腸取辛煎水洗過蓋辛水甚滑洗過

則腸滑後用冷水噴胸前使患者因嗽咳氣則腸收又用人以手托之

使腸入內後用馬恰藥水洗用麝香捻於門口上女人眠倒脚高懸此病

一時即愈

十三

產後

服產後扶元消毒血服部爲虛叔和云新產之服緩滑去質大弦急死來
候寸口瀉疾不調死沈細附骨不絕生

九產其不問腹痛不痛有兩無病以童子小便和酒共一鍾溫服則百病
不生少坐上赤僂高之膝仰臥不時喚醒及以醋塗身或用醋洗炭及
燒漆器更以手從心捍至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆
酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏聩宜頻食白粥少許一月
之後宜食猪蹄少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以百日爲度若氣
血素弱者不計日月否則患手足腰腿痠疼等症名曰產勞最難治療
初產時不可問是男女恐因言語而泄瀉或以愛憎而動氣皆能致病
不可獨宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刮齒恐致血逆須血氣
平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山嶽取不戒哉

天產後血暈其由有三有用心使力而暈者有下血多而暈者有下血少
而暈者其暈雖同其治特異若下血多而暈者當補血以芍歸湯爲主
或惡露不止者倍炒黑乾姜止之若去血少而暈者黑神散去之但凡
血暈不省人事用大炭置產母傍以醋沃之使醋氣薰入產人口鼻

者亦重者亦省人事矣。○一法用韭菜細切盛于有罈中。以醋
沃之。急封瓶口。以瓶嘴納產婦鼻孔中。搗之即醒。○一法用
煙薰之即醒。○一法用荆木糖研末。用二分吹鼻即醒。○一法用鹿角
燒存性。每一錢酒灌下即醒。

夫產後發熱有去血過多者。有勞力過傷者。有惡露不盡者。有飲食未節
者。有感冒風寒者。有來食傷寒者。有因傷挾外感者。有三百蒸乳者。俱
能發熱增寒。并身疼腹痛。不可相類。而用藥也。

○一論去血過多發熱者。脈必虛大無力。內無煩楚。此非有餘之熱。乃陰
虛生內熱耳。以歸朮保產湯主之。

○一論有傷力發熱。或早起勞動發熱者。亦用歸朮保產湯主之。

○一論惡露不盡亦發熱惡寒。必脇肋脹滿。連大小腹。有塊作痛者。以黑
神散主之。

○一論脾胃虛弱。飲食必難消化。以致滯滯發熱。必有噯氣作酸。用食

臭而口中無味。胸膈飽悶。氣口脈必緊盛。發熱惡寒。頭痛。宜理脾胃。

○一論感冒風寒而發熱者。其脈弦而緊。或惡露欠通。頭疼身痛。發熱惡寒。手足厥冷。肚腹疼痛。宜五積散主之。此藥祛除敗血。生新血。調和榮衛。滋養臟腑。使陰陽不相勝負。邪氣不能相干。則無寒熱之患。並加米醋少許同煎。本方去麻黃。方見中寒。

○一論傷寒夾食。必惡食。胸痞腹滿。頭疼發熱。氣口脈來緊盛。宜行氣香蘇散。下消下發而治之。方見初食。

○一論內傷元氣。外感風寒。其脈洪大而虛。其症身熱而煩。頭痛惡寒。而渴。自汗。氣高而喘。宜補中益氣湯。加減治之。方見內傷。

○一論產後蒸乳發熱惡寒者。必乳間脹硬疼痛。令產母搽乳汁通其熱。自除不藥而愈。

○一論產後發熱惡寒。或口眼喎斜等症。皆是氣血虛甚。當以大補氣血為主。若左手脈不足。補血藥多於補氣藥。右手脈不足。補氣藥多於補血藥。

○一論產後中風切不可偶作風治不可服小續命湯之類宜大補氣血若中風口噤乃血虛而風入夾口筋得風則急故口噤也若角弓反張乃体虛而風入於諸陽之經故獨腰背彎急如角弓反張之狀也以歸水保產湯去香附乾薑加秦艽卷活又宜芎歸荆芥各等分水下煎酒少許煎七分漉之如口噤用匙輕開微灌下但以咽即効又宜荆芥略炒爲末每服三錢黑豆淋酒調下童便亦可

○一論產後虛癰諸病惟宜十全大補湯此藥性溫平補養血氣壯健脾胃乃諸虛百損第一方也

○一產後血暈者乃下血過多而眩暈也。不省人事者氣血大脫而神不用也。故用人參剉作劑水煎溫服。蓋人參甘溫益元氣之品。可以回氣。可以生血。身熱氣急者加童便一爵。身寒氣弱者加大附子三錢。外以炭火以醞醋沃之。使醋氣熏蒸入鼻。則能收斂神効。

○一論產後諸疾以未治之大補氣血爲主。此方治一切諸病。氣血虛損。

脾胃怯弱。或露不行。或去血過多。或飲食失節。或怒氣相并。以致
熱惡寒。自汗。口乾。心煩喘急。心腹疼痛。頭眩眼黑耳鳴等症。不語
不省人事。並皆治之。

歸木保產湯

當歸酒洗

一川芎

錢

白芍

酒炒

熟地黃

酒蒸

白朮

去蘆炒

一

白茯苓

去

鐵陳皮

八分

香附米

童便炒

一錢

乾薑

炒黑

八分

甘草

多三分

氣虛加入參

七分

右剉下劑。生薑三片。棗一枚。水煎服。○如去血過多。倍芎歸乾姜。○
一胸膈脹滿。加枳實炒。砂仁厚朴姜炒。山查去子。○兩脇肋痛。加片
皮去穢肉桂。○小腹墜痛。加玄胡索。桃仁紅花蘇木。甚者加三棱。莪朮。
俱煨醋炒。○有汁。加黃芪蜜水炒。酸棗仁炒。○口乾苦。加麥門冬去心。
○身不發熱。小腹痛。不可忍。用桃仁去皮搗爛。五錢。蓬萊汁和酒送下。
立効。○惡露不行。加益母草。牡丹皮。桃仁。入童便酒同服。○吐痰。加牛

夏貝母○咳嗽不止加連五味桑白皮○着氣喘加高藥○昏憤口噤不語加荆芥穗。

○一論婦人產後下十八證服之如神。

照神散

棕皮灰

當歸酒洗

赤芍

白芍

生地黃

熟地黃

香附米炒

玄胡索

乾姜炮

五靈脂

蒲黃砂各一沉香

乳香各五錢

枳木

紅花

大黑豆

右爲細末每服二錢溫酒童便調下。

胞衣不下敗血攻心眩暈欲絕服此卽愈。

將產血多兒食不盡餘血聚胎難產服此塞子救母。

臨產用力太早兒不及轉橫生到出亦當急救母命。

一子死腹中母必肢體冷痛口角出沫指甲青黑服此卽出。

一惡露未盡失而不治又過酸鹹收斂之物因而得崩漏。

血暈眼花起坐不得。

一血迷心或不能言語。

敗血乘虛散流四肢浮腫。

一敗血為害口渴舌燥作寒作熱似癆。

敗血入心煩躁發狂言語錯亂或見鬼神似癲。

月中飲冷敗血凝聚腹痛難忍或致瀉痢。

敗血停留肢節間遍身疼痛。

一敗血結聚小便閉澀大便艱難。

肺竅鼻中氣黑。

一敗血流入小腸小便出血。

敗血冲心喉中氣急發喘。

一敗血滯脾胃中心腹脹滿嘔吐似翻胃。

一產後諸般怪症難以名狀者多是敗血所致服此立効真仙方也。

○一治產後心腹痛瘀血不行或氣喘作癆危急之甚。

當歸三錢

川芎二錢

白芷

官桂

玄胡索

牡丹皮

蒲黃

五靈脂

沒藥各一錢白芍酒炒三錢

右剉一劑水煎入童便空心服。

○一治產後小腹作痛有塊。服訖而痛以四物湯加玄胡索紅花。○一論產後停食。胸膈飽悶。身發寒熱。不思飲食。

理脾湯

蒼朮炒一錢 陳皮一錢 厚朴姜汁炒一錢 砂仁七分 神麩炒一錢

山查去核一錢 麥芽炒一錢 乾薑炒八分 甘草二分

右剉一劑。生薑三片。水煎服。○泄瀉加白朮白茯苓。○太便秘閉加桃仁紅花。○小使閉澀加大腹皮。

○一治產後三日牙關緊急。眼目直視。四肢厥冷。乾姜炒黑五錢。水煎。又童便溫服立効。

○一論產後暈倒。不省人事。眼黑耳鳴等症。并發中風。不可入事。口吐涎。加味佛手散。

當歸

川芎

荆芥各等分

右剉一木。剉水煎。入童便溫服。

○一論產後惡露不快腰疼小腹痛時作寒熱惡痛不思飲食不治久積惡血月水不調又療心痛水腸氣痛血氣痛欲死者又治心腹疼痛及兒枕痛不可忍又或血迷心竅不省人事又治北人青筋症用生薑酒失笑散

五靈脂

水淘去砂醋煮

真蒲黃 炒各等分

右剉酒煎溫服○丁法為細末每服三錢醋熬成膏白湯化下痛甚加川芎肉桂玄胡索各二錢

○一論產婦小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久即甦又用四物湯加炮乾薑白朮陳皮

○一治產後血虛昏暈衣醒以四物湯加入參白朮茯苓炮乾薑香附

○一論產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒者以四物湯加玄胡索香附桃仁紅花青皮澤蘭牡丹皮水煎重酒煎服若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜服此藥或失笑散消之

若按之反不痛是血虛宜四物湯加參朮茯苓

若痛而作嘔是胃虛宜六君子湯○若痛如作瀉者宜六君子湯加乾薑炒白芍酒炒

○一論勞者產中之名也產中虛脫喘之作寒作熱病外癘狀名曰瘵勞此是虛之氣血不相順接虛故作寒壅故作熱無時休息症似癘實非癘也治宜大補氣血使其氣血順接則病愈矣故用人參補氣當歸補血糯米益胃葱豉醒脾而猪腎者取其以類相從能補系胞之區也猪腎湯治產後羸勞發熱盜汗

人參

當歸各等

猪腰子一片白糯米半合葱白三根

淡豆豉一合

以水煮米熟取清汁十盞入藥二錢煎至八分不拘時服

○一方治產後羸勞發熱

猪腰子一對去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一合入葱椒

粥搗醋和將腰子鋪於底以熟鹽蓋之如作盆生狀空心服

○一治產後發熱自汗肢體疼痛名曰摩粉

當歸羊肉湯

當歸酒洗 人參各七錢 黃芪一兩 生薑五錢

右判用羊肉牙裏清汁五大盞去肉入前藥煎至四盞去渣作羊胎早

○一論產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連翳此去血過多元氣

虧損除火熾盛宜

十全大補湯方見補益 加炮薑丁剉而甦又數劑而安

○一論產婦筋攣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛用十全大補湯而愈

○一論產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安宜

茯神散

白茯神去皮 人參 龍齒研 琥珀研 赤芍

黃芪 牛膝去蘆各 生地黃一錢 桂心五分

右劉每服用水煎服

○論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉放心竅神智不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服此藥

八珍散 治產後敗血停蓄於心迷塞心竅舌強不語

人參

五菖蒲

懷生地黃

川芎各一兩細辛一錢

防風

辰砂另研各

甘草一錢

右為末每下錢薄荷湯調下不拘時服

○一論產後咳逆不止

用乾柿一個切碎以水一盞煎至五分熱啣之即止

○一論產後汗出不止

嫩黃芪焙

熟地黃

牡蠣粉

白朮

去蘆炒 麥門冬 去心

防風 去蘆

白茯苓

去皮 當歸酒洗

右判紅聚二枚水煎溫服

○一論產後消渴飲水不正

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

生地黃

麥門冬去心

五味子

知母去毛

白茯苓去皮

黃芪蜜水炒甘草

右判水煎溫服

○一論產後胸痞腹脹

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

白朮去蘆炒

白茯苓去皮

陳皮

半夏湯泡姜炒

砂仁

香附炒

厚朴姜汁炒

甘草

生薑煎服

○一論產後瘧疾

當歸酒洗

一川芎一錢

白芍酒炒

白朮去蘆炒

白茯苓去皮

柴胡八分

青皮去穰八分

甘草三分

右判白水煎服

○一論產婦血痢小便不通臍腹疼痛以生馬齒莧搗爛取汁三六合煎沸下蜜一合調頓服即愈。

○一治產後痢疾不問赤白主方

當歸酒洗

川芎

白芍炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

陳皮

木香

香附炒

神麴炒

乾薑炒

甘草炙

右剉水煎溫服

○不思飲食

加砂仁

○小便不利

加藜蘆

○一論產後痢疾久不止者以四君子湯加黃芪棗殼

○一治產後泄瀉

人參

白朮炒

蘆土

白茯苓

去皮

陳皮

白芍炒

乾姜炒

澤瀉

厚朴

姜汁炒

砂仁

當歸酒炒

甘草炙

右剉姜棗煎服

○一治產後嘔吐

陳皮

半夏

湯泡

姜白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

砂仁

藿香

人參

神麴炒

當歸酒洗

甘草炙

右判生薑五片水煎溫服

○一治產後頭痛

黃芪炙水炒人參

白朮去蘆炒陳皮

當歸

升麻

柴胡

細辛

蔓荊子

川芎

藁本

甘草

右判生薑三片水煎服

○一治產後咳嗽痰喘發熱

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

熟地黃

陳皮

牛夏煨汁泡

白茯苓去皮

枳殼炒去穰

桔梗去蘆

前胡

蘇槿

乾葛

人參

木香

甘草

右判散姜棗水煎服

○一產婦咳嗽痰盛面赤口乾肉熱肺熱微作無時此陰火上炎當歸補脾

腎遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈

○一論產婦產後下血諸藥不應飲食少息肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣湯加吳茱炒黃連五分四劑頓止但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而愈

○一論產後大便不通因去血過多太腸乾涸或血虛火燥乾涸不可計其日期飲食數多用葱通之潤之必待腹滿腸脹自欲去而不能者乃結在直腸宜用猪膽汁潤之若服苦寒藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能止必成敗症若屬血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類

○一產前產後大便不通

當歸酒洗

川芎

防風去蘆

枳殼炒各甘草炙二錢

石剉薑棗煎服忌動風之物用葱導之亦妙

一產後五七日不大便切不宜妄服藥丸用大麥芽炒爲末每服于錢

湯瀉調下與粥間服

○一論產後胞損小便淋瀝不止

人參二錢半 白朮

去蘆

白茯苓

去皮

黃芩

鹽炒

一陳皮

一錢

桃仁

去皮尖

甘草

炙五分

右剉，下荆水煎猪羊胞後入藥煎服。

○一論婦人子宮腫大，二白損落，下片殊類猪肝，已而面黃體倦，飲食不
味，肉熱消熱，自汗盜汗，用十全大補湯二十餘劑，諸症悉愈，仍復生。

○一論產後陰閉不閉，發熱惡寒，用十全大補湯加五味子數劑而發熱

退，又用補中益氣湯加五味子數劑而發熱，若初產腫脹，或燃痛而不閉

者，用加味逍遙散，若腫既消而不閉者，補中益氣湯切忌寒涼之劑，陰

門不閉，用石灰煎湯先煎後洗，一方用荆芥藿香臭椿根皮煎湯煎死。

○一論產後陰閉痛極不可忍

桃仁泡去皮尖，研如泥，塗之，即已。

○一論產後陰戶極痒不可忍

一論產後陰戶極痒不可忍

一論產後陰戶極痒不可忍

一論產後陰戶極痒不可忍

食鹽二兩卷之即止

○一論產後生腸不收皆由氣虛血弱所以懸下但養氣和血其物自收

人參

白朮

去蘆炒

黃芩 綠炒

當歸

川芎

甘草炙

右剉水煎服若懸二白則入升麻五分升提之日用熱

手心常熨腰肚但腰肚氣暖其物亦收

○一治產後生腸不收

草麻子去殼研成膏貼頭頂心即收內服補中益氣湯倍升麻去柴

胡加益母草三錢

○一論產後因于死經斷不行下日小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之

而痛不禁此乃石瘕也

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

生地黃

桃仁去皮尖

紅花

大黃

三棱

檳榔

玄胡索

澤瀉

香附

血竭

水煎空心服

○一論產後有種疾醫則多汗汗則大便閉故難於用藥唯此藥最嘉
二子飲

蘇子

火麻子 去殼二味各半合淨洗研極細用水再研取汁

一益分十次煮粥啜之此粥不惟產後可服太抵老人諸體壯效

○一論產後陰戶腫大用吳茱萸煎湯洗之

○一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑治之其家知醫以為風寒用亦

柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛不信仍服下劑汗出不止諸醫不絕

煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補二劑益甚服洪大重按如無仍以

煎湯加附子四劑稍緩數劑而安

○一產婦渴痢年餘形體骨立肉熱脯熱自汗盜汗口舌糜爛口吐痰下

碗許脈洪入重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然痰在乃脾虛

不能統攝歸元也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補脾金而

健其脾胃

小產

小產重於大產。蓋大產如粟熟自脫。小產如生採破其皮。殺斷其根。胎豈不重於大產。但人輕忽致死者多矣。治法宜補形氣。生新血。去瘀血。若未足。月痛而欲產。芎歸補中湯倍加知母止之。若產而血不止。人參黃芪湯補之。若產而心腹痛。芎歸川芎湯止之。胎氣弱而小產。八珍湯固之。若出血過多而發熱。聖愈湯汗不止。急用獨參湯發熱。煩躁肉爛筋惕。八珍湯大渴面赤。脈洪而虛。芎歸補血湯。卽黃芪二兩。芎歸三錢是也。身熱面赤。脈沉而微。四君薑朮東垣云。晝發熱而夜安靜。是陽氣自旺於陽分也。晝安靜而夜發熱。躁是陽氣下陷於陰中也。如晝夜俱發熱者。是真陽無陰也。當峻補其陰。王太僕云。如大寒而甚熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。時節而動。是無火也。如大熱而甚寒之不寒。是無水也。熱動復止。像忽往來。時動時止。是無水也。

陽氣自旺者，補中益氣湯。陽氣陷於陰者，四物二連湯。即四物加胡連。川連是也。重陽無陰者，四物湯無炙者八味丸。無水者六味丸。

○一論小產氣虛血下不止宜

人參黃芪湯

人參

黃芪蜜炒

當歸

白朮

去蘆炒 白芍酒炒

艾葉醋炒各一錢 阿膠炒二錢 右剉，下荆水煎服。

○一論氣血虛半產宜

芎歸補中湯方見雜錄

○一論小產後瘀血心腹疼痛，或發熱惡寒

當歸川芎湯

當歸

川芎

白芍炒

熟地黄

玄胡索

桃仁

紅花

香附

青皮

澤蘭

牡丹皮

右水煎，入童便好酒各半，盞同服。

右小產腹痛以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥或失笑散或芍
 按之返不痛此是血虛宜用四物參苓白朮若痛如作嘔此是胃虛宜
 用六君子若痛而作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸
 ○一妊娠五月服剪紅丸而墮腹中脹痛服破血之劑益甚以手按之益
 痛余曰此峻藥重傷脾胃受惠用八珍倍入參黃芪加半夏乳香沒藥
 二劑而痛止數劑而全愈

○一婦人年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解表喘急不寐請治余以為
 脾土虛不能生肺金藥損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮姜
 四劑漸愈往視之又與八珍加五味及十全大補湯全愈

○一小產下血不止此氣虛之甚也以補中益氣湯去升柴加白芍川芎
 香附砂仁艾葉阿膠炒

乳病

乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養怒怒所逆驚則行過
厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不得出陽明之血滯
處故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣燥熱含乳而垂熱氣
所吹逆生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失
此不治必成癰癤治法味厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行
汗濁之血以生甘草之節清腫毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角
刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以
艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針力必至危困若不得於夫
不得於姑舅愛怒鬱悶所夕積氣滯氣消阻所氣滯逆遂成癰核其大
其子不痛不痒數十年後方為癰腫名曰奶岩以其岩形故也似癰或
也不可治矣若於如生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治
法亦有可安之理

○一論有見者名為外吹乳有孕者名為內吹乳可以急治宜服

立効散

白芷

貝母

各等分爲末每服二錢好酒調服○若無乳行加漏蘆酒煎調服

○一論婦人乳腫作痛欲成癰毒宜神効瓜蒌散

大瓜蒌黃熟者丁箇連皮子穰以重重袋包火煨搗爛每丁劑半箇

白芷一錢半 玄參二錢 升麻五分 歸尾二錢 桔梗一錢

連翹二錢 柴胡一錢 青皮一錢 川芎八分 天花粉一錢半

知母一錢 木通一錢 穿山甲炒錢木鱉子二箇 玄胡索二錢

右剉一劑水煎溫服

○一治婦人患吹乳腫痛未成膿者用生半夏丁箇爲末將葱白半寸搗和爲丸綿裹塞鼻一夜即愈左乳塞右鼻右乳塞左鼻神効

○一外敷吹乳方

葱一大把搗爛作餅厚攤乳上將瓦罐盛灰火撲在葱上蒸出汗即愈
腫痛甚妙或內將紫蘇煎湯頻服

○一治婦人吹乳

韭菜地中蚯蚓糞研細末醋調厚敷於上乾則再易三次即愈

○一治吹乳用益元散五錢用豆豉葱白湯調下頻服即愈

○一治吹乳法

入慈悲門房上或將頭地下捨草四指長以手捺默念我佛面前一科
蓮結下子來獻西王金頭娘子害吹奶明問左邊右邊尊者應允實告
再說吹口氣來腎即出不可回顧將草手心緊捺出放在牆縫以土厚
蓋不可透風即能止痛消腫妙哉

○一法治吹乳用黃紙書山田火大人五字貼乳上立効

○一論婦人年五十外乳癰初已而又致穿破不得收功者宜

衝脈飲子

黃芪每斤兩用杜人參一錢半白朮一錢

茯苓七分當歸身二錢白芍一錢川芎一錢生地黄一錢

柴胡五分青皮五分宜木瓜四分皂角子一錢甘草三分

右判一劑水煎頻服。○太便不通潤加大麻仁炒二錢黃連酒炒二錢

○一論內外吹乳乳癰腫痛已成未成服之立瘡。

牙皂燒存性蛤粉炒過等分為末每服五錢好頭生酒調下以醋為度

熱服出汗立愈外用巴豆三箇燒存性香油調敷放癰頭上上用膏藥

貼之四圍用鐵槌散

白芨 白薇 白芷稍 赤芍稍 為末蜜調敷癰四圍立愈

○一治內外吹乳及潰漿服之立効

黃芪 人參 當歸 川芎 白芍

木通 天花粉 連翹 漏蘆 青皮炒

橘蓬 防風 白芷 貝母 瓜瓞

穿山甲少

皂角刺

乳香

甘草

水煎食後臨臥服。

○一論乳勞乳癰已成化膿為水去成即消治乳之方甚多獨此神效瘰癧瘡毒尤妙無比。名神效瓜蒌散。

瓜蒌

大者兩箇 當歸 酒洗

甘草 各五錢 乳香 另研

沒藥 另研 各二錢

右作二劑用酒三碗煎至一碗分三次飲之更以清敷患處一切癰疽腫毒便毒皆效。

補遺

○一治吹乳腫痛不可忍者

升麻

甘草節

白芷稍

青皮

歸尾

連翹

貝母

金銀花

瓜蒌仁

倍用 橘葉 片

右剉水煎入酒半碗同服不拘時。

○一治乳痛風神方

北細辛一錢 白芷稍八分 歸尾一錢 赤芍八分 防風一錢
莪朮八分 桔梗八分 烏藥一錢 麻黃二錢 小甘草三分
右剉一劑水煎加熟酒同服以渣滓再處出汗為度

乳岩

婦人奶岩始有核腫如驚棋子大不痛不癢五七年方成瘡初便宜多服
疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之則或如
人口有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五皮膏去其腐肉生新肉
漸漸收斂此症多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終
不可治宜服

十六味流氣飲

當歸

川芎

白芍酒炒

黃芪蜜水炒人參

官桂

厚朴姜炒

桔梗

枳殼去穢

烏藥

木香

檳榔

白芷

防風

紫蘇

甘草

乳癰加青皮。○亦治瘡疹後餘毒作癰癩。

右剉生薑煎服。

○一治婦人乳岩久不愈者。

樺皮

油核桃性等分燒灰存

桔礬

輕粉二味加

共爲末香油調敷。

○一治婦人乳癰或乳岩初起先服荆防敗毒散下劑以敗其毒次進蒲公英連根葉洗淨搗汁入酒飲之將流敷患處立消其敗毒散即人參敗毒散方見傷寒去入參加防風荆芥連翹是也。

○一婦人年踰三十每怒後乳內作痛或腫此肝火所致與小柴胡合四物湯加青皮桔梗香附枳殼而愈彼欲絕去病根自服流氣飲遂致朝寒暮熱益加腫毒此氣血被損而然予與八珍湯三十餘劑喜其年壯元氣易復而得愈也。

○一婦人乳內腫一塊如鴉子大癆則作痛久而不消服托毒散不效
乳勞症也屬肝經血少所致先與神效瓜蒌散四劑更爾毒散之服
退再服八珍湯倍加香附夏枯草蒲公英仍間服前散月餘而消亦有
乳疽一症其狀腫硬水悶雖破而不潰腫亦不消尤當急服此散及隔
蒜灸斯二症乃七情所傷氣血所損亦勞症也宜戒怒節飲食慎起居
否則不治。

○一婦人患乳癰氣血頗實但瘡口不合百法不應予與瓜蒌神效散四
劑少可更與數劑及豆豉餅灸之而愈又一婦人患此未潰亦與此藥
三劑而消良甫云如有乳勞便服此藥可杜絕病根如毒已成能化膿
為水毒未成者則從大小便中散之。

神效瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補丸

通乳

○一論婦人素稟怯弱血氣虛耗產後無乳宜補養之劑用
當歸補血湯

當歸身酒洗五錢

嫩黃芪蜜水炒一兩

右剉一劑葱白十根煎服。

○一論產後乳脈不行身體壯熱痰痛頭目昏痛此涼膈壓乳
玉露散

當歸一分 三川芎五錢 芍藥一錢半 人參一錢半 白茯苓二錢半

白芷五錢 桔梗炒五錢 甘草二錢半

右剉水煎服吐瀉服○煩熱甚大便結加大黃一錢二分 金銀花
脈不行結成癰腫疼痛黃蘗蜜炙 當歸 金銀花 甘草各二錢半 水煎入
酒半鍾食後溫服。

○一方五乳

三母散 牡蠣 知母 貝母 爲細末以猪蹄湯調下。

壽世吳元

壽世吳元

○一論產後乳汁絕不用猪蹄一隻煮五田兩先水煎肉汁後同通草再煎去渣食後服之。又用木梳頭上梳垢取下男流者丸如梧桐子大每服七八丸空心順流水下。

○一論產後氣血不足經血衰弱乳汁游少。

猪蹄隻 通草二兩 川芎一兩 穿山甲十四 甘草一錢

右用永五升煮汁飲之忌生冷避風寒夏月不宜朱蓋更以葱湯洗

○一治乳汁不通

通草七分 瞿麥 柴胡 天花粉各一 桔梗二錢

青皮 白芷 木通 赤芍 連翹

甘草各五分 水煎食遠服更摩乳房

○一治乳婦思慮滯結乳汁不行宜

湧泉散

王不留行酒 白丁香 漏蘆 天花粉 白姜鹽炒

穿山甲 炒黃色各五錢

右爲細末，每服三錢，食後用猪蹄湯調服。

○一治乳汁不行

核桃仁 十箇去皮搗爛

穿山甲末 一錢

黃酒調服。

○一治產婦少乳

穿山甲

天花粉各五錢

入猪蹄水，煮令爛，去渣，服之立愈。

○一婦人產後子而無乳，服下乳藥，但作脹子，謂人乳皆氣血所化，人脹而無乳，是血氣竭而津液亡也。宜補其氣血，自然有乳矣。乃與八珍湯倍加參朮，少加肉桂，干薑剉去効。

斷乳

○一論小兒三四歲或五六歲當斷乳，不肯斷者宜用

斷乳盡骨膏

壽世保元

庚集二卷

五

山梔子

三箇燒灰存性

雄黃少許

辰砂少許

右三味爲末，入生麻油、曬粉各少許，調勻，候兒睡了，抹于兩眉上，醒來便不食，未效再抹。

○一論婦人欲斷乳方

歸尾

赤芍

紅花酒洗

牛膝酒洗

水煎服

○一論婦人血氣方：盛乳房作脹，或無兒，吃乳脹痛，增寒熱。麥芽一二兩炒水煎服，立消其熱，散血氣如此，何脾胃虛弱，飲食不消，方中多用之。一云麥芽最消腎，若氣血虛而乳汁自出者，宜十全大補湯服之，其子多不育。

婦人通治

夫通治方者，蓋胎前產後一切雜症皆可治也。或一方而治數症，不可入於專門，皆是熟試之有驗者。雖曰通治，亦不可膠柱鼓瑟也。

○一論婦人胎前產後諸病。三十六種冷血風八十二種風痧氣中風淋
澀血聚胎孕不安死胎不下胞衣不落一服立効。產後腹內臍下痛刀
刺赤白帶下嘔逆填塞心氣煩滿懷胎近產一日一丸臨產不覺痛者
經脈不通或來頻併飲食無味面赤唇焦手足頑麻遍身生黑點血斑
者產後中風傷寒癰疽如板者麻黃湯研化服。

神祕萬靈丹

何首烏

去皮用黑豆拌九蒸九晒忌鐵器

當歸 酒洗

兩頭尖 各五錢

川烏

火炮去尖

草烏

水浸過

大茴香

川芎

人參

去蘆

防風

去蘆尾

白芷

荆芥穗

桔梗

米泔浸

甘草炙

麻黃

用太棗三

天麻

已上十二味各

白朮

去蘆米泔浸

木香

不見火

遠細辛

血竭

另研已上各五錢

蒼朮

半斤米泔水

洗過入酒浸一宿晒

右共二十味俱爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼黃酒送下
○一論婦人胎前產後一切之症功效甚大

濟陰返魂丹

益母草 五月端午六月六日採製葉花子，陰乾不約多少。

右爲細末，煉蜜爲丸。如彈子大，每服一丸，細嚼米飲吞下。

一胎前臍腹刺痛胎動不安，下血不止，水煎麥九米湯，或當歸湯亦可。

一胎前產後臍腹作痛，作聲或寒熱往來，狀如瘧疾者，俱溫米湯下。

一臨產并產後各先用一丸，重便酒化下，安魂定魄，血氣自然調順，諸病不生，又能破血養胎，息調經絡，功效不能盡述。

一產後胎衣不下，落在胞中，及產前一切產難橫生不順，死胎經白，不下。

脹滿腹中，心悶心痛，炒鹽湯下。

一產後中風牙關緊急，半身不遂，失音不語，童便酒各半送下。

一產後氣喘咳嗽，胸膈不利，惡心口中吐酸水，尚自浮腫，兩脇疼痛，舉動

失力者，溫酒下。

一產後兩太陽癆吹，心忪氣短，肌體羸瘦，不思飲食，血風身熱，手足頑麻。

百節疼痛溫米湯送下。

一產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汗下如無生薑煎乾薄荷湯下及童便酒各半送下。

一產後面垢頰赤五心煩熱或結成血塊腹脹奔痛時發寒熱有冷汗者童便酒各半送下。

一產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力胎動自汗不止月水不調久而不治則爲骨蒸之疾童便酒下。

一產後鼻衄口乾舌黑童便酒各半送下。

一產後大小便不通煩燥口苦者薄荷自然汗下如無生薑煎乾薄荷湯下。

一產後痢疾米湯下。

一產後赤白帶下煎膠艾湯下。

一勒奶痛或成癰爲米水調塗乳上一宿自瘳或生搗爛敷上亦可。

一婦人久無子息溫酒下服至一月決有效驗。

一論此方治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾產了未進別物即先服此藥能除諸疾逐敗血生新血。

佛手散

一名芎藭湯

川芎

當歸酒洗三兩

右剉水酒各半煎溫服。

一治諸般失血

傷胎去血

產後去血

血崩去血

金瘡去血

一治諸般失血不止

一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗塞頭欲倒悉能治之

一產後眩暈宜加酒炒芍藥治之

一產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與童便煎服立効名桂香散

一姙娠子死或未死胎動不安酒水同煎進服若白死服之便下未

死其胎即安此經累効萬不失一

一姙娠臨月服之則縮胎易產兼治產後諸疾

一治虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉二兩薑十片水煎熱溫服

一婦人室女心腹疝痛經脈不調用水煎服

一姪娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服

一婦人血氣上喘下腫二味等分爲細末每二錢空心艾湯調服

一產後虛損敗血衝心腹脹氣絕者神效

一難生倒橫子死腹中先用黑豆一斗合炒熟水下蠶入童便下蠶糞末

四錢煎至一盞分爲二服未効再作

一產後惡血注心迷悶喘急腹痛後前用黑豆加生薑自然汁半合煎服

一臍毒下血每服一錢半炒入槐花末半錢水煎服三日取下血塊即愈

一產後頭痛加荆芥煎服 一味血亦宜服之

女聖丸

香附米乃女中之聖藥以其氣香則爲無滯氣也味苦能降無道之火

其性勇毅，移腸可解，婦女鬱結多怒之偏，本草云：言定氣，世多言定氣，男子不敢服，非也。生春去皮毛，用一斤，淨分作四製，用鹽水加桂汁，浸透，煮略炒，主降痰，調下部血。一用水醋浸透，煮略炒，主款氣，補血。一用山梔仁四兩，同炒，去梔子，不用。主降鬱火。一用童便洗過，不炒，爲末，一方加芎歸各二兩，共爲末，酒煮麩糊爲丸。加梧桐子大，每五七十九丸，隨引子送下。○經水不調，酒送下。○胎前諸病，艾湯下。○產後諸病，芎歸湯下。○胸脇脹滿，用薑湯下。○頭暈，薄荷荆芥湯，入薑汁下。○白帶非冷，乃自庚辛金來，主分心氣所致，用小茴香湯，或木香湯，皆非。○其餘病者，與男子同症，隨意用引，不能者，只用白湯下。

婦人雜病

○一論室女寡婦，師尼，畏風體倦，乍寒乍熱，面赤，心煩，或時自汗，症類時疫，但汗脈弦長，欲男子而不可得者。

斷慾丸

一名抑陰丸

生地黃 二兩 酒浸并爛

黃芩 五錢

硬柴胡 各五錢 赤芍 一兩

秦艽 五錢

有芎藭加煉蜜少許丸如梧子大每服五十丸烏梅煎湯下

○一論暴居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全無施者

柴胡抑肝散

蒼朮 炒一錢 香附 一錢

川芎 七分

神麴 炒八分 山梔 炒一錢

連翹 五分

柴胡 二錢半 青皮 炒二錢 赤芍 一錢半 生地黃 五分

牡丹皮 半錢

地骨皮 一錢 右對水煎服

○一論婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得爲病也其狀不欲

見人如有對悞時獨言笑或時悲泣是也氣息遲伏或如鳥喙者皆

爲病也又脈來綿綿不知度數而顏色不變乃亦是此候也宜

安神散

白茯苓去皮木一兩半

白茯苓去皮人參

石菖蒲各一兩

赤小豆半兩

右剉木煎溫服

○一論婦人心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交通語言錯亂或驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜怒不常夜多盜汗飲食無味頭目昏眩宜服補養氣血安神鎮心有此

妙香散

黃芪一兩人參五錢

白茯苓去皮

白茯苓去皮

山藥美汁炒

遠志甘草炮過去心

木香二錢半桔梗五錢

甘草炙五錢

麝香研錢另辰砂三錢另研

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調服

○一論婦人陰腫者是虛損受風邪所爲胸絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏令氣否滯滕理壅閉不泄越故令腫也宜

黃清散

石菖蒲

當歸

秦艽

吳茱萸

右剉葱白五寸。水煎。空心服。

○一治婦人陰中腫痛。不可忍。洗法。

艾葉五兩

防風三兩

大戟二兩

右剉。水煎。熱洗。切宜避風冷。

一洗法

小麥

朴硝

白礬

五倍子

右剉。同葱白。煮熱水洗之。

○一論婦人陰中腫痛。是蟲所為。三蟲在於湯胃之間。因感風濕。三蟲動作。

蝕於陰內。其蟲作熱。微則為癢。重則為痛也。宜。

將軍散。

大黃 煨炒

黃芩

黃連 各一兩

赤芍

玄參

丹參

山茱萸 取肉 蛇床子 各五錢

壽世保元

庚集七卷

七十二

右爲細末每食前溫酒調下

○一治陰痒以小蘇木拍多水煮湯熱洗日二次用之蒜煮湯亦可

○一治婦人陰冷痒方

遠志二分 乾薑生

蓮花各三分 蛇床子 五味子各四分

右爲細末先以色尿塗陰門中然後燒麩二錢納陰中熱卽爲效

一方以硫黃末煎湯洗

○一治陰門下脫先以淡竹根煎水洗次用

五倍子

白礬 爲末燒之

○又方

用溫鹽湯洗軟用五靈脂燒煙薰之次用草麻子研爛塗頂上吸入卽洗去

○一治婦人陰中生瘡

杏仁燒末

雄黃

礬石

麝香少許

右四味研細末和傳陰中。

○一治婦人陰戶作痒。

用猪肝炙燥納入陰戶則蟲俱引出而痒自止。

○一治女人生門硬如石衣撞行痛不可忍。

青魚膽七箇或鯽魚膽七箇亦好用絲綿二三錢燒灰存性同魚膽調

取鴨毛搽上立効其硬不過半個時即軟。

○一治女人生門者出流黃臭水作痛取綿繭二三錢燒灰存性酒調鴨

毛搽上其毒即收一時即愈。

○一婦人交腸病者糞從小便出尿從大便出濕瀉不分必是夏月伏暑

而致須用五苓散加半膝海金沙木通通草但令大小便各歸本道即

安西園公治臨頓徐少川母服此藥而愈加事前示。

○一治婦人姪亂思色久之必有猫鬼相侵情意相通似睡不醒交媾皆

迷淫精濕漏瀉而不收者，日吞容色變，夜用。

鹿角屑搗細末，以水調方寸匕服之，即愈也。

○一治女人陰中生瘡如蟲咬痛用。

桃葉搗爛，綿裹納陰中，三四易即瘥。

茄病

○一治女人生閉上茄病，取茄蒂剉爛煎水洗。若另出者，用巴豆將絲線

二人穿住，用巴豆搗之，用絲線纏其毒，上過一晚，即落。搗生閉邊縛上

亦用茄蒂煎水洗。如在內，用枯礬與茄蒂煎水洗。

○一論婦人茄病原因，因生產月未滿，是因取重物，膀胱墜下，若見紅茄紫

茄，可治白者不治。

人參三錢半，白朮錢半，當歸三錢，川芎二錢，白芍火煨三錢。

懷熱地黃二錢半。

陳皮錢半，枳殼麩炒一錢半。

沉香二錢 肉桂二錢 吳茱萸湯泡二錢 甘草炙五分

右剉二劑除沉香磨水。生薑一片水煎空心服。

再服白薇散

白薇二錢 當歸三錢 川芎三錢 懷熟地黃三錢

白芍火煨二錢 蒼朮米泔浸三錢 牡丹皮半錢 澤蘭二十片

靈骨花即紫葳花三錢

右剉二劑灑開葉每劑十片。水煎空心服。後薰洗之藥其物自上

洗藥

宣黃連五錢 金毛狗脊八錢 水楊柳根一兩

五倍子八錢 魚腥草一兩 枯礬七錢

右為散每帖用如數木槌。既藥煎液放桶內。夫槌上紙蓋薰蒸藥水。

溫頰小半在盆內洗。次日再將前藥煎滾薰如前法。其物自收。次服三

朱九斷根

吳茱萸 水泡七次

家茱萸 陳者佳 溫水洗去塵垢

山茱萸

去核各一兩

白茯苓 炒去刺八錢

小茴香

七錢 炒入鹽少許 海藻 八錢 洗去鹽

玄胡索 七錢半

牙桔槔 八錢半

白茯苓

七錢半

川練子 去核一兩半

五味子 七錢半

花青皮 去穢七錢半

右十二味俱要足秤不可短少為極細末用真正頭酒調早米粉打糊為丸如梧桐子大空心白湯淡酒任下