

醫

學

心

悟

醫學心悟第三卷

天都普明子程國彭鍾齡

中風門

中風者。眞中風也。有中腑中臟中血脉之殊。中腑者。中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症無異也。中太陽用桂枝湯。中陽明葛根湯加桂枝。中少陽小柴胡湯加桂枝。其法悉具。傷寒門。茲不贅。中臟者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不醒人事。或痰聲如曳锯。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或暴中新寒。則風水相遭。寒冰徹骨。而風爲寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火勢。火借風威。而風爲蒸風矣。爲

熱風多見閉症。其症牙關緊閉。兩手握固。法當疏風開竅。先用搗鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿張悶。火勢極盛者。以三化湯攻之。爲寒風多見脫症。其症手腳脾絕。眼合。肝絕。口張心絕。聲如肝肺絕。遺尿腎絕。更有兩目直視。搖頭上竄。髮直如柱。汗出如珠。皆脫絕之症。法當溫補元氣。急用大劑附子理中湯灌之。若癥延壅盛。以三生飲加人參灌之間。亦有寒痰壅塞。介乎閉脫之間。不便驟補者。用半夏湯紅各兩許。濃煎至一杯。以生薑自然汁對沖。頻頻灌之。其人卽甦。然後接其虛而調之。然予自揣生平用附子理中治愈者甚多。其用牛黃丸治愈者。亦恆有之。惟三化湯一方。並未舉用。此必天時地土大

事之不同。然寒熱之劑。屹然並立。古方具在。法不可混。故兩存之。以備參酌。中血脉者。中在經絡之中也。其症口眼歪斜。半身不遂是也。大秦艽湯主之。偏在左。倍用四物湯。偏在右。佐以四君子湯。左右俱病。佐以八珍湯。並虎骨膠丸。此治真中之大法也。

口噤角弓反張。痙病也。但口噤而兼反張者。是已成痙也。小續命湯。口噤而不反張者。是未成痙也。大秦艽湯。其症病俱見前傷寒。兼症中宜細加查核。

不語。有心脾腎三經之異。又有風寒客於會厭。猝然無音者。大法若因痰迷心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解語丹。若因風痰聚

於脾經當導痰涎。二陳湯加竹瀝薑汁。並用解語丹。若因寒經虛火上炎。當壯水之主。六味湯加遠志石菖蒲。若因腎經虛寒厥逆。當益火之源。劉河間地黃飲子。或用虎骨膠丸。加鹿茸。若風寒客於會厭。聲音不揚者。用甘桔湯加疎散藥。

遺尿謂之腎絕。多難救。然反目遺尿者。爲腎絕。若不反目。但遺尿者。多屬氣重。用參芪等藥補之。則愈。

桂枝湯 葛根湯 小柴胡湯俱見傷寒

摘鼻散 治一切中症。不省人事。用此吹鼻。中有瘻者。生無死者。難治。

細辛去葉 皂角去皮弦 半夏生用 五錢

爲極細末，磁餅收貯勿洩氣，臨用吹一二分入鼻孔中，取塊牛黃丸治中風痰火閉結，或瘧癰癱瘓，語言蹇澁，恍惚眩暈，精神昏憊，不省人事，或喘嗽痰壅，煩心等症。

牛黃六錢

麝香

龍腦以上三味另研

羚羊角

當歸酒洗

防風

黃芩

柴胡

白朮

麥冬去心

白芍各七錢

桔梗

白茯苓

杏仁去皮尖

川芎

大荳黃卷

阿膠

各八錢五分

蒲黃

人參去蘆

神麃各一兩二錢五分

雄黃

另研四錢

甘草二兩五錢

白欵

肉桂去皮

五十枚

乾薑

各三分七錢

犀角銚一兩

乾山藥三兩五錢

大棗五十枚

核

金箔

六伯五十片內存二百片爲衣

爲細末。凍蜜同棗膏丸。每兩作十九丸。用金箔爲衣。每服一丸。溫水化下。

三化湯 治中風入臟。熱勢極盛。閉結不通。便溺阻隔不行。乃風火相搏而爲熱風者。本方主之。設內有寒氣。大便反硬。名曰陰結。陰結者。得和氣日暖。寒冰自化。不可誤用攻藥。誤卽不能復救。慎之慎之。

厚朴薑汁  
炒

大黃酒蒸

枳實麪炒

羌活各一錢  
五分

水煎服

附子理中湯見中寒

治寒風中臟。陰冷極盛。脫症隨見。此風。

水相遭而爲寒風者急服此藥猶可得生夫病屬脫症設誤用疏涌開竅之藥如人旣入井而又加之以石也必須參附大劑飲之方爲合法

三生飲 治寒風中癥六脈沉細痰壅喉響不省人事乃寒痰厥逆之候

生南星

生烏頭去皮

生附子各一錢

生薑五片

生木香五分

水煎服薛立齋云三生飲乃行經絡治寒痰之良藥新闢奪旗之神劑每服必用人參兩許駕馭而行庶可驅外邪而補真氣否則不惟無益適以取敗觀先哲用芪附參附

等湯其義可見。

大秦艽湯 治風中經絡、口眼歪斜、半身不遂、或語言蹇澁。乃血弱不能養於筋、宜用養血疏風之劑。經云：治風先治血。血行風自滅，是也。

秦艽一錢

甘草炙

川芎

當歸

芍藥

生地

熟地自製茯苓

羌活

獨活

白术

防風

白芷

黃芩

酒炒各八分

細辛

水煎服。如或煩躁口渴加石膏一錢。陰雨加生薑三片。春夏加知母八分。

竊謂本方初時宜用。若日久則以四物四君爲主。而以風藥佐之。庶收全功。

四物湯 四君子湯 八珍湯

俱見虛症

虎骨膠丸

見癆症

小續命湯

見傷寒發癰

六味湯

見後類中門

甘桔梗湯

見傷寒咽痛

神仙解語丹

白附子

炮

石菖蒲

去毛

遠志

去心水泡炒草

天麻

全蝎

去尾草水洗甘

羌活

南星

牛膽裹多次更佳各一兩

木香

錢五

右爲末。麪糊丸。龍眼大。每服一丸。薄荷湯下。

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

薑汁炒

炙草各一分

薑半片大棗二枚水煎服

地黃飲子

熟地九蒸酒  
二錢

巴戟去心炮

萸肉去核炒

沙苑草酒浸

石斛

附子炮

五味子杵

白茯苓錢

石菖蒲去毛

桂心

麥冬心去

遠志泡炒各五分

入薄荷少許薑一片棗二枚水煎服○氣虛加人參二錢

類中風

類中風者。謂火中虛中濕中寒中暑中氣中食中惡中也。共有八種。與真中相類而實不同也。然類中有與真中相兼者。須細察其形症而辨之。凡真中之症。必連經絡。多見歪斜偏廢之候。

與類中之專氣致病者。自是不同。然而風乘火勢。邪乘虛入寒。風相搏。暑風相炫。飲食招風。種種變症。所在多有。務在詳辨精細。果其爲眞中也。則用前驅風法。果其爲類中也。則照本門施治。泉其爲眞中類中。粗兼也。則以兩門醫法合治之。斯無弊耳。茲舉類中諸症。詳列於左。俾學者觸目洞然也。

一曰火中火。火之自外來者。名曰賊實火也。火之自內出者。名曰子虛火也。中火之症。良由將息失宜。心火暴盛。腎水虛衰。不能制之。故猝然昏倒。不可作實火論。假如怒動肝火。逍遙散心火。鬱結牛黃清心丸。肺火壅遏。貝母瓜蒌散。思慮傷脾。加味歸脾湯。腎水枯涸。虛火上炎者。六味地黃湯。若腎經陽虛。

火不歸原者。六味地黃湯。剝。利。間。地黃。飲。乎。並。量。之。此。治。火。  
中。之。法。也。或。問。火。中。而。用。桂。附。者。何。也。答。曰。腎。陽。蒸。越。剝。利。  
田。虛。冷。其。痰。涎。上。壅。者。水。不。歸。原。也。而。赤。煩。躁。者。火。不。歸。原。  
也。惟。桂。附。八。味。能。引。火。歸。原。火。歸。水。中。則。水。能。生。木。木。不。生。  
風。而。風。自。息。矣。

二。曰。虛。中。凡。人。體。質。虛。弱。過。於。作。勞。損。傷。元。氣。以。致。痰。壅。氣。浮。  
猝。然。昏。倒。宜。用。六。君。子。湯。主。之。中。氣。下。陷。者。補。中。益。氣。湯。主。  
之。

三。曰。濕。中。濕。中。者。卽。痰。中。也。凡。人。嗜。食。甘。肥。或。醇。酒。乳。酪。則。濕。  
從。內。受。或。山。嵐。瘴。氣。久。雨。陰。晦。或。遠。行。涉。水。坐。臥。溼。地。剝。濕。

從外受濕生癰癧生熱生風故猝然倒無知也蒼白二  
疎陽主之。

四曰寒中。凡人暴中於寒。卒然口鼻氣冷。手足厥逆。或腹痛下利。蒲穀或身體強硬。口噤不語。四肢戰搖。此寒邪直中於裏也。宜用葛附湯或附子理中湯加桂主之。

五曰暑中。凡人務農於赤日。行旅於長途。暑氣逼迫。卒然昏倒。自汗面垢。昏不知人。急用千金消暑丸灌之。其人立甦。此藥有回生之功。一切暑藥皆不及此。村落中各宜預備灌醒後以益元散清之。或以四味香薷飲去厚朴加丹參茯苓等剪連治之。虛者加人參。餘詳論傷暑門。

六日氣虛者精氣結或怒動肝氣以致氣逆痰壅牙關緊急極  
與中風相似但中風身熱中氣身涼中風脈浮中氣脈沉粗  
病有根由必須細究宜用米香調氣散宣之

七日食中醉飽過度或着觸怒以致飲食填塞胃中胃氣不行  
卒然昏倒宜用橘紅三兩生薑二兩炒鹽半撮煎湯灌之  
之次用神术散和之其最甚者胸膈滿悶閉而不通或牙關  
緊急厥暎不醒。但心頭澀者卽以獨行丸攻之藥既下無其  
人或吐或渴自應漸甦若渴不止者以冷粥湯飲之卽止。  
八日惡寒發瘞入廟冷屋棲遲以致邪氣相侵卒然錯語妄言  
或頭面青黯昏不知人急用薰葱湯灌之次以神术散調之。

蘇令丸亦佳

加味逍遙散 治肝經鬱火，脅脹脝痛，或作寒熱，甚至肝木生風，眩暈振搖，或咬牙發瘡，一目斜視，一手一足搐搦，此皆肝氣不和之症。經云：木鬱達之是已。

柴胡

甘草

茯苓

白朮

當歸

白芍

丹皮

黑梔

各一錢

芍藥

五分

水煎服

牛黃清心丸

見真中

地黃飲子

附子理中湯

俱見真中

加味歸脾湯

黃芪

一分一錢

人參

白朮

茯神

當歸

棗仁

炒各一錢

遠志

去心泡各八分

甘草

炙各七分

丹皮

黑山梔

各八分

元眼肉五枚冰煎服

六味地黃湯 滋水制火則無上盛下虛之患

大熟地

四錢

山萸肉

核去核

山藥

各二錢

丹皮

茯苓

澤瀉

各一錢  
五分

水煎服。本方加肉桂熟附子各五分，名八味地黃湯。若爲丸，十倍其藥，煉蜜丸如梧桐子大。

六君子湯

理脾祛痰

人參

茯苓

白朮

陳土炒

陳皮

去白皮

炙甘草

半夏

湯泡七次  
各一錢

生薑五分、大棗二枚、水煎服

補中益氣湯 中氣下陷，宜服此以升舉之。

黃芪

一錢  
五分

白朮

炒土

人參

當歸

甘草

炙各  
一錢

柴胡

升麻

各三  
分

陳皮

五分

生薑一片、大棗二枚、水煎服

蒼白二陳湯

見中  
風

卽二陳湯加蒼朮白朮各一錢

薑附湯

見諸方  
風

四味香薷飲

見傷  
暑

木香調氣散 平肝氣和胃氣

白蔻仁

去皮研

檀香

木香

各兩

丁香

三錢

麝附

五兩

藿香

四兩

炙甘草

砂仁

陳皮

各二兩

右爲細末，每服二錢，入鹽少許，點服。

神木散 此藥能治勝行不正之氣，發熱頭痛，傷食停飲，胃滿腹痛，嘔吐瀉利，並能解穢驅邪，除山嵐瘴氣，鬼瀝戶注，中食

中惡諸症，其效至速。予嘗合此普送，藥到病除，罔不應驗。

蒼朮

陳土炒沙

陳皮

厚模

藿汁炒各二斤

甘草

炙十兩

共爲末，每服二三錢，用湯水調下。

獨行丸 治中食至甚，胸膈滿悶，吐法不效，須用此藥攻之。若昏暈不醒，四肢僵硬，但心頭悶者，扶齒灌之。

大黃  
酒炒

芭草  
去穀

乾薑  
各一錢

研細薑汁爲丸如黃豆大每服五七丸用臺湯化下若服後渴不止者用冷粥湯飲之卽止

蘇合丸 治勞瘵骨蒸症忤心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧疫

癰瘍血月閉痃癖丁腫驚癇中風中氣痰厥昏迷等證

白术

青木香

犀角

香附

毛炒去

硃砂  
水飛

诃梨勒  
蜜取皮

檀香

安息香

酒  
膏

沉香

麝香

丁香

草撥

各二錢

龍腦

薰陸香  
別研

蘇合香

各二兩

右爲細末研藥勻用安息香膏并蘇合香油煉蜜和劑丸如

彈子大以蠟環丸紺綢當心帶之一切邪祟不敢近

傷暑 霽亂 灑腸沙

古稱靜而得之爲中暑動而得之爲中熱暑陰而熱陽也不思暑字以日爲首正言熱氣之襲人耳夏目烈爲太陽之亢氣人觸之則生暑病至於靜而得之者乃納涼於深堂水閣大扇風車嗜食瓜菜致生寒疾或頭痛身痛發無惡寒者外感於寒也或嘔吐腹痛四肢厥冷者直中於寒也與暑症有何干涉大抵辨暑症法以自汗口渴煩心渴赤身熱脈虛爲前然有傷暑中暑閉暑之不同傷暑者感之輕者也其症煩熱口渴益元散主之中暑者感之重者也其症汗大出昏悶不醒或顛心喘喝

妄言也。昏濶之際，以消暑丸灌之立醒。既醒則驗其暑氣之輕重，而清之輕者益元散，重者白虎湯。閉暑者內伏暑氣而外爲風寒閉之也。其頭痛身痛發熱惡寒者，風寒也。口渴煩心者，暑也。四味香薷飲加荆芥、秦艽主之。又有暑天受濕，嘔吐瀉利，發爲霍亂。此停食伏飲所致，宜分寒熱治之。熱者口必渴，黃連香薷飲主之。寒者口不渴，藿香正氣散主之。更有乾霍亂症，欲吐不得吐，欲瀉不得瀉，攬腸大痛，變在須臾。古方以燒鹽和陰陽水引而吐之，或以陳皮同煎吐之，或用多年陳香薷煎湯更佳。俗名攬腸沙、烏沙服，皆此之類。此係穢氣閉塞經隧，氣滯血凝，脾土壅滿，不能轉輸，失天地運行之常則，脹閉而危矣。是以治

法。宜速切戒飲粥湯食諸物人口卽發慎之慎之。

消暑丸 益元散

見類中

白虎湯

見陽明腑病

四味香薷飲 治風寒閉暑之症頭痛發熱煩心口渴或嘔吐泄濶發爲霍亂或兩足轉筋○凡閉暑而不能發越者非香薷不可香薷乃消暑之要藥而方書稱爲散劑俗稱爲夏月之禁藥夏旣禁用則當用於何時乎此不經之說致令良藥受屈殊可扼腕故辨之

香薷

扁草

厚朴

蘆子炒存一錢五分

甘草

五分

水煎服○若兼風寒本方加荆芥藜蒿蔓荆子○若兼霍亂吐濶煩心口渴本方加黃連○若兩足轉筋本方加木瓜茱萸

芥木瓜治轉筋之神品。若風暑相搏而發搐搦者本方加羌活鈎藤。凡暑症不宜發汗。今用風藥者因其暑中挾風也。○若暑濕相搏名曰濕溫。誤汗則名重陽多難治。宜用葛根白虎湯時醫不論暑濕概行發散傷生匪淺。

藿香正氣散 治暑月食涼飲冷發為霍亂腹痛吐瀉骨寒壯熱。

藿香

砂仁

厚樸

茯苓

紫蘇

陳皮

各一錢  
白术  
炒

半夏

桔梗

白芷

各七分

甘草

炙五分

生薑三片水煎服

清暑益氣湯

預服此藥以防暑風

黃連一錢

白朮一錢

人參

當歸

陳皮

麥冬去心

甘草炙各五分

扁荳一錢

茯苓七分

升麻

柴胡

北五味各三分

神曲四分

黃蘆

澤瀉各二分

水煎服

疫癟

疫論已見首卷。分來路兩條去路三條治法五條詳具書矣。六法天行之氣從經絡入其症頭痛發熱宜微散香蘇散散之。病氣傳染從口鼻入其症嘔惡胸滿宜解鬱神木散和之。若兩路之邪歸併於裏腹脹滿悶譁語發狂唇焦口渴者治瘧清涼散。

清之便閉不通者。加大黃下之。其清涼散內人中黃一味乃退。  
熱之藥。解鹹之靈丹。醫家缺而不備。安能取效。復有虛人患  
疫。或病久變虛。或妄治變虛者。須用人參白朮當歸等藥。加入  
清涼藥。內以扶助正氣。如或病氣漸退。正氣大虛。更宜補益。正  
氣爲主。夫發散解穢。清中攻下四法外。而以補法駕馭其間。此  
收效萬全之策也。予嘗用麥冬生地各一兩。加人參二三錢。以  
救津液。又嘗用人參湯送下。加味枳木丸。以治虛人鬱熱便閉  
之症。病氣退而元氣安。遂恃爲囊中活法。謹告同志。各自存神。  
又有頭面腫大。名曰大頭瘟者。頸項粗鍾。名曰蛤蟆瘟者。古方  
普濟消毒飲並主之。但頭腫之極。須用鍼砭。若醫者不究其理。

患者畏而不行。多致潰裂腐爛而難救。若頸腫之極。須用搗紅淡鹽湯吐去其痰。再用前方倍甘桔生之。須宜早治。不可忽也。

香蘇散見太陽症

神木散見類中

治疫清涼散

秦艽

赤芍

知母

貝母

連翹

各一錢

荷葉

七分

丹參

五錢

柴胡

錢半

人中黃

二錢

水煎服。○如傷食胸滿。加麥芽山楂橘子陳皮。○腸下病者。加鱉甲枳殼。昏憤譖語。加黃連。○熱甚大渴。能消水者。加石膏天花粉人參。○便閉不通。腹中脹痛者。加大黃下之。虛人自汗。多倍加人參。津液枯少。更加麥冬生地。○若時

行寒疫不可輕用涼藥宜斟酌投藥

普濟消毒飲

針砭法

並見頭痛

加味枳术丸

見腹痛

製人中黃法

用竹筒兩頭留節刮去青皮開一孔將甘草裝

滿仍用木屑塞口鎔松香封固用繩索定於廁月初一日投

廁缸中一月足取起用水濯洗然後剪開竹筒將甘草晒乾

收貯聽用

或問香蘇散神术散芳香藥也人中黃有穢氣者也而皆以之解疫毒消穢氣何也不知邪客上焦乃清虛之所故用芳香以解之邪客中下二焦乃濁陰之所疫毒至此結而爲穢則非芳香所能解必須以穢攻穢而穢氣始除此人中黃之用所以切

當也。夫病有先後，有部位，有更變，而用藥隨之，方為活法。醫家常須識此，不只治疫一端而已。

虛勞

帝曰：陰虛生內熱，奈何？岐伯曰：有所勞倦，形氣衰少，穀氣不盛，上焦不行，下脘不通，胃氣熱，熱氣薰胸中，故內熱。此言氣虛之候也。東垣宗其說，贅補中益氣之論，卓立千古。朱丹溪從而廣之，以爲陽常有餘，陰常不足。人之勞心好色，內損腎元者多焉。真陰虧損，宜用六味湯加知母黃柏，補其陰而火自降。此又以血虛爲旨也。後人詮補兼者，則宗東垣論補血者，則宗丹溪曰：水爲天一之元，土爲萬物之母。其說至爲有理。然而陽虛易

補陰虛難。療治虛損者當就其陰血未枯之時而早補之。患虛損者當就其真陰未竭之時而重養之亦庶乎其可矣。凡虛勞之症多見吐血痰渴發熱夢遺經閉以及肺痿肺疽咽痛音啞。側臥傳尸鬼疰諸疾今照葛仙翁十藥神書例增損方法臚列於左以備觀覽。

② 即字號方

止咳嗽爲主。予見虛損之成多由於吐血。吐血之因多由於咳嗽。咳嗽之原多起於風寒。仲景云：咳而喘息有聲甚則吐血者用麻黃湯。東垣師其意改用麻黃人參芍藥湯可。見咳嗽吐紅之症多有因於外感者不可不察也。予治外感咳嗽。

用止嗽散加荆防蘇梗以散之。散後肺虛卽用五味異功散。  
補脾土以生肺金虛中挾邪則用圓魚丸解之。虛損漸成咳  
嗽不止乃用紫菀散月華丸清而補之此治虛咳之要訣也。

餘詳本門

止嗽散見後咳嗽門

五味異功散卽四君子加陳皮

方見後

圓魚丸 治久咳不止恐成勞瘵

貝母

去心

知母

前胡

柴胡

杏仁

去皮尖及雙仁者名西棗

大圓魚

一箇重十二兩以上者去腸

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥渣焙乾爲末用魚骨

煮汁一盞和藥爲丸如桐子大每服二十九麥冬陽下日三  
服

海藏紫菀散潤肺止嗽並治肺痿

人參五分

紫菀

知母蒸

貝母去心

桔梗

茯苓

真阿膠

蛤粉炒成珠各一錢

五味子

甘草炙各三分

水煎服

月華丸滋陰降火消痰祛瘀止咳定喘保肺平肝消風熱殺  
戶虧此陰虛發咳之聖藥也

天冬蒸去心

麥冬蒸去心

生地酒洗

熟地酒

山蒸乳蒸

百部蒸

沙參蒸

川貝母蒸

去心蒸

真阿膠名一兩

茯苓乳蒸

獺膽

廣三七錢

各五

用白菊花二兩去蒂桑葉二兩經霜熬膏將阿膠化入膏內和藥稍加煉蜜爲丸如彈子大每服一丸噙化日三服

◎乙字號方

止吐血爲主。凡血症有陽乘陰者有陰乘陽者。俄如脈數內熱口舌乾燥或平素血虛火旺。加以醇酒炙燭之物此乃熱氣騰沸迫血妄行。名曰陽乘陰。法當清降曰生九等主之。止後則用六味地黃丸補之。又如脈息沉遲口舌清潤平素體質虛寒或兼受風冷之氣此謂天寒地凍水凝成冰名曰。

陰乘陽。桂當溫散。理中湯主之。凡治血症。不論陰陽。但以照顧脾胃為收功良策。誠以脾胃者。吉凶之關也。昔云。自上損下者。一損捐於肺。二損捐於肝。三損捐於脾。過於脾則不可治。自下損上者。一損捐於胃。二損捐於心。三損捐於胃。過於胃則不可治。所謂過於脾胃者。吐瀉是也。古人有言。不問陰陽與冷熱。先將脾胃與安。和丹溪云。凡血症。須用四君子之類。以收功。其言深有至理。然而補脾養胃。不專在藥而在飲食。食之得宜。難經曰。損其脾胃者。調其飲食。適其寒溫。誠以飲食之補。遠勝於藥耳。世之治損者。亦可恍然悟矣。

四生尤轉治陽盛陰虛。熱迫血而妄行。以致吐血。咯血。衄血。法

當清降

生地黃

生荷葉

生側柏葉

生艾葉

各等分

細切同搗極爛爲丸如雞子大每服一丸水煎去渣服吐甚者用此丸煎湯調下花蕊散一二錢尤佳

花蕊石散能化瘀血爲水而不動臟腑真神藥也  
花蕊石一片明硫黃四兩

入瓦罐內封口鐵線繫緊鹽泥包裹晒乾硬炭隔定煉二炷香細研篩過每服三三錢童便熱酒調服

生地黃湯

生地

三錢

牛膝

丹皮

黑山梔

各一

丹參

玄參

麥冬

白芍

鬱金

廣三七

荷葉各七分

水煎加陳墨汁、清童便各半杯和服

六味地黃丸 滋益先天，生腎水制虛火，乃醫門要藥。尤紅症之靈丹也。見類中

理中湯見中寒門 治陰盛陽虛不能統血以致陰血走散法當溫補。

四君子湯

人參

白朮

茯苓

炙甘草

各一錢

大棗二枚，生薑一片，水煎服。

◎兩字號方

醫學心悟

卷之三

七

治大吐血成升斗者先用花蕊散止之隨用獨參湯補之所謂血脫益氣陽生陰長之理貧者以歸脾湯代之

人參一兩去蘿

水煎服聽其熟睡切勿驚醞則陰血復生矣

### 歸脾湯

白朮

人參

當歸

棗仁

炒

白芍

各一錢

黃芪

一錢遠志去心泡  
五分七分

甘草

炙五分圓眼肉五枚

水煎服

### ◎丁字號方

治咳嗽吐紅漸成骨蒸勞熱之症如人胃強氣盛大便結脈

有力。此陽盛生熱法。當清涼清骨散主之。若屬虛脾弱大便  
溏脈虛細。此陰虛發熱法。當養陰逍遙散四物湯主之。若氣  
血兩虛而發熱者。八珍湯補之。若元氣大虛變症百出。難以  
名狀。不問其脈。不論其病。但用人參養營湯諸症。自退經云。  
甘溫能除大熱。如或誤用寒涼。反伐生氣。多致不救。

清骨散

柴胡

白芍各一錢

秦艽七分

甘草五分

丹皮

地骨皮

青蒿

龍甲各一分

知母

黃芩

胡黃連

各四分

水煎服。加童便尤妙。凡逍遙四物八珍方內。皆可加入。

逍遙散

方略

類治肝經血虛、煩躁口渴、胸膈刺痛、頭眩心悸。

煩赤口苦發熱盜汗、食少嗜臥、又治女人經水不調、脅腹脹痛、寒熱如瘧、並治室女經閉、癰癧潮熱、肌瘦勞熱等症。

四物湯

大熟地

白蜜

當歸

白芍

各一錢五分

川芎

五分

水煎服。加丹皮麥冬玉竹山藥茯苓退虛熱至效。  
八珍湯 治氣血虛發熱潮熱。

人參

白朮

茯苓

甘草

炙

熟地

當歸

白芍

各一錢

川芎

五分

棗二枚水煎服。本方加黃芪肉桂名十全大補湯。加丹

皮黑山梔柴胡名加味八珍湯

人參養榮湯

白芍炒二錢

人參

黃芪蜜炙

當歸

白朮

熟地各一錢

甘草炙

茯苓

遠志

去心泡北五味各七分

桂心

陳皮各四分

薑一片，棗二枚水煎服

◎ 戊字號方

治肺痿肺癰久咳不止時吐白沫如米粥者名曰肺癰此火盛金傷肺熱而金化也保和湯主之咳嗽吐膿血咳引胸中痛此肺內生毒也名曰肺癰加味桔梗湯主之

保和湯 治肺癆

知母熟五分 貝母二錢 天冬去心一錢 天冬去心一錢 茶仁五錢

北五味十粒 甘草

桔梗

馬兜鈴

百合

阿膠蛤粉炒成珠各八分

薄荷二分

水煎入飴糖一匙溫服虛者加人參

加味桔梗湯 治肺癆

桔梗去蘆 白芨

橘紅

甜葶苈

蜜炒各八分

甘草節

貝母

各一錢五分 芍仁

金銀花

蜜各五錢

水煎服初起加茺蔚防風各一錢漬後加人參黃芪各一錢

治咽痛音瘻喉瘡夫勞症至此乃真陰枯涸虛陽上泛之危  
症多屬難起宜用六味丸滋腎水而以治標之法佐之可也  
百藥煎散 治咽痛

百藥煎

五錢

硼砂

一錢

甘草

二錢

爲末每服一錢米飲調食後細細嚥之

通音煎 治音瘻

白蜜

一斤

川貝母

一兩去心爲末

款冬花

二兩去梗爲末

胡桃肉

十二兩去衣研爛

右四味和勻飯上蒸熟不拘時開水點服

柳華散 治喉瘡並口舌生瘡咽喉腫痛諸症

真青黛 蒲黃

炒

黃柏

炒

人中白

各一兩

冰片 三分 硼砂 五錢

共爲細末吹喉極效

◎庚字號方

治男子夢遺精滑其夢而遺者相火之強也。不夢而遺者心腎之衰也。宜分別之。

秘精丸 有相火心生濕熱則水不清不清則不固故本方以理脾導濕爲先。濕祛水清而精自止矣。治漏之法亦然。

白术

山藥

茯苓

茨神

蓮子肉

去心蒸  
各一兩

芡實

四兩

蓮花鬚

牡蠣

各一兩

五錢

黃柏

五錢

車前子 三兩

共爲末，金櫻膏爲丸，如桐子大，每服七八十九，開水下。○氣虛者加人參一兩。

十補丸 氣旺則能攝精，時下體虛者，服此累效。

黃芪

白术各二兩

茯苓

山藥各一兩五錢

人參一兩

大熟地三兩

當歸

白芍各二兩

山萸肉

杜仲

續斷各二兩

棗仁

二兩

遠志

一兩

北五味

龍骨

牡蠣各七錢五分

金櫻膏爲丸，每服四錢，開水下。

◎辛字號方

治女人經水不調並治室女經閉成損按女人經水不調乃氣血不和其病尤淺室女經閉則水源斷絕其病至深夫所謂天癸者發生於子天一所生之本也所謂月經者經常也反常則災病至矣室女乃氣血完足之人尤不宜閉閉則髮焦咳嗽發熱諸病蜂起勢難爲也

澤蘭湯 調經通血脈治經閉

澤蘭二錢

柏子仁

當歸

白芍

熟地

牛膝

茺蔚子

各一錢  
五分

水煎服

益母勝金丹

熟地

當歸各四

白芍

酒炒三兩

川芎一兩

五錢

牛膝二兩

白朮

香附

酒醋

姜汁

大茴

丹參

茺蔚子各四兩

川芎

酒炒三兩

延胡索一兩

益母草一斤、酒水各半熬膏、和鍊蜜爲丸、每早開水下三錢、晚用清酒下二錢。○經水後期而來、小腹冷痛爲寒、加肉桂五錢。○經水先期妄行、自覺血熱加丹皮二兩、酒炒條芩五錢、凡遇經水作痛、乃血凝氣滯、加延胡索一兩。

◎ 王字號方

治傳尸勞瘵、邪殺蟲、勞症之有蟲、如樹之有蠹、去其蠹而後培其根、則樹木生長、勞症不去、蟲而徒恃補養、未見其受

益者古法具在不可廢也。

驅蟲丸

明雄黃一兩  
燕蒐

雷丸

鬼箭羽各五錢

礪肝一具  
丹參一兩  
五錢

麝二分  
五厘

煉蜜丸如桐子大。每食後開水下十九日三服。紫金丹亦效。  
或用真蘇合香丸治之尤佳。

◎癸字號方

補五臟虛損。凡病邪之所奏。其氣必虛。況由虛致病者乎。則  
補爲最要。難經云。損其肺者益其氣。損其心者和其榮與衛。  
損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者。

益其精。按法主之。

補天大造丸 补五臟虛損

人參 二兩 黃芪 蜜炙

當歸 酒蒸 桂仁 去壳

白芍 酒炒 山藥 乳蒸

枸杞子 酒 大熟地 九蒸晒

鹿角 一斤 龜板 八兩與鹿

以龜鹿膠和藥加煉蜜爲丸每早開水下四錢○陰虛內熱

甚者加丹波二兩陽虛內寒者加肉桂五錢

咳嗽

咳嗽症虛勞門已言之而未詳及外感諸病因故再言之。肺體屬金譬若鐘然鐘非叩不鳴。風寒暑濕燥火六淫之邪自外擊之則鳴。勞慾情志飲食炙燙之火自內攻之則亦鳴。醫者不去其鳴鐘之具而日磨銼其鐘將鐘損聲嘶而鳴之者如故也。鐘其能保乎。吾願治咳者作如是觀大法風寒初起頭痛鼻塞發熱惡寒而咳嗽者用止嗽散加荆芥防風蘇葉生薑以散邪。既散而咳不止專用本方調和肺氣或兼用人參胡桃湯以潤之。金若中寒入裏而咳者但溫其中而咳自止。若暑氣傷肺口渴煩心渴赤者其症最重用止嗽散加黃連黃芩花粉以直折其

火若溫氣生痰。痰涎稠粘者。用止嗽散加牛夏茯苓桑白皮生薑大棗以祛其濕。若燥氣焚金。乾咳無痰者。用止嗽散加瓜蒌貝母知母柏子仁以潤燥。此外感之治法也。然外感之邪。初病在肺。肺咳不已。則移於五臟。臟咳不已。則移於六腑。須按內經十二經見症。而加減如法。則治無不痊。經云。咳而喘息有音甚。則嗜血者屬肺臟。此卽風寒咳血也。止嗽散加荆芥紫蘇赤芍丹參。咳而兩脇痛不能轉側。屬肝臟。前方加柴胡枳殼赤芍。咳而喉中如梗狀。甚則咽腫喉癰。屬心臟。前方倍桔梗。加杏子。咳而右脇痛。陰引肩背。甚則不可以動。動則咳嗽。屬脾臟。前方加葛根秦艽鬱金。咳而腰背痛甚。則咳嗽者屬腎臟。前方加附子。

咳而嘔苦水者屬膀胱。前方加黃芩半夏生薑。咳而失氣者屬小腸腑。前方加芍藥。咳而嘔嘔甚則長蟲出屬胃腑。前方去甘草加烏梅。荆椒乾薑有熱佐之以黃連。咳而遺尿屬大腸腑。前方加白朮赤石脂。咳而遺溺屬膀胱腑。前方加茯苓半夏久咳不止三焦受之其症腹滿不食令人多涕唾面目浮腫氣逆以止嗽散合五味異功散並用投之對症其效如神又以內傷論前症若七情氣結鬱火上衝者用止嗽散加香附貝母柴胡黑山梔。若腎經陰虛水衰不能制火內熱脈細數者宜朝用地黃丸滋腎水午用止嗽散去荆芥加知母貝母以開火鬱仍佐以萎蕤胡桃湯。若客邪混合肺經變生虛熱者更佐以團魚丸若

病勢深沉。變爲虛損。或尸蟲入肺。喉痒而咳者。更佐以月華丸。  
若內傷飲食口乾痰悶。五更咳甚者。乃食積之火。至此時流入  
肺經。用止嗽散加連翹山楂麥芽。荷子。若脾氣虛弱。飲食不思。  
此氣弱也。用五味異功散加桔梗。此內傷之治法也。凡治咳嗽。  
貴在初起得法。爲善。經云。微寒微咳。咳嗽之因屬風寒者十居  
其九。故初治必須發散。而又不可以過散。不散則邪不去。過散  
則肺氣必虛。皆令纏綿難愈。薛立齋云。肺有火。則風邪易入。治  
宜解表。兼清肺火。肺氣虛。則腠理不固。治宜解表。兼補肺氣。又  
云。肺屬辛金。生於己土。久咳不已。必須補脾土。以生肺金。此誠  
格致之言也。然清火之藥。不宜久服。無論脉之洪大滑數。數劑

後卽宜捨去。但用六味丸。頻服之。而兼以白蜜胡桃潤之。其  
咳自住。若脾肺氣虛。則用五味異功散。六君子等藥補土生肺。  
反掌收功爲至捷也。治咳嗽者。宜細加詳審。患咳嗽者。宜戒口。慎風。  
母令久咳不除。變爲肺癆。肺癆。虛損勞瘵之候。慎之慎之。

止嗽散 治諸般咳嗽

桔梗 炒

荆芥

紫菀 蒸

百部 蒸

白前 烹各

甘草 炒十  
二兩

陳皮 水洗去  
白一斤

共爲末。每服三錢。開水調下。食後臨臥服。初感風寒。生薑湯  
調下。子製此藥。普送人。前七味。服者多效。或問藥極輕微。  
而取效甚廣。何也。予曰。藥不貴險峻。惟期中病而已。此方係

暴吐血。以祛瘀爲主。而兼之降火。久吐血。以養陰爲主。而兼之理脾。古方四生丸。十灰散。花蕊石散。祛瘀降火之法也。古方六味湯。四物湯。四君子湯。養陰補脾之法也。然血症有外感內傷之不同。假如咳而喘息有音。甚則吐血者。此風寒也。加味香蘇散。散之務是。赤口行旅。長途日渴。自汗而吐血者。此傷暑也。益元散。清之夏令火炎。更乘秋燥。發爲乾咳。脈數大而吐血者。此燥火焚金也。三黃解毒湯。降之。此外感之治法也。又如陰虛吐血者。初用四生丸。十灰散以化之。兼用地黃湯以清之。止則用地黃丸補之。陽虛大吐血成升斗者。初用花蕊石散以化之。隨用獨參湯以補之。繼則用四君子珍等以調之。臟寒吐血。

如天寒地凍水凝成冰也。則四仲陽以溫之。其或七情氣結。密動肝火者。則用加味逍遙散以疏達之。傷動脾血者。則用澤蘭湯行之。此丙傷之治法也。夫血以不行爲順。止行爲逆。聚吐之時。氣血未衰。飲食如常。大便結實。當導之不行。病勢既久。氣血衰微。飲食漸減。大便不實。當養陰血。兼補脾氣。大凡吐血。降血。須用四君子之類。以收功。蓋陰血生於陽氣。脾土旺。則能生血。耳。治者念之。

四生丸見虎症

十灰散 祛瘀生新。止血之良劑。

大薑

小薑

茅根

苦根

老絲瓜

山梔

蒲黃

荷葉

大黃

亂髮

燒灰存性。每服二三錢。藕湯調下。

花蕊石散

六味湯

四物湯

四君子湯

並見虛症

加味香蘇散

即香蘇散加山梔丹皮  
川參方見傷寒太陽症

益元散

見類中

三黃解毒湯

見傷寒

生地黃湯

見虛症

獨參湯

八珍湯

見虛症

理中湯

見中寒

加味逍遙散

見類中

澤蘭湯

見後腰痛

頭痛

頭爲諸陽之會。清陽不升。則邪氣乘之。致令頭痛。然有內傷外感之異。外感風寒者。宜散之。熱邪傳入胃腑。熱氣上攻者。宜清之。直中症寒氣上逼者。宜溫之。治法詳見傷寒門。茲不贅。然除

正風寒外復有偏頭風。雷頭風客寒犯腦。眉火上衝痰厥頭痛。  
大頭天行破腦傷風。眉稜骨痛眼眶痛等症。更有真頭痛。朝不  
保暮。勢更危急。皆宜細辨。偏頭風者。半邊頭痛。有風熱。有血虛。  
風熱者。筋脈抽搐。或鼻塞。常流濁涕。清空膏主之。血虛者。晝輕  
夜重。痛連眼角。逍遙散主之。雷頭風者。頭痛而起核塊。或頭中  
雷鳴。多屬痰火。清震湯主之。客寒犯腦者。腦痛連齒。手足厥冷。  
口鼻氣冷。羌活附子湯主之。胃火上衝者。脈洪大。口渴飲冷。頭  
筋扛起者。加味升麻湯主之。痰厥頭痛者。胸膈多痰。動則眩晕。  
半夏白术天麻湯主之。腎厥頭痛者。頭重足浮。腰膝痠軟。經所謂下虛上實是也。腎氣衰則下虛。浮火上泛。故上實也。然腎經

有真水虛者脈必數而無力。有真火虛者脈必大而無力。水虛六味丸。火虛八味丸。大頭天行者頭腫大甚如斗時疫之症也。輕者石發頤腫在耳前後皆火癰也。普濟消毒飲主之更加針砭以佐之。破腦傷風者風先破處而入其症多發搐搦防風散主之。眉棱骨痛或眼眶痛俱屬肝經見光則痛者屬血虛逍遙散痛不可開者屬風熱清空督頭痛者多屬陽衰頭統諸陽而腦爲髓海不任受邪若陽氣大虛腦受邪侵則發爲真頭痛手足青至節勢難爲矣速用補中益氣湯加蔓荆子川芎附子並進八味丸間有得生者不可忽也。

清空膏

羌活

防風各六分

柴胡五分

黃芩半生

半炒一錢二分

川芎四分

甘草炙一分

薄荷三分

黃連酒炒六分

水煎服

逍遙散見虛勞

加味清震湯

升麻一錢

蒼朮一錢

青荷葉一箇

全用

甘草炙

陳皮各八分

蔓荆子

荆芥各一錢

全用

薄荷五分

水煎服

羌活附子散

羌活一錢

附子

乾姜各五分

炙甘草八分

水煎服

加味升麻湯

升麻

葛根

赤芍

甘草各一錢

石膏

二錢

薄荷

三分

燈心二十節水煎服

半夏白术天麻湯

半夏

一錢五分

白术

天麻

陳皮

茯苓各一錢

甘草

炙五分

生薑

三分

大棗

三箇

蔓荆子

一錢

虛者加入參

水煎服

六味九 八味九 見類中

普濟消毒飲 治大頭症，腫甚者宜砭之。

甘草

桔梗

黃芩

酒炒黃連

酒炒各一錢

馬勃

玄參

橘紅

柴胡

各五分

薄荷

六分升麻二分

連翹

牛蒡子

炒八分

水煎服。○體虛加人參五分，便閉加大黃、酒燶一錢。○愚按此症須用只母人中黃荷葉爲妙。○發頤症，倍柴胡加丹皮、陳膽、腫痛，倍桔梗、甘草。

灸法，以壯絆磁鋒，用竹片夾定繫紫放鋒出半分，對患處，另以薯蕷、偏刺腫處，俾紫血多出爲善。刺畢以精肉貼片時，再

用雞子清調乳香末潤之此地不宜成膜頭內中空耳前後  
更多曲折提膜板毒氣多不便故針砭斷不可少  
針法以小布針兩枚手法扣定露鋒纖少偏刺腫處血出立鬆  
更敷前藥自然消散用針砭時須正心誠意咬定牙齒下手  
刺之

防風散 治破腦傷風

防風

生南星

炮等分

右爲末每服二錢童便沖酒調服

補中益氣湯

見類中

心痛

當胸之下。岐骨陷處。屬心之部位。其發痛者。則曰心痛。然心不愛邪。受邪則爲真心痛。旦暮不保矣。凡有痛者。胞絡受病也。胞絡者。心主之宮城也。冠凌宮禁。勢已可危。而況犯主乎。故治之宜亟亟也。心痛有九種。一曰氣。二曰血。三曰熱。四曰寒。五曰飲。六曰食。七曰虛。八曰蟲。九曰痘。宜分而治之。

氣痛者。氣壅。攻刺而痛。游走不定也。沉香降氣散。主之。血痛者。痛有定處而不移。轉側若刃鎌之刺。手拈散。主之。熱痛者。舌燥脣焦。溺赤。便閉。喜冷畏熱。其痛或作或止。脈洪大有力。清中湯主之。寒痛者。其痛暴發。手足厥冷。口鼻氣冷。喜熱畏寒。其痛綿綿不休。脈沉細無力。清附湯加肉桂。主之。飲痛者。水飲停積也。

乾嘔吐涎。或咳或噎。甚則瘡之作水聲。脈弦滑小半。夏加扶斧。  
湯主之。食病者。傷於飲食。心胸脹悶。手不可按。或吞酸噫腐。脈  
緊滑。保和湯主之。虛痛者。心悸怔忡。以手按之。則痛止。歸脾湯  
主之。蟲痛者。面白脣紅。或脣之上下有白斑點。或口吐白沫。飢  
時更甚。化蟲丸主之。症痛者。觸冒邪祟。卒爾心痛。面目青黯。或  
昏憤謳語。脈來乍大乍小。或兩手如出兩人。神木散。葱白酒生  
薑湯並主之。此治心痛之大法也。

或問久痛無寒。暴痛無火。然乎否乎。答曰。此說亦宜斟酌。如人  
素有積熱。或受暑濕之熱。或熱食所傷。而發則暴痛。亦屬火矣。  
豈宜熱藥療之。如人本體虛寒。經年累月。憑發無休。是久痛亦

屬寒矣。宜宜寒藥療之。且凡病如受熱中未傳寒中者。比比皆是。必須臨症審確。逐一明辨。斯無誤也。又或謂諸痛爲實痛。無補法亦非也。如人果屬實痛。則不可補。若屬虛痛。必須補之。虛而且寒。則宜溫補。並行。若寒而不虛。則專以溫劑主之。丹溪云。溫卽是補。若虛而兼火。則補劑中須加涼藥。此治痛之良法。治者宜詳審焉。

沉香降氣散 治氣滯心痛

沉香三錢 砂仁七錢 甘草炙五錢 香附醋水炒五兩

玄胡索一兩 酒炒川棟子煨去肉淨一兩

共爲末。每服二錢。淡鹽湯下。

手拈散 治血積心痛

延胡索  
醋炒 香附  
酒炒 五靈脂  
去土 沒藥  
苦丁茶 醋炒  
沒藥  
乾等分

共爲細末、每服三錢、熱酒調下、血老者、用紅花五分、桃仁十粒、煎酒調下。

清中湯 治熱厥心痛

香附  
陳皮  
各一錢 黑山梔  
金鎗子  
卽川康子

延胡索  
各八分 甘草  
炙五分 川黃連  
姜汁炒一錢

水煎服

薑附湯  
見諸方補遺 治寒厥心痛。○又真心痛、手足青至節、宜用本方、大劑飲之、或救十中之一二、若痛時喜手緊、按更加

人參

小半夏加茯苓湯

見傷寒、咳嗽

保和湯 治傷食心痛

麥芽

山楂

荀子

厚樸

香附

各一錢

甘草

連翹

各五分

陳皮

一分錢

水煎服

歸脾湯 治氣血虛弱，以致心痛

黃芪

一錢  
五分

白朮

人參

茯神

棗仁

當歸

各二錢

遠志

七分

木香

甘草

炙各五分

圓眼肉

五枚

水煎服。若挾肝火，加柴胡、山梔、丹皮各一錢。

化蟲丸 治蟲鳴心痛

燕羹

去梗

白雷丸

各五錢

換榔

二錢

雄黃

一分一錢

木香

白术

陳皮

三分三錢

神曲

四錢炒

以百部二兩、熟朮九錢、加桐子大每服一錢五分，分三次飲下。如取下蟲積，加大黃五錢，酒炒。

神木散

見中食

胸痛

胸者，肺之分野，然少陽胆經受病，亦令胸痛。此邪氣初傳入裏，而未深入於裏，故胸痛也。古方用柴胡湯加枳殼治之。如未應。

本方對小陷胸湯一服其效如神。又風寒在肺。胸滿痛氣喘用甘桔湯加理氣散風之劑。又飲食填塞者宜用吐法。其肺癰肺癆二症詳見虛勞茲不贅。

柴胡湯見傷寒少陽症

甘桔湯見傷寒喘病

腸痛

傷寒腸痛屬少陽經受邪。用小柴胡湯。雜症腸痛左爲肝氣不和用柴胡疎肝散。七情鬱結用逍遙散。若兼肝火痰飲食積瘀血隨症加藥。右爲肝移邪於肺用推氣散。凡治實症腸痛左用枳殼右用鬱金皆爲的劑。然亦有虛寒作痛得溫則散按之則止。又宜溫補不可扣執也。

小柴胡湯

見傷寒

柴胡疎肝散 治左脇痛。

柴胡

陳皮

各二分

川芎

赤芍

枳殼

麸炒

香附

醋炒一錢

甘草

炙五分

水煎服。○脣焦口渴。乍痛乍止者。火也。加山梔黃芩。○肝經一條扛起者。食積也。加青皮麥芽山楂。○痛有定處而不移。日輕夜重者。瘀血也。加歸尾紅花桃仁牡丹皮。○乾嘔咳而脇不痛者。停飲也。加半夏茯苓。○喜熱畏寒。欲得熱手按者。寒氣也。加肉桂吳茱萸。

逍遙散

見虛勞

推氣散 治右脇痛

枳殼一錢  
薑金一錢

桂心

甘草

炙各五分

桔梗

陳皮各八分

生薑二片

大棗二枚

水煎服

瓜萎散 治肝氣燥急而脇痛或發水泡

大瓜萎一枚連皮搗爛

粉甘草二錢

紅花七分

水煎服。按鬱火日久，肝氣燥急，不得發泄，故反嘯起泡，轉而爲脇痛。經云：損其肝者緩其中。瓜萎爲物甘緩而潤于鬱，不逆，又如油之洗物，滑而不滯，此其所以奏功也。

胃脘痛

胃脘痛治法與心痛相倣。但停食一症。其脹痛連胸者。此之脹痛連腹者。下之。其食積之輕者。則用神术散消之。又有胃脘癰症。嘔而吐膿血者。不得妄治。昔云。嘔家有膿不須治。嘔盡膿自愈。

神术散 方見食中

### 腹痛

腹中痛其寒熱食積氣血蟲蟲辨法亦與心痛相倣。惟有肝木乘脾。攬腸沙腹內癰。茲三症有不同耳。經云諸痛皆屬於肝。肝木乘脾則腹痛。仲景以芍藥甘草湯主之。甘草味甘者已也。芍藥味酸酸者甲也。甲已化土。則肝木平而腹痛止矣。傷寒症。

中有由少陽傳入太陰而腹痛者。柴胡湯加芍藥有因誤下傳入太陰而腹痛者。桂枝湯加芍藥卽同此意。尋常腹痛全在寒熱食積分別詳明爲主。凡腹痛乍作乍止脈洪有力熱也。以芍藥甘草湯加黃連清之。若喫腐吞酸飽悶膨脹腹中有一條杠起者是食積也。保和丸消之消之而痛不止便閉不行腹痛拒按者三黃枳术丸下之設或下後仍痛以手按其腹若更痛者積未盡也。乃用平藥再消之。若按之痛止者積已去而中氣虛也。五味異功散補之。若消導攻下之後漸變寒中遂至惡冷喜熱須易溫中之劑。此火痛兼食之治法也。若腹痛綿綿不減脈遲無力者寒也。香砂理中湯溫之。若兼飽悶腹痛是有食積不

便驟補香砂二陳湯加薑桂。查茅厚朴溫而消之。消之而痛不  
止。大便反閉。名曰陰結。以木香丸熱藥下之。下後仍以溫劑和  
之。此寒痛兼食之治法也。若因濁氣壅塞。走注疼痛。木香調氣  
散散之。若因瘀血積聚。呆痛不移。澤蘭湯行之。蟲癰而痛脣有  
斑點。餓時更甚。化蟲丸消之。傷暑霍亂。四味香薷飲解之。更有  
乾霍亂症。欲吐不得吐。欲渴不得渴。變在須臾。俗名攬腸沙。是  
也。更有循體紫黑者。名曰烏沙。脹急用燒鹽和陰陽水。吐之或  
用四陳湯服之外。用武侯平安散。擦左右大眼角。其人即甦。其  
腹內癰一症。當臍腫痛。轉側作水聲。小便如淋。千金牡丹皮散  
化之。古方治腹痛症。多以寒者爲虛。熱者爲實。未盡然也。蓋寒

卷之三  
症亦有實痛者。熱症亦有虛痛者。如寒痛兼食則爲實矣。挾熱久痢則爲虛矣。凡看症之法。寒熱虛實互相辨明。斯無誤也。

芍藥甘草湯 止腹痛如神

白芍藥酒炒 三錢 甘草炙一錢

三分

水煎服。脈遲爲寒。加乾薑。脈洪爲熱。加黃連。脈緩爲濕。加蒼朮。牛蒡。脈濺傷血。加當歸。脈弦傷氣。加芍藥。保和丸見心痛。消食積。清濕熱。腹中有一條杠起者。食積也。舌乾口燥是濕熱也。本方主之。有熱加黃連。

三黃枳术丸 消熱食除積滯。腹痛拒按便閉瀉。亦名曰陽結。宜用本方。若冷食所傷。宜用木香丸。若冷熱互傷。須酌其所

食冷熱之多寡而並用之此東垣法也

黃芩一兩

黃連五錢

大黃七錢

五分各五錢

神曲

白术

枳實

陳皮

各五錢

荷葉一枚煎水養爲丸量虛實用

香砂理中湯見中寒治客寒犯胃其症乎是厥冷口鼻氣冷其痛綿綿不止喜熱畏寒脈沉細不比熱痛乍止乍作喜冷畏熱唇焦舌燥口渴脈洪也寒熱之別相隔千里

香砂二陳湯

見類中卽二陳湯加木香砂仁

木香丸 治寒積冷食腹痛拒按或大便閉結謂之冷閉名曰

陰結本方攻之

木香

丁香

各一錢  
五分  
乾薑三錢

麥芽

炒五  
錢

陳皮

三錢

巴荳

三十粒去  
殼炒黑

神麃煮糊爲丸，每服十九丸或二十九丸，開水下。痛甚者倍之。所食之物應隨利出，如利不止，以冷粥飲之即止。

木香調氣散

見癩中

澤蘭湯

見吐血

化蟲丸

見心痛

四味香薷飲

見傷暑

諸葛武溪平安散

硃砂

二錢

射香

冰片

各五  
厘

明雄黃

硼砂

各五  
分

白硝

一分

共研極細末，用小磁罐收貯，每用清水以骨簪點二三厘，在

大眼角內如點眼藥法點後忌熱茶飲食半日卽愈

四凍湯

陳皮去白  
陳香圓去穰  
陳枳殼去穰  
陳茶葉  
炒

等分爲末每服三錢開水點服

千金牡丹皮散 治腹內癰

牡丹皮三錢  
苡仁五錢  
桃仁十粒

瓜蔞仁去殼去油  
淨二錢

水煎服

小腹痛

書云大腹屬太陰當臍屬少陰小腹屬厥陰傷寒傳至厥陰少

腹痛甚此熱邪也宜下之若熱結在裏蓄血下焦亦宜下之若直中厥陰小腹冷痛則爲寒邪宜溫之治法已詳本門尋常少腹痛多屬疝瘕奔豚之類書云男子外結七病女子帶下瘕聚古人更有痃癖癰瘕之名皆一類也痃如弓弦筋扛起也癖者隱僻沉附着骨也癰則有塊可微猶積也多屬於血瘕者假也忽聚而忽散氣爲之也奔豚者如江豚之上竄冷氣上衝也其癰瘕之氣聚於小腸則曰小腸氣聚於膀胱則曰膀胱氣也小腸氣失氣則快膀胱氣少腹熱若沃以湯溼於小便也尤治少腹痛當用墜降之藥其有氣皆當用核乃能宣達病所以取效也橘核丸奔豚丸並主之

**橘核丸** 通治癰瘕痃癖小腸膀胱等氣

橘核

鹽酒炒  
二兩

川棟子

煨去  
肉

山楂子

炒

香附

姜汁浸炒各  
一兩五錢

荔枝核

殼研

小茴香

微炒各  
一兩

神曲四兩，煮糊爲丸。如桐子大，每服三錢，淡鹽水下。寒甚加附子五錢，肉桂三錢，當歸一兩。有熱加黑山梔七錢，又疝氣症，表寒束其內熱，丹溪以黑山梔、吳茱萸並用。按此二味若寒熱不調者，加入丸中更佳。若胞溝小便不利，去小茴加茯苓車前子黑山梔丹參。

**奔豚丸**

見積聚

**身痛**

身體痛。內傷外感。均有之。如身痛而拘急者。外感風寒也。身痛如中杖者。中寒也。身痛而重墜者。濕也。若勞力辛苦之人。一身酸軟無力。而痛者虛也。治法風則散之。香蘇散。寒則溫之。理中湯。濕則燥之。蒼白二陳湯。虛則補之。補中益氣湯。大抵身痛多屬於寒。蓋熱主流通。寒主閉塞也。無論風濕與虛。挾寒者多挾熱者少。治者審之。

香蘇散

見太陽症

理中湯

見中寒

蒼朮二陳湯

卽二陳湯加蒼朮

補中益氣湯

見類中

肩背臂膊痛

肩。臂。痛。古。方。主。以。茯。苓。九。謂。痰。飲。爲。患。也。而。亦。有。不。盡。然。者。凡。  
背。痛。多。屬。於。風。胸。痛。多。屬。於。氣。氣。滯。則。痰。凝。藏。肝。之。病。也。背。爲。  
諸。臟。之。所。伏。凡。風。邪。襲。人。必。從。臟。入。經。絡。之。病。也。間。有。胸。痛。連。  
背。者。氣。閉。其。經。也。亦。有。背。痛。連。於。胸。者。風。襲。其。氣。也。治。胸。痛。者。  
理。痰。氣。治。背。痛。者。祛。風。邪。此。一。定。之。理。也。理。痰。氣。宜。用。木。香。調。  
氣。散。並。前。九。祛。風。邪。宜。用。秦。艽。天。麻。湯。挾。寒。者。加。附。桂。挾。虛。者。  
以。補。中。益。氣。加。秦。艽。天。麻。主。之。如。或。風。邪。痰。氣。互。相。鼓。煽。痰。飲。  
隨。風。走。入。經。絡。而。肩。臂。腫。痛。則。煎。九。二。方。須。酌。量。合。用。治。無。不。  
效。矣。

茯苓丸

茯苓

半夏

各二兩  
姜汁炒

枳殼

各五錢  
炒

薑汁糊丸如桐子大每服二三十丸淡姜湯下

木香調氣散

見類中

秦艽天麻湯

秦艽

一錢  
五分天麻

羌活

陳皮

當歸

川芎各一錢

炙甘草五分

生薑三片

桑枝

三錢  
酒炒

水煎服。○挾寒加附子桂枝。

補中益氣湯

見類中

腰痛

腰痛有風有寒有濕有熱有瘀血有氣滯有痰飲皆標也。腎虛其本也。腰痛拘急牽引腿足脈浮弦者風也。腰冷如冰喜得熱手熨脈沉遲或緊者寒也。並用獨活湯主之。腰痛如坐水中身體沉重腰間如帶重物脈濡細者濕也。蒼白二陳湯加獨活主之。若腰重疼痛腰間發熱痿軟無力脈弦數者濕熱也恐成萎症前方加黃柏主之。若因閃挫跌撲瘀積於內轉側若刀鎚之刺大便黑色脈濇或芤者瘀血也澤蘭湯主之走注刺痛忽聚忽散脈弦急者氣滯也橘核丸主之。腰間腫按之濡軟不痛脈滑者痰也立陳湯加白朮草薢白芥子竹瀉薑汁主之腰痛似脫重按稍止脈細弱無力者虛也六君子湯加杜仲續斷主之。

若兼陰冷更佐以八味丸。大抵腰痛悉屬腎虛。既挾邪氣必須祛邪如無外邪則惟補腎而已。然腎虛之中又須分辨寒熱二症。如脈虛軟無力溺清便溏腰間冷痛此爲陽虛須補命門之火。則用八味丸。若脈細數無力便結滯赤虛火時炎此腎氣蒸鬱減骨枯恐成骨痿斯爲陰虛須補先天之水。則用六味丸合補陰丸之類不可誤用熱藥以灼其陰治者審之。

獨活湯 治腎虛兼受風寒濕氣

獨活

桑寄生

防風

秦艽

威靈仙

牛膝

茯苓各一錢

桂心五分

細辛

甘草炙各三分

當歸

狗脊各二錢

生薑二片水煎服。○丹溪云：人腰痛必用官桂開之。方止寒甚者，更如附子，但有濕熱，則二者皆不宜用。

蒼白二陳湯

見類中

澤蘭湯 治閃挫跌蹣，瘀血內蓄，轉側若刀錐之刺。

澤蘭

三錢

丹皮

牛膝各二錢

桃仁

十粒去皮尖研一錢

紅花

五分

當歸

尾五錢

廣三七

一錢

赤芍

一分

水煎熱酒沖服。如二便不通加酒蒸大黃三錢。凡跌蹣傷重，便溺不通者，非大黃不救。若大便已通，則用廣三七煎酒或山羊血，沖酒、青木香煎酒隨用，一味皆可立止疼痛。

橘核丸

見小腹痛

茯苓丸

見肩臂痛

六君子湯 見類中

六味丸 八味丸

見虛勞

補陰丸 治腎氣熱、腰軟無力、恐成骨痿。

熟地 三兩

丹皮

天冬

當歸

枸杞子

牛膝

山藥

女貞子

人參

黃柏各五錢

杜仲

續斷各一兩

石斛四兩、熬膏和鍊蜜爲丸，每早淡鹽水下三錢。

薄鶴膝風

痺者，癱也。風寒濕三氣雜至，合而爲痺也。其風氣勝者爲行痺，遊走不定也；寒氣勝者爲痛痺，筋骨掣痛也；濕氣勝者爲着痺。

浮腫重墜也。然既曰勝則受病，有偏重矣。治行導者，散風爲主。而以除寒祛濕佐之，大抵參以補血之劑。所謂治風先治血。血行風自滅也。治痛癥者，散寒爲主，而以祛風燥濕佐之，大抵參以補火之劑。所謂熱則流通，寒則凝塞，通則不痛，痛則不通也。治着癥者，燥濕爲主，而以祛風散寒佐之，大抵參以補脾之劑。蓋土旺則能勝濕，而氣足自無頑麻也。通用蠲癥湯加減主之。痛甚者，佐以松枝酒。復有患癥日久，腿足枯細，膝頭腫大，名曰鵝膝風。此三陰本虧寒邪襲於經絡，遂成斯症。宜服虎骨膠丸。外貼普救萬全膏，則漸次可愈。失此不治，則成痼疾而爲廢人矣。

蠲痹湯 通治風寒濕三氣合而成痹

羌活

行上力大

獨活

行下力專各一錢

杜仲

五分

秦艽

一錢

當歸

三錢

川芎

七分治風先治血

甘草

炙五分

海風藤

二錢

桑枝

三錢

乳香

透明者

木香

各八分須理氣也

止痛

水煎服。風氣勝者更加秦艽防風。寒氣勝者加附子。  
濕氣勝者加防己草薢苡仁。痛在上者去獨活加荆芥。  
痛在下者加牛膝。間有濕熱者其人舌乾喜冷口渴溺赤。  
腫處熱辣此寒久變熱也去肉桂加黃柏三分。

松枝酒 治白虎歷節風走注疼痛或如蟲行諸般風氣、

松節

桑枝

桑寄生

鈎藤

續斷

天麻

金毛狗脊

虎骨

秦艽

精水香

海風藤

菊花

五加皮各一兩  
當歸三兩

每藥一兩用生酒二斤煮退火七日飲。痛在下加牛膝，

虎骨膏九

治鶴膝風並治癰瘍諸症

虎骨二斤剉碎洗淨用蠻桑枝金毛狗脊去毛白菊花去蒂各十兩  
和藥爲丸如不足量加蠻蜜

大熟地四兩

當歸三兩

牛膝

山藥

茯苓

杜仲

枸杞

續斷

桑寄生各二兩  
熟附子七錢

厚肉桂去皮不見火五錢

丹皮

澤瀉各八錢

入參一兩

貧者以黃芪四兩代之

右爲末以虎骨膠爲丸每早開水下三錢

普救萬全膏 治一切風氣走注疼痛以及白虎歷節風鶴膝風寒濕流注癰疽發背疔瘡瘰癧跌打損傷腹中食積痞塊多年瘧母頑痰瘀血停蓄腰痛泄利小兒疳積女人癥瘕諸症並貼患處咳嗽癰疾貼背心第七椎子製此膏普送其取效神速倘貼後起泡出水此病氣本深盡爲藥力拔出吉兆也不必疑懼記之記之

藿香

白芷

歸尾

貝母

大楓子

木香

白蘇

烏藥

生地

蘿蔔子

丁香	白芨	殼蟹	細辛
檀香	秦艽	蜂房	防風
苦參	肉桂	蟬退	丁皮
羌活	桂枝	全蝎	白鱲皮
云參	南星	鼈甲	高良薑
獨活	蘇木	枳殼	兩頭尖
桃仁	紅花	連翹	威靈仙
杏仁	蒼术	續斷	花百頭
川芎	麻黃	艾絨	骨碎補
川烏	半夏	藁本	黑山梔
	牙皂	甘草	紫荆皮

青鳳藤  
以上各一兩五錢

大黃  
三兩

蜈蚣  
三十條

蛇膽  
五個

槐枝

桃枝

柳枝

桑枝

練枝

榆枝

楮枝  
十五寸

以上各三寸

男人血餘

三兩以上俱浸油內

真麻油  
十五斤用二

十兩拌搗

松香

一百斤櫻皮濾淨

百草霜

十斤細研篩過

冬浸九宿春秋七宿夏五宿分數次入鍋文武火熬以藥枯油黑滴水成珠爲度濾去渣重稱每藥油十二兩下濾淨片子松香四角同熬至滴水不散每鍋下百草霜細末六兩勿住手攪俟火候成則傾入水缸中以棒攪和成塊用兩人扯拔數次磁鉢收貯治一切風寒濕氣癆瘍等症其效如神

又法治瘻瘍用血丹收更妙每油一斤用丹六兩

### 瘻

瘻大症也。請瘻生於肺熱經云五臟因肺熱葉焦發爲瘻。肺氣熱則皮毛先瘻而爲肺鳴。心氣熱則脈瘻經縱不任地。肝氣熱則筋瘻口苦而經攀。脾氣熱則肉瘻肌膚不仁。腎氣熱則骨瘻腰脊不舉。丹溪治法渴南方補北方渴南方則肺金不受刑。補北方則心火自降。俾西方清肅之令下行。庶肺氣轉清故筋脈骨肉之間濕熱漸消而瘻可愈也。然經云治瘻獨取陽明何也。蓋陽明爲藏府之海主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足瘻不用也。由前論之則曰五臟

有熱。由後論之。則曰陽明之虛。二說似異而實同。蓋陽明胃屬濕土。土虛而感濕熱之化。則母病傳子。肺金受傷。而癰症作矣。是以治癰獨取陽明也。取陽明者。所以祛其濕。渴南補北者。所以清其熱。治癰之法。不外補中祛濕。養陰清熱而已矣。

五癰湯 治五臟癰

人參 白朮 茶芩各一錢 甘草三分  
當歸一錢 茯仁三錢 莪冬二錢 黃柏炒熟

知母各五分

水煎服。心氣熱。加甘草連三分。丹參生地各一錢。肝氣熱。加黃芩。丹皮。牛膝各一錢。脾氣熱。加連翹一錢。生地一錢。

五分。腎氣熱加生地、牛膝各一錢五分。肺氣熱加天冬、百合各二錢。挾痰加川貝、竹瀝。濕痰加半夏、陳皮。瘀血加桃仁、紅花。如氣血兩虛，另用十全大補湯。腎肝虛熱，髓液骨枯，兼用虎潛丸主之。

十全大補湯

見虛勞

虎潛丸

龜板

四兩

杜仲

熟地

各三兩

黃柏

炒褐色

知母

各五錢

牛膝

白芍藥

虎骨

酒炙

當歸

各二兩

陳皮

四錢

乾薑

二錢

爲末，酒糊丸，每服二錢，淡鹽湯下。加人參一兩，尤妙。

腳氣

腳氣者。脚下腫痛。卽癆症之類也。因其痛專在脚。故以腳氣名之。其腫者。名濕脚氣。不腫者。名乾脚氣。濕脚氣。水氣勝也。乾脚氣主之。乾脚氣。風氣勝也。四物湯加牛膝木瓜。主之。

枳榔

牛膝

防已

獨活

秦艽

各一錢

青木香

天麻

赤芍

各八分

水煎服

四物湯

見虛症

癘風

發風癩也。俗稱大癰風。濕熱在內而爲風。鼓之則肌肉生蟲。白屑重疊。搔癢。頑麻。甚則眉毛脫落。鼻柱崩壞。事不可爲矣。治法清潔熱祛風邪。以苦參湯地黃酒並主之。外以當歸膏塗之。往往取效。未可遽視爲廢疾而忽之也。

苦參湯

苦參一錢

生地二錢

黃柏五分

當歸

秦艽

牛蒡子

赤芍

丹參

丹皮

銀花

貝母  
名一錢

加甘菊三錢水煎服。

地黃酒

生地二兩

黃柏

苦參

丹參

草薢

菊花

銀花

丹皮

赤芍

當歸

枸杞子

蔓荆子

赤茯苓

各一兩

秦艽

獨活

威靈仙

各五錢

桑枝

一兩

烏梢蛇

去頭尾一具

右煮好頭生酒五十斤退火七日用

加味當歸膏 治一切瘡瘍並癰腫收口皆效

當歸

生地

各一兩

紫草

木鼈子

去殼研

麻黃

大楓子

去殼研

防風

黃柏

玄參各五錢

麻油八兩

黃蠟

二兩

先將前九味入油熬枯，濾去渣，再將油復入鍋內，熬至滴水成珠，再下黃蠟，試水中不散爲度。傾入蓋碗內，坐水中出火。

三日聽擦

噎隔

古方治噎隔，多以芷比之劑通用。不思吐濕症也。宜燥。噎隔燥症也。宜潤。經云三陽結謂之隔，結熱也。熱甚則物乾。凡噎隔症不出胃脘乾稿四字。稿在上脘者，水飲可行，食物難入。稿在下脘者，食雖可入，久而復出。夫胃既稿矣，而復以燥藥投之，不愈益其燥乎？是以大小半夏二湯，在噎隔門爲禁劑。子嘗用啟

膈散開關更佐以四君子湯調理脾胃。挾鬱者則用逍遙散主之。雖然藥道遠而人不逍遙亦無益也。張雞峯云此症乃神思間病法當內觀靜養斯言深中病情然其間有挾鬱挾血挾痰與食而爲患者皆當按法兼治不可忽也。

啓膈散通噎隔開關之劑屢效

沙參三錢  
丹參三錢  
茯苓一錢  
川貝去心一錢

蜜金五分  
砂仁殼四分  
荷葉蒂二分  
杵頭糠五分

水煎服。虛者加人參。前症若兼瘀積加胡連蕪荑甚則用雄黃散以吐之。若兼血積加桃仁紅花或另以生韭汁飲之。若兼痰積則廣橘紅。若兼食積則加薑子麥芽山楂。

查。此症有生蛇蠅者華陀以醋蒜食之令飽則吐物而出。  
真神法也。

四君子湯

見虛症

調中散

通噎隔開關和胃

北沙參

三兩

荷葉

去筋淨一兩

廣陳皮

浸去白一兩

茯苓

一兩

川貝母

去心粒米炒熟一兩

丹參

二兩

陳倉米

三兩炒熟

五穀鹽

酒炒焦黃一兩

共爲細末，每用米飲調下二錢日二服。

逍遙散

見類中

河間雄黃散

雄黃

瓜蒂

赤小豆

各一錢

共爲細末。每服五分。溫水調滴入狗油數滴。服下以吐爲度。  
吐去隔間小蟲。隨用五味異功散安之。續用逍遙散調之。

痢疾

古人治痢多用墜下之品。如橘榔枳實厚朴大黃之屬。所謂通用通  
因通用法。非不善矣。然而效者半。不效者半。其不效者。每至纏  
綿難愈。或嘔逆不食。而成敗症者。比比皆是。予爲此症。仔細揣  
摩不捨置。忽見燭光。遂恍然有得。因思火性炎上者也。何以降  
下於腸間而爲痢。良由積熱在中。或爲外感風寒。所閉或爲飲  
食生冷所遏。以致火氣不得舒伸。逼迫于下裏急而篩重也。醫

者不察。更用槟榔等藥下逐之。則降者愈降。而痢愈甚矣。予因製治病散。以治痢症初起之時。方用葛根爲君。鼓舞胃氣上行也。陳芽苦參爲臣。清潔熱也。麥芽山楂爲佐。消宿食也。赤芍藥廣陳皮爲使。所謂行血。則便。膩自愈。調氣。則後重自除也。製藥普送。效者極多。惟於腹中脹痛。不可手按者。此有宿食。更佐以礞黃丸下之。若日久脾虛。食少痢多者。五味異功散加白芍。黃連木香。清而補之。氣虛下陷者。補中益氣湯升提之。若邪熱穢氣塞于胃脘。嘔逆不食者。開噤散散之。若久痢變爲虛寒。四肢厥冷。脈微細。飲食不消者。附子理中湯加桂溫之。夫久痢必傷。腎不爲溫。煖元陽誤事者衆矣。可不謹與。

治痢散 峩治痢疾初起之時不論赤白皆效

葛根

苦參

陳皮

陳松蘿茶

各一

赤芍

酒炒

麥芽

炒

山楂

炒各十

右爲細末每服四錢水煎連末藥服下小兒減半忌葷腥  
食煎炒閑氣發氣諸物本方加川連四兩尤效

樸黃丸 治痢疾初起腹中實痛不得手按此有宿食也宜下

之

陳皮

厚朴

姜汁炒各十二兩

大黃

一斤四兩酒蒸

廣木香

四兩

荷葉水疊爲丸如葵莢大每服三錢開水下小兒一錢

五味異功散

卽六君子湯除半夏見類中門

補中益氣湯

見類中門

開噤散 治嘔逆食不入。書云：食不得入，是有火也。故用黃連、  
痢而不食，則氣益虛。故加人參、虛人久痢，並用此法。

人參

川黃連

美水炒各五分

石菖蒲

七分不見欽去梗卽建蓮

丹參

三錢去梗

石蓮子

中有黑穀者

茯苓

陳皮

陳米一撮

冬瓜仁

去殼一錢五分

荷葉蒂二箇

水煎服

附子理中湯

見中寒門

泄鴻

醫學心悟

卷之三

七

書云。濕多成五。鴻濬之屬濕也。明矣。然有濕熱。有濕寒。有食積。  
有脾虛。有腎虛。皆能致鴻。宜分而治之。假如口渴溺赤。下瀉。腸  
垢濕熱也。瀉清口和。下瀉清穀。濕寒也。胸滿痞悶。嗳腐吞酸。瀉  
下臭穢食積也。食少便頻。面色㿠白。脾虛也。五更天明。依時作  
鴻腎虛也。治鴻。神木散主之。寒熱食積隨症加藥。脾虛者。香砂  
六君子湯。腎虛者。加減七神丸。凡治鴻。須利小便。然有食積未  
消者。正不宜利小便。必俟食積既消。然後利之。斯爲合法。

神木散見類中燥濕利脾。消積滯爲止瀉之良藥。濕熱加連翹、  
溫寒加炮薑。木香食積。加山楂麥芽神曲。

香砂六君子湯

見類中治脾虛作瀉。挾寒者加薑桂。甚加附子。

加味七神丸 止堅渴如神

內豆蔻

炒累

吳茱萸

去梗湯泡七枚

廣木香各一兩

補骨脂

二兩 插酒炒

白术

陳土炒四兩

茯苓

車前子

去殼蒸二兩

大棗煎湯疊爲丸每服三錢開水下

瘡疾

瘡者暴虐之狀因形而得名也經曰陰陽相搏而瘡作矣陰搏陽而爲寒陽搏陰而爲熱如二人交爭此勝則彼負彼勝則此負陰陽互相勝負故寒熱並作也善治瘡者調其陰陽平其爭勝察其相兼之症而用藥得宜應手可愈大法瘡症初起香蘇

散。隨用加減少柴胡湯和之。二三發後止。瘧丹截之。久瘧脾虛。大君子湯加柴胡補之中氣。下陷補中益氣湯舉之。元氣既回。瘧氣自止。書云。一日一發者。其病淺。兩日一發者。其病深。三日一發者。其病尤深。然而寒熱往來。總在少陽。久而不愈。總不離乎脾胃。蓋胃虛亦惡寒。脾虛亦發熱也。疎理少陽。扶助脾胃。治瘧無餘蘊矣。

香蘇散

見傷寒太陽症

加減小柴胡湯 治瘧症之通劑。須按症加減。法主之。

柴胡

秦艽

赤芍

各一錢

甘草 五分

陳皮 一分

生薑一片、桑枝二錢、水煎服。熱多者加黃芩一錢。寒多者加黑薑五分。口渴甚者加知母一錢、貝母一錢五分。嘔惡加半夏茯苓各一錢、砂仁七分、生薑二片。汗少者加荆芥一錢、川芎五分。汗多者祛秦光減柴胡一半、加入參一錢、白朮一錢五分。飲食停滯、胸膈飽悶加麥芽神曲山楂厚朴各一錢。如欲止之加白蔻仁八分、鼈甲醋炙二錢更另用止瘧丹一二丸截之神效。若體虛氣弱加人參黃芪白朮各二錢、當歸茯苓各一錢。久病成瘧母加白朮一錢、木香枳實各五分、鼈甲二錢。

止瘧丹治瘧症二三發後、以此止之、應手取效。

常山火酒

草茱仁去殼

半夏曲炒

姜汁

香附米酒炒

青皮去穰醋炒

各四兩

真六神曲十二兩爲末用米飲煮糊爲丸如彈子大硃砂爲衣輕者一丸重者二丸紅棗五六枚煎湯化下清晨而東空腹服

六君子湯 補中益氣湯

俱見類印

瘧久變虛宜用前二方主之但真虛者多挾寒須加肉桂附子炮薑砂仁之類溫補元氣甫克收功

論水腫鼓脹

問曰水腫鼓脹何以別之答曰目窠與足先腫後腹大者水也

先腹大後四肢腫者。脹也。然水腫亦有兼脹者。脹亦有兼水者。須按其先後多寡而治之。今分爲兩門。治者宜合參焉。

### 水腫

水腫症。有表裏寒熱。腎胃之分。大抵四肢腫。腹不腫者。表也。四肢腫。腹亦腫者。裏也。煩渴。口燥。溺赤。便閉。飲食喜涼。此屬陽水。熱也不煩渴。大便自調。飲食喜熱。此屬陰水。寒也。先喘而後腫者。腎經聚水也。先腫而後喘。或但腫而不喘者。胃經蓄水也。經云。腎者。胃之關也。關閉則水積。然胃病而關亦自閉矣。治胃者。五皮飲加減主之。治腎者。腎氣丸加減主之。或間書云。先喘後腫。其病在肺。何也。答曰。喘雖肺病。其本在腎。經云。諸痿喘嘔。皆

屬於不是也。若外感致喘，或專屬肺經受邪，而傷致喘，未有不由於腎者。治者詳之。

五皮飲 治胃經聚水，乃通用之劑。華陀中藏經之方也。累用

累驗

大腹皮

黑豆汁洗去皮

茯苓皮

陳皮

桑白皮

各一錢  
五分

生薑皮 八分

水煎服。仲景云：腰以上腫宜發汗。加紫蘇秦艽荆芥防風。腰以下腫宜利小便。加赤小豆、赤茯苓、澤瀉車前子、萆薢防己。若大便不通，宜下之。加大黃葶苈。腹中脹滿加芍子厚朴。陳皮麥芽山楂。體虛者加白朮入參茯苓。審是陰水加

附子乾姜肉桂。審是陽水。加黃連黃柏黃芩。挾痰者。加半夏生姜。既消之後。宜用理中湯。健脾實胃。或以金匱丸溫暖命門。或以六味加牛膝車前滋腎水。清餘熱。庶收全功。

附子理中湯見中寒

金匱腎氣丸。治腎經聚水。小便不利。腹脹肢腫。或痰喘氣急。漸成水蠱。其效如神。然腎經聚水。亦有陰陽之分。不可不辨。也經云。陰無陽無以生。陽無陰無以化。經又云。膀胱者。州都之宮。津液藏焉。氣化則能出矣。假如腎經陽虛。陰無以生。真火不能制水者。宜用此丸。假如腎經陰虛。陽無以化。真陰不能化氣者。宜用本方去附桂。主之。東垣云。土在兩中化爲泥。

陰水之象也。河間云夏熱之甚，庶土蒸溽，陽水之象也。知斯意者可以治水矣。

大熟地

八兩

山藥

四兩

山萸肉

丹皮

澤瀉

車前子

牛膝

各二兩

茯苓

六兩

肉桂

一兩

附子

一兩虛寒  
甚者倍之

用五加皮八兩煮水一大碗，濾去渣和藥，加煉蜜爲丸，如桐子大，每早開水下四錢。前症若屬陰虛，本方加桂附、文蛤、牡蠣各二兩，潔熱甚者加黃柏五錢，不用五加皮，以草薢八兩，熬汁代之。

論血分水分

婦人經水先斷後發腫者名曰血分通經丸主之先發水腫然後斷經者名曰水分五皮飲送下通經丸主之

### 通經丸

當歸尾

赤芍藥

生地黃

川芎

牛膝

五靈脂

各一兩

紅花

桃仁

各五錢

香附

二兩

琥珀

七錢

蘇木屑二兩煎酒和砂糖熬化爲丸如桐子大每服三錢酒下。體虛者用理中湯送下。若血寒加肉桂五錢。

### 鼓脹

或問方書有鼓脹蠭脹之別何也答曰或者中空無物有似乎

鼓盪者中實有物非蟲卽血也中空無物填實則消經所謂塞因塞用是已。中實有物消之則平經所謂堅者削之是已然。脹滿有寒熱虛實淺深部位之不同若不細辨何由取效。假如渴赤便閉脈數有力色紫黑氣粗厲口渴飲冷脣焦舌燥多屬于熱假如渴清便溏脈細無力色㿠白氣短促喜飲熱湯舌潤口和多屬於寒又如腹脹按之不痛或時脹時減者爲虛按之愈痛。腹脹不減者爲實凡脹滿飲食如常者其病淺飲食減少者其病深且脹有部分縱是通腹脹滿亦必有脹甚之部與病先起處即可知屬何藏府而用藥必以之爲主東垣治脹滿不外枳木補中二方出入加減寒熱攻補隨症施治予因製和中尤

普送。效者甚多。有力者當修合以濟貧乏。又氣虛中滿宜用白术丸而以六君子湯佐之。中空無物不用枳實恐傷氣也。

枳术丸 健脾消食

枳實一兩  
炒少 白术二兩  
土炒

共爲末。荷葉包爛飯煨透杵和爲丸。每服二錢。開水下。補中益氣湯見類中

和中丸

白术	陳土炒	扁豆炒	三	茯苓	一兩	枳實	炒少
陳皮	四兩	兩		五錢		二兩	
香附	兩	神曲	炒黑	麥芽	炒	山楂	炒
姜汁炒		一兩					
砂仁	五錢	半夏	姜汁炒	丹參	二兩		
						酒蒸	

五穀蟲

三兩酒拌炒焦黃色

荷葉一枚煎水盞爲丸，每日上午下午開水吞二錢。此方不寒不熱和平之治法也。若寒盛加乾姜吳萸肉桂。如若濕熱盛加黃連連翹。若大便閉結先用三黃枳木丸下之隨用本方漸磨之。若兼瘀血加厚朴赤芍。若脾虛氣弱用六君子湯吞服此丸或以補中益氣湯送下此醫門之秘法不可不講。

白术丸 治氣虛中滿

白术

一

茯苓

陳皮各二

砂仁

神曲

各一兩

五穀蟲

用荷葉老米煎水發爲丸每服三錢開水下

三黃枳术丸 治熱食所傷肚腹脹痛並濕熱脹滿大便閉結者

黃芩一兩

黃連四錢

大黃七錢

五分酒蒸神曲炒

枳實炒

白朮炒

陳土

陳皮各五錢

荷葉煎水疊爲丸如茶豆大每服一錢五分或二三錢至八

虛實用

六君子湯見類中

積聚

積者推之不移成於五臟多屬血病聚者推之則移成於六腑

多屬氣病。治積聚者。當按初中末之三法。為邪氣初客。積聚未  
至。宜直消之。而後和之。若積聚日久。邪盛正虛。法從中治。須以  
補渴相兼為用。若塊消及半。便從末治。卽往攻繫之藥。但和中  
養胃。導達經脈。俾榮衛流通。而塊自消矣。更有虛人。患積者。必  
先補其虛。理其脾。增其飲食。然後用藥攻其積。斯為善治。此先  
補後攻之法也。初治太無神功散主之中治。五中丸主之末治。  
理中湯主之。予嘗以此三法。互相為用。往往有功。

太無神功散 治痞積不拘氣血。飲食蟲積痰水。皆效。

地扁蓄

瞿麥穗

大麥芽

各五錢

神曲

二錢

沉香

木香

各一錢

甘草

炙五錢

大黃

酒蒸二兩

右爲細末每服二三錢燈心竹葉煎湯及無灰酒調服女以  
燈心紅花當歸煎湯及無灰酒送下忌油膩動氣之物及房  
室一月藥須黃昏服勿食晚飯大小便見惡物爲度

和中丸見鼓脹

書云肝之積在左脇下名曰肥氣加柴胡龍甲

青皮莪朮肺之積在右脇下名曰息賁加白芍仁桑白皮鬱

金心之積起肺上上至心下大如臂名曰伏梁加石菖蒲厚

朴紅花莪朮脾之積在胃脘腹大如盤名曰痞氣加厚朴腎

之積在脾下發於小腹上衝心而痛名曰奔豚另用奔豚丸

主之熱積加黃連黃芩寒積加肉桂乾姜附子酒積加葛根

痰積加半夏水積加桑白皮赤小草血積加桃仁紅花乾漆

肉積加阿魏山楂

奔豚丸

川樣子

炭去肉一兩

茯苓

橘子

鹽酒炒各兩

桂枝

一兩伍錢

肉桂

三錢

附子

炮八錢

吳茱萸

湯泡各五錢七次

荔枝子

錢八錢

小茴香

木香

各七錢

熬砂糖爲丸每服二錢淡鹽湯下若有熱者去桂附

理中湯見中寒

疝氣

疝者小腹痛引睾丸也經云任脈爲病男子外結七疝女子帶

下瘕聚七疝者一曰疝氣上衝心二便不通也二曰狐疝臥

則入腹立則出腹也。三曰癰。痈陰囊腫大如斗如升也。四曰厥。  
疝。肝氣上逆也。五曰癥。腹有癥。痞而熱時下白濁也。六曰  
癢。癰內聚膿血也。七曰瘻。瘻竅內聚膿血。小便不通也。愚按厥  
疝卽衝疝。瘻瘍疝。卽瘻疝。其名有七。其實五者而已。疝之根起  
於各臟而歸併總在厥陰。以肝主筋又主痛也。治疝之法非一  
而分別不外氣血氣。則遊走不定。血則凝聚不散也。橘核丸加  
減主之。

橘核丸

通治七疝

橘核

二兩  
酒炒

小茴香

川棟子

去皮去尖及肉

桃仁

去皮尖及雙仁者炒

山楂子

炒一兩

香附

諸炒一兩

廣木香

紅花

各五錢

以神曲三兩打糊爲丸、每服三錢。衝疝用白茯苓一錢、松子仁三錢煎湯送下。狐疝用當歸二錢、牛膝一錢五分、煎酒送下。癰疝用白茯苓陳皮赤茯苓各一錢煎湯送下。厥疝治同衝疝。瘕疝用丹參白茯苓各一錢五分煎湯送下。癩疝本方內加五靈脂一兩、醋炒赤芍一兩五錢、酒炒服時用牛膝一錢五分、當歸尾三錢、煎酒送下。清癰疝治法同上。此症若寒氣深重本方內加吳茱萸肉桂心各五錢甚則加附子一枚。若表寒束其內熱腹痛熱練成流白濁者本方內加黑山梔五錢、川草薢一兩、吳茱萸三錢、湯泡七次吳萸散表寒、山梔清內熱二者并行丹溪心法也。

小腸氣者。肺下轉痛。失氣則快。

膀胱氣者。肺熱痛澀于小便。卽胞痺也。

弦者。狀如弓弦。筋病也。

癲者。隱伏于內。疼痛着骨也。

癰者。有塊可徵。血病也。

瘕者。假也。忽聚忽散。氣病也。

以上諸症。雖作痛。不引睾丸。故不以痛名之。然而治法。可以彷彿前丸加減。或輕或重。因時制宜也。

一 痰飲

凡病未有不發熱。不生痰者。是痰與熱。乃雜病兼見之症。似無

容專立沫門矣。然亦有雜病輕而痰飲重，則當以痰飲爲主治。書有五痰之名，以五臟分主之也。五飲之名，隨症見也。其實猶未確當，大抵痰以燥濕爲分飲，以表裏爲別。濕痰滑而易出，多生于脾。脾實則消之，二陳湯甚。則滾痰丸。脾虛則補之，六君子湯兼寒兼熱。隨症加藥。燥痰濇而難出，多生于肺。肺燥則淶之。貝母瓜蒌散。肺受火刑，不能下降，以致真水上泛，則滋其陰。六味丸飲在於表者，乾嘔發熱而咳，面目四肢浮腫，否蘇五皮散。飲有在裏者，或停心下，或伏兩腋，咳嗽相引而痛，或走腸間，輒有聲，用小夏加茯苓湯，隨其部位而分治之。此治痰飲之大法也。書又云：治痰須理脾。以痰屬濕，脾土旺，則能勝濕耳。治痰

如此飲亦宜然。然脾經痰飲當健脾以祛其濕。若腎虛水泛爲痰爲飲者必滋其腎。腎水不足則用六味。若命門真火衰微寒痰上泛者則用八味。腎氣丸補火生土開胃家之關導泉水不流而痰飲自消矣。

二陳湯

半夏

茯苓

陳皮

去白各一錢

甘草

炙五分

生薑二片大棗二枚煎服。如人參白朮各一錢名六君子湯。

滾痰丸治實熱老痰變生怪症

大黃

刻

蒸片

黃芩

炒各

四兩

青蒙石

硝

金色

沉香

細剉各三錢

沉砂

細研水乘二錢

氣滯積爲癰，脹砂爲痃。每服一錢，開水下此藥，但取痰積並

痃刮腸大瀉爲老痃要藥。

貝母瓜萎散

貝母

一錢五分

瓜萎

一錢

花粉

桔梗

橘紅

桔梗

各一分

水煎服

香蘇散 見太陽症 沙五皮飲 見水腫

小柴夏加茯苓湯 見傷寒咳嗽

六味丸 千味腎氣丸 卽八味丸加車前牛膝，並見類中門

嘔吐噦 呪逆

嘔者聲與物俱出。吐者有物無聲。噦者有聲無物。世俗謂之乾嘔。東垣以此三者皆因脾胃虛弱或寒氣所客或飲食所傷以致氣逆而食不下也。香砂二陳湯主之。然嘔吐多有屬火者。經云食不得入是有火也。食入反出是有寒也。若拒格飲食點滴不入者必用薑水炒黃連以開之。累用累效。至於食入反出。固爲有寒。若大便閉結須加血藥以潤之。潤之不去宜蜜煎導而通之。蓋下竅開上竅卽入也。其有因脾胃虛弱而吐者。補中爲主。理中湯其有因痞積滯礙而吐者。消積爲主。和中丸。若命門火衰不能生土者。補次爲主。八味丸復有呃逆之症。氣自廢。

下。直衝土。多因痰飲所致。或氣鬱所發。扁鵲丁香散主之。若本氣土衝。橘皮竹茹湯主之。至於大病中見呃逆者。是謂土敗木賊。爲胃絕多難治也。

二陳湯見痰飲通治嘔吐噦。隨症加減。

前症若脾胃虛弱。加人參白朮。若寒氣所侵。加薑桂。甚加附子。若飲食所傷。加山楂麥芽神曲香附砂仁藿香。若飲食沖口而出。不得入者。是爲有火。加黃連山楂。若大便結燥。加當歸黃芩知母。若有積滯。宜兼服和中丸。

理中湯見中寒

和中丸見虛脈

八味丸見類中

扁散丁香散見傷寒呃逆

橘皮竹茹湯

陳皮去白  
二錢

竹茹一團

半夏人參

甘草各一  
錢

水煎服

三消

經云渴而多飲爲上消。消穀善飢爲中消。口渴小水如膏者爲下消。三消之症皆燥熱結聚也。夫法治上消者宜潤其肺兼清其胃。二冬湯主之。治中消者宜清其胃兼滋其腎。生地八味湯主之。治下消者宜滋其胃兼補其肺。肺陰陽生脈散並主之。夫上消清潤使胃火不得傷肺。肺火冲消滋潤者使肺火不得而攻胃也。下消清肺者滋生源以生火也。三消之治不必專執本經。

而滋其化源。則病湯亦次。書又云飲二溲。或飲一溲。或  
危急。仲景用八味丸。主之。漸以安固腎氣也。而河間則用黃芪。  
湯和平之劑。大抵肺腎虛而不寒者。宜用此法。又按仲景少陰  
篇云。腎經虛必頻數熱湯以自救。乃洞氣相求之理。今腎經虛  
寒。則引水自灌。虛寒不能約制。故小便頻數。似此不必與消症。  
同論宜用理中湯加益智仁。主之。然予嘗見傷暑發喘之症。小  
便極多。不啻飲一而溲二者。用六味丸知柏而效。可見此症。又  
由腎經陰虛而得治。宜通變。正當臨症制宜。未可一途而取也。

二冬湯 治上消

天冬二錢

麥冬三錢

花粉一錢

黃芩一錢

知母一錢

甘草五分

人參五分

荷葉一錢水煎服

生地八物湯 治中消

生地三錢

山藥五分

知母一錢

麥冬三錢

黃芩一錢

黃連一錢

黃柏一錢

丹皮一錢

荷葉二錢水煎服

六味地黃湯

見類中

生脈散

麥冬二錢人參一錢

北五味子十五粒

水煎服

八味丸治肺腎兩虛少溲多

黃芪湯治肺腎兩虛少溲多

黃芪

三錢

五味子

一錢

人參

夢冬

枸杞子

大熟地各一錢

分

冰煎服

連中湯治中寒

熱淋

淋者小便澀數不得流通溺已而痛者也。大抵由膀胱經濕毒所致。然淋有六種。增曰石淋下如砂石。有似湯瓶久在火中底結白碱也。益元散加琥珀末。玉蕊散。白滑淋消下潤液如脂膏。

也。莫解飲主之。三日氣淋。氣滯不通水道。阻塞脣下。妨閼腹痛。是也。假蘇散主之。四日血淋。瘀血停蓄。莖中割痛難忍。是也。生地四物湯加紅花桃仁花蕊石主之。或兼服代抵當丸。五日勞淋。勞力辛苦而發。此爲氣虛。以至氣化不及。州都補中益氣湯。主之。六日冷淋。寒氣堅閉。水道不行。其症四肢厥冷。口鼻氣冷。喜飲熱湯是也。金匱腎氣湯主之。更有過服金石熱藥。敗精流注。轉而爲淋者。又老人陰已痿。而思色以降其精。則精不出。而內敗。以致大小便牽痛如淋。愈痛則愈便。愈便則愈痛。宜用前莫解飲。羊黃柏加菟絲遠志導去其精。然後用六味地黃湯補之。方爲有益。淋症多端。未可一概而論也。

益元散

見類中

草薢飲

治膏淋並治諸淋

萆薢

三錢

文蛤粉

研細末

石菖

車前子

茯苓

各一錢

燈心箭

二十枝

蓮子心

石菖蒲

黃柏

各八分

假蘇散

治氣淋

荆芥

陳皮

香附

麥芽

炒

瞿麥

木通

赤茯苓

各等分爲末，每服三錢，開水下。

生地四物湯

即四物湯以生地易熟地方見虛勞

代抵當丸

生地

當歸

赤芍

各一兩

川芎

五靈脂

各七錢  
五分

大黃

一錢  
酒蒸

砂糖爲丸。每服三錢。開水下。

補中益氣湯

見類中

金匱腎氣湯

見水滻

小便不通

顯裕 孕婦轉脬

小便不通謂之癃閉。癃閉與淋症不同。淋則便數而莖痛癃閉則小便點滴不通也。東垣云。渴而小便不通者。熱在上焦氣分也。宜用四苓散加山梔黃芩等藥。以分利之。若大便亦閉。加大黃玄明粉之類。不渴而小便不利者。熱在下焦血分也。宜用滋

陰化氣之法。若滋腎丸之類是也。大法無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。下元真陰不足。則陽氣不化。必滋其陰。若下元真陽不足。則陰氣不生。必補其陽。譬如冰腫鼓脹。小便不通者。服金匱腎氣丸。而小便自行。陰得陽以生也。復有除桂附服之。而亦效者。陽得陰而化也。此陰陽氣化之精義也。更有小便不通。因而吐食者。名曰關格。經云。關則不得小便。格則吐逆。關格者。不得盡其命矣。宜用假蘇散治之。又丹溪治孕婦轉脬。小便不通者。用補中益氣湯隨服而探吐之。往往有效。譬如滴水之器。上竅閉。則下竅不通。必上竅開。然後下竅之水出焉。丹溪初試此法。以爲偶中。後來屢用屢驗。遂特爲救急良方。每見今人治。

轉脬症。投補中益氣而不爲探吐。且曰古法不效。有是理乎。予嘗用茯苓升麻湯治此。有驗。蓋用升麻以舉其胎氣。用茯苓以利小便。用歸芎以活其胎。用苧根理胞絲之繚亂。此以升劑爲通之法也。附錄於此。以俟明哲。

四苓散

卽五苓散去桂枝  
方見太陽府病

滋腎丸

黃柏炒褐色

知母蒸各

二兩

肉桂去皮一錢

煉蜜丸。如梧桐子大。每服七八十九。開水下。

金匱腎氣丸

見水腫

假蘇丸

見淋症

補中益氣湯

見類中

茯苓升麻湯

茯苓赤白各五錢

升麻一分

當歸二錢

川芎一錢

芍根三分

當歸二錢

急流水煎服或調琥珀末二錢服更佳。

大便不通 大小腸交 遺尿 脫肛

經曰。北方黑色入通於腎。開竅于二陰。是知腎主二便。腎經津液乾枯。則大便閉結矣。然有實閉虛閉。熱閉冷閉之不同。如陽明胃實燥渴。譖語不大便者。實閉也。小承氣湯下之。若老弱人精血不足。新產婦人。氣血乾枯。以致腸胃不潤。此虛閉也。四物湯加松子仁。柏子仁。肉蓯蓉。枸杞。人乳之類。以潤之。或以蜜煎。

導而通之。若氣血兩虛，則用八珍湯。熱閉者，口燥脣焦，舌胎黃，小便赤，喜冷惡熱，此名陽結，宜用清藥攻下之法。三黃枳木丸主之。若冷閉者，唇淡口和，舌胎白，小便清，喜熱惡寒，此名陰結，宜用溫藥而兼潤燥之法。理中湯加歸芍主之。凡虛人不大便，未可勉強通之。大便雖閉，腹無所苦，但與潤劑積久自行，不比傷寒邪熱消燥津液有不容刻緩之勢也。予嘗治老人虛閉，數至圊而不能便者，用四物湯加滋潤藥，加升麻，屢試屢驗。此亦救急之良法也。

大小腸交陰陽拂逆也。大便前出，小便後出，名曰交腸。五苓散主之。復有老人陰血乾枯，大腸結燥，便溺俱自前出，此非交腸。

乃血液枯涸之徵氣血衰敗之候也。多服大劑八珍湯或可稍延歲月耳。

遺尿有二症。一因脾胃虛弱。倉廩不固。腸滑而遺者。一因火性急速。逼迫而遺者。宜分別治之。脾虛理中湯。火盛芍藥甘草湯。加黃連。

脫肛亦有二症。一因氣虛下陷而脫者。補中益氣湯。一因腸胃有火。腫脹下脫者。四物加升麻黃芩荷葉之屬。

小承氣湯 見傷寒少陰經症  
四物湯 見虛勞

蜜煎導法 見傷寒

八珍湯 見虛勞

三黃枳木丸 見腹痛

理中湯 見傷寒、中寒門

五苓散

見太陽病

補中益氣湯

見類中

芍藥甘草湯

見腹痛

小便不通

經云膀胱不利爲癃。不約爲遺溺。所以不約者其因有三。一曰肝熱。肝氣熱。則陰挺失職。書云肝主疏泄。是已。加味逍遙散。主之。二曰氣虛。中氣虛。則不能統攝。以致遺溺。个補湯。主之。大抵老幼多見此症。悉屬肝氣不固。老人挾寒者。多小兒挾熱者。衆挾寒者。用本方。挾熱者。六味地黃。九三日腎敗。有言反日溲便自遺者。此腎絕也。傷寒日久見之。多難救。中症見之。隨用大劑附子理中湯。頻灌。間有得生者。蓋暴脫者。可以暴復。若病勢日

深則不可也。然中症亦有陰虛而遺溺者，不宜偏用熱藥治此者詳之。

加味逍遙散

見癩中

十全大補湯

見虛勞

六味地黃丸

見虛勞

附子理中湯

見中寒

便血

便血症有腸風、有臟毒、有熱、有寒。病人臟腑有熱，風邪乘之，則下鮮血。此名腸風清魂散主之。若腸胃不清，不如魚湯或如葛汁，此名臟毒芍藥湯主之。凡下血症脈虧有力，脣焦口燥，喜冷畏熱，是爲有火，宜用前方加黃芩丹皮生地之屬。若脈細無力，脣淡口和，喜熱畏寒，或四肢厥冷，是爲有寒，宜用溫藥止之。理

沖加歸芍生之若便久不止氣血大虛宜期歸脾十全草旋血  
歸經血本屬陰生於陽氣治者宜滋其化源

清魂散

荆芥

三錢

當歸五錢

水煎服

芍藥湯

見腹痛

理中湯

見中寒

歸脾湯

十全大補湯

俱見虛勞門

尿血

心主血。心氣熱則遺熱於膀胱。陰血妄行而漏出焉。又肝主疏泄。肝火盛亦令尿血。清心阿膠散主之。平肝加味逍遙散主之。若久病氣血俱虛而見此症。八珍湯主之。凡治尿血不可輕用。

止清藥恐積瘀子陰莖痛楚難當也。

阿膠散

阿膠水化開冰一錢丹參

生地各二錢

黑山梔

丹皮

血餘

即亂髮燒灰存性

麥冬

當歸各八分

水煎服

加味逍遙散見顏中

八珍湯見虛勞

醫學心悟第三卷終