

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷十一

雜病源流犀燭奇經八脈門

衝脈病源流

沈金鰲撰

衝脈起于會陰。夾臍而行。直衝于上。爲諸脈之衝要。故曰十二經脈之海。此與任脉主身前之陰。

經曰。衝脈爲病。氣逆而裏急。又曰。上衝作躁熱。又曰。欬唾手足厥逆。氣從少腹上衝胸咽。面翕然熱如醉。下流陰股。小便難持。又曰。暑月病甚。則傳腎肝。爲瘻厥。四肢如火。或如冰。心煩。仲景曰。寒氣客脈不通。氣因鳴動。應手起關元。隨腹直上。疝瘕遺溺。脇支滿煩。女子絕孕。動氣在上下左右。不可發汗與下。合此數條觀之。衝脈既爲十二經之海。而下爲血海。又與督脈爲十二經之道路。及與任脈陽明脈會于氣街。則督任二脉皆可謂之衝。故古人不分衝任督。而總名曰太衝。如經云。廣明之後。卽爲太衝是也。蓋太衝云。

者以一身之精氣上升言之。不止爲血海言之也。然衝任督雖同起下極。畢竟三脉分行故。衝則獨主血海。而其所以主血海。以其爲先天精氣之主。能上灌諸陽。下滲諸陰。以至足跗。故其治常在血海也。若陰陽和而精氣足。則陽和之精升。運于一身之間。自然無病。稍有不調。必逆而上僭。而其爲病一曰寒逆。陽不足也。脈來中央。寢堅徑至。關尺寸俱牢。直上直下。症見胸中寒。少腹痛。中滿暴脹。疝瘕遺溺。脇支滿煩。女子絕孕。宜理中湯去白术或加肉桂一曰火逆。陰不足也。脈來陰陽俱盛。兩手脉浮之俱有陽沉之俱有陰。症見咳嗽。躁熱上搶心。眩仆。四肢如火。心煩恍惚痴狂。宜加味補陰丸此等脉症皆衝之病。仲景以動氣在上下左右。俱不可發汗與下者。凡以衝氣逆則陰精虛。陰精虛則陽氣竭。故不可汗下也。况乎發汗與下必右犯肺。左犯肝。上犯心。下犯腎。諸經皆受害矣。犯肺則奈何汗

之氣躁而逆故鰥渴苦煩氣隔飲水卽吐下之津液內渴而不下

故咽燥鼻乾頭眩心悸皆衝氣犯肺肺受其害所見之症也

宜五苓散

犯肝則奈何汗之傷血而引肝上逆故頭眩汗不出筋惕肉瞤下之傷氣故腹內拘急食下動氣反劇身雖有熱卧則欲蜷皆衝氣犯肝肝受其害所見之症也

宜防風白术牡蠣湯

犯心則奈何汗之氣逆上冲正在心端下之掌握熱煩身上浮冷熱汗自洩欲得水自灌皆

衝氣犯心心受其害且汗下則心液洩故見如是等症也

宜甘李根湯

犯腎則奈何汗之必寒起無汗心中大煩骨節苦疼目暈惡寒食則反吐穀不能進下之腹脹滿卒起頭暉食則清穀不化心下痞

皆衝氣犯腎腎受其害且腎主五液汗下則五液耗故見如是等

症也

宜大橘皮湯

以是知衝治則血海治臍之上下左右皆無犯而病自愈也此則仲景之微旨仲景之良法也然其氣是起于少陰發

予厥陰。若三陰之開閉失職。則本原之真水真火兩虛。而爲患種。種必犯於衝經。言衝病傳肝腎。而爲痿厥者。三陰之患犯衝。則又不止于痿厥二症。爲衝之自致矣。

奇經八脉總說 濱湖曰。凡人身有經脉。絡脉。直行。曰經。旁支曰絡。經凡十二手三陽三陰。足三陽三陰是也。絡凡十五。十二經各有別絡。而脾又有大絡。并任督二絡爲十五也。共二十七氣。相隨上下。如泉之流。不得休息。故陽脈營于五臟。陰脈營于六腑。陰陽相貫。莫知其紀終而復始。其流溢之氣。入于奇經。轉相灌輸。內溫臟腑。外濡腠理。奇經凡八脉。不拘制于十二正經。無表裏配合。故謂之奇。蓋正經猶溝渠。奇經猶湖澤。正經之脉。隆盛則溢于奇經。故秦越人比之天雨降下溝渠。溢流湖澤。此發靈素未發之秘也。八脉散在羣書者。可攷而悉也。

衝脈經行諸穴

內經曰衝爲經脈之海。又名血海。其脉與任

脈皆起于少腹之內胞中。其浮而外者起于氣衝。

一名氣街在少腹毛中兩旁各二寸橫骨兩端動

脈宛宛中足陽明穴也。並足陽明少陰二經之間循腹上行至橫骨。足陽明去腹中行二寸少陰去腹中行五分。衝脈行于二經間。橫骨在陰上。橫骨中宛如半月去腹中行一寸半。

夾膀左右各五分上行歷太赫。

橫骨上一寸氣穴即胞門太赫上一寸少陰衝脈之會

四海。氣穴上一寸中注氣穴上一寸盲命中注上一寸商曲盲命上一寸石關商曲上一寸通谷陰都上一寸幽門通谷上一寸

凡二十四穴。

脉法 脉經曰兩手脉浮之俱有陽沉之俱有陰。陰陽皆盛。此

衝督之脉也。衝督之脉爲十二經之道路也。衝督用事。則十二經不復朝于寸口。其人若恍惚狂痴。又曰脉來中央堅蹇徑至。關者。衝脉也。又曰尺寸俱牢直上直下。此乃衝脈胸中有寒痼

也。

衝脈經行原委

靈樞曰、衝任皆起胞中、上循背裏爲經絡之

海。其浮而外者、循腹右上行、會于咽喉、別而絡唇口。血氣盛、則充膚熱肉、血獨盛、則滲灌皮膚、生毫毛。婦人有餘子氣、不足于血、月下數脫血、任衝並傷。脉不榮其唇口、故鬚鬚不生。宦者去其宗筋、傷其衝脉、血寫不復、皮膚內結、唇口不榮、故鬚亦不生。天宦不脫于血、而任衝不盛、宗筋不強、有氣無血、唇口不榮、故鬚亦不生。又曰、衝脈者、五臟六腑之海也。其上者出于頸頬、滲諸陽、灌諸精。其下者、注于少陰之大絡、起于腎下、出于氣街、循陰股內廉、斜入膕中、伏行骨內廉、並少陰之經、下入內踝之後、入足下。其別者、並于少陰、滲三陰、斜入踝、伏行出屬跗下、循跗上入大指之間、滲諸絡、而溫足脰肌肉。故其脉常動、別絡結、則跗上不動。不動則厥、厥則寒矣。內經曰、三陰之所交結于

脚也。踝上各一行者，此腎脈之下行也。名曰太衝。王啟元曰：腎脈與衝脈並下行，循足行而盛大，故曰大衝。一云：衝脈起于氣街，街直而通，故謂之衝。又曰：心臟在南，故前曰廣明。衝脈在北，故後曰太衝。足少陰腎與衝脈合而盛大，故曰太衝。兩脉相合爲表裏也。衝脈在脾之下，故曰其衝在下。名曰太陰。

衝脈相通諸經 王海藏曰：手少陰三焦相火爲一腑。右腎命門爲相火。心包主亦名相火。其脉同診。腎爲生氣之門。出而治腑。下分三岐。上衝夾腑。過天樞。上至膻中。兩乳間。元氣所繫焉。又足三焦太陽之別。並足太陽正路。入絡膀胱。約下焉。三焦者。從頭至心。心至脅。脅至足。爲上中下三焦。其寔直元一氣也。故曰：有臟無腑。脈訣云：三焦無狀空有名。寄在胸中。膈相應。一云：其腑在氣街中。上焦在胃上口。治在膻中。中焦在胃管。治在脅。

旁下焦在臍下膀胱上口。治在臍經曰原氣者。三焦之別使也。
腎間動氣者。真原一氣分爲三路。人之生命也。十二經之根本
也。瀕湖曰三焦卽命門之用與衝任督相通者

人身四海。內經曰海有東西南北。人亦有四海以應之。胃者
水穀之海。其輸上在氣街。下至三里。衝脈爲十二經之海。其輸
上在于大杼。下出于巨虛之上下廉。膻中者爲氣之海。其輸上
在于柱骨之上下。前在人迎。腦爲髓之海。其輸上在于蓋。下在
風府。氣海有餘。氣滿胸中。悅息面赤。氣海不足。則氣少不足以
言。血海有餘。則常想其身大。怫然不知其所病。血海不足。常想
其身小。狹然不知其所病。水穀之海有餘。則腹滿。水穀之海不
足。則饑不受食。髓海有餘。則輕勁多力。自過其度。髓海不足。則
腦轉耳鳴。脛痠眩冒。目無所見。懈怠安卧。

衝病症治

內經曰：治療獨取陽明者何也？曰：陽明者，五臟六

腑之海也。主宗筋。宗筋主束骨而利機關。衝脈者，經脈之海也。

主滲灌谿谷。與陽明合于宗筋。會于氣街。而陽明爲之長。皆屬於

帶脉。絡于督脈。故陽明虛則宗筋縱。帶脈不引。故足痿不用。治

之當各補其營。而通其俞。調其虛寢。和其逆順。筋脈骨肉各以

其時受月則病已。

謂肝甲、心丙、丁、脾戊、己、王氣法。時月也。

李東垣曰：秋冬之月。

胃脈四道爲衝脈所逆。脇下少陽脈二道而反上行。名曰厥逆。

其症氣上衝咽。不得息。而喘息有音。不得卧。宜調中益氣湯加

吳萸五分。隨氣多少用之。夏月有此。乃大熱之症。用黃連黃柏

知母各等分酒洗炒爲末。白湯和丸。每服一二百丸。空心白湯

下。卽以美膳壓之。不令停留胃中。直至下元。以瀉衝脈之邪也。

蓋此病隨四時寒熱溫涼治之。又曰：凡逆氣上衝。或兼裏急。或

作躁熱。皆衝脈逆也。若內傷病此。宜補中益氣湯加炒黃連。黃柏知母以洩衝脈。又曰。凡腎火旺。及任督衝三脉盛者。宜用酒炒黃柏知母。亦不可久服。恐妨胃也。又曰。或腹中刺痛。或裏急。宜多用甘草。或虛坐而大便不得者。皆屬血虛。血虛則裏急。宜用當歸。又曰。氣逆裏急。膈咽不通。大便不行者。宜升陽瀉熱湯。主之。又曰。麻木厥氣上衝。逆氣上行。妄聞妄見者。宜神功丸。主之。又曰。暑月病甚。則傳腎肝爲瘻。厥瘻乃四肢痿軟。厥乃四肢如火。或如冰心煩。衝脈氣逆上甚。則火逆。名曰厥逆。故瘻厥二病。多相須也。經曰。下氣不足。則痿厥心惋。宜以清燥去濕熱之藥。或生脉散合四苓散。加酒洗知柏以洩其濕熱。李瀨湖曰。濕熱成瘻。乃不足中。有餘也。宜滲洩之藥。若精血枯涸成瘻。乃不足中。之不足也。全要峻補之藥。千金方曰。欬唾手足厥逆。

氣從小腹上冲胸咽。其面翕熱如醉。因復下流陰股。小便難時。
復冒者。寸脉沉。尺脉微。宜茯苓五味子湯。以治其氣衝胸滿者。
去桂。

治衝病諸藥要品及方十三

衝逆宜降氣泄熱。陳皮、黃芪、當歸、沉香、木香、吳茱萸、枳榔、川黃連

黃芩、黃柏、知母

理中湯

寒逆

加味補陰丸。火逆：黃柏、知母各四兩；當歸、沉香、木香、吳茱萸、枳榔、川黃連。
巴戟、熟地、山萸各三兩；黃芩、白朮、川黃連。

杞子、遠志、山藥、鹿茸、龜板各二兩

蜜丸、鹽湯、下八九十九丸

此方補陰虛，瀉陰火。

五苓散

右動

防風白朮湯。左動：防風、白朮、牡蠣粉等分每末二錢酒或米飲下日二三服。
此方耑治動氣悞發汗筋惕肉瞶者。

甘李根湯

上動
芍

李根皮五錢
黃芩各一錢
半夏

桂枝錢半
當歸
甘草各五

白

分 姜三片

大橘皮湯

下動
陳皮三錢

竹茹二錢
棗三枚

甘草

人參

甘草

調中益氣湯

厥逆
一錢

黃芩二錢
陳皮

人參
蒼朮

炙甘草各

木香二

分

水煎服

補中益氣湯

內傷
甘草

黃芪
升麻

人參
當歸

白朮

陳皮

升陽瀉熱湯

氣衝
香附

柴胡
甘草

升麻
白朮

赤芩

枳壳

神功丸

又

人參
麥冬

五味子

生脉散

燥熱

人參
白朮

澤瀉

四苓散

又

茯苓
猪苓

白朮

茯苓五

味
子湯

氣逆
各一錢

茯苓
五味子各二錢

肉桂

甘草

任脉病源流

沈金鰲撰

任脉起于中極之下。以上毛際循腹裏上關元。至咽喉上頸循面入目。此與衝脈主身前之陰。

古人以任脈爲陰沉之海。以其起于中極之下會陰也。按其脉之所到。旣上中極。卽與足厥陰太陰少陰之脉並行。循關元。歷石門。氣海。又會足少陽。衝脈于陰交。歷建里。再會手太陽。少陽。足陽明之脉。於中脘。以上喉嚨。再會陰維之脉于天突。廉泉。至目下之中央。承泣而終。是任脉固起于真陰。而陰無陽不生。猶地之統于天。而地氣之上通。必由天氣之下降。兩相濟而後能通。不然。窮陰冱寒。必至成痞閉也。人身之有天癸。乃天之元氣。降則爲精氣。以充於地。則真陰自生。旣生而漸至于充。然後地氣通。太衝脉由是始旺。月事以時下。而易于有子。若無子者。必其任脈虛。以至衝衰。血竭。地氣不通故也。然而真陰最難充滿。非年歲既至。穀氣充實。天

元必不堅定。故天癸亦不至。然則真陰之盛有不出于真陽之寔者乎。經曰年四十而陰氣自半。言平陽極而衰爲陰所襲。故曰陰半。蓋此陰已爲窮陰非真陰也。此雖真陰衰寔真陽衰也。故任脈爲病非陰之自病。寔由于陰中無陽。如經云男子內結七疝。女子帶下瘕聚。皆原結陰之故耳。若經又云脉來丸丸。橫于寸口者爲任脈。此脈已爲陰氣所襲。故動苦少腹。引臍下引橫骨。陰中切痛。宜奪命丹。又苦腹中有氣如指。上搶心。拘急不得俛仰也。宜木香一捏金散。則此雖爲無陰之症。何莫非無陽之症乎。所謂真陰之盛。必由於真陽之寔。益可見矣。

任脈經行諸穴。脉經曰任爲陰脉之海。其脉起于中極之下。少腹之內會陰之分。在兩陰之間上行而外出循曲骨。橫骨上毛際中毛際至中極。膍下四寸膀胱之募同足厥陰太陰少陰並行腹裏循關元

臍下三寸小腸之募

歷石門

卽丹田

一名命門

在氣海臍下

一寸半宛

宛中男子

生氣之海

三陰爲任脉之會

歷石門

卽丹田

一名命門

在氣海臍下

一寸半宛

宛中女子

生氣之海

會足少陽衝脈于陰交

臍下一寸當膀胱

循神闕

臍中

三焦之募

口三焦之募

氣海臍下

一寸半宛

水分

臍上一寸當

會足太陰于下院

臍上二寸當胃下口

歷建里

臍上三寸當胃下口

巨關

鳩尾

會手太陰少陽足陽明于中院

臍上四寸當胃之募也

上上院

臍上五寸

巨關

尾

巨關

鳩尾

下一寸心

鳩尾

蔽骨下

中庭

膻中下

一寸

玉堂下

一寸六分

之募也

五分

中庭

膻中下

一寸六分陷中

膻中

玉堂

一寸六分

紫宮下

華蓋

華蓋下

璇璣

璇璣幾下

天突下

上喉嚨會

天突

陰維于天突廉泉

廉泉在結喉上

天突在結喉下

四寸宛宛中

上顧循承榮與

上顧循承榮與

上顧循承榮與

上顧循承榮與

手足陽明督脈會

唇下

唇下

唇中

環唇上

至下齦

交循出分行循面繫兩

兩

目下之中央至承泣而終

目下七分直竇子陷中二穴

凡二十七穴

按難經

目下七分直竇子陷中二穴

甲乙經

部無循面

以下之說

口邊脉丸丸者任脉也。

脉法

脉經曰寸口脉來緊細寔長至關者任脉也。又曰橫寸

任病源由症治

楊氏曰。任者。妊也。此是人生養之本。故曰。任

脉起中極之下。

內經曰。女子二七而天癸至。任脈通。大衝脉

盛。月事以時下。

七七任脈虛。大衝脉衰。天癸竭。地道不通。故形

壞而無子。又曰。上氣有音者。治其缺盆中。

按此言治謂針灸之也。與脉經言動苦

少腹繞臍下引橫骨陰中切

痛取關元穴治之。同治同

靈樞曰。缺盆之中。任脉也。名曰

天突。其側動脈人迎足陽明也。

瀕湖曰。任衝之別絡。名曰尾

翳。下鳩尾散于腹。寢則腹皮痛。虛則痒搔。

治任病方四

奪命丹

陰製吳萸一斤一分酒浸一分醋浸一分童便浸一分白湯浸並焙乾澤鴻二兩酒麵

糊丸空心鹽湯下此方兼治奔豚疝氣上衝小腹引痛

一捏金散

又延胡索川練肉全蝎茴香每末二錢酒下

此方亦治奔豚疝氣上衝及小腸氣膀胱大痛

木香順氣散

氣痛
厚朴

木香

蒼术

枳壳

砂仁
炙草

橘紅

陳皮
青皮

和氣湯

又

木香

紫蘇


枳榔

半夏
陳皮

法夏

半夏
橘紅

香



七疝源流

沈金鳌撰

七疝任脉病也。經曰：任脈爲病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。七疝者，狐衝癩厥瘕瘻瘡瘻瘍是也。凡內外邪所感，皆能使陰陽不和，陰偏勝則寒氣衝擊，陽偏勝則熱氣內壅，皆致任脈爲疝。而肝則佐任脉以生化者，故疝病原于任，必及于肝。若專主肝而不及任，背內經矣。非也。專主任而不及肝，昧乎病之源流矣。亦非也。蓋疝病在中極之中，少腹之間，總諸陰之會，而上于闢元，無不由任脉爲之。以任總諸陰之所聚也。乃其症或由于熱，或由于寒，或由于勞，或由于虛，而犯陰傷筋，則同。故其病皆在陰，其傷皆在筋，其動爲風，其聚如山，所以有疝之名也。經又曰：少陰脉滑，病肺風疝。太陰脉滑，病脾風疝。陽明脉滑，病心風疝。太陽脉滑，病腎風疝。少陽脉滑，病肝風疝。歷觀經旨，雖各經皆病，非俱從任脉起。然各經所

受之邪必與任脉相犯故心肝脾肺腎五經皆統係之曰疝言風者肝之陽氣爲風任之陰氣爲疝肝既佐任以生化故病必相及而以風與疝並稱也惟肝佐任故其病曰少陽有餘病筋痺肝風疝者此少陽之相火犯陰傷筋而動肝木之風因聚肝而爲疝也太陽與腎風寒合邪傷陰而聚于腎故腎亦有疝又厥陰位下焦總諸筋其氣塞而不升則亦病疝故經有厥陰有餘病陰渾滑則病狐風疝之語總之內外邪所感攻于臟腑則爲腹中之疝會于陰器則爲睾丸之疝正自有辨土材云疝之爲病受熱則挺縱不收受寒則腹內牽引作痛受濕則腫脹累垂虛亦腫墜血分不移氣分多動畢丸有兩左屬水生肝木木生心火三者皆司血統納左之血者肝也右屬火火生脾土土生肺金三部皆司氣統納右之氣者肺也是故諸寒收引則泣而歸肝下注于左丸諸氣憤鬱

則濕聚而歸肺下注于右丸且署丸所絡之筋非盡爲厥陰太陰陽明之筋亦入絡也故患左丸者痛多腫少患右丸者痛少腫多其論甚確可據而依也試詳七疝之症經曰從少腹上中心而痛不得前後爲衝疝蓋旣上冲心又二便不通能上而不能下也宜

香散經又曰肝所生病爲狐疝蓋上抵少腹下環陰器皆肝部分受

疝之處一切疝病非肝木受邪卽肝自病狐疝乃其自病曰狐者以出入不常也

宜二香丸

經又曰三陽爲病發寒熱其傳爲癲疝

蓋三陽者小腸膀胱胆也小腸膀胱皆在下體胆與肝爲表裏故

皆能致疝曰癲者丸腫大如升如斗頑癲不仁也

宜蠲痛元湯氏

消丸金鈴散若本腎則不痛另詳前陰條內經又曰黃脉之至也大而

虛積氣在腹中有厥氣名曰厥疝蓋肝木乘脾故大而虛肝木主

上升怒則氣上逆曰厥者脾受肝邪氣逆有積也

宜蟠葱散烏頭桂枝湯四神丸

經又曰脾傳之腎。病名痴瘕。少腹冤熱而痛。出白。蓋脾受肝邪。又傳于腎。則脾失運化。之常。入遇寒水之臟。則留而成形。曰瘕者。狀如黃爪是也。氣不得申。曰冤。宜二香丸加味通心飲丹溪云。陽明受濕熱傳入太陽。發熱惡寒。小腹悶痛。此亦痴瘕之屬。宜沈氏散瘕湯經又曰足陽明之筋。病癰癧。腹筋急。又曰肝脉微大爲疝。氣滑甚爲癰癧。又曰肝木乘胃。故既曰陽明之病。又曰肝之病也。曰癰者。以必裹膿血。甚則下膿血也。宜橘核丸。橘核湯經又曰脾脉微大爲疝。氣滑甚爲癰癧。又曰腎脉滑甚爲癰癧。蓋以內裹膿血。外小便秘。由脾邪傳腎之故也。宜味通心散加味通心飲此內經七疝。有可攷而得之者也。後張氏又立寒筋血氣狐水瘕七名。內惟狐疝一名。與內經同然。其言症則王寒濕下注囊中。宜丁香練寢丸亦或由于痰飲下注。宜二陳湯加青川芎陳丸皮香附蒼术名。雖同而寔與內經肝自爲病之旨有異。至其曰寒疝。則囊冷結硬。

如石陰莖不舉或控睾丸而痛此蓋得之坐卧濕地或寒月涉水
或值雨雪或坐卧風冷也宜青木香元富歸逆湯其日水疝則囊腫痛或腫

宜青木香元
當歸四逆湯

其四

白水痘。則囊腫痛。或腫

如水晶或濕痒出黃水或按小腹有水聲此蓋得之于飲水醉酒入內適遇風寒之氣聚于囊中也宜腰子散秘傳茱萸內消散其曰筋瘤則陰

宜腰子散秘傳

其曰筋痴則陰

漫下白物如精此蓋得之于房勞及邪術所使也。宜加減柴芩湯
龍胆草升陽

宜加減柴芩湯

其日血疝則狀如黃瓜。在小腹兩旁。橫骨兩端。約紋中。俗名便癧。

者此蓋得之盛暑入房氣血滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多或情慾太濃當洩不洩所致也。宜復元通氣散其曰氣疝則聖代針散

散其日氣疝則

上連腎俞下及陰囊偏墜而痛或不痛此蓋得之忿怒號哭氣鬱而脹號怒罷氣卽散者是也。宜氣疝飲。聚香飲子其曰瘕疝則陰囊如升斗。

宜氣病飲

其曰瘡痏。

則陰囊如升斗。

不痒不痛者是此蓋得之地氣卑濕故江淮間多有之女人陰戶

有之。女人陰

凸出亦名癧疝。小兒亦有生成如此者。乃胎中宿疾。然而癧疝不一。有玉莖腫硬引臍絞痛甚。則陰縮肢冷。囊上生瘡。名曰卵癧。出水不止者死。有素多濕熱。因怒激火昏眩。手擗面黑。睂丸能左右相遇。名曰氣癧。者而膀胱氣名曰水癧。小腸氣名曰腸癧。此四者皆癧疝也。治之之法。同宜橘核丸橘核散天台烏藥散。總之後世之人嗜慾紛而病日多。卽疝氣一症。有不止於內經名目者。故張氏增立七疝。寃足補內經之未備。茲因按其名而詳參症治。庶醫者不至臨時束手。若巢氏強分厥癥寒氣盤附。狠自附內經之七疝。則適見其支離矣。曾何益于經旨乎。且經以疝症屬肝任理。固然已。而猶有未盡者。必其人腎虛寒濕邪乘虛客之。遂成疝病。丹谿謂與腎經絕通腎氣除濕。宜人參黃芪橘核合歡子荔枝核川陳子牛膝木瓜杜仲草薢巴戟若陰虛有熱。兼宜

清熱宜生地

虛寒而痛必溫腎

宜小茴仙茅補骨脂虛熱而痛必清火

宜黃柏車

前濕盛必除濕

宜茯苓蒼朮若夫先因濕邪爲病後成濕熱者

用藥亦宜分寒熱先後二途此疝由于腎又所宜知也丹溪又云

睪丸連小腹急痛或有形或無形或有聲或無聲人皆以爲經絡得寒收引而痛不知其始于濕熱壅遏又因外感濕熱被鬱故作痛也宜

枳實桃仁山梔吳萸山楂生姜以治之濕勝成癩疝加荔枝痛甚加鹽炒大茴香痛處可按加桂枝丹溪此言更足備前人未備之旨此外又有奔豚疝氣少腹控睾而痛上冲心腹者夫奔豚本腎之積也今日奔豚疝氣乃其人素有腎積復因傷寒之邪冲突下焦致其發動如江豚之奔冲皆由真氣內虛水結不散氣與之搏故發奔豚雖有當表當攻之症然切不可汗下丹溪謂宜用理中湯加肉桂赤茯苓去白朮主之又謂桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪

若白朮助土。菟水燥腎閉氣。是以去之。言誠是也。宜奪命丹胡蘆巴元一捏金散
有受寒重。腹痛裏急者。宜當歸羊肉湯加桂枝姜糊丸以川烏治外束之寒。山梔子治內鬱之熱也。有疝氣久不愈者。宜木香子散種練子散諸疝病。其由來既各不同。而其爲症亦自有異。能依法治之。曷弗瘳歟。

脉法 內經曰。心脉搏滑急爲心疝。肺脉沉搏爲肺疝。腎脉肝脉大急沉皆爲疝。又曰。肝脉滑甚爲瀆疝。心脉微滑爲心疝。腎脉滑甚爲瘻瘍。又曰。脈急者曰疝瘕。小腹痛。又曰。三陽結爲瘻。三陰急爲疝。註云。太陽受寒。血聚爲瘕。太陰受寒。氣聚爲疝。脉訣曰。疝脉弦急。積聚在裏。牢急者生。弱急者死。沉遲浮澁。疝瘕寒痛。痛甚則伏。或細或動。正傳曰。寸口脉弦而緊。弦緊相搏。則爲寒疝。入門曰。內經皆以滑脉爲疝。脉經曰。疝瘕積

聚脉弦急者生虛弦小者死。

疝病原由症治。靈樞曰：疝者，寒氣結聚之所爲也。內經曰：病在小腹，腹痛不得大小便，名曰疝。得之寒也。又曰：小腹控睾引腰脊，上冲心，甚出清水，及爲暎噫邪，在小腸也。丹溪曰：疝者，睾丸連小腹急痛也。有痛在睾丸者，有在五樞穴邊者，皆足厥陰之經也。自素問以下，皆謂之寒。子思之此病，始于濕熱在經，鬱而至久，又感寒氣外束，故痛。若只作寒論，恐爲未愜。人有踢冰涉水，終身不病者，無熱故也。蓋大怒則火起于肝，醉飽則火起于胃，房勞則火起于腎。火積久，母能生子，虛濕氣便盛。厥陰肝木，其性急速，火性又暴，爲寒所束，宜其痛之太暴也。有以烏頭梔子湯服之，其效亦敏。然濕熱又須分多少，而治濕甚腫多，癧病是也。又曰：疝痛屬濕熱痰積，注下作病，因寒鬱而發也。

又曰。疝痛之症。或因風寒外襲。或因怒氣上冲。小腹作痛。上連
脇肋。甚則搘揭反張。咬牙戰掉。冷汗交流。須臾不救。綱目曰。
疝名雖七。寒疝卽疝之總名也。水疝卽癆疝之屬。氣疝卽狐疝
之屬。血疝卽癰癧之屬。惟筋疝罕見之。亦下惡瘡之屬也。又曰。
小腹痛有三。肝病。小腹引脇痛。小腸病。小腹引睾丸。腰脊痛。膀
胱病。小腹痛腫。不得小便。直指曰。疝之爲病。外腎。小腹作痛。
或攻刺腰脇。或走遊背膂。或冷氣搶心。或手足厥冷。有壯熱惡
寒者。有酒漸寒熱者。有不得大小便者。有下泄者。有自汗者。有
積聚如盆。如脣如盤如桃李。其于陰間。則卵有大小。而上下不
常。囊有腫脹。而痛止無定。挾冷觸怒。則塊物上衝心胸。心平氣
和。則塊物歸入囊中。又曰。治法大要。以流行疏利爲先。毋曰腎
虛得病。不敢疎淺。蓋腎爲邪氣所干。若不逐去病根。病何由愈。

倘或姑息補住使大小便秘而不通邪氣入腹冲心危殆必矣。又曰甚或挾虛而發脈不甚沉緊而豁大無力者是也。其痛亦輕性覺重墜牽引耳當以參术爲君疎導藥佐之疎導卽桃仁山楂枳實梔子茱萸川棟玄胡索丁香木香之類是也。又曰諸疝以手按之大痛者爲寃不痛者爲虛。又曰惟是逆氣長噓中脘停酸躁悶煩擾甚至嘔吐最爲惡候蓋脾土不濟腎水上乘必爲酸汁或爲痰涎遂成暴吐大小二便關格閉塞而腎汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救。方廣曰疝症古方用辛溫以散之是治其標也丹溪以爲痰飲食積死血流注歸于肝經用辛平以豁痰消積去瘀是治其本也夫疝痛有定處是有形之積也非痰食血相聚而何若無形之氣則走注滿腹流散遍體矣。本事曰此疾雖因虛而得不可以虛驟補經云邪之

所湊其氣必虛留而不去其病卽寢故必先滌去所畜之邪然後補之諸藥多借巴豆氣者蓋謂此也。入門曰四氣七情疝通用五苓散蓋猪苓澤瀉分陰陽以和心小腸白朮利腰臍間濕與死血茯苓利膀胱木得桂則枯用以伐肝木又曰通治宜胡蘆巴元又曰疝病虛甚上爲嘔吐下有遺精者危正傳曰刲疝痛藥烏頭梔子並炒研細順流水入姜汁調服梔子以降濕熱烏頭以破寒鬱皆下焦之藥而烏頭爲梔子所引其性急速不容胃中停留也又方桂枝山梔炒川烏姜炒姜汁糊丸姜湯下三四十丸大能刲痛三因曰凡疝病非痛斷房事與厚味不可用藥

疝痛導引法類聚曰坐舒兩脚以兩手捉大拇指使足上頭下極挽五息止引腹中氣遍行身體去疝瘕病

又導引保生秘要曰用手緊閉幽關，納氣數口而緊緊頂閉，納之立效。

運功保生秘要曰因慾火積滯外腎復感冷氣故作脹痛不可勝言。注意從外腎提氣至內腎右運二七遍卽從內腎想一火提到頂門外畧凝而後行吹吸之法。

治七疝方三十七

木香散	衝疝	木香	陳皮	乾姜	良姜	調子
蜘蛛散	狐疝	川芎	草蔻仁	黑牽牛		
二香丸	又 用末一錢	木香	香附各三兩	杏肉二兩	南星各一兩	三稜
	連與吳萸同炒	蓬术	醋炒	肉桂五分	橘核	黃山
	梔各五錢	姜汁糊丸	姜黃		桃仁	
獨痛丸	癩疝	元胡索一兩	川棟肉	茴香谷五錢		
	白丑頭末	當歸	良姜	青皮	木香	烏
	藥各二錢半	全蝎七个	姜汁糊丸燒棉灰			
調酒送下三十五丸						

此方兼治小腸氣膀胱氣一切疝痛

楊氏麝香元

又

木香

麝香一錢

水下五七丸

此方能尋

諸處

凡膀胱氣

脇下痛

最難治此

藥主之

全蝎

巴霜各四

巴霜各四

巴霜各四

茱萸內消丸

又

山萸

吳萸

川棟子

馬蘭花

大茴

川棟子

山藥

肉桂各二兩

木

金鈴散

又

青皮

陳皮

山藥

肉桂各二兩

木

蟠葱散

又

川棟肉

三十枚

切片

巴豆內

三十枚

切片

巴豆

茴香炒等分

再入木香一

錢半

每末二錢

水酒各半

煎葱白湯

冲服

此方

兼治

膀胱

小腸

氣腫

痛

各五分

延胡索

肉桂

乾姜各三分

共

爲粗末

加葱白一莖

煎

此方專治脾

胃虛冷

心腹攻刺

連胸脇

膀胱小

腹腎氣作痛

大川烏

一個

蜜同煎

減半

取出炒

內桂

各三錢

三分

甘草二錢半

分

烏頭桂枝湯

又

大川烏

一個

蜜同煎

減半

取出炒

甘草二錢半

分

作二帖入姜三片棗一枚及前蜜煎

去烏頭

此方治風寒癥氣入腹刺痛陰縮手足逆冷

四神丸

又 吳萸醋酒各半分浸培 華澄茄 青木
香各五錢 香附一兩 糊九監湯下

加味通心飲

病癰 瞿麥 木通 桔子黃芩 連翹
枳壳 甘草 川棟子各一錢 煙心二十長

沈氏散癰湯

通此方兼治小腸疝氣熱痛 小便不通
車前草五葉 桃仁 枳壳 山梔 山査 澤瀉 木
膀胱氣痛不得小便者無不效

荔枝橘核湯

癰瘍 荔枝 橘核 桃仁 甘草 茯苓
白朮 枳壳 山査 延胡索

橘核丸

又 蓮水洗海帶 醬酒炒延胡索 起炒桃仁
炒海藻 鹽酒炒昆布 厚朴 枳殼 炒川棟子各一錢
木通各五錢 酒糊丸 酒或鹽湯下六七十
丸 久不消加醋炒硼砂二錢

此方主治四種癰瘍卵核腫脹偏有大小或硬
如石或少腹絞痛甚則囊腫潰爛出黃水

任七癰方

卷十一

七

橘核散

錢叉 橘核一錢半 桃仁十五粒 山梔子三
川烏 吳萸各五分 略炒爲粗末煎

橘核单止痛 烏頭散寒
鬱山梔除濕熱 又引血
頭速下不令胃中停留用之甚捷

此方亦治四極癆症腫痛
此方治四種癆症之新者
一方各別

加味通心散

櫟木通
櫟木通
山梔
山梔
山梔
甘草
甘草

燈心草前車

丁香棟寃丸

狐瘡 當歸一錢
附子 川棟肉一錢
芍藥 茴香各一錢
桔梗 每藥末一兩

丁香
木香各二錢
桂枝一錢
全蝎三十個
僵蚕十五個
延胡索一錢
大黃三錢

右並原未與前未并今酒樹尤空心
几男子七痴女子帶下皆属于風氣

**蝎治風聖藥川棗齒齦香薷入小腸經當歸延胡
和血止痛疝氣帶下皆積寒邪在小腸之間故**

以附子佐之。丁香木香爲引導也。

四庫全書

四十九枚炒黃一用麸皮一合巴穀一
麸皮一合巴豆四十丸炒一用鹽一兩炒
一兩

香一合炒並以麸皮黃色爲度只取川棟肉重加木香破故紙各一兩酒糊丸每五十丸
監湯下日三服

加木香
下日三服
鹽湯
破故紙各一兩
酒糊丸每五十丸

此方兼治一切癰氣腫癰縮小久服勝狀

二陳湯

芍藥
陳皮
半夏
甘草

青木香元

寒症
枳榔各二兩
黑丑頭末三兩
補骨脂
草澄茄

當歸四逆湯

當歸一錢
白芍一錢
柴胡各九分
附子一錢
肉桂
茴香各七分
延胡索
川棟澤瀉五分

腰子散

水疝
黑丑
白丑並炒等分取頭末
吳萸半酒半醋浸一夜焙
炒茴香
海藻
丸鹽湯或酒下
以辛牛末遍捲之濕紙包扎好煨令香熟空心

秘傳內消散

花醋浸焙
川棟肉
內桂
黑丑頭末
去白青皮
桃仁
木香各五錢
酒糊

加減芩湯

筋瘤
白木
山楂
荔枝核各七分
此方耑治陰癩偏大或生瘡出黃水

此方兼治諸癰因濕熱腫痛出水

龍胆瀉肝湯

又 龍胆草 柴胡 澤鴻各一錢 車前子

木通 赤芩 酒洗生地

酒拌當歸 山梔

黃芩 甘草各五分

復元通氣散

血癥 白丑頭末二兩 茴香 穿山甲各兩

半去白陳皮 延胡索 炙甘草各一兩

木香五錢 每末二錢酒或姜湯下

神聖代針散

又 乳香 没藥 當歸 白芷 川芎 製

元青各一錢 共爲末每服一分甚者五分先點好茶一盞次移藥末在茶上不得吹攪立地

細細呷之 此方兼治諸症刺痛

氣疝飲

氣疝 黃連以吳萸煎水浸炒二錢 人參
白朮各一錢 白芍 陳皮各七分 甘草三分

聚香飲子

又 乳香 沉香 檀香 木香 蕺香 丁

香各八分 姜黃

烏藥 桔梗 肉桂 甘

天台烏藥散

此方治七情所傷結成痼氣 川棟子十個將巴豆十四粒同炒黑

色去皮各五錢 炙梧桐三錢 每末一錢酒下痛甚

炒姜熟酒下

理中湯

奔豚

奪命丹

又 吳萸一斤作四分

一酒浸

一醋浸

一澤鴻二兩

酒糊丸鹽湯空心下

一名四製茱萸丸

胡蘆巴元

又 肉

白丑頭末 吳萸各兩半

茴香各二兩

川烏

巴戟

一兩

酒糊丸空心酒下二三十丸

胡蘆巴各一兩

巴戟

一兩

一捏金散

又 延胡索

川棟肉

全蝎

茴香

每末

當歸羊肉湯

寒痛

羊內一斤

生姜五兩

當歸二兩

水八升煮三升分服七合日三服

烏頭梔子湯

因虛

川烏頭末

山梔子

木香棟子散

久病

石菖蒲

青木香

荔枝核

草薢

川棟子

每末二錢入麝少許茴香炒鹽用執

酒冲調下

督脈病源流

沈金鳌撰

督脈起于會陰循背而行于身之後爲陽脈之總督故曰陽脈之海其別與厥陰原氣同會于顛此主身後之陽

人身陰陽原氣皆起于下經曰廣明之後卽爲太衝太衝之地屬之少陰少陰之前乃爲厥陰其部有血海嘗與太衝騰精氣而上灌滲陰陽可知元氣固起於下精氣亦起于下矣嘗按精氣之下而上也寔分三道其陽者起胞中從少陰之後行太陽夾脊之中道上嶺歷百會都庭以統宗諸陽其名曰督其陰者起中極之下胞中由前陰地道而上行陽明之表中循關元歷承漿上與督脈會以統宗諸陰其名曰任其中央一道起胞中循血海騰精氣而上上行伏臍積于胸中爲宗氣以司呼吸會于咽喉其名曰衝是三脈者同起于胞中一源而三歧故古人統三者而總名之曰太衝且三者之氣與陽明胃氣同住中州亦與營俱行于十二經

故三者之氣能貫于一身也。而督之所以爲督。從可識矣。楊氏曰。督之言郵。也是人陽脉之都綱。呂氏亦曰。陽脉之海。下極者長強也。長強乃督脈之別名。下極者尾骶骨也。以其循脊上項。散頭。故蹇則脊強而厥虛。則頭重。夫脊强者五症之總名。其症卒口噤。背反強而瘛瘲也。而督之所以爲病。又從可識矣。

督脈經行諸穴。內經曰：督乃陽脈之海，其脉起于腎下胞中，至於少腹，乃下行于腰橫骨圍之中央，繫溺孔之端。男子循莖下至篡，女子絡陰器合篡間，俱繞篡後屏翳穴。前陰後陰之間也別繞臂至少陰與太陽中絡者合少陰上股內廉由會陽。在陰尾尻骨兩旁凡

二十一、陽關十六椎下。二十二、貫脊十七椎下會于長強穴，在骶骨端，與少陰會並脊裏上行，歷腰俞。

二十三、命門十四椎下。二十四、懸樞十三椎下。二十五、脊中十二椎下。二十六、中樞十一椎下。二十七、筋道十椎下。

二十八、身柱三椎下。二十九、陶道大椎下。三十、大椎。

下至陽七椎下。靈臺六椎下。衝道五椎下。

下至下頸椎九椎下。督脈經行諸穴。

椎一椎

與手足三陽會合上齒門。

項後入髮際五分

會足太陽陽維入腦中循腦戶。枕骨

上至風府。

大筋內宛宛中項後入髮際一寸百會後一寸

會足太陽陽維入腦中循腦戶。枕骨

上強間。

百會後三寸

後項。

百會後一寸半

上顴歷百會。在頭中央旋毛中

前項。

百會前一寸半

會手足

半顱會。

百會前三寸即顱門

上星。

百會前一寸

至神庭。

頭會前二寸直鼻上人髮際五分

爲足

太陽督脈之會循額中至鼻柱經素膠。

鼻導頭也人中水溝也

陽明至兌端。

唇上端

入斷交。

齒中

與任脉足陽明交會而終。凡三

十一穴督脈別絡自長強走任脈者由小腹直上貫脐中央上

貫心入喉上頤環唇上繫兩目之下中央會太陽于目內眞睛

明穴。

見陰蹻下

與足厥陰全會于頤人絡于腦又別自腦下項

循肩胛與手足太陽少陽會于大杼第一椎下兩旁去脊中一

寸五分陷中內挾脊腰中入循督絡督。

脈法

脈經曰尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰脊強痛不得

俛仰大人癲病。小兒風癇。又曰脉來中央浮直上下動者。督脈也。勤苦腰背膝寒。

督病原由症治 睿樞曰頭中央之脉。督脈也。名曰風府。內

經曰風氣循風府而上。則爲癲癇。風入腦戶。則爲風目眼寒。註

云。腦戶乃督脈足太陽之會故也。又曰。督脈生疾。從小腹上冲

心而痛。不得前後。爲衝病。女子不孕。癃閉遺溺嗌乾。治在骨上。

謂橫骨上毛際中曲骨穴也

甚者在臍下營。陰交穴 註云。此乃任衝二脉

之病。不知何以屬之督脈。李厥明云。督脈雖行于背。而別絡自

長。強走任脈者。則由小腹直上貫臍。中貫心。入喉。上頤。環唇而

入于目之內。皆故顯此諸症。王註蓋未深攷爾。又曰。督脈寔則

脊強反折。虛則頭重。難經曰。督脈爲病。脊強而厥。海藏云。此

病宜用羌活獨活防風荆芥細辛藁本黃連大黃烏頭附子蒼

耳子之類。張潔古曰：督者，都也。爲陽脈之都綱，任者，姪也。爲陰脈之妊養。王海藏曰：陰蹻陽蹻同起跟中，乃氣并而相連，任脈督脈同起中極之下，乃水溝而相接。滑伯仁曰：任督二脈一原而二歧，一行于身之前，一行于身之後。人身之有任督，猶天地之有子午，可以分，可以合。分之見陰陽之不離，合之見渾淪之無間，一而二，二而一者也。李瀕湖曰：任督二脈，人身之子午也。乃丹家陽火陰符升降之道，坎水離火交媾之鄉。魏伯陽叅同契云：上閉則稱有，下閉則稱無，無者以奉上，上有神德居此。兩孔穴法金氣亦相須。崔希範天元大藥鏡云：上鵲橋，下鵲橋，天應星地應潮，歸根竅復命關貫尾閭通泥丸。大道三章直指云：修丹之士，身中一竅，名曰玄牝，正在乾之下，坤之上。震之西，兌之東，坎離交媾之地，在人身天地之正中。八脉九竅。

十二經十五絡聯繫虛間一穴空懸。參珠醫書謂之任督二脉。此元氣之所出。真息之所由。起修丹之士。不明此竅。則真息不生。神化無基也。俞琰註。泰同契云。人身血氣。往來循環。日暮不停。繫有任督二脉。人能通此二脉。則百脉皆通。黃庭經言。皆在心內運天經。晝夜存之。自長生。天經乃吾身之黃道。呼吸往來于此也。鹿尾問。能通督脈。龜納鼻息。能通任脈。故二物皆長春。此數說。皆丹家河車妙旨也。

治督脈病諸藥要品及方四

總治羌活 荆芥 秦艽 細辛 黃連 附子

蘇合丸

強厥
草撥
丁香
安息香
薰陸香
蘇合香油

白术
冰片
木香
檀香
沉香
砂仁

香附
橘香
沉香
射香

詞子
射香

藿香正氣散

又大腹皮
白术
陳皮
藿香

桔梗
甘草

紫蘇

厚朴

川芎茶調散

頭重
甘草

薄荷
防風

川芎
細辛

荆芥
每末二錢

羌活
食後茶清下

白芷
蜜丸彈子

荳蔻
荆芥湯下

白芷丸

又
白芷

二兩蘿蔔汁浸晒乾爲末

細嚼茶清或荆芥湯下

蜜丸彈子

荳蔻
荆芥湯下

ଶ୍ରୀମତୀ

ପାତ୍ରି

帶脈病源流

沈金齋撰

帶脈橫圍于腰。狀如束帶。所以總約十二經脈。及奇經中七脈者也。

按內經。衝任二脈。與陽明合于宗筋。會于氣街。皆屬於帶脈而絡于督脈。則太衝。所以能上養心肺者。須賴帶脈之持之。一身二十七氣之上下流行。亦賴帶脈爲之關鎖。且其氣整齊堅固。有以牢持于上下之間。而一身之強力。亦賴帶脈以出。蓋力出于督。督在季脇之下。卽帶脈所在也。故經云。身半以上天氣主之。身半以下地氣主之中。爲天樞。天樞在氣交之分。正指帶脈而言也。故人苟上而心脾抑鬱。氣不運行。下而肝腎虛敗。真陰不榮。必致停濕爲熱。下注于小腸血海之間。其病自作矣。何言之中分不運。必病腹滿。陰陽兩虛。中分弱而不能鎮定。必病腰溶溶如坐水中心。脾上鬱。肝腎下虛。邪熱留連而爲滯淫。必病赤白。帶陽不能勝。不能固

守于天樞。陰氣得以襲之。必病左右遶臍腰脊痛。冲中心腹。邪客于太陰之絡。必病腰痛引小腹。控脅。季脇下空軀處不可以養息。此皆帶脉所生病也。是知一身上下機關全在于帶。帶不能自持其氣。其症皆陷下而不上矣。可不知帶之爲病。求其源而升降補瀉哉。

帶脈經行諸穴。內經曰。帶脈者。起于季脇厥陰之章門穴。在季脇骨端肋尖盡處爲足厥陰足少陽二經之會。同足少陽循帶脈穴。在季脇下一寸八分陷中屬足少陽經。圍身一週如束帶然。又與足少陽會于五樞。帶脉下維道章門。下五寸。凡四穴。

三分
脈法 脉經曰。脈來關部左右彈者。帶脈也。

帶病原由症治 靈樞曰。足少陽之正至脰中。別走太陽而合上至腎。當十四椎出屬帶脈。註云。帶脈總束諸脈。使不妄行。如人束帶而前垂。故名婦人惡露。隨帶脈而下。故謂之帶下。 張

潔古曰帶脈之病。太陽主之。可灸章門穴三壯。仲景曰大病

瘥後。腰以下有水氣。牡蠣擇瀉散主之。若不已。灸章門穴。海

藏曰。小兒癩疝。可灸章門三壯而愈。以其與帶脉行于脈陰之分。而太陽主之也。子和曰。十二經與奇經七脉。皆上下周流。

惟帶脉起少腹之側。季脇之下。環身一週。絡腰而過。如束帶狀。

而衝任二脉。循腹脇夾膚旁。傳流于氣衝。屬於帶脉。絡于督脉。衝任督三脉同起而異行。一源而三歧。皆絡帶脉。因諸經上下。

往來。遺熱于帶脉之間。客熱鬱抑。白物隨瀉而下。綿綿不絕。是

爲白帶。皆從濕熱治之。與痢同法。赤白痢。乃邪熱傳于大腸。赤

白帶。乃邪熱傳于小腸也。劉宗厚曰。帶下多本于陰虛陽竭。

營氣不升。經脈凝滯。衛氣下陷。精氣積滯于下焦。奇經之分。醞

釀而成。以帶脈爲病得名。亦以病形而名。白者屬氣。赤者屬血。

多因醉飽入房服食躁熱所致亦有濕痰流注下焦者。腎肝陰淫濕勝者或驚恐而木乘土位濁液下流或思慕無窮發爲白淫所謂二陽之病發心脾也或餘經濕熱鬱滯于少腹之下或下元虛冷子宮濕淫治之之法或下或吐或發中兼補補中兼利燥兼升發潤兼溫養或收濕或溫補諸例不同亦病機之活法也。巢元方曰腎着病腰痛冷如水身重腰如帶五千錢小便利因勞汗出衣裏冷濕而得久則變爲水也千金方用腎着湯三因方用滲濕湯東垣用獨活湯主之。

附載仲景大法諸藥要品及方九

血崩久而成枯四物湯 崩者澀劑收白芍黃芩 白朮 艾葉
血閉久而成竭四物湯 閉者破劑通三棱紅花 牛膝 桃仁
甲灸 肉桂 鮫鯉

初治

四物湯加紅藍花調內桂黃芪

破血三法次治

四物湯加紅藍花調鱉甲桃仁內桂童便
酒煮尤佳

三治

四物湯加紅藍花調沒藥散

四物湯春加川芎風勝也夏加白芍火勝也秋加
當歸金勝也冬旺水勝又加熟地以益之若血旺
必無服四物之理以其血衰而煩以此補之故加
熟地也既可服四物知其血衰之甚也故用加之
耳

丁香脾積丸

腹滿

醋煮高良姜

三稜

蓬木

青皮

丁香

木香

茴香各一兩

少許

糊丸

巴霜

皂莢

燒存性

大白湯

下二三十丸

每用猪腰

壯本丹

腰冷

酒杜仲

鹽補骨脂

茴香

巴戟

青鹽各五錢

每用猪腰

子二个批開入藥末五錢扎好紙包煨熟以黃

酒二頓送下

秘傳帶下方

帶下 青箱子子 鬼繩子各二錢 橘子肉炒

令烟盡四錢 共爲細末 分作十服 消晨將壯

生鳴蛋一個 捏一小孔入藥在內 攪和黃白中
將瓶封孔 飯上蒸熟以黃酒食之 輕者八九服
重者一二十服無不效 如赤帶每料加熱石
膏一錢 愈後再服丸藥以補之

加味龍虎散

陰囊 蒼朮一兩 全蠅三錢 草烏附子
各二錢 天麻三錢 每末一錢空心豆酒調
下

速效散 牡蠣澤瀉散

水氣 此方兼治風寒腰痛筋骨攀掣
腰重 邪客 川棟肉巴豆五粒全炒去豆
炙草五分 香蜜炒補骨脂 各一兩 每末一錢熱酒下

腎着湯

白朮二錢半 炮姜 赤芩各錢半

滲濕湯

陳皮 茯苓 僧夢 白朮 澤瀉 蒼朮

獨活湯

黃風 漢葛 蔊活 防己 葛根

又當歸 洋蕷 各錢半 防己 黃柏
甘草 洋蕷 各一錢 防己 大酒水各

半煎

此方兼治閃挫勞役腰痛如折

陽維陰維脉病源流

沈金鳌撰

陽維脉起于諸陽之會。由外踝而上行於衛分。陰維脉起于諸陰之交。由內踝而上行於營分。所以爲一身綱維也。人身陽脈既統於督。陰脈既統於任矣。而諸陽諸陰之散見而會者。又必有以維繫而主持之。故有陽維以維諸陽。陰維以維諸陰。要其所以能維者。必從陰陽根柢之處。以發其氣氣之極盛。而後能維之。蓋陽維則從少陰斜至太陽。發足太陽之金門。而與手足少陽陽明會于陽白。是其所從起者少陰。而所會者皆陽也。所會皆陽。則所維自皆陽矣。陰維從少陽斜至厥陰。發足少陰之築賓。至項前而終。是其所從起者少陽。而所發所至者皆陰也。所發所至皆陰。則所維自皆陰矣。然陽維既爲諸陽之維。而反起于少陰。陰維既爲諸陰之維。而反起于少陽者何也。少陰爲諸陰根柢之氣。維于陽者必起于此。是陰爲陽根也。少陽爲諸陽根柢之氣。維于陽者必起于此。是陰爲陽根也。

於陰者必起于此。是陽爲陰根也。所謂互爲其根者是也。故二脉又爲營氣之綱領。仲景云。病常自汗。榮衛不相和諧。宜桂枝湯。反煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯愈。此二穴乃陽維之會也。以病寒熱自汗。本桂枝湯症。服之而不愈者。乃陽維脈病也。故必先針陽維諸會之穴。以制受病之處。然後再服桂枝湯。自無不愈也。其曰榮衛不和者。是衛氣不與榮血和也。潔古云。陰維爲病。若心痛者。其治必在足少陽三陰交此。其處乃陰維所起也。按仲景法太陰症則用理中湯。少陰症則用四逆湯。厥陰症則用當歸四逆陽吳茱萸湯。參其法酌其劑。以治陰維之病。乃潔古所以治足少陽三陰交之意也。如是而二維之病何憂弗愈哉。

陽維經行諸穴

內經曰。陽維起于諸陽之會。其脈發于足太

陽金門穴

在足外踝下一寸五分

上外踝七分。會足少陽于陽交。爲陽維

之郄

在外踝上七寸斜屬二陽之間

循膝外廉上髀厭抵少腹側會足少陽于

居髎

在章門下八寸監骨上陷中

循脇肋斜上肘上會手陽明手足太陽于

臂臑

在肘上七寸兩筋罅中肩髃下一寸

過肩前與手少陽會于膕會天髎

臑在肩前去肩端三寸宛宛中天髎

在缺盆中間上據骨際陷中央却會手足少陽足陽明于肩

井

在肩後大骨下上循耳後會手足少陽于風池在耳後髮上

腦空

承靈後一寸半夾玉枕骨下陷中

承靈正營後正營目窓後

臨泣

在瞳人直上髮際五分陷中

下額與手足少陽陽明五脈會于陽中眉

人相對

一寸直瞳人直上髮際中

循頭入耳上至本神而止

本神在直耳上直髮際中

凡經共三十

二穴

陰維經行諸穴

內經曰陰維起于諸陰之交其脉發于足少

陰築賓穴

在足內踝上五寸膕內分肉

爲陰維之郄上循股內廉上行入小

腹會足太陰厥陰少陰陽明于府舍

在腹哀下三寸去腹中行四寸半

上會足

太陰于太橫腹哀

大橫在腹哀下一寸五分腹哀在日月下一寸五分並去腹中行四寸半循脇肋

會足厥陰于期門

直乳下一寸半上胸膈挾咽與任脈會于天突廉泉

天突在結喉下四寸半宛宛中廉泉在結喉下二寸中央是穴

凡一十四穴。

脈法 脉經曰寸口脉從少陰斜至太陽是陽維脉也動若肌

肉痺癢皮膚痛下部不仁汗出而寒

又若顛仆羊鳴手足相引

甚者失音不能言又曰寸口脉從少陽斜至厥陰是陰維脉也

動若癲癇僵仆羊鳴又若僵仆失音肌肉痺痒應時自發汗出

惡風身洗洗然也。

二維病原由症治 難經曰陽維陰維者維絡于身灌溉諸經

者也陰陽不能自相維則快然失志溶溶

緩慢貌

不能自收持又

曰陽維爲病苦寒熱陰維爲病苦心痛

張潔古曰衛爲陽主

表陽維受邪爲病在表故苦寒熱營爲陰主裏陰維受邪爲病

表陽維受邪爲病在表故苦寒熱營爲陰主裏陰維受邪爲病

在裏故苦心痛。陰陽相維則營衛和諧矣。營衛不諧則快然失志不能自收持矣。何以知之。仲景云。病常自汗。是衛氣不與營氣和也。宜桂枝湯和之。又云。服桂枝湯反煩不解。先刺風池風府。却與桂枝湯。此二穴乃陽維之會也。謂桂枝後尚自發熱惡寒。其脉寸浮尺弱而反煩。爲病在陽維。故先針此二穴。又曰。陰維爲病。主心痛。治在三陰之交。太陰症則理中湯。少陰症則四逆湯。厥陰症則當歸四逆湯。吳茱萸湯主之。李瀕湖曰。陽維之脈。與手足三陽相維。而足太陽少陽。則始終相聯附者。寒熱之症。惟二經有之。故陽維爲病。亦苦寒熱。蓋衛氣晝行于陽。夜行于陰。陰虛則內熱。陽虛則外寒。邪氣在經。內與陰爭而惡寒。外與陽爭而發熱。則寒熱之在表而兼太陽症者。有汗當用桂枝。無汗當用麻黃。寒熱之在半表半裏而兼少陽症者。當用小

柴胡湯加減治之。若夫營衛懈卑而病寒熱者。黃芪建中及八物湯主之。潔古獨以桂枝一症屬之陽維似未擴充。至于陰維爲病。王心痛。潔古獨以三陰溫理之藥治之。則寒中三陰者宜矣。而三陰熱厥作痛。似未備矣。蓋陰維之脈雖交三陰。而行寔與任脉同歸。故心痛多屬少陰。厥陰。任脉三氣衝上。而然暴痛無熱。久痛無寒。按之少止者爲虛。不可接近者爲寔。凡寒痛兼少陰及任脉者。四逆湯兼厥陰者。當歸四逆湯。兼太陰者。理中湯主之。凡熱痛兼少陰及任脉者。金鈴散。延胡索散。兼厥陰者失笑散。兼太陽者。承氣湯主之。若營血內傷。兼夫任衝手厥陰者。則宜四物湯。養榮湯。妙香散之類。因病藥之如此。則陰陽虛寔。庶乎其不差矣。潔古據仲景法。以桂枝方治陽維。理中三方治陰維。舉其要也。故余前論亦據之。瀕湖于陽雜增黃芪建中三方。于陰雜增金鈴散七方。脩其用也。余故附錄之。又曰。叔和以癲癇屬陽。

維陰維。靈樞以癲癇屬陽蹻陰蹻。二說文異旨同。蓋陽維行衛分諸陽之會。陰維行營分諸陰之交。陽蹻行一身左右而主陽。陰蹻行一身左右而主陰。邪在陰維陰蹻則發癲癇。邪在陽維陽蹻則發癰癰動而屬陽。陽脈主之癲靜而屬陰。陰脈主之大抵二疾當取之四脉之穴。分其陰陽而已。王叔和曰。診得陽維脈浮者暫起目眩。陽盛寔若肩息洒洒如寒。診得陰維脈沉大而寔者。若胸中痛。脇下支滿。心痛。其脈如貫珠者。男子兩脇下寔。腰中痛。女子陰中痛。如有瘡狀。

治二維病方十五

桂枝湯

陽維

桂枝

白芍

甘草

姜

棗

黃芪建中湯

又

維病源流

二維方

卷十一

三

八物湯

又歸人參茯苓

白朮甘草川芎當

理中湯

陰雜

人參

白朮地黃

四逆湯

又附子

乾姜

甘草

當歸四逆湯

又草

大東

當歸

桂枝

白朮

細辛

甘草

通

金鈴散

又下痛

止與枳木

丸去其餘邪

金鈴子

延胡索各一兩

每末二錢酒

延胡索散

又一錢

延胡索

當歸

木香

乳香

沒藥各七分

赤芍

官桂各

炙草五分

姜三斤

此方兼治婦人血結胸腹作痛連腰脅脊督

上下攻刺甚作搘搗

失笑散

又

大黃

芒硝

枳實

厚朴

承氣湯

又

當歸

白芍

生地

熟地

赤芍

人參

甘草

洛

養榮湯

又

當歸

白芍

陳皮各

一錢

人參

甘草

洛

五

山

分棗一枚 烏梅一個

四物湯

川芎
牛

當歸
一方春倍川芎 夏倍芍藥 秋倍熟地冬倍

生

白芍
當歸春倍川芎 夏倍芍藥 秋倍熟地冬倍


生

熟地各一錢二分

當歸春加防風夏加黃芩秋加天冬冬加桂枝
按此方通治血病當歸和血歸經白芍涼血補
腎生地生血甯心熟地補血滋腎川芎行血通
肝

妙香散

又



陽蹻陰蹻脉病源流

沈金鰲撰

陽蹻脉起于跟中循外踝上行于身之左右主一身左右之陽。陰蹻脉起于跟中循內踝上行于身之左右主一身左右之陰。所以使機關之蹻提也。

蹻以矯舉爲義。其脉之剽悍同于衛氣而皆上出目內眞然皆有孔道與衛不同。按其脉則陰出陽而交於足太陽。陽入陰而交於足少陰。其氣其行每從根柢陰陽和合以爲蹻舉而上榮大會于目故目之開闔皆宜。若目氣不榮則目不合矣。經曰：陰脉榮其臟。陽脈榮其腑者言乎。入陰則榮臟。入陽則榮腑也。又曰：蹻脉有陰陽。何者當其數男子數其陽女子數其陰者。男子陽用事其蹻在陽。故數其陽。女子陰用事其蹻在陰故數其陰也。至其爲病。陽蹻則陰緩而陽急。陽急則狂走目不昧。潔古云裏和表病爲陰不病而陽病。陽病則寒。其治風池風府。若在陽表當汗桂枝湯。麻黃湯。

若在陰裏當下承氣湯。陰蹻病。陽緩而陰急。陰急則陰厥。足脛直。
五絡不通。潔古云表和裏病爲陽不病而陰病。陰病則熱。甘草乾
姜湯。二蹻之病異治。二蹻之法亦異也。要而論之。奇經八脈。惟帶
脈橫束於脅。不與七脉同。而七脉則皆起于太陽少陰。雖或統宗
衆會。孔道之各有殊。其寔皆自下而上源。不甚遠。古人止言太衝。
不分督任蹻維。蓋有分之而不盡。可分者固卽謂太衝之義也。此
又不可不知也夫。

陽蹻經行諸穴。內經曰陽蹻者。足太陽之別脈。其脈起于跟
中。出于外踝下。足太陽申脈穴。在外踝下五分陷中。容爪甲白肉際。當踝後遠跟
以僕參爲本。在踝骨下陷中。洪足得之上。外踝上三寸。以附陽爲郄。在外踝
足太陽六也。直上循股外廉。循脇後胛上。會手太陽陽維于膕俞。在
大骨下。脾上廉陷中。上行肩髃外廉。會手陽明于巨骨。在肩尖端上。行
兩父骨間。上行

中會手陽明少陽于肩髃。

在腋骨頭肩端上兩骨罅

上人迎夾

口吻會手足陽明任脈于地倉。

夾口吻旁四分外如直瞳子平水溝復會任脈于承泣。

在目下七分迎下有微脈動處

同足陽明

上而行巨第。

夾鼻孔旁八分直瞳子平水溝復會任脈于承泣。

在目下七分直瞳子陷中至

目內眞與手足太陽足陽明陰蹻會于睛明穴。

見陰蹻下從睛明上

睛下從睛明上

行入髮際下耳後入風池而終。

風池在耳後夾枕骨下髮際陷中

凡共經二十

二穴。

陰蹻經行諸穴

內經曰陰蹻者足少陰之別脈其脈起于跟

中足少陽然谷穴之後

然谷在內踝前下一寸陷中

同足少陰循內踝下照

海。

在內踝上內踝之上二寸

以交信爲鄰

交信在內踝骨上少陰前太陰後廉筋骨間

直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上行入目內眞與手足

太陽足陽明陽蹻會于睛明而上行

睛明在目內眞外一分宛宛中

凡經行八

穴。張紫陽八脉經云八脈者衝脈在風府穴下督脈在膀胱

任脉在臍前。帶脉在腰。陰蹻脈在尾間前陰襄下。陽蹻脈在尾間後二節。陰維脈在項前一寸三分。陽維脈在項後一寸三分。凡人有此八脈俱屬陰神閉而不開。惟神仙以陽氣冲開故能得道。八脈者先天大道之根。一氣之祖。采之惟在陰蹻爲先。此脈綰動諸脈皆通。次督任衝三脉總爲經脉造化之原。而陰蹻一脉散在丹經。其名頗多。曰天根。曰死戶。曰復命關。曰鄆都。鬼戶。曰死生根。有神主之名。曰桃康。上通泥丸。下透湧泉。倘能如此使真氣聚散。皆從此關竅。則天門常開。地戶永閉。尻脈周流于一身。貫通上下。和然自然上朝。陽長陰消。水中發火。雪裏花。開所謂天根月窟。閑來往。三十六宮都是春。要知西南之鄉。乃坤地。尾閭之前。膀胱之後。小腸之下。靈龜之上。此乃天地逐日所生炁根。產鉛之地也。醫家不知有此。李漸湖曰丹書論及陽精河車皆往往以隨任

督脈命門三焦爲說未有專指陰蹻者而紫陽八脉經所載
脈稍與諸家之說不同然內景隧道惟返觀者能照察之其言
必不相謬也

脈法 脉經曰寸口脈前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛又
爲癲癇僵仆羊鳴惡風偏枯瘍癰身體強又曰微濶爲風癇並
取陽蹻在外踝上三寸直絕骨是穴跗陽穴也又曰寸口脈後部左
右彈者陰蹻也動苦癲癇寒熱皮膚澀痺又爲少腹痛裏急腰
及龍筋下相連陰中痛男子陰疝女子漏下不止骭骨也筋腰下穴也
又曰陰蹻脉急當從內踝以上急外踝以上緩陽蹻脉急當從
外踝以上急內踝以上緩難經曰陰絡者陰蹻之絡陽絡者
陽蹻之絡

二蹻脈原由症治 靈樞曰目中赤痛從內眥始取之陰蹻交
穴又曰風痙反折先取足太陽及臍中及血絡出血若中有寒
也

邪取陰蹻及三毛上及血絡出血

濺湖所謂足太陽京骨穴也
在足外側小指本節後大骨

下赤白際陷中針三分灸七壯

膕中委中穴在曲膝後橫文中

針三分陰蹻取交信穴在內踝骨上少陰前太陰後廉筋骨間

三毛大敦穴也在足大指外側三毛中肝脉之井也針

三分灸三壯血絡者視其處有絡脉盛滿者出其血也

又曰陰

蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交于目銳皆陽氣盛則瞑目

陰氣盛則瞑目又云五穀入于胃也其糟粕精液宗氣分爲三

隊故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心肺而行呼吸焉營氣者

泌其津液注之于脈化而爲血以榮四脈內注五臟六腑以應

刻數焉衛氣者出其悍氣之疾而先于四末分肉皮膚之間而不休焉晝行于陽夜行于陰常從足少陽分間行于五臟六腑

今厥氣客于臟腑則衛氣獨衛其外行于陽不得入于陰行于陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻陷不得入于陰則陰氣虛故目不

瞑也治當補其不足瀉其有餘以通其道而去其邪飲以半夏

湯一劑。陰陽已通。其卧立至。甲乙經曰。人病目閉不得視者。

衛氣留于陰。不得行于陽。留于陰。則陰氣盛。陰氣盛。則陰蹻滿。

不得入于陽。則陽氣虛。故目閉也。病目不得瞑者。衛氣不得入

于陰。常留于陽。留于陽。則陽氣滿。陽氣滿。則陽蹻盛。不得入于

陰。則陰氣虛。故目不瞑也。瀨湖曰。靈樞有云。足太陽之筋爲

目上綱。足陽明之筋爲目下綱。寒則筋急。目不合。熱則筋縱。目

不開。又云。壯者血氣盛。肌肉滑。營衛不失其常。故晝精而夜瞑。

老人氣血衰。氣道澀。衛氣內伐。故晝不精而夜不瞑。又云。多卧

者。腸胃大而皮膚澀。分肉不解。衛氣行遲。故也。張子和云。思氣

所至。爲不眠。爲嗜卧。巢元方云。脾病困倦而嗜卧。胆病多煩而

不眠。王叔和云。水流夜疾。有聲者。土休故也。人亦應之。夜卧

則脾不動搖。脈爲之數疾也。一云。脾之候在驗。驗動則知脾能

消化也。脾病則驗澁嗜卧矣。數說皆言目閉目不瞑。雖不言及二蹠。蓋亦不離乎陰陽營衛虛寔之理。可互攷也。張潔古曰。蹠者捷疾也。二脈起于足。使人蹠疾也。陽蹠在肌肉之上。陽脉所行。通貫六腑。主持諸表。故名爲陽蹠之絡。陰蹠在肌肉之下。陰脉所行。通貫五臟。主持諸裏。故名爲陰蹠之絡。陰蹠爲病。陰急則陰厥脛直。五絡不通。表和裏病。陽蹠爲病。陽急則狂走目不昧。表病裏和。陰病則熱。可灸照海陽陵泉。在膝下一寸筋外廉陷中足少陽之合也。筋內宛宛中督脈太陽陽維。病治此。陽病則寒。可針風府風池。風府在項後入髮際一寸大筋內宛宛中督脈太陽陽維之會也。又曰。在陽表者當汗之。在陰裏者當下之。又癲癇晝發。灸陽蹠。夜發灸陰蹠。

治二蹠病方五

桂枝湯

陽蹠

桂枝

白芍

甘草

姜

棗

麻黃湯 又 麻黃 桂枝 甘草 杏仁 姜 糜

承氣湯

又

半夏湯 又以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令至一升半去其滓飲汁一小杯日三稍益以知爲度故其病新發者覆杯則卧汗出則已久者三飲而已

甘草乾姜湯 陰蹻 甘草 乾姜

桂枝湯

又

大青湯

又

沈氏尊生書卷十二

雜病源流犀燭六淫門

風病源流毒風論

沈金鰲撰

經曰。諸暴強直。支痛。緩戾。急筋縮。皆屬於風。此厥陰風木。爲肝膽之氣。乃臟氣所主之風也。若八方之風不正。則爲邪氣。故中於人而爲病。而其中人。有四時之勝氣。而襲之者。如春勝長夏。爲木。尅土。長夏勝冬。爲土尅水。以所勝入也。有隨時隨臟而爲病者。以內氣不守外邪得入也。故春病在頭。善鼽衄。夏病在臟。善病胸脇。長夏病在脾。積風爲寒。善洞泄。寒中秋病在肩背。暑汗不出。風襲腠膚。善風瘧。冬病在四肢。善脾厥。原其然者。人之精爲真陰。爲元氣之本。惟冬藏精。則內寔。雖夏之暑邪。亦汗出而不得入。若冬不藏。又暑汗不出。閉藏疏泄之道俱失。則春溫夏熱。秋瘧隨時隨臟。

而病矣。此風邪所化之由也。然風入五臟其症狀固各不同。肺受風多汗惡風。色皎然白。善欬短氣。晝猶與衛氣和而少差。暮則與陰入內而劇。診在肩上白色。心受風多汗惡風。善怒赫色赤。風火相薄。木火交熾。神志昏亂故也。心病則舌本強。必言不快。其診在口。肝受風多汗惡風。色微蒼。肝本爲風。風反勝之。則內氣不勝。故多悲。本氣動。又多怒。陰器病則如陰。如陰者時憎女子也。其診在目下。脾受風多汗惡風。色微黃。土爲風木所尅。必身體怠惰。四肢不欲動。風勝土疎。必不化食。其診在鼻。腎受風自汗惡風。面靄然浮腫。以邪入腎。挾水氣上升。故腫也。脊痛不能正立。以腎在其部也。始氣見以腎枯也。隱曲不利。以腎氣傷也。其診在肌上。五臟受風。不同病由以異。如此。然風之中人。治必當早。遲則五臟相傳。以至於死。如人初感風。毫毛直。皮膚閉而爲熱。是時當汗。發之即已。

卽或痺不仁。腫痛可湯熨火炙之。惟弗治。病遂入舍于肺。以自表入裏。必先于肺風寒。閉於此而不行。故爲肺痺。發欬而喘急也。然此猶在可發之時。又弗治。卽從所尅而傳于肝。爲肝痺。脇痛而出食也。然此猶可治也。又弗治。再從所尅而傳于脾。風熱相乘而爲脾痺。內則中熱煩心。外則肌體出黃。然此猶可藥之浴之。以解表裏之風熱也。又弗治。再從所尅而傳于腎。爲疝瘕。疝瘕者。聚氣而痛之名。少腹冤熱而痛。出自白而煩熱也。邪聚下焦。溲出自白濁。以熱結不散。虧餗真陰。如蠱之吸血。故名曰蠱。此渴病名非蠱脹病也然此猶可治也。又弗治。再從所尅而傳于心。筋脉相引而急。病名曰瘻。以心主血脉。心病則血燥。筋脉相引。則手足攣掣。是以名瘻也。夫邪氣至心。其病已極。五臟氣皆息。能無死乎。此五臟相傳之次也。有內傷而適與風邪會。因加而發者。此必嘗有所傷。或傷濕而留于分

內血脉。或墮跌打撲惡血留而不去。或卒然喜怒不節。氣有所逆。
或飲食失宜。內有所傷。或寒溫不時。腠理閉而衛氣不通。其開而
冒露于風寒。則邪在前。風寒繼之。二者相值。則血氣凝結而爲寒
痺。其或因熱而汗出受風。雖非外感之邪風。邪氣因加而發。所謂
合邪也。夫邪之中人。雖各有所入。要歸于三部。喜怒不節。則傷臟。
臟傷病起于陰。一也。清濕襲虛。則病起于下。二也。風雨襲虛。則病
起于上。三也。至于淫佚不可勝數。然受病之始。只在此三部。故風
雨寒濕。不得虛邪。不能獨傷人。總之風善行而數變。其傷人爲病。
變態不一。如風藏皮膚之間。內不得通。外不得泄。又善行數變。腠
理開。則衛失守。而洒然寒。元府閉。則陽內壅而熱煩悶。其病則爲
寒熱矣。至寒能衰飲食。熱能消肌肉。又寒熱交作之劇者矣。又如
風襲陽明入胃。胃居中焦。其脉上至目內眞。其人肥。邪不得正。則

目黃而留爲熱中。宜三黃元加連。其人瘦外泄而寒。則變爲寒中矣。宜加減自通湯。又如風與太陽俱入行諸脉。俞散行分肉之間。與衛相犯。能使肌肉膩而生瘡。氣凝不行。能使肌肉不仁。或附熱其氣不清。能使鼻柱瘻而色敗。皮膚瘡癧客于脉而不去。其病則爲癘風矣。夫病至癘風。風之入也深矣。宜消風散追風散磨風丸若風中五臟六腑之俞。則亦各入其門戶。隨俞左右而偏中。其病則爲偏風矣。宜舒筋保安散以至循風府而上入腦戶。其病則爲腦風矣。宜太陽丹神聖散。飲酒後元府易開而中之。其病則爲漏風矣。宜白芷散湯入房汗出。內耗其精而中之。其病則爲內風矣。宜加味葛花解醒湯毛孔開而中之。其病則爲首風矣。宜白芷丸大川芎丸。風不散。傳變而入大腸。其病則爲腸風。而熱則下血。宜清臟湯加減四物湯寒則飧泄矣。宜附子理中湯桂八仙。且在腠理。汗泄不止。其病則爲泄風矣。宜玉屏散病雖異名。

皆風之變。然首風漏風泄風三症狀尤奇特。首風則因沐而風中頭面故多汗惡風止作無時。凡于風氣所發必先一日而甚。頭極痛以陽性先而速也。先至必先衰故次日少愈。漏風則常多汗不可單衣食則汗出以風邪挾酒則陽氣散越故多汗也。陽勝則身熱不惡寒故不可單衣也。食長陽氣故食則汗出也。甚或陽獨盛于上而喘息汗出不止而衣濡陽盛陰虛而口乾善渴身不能勞皆患漏風者所必見之狀。泄風則表既不固而汗出如漬津潤故口乾液涸血虛故不能勞而身盡痛且汗多亡陽故令人寒也。此風所部而受病之狀有不同也。要之風爲百病長。凡寒暑濕燥火五者皆從風而入而風之爲邪又有寒熱剛柔之不一則治之豈易事哉。然古人云治風先治血血行風自滅固爲治風疾者一定之法也。

脉法一仲景曰脉浮而大者曰風又曰脉浮而數中風使然
脈訣曰浮脉主表府病所居有力爲風無力血虛浮遲表冷浮
數風熱浮緊風寒浮緩風濕

風病原由症治內經曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮
毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六腑其次治五臟治五臟
者半死半生也又曰邪之所凌其氣必虛留而不去其病則寔
入門曰傷風則涕流鼻塞聲重又曰傷風症入肺者居多宜
辛溫或辛涼之劑散之宜參蘇飲冲和散防風冲和湯又曰有
汗而惡風此真感風症也醫說曰邪之中人或中于陰或中
于陽上下左右無有恒常人方虛時及新用力飲食汗出腠理
開而中于邪中于面則下陽明中于項則下太陽中于頰則下
少陽其中于膺背兩脇亦中其經驚按以上言感之風病河間曰風病

多因熱盛。熱者風之體也。風生于熱。以熱爲本。而風爲標也。凡有風者。卽風熱病也。內經曰。風者。百病之長也。至其變化。乃爲他病。丹溪曰。凡濕生痰。痰生熱。熱生風。鰲按以上言本氣之風病。

諸風病名。醫說曰。頭風多白屑。毒風面上生瘡。刺風狀如針刺。腰痛如錐。癟風急倒作聲。發搐急緩。頑風不識。痛痒癰風。頭項斑剝。暗風頭旋。眼黑不辨東西。瘡風面生米點。肝風鼻悶。眼瞼兩臉赤爛。偏風口眼喎斜。節風肢節續斷。指甲脫落。脾風心多嘔逆。酒風行步不前。肺風鼻塞。項疼。胆風令人不睡。氣風肉如瓦行。腎風耳內蟬鳴。陰間濕痒。寒濕腳氣。癱風半身不遂。瘧風手足拳摶。胃風不伏水土。虛風風寒。湿痒腸風。脫肛鴻血。腦風頭旋偏痛。賊風發聲不響。產風四肢疼痛。骨風膝腫如槌。腰風腿寒。骨痛心風。健忘。多驚。盛風。言語蹇塞。髓風臂膊痠疼。藏

風夜多盜汗。血風陰囊濕痒。烏風頭面腫塊。皮風赤白癰癬。肌風遍體癰癩。體風身生腫毒。閉風大便燥澁。軟風四肢不舉。綠風瞳人開大青風。吐極青盲。虎風發吼。羊叫大風成片爛瘡。

附錄毒風論

起潛大弟婦患毒風一載有餘。醫藥罔效。商所以治之者。故爲論其源流并酌方劑。

論曰。遍考方書。瘋癲癩癩。天泡楊梅棉花等瘡。總皆有毒。不但楊梅爲毒瘡已也。其獨稱楊梅爲毒瘡。一切瘋癲等。不加以毒之名者。亦世人傳習之故耳。一切瘋癲等所受之毒。或感天地沴戾之氣。或感山溪齋過之氣。或感蛇虺蠭厲之氣。此等氣由風飄蕩壯盛人觸之不侵。虛弱人觸之即受。而所受之處。何經虛。卽何經受之。當時不覺。積久。鬱于經絡。淪及筋骨。侵及肌肉。則爲一切風癥等。恚發時又各因所發之經。各有見症處。且不特天地山溪蛇虺有毒也。卽尋常風寒暑濕之氣。人受之久。亦

譖爲毒。故有風毒寒毒暑毒濕毒之名。受之輕者。不過疥癬等類。受之重者。卽爲一切瘋癲等恙。無足怪也。更不特風寒暑濕有毒也。卽如藥餌中草根樹皮及一切飲食之物。亦皆有毒。故又有藥毒食毒之名。人有病。偶服藥用之的當。病卽當之。雖毒而人不受害。若用違其性。卽病不能去。而毒反留于身中。久必發現爲一切瘋癲等恙。飲食不能節省。不能顧忌。亦然。此一切瘋癲等恙。爲必有毒。無足疑。更無足恠也。不知者每因傳習楊梅爲毒瘡一語。專以毒之一字歸于楊梅瘡。其他瘋癲等皆不敢以毒字加之。若提起毒字。卽如生楊梅瘡者。故在醫家必諱而傳會之。在病家必諱而隱瞞之。在旁人聞毒之一字。亦且驚且怪。以爲何來此恙。總皆不明之故也。夫楊梅毒有由感受者。有由傳染者。一切瘋癲等恙。亦能傳染人。若非有毒。何由傳

染乎。且非有毒何。至筋骨脹急。肌肉疼痛。痛既皆爲
毒。甯有可不去之者乎。然而去之未易矣。其脹于筋骨者。匪朝
伊夕。欲去之。非使筋骨一清。不可。疼痛于筋骨者。匪朝伊夕。欲
去之。非使肌肉一鬆。不可。清之鬆之計。惟有瀉之一法。雖然。瀉
又難言之。千金子乎。巴豆霜乎。恐瀉之不勝。血氣愈耗。精神愈
敗也。且用此等瀉。只可暫時。不可久行。暫時之瀉毒之藥。于經
絡。淪。及。筋。骨。侵。及。肌。肉。者。斷。不。能。一。時。盡。去。既。不。能。一。時。盡。去。
亦徒耗其血氣。徒敗其精神。雖因一瀉毒。亦稍去而餘毒仍鬱。
經絡也。仍淪筋骨也。仍侵肌肉也。且稍去之時。筋骨之脹急亦
暫緩。肌肉之疼痛亦暫止。迨又久焉。鬱于經絡者必更甚。淪於
筋骨者必更甚。侵于肌肉者必更甚。何也。以未瀉之前。血氣還
充。精神還寔。所謂營經絡。淪筋骨。侵肌肉者。猶有血氣精神以

禦之。其爲毒猶可言。旣瀉之後。血氣耗精。神散所謂。營經絡。淪筋骨。侵肌肉者。更無血氣精神以當之。毒之浸灌。橫决恐非。言語可罄也。雖然。暫瀉尚不可。可久瀉乎。夫久瀉誠不可也。計惟有瀉而不瀉之一法。庶得血氣弗耗也。庶得精神弗敗也。血氣弗耗。精神弗敗。雖瀉無傷也。雖久瀉無傷也。何也。瀉而不瀉也。且瀉則可使毒去。久瀉則可使毒盡去。毒去而病自痊矣。旣不耗血氣。旣不敗精神。毒去病痊。而身可安矣。况乎瀉而不瀉之時。不但不耗其血氣。并須養其血氣也。不但不敗其精神。并須助其精神也。夫苟于瀉之時。反能養其血氣。助其精神。亦何畏何疑而不瀉乎。何畏何疑而不久瀉乎。而又非行瀉之藥。卽能用之藥。何藥曰九製大黃。蓋大黃爲將軍。性猛速。九製則將軍。

之性已除。能使經絡筋骨肌肉間之積毒逐漸掃除而又無泄利之患。且大黃雖瀉只行胸以下之積。九製則自胸臆上至頸項皆能追而去之。以所製大黃以酒爲主。而酒氣上升故也。且大黃行瀉有排山倒海之能。用酒九製則性和緩。不見其排倒而自覺其消磨。故熟思病情病勢。非用瀉而不瀉。不瀉而瀉之。九製大黃斷必不爲功。蓋以病者之性情日常多膠執十餘年來偏信無識。無能說鬼話賺錢財之草頭郎中。非挑箭風卽針寒濕。挑之針之外。又多服草頭藥。已經十有餘載。前所云草根樹皮皆有毒者。在官料且然。况于山野間採來本草。不載之物。有不毒者乎。在採之者不計其毒。不毒止欲爲賺錢之計。在服之者亦不問其毒。不毒止欲冀其有益于身。故積久服之。而毒之凝聚不散者。遂發爲此症也。此余歷年來在家庭間親見

情勢而直可斷爲毒盛者也。此症既由于毒而發現之初僅生項髮中以後漸及遍體。今春病劇至卧不起。渾身腫痛。四肢不仁。可見毒發以漸。至此已爲沉重。非謀所以治之之方。勢將爲難療也。春初脉象右寸關洪數弦大。餘俱溫滯。二月盡以來。獨左關洪數。餘皆濡弱。近日愈多煩躁。火性太甚。肝風煽烈。毒氣熾騰。更可卽脉卽症而知之者也。至于瘡形或大或小或成粒或成片。其色紫而帶黑。其形稍腫而浮。旣非若楊梅之燉紅濕爛如鼓釘。如葡萄如棉花。更非若癰風之潰瘍零落如白雪如紫雲。而又兼似葡萄紫雲等樣。則謂之楊梅瘡固不可竟謂之紫雲瘡亦不可。而古人有毒瘡成瘻之語。蓋指如此症而言之也。因古人有毒瘡成瘻之號。後世卽約之爲毒瘡二字。此不在麻瘋癩瘋等例之內。參攷前賢治法。惟丹溪最善。其要雖分上

下開手總以追取惡物蠶積爲始然後隨症輕重因人強弱而調治之然猶諄諄致誠曰此疾雖治難愈若不絕嗜斷欲皆不免再發而終于不救可見此症之不可輕視而治之矣茲因病者誼關骨肉他人尚且醫救何況一家故積日夜思維總必以滙而不滙爲主特製大黃再酌餘品成劑以治之以口舌所及一時難悉聽者又不能詳故特筆而書之以付起潛大弟其細審余言庶於此病得救而亦不負吾拯治之心也所酌前後服方開附于後戊子春三月再平沈金鰲書

治風病諸藥要品及方二十四

升提發散	升麻	川芎	防風	葛根	羌活	香白芷
桂枝	葛根	羌活	荆芥	前胡	獨活	北細辛
乾姜	柴胡	紫蘿	荳蔻	葱白	薄荷	甘菊
桂辛	生姜	藁本	獨活	藁本	白芷	吳茱萸
獨活						
藁本						
川芎						
杜薑子						

卷之二十一 風寒方
總目上

總目上

總目上

總目上

總目上

總目上

藥自 機橘皮

清涼發散

薄荷
石膏

麥冬

知母
連翹

竹葉

甘菊
牛蒡子

金石斛

三黃元

熱中

黃連

黃柏

大黃

加減白通湯

寒中
半夏

附子

乾姜
炙草

人參

肉桂
草荳蔻

白米

消風散

癟風
寒而逆

此方兼治沉寒痼冷

瘡風
錢勿食晚飯次日空心

酒調下

心溫酒
人參各一兩

每未二

追風散

此方第一日服
又大黃六兩
共爲末初服五錢或六錢人加大風子油一錢

半朴硝少許
直待辰時又調藥酒一碗人熟蜜少許勿令患

人知先以水盥漱淨然後服藥必以蜜解口切

不可卧良久痛鴻數次以稀粥補之

此方第三日服
此藥老弱者難治五十以下

者可治精神壯旺者十日內三服謂如初一日

服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸

又如此周而復始二十日內一服

磨風丸

辛又

當歸防風

川芎

羌活

獨活

天麻首烏

細辛

蔓荆子

牛蒡子

荆芥

威靈仙

麻黃

草各一兩

地骨皮

苦參

車前子

首烏

此方第三日

服日二帖用薰洗

細辛各二兩

稀莶草

蒼耳

熏洗藥

大桶盛浸浴

通身出血爲度

河水

敷膠藥

寒水石枯礬硫黃各二兩

蛇床子

調敷

熏洗藥

兩朴硝五錢共爲末

臘猪油

身瘡爛如神

換肌散

細辛白芷

地龍各一兩

當歸

芥穗

烏蛇首烏

蔓荆子

威靈仙

不灰木

甘菊

苦參

沙參

荆芥

赤箭

木鼈子

石菖蒲

胡麻子

烏草

偏風酒

下酒多爲妙

如無紫參不灰木

亦可

重者如神

全生虎骨散

本偏風虎骨各一兩

川芎各二錢半

每末五錢

溫

食後溫酒調下

骨中疼痛加生地

一兩

每末二錢

藥

舒筋保安散

牛膝木瓜各五兩

川斷烏藥

松節白芍

天麻

威靈仙
黃芪
當歸
防風
虎骨各一兩
以好酒一升浸瓶中封口二七日取藥焙乾爲
細末每三錢以所浸藥酒半盞調服如酒完以
水飲下此方能治左癱右瘓筋脈拘攣走注疼痛

神聖散

太陽丹

腦風
葛根半生半炒
麻黃
細辛
藿香
葉各等分
每末二錢
荆芥薄荷酒下
又
石膏二兩
川芎
川烏
白芷
甘草
各一兩
水片二錢
煉蜜同麴糊丸每兩作
十八丸黃丹爲衣食後葱茶嚼下二三丸
屬寒之病皆因邪攻上焦令人頭痛晝夜不寧
也惟此藥主之

白术散

葛花解酲湯

漏風
防風二兩半
白术兩二錢
牡蠣三錢
錢又
每末二錢溫水下
葛花
砂仁
白荳蔻各五錢
乾姜
神曲
澤鴟各二錢
人參
青皮三
茯苓
猪苓
陳皮各一錢半
每末三錢白湯下得微汗則酒病去矣
人參
白术
酒牛膝
當歸
蜜黃芪
青皮
人參
木香
沉香
甘草
內風
白芍
熟地各七分
杜仲
附子
木瓜
防風
肉桂
各五份
內風
白芍
熟地各七分
木香
沉香
甘草
酒牛膝
烏藥
苡仁

大川芎丸

各三分
首風川芎四兩
大虛左瘡右瘡

白芷丸

又十九海九細嚼茶酒任下
彈子大每丸細嚼茶或荆芥湯下
此方耑治沐浴後眩暎頭痛或頭風眩痛令人
目明凡暴寒乍暖神思不清頭目昏暎皆宜服
腸風生地一錢酒當歸黑地榆各八分
黃芩黃柏山梔各七分白芍黃連
阿膠側柏葉各六分炒槐角川芎各五分

加減四物湯

川芎當歸生地側柏葉各一錢
枳壳荆芥槐花炙甘草各五分
姜三分

附子理中湯

又此方能治腸風兼治便血
附子人參白朮乾姜炙草

八仙糕

又

玉屏風散

淮風白朮二錢牛黃一錢
防風黃芪蜜姜氣白朮燥內濕故效
白芍五錢桂枝二錢炙草三錢
姜二兩

小建中湯

又五味子桂枝芍藥甘草大棗各三錢
桂枝二錢炙草三錢
煎至過半去渣入蜜糖一兩

調化服之
甘草之溫補，脾養胃爲臣，水挾木勢亦來侮土，故或厥逆而腹痛，桂枝辛熱佐白芍以去寒水，姜棗甘辛溫發散陽氣，行于經絡皮毛爲使，建中之名始于此焉。

此方兼治虛勞裏急，腹痛，夢寐失精，四肢痠疼，手足煩熱，咽乾口渴。黃芪建中湯卽本方加黃芪也。治虛勞自汗及病後熱不退，當歸建中湯卽本方加當歸一兩也。治血虛自汗，桂枝附子湯卽本方用桂枝五錢加附子半枚也。桂枝自汗漏不止，每服七錢，姜七棗二煎服。

參蘿飲

外感人參、蘿葉、葛根、半夏、前胡、桔梗、枳壳、陳皮、茯苓、甘草、木香。

冲和湯

又一方，苦杏仁四錢，荆芥二錢，白芷一錢，生地、羌活各一錢，細辛、川芎各五分。

防風冲和湯

又一方，苦杏仁四錢，荆芥二錢，白芷一錢，防風各錢半，白芍一錢。

此方治四時感冒風寒，黃芩各一錢，細辛、甘草各五分。

此方治春夏秋感冒風寒頭痛身熱，白芍一錢，葛根三片，葱白三個，一名加減冲和湯。

此方治春寒脉浮緩。

附錄沈氏毒風方五 此皆余自製方也

沈氏毒風方

毒風

始服

全蠍三枚去毒

姜製川烏六分

炒

全蠍三枚去毒

蟬退十枚去翅足

皂角刺

二分苦參一錢

白蒺藜炒三錢

川連五

分羌活七分獨活七分加猪胰子一兩

服四帖後再服第二方

忌食鷄鴨魚蝦

鵝子鳴子韭筍葱蒜

一切生冷

腥膩辛辣之物

不忌則服藥不效

最切房慾慎之慎之

沈氏毒風方

毒風

次服九製大黃三錢

全當歸酒洗二錢

赤芍三錢防風錢半

羌活七分蟬退去

翹足七枚四分

黃芩一錢單蘚錢半木通七分

沈氏毒風方

毒風

第三次方

又次腳二分

荆芥穗錢半

川連三分犀角

四分黃芩一錢單蘚錢半木通七分

加猪胰子六錢服十帖再服第三方或八帖

或六帖總視病勢之輕減與否可也

生首烏二錢

木香三分

加猪胰子四錢

服十帖或八帖

或六帖看病勢若能減去過半

便服下丸藥

沈氏毒風丸

後服

九製大黃三兩

白蒺藜

川山甲

木瓜

全當歸

羌活

製首

烏牛蒡子

活絡石各一兩

胡麻

便香附

威靈仙

天銷

乳黃草

皇角刺

沈氏毒風方

地風

石各一兩

荳蔻草

甘草

卷十二

古

芎 苦參

赤芍

丹參

防風

川

荆芥 獨活

大風子肉

川斷

地骨

皮 秦艽各八錢

茯苓皮

桂枝

陳皮

柴胡 蔓荆子

元參

沙參

漢防已

川烏 草烏

石菖蒲

紅花

遠志各五錢

仁 生僵金各三錢

細辛

白蔻仁各二錢

瓜蒌

人共製爲末

棗肉爲丸空心米湯下二錢壯盛

加至三錢

如服一料未全愈卽兩料三料

亦可此方共用藥四十九種取七七之數也加棗內爲丸共成五十又六分大衍之數也大衍之數五十其用四十有九今選四十九藥合丸共五十五則體用兼備元氣渾淪又得少陽生長之氣以之治病何患不痊乎金匱自註又此方不但治毒風并可治大麻癰鬚眉俱落者紫雲癰遍身腐爛者亦無不效

沈氏洗風方

帛洗

皮

桃枝

柳枝

槐枝

忍冬藤

地骨

以河水煎

松毛

苦參

皂莢各一兩

皮硝二錢

後則半月或二十日一次將洗時務必先進飲

食切不可空腹恐精神絕乏也

感冒源流卽傷風

沈金齋撰

感冒肺病也。元氣虛而腠理疎也。經曰：虛邪賊風。陽先受之。蓋風者，天之陽氣。其乘於人則傷衛。衛者，陽也。故曰陽先受之。衛又卽氣也。肺主氣。脾生氣。故傷風雖肺病而亦有關係于脾。以脾虛則肌肉不充。肺虛則元府不閉。皆風邪之所由以入也。蓋以風爲百病長。善行數變。無微不入。十二經十五絡。五臟六腑。皆能受風。而爲病。或經絡受之。由皮毛而入肌肉。入腑。或由口鼻受之。而入胃。入腸。或入骨空肢節。而心火與風易合。肝木與風易引。肺金在至高尤易感。又况頭項招風。眼招風。四肢受風。濕古人云：避風如避箭。前雖風之正者。猶須避之。况其爲屬爲邪者乎。是故風感人于不覺。初治則易散。久則漸入于內。六淫之邪。每因緣以作難。風固不可不慎。治風亦不可不審。惟吾故論之。風邪襲人。不論何處。感受必

內歸于肺。其症或頭疼。身熱。輕則否。鼻必塞。兼流清涕。必惡風惡寒。或聲重。或聲啞。甚者痰壅氣喘。合口不開。咳嗽咽乾。自汗。脉浮而緩。此外感也。春夏治以辛涼。宜茶調散柴胡升麻湯。秋冬治以辛溫。宜參毒散。人參敗則肌表解而邪從汗散矣。或素有痰熱。壅遏于太陰陽明之間。內有窠囊。風邪易入。若爲之招引者。昔人所謂風乘火勢。火借風威。互相鼓煽者。此內因也。治必以辛涼外發。甘苦內和。宜姜活沖和湯。防風通聖散。斯正不傷而邪自去矣。又有重衣厚被。肺因壅熱生風。而在外風邪。又適與之相襲。其症亦聲重鼻塞。咳嗽咽乾音啞。此內外因也。治以甘苦辛涼兼升散之品。宜桔梗湯上清散菊花散。邪自由內達外而解矣。至有風熱兼傷者。或先感風。又受熱。或先受熱。又感風。一時交發。貴審其輕重而治之。宜桔梗湯上清散菊花散或加味二陳湯。若久而不愈。其人必虛。固不得專用疏散也。陽虛宜加參木陰虛宜加地黃五味倍門冬白芍。然則感

冒之症雖若輕微而要豈可忽視者乎

脉法 仲景曰脉浮而大者曰風又曰脉浮而數中風使然

脈訣曰浮數風熱浮緊風寒浮緩風濕

傷風症治

入門曰傷風症屬肺者多宜辛溫或辛涼之劑散

之戴氏云新咳嗽鼻塞聲重是也又曰有汗而惡風此真感風

症也

陶節菴曰惡風者風邪傷衛腠理不密由是惡風悉屬於陽非比惡寒乃有陰陽之別者有汗惡風脉浮緩者當解肌

隨時用藥惡風發熱兼喘者羌活冲和湯若發汗太過衛虛亡

陽遂漏不止惡風脉浮者桂枝湯加术附惡風小便難四肢拘

急難以屈伸者同上若風濕惡風不欲去衣骨節痛汗出短氣

小便不利身微腫者甘草附子湯汗後七八日不解表裏俱熱

時時惡風大渴舌乾燥而煩者人参白虎湯仲景曰太陽傷

風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出。膏肓惡寒漸漸惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之。又曰太陽兩傷風寒其脉浮緊發熱惡寒身痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之。活人書曰發熱惡寒煩躁手足溫爲傷風候脈浮緊爲傷寒脈是傷風見寒脉也若寒多熱少不煩躁手足微厥爲傷寒候脈浮緩爲傷風脈是傷寒見風脉也蓋脉似桂枝反無汗症似麻黃反煩躁是也。

導引法 保生秘要曰先擦手心極熱按摩風府百餘次後定心以兩手交叉緊抱風府向前拜揖百餘俟汗自出勿見風定息氣海清坐一香飯食遲進則效矣。

運功 保生秘要曰凡頭疼目脹背脹腰脹膝痠發熱者當先守艮背入定後用行庭運至風府用意遶迴百度直行泥丸亦

旋百度後分兩路。旋眼胞漸入瞳人百度。至鼻柱合行亦旋入深處。多旋一會。接上鵠橋經重樓行胸腹。止于氣海睡時以兩手捻孩兒印。兩脚屈指咬緊牙關。意在氣海旋透。或透入黃庭。注念煉至心純。不覺真意自旋一貫。前後間行邪氣無不散者。疼痛自止。或以手指于腦上着力分兩邊摩之。及耳根處。以指甲捻之。至疼有導引之功。

治感冒方十五

柴胡升麻湯	春夏 黃芩	柴胡	前胡	升麻	赤芍	桑皮
茶調散	秋冬 桔梗	葛根	荆芥	石膏		
參蘿飲	人參 桔梗	葛根	陳皮	茯苓		
人參敗毒散	人參 桔梗	羌活	桔梗	柴胡	甘草	木香
羌活冲和湯	內因 生地 川芎	羌活	防風	蒼朮	甘草	白芷
		葛芩	細辛	姜		

防風通聖散

羌活、防風、連翹、川芎、麻黃、甘草、薄荷

桔梗、大黃、黃芩、桔梗、石膏、荆白

芥山梗

白术、滑石

甘草

桔梗湯

內外因、桔梗、香附、山梔、黃芩、川貝

母、知母、前胡、薄荷、黃芩、桔梗、石膏、荆白

熟薦湯

甘草、連翹、薄荷、黃芩、麥冬、瓜萎、金

風熱、元參、桔梗、陳皮、黃芩、枳壳、川芎

上清散

葛根子、竹葉、薄荷、荆芥、甘草、大黃

歸尾、元參、桔梗、陳皮、黃芩、枳壳、川芎

菊花散

甘菊、防風、羌活、枳壳、石膏

蔓荆子、旋覆花、葛根子、枳壳、川芎

加味二陳湯

牛夏、陳皮、當歸、茯苓、枳壳、桔梗

杏仁各一錢、砂仁五分、黃芩、山梔

各七分、葛根子、甘草各六分

桂枝湯

迥汗、桂枝、白芍、甘草

桂枝湯

風溫、甘草、附子

人參白虎湯

汗後、人參、石膏、知母、甘草、梗米

凡用此方先煎石膏數十沸再入米及藥以米熟爲度溫服

大青龍湯

兩傷

甘草一錢
麻黃去節三片
姜三片


桂枝二枚
棗二枚

炒杏仁

石膏一錢

此方耑治太陽中風。脈浮緊惡寒，發熱身疼痛，不汗出而煩躁。此傷風見寒脉者亦治。傷寒脉見風脉者，附節卷曰：熱盛而煩，手足自溫。脈浮而緊，此傷風見寒脉也。不煩少熱，四肢微厥，原浮而緩，此傷寒見風脉也。二者爲營衛俱病，法雖用大青龍湯，此湯峻險不可輕用。須風寒俱甚，又加煩躁，方可與之。不若羌活沖和湯爲神藥也。一法用桂枝麻黃各半湯。

桂枝一錢
麻黃半錢
杏仁一錢
姜一錢
棗一錢



中風源流

沈金鳌撰

中風風乘虛而爲病也。向來惟東垣主虛而河間則主火。丹溪則主痰。似乎各異。不知惟虛也。故無根之火發焉。惟虛也。故逆上之痰生焉。特東垣舉其本。河間丹溪各舉其標耳。未有痰與火之發不由於虛者也。且卽河間主火而其論曰。中風癥。非外中風邪。亦非肝風獨盛。由將息失宜。心火暑盛。腎水虛衰。不能制之。則陰虛陽盛。而熱氣怫鬱。心神昏冒。筋骨不用。卒倒無所知。則其言腎水虛衰。言陰虛陽盛。雖主乎火。而論火之自發。何嘗不以爲由於虛乎。丹溪主痰。而其論曰。西北氣寒爲風所中。誠有之矣。東南氣溫多濕。有風病者。非風病也。皆濕土生痰。痰生熱。熱生風也。夫人身之氣。根於脾。主于肺。苟脾氣充盛。自能健運。內因之濕。何自生。外來之濕。何自感。痰。卽不能爲患矣。然則痰之發逆。非由氣之虛。

弱不能健運乎亦可知。因太陽系也。由于虛。虛爲中風之根也。
惟中風之病由于虛故。肺虛則脾臟虛。則中臟血脈虛。則中
脈而其症各別。蓋中臟者。病在裏。多滑少數。有六經形症。如唇緩
二便閉。屬于脾。不能言。屬于心。耳聾。屬于腎。鼻塞屬于肺。目瞀屬
于肝。邪之中較深治宜下之。宜三化湯然亦不可過下。以損榮血。
中腑者。病在表。多着四肢。其症半身不遂。手足不隨。痰涎壅盛。氣
喘如雷。然目猶能視。口猶能言。二便不秘。邪之中猶淺。且有六經
形症。如頭疼身熱。項脊強。屬于太陽。目痛鼻塞。不得卧。屬于陽明。
口苦脣痛。耳聾寒熱。嘔吐。屬于少陽。腹滿自利。咽乾。屬于太陰。舌
乾口燥。屬于少陰。煩滿。屬于厥陰。而又有太陽經症。無汗惡
寒者。宜麻黃防風或有汗惡風者。宜桂枝防風有陽明經症。無汗
身熱不惡寒者。宜白芷石膏或有汗身熱不惡風者。宜桂枝葛根
黃芩甘草

有太陰經症無汗身涼者

麻黃防風

有少陰經症有汗不熱者

乾姜附子

宜麻黃桂枝杏仁

防風附子甘草

若無此四經之症在少陽厥陰二經則從二經

治之

宜柴胡黃芩

連草

然以上種種形症不獨中腑爲然卽中臟中

血脈者亦往往有之當臨時參酌爲治惟中腑者必面加五色脉

浮弦而多惡風

大法必當汗之

宜疏風湯

然亦不可過汗以損衛

氣至如中

血脈者病在半表半裏其症口眼喎斜沉沉欲睡外無

六經症狀

內無便溺之危既不可汗又不可下惟以靜勝其躁以

養血爲主

宜大秦艽湯養榮湯

其有瘻痺癰瘍頑麻或因痰而中

宜清

疾尤三生或因火而中

宜涼膈散清氣宣風散

或因暑而中

宜中暑湯

或因濕而中

宜行濕流氣散滲濁湯

或因寒而中

宜附子湯附子

或因虛而中

宜桂枝湯附子湯

或因虛而中

萬古

金湯八寶

或因氣而中

宜木香

順氣散或因惡而中

宜平滑散

迴春湯

或因氣而中

宜冰香

調氣散或因惡而中

宜扶正丸

雖所中之因不一皆爲類中屬蓋類中者卒倒偏枯語蹇癱瘓

中風

中風

者卒倒偏枯語蹇癱瘓

延寒盛者與仲尼臘麻血脈之氣中風相類但無六經形症爲異耳
皆由中氣虛慘血液因而澁逆故慮風內煽至此生病也治必于
補益藥中加治風之品宜以參芪爲君歸地佐之加秦艽茯神竹
姜汁梨汁人乳最爲穩妥雖然類中諸症既不可不別于真中風亦不得混于脫絕之症脫
絕者何經曰口開者心絕手撒者脾絕眼合者肝絕遺尿者腎絕
聲如鼾者肺絕皆由虛極而陽脫也若五症不全現者急用大劑
參芪术附進之或可救十中之一若瘧服蘿合丸牛黃丸至寶丹
活命金丹之類卽不可救蓋古人製此等方藥皆辛脊走竄爲斬
關奪門之將原爲牙關緊塞兩手握固中臟之閉症而設故用牛
黃入脾治內麝香入腎治骨冰片入肝治筋惟邪氣深入者乃能
驅出若施于中腑脫絕之症反掌殺人矣夫真中類中脫絕其各
有別如此而土材于真中風又有分表裏分陰陽之說于中腑又

有多兼中臟之說。致爲精審。茲試據其畧曰。眞中風須分表裏病。在表者照前六經形症治之。在裏者便潤阻隔須下之。宜三化湯

若表裏俱見者先解表後攻裏。若內外邪已解而猶語言蹇澀半身不遂。未能驟愈則以六君子湯爲主加羌活防風秦艽當歸生地白芍。久久服之榮衛自和。此卽古所稱大藥加麻黃卽一旬之微汗。加大黃卽一旬之微利者是也。如望春大寒之後則加人參半夏柴胡木通。迎而奪少陽之氣。望夏穀雨之後則加石膏黃芩知母。迎而奪陽明之氣。季夏濕土主令則加防己白朮茯苓勝脾土之渴。望秋大暑之後則加厚朴藿香官桂。迎而奪太陰之氣。望冬霜降之後則加桂附當歸勝少陰之寒。又曰治中風須分陰陽。陰中者或青或白或黑。痰喘昏亂。眩冒多汗甚者等足厥冷。陽中者面赤唇焦牙關緊閉。上視強直。轉脰頸渴。又曰中腑者多兼中臟。如

左關脉浮弦。面目青。左脇痛筋脉拘急。肉瞤。頭目眩。手足不收。坐

踞不得此。中。胆兼中。肝也。

宜犀角散。左寸脉浮洪。面赤汗多。惡風心神恍惚。此中包絡兼中心也。牛黃散。

顛倒語言蹇澀。舌強口乾。忡忡恍惚。此中包絡兼中心也。牛黃散。

右關脉浮緩或浮大。面黃汗多。惡風口渴。語澀身重。忘情嗜卧。肌

膚不仁。皮肉瞤動。腹脹不食。此中。胃兼中。脾也。

宜防風散。右寸脉浮澀。

而短鼻流清涕。面白多喘。胸中冒悶。短氣自汗。聲嘶四肢痿弱。此中。大腸兼中。肺也。

子湯

左尺脉浮滑。面目黑。腰脊痛引小腹。不能俛仰。兩耳虛鳴。骨節疼痛。足痿善恐。此中膀胱兼中。腎也。

宜獨活散。

士材之分晰施治如此。詎非司命者所當加意哉。總之治中風大

法。猝然昏倒。必先順氣。然後治風。

宜熟合丸。用竹瀝姜汁調灌。如口不開。急用吹鼻散吹入。有嚏

可治無。亦須辨明氣血之所屬。氣虛者右手足必不仁。

宜六君子湯。加鈎藤。姜汁。此其要法也。若夫稟賦

可治無。亦須辨明氣血之所屬。氣虛者左手足必不仁。

宜八珍湯。加竹瀝姜汁。此其要法也。若夫稟賦

可治無

則死

姜血虛者

左手足必不仁

宜八珍湯。加竹瀝姜汁。此其要法也。若夫稟賦

不齊七情異起六氣殊傷又難執一神明參活可也今將中風條
欵根由方治開列于後一曰口噤不開足陽明領頰之脉急則口
噤肝風乘胃故也急將皂莢乳香黃芪防風煎湯熏之然須大作
湯液如蒸如霧乃得力南星冰片爲細末擦牙齦或蒸盧薑金末
搐鼻或明礬一兩飛鹽五錢擦牙更用錢許棉裹安牙盡處甘草
五寸截五段麻油浸透火炙挾口令咬之約人行十里許又換一
段從此灌藥甚便二曰口眼歪邪耳鼻常靜故風不作口眼常動
故風易生風搖則血液衰耗無以養筋故筋脈拘急而口目爲僻
嘗急不能卒視宜急以桂枝三兩酒煎濃汁以舊布浸之右歪
搘左左歪搘右乳香二兩皂莢一兩燒烟熏之三日語言蹇澀經
曰足太陽脉貫舌本散舌下病則舌強又曰足少陰脉之正者係
舌本又曰內奔而厥則爲瘲瘍嘔見中風之正皆由督脈之氣不

能上循喉嚨挾舌本故不能言。脾土不足痰濕湧盛而蹇澀故亦

不能言也。腎不足宜地黃飲子至其所兼有緣風痰者宜滌痰有

緣濕痰者清脾熱有緣痰迷心竅者清心火有緣風熱者清肝火。

有緣虛火上炎者壯水之主有緣虛寒厥逆者益火之原各隨症

兼治之。宜神仙解語丹滌痰湯八味丸加味轉舌清瀉所當用而施治

四曰四肢不舉脉緩大有力者土太過也。宜平胃散五苓散

脉細小無力者土不及也。宜補中益氣湯而或

爲血枯筋急。宜四物湯加防風鈎藤秦艽

或爲水旺風淫。宜四物湯加防風鈎藤秦艽

或爲痰多。宜六君子湯加秦艽天麻竹瀝姜汁

五曰身體疼痛諸陽之經皆起手足循行于身體風

寒客于肌膚始痺而痛。宜獨活湯若挾濕熱宜當歸拈痛湯

是。宜十全大補湯六曰痰涎壅盛肥人多中以氣盛于外而歎于內也。人

肥必氣急而肺盛肺金克肝木故痰盛。宜星香散二陳湯

其有挾虛者。宜上二方加桂竹瀝參

有挾寒者。宜上二方加桂附姜汁

有寃者。送星香散有虛者宜六君子湯

湯送星皆隨症酌治。七曰遺尿不禁。皆由脾虛下陷。宜補中益氣香散。

自汗不能收攝也。宜地黃飲子。

同生脉散。

八曰小便不利。中風便不利。蓋由

腎虛不能收攝也。宜地黃飲子。

同生脉散。

九曰善饑。善食。風木太過凌虐中州。脾土受攻。求助於食法。當瀉

歸六黃湯。

肝安脾則復其常矣。宜青皮湯十日。自汗盜汗。或由于風多者。宜桂枝湯。

或由于表虛者。宜玉屏風散。

附湯皆宜順時審症。至

如盜汗更宜變通。宜補中益氣湯送六味丸。或當歸六黃湯作丸。十一曰神氣昏瞀。蓋由

痰氣逆冲心主被障。故昏不知人。此係中臟而非中腑。閉症而非

脫症。煎劑宜六君子湯加南星。木香。菖蒲。遠志。竹瀝。

十二曰左癱。

右瘓。蓋瘻瘍及四肢頑麻。骨節痠痛。一切寒濕風氣與腎虛足膝

無力。治法皆同。宜史記公酒。其條數根由方治各各不同。如此而前人

又據經文。分列中風四大法。雖不外乎臟腑肢體間症治。然其法

亦不可不知。一曰偏枯。卽半身不遂。由血氣偏虛。邪氣留着于所虛之半邊。阻隔脉道。故手足枯瘦。骨間疼痛。經言。虛邪客于身半。其入深。內居榮衛。榮衛稍衰。則真氣去。邪氣獨留。發爲偏枯。是也。而仲景又言。言不變智不亂。病在分腠之間。則知經之榮衛。乃病所發之由。仲景之分腠。乃病所寄之處也。宜加減潤燥湯以治左偏。二曰風癆。身無痛緩者。四肢不舉。或一臂不遂。或左癱右瘓。急則一身皆仰。大約言變智亂者居多。若言變甚智亂甚者難治。而東垣却以癥病爲卽邪。入于裏而中臟者。偏枯爲卽邪。在分腠之間。而中腑者。然則癥與偏枯。雖是兩疾。其寔。癥卽偏枯之邪氣深者也。宜換骨丹疏風順氣元八寶回春湯。三曰風懿。亦名風癆。其病亦在臟腑之間。由痰水制火。閉塞心竅。故猝然昏倒。舌强不言。喉中窒塞。噫噫有聲。是也。但此症有汗身軟者可治。無汗身直者不易治。前人斷爲七

日死良然。總之風癆病有由脾寢者。由膏粱過甚之故。故用疏風順氣丸以導之。有由脾虛者。由飲食失節之故。故用八寶回春湯以調之。風懿病有由于熱者。則以痰火鬱積而然。非清火不可。宜牛黃清心丸。有由于虛者。則以元弱痰橫之故。非化痰不可。宜導痰湯。皆當分治。四曰風痺。經曰邪之所湊其氣必虛。留而不去。則爲痺。衛氣不行。則爲不仁。又曰風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲痺。是也。大約皆由汗出風吹。血凝于膚之故。另詳諸痺條內。茲不細載。四大法之外。又有暴仆。暴瘡。蒙昧。及中風。熱中風。虛等症。皆中風之流派。而與中風症同而異。異而同者也。暴仆。維何。或因虛。或因火。或因痰。忽然仆地。精神恍惚。口噤涎潮。與卒中風相似。惟不搐搦。遺尿爲異耳。宜審其爲虛。宜人參黃芪湯。爲痰。宜竹瀝姜汁。爲火。宜風通聖散。而切治之。亦可參用瀝法。加竹瀝姜汁。暴瘡。維何。其人平素腎必虛。又爲

屬風所傷故語音蹇澀而瘡瘍。其所以與中風之語澀異者。以此必足筋枯細緩弱或耳聾或腰背相引痛經所謂腎氣內奪則舌瘡足廢者是也。宜腎瀝湯地黃飲子清神解語湯養壽解語湯

人必昏冒神情不爽若有物蒙蔽者然并有風犯于心心神不守。

致健忘驚悸者宜牛黃定志丸四白丹二參丹至寶丹中風熱雜何風因熱生熱。

勝則風動甚有風毒上攻頭面腫庠痰涎閉塞心胸煩熱大小便秘下注腰脚腫痛生瘡者不治亦能致癱瘓宜透冰丹天麻丸防風通聖散中風

虛維何人至五六十歲氣血就衰乃有中風之病少壯無是也然肥盛之人或兼平日嗜慾太過耗其精血雖甚少壯無柰形盛氣衰往往亦成中風此卽經所云中風虛症言本非中風之時乃因虛故亦中風也法當和氣活血補虛去風爲主宜萬金湯入審此寶回春湯求之中風之爲病甯有或遺也哉要之中風之人氣必虛氣道必

多滯。直指曰。治風良劑。小續命爲上。排風湯次之。然二藥主風。不主氣。須以人參順氣散烏藥順氣散佐助。氣一流行。則風疎散矣。據此可知。單用風藥爲非宜也。然人參順氣散。所以補氣虛。烏藥順氣散。所以宣氣滯。臨時調劑。又不可混用。中風之人。又必能食。而其能食有二因。一由肝木盛。木盛。克脾土。土受制。求助于食。故多食。瀉肝治風。則脾安。脾安。則食自少。而病可以治。一由脾氣盛。盛。則下。寇腎水。水虧。不能制火。故食益多。而病益劇。急服安土滋水之藥。不必多食。則食自少。而病可以治。此又治中風者。兩大端。不可不知者也。又有小中。小中者。何其風之中人。不至如癲癇。血脈之甚。止及手足者。是也。若遇小中症。切不可用正風藥。深切治之。或至病反引而向裏。只須平和之劑。調理。雖未必爲完人。亦不至有傷性命也。若風病既愈。而根株未能悉拔。隔五年。或數年。

必再發。發則必加重。或至喪命。故平時宜預防之。第一防房勞暴怒鬱結。調氣血。養精神。又常服藥以維持之。宜定風餅子庶乎可安。故

丹溪云。宜常服小續命湯以防瘡癥。易老亦云。如覺風動。便服愈風湯以免倒仆。蓋皆有見乎預防之爲要也。若男婦尋常涎潮于心。卒然昏倒。未卽爲中風者。當卽扶入室中正坐。用醋炭熏之。令氣冲口鼻。其涎自歸經絡。卽自能省。惟不可用姜湯及滴水入咽。湯水一入。痰涎永繫于心。必成痼疾。

脉法

仲景曰。寸口脉浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。虛寒相搏。邪在皮膚。絡脉空虛。賦邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣獨急。正氣引邪。喝辟不遂。邪在于絡。肌膚不仁。邪在于經。卽重不勝。邪入于腑。卽不識人。邪入于臟。口卽難言。口吐涎沫。又曰。脉浮而大者曰風。又曰。脈浮而數。中風使然。得效曰。凡中風之脉。

無不大者。非熱也。是風脉也。脉訣曰。中風口噤浮遲亡急。是大數三魂孤。又曰。中風脉浮滑兼痰氣。其或沉滑勿以風治。或浮或沉而微。而虛持危。消痰風未可疏。丹溪曰。中風脉遲浮可治。大數而極者死。脉經曰。大而浮遲者吉。急而且疾者凶也。

似中真中論 紹仲淳曰。凡中風有真假內外。西北地高風烈虛人猝爲所中。中腑死。中腑成廢人。中經絡可治。必先解散風邪。次再補養氣血。此治真中風法。以小續命湯。桂枝麻黃附子羌活。獨活防風。白芷。南星。甘草爲本。若江浙閩粵川滇等處。無剛風多濕。熟人皆柔脆。多熱多痰。真陰既虧。內熱彌甚。煎熬津液凝結爲痰壅塞氣道。熟極生風。亦致猝然僵仆。類中風症。或不省人。或語言蹇澀。或口眼歪斜。或半身不遂。筋發。必先內熱。

口乾舌苦。便秘渴赤。河間謂是水不勝火。丹溪謂是濕熱相火中氣中疾是也。此卽內虛暗風確係陰陽兩虛而陰虛爲多。與外來風邪迥別。法當先清熱。二冬甘菊白芍茯苓花粉順氣藤子橘紅鬱金枇杷葉。開痰貝母竹瀝白芥子瓜蔞仁。以救其標。次用治本。益陰二冬菊花生地白芍歸身杞子五味子牛膝白膠人乳黃柏白蒺藜。補陽人參黃芪鹿茸巴戟大棗。若氣血兩虛。則陰陽兼補。

似中問答。繆仲淳曰。或問有似中風。眠不竟夕易醒。心脉弦而不洪。多怒。肝脉弦而不長。語蹇。多痰。身重。溲速不能忍。有餘瀝。大便結。左尺浮洪。食少難化。此何故。答曰。眠不竟夕易惺。心血不足。故脉弦不洪。東垣云。虛者多怒。多怒肝氣必不和。故脉弦不長。弦爲血少。必自養藥未易瘳。督脉本沉浮者。腎水

不足腎有火則真陰虧津液耗不能養舌絡舌絡勁急故言不利火性急故小便大便皆見前症脉亦反浮洪也肺喜清肅惡煩熱熱則液枯無以下滴而通水道或煎熬成痰故聲重多痰氣道塞也不可用人參脾胃後天元氣之本脾陰虧則不能消胃氣弱則不能納飲食少則後天元氣無自生精血愈不足經曰脾損調飲食節起居適寒溫此至論也否則脾陰難復然其要又在戒暴怒使肝無不平之氣所和則不賊土矣命門乃先天真陽所寄其壯也一由稟氣厚二由精不妄泄三由志無所鬱則年雖老而猶壯否則子後一陽不升不能熏精柏化精微是火不生土脾胃益弱法當降氣和肝滋腎降氣則陽交于陰和肝則不賊土後天元氣日長腎足則真陰生津液足舌絡榮養則語言自利矣且世無不陰虛而中風者第須攘去一切使

心火不炎則腎亦不燥此又治之之本也

肥人多中風 河間曰人肥則腠理緻密而多蓄滯氣血難以通利故多卒中也 聖鑑曰肥人多中風者以其氣盛于外而歎于內也肺爲氣出入之道人胖者氣必急急則肺邪盛肺金尅木胆爲肝之腑故痰涎壅盛治法先須理氣爲急

臟腑血脉之異 易老曰中腑者面顯五色有表症而脉浮惡風寒拘急不仁或中身之前或中身之後或中身之側皆曰中腑其病多易治中臟者唇吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞀二便秘結皆曰中臟其病多難治大抵中腑多着四肢中臟多滯九竅 東垣曰中血脉則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危三者治各不同

中風症治 正傳曰中血脉而外有六經形症則從小續命湯

加減及疏風湯治之中腑者。先以加減續命湯隨症發其表。如兼中臟則內有便尿之阻隔。宜三化湯滋潤湯。內無便尿阻隔。外無六經形症。宜養血通氣。大秦艽湯養榮湯。中臟者痰壅昏冒。至寶丹之類。或牛黃定志丸。又曰。風中五臟。舌瘡眼瞀。宜排風湯加減。排風湯。但手足不遂。語言蹇澀。當從愈風湯以從中道。久服大風悉去。保生秘要曰。因腠理不密。風邪乘虛而入。始于中風。或起四肢麻木。或不覺寒而時疼者。皆因受風濕之過耳。其有口眼歪斜。風中經絡。左身不遂。死血爲癱。右身不遂。痰濕氣弱爲瘓。而左右癰疽。爲氣血兩虛也。口喝語澀。皆因血虛火盛。而心氣不潤。宜當養心運動。綱目曰。初中倒時。隨卽甦者。宜治。若不省者。宜掐人中。若痰壅。宜吐。口噤亦宜吐。若口開手散。遺尿者。爲陽暴絕。速宜大料參芪補接之。丹溪曰。氣

虛卒中濃煎參芪加竹瀝姜汁服。又曰：凡中風多是老年因怒而成。蓋怒火上升所以昏仆不省。痰涎上壅治宜豁痰降火。豁痰宜省風湯降火宜防風通聖散。又曰：風從汗散故治風多用發汗之藥。又曰：續命排風越婢悉能治風。而千金多用麻黃以風邪非大汗不能除也。若自汗更用麻黃反爲大害。齋按中風多由氣血虛衰故多自汗者于金用麻黃或指壯盛人但爲風痰所閉者言之未可概施于虛弱人也。丹溪治風用續命煮散以爲能復榮衛却風邪所不可缺良然而換骨丹亦可參用。直指曰：卒中卽用開噤噴嚏法次用攝生飲煎湯調蘓含香元三丸灌下。痰盛者加全蝎。

中風絕症 得效曰口開心絕也。遺尿腎絕也。手散脾絕也。眼合肝絕也。鼻鼾肺絕也。皆不治。五症中見一症猶可治。蓋初中

則眼合者多痰上則鼻鼾者多惟遺尿口開俱見爲惡以心爲五臟主腎爲五臟根也。綱目曰卒中風若面赤時黑主陽氣上散腎反尅心也兼遺尿口開氣喘者不治又曰中五臟之絡者口眼俱閉可治如口開眼合手散鼻鼾遺尿及大吐大瀉下血吐血皆死。丹溪曰內脫筋痛髮直頭搖上竄面赤如斑汗綴如珠吐沫直視者皆不治又曰動止筋痛名曰筋枯無血滯筋故也不治又肝木尅脾土大便洞泄者亦不治。

偏枯與癰病異。綱目曰偏枯者手足爲邪氣阻塞脉道而然癰病則陽明虛宗筋縱帶脉不引而然癰病有言變志亂之症癰病則無之蓋癰病發于擊仆之暴癰病發于怠惰之漸明是兩疾也。

癰癧導引法 保生秘要曰如患右手以右手指右回頭目左

而視。左患亦如之。各運氣二十四口。如患左足。坐至橙子上。以左足踏右膝上。左手托脚跟。右手扳脚尖。轉頭向左。患右亦如之。用力扳之。能除風寒暑濕。遠近癱瘓之症無不驗。

運功 保生秘要曰。三提三咽。返念歸元。炁積一元。斡旋週天。左邊炁永不通。于右手行功。着意引在左手。右亦如之。各運五口。專氣須百日。候到氣脉全。

偏風導引法 保生秘要曰。左偏於左內關穴。指之九九。擦之九九。次指五指尖。右亦如之。

運功 保生秘要曰。取效全用週天通關法。

治中風方九十一

三化湯

中藥

厚朴

大黃

枳實

羌活各二錢

水二碗急火煎至一碗服

厚朴

白芍

枳實各四兩

大黃八兩

麻仁湯

麻仁三兩另研

杏仁三兩

蜜丸

疏風湯

中藥

升麻

五錢

每用末

五錢水煎

益智仁

杏仁各一兩

川芎

當歸

白芍

黃芩三兩

大秦艽湯

血脈

白芷

羌活

獨活

防風

黃芩

細辛

川芎

當歸

白芍

甘草

生地

茯苓

白木

養榮湯

冬連

當歸

陳皮

烏藥

白芍

生地

石菖

枳壳

知母

川芎

秦艽

杜仲

杞子

甘草

羌活愈風湯

草各

防風

羌活

炙草

防風

秦艽

姜三片

黃芪

半夏

南星

甘草

獨活

黃芩

甘麥

活人參

薄荷

蔓荆

子各二

當歸

細辛

枳壳

知母

川芎

秦艽

杜仲

杞子

甘草

獨活

骨皮

半夏

厚朴

熟地

羌活

炙草

防風

秦艽

姜三片

黃芪

半夏

南星

甘草

獨活

生地

蒼朮

石膏

白芍

各四兩

黃芩

內桂

柴胡

木通

甘草

獨活

黃芩

知母

甘草

大寒後

多加牛

夏人參

柴胡

木通

甘草

獨活

黃芩

知母

甘草

獨活

穀雨後

多加石膏

黃芩

知母

甘草

獨活

黃芩

知母

甘草

獨活

大暑加厚朴

藿香

內桂

季夏

加防已

白

霜降後

加白

蜜

獨活

黃芩

知母

甘草

獨活

當歸內桂附子

附子

當歸

白芍

各二兩

黃芩

知母

甘草

獨活

黃芩

知母

甘草

獨活

黃芩

此方治風中腑中癱先以木藥之後用此方調理諸經久則大風悉去清濁自分榮和自和矣

易老云此方療肝腎虛筋骨弱精神衰弱言難

中風方

或瘦而偏枯或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思忘皆病不足也能安心養神調陰陽使無偏勝

滾痰丸

因痰煎水丸大黃 黃芩 沉香 青蒙石 百藥

三生飲

又木香五分 生南星 生白附子 生川烏各一錢
此方治卒中風痰塞昏仆不省脉沉無熱者

龍星丹

又二錢 陳胆星 硫砂各三錢 黃連 黃芩各全蝎 防風 薄荷各一錢 水片

牛黃 膜香各三字

加青黛一錢 蜜丸櫻

挑大別以硃砂爲衣不拘時每噙化一丸

凡中風多是濕土生痰疾生熱生風此方既治風熱又兼理痰凡風熱痰無不治也

因火連喬二錢 大黃 芒硝 甘草各一錢
薄荷 黃芩 檀子各五分 竹葉七片

涼膈散

蜜少許 煎至半入硝

清氣宣風散

又活當歸 半夏 生地 白芍各一錢 川芎 赤芍
芩各六分 防風 甘菊 枳壳 陳皮

升麻 黃連 山梔各五分 甘草生荆

分

姜三

棗二

香茹飲

此方
因暑

兼治風熱

香茹

厚朴

扁豆子

甘草

沈氏中暑湯

川連六分吳萸五粒泡水一二匙拌知母一錢乾姜一分泡水一二匙拌遠志一錢石菖蒲升四五匙拌川貝母二錢熟艾半分

泡水一

二匙拌

枳實磨升八分

羚羊角一

錢瓜萎仁三錢

麥冬二錢

西瓜翠衣五

錢此金鷺自製方也

此方端

治暑邪直中

心肝二經不頭疼不發熱

時躁煩舌短手足牽攏者

因寒

麻黃白朮

人參附子

乾姜

甘草

附子湯

又茯苓各一錢

白朮錢半

白朮

白朮

內桂

人參

甘草

四溫

荳蔻附

川芎

砂仁

厚朴

甘草

滲濕湯

澤泻

心

生姜

行濕流氣散

又防風

川烏各一

兩每末二錢酒或葱白湯

苡仁二兩

茯苓兩半

蒼朮

羌活

調下

此方兼治風寒濕痺麻木不仁手足煩軟

中風方

此方兼治風寒濕痺麻木不仁手足煩軟

卷十二

萬金湯

因虛
細辛

川芎
人參

杜仲
肉桂

防風
甘草

茯苓
當歸各八分

此方耑能治風癩虛及手足風累驗若手指無

力不半刻可愈

木香調氣散

因氣
蔻仁

木香
甘草

丁香
加鹽少許

檀香
烏藥一錢半

霍香
人參

砂仁
天麻

順氣勻風散

因氣
川芎各一錢

白术二錢
紅香

青皮
甘草各五分

白芷
姜三片

木瓜
一方有枳壳一

砂仁
紫蘇

葉錢

一名勻氣散

此方耑治中風氣虛不遂

調氣平胃散

因惡
藿香

木香
蒼朮

檀香
厚朴

蔻仁
陳皮

砂仁
甘草

烏藥
加姜

桃奴丸

息香
桃奴七个

又去渣一兩
另研

右三味同入銀石器熬成膏

砂仁
玳瑁鏽細末一

烏藥
雄黃各

安
一

息香
再用一硃砂

磨香
冰片

右三味同入銀石器熬成膏

砂仁
玳瑁鏽細末一

烏藥
雄黃各

安
一

胆肝
人参

桃奴丸
羌活

獨活
黃芪

白术
黃芩

大陰
安

大陰
安

枳壳

當歸

防風

東方

白芷

甘草

此以下至獨活散五方皆須察病人氣血之虛
加補氣血藥

加味牛黃散

包絡心

羚羊角

白鮮皮

牛黃

麝香

沙參

龍齒

防風

天麻

獨活

人參

防風散

朱砂

鐵粉

麥冬

升麻

遠志

甘草

獨活

黃芩

赤芍

人參

川芎

附子

五味子湯

大腸肺

五味子

杏仁

肉桂

炙甘草

防風散

膀胱腎

赤芍

川芎

川椒

當歸

蒲防風

川菊

獨活

防子

當歸

石菖

枳壳

丹參

牛膝

川芎

肉桂

山萸肉

白朮

以上五方皆中腑而兼中臟者

南星

半夏各錢半

草薢

甘草各一錢

初服

菖蒲

木香

丁香

安息香

蒼朮

攝生飲

細辛

此方治卒中不省無熱者

蘿合丸

又犀角

白朮

香附

硃砂

調子草

二兩 龍腦香 薑臘香 蕤合香各一兩

六君子湯

氣虛人參 茯苓 白朮 炙草 半夏
陳皮 川芎 當歸 白芍 地黃

四物湯

氣血虛人參 茯苓 白朮 炙草 川芎
當歸 川芎 當歸 白芍 地黃

八珍湯

口眼歪斜人參 茯苓 白朮 炙草 川芎
升麻 防風 葛根 蘿木 鈎藤 紅花
加酒

地黃飲子

語言菖蒲 遠志 麥冬 姜三七 官桂 附子 茯苓
解此方治中風舌瘡足廢腎虛其氣厥不至舌下
五味子白附子菖蒲 遠志 全蝎 秦艽
神仙解語丹又南星 天麻 姜黃 等分 薤壳姜湯下五
七十丸 一名解語丸

滌痰湯

又蒲公英 南星 半夏 枳實 桔紅 人參 茯苓
鴻鵠 竹茹 茯苓 甘草 加姜 丹皮 茯苓 漚澤
附子 熟地 山藥 山萸 肉桂

八味丸

加味轉舌膏

舌瘡
山梔

防風
川芎

桔梗
元明粉

黃芩
硃砂

薄荷
甘草

菖蒲
犀角

當歸
大黃

平胃散

臨卧各
肢廢

蒼术
厚朴

陳皮
甘草

五苓散

外
苓

白术
葛根

內桂
升麻

茯苓
防風

猪苓
羌活

澤瀉
姜黃

獨痺湯

膿瘍
甘草

當歸
姜

白芍
棗

羌活
葛根

黃芪
升麻

黃芩
防風

當歸拈痛湯

又
苓

知母
葛根

白芍
升麻

人參
羌活

苦參
茯苓

陳皮
澤瀉

鐵彈丸

又
各

靈脂二兩
五錢

川烏一兩
麝香一錢

乳香
水丸

沒藥
彈子大

朱砂
每一丸薄

荷酒下
此方治中風癓斜癱瘓涎潮語濶筋骨痛
應是風疾無不治之

十全大補湯

又
歸

人參
白芍

茯苓
地黃

白术
黃芪

甘草
肉桂

川芎
當

星香散

痰涎
南星

木香
加姜

二陳湯

文、茯苓、陳皮、半夏、甘草

生脉散

適尿、人參、麥冬、五味子

當歸六黃湯

易汗
黃連

當歸
黃芩

生地
白芍

熟地
柴胡

黃柏
山梔

黃芩
人參

青皮白芍湯

善飢
白木

青皮
茯苓

白芍
甘草

柴胡
桂枝

山梔
桂枝

人參
白芍

桂枝湯

風邪

桂枝

白芍

甘草

姜、枣

玉屏風散

表虛

芪附湯

氣虛

六味地黃丸

盜汗
茯苓

熟地

山萸

丹皮

澤瀉

加減牛心湯

神昏
白术

人參
雄黃

茯神
甘草

麥冬
犀角

山藥
硝砂

胆星
牛黃

黃精肺心湯

水片

麝香

金箔

羚羊角

牛黃

蒲黃

至聖保命丹

又
藍根

管仲一兩

生地七錢

大黃五錢

板

薄荷

珍珠

水片各錢半

麝香一錢

蜜

丸金箔爲衣

疏風順氣方

差合此藥切勿令陰人觸犬見之
此方耑治中風喎斜癱瘓及暗風風癇
又製大黃五兩 車前子二兩半 柘榔
郁李仁 火麻仁 芫荽子 牛膝 山藥

卷之三

各二兩 桂壳 防風 獨活 各一兩

八寶回春湯

白芍錢二分
半夏各五分
附子八分
人參六分
白朮六分
麻黃一分

陳皮

防風 已
肉桂 附
乾杏 仁
姜川 草芎
熟地歸

生地

各四分 沈香 烏藥 川烏各三分

卷之二

八味去風八味和氣八味活血益氣血

牛黃清心丸

平榮益
調理則風症自去
風篴山藥七錢
甘草五錢
人參一
切服虛症

肉桂神

曲各二錢半 麝角一錢 白芍 大豆黃結
阿膠各錢七分半 白芍 大豆黃結

胡芩

當歸桔梗杏仁茯苓川芎各錢二分
防風砂白术各錢半

錢牛

黃錢二分
雄黃八分
白欖一
羊角一
泡一
姜各七
水片一
麝香半
分半

一
油

方內四十方爲衣 大棗肉二

此方八味去風八味和氣八味活血益氣血
平榮衛調順則風症自去故治一切風虛症
風盜山藥七錢甘草五錢人參蒲
神曲各一錢半犀角二錢大豆黃卷

枚蒸研膏和煉蜜丸每劑一錢溫水下
此方耑治卒中風不省人事痰涎壅精神昏語
言塞口眼嚙斜手足不遂等症

導痰湯

草本夏半南星赤苓枳實橘紅甘草
本方加香附子烏藥沉香木香名順氣導

痰湯加黃芩黃連名清熱導痰湯加羌活
白术名祛風導痰湯加遠志菖蒲硃砂黃芩

黃連名甯神導痰湯此方耑治中風痰盛語澀眩暈

防風通聖散

暴仆黃芩桔梗各七分滑石錢七分甘草錢二分石膏
赤芍大黃麻黃連翹薄荷芒硝各

四分半白术荆芥山梔各三分半姜

五分半此方治風熱燥三者之總劑也

葛根水一斗煮取五升再入元參白芍

肉桂各兩二錢半黃芪川芎五味子

當歸人參防風甘草各一兩
再煮取一升分二服

此方耑治腎臟風語音塞澀

清神解語湯

芍药南星生地麥冬遠志川芎陳皮茯白

芩
烏藥

枳實
黃連

防風
羌活

甘

草各五分

竹茹錢半

加姜汁

童便

瀝冲服

竹瀝五匙

姜汁一匙

竹

資壽解語湯

七分半

防風

附子

棗仁

天麻各五分

此方耑治中風痰迷心竅語言蹇澀不省人事於羊角桂枝各一錢羌活甘草各于此方耑治風中心脾舌強不語益心之別脉係于舌本脈亦挾咽連舌本散舌下也

牛黃定志丸

蒙昧

砂

半夏各二兩

雄黃

天麻

當歸各兩二錢半

甘草一兩

烏蛇肉各一兩

西珀七錢半

牛黃

附子

牛膝

冰片

全蝎

姜蚕

蜜丸

芡子

大人參薄

各五錢

麝香二錢半

蜜丸

芡子

大人參薄

南星

荷湯嚼下一丸

此方耑治心臟中風昏冒精神不守此藥壓驚

鎮心化涎安神

祛風至寶丹

刃

滑石兩半

川芎

當歸各兩二錢半

白芍

防風各七錢半

甘草一兩

石膏

黃芩

桔梗

熟地

天麻

錢半

人參

羌活

獨活各五錢

梔子三錢

連

連

荆芥

薄荷

大黃

芒硝

連

黃柏

細辛

全蝎各二錢半

蜜丸

彈

連

子大細嚼茶酒任下此卽通聖散加九味

此方耑治風中臘昏冒及風熱

下

丹參

熟地

天冬各兩半

茯苓

甘草

麥冬各一兩

人參遠志

珠砂菖

甘草

蒲各五錢

蜜丸清晨以羌活愈風湯送或臨卧

再以羌活愈風湯送下四白丹

此方耑治中風後健忘能養神定志和血

二參丹

草各五錢

蜜丸清晨以羌活愈風湯送或臨卧

再以羌活愈風湯送下四白丹

此方耑治中風後健忘能養神定志和血

四白丹

芩又

砂仁

甜竹葉三兩

白芷一兩

白朮

白茯

甘草

防風

人參

川芎

獨活各二錢半

藿香各一錢

蜜丸

每丸重一錢

臨卧以羌活愈風湯送下

此方耑治中風昏冒能清肺氣養魂

透冰丹

風熱

製川烏

二兩再鹽炒才鹽

威靈仙

大黃

山梔

防風

知母各二錢

白朮

白蘆各五錢

京墨醋

蜜丸

每丸重一錢

臨卧以羌活愈風湯送下

此方耑治風熱毒上攻頭面腫痺癰瘍塞口

乾胸煩下注腰脚腫痛生瘡大小便秘及癩瘍

等症

桐子大薄荷汁同溫酒下二三丸

此方耑治風熱毒上攻頭面腫痺癰瘍塞口

乾胸煩下注腰脚腫痛生瘡大小便秘及癩瘍

等症

天麻丸

又一生瘡四兩

羌活三兩半

當歸二兩半

兩半

附子五錢

蜜丸

杜仲

獨活各

小續命湯

總治

防風錢半

防已

肉桂

杏仁

芩

白芍

人參

川芎

麻黃

附子五分

姜三

棗二

一方無附子

防已

有當歸石膏

此方耑治卒中風不省人事

嚼得癰瘍瘽瘻

麻黃

木眩量

初中無汗表裏等及治一切

諸風症

麻

木眩量

凡中風六脉浮緊風氣太盛心火暴升痰涎壅

遏于經絡之中宜小續命湯用附子以其稟雄

壯之資而有斬關奪將之勢能引人參輩並行

于十二經以追復其散失之元陽又引麻黃防

風杏仁輩散表開腠理以驅其在表之風寒又

引當歸川芎輩入血分行血養血以滋養其衛

損之真陰或加石膏知毋以降胃火或加黃芩

以清肺金若病勢稍退精神稍復輒當改用丹

溪之法以補氣血消痰之劑以調養其本氣此

急則治其標與夫標而本之之治也

也

此

排風湯

草各八分

桂枝

川芎

杏仁

白鮮皮

姜三

急

麻黃

獨活

赤苓各一錢

白朮

甘肉

人參順氣散

(氣虛)

麻黃

人參

川芎

陳皮

白芷

白朮
分半

厚朴

桔梗

甘草各一錢

乾葛各七

烏藥順氣散

(氣滯)

薄荷

七葉

陳皮

烏藥各錢半

川芎

白朮
分半

甘草三分

枳壳

桔梗各一錢

乾姜五

此方耑治一切風疾先服此疏通氣道然後進以風藥又治癰瘍及歷節風

定風餅子

防再破

天麻

川烏

南星

半夏

姜黃

川芎

茯苓

生甘草

等分

姜汁丸

茨子大

作餅子

硫砂爲衣

每一片

餅

細嚼姜湯下

此方亦能預防風疾

中藥

當歸

生地

枳壳

厚朴

枳榔

大黃

麻仁

杏仁各

一錢

羌活

七分酒

焙紅花

三分

此方治風中癱

二便閉瀉先服此藥後以羌活

愈風湯調理

至寶丹

又兩

犀角

硫砂

雄黃

西珀

玳瑁各一

牛黃五錢

冰片

麝香各錢半

金箔

銀箔三十片

安息香酒灌

五十片牛黃爲衣

兩熟膏和勻

一兩作四十九每丸

去沙土淨

一兩作四十丸每丸

人參湯下日二三服安息香性硬難化倉卒
難用如欲急用煉蜜丸亦可
此方兼治卒中急風不語不省人事

加減排風湯

又 天麻二錢 蒼朮一錢 防風 川芎
羌活 獨活各八分 麻黃七分 白鮮皮

加減續命湯

當歸 杏仁 甘草各四分 美三片
芩 中廄 人參 防風錢半 防已 川芎
白芍 白朮 半夏 赤苓 黃芩

錢 附子五分 姜三 藜二 此小續命湯
方也 凡風中廄今人不分表裏虛實故張易老
授東垣以六經加減之法如 太陽中風無汗
惡寒麻黃續命主之本方倍麻黃防風杏仁也
有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝白芍杏
仁也 陽明中風無汗身熱不惡寒白虎續命
主之本方倍桂枝黃芩加葛根一錢四分也
太陰中風無汗身涼附子續命主之本方倍附
子甘草加乾姜七分也 少陰中風有汗無熱
桂枝續命主之本方倍桂枝附子甘草也 六
經混淆繫之于少陽厥陰或肢節掣痛或麻木
不仁羌活連翹續命主之本方一兩加羌活一
錢連翹錢半也

省風湯

去痰

防風

南星各二錢

半夏

黃芩

甘草各一錢

冰片

研和以中

姜十片

此與導疾湯相合照

續命煮散

此方耑治卒中風不省有熱者

桂皮七分半

防風

獨活

人參

片富歸

細辛

葛根

白芍

川芎

熟地

遠志

牛夏

甘草

荆芥穗各五分

姜三

開關散

開禁

南星末五分

冰片一字

研和以中

指薰藥末揩齒二三十度其口自開每用半錢

至一字端午日合尤佳

一泣以烏梅肉和南

星細辛末擦牙口自開便可下藥

三陽之筋

並絡入頭頸換于口諸陽爲風寒所客則易急

故口噤不開

此方耑治卒中風口噤不省氣寒用以吹鼻

巴豆熏法

又巴豆去壳紙包搗油去豆以紙撲作條送

入鼻內或加皂角末尤良或燒烟熏鼻內亦同

取嚏

細辛

皂角薄荷

雄黃各一錢

一方耑治卒中風口噤不省氣寒用以吹鼻

為末每少許吹入鼻中有嚏可治無嚏不可治

一方商星牛夏皂角等分爲末用如上法

通關散

此方耑治卒中風口噤不省氣寒用以吹鼻

又石膏二錢

藜蘆川芎

細辛人參

一方耑治卒中風口噤不省氣寒用以吹鼻

此方耑治卒中風口噤不省氣寒用以吹鼻

共爲末每取一字吹鼻即得

甘草各四分

人參

中風方

卷十一

三

搐鼻通天散

川芎
角
等分爲末用如上注

細辛
薺蘆

白芷
防風

皂角
等分爲末每二錢水

皂角
等分爲末每二錢水

皂角散

取吐
煎盡服卽吐

黃荷
萊菔子

等分爲末每二錢水

巴豆丸

巴豆三枚去皮膜
爲末
右二味瓦上煅令豆焦赤爲度蜜丸芡

白礬如拇指大一塊
立愈

熏法

此二方治中風痰塞吐之立愈雖垂死者亦

效

黃芪防風湯
霧熏之口噤自能漸開

濃煎數斛置于床下令氣如烟

此方許允宗治王太后中風法也丹溪曰中風
脉沉口噤非大補不可若用有形湯藥緩不及
事熏以黃芪防風湯使口鼻俱受之此非智者
通神之法不能也蓋人之口通乎地鼻通乎天
口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而
爻無形地主濁故口受有形而兼受無形也