

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十九

雜病源流犀燭 身形門

腿股膝臏踝足病源流

沈金鰲撰

按銅人圖膝上曰髀膝上骨曰髀骨髀骨與髓骨接處曰髀樞穴
髀內曰股髀外曰腿腿下脛上接處曰膝膝之蓋骨曰臏膝下曰
脛一勿曰胫膝下之骨曰脛骨脛骨之外骨曰輔骨脛之後魚腹
曰臑脛下跗上相接處曰腕腕骨曰踝足通謂之脚據此則腿股
膝臏踝等皆屬于足凡腿股膝臏踝之病以足居下部皆當從下
部治之也夫足之爲病其大端有三曰厥厥者氣逆上之名不論
寒厥熱厥皆從手足逆起雖厥之因不一大約由于腎虛經故曰
腎虛則清厥意不樂又曰下虛則厥也另詳諸厥篇茲不贅白痿
痿者手足痿弱不能運動足爲尤甚五臟雖各有痿由于下焦虛

冷以致脚膝無力陽事不行者是多

宜羊腎一枚煮熟和米粉并六兩煉成乳粉空腹食之

有新娶後得軟脚病且痛甚者

宜杜仲切一兩酒水各半盞煎服三日能行又三日愈矣至如

感受寒濕亦能令脚痿行步不穩

宜草薢二十四兩杜仲八兩其搗末每旦酒服三錢忌牛肉其

詳在諸痿篇中茲亦不贅曰脚氣脚氣者全由受濕成病其間又

有風濕寒濕濕熱之別并有食積流注之因東垣以爲有南北之

異南方多外感寒濕北方多內傷濕熱是也千金方云脚氣初起

甚微飲食如故人多不覺惟卒然脚屈弱或腫痛發則經旬累月

往來寒熱大似傷寒瘧疾此可見脚氣之爲病矣而其爲病又有

乾有濕筋脉跼縮牽痛枯細不腫爲乾脚氣乾卽熱也當潤血清

燥筋脉弛張而軟或浮腫或生臃瘡爲濕脚氣當利濕疎風而其

腫處則又分屬諸經前廉屬陽明

宜白芷升麻葛根

後廉屬太陽

宜羌活防風

外廉屬少陽

宜柴胡

內廉屬厥陰

宜青皮川芎吳萸

內前廉屬太陰

宜蒼朮白芍

內後廉屬少陰

宜車前牛膝

脚氣之候必身痛發熱惡食嘔逆或腹痛

下利或少腹不仁或二便閉或驚悸昏憤或吐熱或身冷疼或轉

筋或上腫下不腫或頑痺或緩縱或擊急或兩脛腫赤便當以脚

氣治其風寒暑濕所勝亦各有症狀宜辨風勝者必自汗走注脉

浮弦

宜越婢加白木湯

寒勝者必無汗擊急掣痛脉沉澁宜牛膝丸暑勝者必

身熱煩渴

脉洪數

宜清暑益氣湯

濕勝者必腫痛重着脉濡細宜除濕湯至脚

氣爲壅疾當䟽下然太過則損脾不及則病不去如脚氣初發一

身皆痛便溺阻隔當先用導氣之法

宜羌活導氣湯

再用方藥以除之宜

歸拈

脚氣飲食不消心下痞悶必以開解爲主宜開結導氣丸脚氣欲吐

必每日飽食午後少食日晚不食若饑可食豉粥晷不消欲致霍

亂者

宜高良姜一兩水三升煮一升

脚氣攻注腿脛痛

宜田螺搗敷兩股便覺冷趁至足而安

脚氣發作筋骨引痛

宜金銀末每二錢熱酒下

脚氣不論男婦骨節皮膚腫疼

身形

腿股膝臏踝足

卷三十九

二

痛宜五加皮丸脚氣腫痛成瘡腫爛不能步履脉沉緩由于寒濕爲患

宜沈氏脚氣湯脚氣由于寒濕未至成瘡但腿膝疼痛行步無力宜胡盧巴丸

脚氣上攻結成腫核宜甘遂末水調敷即脚氣風腫不仁宜草麻葉蒸搗

畏之日二三易脚氣脹滿非冷非熱或老弱人病此宜栝櫚末茶調脚氣

濕瘡極痒有虫宜烏日根爲末傅脚氣由于酒毒危甚宜巴黃丸脚氣

成漏跟有一孔深半寸許其痛異常宜人中白煨研有脚氣病致

腿肚轉筋宜蒜擦足心令熱即脚氣膝浮宜甘松香煎湯淋洗脚氣入腹脹

悶喘急宜威靈仙末每二錢酒下脚氣入腹脇作痞塊大如石悶

絕且死困不知人搗搦上視宜杉木節湯脚氣冲心爲火氣上逆急以

附子末津調塗湧泉穴內仍服湯劑宜四物湯加妙黃柏脚氣冲心悶亂不

識人宜白栝櫚十二個爲分二服空心煖小脚氣上冲亦有由于

虛熱者宜金匱丸以上皆治脚氣病之大法也至如一切腿股脛膝

雜病。又可進詳之。如濕鬱脚痠痛。並引少腹及腰。宜桑沙防已黃

果車藤茯苓皮。如老年膝痛。牽引兩足。不堪步履。宜鹿角霜當歸菴蓉如

足膝腫痛。久不止。內熱。宜生虎骨牛膝草薺當如腿骨麻疼。由于

勞力傷損。宜生虎骨丸如痛着右腿。深入筋骨。肌肉不腫。夜分勢篤。由

邪留于陰。必從肝治。宜歸如足大拇指硬強而痛。並嘔逆吐涎。宜

莢附子獨活細辛。富歸漢防已。如兩足皮膜。撫之則痛。脉弦而數。由于肝邪犯胃。

胃厥所致。宜川棟子青皮橘紅查肉如血熱而少。以致兩腿筋不

舒展。時覺微痛。宜沈氏雖自腿至足。爲病正多。而從此類。推庶可

無悞矣。

脉法 仲景曰。脚氣之脉。其狀有四。浮弦爲風。濡濕氣遲澁。因

寒。洪數熱鬱。又曰。尺脉虛弱。緩澁而緊。病爲足痛。或是痠病。

正傳曰。微滑者虛。牢堅者寔。三因曰。脚氣之脉。浮爲風。緊爲

寒緩細爲濕。洪數爲熱。又曰：沉而弦者爲風，沉而緊者爲寒，沉細爲濕，沉數爲熱。

腳氣古今異名。醫鑿曰：腳氣者，古名緩風，又謂之厥。後人謂之腳氣。後又以腳腫者名濕腳氣，不腫者名乾腳氣。漸而至于足脛腫大如瓜，匏者有之。

腳氣原由症治。綱目曰：腳氣之疾，寔水濕之所爲也。其爲病有症無名。腳氣之稱，自蘇敬始。關中河朔無有也。惟南方地下水寒，其清濕之氣，中于人，必自足始。故經曰：清濕襲虛，則病起于下是也。靈樞曰：脾有邪，其氣流于兩股；腎有邪，其氣流于兩脛。東坦曰：水性潤下，注之于足，積久而作腫痛。此飲食下流之所致也。內經曰：太陰之勝，火氣內鬱，流散于外，足脛附腫，飲發于中，附腫于下。加之房事不節，陰盛陽虛，遂成痼疾。孫真

人云。古人少有此疾。自永嘉南渡後。衣冠士人多有之。亦此意也。千金方曰。凡脚氣之病。起始甚微。多不令人識也。食飲嬉戲。氣力如故。惟卒起脚屈伸不能動作異耳。又曰。脚氣之疾。皆由氣寔而死。終無一人以服藥致虛而殞。故其病皆不得大補。亦不可大瀉。縱甚虛羸。亦須微微通泄。宜時取汗也。入門曰。脚氣外症。全類傷寒。但初起脚膝軟弱。頑痺轉筋。赤腫。乃爲異耳。又曰。濕熱在三陽。則宜神秘左經湯。在太陽。麻黃左經湯。在少陽。半夏左經湯。在陽明。大黃左經湯。或加味敗毒散。通宜槓蘇散。濕熱在三陰。則宜羌活導滯湯。搜風丸。枳寔大黃湯。開結導引丸。當歸拈痛湯。氣血虛者。獨活寄生湯。羌活續斷湯。寒濕盛。則宜捉虎丹。病久者。卷栢散。熱甚者。加味蒼栢散。腫甚者。勝濕餅子。桑白皮散。直指曰。脚氣爲病。雖起于足。定周乎身。或

壯熱頭痛。或百節拘攣。或十指走注。或轉筋急痛。或小腹不仁。以至胸滿喘息。煩悶怔忡。昏憤羞明。腹痛下利。嘔噎痰涎。惡聞食氣。二便秘澀。自腿至膝。自脛及踝。屈弱頑痺。攣急痠疼。或炊不燃。或腫不腫。皆其候也。其傳足六經外症。與傷寒頗類。但卒然脚痛爲異耳。又曰。治法大要。疏導大便。使毒氣得泄而後愈。其用湯淋洗。皆醫家之大戒也。醫鑑曰。脚氣治法。用蒼朮白朮以治濕。黃芩黃柏知母以治熱。當歸白芍地黃以調血。楫榔木瓜以調氣。羌活獨活以利關節。而散風濕。兼用木通防己牛膝引諸藥下行。此爲治之大法。清熱瀉濕湯亦可。醫說曰。人黑瘦者易治。肥大肉厚赤白者難愈。黑人耐風濕。赤白人不耐風濕。瘦人肉硬。肥人肉軟。肉軟則受病難愈。

脚氣惡候 千金曰。脚氣病。但覺心下急。氣喘不停。或自汗出。

或乍熱乍寒。其脈促短而數。嘔吐不止者死。上氣脈數。不得臥者亦死。上氣肩息。胸膈逆。臟急者亦死。腳氣脈浮大而緊。此最惡候之脈也。若細而緊。同是惡脈。又曰。腳氣病。其小腹頑痺。不仁者多不腫。小腹頑後。不過三五日。即令人嘔吐。名曰。腳氣入心。死在旦夕。丹溪曰。入腎則腰脚腫。小便閉。氣上喘急。尺脈絕。目皆黑光。以腎乘心。水尅火。死不旋踵。急以八味丸去山藥救之。入門曰。腳氣入腹。喘急欲死。宜木萸湯。杉節湯。三將軍元烏藥平氣湯救之。

禁忌法 外臺秘要曰。第一忌噎。噎則心煩。腳氣發。第二禁大語。大語則傷肺。亦發動。又忌露足。當風入水。以冷水洗足。東垣曰。凡飲食後。宜緩行二三百步。疲倦即止。如此則不能成壅也。凡飲食酒麵。勿過度。過度則脚氣發。慾不可縱。嗜慾多則脚

氣亦發。

以上言未發脚氣平日保養法也。

千金曰：脚氣之病，極忌房室，勿食

牛羊魚肉葱蒜韭菘菜酒麵酥油猪鷄鴨，惟食粳粟醬豉姜椒生果子，犯禁者病不差。入門曰：最忌熱藥蒸泡，恐逼邪入

經絡也。

以上言已發脚氣後保養法也。

脚氣按摩法

養生書曰：涌泉穴在足心，濕氣皆從此入，日夕

之間，常以兩足赤肉更次用一手握指，一手摩擦，數目多時，覺足心熱，即將脚指略略動轉，倦則少歇，脚力強健，無痿弱痠痛之疾矣。

瘡瘍之發，下部爲多，以下部易于傷濕，濕鬱生熱，風邪時毒，又易相侵，故多發外症也。試卽腿以下至足附，詳言其症，其治發于腿髀及陰股者，名曰陰疽，其初起必腰膀發強，口渴，數欲飲而水不能多。

直仙方活命飲

若至七日發，堅腫脹，惡心煩躁者不治，發于腿上，筋

骨之內。痛如錐刺。皮肉全無赤腫。突起者。名附骨疽。俗謂之貼骨腿瘡。外由風露寒濕所侵。內由醇酒厚味所注。與積痰瘀血相搏而成。初起痛不能轉側。寒熱無汗。宜青草蒼朮湯。漏盧飲子。若得微汗便愈。或

至經久寒鬱爲熱。便成膿汁。急用火鍼使毒不得內潰。內急服藥。

宜內消升麻湯。或有至于便秘者。宜漏盧飲子五香連香湯。下之。如體弱不可下。須用分

經內托法。或發在足尖。宜內托羌活湯。或發在腿內。近膝股。蔓腫木硬。宜

托茂柴湯。或發在腿外。宜內托酒煎湯。或發在左腿外側。蔓腫長闊。行走作痛。

以手按至骨大痛。宜黃連消毒散。或初起大痛。而肉色不變。宜三生散。或

漫腫作光色。宜三生散。或以神應膏爲丸。酒下三十九。或堅硬漫腫。不辨肉色。重按大

痛。此候多見于足少陽之分。宜東垣柴胡黍粘子湯。足少陽分者。左腿外側

也。宜大腿近膝股內。便屬足厥陰分。或膿成。便當針刺。若待全熟。

則內潰益甚。收斂愈難。或潰後。亦可以狗頭燒煙熏之。宜平肌散。或起

于伏兔穴。則死不治。穴在腿外膝蓋上六寸。至于未成骨疽。但環

跳穴痛不已。卽宜預防之。宜青草蒼柏湯不效加麻黃一錢用二三貼然附骨疽與緩

疽石疽賊風三者頗相類。不可不辨。蓋緩疽石疽皆由寒氣伏于

骨髓之間而成。其熱勢緩慢。積日不潰。久方紫黑。皮肉俱爛者。名

緩疽。宜內托酒煎湯其腫與皮肉相似。疼而堅硬如石者。名石疽。宜生商

爛和鹽少許塗敷。甚有腫痛。口乾煩熱。四肢拘急者。宜沉由石疽。日換一次卽歇。

推之。又有石瘰。結硬發熱。毒氣攻衝不定。疼痛者是也。宜黃賊風

則由風邪搏于骨髓。故其痛亦徹骨。遇寒則更甚。外症惡寒有汗。

痛處常欲熱熨。失治則變爲攣曲偏枯。宜越然此三者。雖與附骨

疽相類。究竟有別也。發于大腿之內。陰囊之側者。在左名上馬瘡。

在右名下馬瘡。在肛門旁爲肛門瘡。俱屬厥陰經濕熱及七情憂

憤而成。宜內補黃芪湯內托羌活湯十全大補湯繆仲淳云。大抵瘡瘍初發。必腫痛。氣

血鬱積。蒸肉爲膿。其痛宜也。潰膿之後。腫散肌寬。故痛則漸減。若痛還不止。是氣血不足。宜大補之。丹溪河間有虛甚之說。仲瀆此言。蓋指凡屬瘡瘍言之。不獨股疽也。發于腿外側。胯下。名伏兔。發卽前所云起于伏兔穴者是也。必寒熱大作。疼痛無頭。屬足陽明胃經病。固爲不治之症。然急早治之。或可希冀萬一。速用隔蒜灸法。灸而跑起者。猶可治。先汗下之。宜紫金丹隨用止痛消毒藥。宜仙方活命飲。發于膝者。名疵疽。其狀大而肉色不變。寒熱而堅。按之如石者。死症也。若肌肉稍溫。按之不至如石。急用生商陸根擦之。宜犀角湯去升麻加酒牛膝。發于膝上。或有在臂膊者。名人面瘡。狀如人面。眼目口鼻皆具。古書云是冤業所生。須清心悔過乃得。宜十六味流氣飲。久昔者大苦參丸。腎氣丸。昔有人患此瘡。以物餉之。皆能食。灌以酒。面亦赤。醫者歷試諸藥。皆無芒。至貝母。其瘡乃聚眉閉口。因卽取貝母末和水灌入口中。數

日成痂而愈。發于兩膝。壅腫。內外皆痛。寒熱間作。腿日瘦削。膝獨腫大。如鶴之股。膝者名鶴膝風。多由足三陰經虧損。風邪乘之。所

致。初起即當用葱熨法。令其內消為要。着否則內熱食減。肌肉漸

瘦。肢體攣痛。其症有寒熱。齊作者。宜五積交加散。有倏忽發熱者。

乃無根虛火也。宜十全大補湯。有臍腹疼痛。溺頻頭暈吐痰者。宜八有血

虛甚而發熱大渴。面赤脉大者。宜歸芪湯。有陰虛形瘦發熱者。宜腎氣丸。有

挾濕熱者。宜蒼龜丸二妙蒼柏散。有食少面黃者。宜六君子湯。有津液乾。中氣不

足者。宜補中益氣湯。有五成膿潰爛者。宜獨活寄生湯。有膿清而肌肉

不生者。宜八味丸。皆當隨症施治。而總治宜用隔蒜灸法。內服大防風

湯。切不可針刺。以致傷生。而其由來亦有因脚軟痛難行。漸成此

症者。然其名則曰痲風。亦有因傷寒餘毒不能發散。風寒濕氣結

于經絡而成此症者。亦即鶴膝風之原委。而其為治則一。雖然鶴

膝風必兩膝壅腫其大概也若一膝引痛上下不甚腫而微紅則

名膝遊風而不謂之鶴膝風矣宜防風通聖散加木瓜牛膝或換骨丹若但膝之兩

旁腫痛增寒壯熱晝夜偏劇腫處手不可近則名膝眼毒而不謂

之鶴膝風矣宜勝金丹紫金丹仙方活命飲加牛膝若膝蓋上腫痛亦發寒熱則名

膝癰而不謂之鶴膝風矣宜勝金丹紫金丹仙方活命飲加牛膝固知膝腋腫痛之

病有非一端所當辨析以治之者也發于足小肚上半三四寸許

大紅腫堅硬如石痛甚者名黃鰓瘡由肝脾二經濕熱或積怒所

致宜五香湯流氣飲加解毒丹又有足小肚下半生

疔寒熱煩躁名胼胝疔屬腎水不足積熱所致宜仙方活命飲加淮牛膝木瓜黃柏

或八珍湯加牛膝壯寔者下之宜一粒金丹虛及老弱者補之宜金匱腎氣丸又有似

疽非疽似瘡非瘡生于脛上名曰兔齧其狀如赤豆根至骨不急

治則殺人宜仙方活命飲加牛膝又有足脛之間生瘡狀如牛眼或紫或黑

●小淋瀝止處卽爛名濕毒流注緣風雨霧露寒濕邪氣侵入腠

理所致也。宜防風通聖散加牛膝木瓜防已或當歸拈痛湯加牛膝發于膝骨正面及內外兩

廉者名膝瘡而以膝骨正面者爲重以其骨上肉少皮薄難治也

由本有濕熱下注瘀血凝滯又適爲搔傷或磕撲破損而成又日

逐步屢多所傷動又午後氣多下墜愈覺腫痛是以累年不愈致

成頑瘡女人患此或經水往來或裙風相扇更難調治故其名曰

裙風禱口瘡總之膝瘡之治當分正面內外三處其在正面慢腫

作痛或不腫不痛者三陰虛也甚則寒熱交作宜八物湯十全大補湯又有

脾虛挾表邪者宜補中益氣湯加桔梗白芷又有脾虛濕熱流膿口乾食少者

宜補中益氣湯甚則脯熱地炒黑黃柏或挾怒氣宜前方加或更

有爵宜歸脾湯加皆當酌治又有患處黑黯肢體惡寒飲食少思

者肝腎虛敗也宜八味丸甚則內熱口乾宜腎氣丸或腎臟虛風宜四生散黃芪

丸或日久不愈

宜大苦參丸

皆宜酌治。若矣投攻伐之劑亦能殺人其

在外膝有因風濕者

宜洗以葱湯貼龍骨膏

有因風熱者

宜馬齒膏

有因濕熱者

宜蜜土膏

有因血氣凝滯者

宜小駝車丸加乳香少許搽之

皆當酌治其在內膝初起

時宜以鹽湯洗

貼蠟礬紙

勢甚重者

宜桐油膏

或痒甚者

宜斷艾膠或久不愈者

宜先貼蠟礬紙

去瘀肉

皆當酌治總之膝瘡有虫必去虫

宜取虫方

膝瘡有惡

血必去惡血

宜針法

膝瘡極臭爛必去臭治爛

宜粉

而總治膝瘡必

使其去腐生肌數日可愈

宜沈氏二蠟膏

至于禁忌第一房慾第二辛熱

毒物第三多行履守此禁忌目愈不然雖藥何益矣發于內脛或

廉上其瘡如癰初起兩足時熱脚跟作痛失治則延及脛股及遍

身者名腎臟風瘡已詳前陰瘡條內互參可也發于足者名足發

其原有二一由三陰經精血虧損其色微赤雖腫而膿清

宜八一味丸

由三陽經濕熱下注其色赤腫痛而潰膿急用隔蒜灸內服藥以

身形

腿股膝臍脛足瘡瘍

卷三九

九

先解壅毒。宜仙方然後再補氣血。宜補中益氣湯六味丸若色黯黑不腫不

痛。不潰膿。煩熱作渴。小便淋瀝者。乃為陰敗。未傳惡症也。着肉用

桑枝灸。以行壅滯。更服八味丸。十全大補湯。以壯脾胃。滋化源。多

有得生者。若專攻其症。重傷元氣。立斃之道也。發于足旁者。名癩

疽。其狀不大。初從足小指生起。急宜治之。宜東垣柴胡黍粘子湯牛膝湯下若覺

有異者。不可消。宜托裡消毒散加牛膝不治必死。發于足趺者。名陽疽。宜仙方

命飲加牛膝十日可刺。二十日不穴者。死。赤白膿血不多。瘡上痒。及赤

黑者。亦死。發于足指。潰則指自脫者。名脫疽。俗名脫骨疽。或云惟

足大指名脫疽。餘指則名敦疽。此因手大指生瘍。名脫疽。故在足

亦云然也。存泰。但此疽。究為難治之症。赤黑者必死。救之之法。惟

見赤黑。即急去其指。與手大指疽同法。內服仙方活命飲。加牛膝。

如未赤黑。可治也。如初起。焮腫。宜萬病解毒丹必先外解其毒。或未成而腫

痛急用隔蒜灸內服藥

宜仙方活命飲人參敗毒散
加牛膝大黃白芷金銀花

不可令見黑

色則愈其輕者只如蛇傷瘴氣治之可也

宜五神散

發于脚膝始而腫

繼乃潰爛成瘡者名脚氣瘡由腎虛爲風濕所搏攻于腿下足上

或由氣血壅滯濕毒在膚腠不得宣通所致若風毒不散其瘡漸

出黃水腫痛身熱延遲太久亦能傷生至本症方治已詳前脚氣

條茲不贅發于足指四邊焮腫黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸

引上足跌者名甲疽瘡又名嵌甲由足三陰經起于足指氣血阻

而不行結于指甲之間此經絡之所流注非但肌肉之病也或又

因裁剪指甲所傷或因脚長履小研損肉分皆令氣血沮遏至

于潰爛成疽

宜綠礬散
勝金散

但足居下極足指下而更遠氣血易阻藥

力一時難到稍涉虛弱尤宜大補方得斂口尤忌寒涼敷散又有

脚指間濕爛或指甲角入肉刺損作瘡不可着履者須用藥蝕去

惡肉生長好肉

宜枯礬三分研搽

細細割去甲角便差。又有因穿窄

履而生肉刺在指間碍痛不得着履者

宜大棗肉打爛凡此皆甲

疽之屬也。發于足指頭漸腫熱痛爪甲結膿甚至爪甲俱脫者名

代指由熱氣所壅故也。宜烏梅核中仁爲末米醋調成膏先以芒

硝煎湯洗淨浸指于膏內或以猪脂和蚯蚓糞搗敷亦效。發于足

背焮赤腫痛者名足跗發又名足面疽俗名脚發背此處爲肝胃

二經之會多因濕熱乘虛下注也

宜百草膏仙方活命飲加木瓜牛膝肉桂

膿清者不

易治

宜托裡溫中湯十全大補湯

發于足跟者名足跟疽又名兔齧與脛間所

生兔齧名同症異足跟乃足太陽經部分足跟骨下又陰陽二蹻

發源之所又爲腎經所過之地若患瘡毒則蹻氣不能發生腎氣

亦由此而泄若三陰虧損者久不能斂必癩盡氣血而亡故凡漫

腫寒熱體倦少食由脾虛下陷也

宜補中益氣湯

補熱頭痛目不清由脾

虛陰火熾也。宜逍遙散佐以六味丸。咳嗽有痰水虧金耗也。宜十全大補湯八味丸。此

皆當滋其化源勿徒治其外也。婦人足跟足指腫痛足心發熱皆

因胎產或經行失于調理虧損足三陰虛熱所致。故有腫痛或出

膿者。宜六味丸為主。佐以八珍湯。有胃虛少食者。宜六味丸佐以六君子湯。有寒熱內熱者

宜六味丸佐以逍遙散。晡熱甚頭目不清者。宜六味丸佐以補中益氣湯。大凡發熱晡熱

內熱皆陰虛假熱。丹溪云火起九泉陰虛假熱也。酒色過度多患

之。陳文治亦云婦人血虛兩足發熱晡熱月經過期足跟作痛肝

脾血虛也。胸痞吐痰飲食不思脾胃氣虛也。蓋胃爲五臟之根本

胃氣一虛諸病悉至矣。宜補中益氣湯加茯苓半夏。必服藥使胃氣漸復然後

補之。宜補中益氣湯佐以六味丸。大約此症八珍湯是最要之藥。發于足掌心

者名涌泉疽。與足發足趺發症治大畧相似。足心熱者由于陰虛

宜四物湯加知柏。宜補中益氣湯。脾虧最爲此症要

治若專治瘡者往往致死然而此症又有難治易治之分如兩足
心發徹骨者難治如脚心皮微破穴不深膿不多者易治湯藥通
用仙方活命飲托裡消毒散加牛膝檳榔杜仲補中益氣湯腎氣
丸至于潰後則用大防風湯十全大補湯八味丸蓋此固非輕症
也雖然足之爲病正有不可忍者如人走長路被石塊墊腫脚底
不能行步痛不可忍名脚墊毒將舊草鞋浸尿桶內半日燒紅新
鞋放草鞋在上脚踏之令火逼尿氣入裡卽消若不早治必爛入
脚亦能殺人蓋此症古方書罕載惟瘍科選粹有此方故錄之至
尋常走路脚腫痛者亦可用此法治之如脚跟皸裂者用桐油一
碗男髮一握熬至髮化收貯毋令塵入每用以百沸湯洗令軟敷
上卽安如脚指縫搔痒成瘡血出不止者用多年糞桶箍篾燒灰
敷之如脚指縫患沙瘡者以燕窩土畧炒黃栢末香油調敷痛者

加乳香如脚裂縫者以五倍子末同牛骨髓填縫內愈或以蒸藕
研成膏敷之亦愈手裂亦然如脚皸裂至春夏不愈者用生姜細
搗白鹽臘猪油研爛擦入皸內一時雖痛少頃皮合再用則安矣
瘦足瘡瘍原由症治 丹溪曰附骨瘡熱在血分之極初起時
先以青皮行氣甘草節消毒繼而養血誠萬全之法也 薛立
齋曰凡毒在下部藥氣難達勢重者砭患處去毒血仍服當歸
拈痛湯虛者大補之 陳文治曰方書切傳治腫瘡夾膏等方
或效或不效蓋由氣稟與所感不同也要之必因其人或屬陰
虛或屬脾虛或屬陰火或屬肝火或脾氣下陷濕熱滯于下部
必內服湯劑用升舉之法然後外貼膏藥則經絡調和皮膚自
合 立齋又曰脫疽赤色作痛自潰者易治色黑不潰者不治
蓋色赤作痛者元氣虛而濕毒壅盛也急以蒜隔灸次活命飲

托裡散。次用十全湯加減八味丸自效。色黯不痛者。腎氣敗而
虛火盛也。亦用隔蒜灸。加用十全湯加減八味丸。則毒氣不至
上侵。元氣不至虧損。庶可保生。其有因修手足口咬者。惟避湯
火風毒。服藥自愈。華陀曰。治嵌甲。用礪砂乳香各一錢。膩粉
五分。橄欖核三枚。燒存性。黃丹一錢。真麻油調。先用鹽湯洗淨。
拭乾敷之。二次效。丹溪曰。嵌甲卽甲疽。又名陷甲。割甲成瘡。
久不瘥。用黃栢烏頭尖等分爲末。洗淨敷貼。繆仲淳曰。足跟
疽。由臟腑積熱所致。忌毒藥敷貼。宜隔蒜灸之。服活命飲。加牛
膝肉桂。又曰。脚跟瘡久不愈。毒氣攻注。用白朮爲細末。先以搥
漿水溫洗。乾搽上。二日一換。卽能負重涉險。又曰。腿肚上瘡。初
生如粟。以後漸大。爬搔不已。相沿成片。黃水流出。痒不可忍。久
成癩疾。難愈。先用貫仲煎湯洗。後用百藥煎爲末。津調。逐漸塗。

敷。又曰。脚脛生瘡。名曰。榜口。或因磕損而成。其瘡外狹內寬。皮薄極痒。又痛。黃水長流。延蔓而生。甚則十餘年不愈。且易染人。須忌酒色。用韭菜地乾蚯蚓糞爲末。入輕粉清油。或取白狗血調敷自效。

附錄一切癰疽兼症方論

發煩渴

劉涓子曰。熱毒方盛。或發大渴。此乃毒氣攻心。令舌

乾煩渴。但補心氣卽止。薛立齋曰。瘡瘍作渴。焮腫發熱。二便

調和者。熱在上焦也。竹葉石膏湯。瘡痛發熱。大便秘澀者。內臟熱也。

四順清涼飲。焮腫痛甚者。熱毒蘊結也。仙方活命飲。漫腫微痛者。氣血虛

壅也。補中益氣湯。胃火消燦。而津液短少者。竹葉黃芪湯。腎水乾涸。作渴。

口苦乾燥者。加減八味丸。疽愈後發渴。最惡候。惟加減八味丸

最妙。蓋癰疽多因虛而得。疽安發渴。宜服此丸。未渴先服。永不

發渴。

回春日癰疽發渴乃氣血兩虛也。

黃芪六一湯

寒熱。

得效曰癰疽未愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止或連

日或間日。

加味不換金正氣散

薛立齋曰癰疽症口苦寒熱往來肝火

血虛也。

托裏消毒散去白芷連喬金銀花加柴胡熟地

因怒而寒熱肝火氣虛也。前方

胡黃芩不應入珍湯

加山梔棗仁龍胆草體倦寒熱肝脾氣虛也。前方去金喬芷加參芪歸木不應補

氣湯內熱晡熱而寒熱陰血虛也。

前方去三味加芍歸丹皮柴胡不應入珍湯加丹皮效

畏寒者胃氣虛也。

前方去三味加參苓木升麻不應補中益氣湯

脇痛痞滿而寒熱肝

氣滯也。

前方去三味加青皮木香不應屬氣血兩虛加參歸木

作痛。入門曰癰疽不可不痛亦不可大痛未潰時痛爲熱毒

甚或便秘。

內疏黃連湯

膿脹痛者針之已潰膿出而反痛虛也。宜歸芪湯

精義曰癰疽寒熱虛寔皆能爲痛若熱毒痛以寒涼折其熱

若寒邪痛以溫熱熨其寒虛痛補之熱痛瀉之。

綱目曰穢氣

觸而痛。和解之。乳香、芍藥之類。風冷逼而痛。溫散之。防風、桂枝之類。回春曰

膿血既泄。腫痛尤甚。人參、黃芪、湯。薛立齋云。瘡瘍之作。由六淫七

情。其痛因氣血凝滯。如熱毒在內。便秘作痛。導之。內疎黃、熱毒

熾甚。焮腫作痛。解之。黃連、解毒散。不應。瘀血凝滯作痛。和之。乳

定痛。作膿而痛。排之。托裡消毒散。膿脹而痛。針之。膿潰而痛。補之。人

黃芪、湯去。蒼木神麩。氣虛而痛。益之。四君子湯。血虛而痛。養之。四物湯。腎

虛而痛。滋之。六味丸。加歸芪。

嘔逆。丹溪曰。未潰時嘔。當作毒氣上攻治之。乳粉托。潰後。當

作陰虛補之。老年人潰後嘔。不能食。虛也。參苓白朮膏。河間謂瘡瘍

嘔者。濕氣侵于胃也。多用白朮。回春曰。食不能下。服藥而嘔。六君子湯。

加木香。薛立齋曰。作嘔。難泯毒氣上攻。而概用敗毒等藥。如

熱甚。痲痛而嘔。邪氣寔也。解之。仙方活命飲。作膿。焮痛而嘔。胃氣虛

砂仁。

也補之。托裡消毒散膿熱脹痛而嘔氣血虛也泄之。先用托裡消毒散替針丸散之

痛便秘而嘔熱蘊于內也導之。內疏黃連湯又有因寒熱傷胃而嘔

者。托裡健中湯有胃寒少食而嘔者。托裡益中湯有中氣虛寒而嘔者。托

溫中湯有肝木乘脾而嘔者。托裡抑青湯有胃腕疲停而嘔者。托裡清中湯

有因脾虛而嘔者。托裡益黃湯有鬱結傷脾而嘔者。托裡越中湯當各究

其原而施治之。丹溪雖有腫瘍作毒氣上攻。憤瘍作氣虛之說。

亦大概言之耳。大約熱毒內攻者少。胃氣虛寒而嘔者多。

煩躁。繆仲言曰。面目赤色。煩熱作渴。脈大而虛。血脫發躁也。

托裏消毒散去連芷銀花加歸芪佐以當歸補血湯身熱惡衣。欲投涼水。脈沉微。氣脫發

躁也。前方去三味加附桂或用於理中湯。

更如眩暈。薛立齋曰。初腫時頭痛發熱邪在表也。托裡消毒散加川芎

羌頭痛惡寒表虛也。前方去銀花連喬加參芪倦怠眩暈。中氣虛也。前方去三味加

升柴或補中益氣湯加蔓荊子日晡頭痛血虛也。前方去三味加熟地佐以六味丸 夢洩遺精

頭暈痛或痰喘氣促腎虛不能納氣也。前方去三味并川芎佐以六味丸不應大虛寒

也。用八味丸。

喘急 陳文治曰瘡疽喘急恍惚嗜臥肺脉洪數無力此心火

刑肺金也當理氣化痰清肺。人參平肺散 若兼發熱作渴脉洪數有

力此爲火尅金之惡候。加金解毒散 面赤者不治。

痰多 陳文治曰胸膈多痰脾氣虛也。托裡消毒散去三味加桔梗半夏不應六君子

湯加枳椇 補熱多痰脾血虛也。前方去三味加歸地參芪 咳嗽吐痰腎虧津液泛

上也。前方去三味加山萸山藥熟地佐以六味丸

胸痞 薛立齋曰胸痞有由氣滯者。托裡消毒散加桔梗山梔或補中益氣湯加枳椇

若倦怠胸痞氣虛也。前方去三味加參朮茯苓不應八珍湯加柴胡

自汗盜汗 薛立齋曰體痛不寐而汗脾血虛也。托裡消毒散去三味加茯苓

苓遠志素

寐而汗出腎氣虛也。

前方去三味加參
芪歸木五味子

目斜上視

瘍科選粹曰瘡疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤

乃肝挾火邪

故肝脈弦緊洪數必祛肝經之火邪

瀉青丸

甚至有

瀉利者

前方去大黃加荆芥或
用黃連瀉心湯一二貼

四肢沉重

瘍科選粹曰此乃七惡中之五惡也

胃苓湯

若服此

湯脾氣醒濕氣除必須大補

參苓白朮散

大便秘結

東垣曰瘡瘍熱毒深固嘔噦心逆發熱而煩脈沉

而寔腫硬木悶

大便秘結此毒在臟腑宜疏通之故曰疏通其

內以絕其源

內疏黃連湯甚則
用五利大黃湯

又曰瘡瘍及諸面赤雖有伏火

不得妄攻其裡若陽氣拂鬱邪氣在經宜表發以去之故曰火

鬱則發之

白芷升麻湯

繆仲淳曰凡痞脹大便不通乃直腸乾澀

導之

猪膽汁法

或腸胃氣虛血滯不通培養之

十全大補湯

若潰瘍見此

症因氣血虧損。腸胃乾涸。法當大補爲主。若不審虛。是一于疏利。必致大悞。

瀉利。直指曰。瘧疽泄瀉。宜乳粉托裡散。再以木香茯苓煎湯。調下。加味不換金正氣散佐之。回春曰。腹痛泄瀉。咳逆昏憤。

急用托裡溫中湯。薛立齋曰。脾氣虛寒。腸鳴泄瀉。腹冷托裡。

消毒散去三味。加炮姜木香。手足逆冷。虛寒日甚。本方去三味。加附子煎送四神丸。瘍科選粹曰。瘡瘍大便泄瀉。或因寒涼。

剋伐。脾氣虧損。或因脾氣虛弱。食不剋化。或因脾虛下陷。不能。

升舉。或因命門火衰。不能生土。或因腎經虛弱。不能禁止。或因。

脾腎虛寒。不能司職。主治之法。若寒涼傷脾。六君子湯加木香砂仁送一神丸。

脾虛下陷。補中益氣湯送二神丸。命門火衰。八味丸料送四神丸。腎虛不禁。姜附湯加吳萸。

子。五味。脾腎虛寒。參附湯送四神丸。凡腸鳴泄瀉。多屬脾氣虛寒。法宜溫。

身形 腿股膝臍脛足

卷三十九 法

補治如前法多有可生。

小便淋瀝頻數。繆仲淳曰：瘡瘍小便淋瀝頻數，或莖中澀痛。

者，腎經虧損之惡症也。宜補陰。加減丸足脛逆冷者，宜補陽。丸

九。若小便頻而黃，宜滋腎。四物湯加參朮若小便短少，宜補脾。

肺。補中益氣湯加山藥麥冬五味子若熱結膀胱而不利，宜清熱。五淋若脾氣

燥而不能化，宜滋陰。黃芩清肺飲若膀胱陰虛，陽無以生。六味若膀胱

陽虛，陰無以化。滋腎丸腎虛之患，多傳此症，非滋化原不救。若

用知栢反瀉其陽，以速其危。若老人陰痿思慾，精內敗，莖中澀

痛不利者。加減丸味丸加牛膝。薛立齋曰：莖中痛，小便不利。

內敗也。托裡消毒散去三味愈便愈痛。前方去三味食少體倦。

口乾飲熱，小便黃短，脾肺虛熱也。前方去三味加山藥。勞役便

黃元氣陷也。前方去三味加升柴。午後小便黃短，腎虛熱也。前方去三味加升柴煎送。

六味
九

出血。瘍科選粹曰：瘡瘍出血，因五臟之氣虧損，虛火動而安

行也。

犀角地黃湯爲主。

氣血俱虛。

十全大補湯。

陰火動。

六味丸。

氣虛。

補中益氣湯。

又

曰：瘡瘍出血，煩躁，脈洪大無力。

當歸補血湯，或八珍湯，加黃芪、山梔，尤妙。

又曰：血脫

補氣，此陽生陰長之理。

四君子湯，加芍藥、熟地。

若用涼血降火沉陰之劑

則脾土復傷，不但血不歸原，而命亦不保矣。

薛立齋曰：膿多

帶赤，血虛也。

托裡消毒散，去三味，加歸地、參朮，不應入珍湯，加丹皮。

忿怒後，晡熱血出，肝

火血虛也。

前方去三味，加丹皮、山梔、熟地，不應入珍湯。

面青，脇脹而出血，肝氣虛而

不能藏血也。

前方去三味，加山藥、山梔、五味子，兼用六味丸。

食少，體倦，出血，脾氣虛而

不能攝血也。

前方去三味，加參朮、歸地，不能寐，加茯苓、神、棗、仁、遠志、龍眼，或兼用歸脾湯。

陽氣脫陷。

薛立齋曰：瘡瘍，陽氣脫陷，或因尅伐太過，或因膿

血大泄，或吐瀉之後，或因誤入房室，若發熱頭痛，小便淋瀝，或

身形

腿股膝膕脛足瘡瘍

卷五

十七

滑數便血。目赤煩喘。氣短自汗。頭暈倦怠。惡寒汗出如木。此爲無根虛火之假熱症。若畏寒頭痛。喘咳嘔逆。耳聾目矇。小便難。腸鳴瀉利。裡急腹痛。玉莖縮冷。汗牙疼。此爲陽氣脫陷之真寒症。勿論其脉。勿論其瘡。急宜參附補之。

以上十七條。本遍身一切瘡疽之兼症。不獨腿足瘡瘍爲然也。今附錄于後者。亦欲人易于觀覽耳。

治腿股膝脛足病方三十六

越婢加白朮湯

風勝大棗

麻黃

石膏

生姜

甘草

白朮

牛膝丸

因寒

牛膝二兩

川椒五錢

附子一錢

虎脛骨六錢

蜜丸

清暑益氣湯

因暑

人參

黃芪

白朮

蒼朮

麥冬

茯苓

升麻

葛根

黃柏

青皮

歸身

除濕湯

因濕

半夏

蒼朮

厚朴

藿香

陳皮

甘草

白朮

茯苓

木瓜

枳櫨

白芷

姜棗

羌活導氣湯 導氣 羌活 獨活 防已 枳寔 大黃

開結導飲丸 陳皮 枳寔 神曲 乾姜 半夏 澤瀉

四物湯 川芎 當歸 白芍 地黃

金匱腎氣丸 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓

五加皮丸 五加皮 肉桂 牛膝 車前子 茯苓

沈氏腳氣湯 薤白 草薢 五錢 茯苓 桑枝 各三錢 蒼

胡盧巴丸 寒濕 三四服愈 此再平自製方也用之無不效重者不過

酒毒 巴戟 五錢 糯米炒 米微轉色 去米 大

黃一兩 炒 蜜丸 水服 仍須禁酒

杉木節湯 入腹 杉木節 一升 橘葉 切一升 無葉則以

皮代之 軀股膝臙脛足病方 童便 三升 者一升 半分

身形 軀股膝臙脛足病方 卷五十九 十八

生虎骨丸

二服若一服得快即停後服
此方兼治霍亂上氣悶絕者
麻痺生虎骨四兩 金毛狗脊八兩 五加
皮仙靈肝牛膝 白茄根 抽松節各二
兩 獨活一兩

歸鬚湯

右痛 生杜仲一兩 歸鬚 穿山甲各二錢
乾地龍 小茴各一錢 北細辛三分

沈氏苧根湯

腿痛 炒杜仲三錢 炒當歸 酒川斷 核
桃肉 酒杞子 白芷 根各二錢 炒桑枝四
錢 二煎加秦艽 桃仁 紅花各二錢 將藥渣
用絹袋乘熱包在不舒展處運之四五服愈
此再平自製方也用之無不效

神秘左經湯

三陽 麻黃 肉桂 枳殼 黃芩 柴胡
半夏 羌活 赤苓 防風 厚朴 小草
白姜 防已 麥冬 葛根 細辛 甘草各
五分 大棗

加味敗毒散

此方治風寒暑濕流注足三陽經脚膝拘攣
腫痛
又 人參 敗毒散一兩加 大黃 蒼朮各一
錢 姜三片 薄荷七葉 人參 敗毒散加羌
活 獨活 柴胡 前胡 枳殼 桔梗 川芎 赤苓 人參 甘
草各一錢

此方治三陽經脚氣流注脚蹠熱赤腫寒熱自汗

栝蘇散

又 蒼木二錢 香附 蘇葉 陳皮 木瓜 栝 羌活 牛膝各一錢 甘草二分

羌活導滯湯

此方治風濕脚氣腫痛拘攣用此既通氣道三陰 酒煨大黃二錢四分 羌活 獨活各錢二分 防已 歸尾各七分 枳寔五分 微利即止

此方治脚氣初發一身皆痛或肢節腫痛便尿阻隔先以此導之後用當歸拈痛湯除之

當歸拈痛湯

又 羌活 茵陳 酒黃芩 炙草各一錢 知母 澤瀉 赤苓 白朮 猪苓 防已各

六分 人參 苦參 升麻 葛根 當歸 蒼朮各四分 水二盞浸藥時許煎牛空心臨卧各一服

搜風丸

又 黑牽牛子生取頭末二兩 大黃 枳寔 栝 榔各五錢 糊丸米飲下

枳寔大黃湯

又 酒大黃三錢 羌活錢半 當歸一錢 枳寔五分 空心服

開結導引湯

又 陳皮 白朮 澤瀉 茯苓 神曲 麥芽 半夏各一兩 枳寔 青皮 乾姜各五

身形

散藥類經足病方

卷三十九

獨活寄生湯

此方能治脚氣挾食積流注心下痞悶
肝腎虛獨活白芍當歸桑寄生各七
分熟地川芎人參茯苓牛膝杜
仲素元細辛防風肉桂各五分甘
草三分姜三片
此方能治肝腎虛弱筋舉骨痛脚膝偏枯緩弱
冷痺

羌活續斷湯

又羌活防風細辛白芷杜仲酒牛
膝秦艽川斷熟地人參白芍當
歸赤苓肉桂川芎各五分姜三片
前方桑寄生無真者則用此方

捉虎丹

寒濕盛五靈脂白膠香草烏黑豆同煮
去豆木鼈子地龍各兩牛乳香沒藥
當歸各七錢半麝香京墨煨各三錢五
分糯米糊丸茨子大空心酒下一丸趕到脚
面赤腫下散趕至脚心中出黑汗乃除根又
名一粒金丹
此方尚治脚氣走注疼痛不可忍

卷栢散

久病卷栢東向者先用鹽水煮半日再用淡
水煮牛日焙乾黑牽牛子頭末甘遂
椰末二錢五更初濃煎葱白湯調下至辰巳時
得相雜每服各稱一錢惟板

取下惡物如魚凍虛人戒牛隨吃淡物更服湯藥如清熱除濕湯調理之此方主遠年脚氣不愈者惟服此特效

清熱瀉濕湯

又 鹽酒炒黃柏 蒼木各一錢 紫蘇葉 赤芍 木瓜 澤瀉 木通 防已 枳殼 香附 羌活 甘草各七分 樞榔 香 腫加大腹皮 熱加黃連大黃 熱甚 蒼木一錢 白木八分 知母 黃柏 黃芩各六分 當歸 白芍 生地各四分 木瓜 枳榔 羌活 獨活 木通 僕防

加味蒼栢散

已 牛膝各三分 甘草一分 姜三片 腫甚 黑丑二兩取頭末五錢 白丑二兩取頭末五錢 甘遂五錢 喬麥麵兩半水調和 藥作餅子如錢大飯上蒸熱每空心茶嚥一餅 以利爲度 此治遠年脚氣足腫如瓜瓠 又 赤苓二錢 木香 防已 枳榔各錢二分 桑皮 郁李仁各一錢 蘇葉 木通 大腹子 青皮各七分 姜三片

勝濕餅子

頭末五錢 甘遂五錢 喬麥麵兩半水調和 藥作餅子如錢大飯上蒸熱每空心茶嚥一餅 以利爲度 此治遠年脚氣足腫如瓜瓠 又 赤苓二錢 木香 防已 枳榔各錢二分 桑皮 郁李仁各一錢 蘇葉 木通 大腹子 青皮各七分 姜三片

桑白皮散

又 赤苓二錢 木香 防已 枳榔各錢二分 桑皮 郁李仁各一錢 蘇葉 木通 大腹子 青皮各七分 姜三片

木萸湯

入腹 木瓜 枳榔各二錢半 吳萸錢半

三將軍元

又 吳萸 木瓜 大黃 等分 糊丸 枳殼湯 下 此治脚氣冲心大便不通

身形

腿股膝頰腫足病方

卷五 二十

烏藥平氣湯

烏藥一錢 茯神 人參 白芷 白朮 五味子 川芎 木瓜 當歸 白芷 蘇葉各七分

分甘草三分 姜五片 棗二枚
此方端治脚氣上攻昏迷喘促

治腿股膝臏脛足瘡瘍方六十七

仙方活命飲

陰疽 穿山甲 白芷 防風 赤芍 皂角刺 甘草 歸尾 貝母 花粉各一錢 金銀花 陳皮各三錢 乳香 沒藥各一錢 另研末 木酒各半煎送下二末

青草蒼栢湯

附骨疽 蒼朮 黃栢各三錢 青皮錢半 甘草五分 加姜汁少調 虛人加牛膝一錢 夏加黃芩八分 冬加桂枝五分 痛甚無汗加麻黃二分 此能治環跳穴痛不已

內消升麻湯

又 升麻 枳殼 黃芩 當歸 白芍 獨活 枳實 升麻 枳實 升

漏蘆飲子

又 漏蘆 白芍 甘草 黃芩 麻黃 枳實 升

五香連喬湯

又 五香 連喬 射干 獨活 升麻 枳實 升

煎取利為效
此方兼治諸瘡初覺一二日厥逆咽喉寒發寒熱如不用五香各七味連喬湯

內托羌活湯

羌活 黃栢各一錢 防風 蒼朮 陳皮各八分 肉桂五分 連

內托芪柴湯

黃芪二錢 柴胡一錢 羌活五分 生地 連

內托酒煎湯

黃栢各二分 歸尾七分 柴胡一錢 羌活五分 生地 連

內托酒煎湯

黃栢各二分 歸尾七分 柴胡一錢 羌活五分 生地 連

內托酒煎湯

黃栢各二分 歸尾七分 柴胡一錢 羌活五分 生地 連

內托酒煎湯

黃栢各二分 歸尾七分 柴胡一錢 羌活五分 生地 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

黃連消毒散

黃連 酒生地 酒歸身 羌活 連

三蘇散

蘇梗 香附各二錢 甘草 陳皮 栝

身形

腿股膝臍脛足瘡瘍方

卷三九 二十一

神應膏

又富歸兩一錢 赤芍 大黃各兩半 白芷 官桂各一兩 元參兩三錢 川斷兩二

錢 莪朮九錢 生地兩二錢 真香油二斤 浸藥 春五夏三秋七冬十 日熬黑去渣夏用黃

丹二十兩冬十五兩漸下不任攪滴水沉為度 此藥本治漏瘡寒孔內并作貼子護

又連喬 內桂各一錢 黃栢 炙草各五 分 歸梢 黃芪各二錢 柴胡 鼠粘子各

柴胡鼠粘子湯

錢半 酒煎空心服服後即飯不使熱藥犯上 焦也

又蜜陀僧煨赤色 花蕊石煨赤色 白龍 骨各一兩 黃丹炒 乳香另研 黃連各二

平肌散

錢半 輕粉一錢 研極細乾摻 此方兼治諸瘡久不斂

石廬 沉香 當歸 木香 防風各七錢半 羚羊 角 麥冬 當歸 枳殼 升麻 元參 羚羊

沉香湯

每末 四錢 水煎服 生甘草各一兩 炒大黃二兩

石廬 黃連 大黃 牙硝 白欬 黃栢各 一兩 血竭 青藍各五錢 赤小豆半合

黃連散

杏仁 去皮尖 四十九粒 蜜水調塗乾即易之

賦風

越婢湯

賦風

內補黃芪湯

股疽 黃芪二錢 鹽水炒 熟地 人參 茯苓
苓 炙草各五分 白芍 川芎 官桂 遠志
三枚 當歸各八分 麥冬五分 姜三片 棗

十全大補湯

又 人參 茯苓 白朮 炙草 川芎 當歸
白芍 熟地 黃芪 肉桂 姜 棗

紫金丹

犀角湯

痘疽 犀角 木香各七錢半 山梔仁 連
喬 射干 當歸 赤芍 升麻 元參 枳
壳 生甘草各一兩 大黃二兩 每末三錢
水煎服 此兼治癰疽腫硬如石久不作膿

十六味氣飲

人面 人參 黃芪 當歸 各一錢 川芎
肉桂 厚朴 白芷 甘草 防風 枳椇
烏藥 白芍 枳壳 木香各五分 桔梗
皮一分 紫蘇 錢半 水煎食後服若因怒加青

大苦參丸

又 苦參二兩 防風 荆芥 白芷 生川
烏 赤芍 首烏 川芎 獨活 蔓荊子
山梔 皂角 赤苓 山藥 羌活 黃芪
白茯苓 白附子各五錢 炮草烏 錢半 麵
糊丸空心酒茶任下

金匱腎氣丸

又熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤
附子 肉桂 牛膝 車前子 黃

五積交加散

枝 鶴膝 風 白芷 當歸 茯苓 半夏 川桂
皮 川芎 白芍 甘草 枳殼 麻黃 陳

活 獨活 柴胡 前胡 此即五積散合人
參 敗毒散也

此方兼治寒濕身軀重痛腰脚痠疼

八味丸

又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤
附子 肉桂

歸芪湯

又 當歸 一錢 黃芪 五錢

蒼龜丸

又 蒼木 白芍 龜板 各二兩半 黃栢 五
錢 芩 每五十九丸 四物湯加陳皮甘草煎

湯下 此方兼治痢後脚弱漸小

二妙蒼栢散

又 蒼木 鹽炒 黃栢 酒炒 各五錢 水煎服
二物 皆有雄壯之氣 寔加酒少許 氣虛加

補氣 藥血虛加補血 藥痛加姜汁 或為末為丸
皆可

此方兼治一切風寒濕熱脚氣骨間作熱或腰
膝疼痺腫痛令人痿痺用之神效

六君子湯

又 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏 陳
皮

補中益氣湯又

獨活寄生湯

又 獨活 桑寄生 白芍 當歸 各七分
熟地 川芎 人參 茯苓 牛膝 杜仲
秦艽 細辛 防風 肉桂 各五分 甘草 三

大防風湯

又 熟地 防風 杜仲 姜汁炒 當歸 黃
芪 白芍 各一錢 附子 炙草 各五分 白木
羌活 人參 酒 牛膝 服此方 芎歸 芍地 以補

血 參 芪 木 草 以 補 氣 羌 活 防 以 散 風 濕 利 關 節 杜
仲 牛 膝 以 補 腰 膝 附 子 以 行 參 芪 之 氣 而 走 周

身 脉 絡 乃 治 氣 血 兩 虛 扶 風 濕 而 成 痿 痺 之 聖
藥 豈 但 治 鶴 膝 而 已 但 不 可 以 之 治 有 餘 耳 大

膝 遊 風 結 梗 赤 芍 芒 硝 川 芎 滑 石 煨 大
黃 山 梔 白 木 荆 芥 石 膏 川 芎 滑 石 煨 大

防風通聖散

山 梔 白 木 荆 芥 石 膏 川 芎 滑 石 煨 大
黃 山 梔 白 木 荆 芥 石 膏 川 芎 滑 石 煨 大

勝金丹

錢 雄 黃 白 砒 製 麝 香 各 五 分 煎 蟬 酥 一
錢 雄 黃 白 砒 製 麝 香 各 五 分 煎 蟬 酥 一

半 錢 全 蠟 炮 辰 砂 乳 香 各 五 分 煎 蟬 酥 一
三 錢 姜 蚕 炒 五 錢 每 末 三 錢 砂 糖 調 蔥 頭

酒 送 下 取 汗

身形

腿股膝脛足瘡湯方

卷二十九 二十三

五香湯

黃鱖魚 青木香 藿香 沉香 丁香 薑
陸香各一兩

流氣飲

又 人參 肉桂 桔梗 當歸 黃芪 枳殼 防
草 厚朴 紫蘇 白芍 烏藥 生薑 痛
風 枳殼 川芎 白芷 木香 胃虛加陳皮
加乳香沒藥 氣滯加香附 胃虛加陳皮
流注加羌活獨活 此乃行氣散血之劑不宜
多服以致氣血虛耗反不能成膿也 此又名
瘡科流氣飲
此方主治怒氣結成核腫硬及風寒濕熱搏結
經絡或血氣不和結成腫塊漫腫木悶者神效

當歸拈痛湯

濕毒

一粒金丹

脾腦疽 沉香 木香 乳香各五分 巴霜
錢牛 棗肉丸服法詳在前

八物湯

腫瘡

歸脾湯

又

黃芪丸

又 黃芪 烏藥 地龍 茴香 川棟肉
川椒 防風 赤小豆 白蒺藜 海桐皮
威靈仙 陳皮 等分 酒糊丸空心酒下三
十九

四生散

此方治腎臟虛風攻注手足頭面麻痺痛痒

或生瘡疥癩瘡癩腫

又生白附子生黃芪生獨活生蒺藜

龍骨膏

此方治風濕熱空連腰子細嚼鹽酒下

末濕帶包煨熟空連腰子細嚼鹽酒下

馬齒膏

又馬齒莧煎汁一鍋去渣入黃蠟五兩漫火

窰土膏

又窰土或只用灶心土黃丹等分輕

小駝車丸

油調成膏用傘蒂夾住茶清洗過貼之以絹縛

蠟礬紙

雖痒不可動直待成痂方揭未愈再貼

小駝車丸

又黃連六錢阿膠三錢當歸二錢乾

小駝車丸

又麻油二兩川椒四十九粒銅鈞內煎

小駝車丸

兩輕粉研二錢枯礬研一錢候化將棉

小駝車丸

透為度勿使昏黃先以槐枝葱椒煎湯洗將帛

小駝車丸

貼上用油帛包裏紅絹緊扎一周時揭起去

身

卷三九

近內帑一層十二日揭盡瘡愈

桐油膏

又桐油 百草霜 髮灰 黃丹 乳香
鹿角灰各三錢 共爲細末熬膏塗油帑上貼
之血虛痛甚者尤宜如年久紫黑者先用爐灰
膏去瘀肉

蕪艾膏

又蕪艾 川椒各五錢 黃丹三錢 水飛
水粉一兩 輕粉一錢 熟麻油調膏隔帑貼
又響糖爐內灰一升半 風化石灰一升炒
紅盛箕內用滾湯三碗徐徐淋汁浸火熬如
稀糊先下 巴霜次下 蟾酥各二錢 白丁
香研末五分 炒石灰一錢 攪勻再熬如麵
糊磁器盛勿洩氣每用以簪頭挑少許口呵氣
令化以針撥開患處貼之

爐灰膏

黃蠟膏

此方治一切無名腫毒惡瘡及外痔瘰癧兼除
癩點痣有膿去膿無膿即散惟好肉及眼上忌
用如點瘰癧去蟾酥加輕粉一錢痛者加乳香
沒藥各一錢瘡毒只用灰膏不必用藥
又藥香油一兩入胎髮梅大一團熬化入
白膠香黃蠟各一兩化再入龍骨赤石
脂血竭三末各一兩攪勻候冷磁器收每用
捏作薄片貼瘡上外以絹縛三日後翻貼外面
又以活血藥煎湯洗

取虫方

又以生鱗魚數條以清油塗臍下置瘡上盤屈以帛繫定少頃痒不可忍然後取視臍下有小

針法

又洗淨乃貼膏藥忌日火光火氣陽氣如黑腫未盡可再出血以紫黑血盡為度

粉麝散

又煨放冷為末入輕粉一錢和勻先以葱湯洗後塗上

沈氏二蠟膏

又蠟白礬各二錢化離火俟沸稍定入東丹三錢急急攪勻倒在碗內放陰土地上一日夜去火毒然後將藥塗上如錢厚以油搥貼外以粗草帚畧揉軟蓋上絹帛縛之每日一洗一塗縛扎如法數日即愈矣但瘡雖愈四邊必多水泡痒極切不可爬搔若搔碎即又成瘡矣故雖愈仍將藥照舊洗塗并水泡亦塗在內如是三四日全愈不痒矣此再平自製方也屢試屢驗并治下部淫毒瘡

身形

起股膝臍足瘡瘍方

托裡消毒散

癰疽 人參 鹽水炒黃芪 酒當歸 炒白芍 炒白木 川芎 茯苓各一錢 白芷

金銀花 連喬各七分 炙草五分

萬病解毒丹

又五倍子搥碎洗淨焙乾三兩 山茨菇去

皮淨末二兩 千金子去壳油淨霜 大戟去

蘆焙乾為末各一兩 麝香三錢另研 糯米

濃飲丸分為四十錠此藥能應諸病各有神效

若瘡疽用東流水磨塗並可服須端午日合

一名玉樞丹 一名紫金錠 一名萬病解毒丸

砂雄黃各一兩 一名神仙萬病解毒丸 一方有全蝎朱

脫疽 人參 羌活 獨活 柴胡 前胡

桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草各一錢

又金線鈞葫蘆 紫河車各二錢 千金子

霜 雄黃各一錢 麝香少許 醋調塗之

此方兼治一切蛇蝎傷瘡毒氣 毒盛者以刀

割去死肉以末搽之

甲疽 綠礬煨過五錢 蓋會錢半 麝香一

字 共研末照指作絹袋盛藥套指上以線扎

住久而自愈 製綠礬法用綠礬三兩鐵盤內

炭火封煨火燻礬熔流出液汁如鎔金者汁盡

綠礬散

去火依冷取其赤似黃丹者用之 或以此礬

為主入乳香三分之一為末鹽湯洗淨拭乾敷

勝金散

百膏

之治傷甲肌浸淫腫痛流出黃水漸引上脚四
邊腫爛如火燒瘡內服勝金散
又壯癩厚頭生研爲末每二錢酒研花
下日三服已潰者以綠礬散敷之
足跡發羊糞三十粒瓦上炙烟盡覆地存性
研篩先用椒湯洗淨麻油調敷痒加輕粉少
許痛加麝香少許以山茶葉裏之絹縛

托裡溫中湯

又附子 羌活各四錢 炒乾姜二錢 炙
甘草二錢 丁香 益智仁 沉香 木香
茴香 陳皮各一錢 姜

消遥散

六味丸

加減八味丸

此方前治瘡瘍濃潰元氣虛寒或過服尅伐以
致胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏瀉神思昏憤此
寒變內陷緩則不治
足跟疽 柴胡 白芍 白朮 茯苓 當歸
身 麥冬各一錢 甘草 薄荷各五分 姜
又 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤
傷 脫疽 熟地八兩 茯苓 丹皮 澤瀉各三
兩 肉桂 五味子各一兩 山藥 山萸各
四兩 蜜丸 一方五味二兩 山萸 山藥 丹皮
各一兩 茯苓 澤瀉 肉桂 各五錢 生地 二兩 酒蒸
搗膏

附錄一切癩疽兼症方

竹葉石膏湯

煩渴 淡竹葉 石膏 桔梗 木通 炙甘草 薄荷各一兩 水煎

四順清涼飲

又 大黃 當歸 赤芍 炙草各錢二分 薄荷十葉

仙方活命飲

又 穿山甲 白芷 防風 甘草 赤芍 花粉 歸尾 貝母 角刺各一錢 陳皮 金銀花各三分 乳香 沒藥各一錢另研

補中益氣湯

又 人參 黃芪 歸身 白朮 陳皮 甘草 升麻 柴胡

竹葉黃芪湯

又 生地 黃芪各二錢 竹葉 當歸 芍 甘草 白芍 黃芩 人參 花粉各一 錢 熟石膏錢半 麥冬二錢 姜三片

此方治癩疽大渴發熱小便如淋

加減八味丸

又 熟地 茯苓 丹皮 澤瀉 肉桂 五味子 山藥 山萸 分量見前

黃芪六一湯

又 黃芪 鹽水炙六兩 甘草一兩半生半熟 每末一兩水煎加人參九妙或白湯下二錢

加味不換金正氣散

寒熱 蒼朮 橘紅 半夏 藿香葉 厚 樸 谷錢二分半 炙草一錢 茯苓 川芎各 七分半 木香五分 姜五 棗二

托裡消毒散

又 人參 黃芪 當歸 白芍 白木 川芎 茯苓各一錢 白芷 金銀花各七分 炙草 連喬各五分

內疎黃連湯

作癩 黃連 黃芩 山梔 白芍 薄荷 當歸 枳榔 桔梗 甘草 木香各一錢 連喬 大黃各錢半 水煎量入虛寒而用

人參黃芪湯

又 人參 麥冬 蒼朮 當歸 神曲 白朮 甘草 陳皮 五味各一錢 蜜黃芪二錢 黃栢 升麻各四分 姜棗

黃連解毒散

此方端治膿血大泄臭敗作痛 薛云此症乃七惡中之二宜治以此方亦有潰後虛而發熱或作痛者尤妙若痛止而大便不寔去黃栢麥冬 又 黃連 黃芩 黃栢 山梔

歸芪湯

又 黃芪 當歸 瓜蒌 甘草 角刺 金銀花各一錢 水煎好去渣入乳香加酒再煎 服或加貝母花粉穿山甲尤妙

四君子湯

又 人參 茯苓 白朮 甘草

四物湯

又 川芎 當歸 白芍 熟地

六味丸

又

熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤

乳香定痛散

又

乳香 沒藥各五錢 寒水石 滑石各一兩 冰片一錢 共為末 搗過 立止 加南星 半夏 能止痛 加蓖麻仁 尤佳

乳粉托裡散

又

甘草 芍藥 茯苓 白朮 各二錢 甘草湯調時 啣下 乳香 一錢 共為末 搗

參苓白朮膏

又

人參 茯苓 白朮 山藥 炙甘草 各一兩 苡仁 蓮肉 桔梗 砂仁 白扁豆 各五錢

六君子湯

又

人參 茯苓 白朮 炙草 半夏 陳

托裡健中湯

又

牛夏 炮姜 各一錢 炙草 五分 黃芪 錢半 人參 白朮 茯苓 各二錢 肉桂 三分

托裡益中湯

又

木香 附子 羌活 各四錢 炒乾姜 三錢 炮

托裡溫中湯

又

丁香 羌活 各四錢 炒乾姜 三錢 木香 沉香 各

香 陳皮各一錢 姜 棗

托裡抑青湯

胡人參 白芍 甘草各五分 茯苓 陳皮各一分 姜 棗

托裡清中湯

夏人參 桔梗七分 甘草五分 陳皮各一分 姜 棗

托裡益黃湯

又人參 白芍 丁香 茯苓 陳皮 半夏各一錢

托裡越麴湯

又錢人參 白芍 川芎 香附 蒼朮各七分 炙

當歸補血湯

煩躁 黃芪一兩 酒當歸三錢

八味丸

頭痛眩暈 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓

人參平肺散

喘急 桑皮 知母各七分 杏仁 紫蘇

如金解毒散

又三片 地骨皮 橘紅 半夏 茯苓 青皮 人參 各一錢 五味子二十一粒 甘草五分 姜

瀉青丸

目斜 川芎 當歸 山梔 羌活 防風
大黃 龍胆草 等分 蜜丸 茨子 大竹葉湯下
一二丸 日進三四服 如瀉者去大黃加荊芥

黃連瀉心湯

又

胃苓湯

四苓 厚朴 陳皮 白朮 甘草各一錢
茯苓 錢七分 白芍 澤瀉 木香各一錢
官桂 五分 竹葉 二十片 蒼朮 二錢 姜三

參苓白朮散

又 人參 茯苓 白朮 蓮肉 砂仁 苡
仁 山藥 各二兩 桔梗 甘草 菖豆炒各
一兩 每末二錢 石膏補湯下

五利大黃湯

大便秘 大黃 黃芩 升麻 各錢二分 芒
硝 山梔 各一錢 水煎 稍熱服

白芷升麻湯

又 白芷 七分 升麻 桔梗 各五分 甘草
生 黃芩 生 歸梢 生地 各一錢 肉桂
紅花 各分半 酒黃芩 連翹 各二錢 水酒
各半煎

十全大補湯

又

二神丸

瀉利 破故布 四兩 肉豆蔻 二兩 紅棗 四
十枚 生姜 四兩 煮丸 食前白湯下

四神丸

此方主五更泄瀉大便不寔不應乃命門火衰
急佐以八味丸補火生土

又破故帛四兩 肉豆蔻 五味子各二兩
吳茱萸二兩 紅棗百枚生薑八兩煮丸食前

白湯下

姜附湯

此方主脾氣虛弱大便不寔飲食不健小腹
又 人參 附子各五錢 炮姜 白朮各二

錢半

此方主瘡家真陽虧損或誤行汗下或膿血
出多失于補托以致上氣喘急自汗盜汗氣短
頭暈等症

參附湯

又 人參 附子各五錢 姜五片水煎服

玉淋散

淋瀝 甘草 當歸各錢半 山梔 赤芍各

二錢 赤苓二錢半 煎加燈心

此方主膀胱有熱水道不通或小便如豆汁
或如砂石或如凍膏或沸熱便血

黃芩清肺飲

又

滋腎丸

又 酒知母 酒黃柏各一兩 肉桂二錢
水丸

犀角地黄湯

此方主腎陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟凡不
渴而小便秘者熱在下焦血分最宜此藥
出血 犀角 生地 赤芍 丹皮各錢半
升麻 黃芩炒各一錢 如怒傷加柴胡山梔
如脾虛不能揮血用歸脾湯 如肝脾火動
而妄行用加味逍遙散 如血虛有火用四物
湯加炮姜 如腎經有火用六味丸

歸脾湯

又

加味逍遙散

又 白芍 白朮各錢二分 知母 當歸
地骨皮各一錢 茯苓 麥冬 生地各八分
山梔 黃柏各五分 桔梗 生甘草各三
分 水煎服

沈氏尊生書卷三十

雜病源流犀燭 身形門

跌撲閃挫源流

沈金鰲撰

跌撲閃挫卒然身受。由外及內。氣血俱傷。病也。何言之。凡人忽跌。忽閃挫。皆屬無心。故其時本不知有跌與閃挫之將至也。而忽然跌。忽然閃挫。必氣爲之震。震則激。激則壅。壅則氣之周流一身者。忽因所壅而凝聚一處。是氣失其所以爲氣矣。氣運乎血。血本隨氣以周流。氣凝則血亦凝矣。氣凝在何處。則血亦凝在何處矣。夫至氣滯血瘀。則作腫作痛。諸變百出。雖受跌受閃挫者。爲一身之皮肉筋骨。而氣既滯。血既瘀。其損傷之患。必由外侵內。而經絡臟腑。并與俱傷。其爲病有不可勝言。無從逆料者矣。至于打撲。有受人譴責者。有與人聞毆者。雖不盡無心。然當譴責聞毆之時。其氣

必壅其血。必凝固。與跌閃挫無異也。其由外侵內。而經絡臟腑之
俱傷。亦與跌閃挫無異也。故跌撲閃挫。方書謂之傷科。俗謂之內
傷。其言內而不言外者。明乎傷在外。而病必及內。其治之之法。亦
必于經絡臟腑間求之。而爲之。行氣爲之。行血不得徒從外塗抹
之已也。古來傷科書甚多。莫善于薛立齋分症主治諸法。及陳文
治按處施治之法。今特卽二家書。採其語之切要者。著爲篇。而傷
科之治。無遺法矣。陳氏曰。凡治顛撲迷悶。急宜酒化蘇合丸灌醒顛撲損傷。
急宜酒蘇木調服蘇合丸大法。固以血之或瘀。或失分虛。是而爲補。瀉亦當看
傷之輕重。輕者頽挫。氣血凝滯。作痛。此當導氣行血而已。若重者
傷筋折骨。必須接續。但欲接續。非數月不爲功。倘使氣血內停。沮
塞真氣。不得行者。必死。急瀉其血。宜鷄鳴散下瘀血方通其氣。宜和氣飲烏藥順氣散
庶可施治。大凡損傷。寒涼藥一毫俱不可用。蓋血見寒則凝也。若

飲冷致血入心卽死。惟看有外傷者當內外兼治。若外無所傷但

內有死血。惟用蘇木等治血之藥。可下者下之。鷄鳴散是也。亦有

血迷心竅而致昏沉。不知人事者。宜花蕊石散童便調服有神魄散失一時

不知人事者。惟在臨期斟酌。大抵跌撲之病。全要補氣行血。若自

然銅之類。雖有接骨之功。而燥散之害。甚于刀劍。丹溪備言之矣。

故初傷。只用蘇木活血。黃連降火。白朮當歸和中補血。加童便製

炒爲要。又有損傷瘀血攻心。不能言語者。宜清上瘀血湯。下破

調理又有損傷出血太多。頭目暈眩者。先用當歸川芎煎服。次加

白芍熟地。續斷防風。荆芥羌活。獨活南星。加重便服。切不可用酒

煎酒煎。則氣逆上。恐頭目益眩也。如出血少。內有瘀血。以生料四

物湯一牛。和獨聖散一牛煎服。皮血未破者。煎成少加酒服。又有

墮傷。內有瘀血。腹脹滿不痛。或胸脇痛者。宜用破血藥。清心藥。及

通利之劑其痛不止者

宜獨聖散

用乳香沒藥極散血止痛故此二味

損傷藥中斷不可缺又酒煎蘇木和童便服乃傷科單方大妙止

痛兼補宜當歸補血湯若皮肉不破損瘀血停滯者先用獨聖散

次服破血藥隨宜加減以上言傷科大概要法也若陳氏逐處施

治其法又有可條析者如腦骨傷破用輕手搥捺平正不破以膏

藥貼之

宜退腫膏

若骨不損而但皮破肉傷者護之

先搥封口藥外血以散血膏貼

流不止者止之

宜搽止血散

慎勿見風致成破傷風便又費手雖然腦

骨傷損在硬處猶易治在太陽穴則不可治須依上用藥若欲洗

之須用熟油和藥水洗或溫茶洗諸處法亦畧同如面傷青黑宜

用敷藥

宜一紫散

或貼膏藥

宜紫金膏

傷重者亦宜貼膏

宜補肉藥

既治外然後

隨宜服藥以治內至于腦兩角及眉稜耳鼻等處與治面數法畧

同如跌磕損傷牙齒或落或碎皆宜外內兼治

外宜搽補肌散及扶封口藥內服破

血藥用水煎。或傷齒而未動。宜參芩或已動。宜茯苓根燒存。性燥之即固。俱不

同治。如胸膈骨爲拳搥所傷。外腫內痛。外宜貼定痛膏。內宜服破血藥。利去瘀血

如膈筋傷重。血不通。用菘豆汁。生姜汁和服。使吐力人在後擠住。

自吐出血。再服藥。宜破血藥。如跌撲脇痛。血歸肝也。宜破血消痛湯。亦

利去惡血。總之顛撲壓墜。專怕惡心。必有惡血在內。先要清心。宜

藥打血。宜破血藥。通利大小腸。次第服之。每服加童便一杯入藥。立效。

其顛撲傷重者。先服清心藥。次可服清小便藥。再次服去血藥。令

血從瘡口出。或結在內。則打入大腸而泄出。或惡血未積者。打入

四肢。或歸臟腑。或歸上膈。從口中出。或歸中膈。入大腸出。用此急

救。隨服止痛藥。宜二十五味藥。方中加減用。蓋以傷重與傷輕者不同治。傷輕

止。須通氣活血。便愈。傷重則非急速治之。且重藥治之。勿效也。傷

者急宜以姜湯燈心湯。調二十五味藥服。立效。其發熱體寔。宜疎風散惡寒體弱者。宜五積

身形 跌撲閃挫

卷三十一

始固不同治。後之調理畧同。

服敗毒五積後俱宜用黃白紅黑四未子及補損丹調治。如老人

跌墮不可轉側。其治與吐盛人有異。

宜先用蘇木參芪芎歸陳皮甘草煎服。後卽以此湯調四

未子或補損丹活血丹。

如小兒跌撲疼痛止須順氣。宜蘿蔔子煎服。又與老人有異。

以上言跌撲損傷之在皮肉氣血間者。未及于筋骨也。若在筋骨

陳氏施治之法。又有可條析者。如腦骨破碎已詳在前。如胸骨筋

斷必須接之。宜先用破血藥後貼定痛膏接骨丹。

若但皮破止貼補肉膏。如傷腹腸

出急以麻油潤瘡口。輕手納入。以吹藥少許吹鼻。

宜通開散。令噴嚏。其

腸自入。用桑白皮線將腹皮縫合。以封口藥塗傷處。外用藥敷貼。

宜鴉子清調補肌散或散血膏尤妙。

線上用花蕊石散敷之。總之腹內被傷皆當急

利大小腸。不可使其秘結。以致重患。如手足骨折斷縛之中間要

帶緊。兩頭畧放鬆。庶乎氣血流利。若如截竹斷却要兩頭緊。中間

寬。使氣血來聚。斷處俱用藥敷貼夾縛。

宜定痛膏接骨丹。

如手指跌撲損

傷及刀斧打碎用鷄子黃油潤之次按封口藥外貼膏藥宜散膏

片縛定若咬傷則另治宜釋蘭散敷之若有寒熱又另治宜敷退熱散寒熱已即去之

如脚有六臼四折骨凡脚板上交胛處或挫出臼須用一人拽正

自摸其骨或突出在內或出在外須用手力整歸窠若只拽不用

手整便成痼疾整後用藥敷貼宜定痛膏接骨丹四折骨用正副夾縛六

出臼只以布包不可夾手臂出臼與足骨同如脚大腿出臼此處

身上骨是臼腿根是杵或前出或後出須用一人手把住患人身

一人拽脚用手盡力搨令歸窠或是剝開可用軟綿繩從脚縛倒

吊起用手整骨節從上墜下自然歸窠再用膏藥敷貼夾縛凡出

臼急與接入臼中若血浸臼中即難治總之腰腿脚骨等傷甚難

整當臨時相度隨其傷處用法整頓歸元先用麻藥與服宜麻藥方令

不知痛然後用手藥加杜仲又以手足筋脉最多時時要曲直不

可定放。又時時看顧。恐再致出窠也。如手脚骨被壓碎者。以麻藥與服。或用刀刮開尖骨。用剪刀剪去骨鋒。或粉碎者去之。免膿血之禍。後用大片桑皮。以補肉膏定痛膏糊在桑皮上。夾貼骨肉上。莫令不正。致有差錯。三日一洗。勿令臭穢。徐用藥治。如皮裏有碎骨。只用定痛膏接骨膏敷貼夾縛。如十分傷。自然爛開肉。其碎骨自出。然後摻補肌散。外以補肉膏敷貼。如骨斷皮破者。不可用酒煎藥。或損在內而破皮者。可加童便在破血藥內和服。若骨斷皮不破。可全用酒煎藥。若只傷而骨不折。肉不破。宜用藥治。宜消腫膏定痛散。如損傷平處。骨斷碎皮不破者。用接骨定痛等膏敷貼夾縛。若手足曲直伸縮處。只用包裹。令時時轉動。指骨碎者。只用苳麻夾縛。腿上用苳繩夾縛。冬用熱縛。夏冷縛。餘月溫縛。束縛處。須藥水。以時泡洗。夏二冬四。春秋三月。洗去舊藥。須仔細。勿驚動損處。洗

訖仍用前膏敷縛其束縛之法。用杉木浸軟去粗皮。皮上用蕉葉或薄紙攤藥。移至傷處。杉木爲夾。再用竹片去黃用青爲副夾。疎排周圍以小繩三度縛。縛時相度高下遠近。使損處氣血相續。有緊有寬。說見前條。二三日一次換藥。一月之後方另以膏貼之。宜益膏仍用正夾夾住。令損處堅固。如敷貼後疼痛不止。可量加乳香沒藥白芷南星楓香肉桂獨活等味。令溫煖。痛卽止。刀斧傷去肉桂南星獨活。如傷重者。麻而不痛。須板伸捺正。或用刀開皮。二三日方知痛。且先勻氣。如折骨出臼。不可用下瘀血之藥。及通利藥。宜踈風順氣。勻血定痛。補損而已。如換藥切不可生換。用手巾打濕搨潤。逐片取脫。隨手盪洗換上。又不可停留一時。須預先攤貼。隨手換上。如服損藥不可食冷物。若服草藥所生之骨必大。又損藥必熱。能生氣血以接骨。忌用火灸。損藥用酒忌灰酒。然重傷便

身形

跌撲閃挫

卷五

五

用酒反承其氣作腹脹胸滿必須稍定方用酒或酒水煎如敷貼等草藥必新採鮮的爲效平時採取末之聽用可也如跌傷出血痛不可忍乃風寒所着宜用葱杵入鹽少許炒熱罨之痛卽止冷則再溫之又法凡傷痛取大葱新折者入灰火煨擘葱內臑汁罨傷處續續多罨只要熱者三四易卽痛止搗爛仍封損處卽跌殺等傷氣未絕者取葱白炒大熱徧敷傷處頃再易其痛自止以上皆陳氏逐處損傷施治之法也醫者各隨其處所傷又卽所兼症叅以薛氏分症主治之法于傷科亦奚難哉按薛氏法如傷家脇肋脹痛若大便通和喘咳吐痰者肝火侮肺金也宜小柴胡湯加青皮山梔若兼胸腹痛大便不通喘咳吐血者瘀血停滯也宜當歸導滯散若肝火之症本脉必大兩脇熱脹但多飲童便再服藥宜小柴胡湯加黃連山梔歸尾紅花又肝脉浮而無力以手按其腹反不脹者此血虛而肝脹也宜四物湯加參

甘草青皮

若肝脉洪而有力。胸脇脹痛。按之亦痛。此怒氣傷肝也。宜

柴胡湯加芍歸青皮白芍桔梗枳殼

總之此症不論受害輕重。去血曾否。但被扭按

甚重。悲怒努力傷其氣血。血瘀歸肝。多致此症。甚則胸脇脹滿。氣

逆不通。或致血溢口鼻而危矣。如傷家腹痛。若大便不通。按之甚

痛。瘀血在內也。必下之。宜加味既下而痛不止。瘀血未盡也。宜加

物。若腹痛。按之却不痛。氣血傷也。必補而和之。宜四物湯加倘下

之而脇胸反痛。肝血傷也。當議補。宜四君子或既下而發熱。陰血

傷也。宜四物湯既下而惡寒。陽氣虛也。宜十全既下而惡寒發熱。

氣血俱傷也。宜八珍湯既下而作嘔。胃氣傷也。宜六君子既下而洩瀉。

脾腎傷也。宜六君子湯加既下而手足冷。昏憤汗出。陽氣虛寒也。

宜急用若手足冷。指甲青。脾腎虛寒甚也。宜急用大甚至口噤手

撒。遺尿痰壅。唇青體冷。虛極之壞症也。宜急投大劑。參附湯。曾有一人跌墜

身形。跌撲閃挫。

腹停瘀血。用紅花、大黃等不下。反胸膈脹痛喘促。薛氏用肉桂木

香末各二錢。熱酒調服而下黑血。再服而愈。此因寒藥凝滯而不

行。故以辛溫散之也。如傷家小腹引陰莖作痛。或兼小便如淋。肝

經有鬱火也。

宜小柴胡湯加
大黃黃連山梔

再用養血藥。不可誤認爲寒。投以熱

劑。至使二便不通。諸竅出血。如傷家肌肉間作痛。榮衛之氣滯也。

宜復元
通氣散

或筋骨作痛。肝腎之氣傷也。

宜六
味丸

或內傷下血作痛。脾胃

之氣虛也。

宜補中
益氣湯

或但外傷出血作痛。脾肺之氣虛也。

宜八
珍湯大凡

下血不止。皆脾胃氣脫。吐瀉不食。脾胃氣敗也。須預調脾胃。如傷

家瘀血作痛。或兼厥腫發熱作渴。陰血受傷也。必砭去惡血。再服

藥以清肝火。

宜四物湯加柴芩
山梔丹皮骨碎補

或瘀血腫痛不消。以蘿蔔汁調山

梔末敷之。其破處則以膏貼。宜當歸膏更服活血之藥。凡患處腫黑重

墜者。卽係瘀血。法當重砭去惡血。看症用藥。總以大補氣血爲主。

如傷家血虛作痛。或兼熱渴。煩悶頭暈。陰血內熱也。宜八珍湯加丹皮。麥冬。五

味肉桂。骨碎補。兼服地黃丸。如傷家青腫不消。氣虛也。宜補中益氣湯。或腫點不消。血

滯也。宜加味逍遙散。或焮腫脹痛。瘀血作膿也。急當內托。宜八珍湯。或膿

反痛。氣血虛也。宜十全大補湯。或骨節接而復脫。肝腎虛也。宜地黃丸。或腫不

消。青不退。氣血俱虛也。急先用葱熨法。內服藥。宜八珍湯。倘單用行血

破血。脾胃愈虛。衛氣愈滯。若敷貼涼藥。則瘀血益凝。內腐益深。難

以收拾矣。如傷家腐肉不潰。或惡寒而不潰。宜補中益氣湯。或發熱而不

潰。宜八珍湯。或服剋伐藥而不潰。宜六君子湯。或內火蒸蒸。外皮堅黑。而

不潰。宜內服八珍湯。凡死肉不潰。新肉不生。皆失于預先補脾胃。

耳。如傷家新肉不生。或患處天白。脾氣虛也。宜六君子湯。或患處鮮

赤。陰血虛也。宜四物湯。加參朮。或惡寒發熱。氣血虛也。宜十全大補湯。或膿汁稀

白。脾肺氣虛也。宜東垣聖愈湯。或寒熱交作。肝火動也。宜加味逍遙散。日晡發熱。

肝血虛也。

宜入珍湯加丹皮。

或食少體倦。胃氣虛也。

宜六君子湯。

臍汁臭穢。陰

虛而有邪火也。

宜六味丸。

或四肢困倦。精神短少。元氣內傷也。

宜補中益氣湯。

夏月調中益氣湯。

作瀉清暑益氣湯。如傷家出血。或血出患處。或血出諸竅。皆肝火

熾盛。血熱錯行也。

宜加味追遠散。

或中氣虛弱。血無所附而

妄行。

宜加味四君子湯。

或元氣內脫。而不能攝血。急當回陽。

宜獨參湯。

姜不應。

或內有藕血而嘔吐。

宜四物湯加柴芩。

皆出血之重症也。總之凡

傷損勞碌。怒氣。肚腹脹悶。悞服大黃等藥。致傷陽絡。則有吐血。衄

血。便血。尿血等症。傷陰絡。則為血積。血塊。肌肉青黯等症。此皆臟

腑虧損。經隧失職也。急補脾肺。亦有得生者。如傷家瘀血。流注腰

膂。兩足至黑。急飲童便酒。砭出舊血。先清肝火。

宜小柴胡湯去牛黃。加山梔黃芩骨

碎。

次壯脾胃。

宜八珍湯加茯苓。

如傷家昏潰。其傷重者。以獨參湯灌之。雖

有瘀血。切不可用花蕊石散內化之。恐因瀉而亡陰也。元氣虛者。

尤當切戒。凡瘀血在內，大小便不通用，大黃、朴硝不下者，用木香、

肉桂末二三錢，熱酒下，血下乃生。假其熱以行寒也。如傷家眩暈，

或因失血過多，宜十全大補湯，或元氣不足，不能攝氣歸源，宜參、苓、芪、草

芎歸熟地、陳皮、山藥、山萸、五味、麥冬等味。如傷家煩躁，或由血虛，

宜當歸補血湯，或兼日晡發熱，宜四物湯加知柏，如傷家發熱，或出血太

多，或潰膿後，脈洪大而虛，按之如無，此陰虛發熱也。宜當歸補血湯，脈沉

而微，按之軟弱，此陰盛發熱也。宜四君子湯，或因亡血，宜聖愈湯，或汗出

不止，宜獨參湯，如傷家胸腹痛悶，凡跳躍撻胸，舉重閃挫，而胸腹痛悶，

喜手摸者，肝火傷脾也。宜四君子湯，其怕手摸者，肝經血滯也。宜

物湯加柴胡、山，或胸脇刺痛發熱，宜四君子湯，若胸腹脹滿，不思飲食，

梔紅、花、桃、仁，或胸脇刺痛發熱，宜四君子湯，若胸腹脹滿，不思飲食，

而不思飲食，肝脾氣傷也。宜四君子湯，若胸腹脹滿，不思飲食，

脾胃氣滯也。宜六君子湯，若胸腹不利，食少不寐，脾氣鬱結也。宜

加芍、歸、柴、胡，若胸腹不利，食少不寐，脾氣鬱結也。宜

加芍、歸、柴、胡，若胸腹不利，食少不寐，脾氣鬱結也。宜

身形 跌撲閃挫

卷三十一 八

痢歸 脾湯若痰氣不利，脾肺氣滯。宜二陳湯加白朮。如傷家作嘔，或因

痛甚，或因尅伐傷胃。宜四君子湯加青皮、山梔、芎歸。或因忿怒傷肝。宜小柴胡湯

若因痰火者，急消痰。宜半夏當歸生薑。或因忿怒傷肝。宜小柴胡湯

夏生。若因出血太多，或潰後者。宜六君子湯加當歸。若因胃火者，急清胃。宜

胃湯加梔。或因打撲傷損，敗血入胃，嘔吐黑血如豆汁。宜百合湯

如傷家喘咳，凡出血過多而黑，胸脹膈痛，發喘氣虛，瘀血乘于肺

也。宜二味參蘇飲。若欬血衄血，氣逆血蘊于肺也。宜十味參蘇飲。如傷

家作渴，或因出血過多。宜四物湯加白朮。或因胃熱傷津液。宜

葉黃。或因胃虛津液不足。宜補中益氣湯。或因胃火上熾。宜竹葉

小便淋瀝，乃腎經虛熱也。宜地黃丸。如傷家創口痛，或至四五日不癒

或至一二日方痛，欲作膿也。宜托裏散。若兼頭痛，時作時止，氣虛也。再

兼眩，則屬痰，當生肝血，補脾氣。以上皆薛氏之法，所當詳審而熟

兼眩，則屬痰，當生肝血，補脾氣。以上皆薛氏之法，所當詳審而熟

究合之陳氏條以爲傷科玉律者也。倘不此之求。而或恃單方。或信草藥。以爲傷家有傷。只須攻打。初不問其脈其症。而概用剋伐。猶自詡爲和傷妙訣。有不致陷人死地者。幾何矣。吾故重其科而獨立爲篇。此篇採取薛立齋陳文治兩家方論

脈法 脈經曰。從高顛仆。內有瘀血。腹脹滿。其脈堅強者。生。小弱者。死。又曰。破傷有瘀血停積者。其脈堅強。寔則生。虛細澀則死。若亡血過多者。其脈虛細澀則生。堅強寔則死。皆以脈病不相應故也。醫鑑曰。打撲損去血過多。脈當虛細。若得急疾大數者。死。入門曰。凡折傷外損筋骨者。可治。內損臟腑裡膜。及破陰子。其脈急疾者。不可治。得效曰。如傷臟腑致命處。一觀其脈。虛促危矣。

跌撲閃挫症治 得效曰。凡墮壓死者。急安好處。以袖掩其口。

鼻上一食頃。候眼開。先與熱小便飲之。若初覺氣絕。急擘開口。以熱小便灌。利去瘀血。綱目曰。卒墮撲壓。倒打死。心頭溫者。皆可救。將本人如僧打坐。令一人將其頭髮控放低。以半夏末。或皂角末吹入鼻內。如活。却以姜汁香油灌之。入門曰。若取藥不及。急挖開口。以熱小便多灌。醫鑑曰。人爲刀斧所傷。或墮落險地。或撲身體。損傷筋骨皮肉。皆出血不止。或瘀血停積。若去之不早。則有入腹攻心之患。又曰。治損傷腫痛瘀血。流注紫黑。或傷眼上。青黑不散。大黃爲末。生姜汁調敷患處。卽消。名將軍膏。又曰。一人落馬。被所佩鎖匙傷破陰囊。二丸脫落。懸挂未斷。痛苦無任。諸藥不效。子教漫漫托上。多取壁錢敷貼傷處。日漸安。其囊如故。又曰。接指方。蘇木爲末。敷斷指間。接定。外用蚕繭包縛完固。數日如故。又曰。自行頸仆。穿斷舌心。血出不止。

取米醋以鷄翎刷所斷處。其血卽止。仍用蒲黃杏仁礪砂少許爲末。蜜調。噙化而愈。又曰。治擦落耳鼻。用亂髮灰末。乘急以所落耳鼻蘸髮灰。綴定。以軟帛縛定。有人爲驢所咬下鼻。一僧用此綴之。神效。丹溪曰。跌撲損傷。須用蘇木活血。黃連降火。白朮和中。以童便煎服。妙。傷在上。宜飲韭汁。又曰。凡損傷。專主血論。肝主血。不問何經所傷。惡血必歸于肝。流于脇。鬱于腹。而作脹痛。寔者下之。宜通導散。桃仁承氣湯。奪命散。虛者復元活血湯。當歸鬚散。調之。又曰。凡出血過多。而又嘔血不止者。難治。宜用蘇木煎湯。調蜂霜散服之。得效。曰。凡撲跌壓傷。或從高墮落。皆驚動四肢五臟。必有惡血在內。專怕惡心。先用通二便藥。和童便服之。立效。大小腸俱通利。則自無煩悶攻心之患矣。又曰。蘇合香元。治打撲墮落。挾驚悸。氣血錯亂。昏迷不省。急取三

五九溫酒童便調灌。卽甦。又曰頭上有傷。或打破。或金刃傷。用藥糊縛。不可使傷風。慎之。又曰凡手脚各有六出。曰四折骨。每手有三處出。曰脚亦三處出。曰手掌根出。曰其骨交互相鎖。或出。曰則是挫出鎖骨之外。須是搦骨于鎖骨下歸窠。若出外。則須搦入內。若出內。則須搦入外。方入窠。曰只用手拽斷。難入窠。十有八九成痼疾也。又曰骨節損折。肘臂腰膝出。曰蹉跌。須用法。整頓歸元。先用麻藥與服。使不知痛。然後可用手法。又曰搦骨歸窠。須用竹一片。生柳木板片尤佳。夾定一邊。一邊不用夾。須存屈直處。時時拽屈拽直。不然則愈後屈直不順。又曰凡骨碎者。用接骨藥。火上化開。攤骨上。然後夾定。外用夾骨法。活血散接骨丹。內服接骨散。自然銅散。接骨紫金丹。淋洗用蔓荊散。回春曰。凡鬪毆被打。成破傷風。頭面腫大發熱。以九味羌活

湯熱服取汗。外用杏仁搗爛入白麵少許新汲水調敷瘡上。腫
卽消。又曰治跌撲亦散被毆癢痕麻油清酒各一碗同煎數沸
服之。服了回火燒熱地上一夜痛止腫消無痕。有被傷者仇家
陰令術士以此治之。次日驗審了無一毫傷痕。聖惠方曰打
撲傷肌膚青腫茄子種極黃極大者切片瓦上焙爲末。臨卧酒
調二錢服。一夜消盡無痕。鰲曾治一人。腦顛震動。氣海鬱塞

者。其人因倒墜下樓。跌傷肩臂。服和傷藥。損傷已愈。但患頭昏
眼黑。竟不能俛仰。時有氣從臍下而上。便身聳肩息。其氣直從
喉上出。方止。日數十次。診其脉。諸部皆平。但覺石。以拍外清數
二三十至。一止。右寸近關半指沉澀。因知其倒墜時頭項先着
地。故腦髓爲之震動。又和身倒墜。身地相擊。必氣爲之併。因遂
凝抑氣海中。不得調暢也。因與茯神三錢。白朮四錢。便香附二

錢兔絲子三錢。硃砂五分。一塊絹包線挂罐中。不令着底煎好。調真琥珀末五分。服二帖。病減半。又前方加磨沉香五分。愈七八分。又前方加沉香再加歸身二錢。二帖全愈。

治跌撲閃挫方九十

蘇合香丸 急救

鷄鳴散

下癩 大黃一兩 杏仁二十一粒 去皮尖另
研 右爲末 酒煎 鷄鳴時服 至曉下 癩血愈
此方治從高墜下木石所壓 癩血凝積 痛不可
忍 此用杏仁者 因血入氣也 此用藥妙處
又 歸棗 川芎 烏藥 赤芍 蒼朮 青
皮 陳皮 枳殼 蘇木 紅花 桃仁 肉
桂 大黃 水煎服

下癩血方

活血和氣飲

通氣 川芎三錢 青皮二錢 炙草 白芍
滑石各一錢 丹皮五分 桃仁七粒 去

和氣飲

皮尖研 水煎
此方治因跌撲瘀血入內
又蒼木 葛根 桔梗 當歸 茯苓 白
芷 枳殼 甘草 陳皮 白芍

烏藥順氣散

又

花蓋石散

血迷 花蓋石四兩 硫黃一兩 爲末入瓦
礮內搗固 臍晒乾安方礮上以炭已午時煨
至一夜候冷取出研細每一大匙童便酒煎熱
服

消上瘀血湯

此方治一切金刃斫傷打撲損傷牛馬咬傷
或至死者急于傷處搽此藥其血化爲黃水再
服藥便活更不疼痛如臍有瘀血內損煩悶
欲死服此藥則化爲黃水或吐或下泄出
攻心 羌活 獨活 連喬 桔梗 枳殼
赤芍 山梔 當歸 黃芩 甘草 川芎

消下破血湯

桃仁 紅花 蘇木 生地 大黃 水煎和
酒童便服 此方主上膈被傷
又柴胡 川芎 大黃 赤芍 五靈胎
當歸 黃芩 桃仁 枳殼 山梔 木通
澤蘭 紅花 蘇木 赤牛膝 生地 水煎
加酒童便服 此方主下膈被傷

復元羌活湯

又

獨聖散

退腫膏

封口藥

散血膏

養血膏

痛不止 香附一味姜汁浸一宿炒研每二錢

白湯調服 此因氣滯血凝香附行氣通血

腫骨 白芙蓉葉地薄荷耳草葉澤蘭

葉 金桐葉赤牛膝 大黃另研等分搗

敷傷處中留一孔出氣

此方兼治一切破傷腫痛

皮肉 乳香沒藥當歸兒茶虎骨杉木炭

各一錢 麝香五厘 冰片一分 各研細合和

耳葉草一錢如無以葛葉代之 各研細合和

次入磨次入水勻之磁器收一應耳瀝唇缺俱

可隨方施補用此藥摻之每日輕水洗去搽油

換藥

又 虎睛葉 澤蘭葉 生鴉桐 冷敷傷處先

用金毛狗脊毛 薄荷鋪患口次按封口藥再貼

此膏四圍用截血膏敷貼令血不潮

又 花柳二兩 薑黃 赤芍 白芷各用一

兩 為末茶調敷患口四邊 如傷頭面血不

止急以此敷頸上周圍能截住血使不來潮

傷各處敷此口周圍能截住血使不來潮

瘡口肉硬不消被風所襲也可加獨活以熱酒

調敷如又不消則風毒已祛肌肉結寔加紫金

皮和敷必消

止血散

又血竭末一味摻之 一方有白膠香松香
白芷末 金瘡血不止 黃丹 白礬末 摻

一紫散

面傷 紫金皮童便浸七日曬乾 生地 等
分搗爛 茶清調敷 餘處傷不必便製 又芙蓉

葉生地同搗各一錢散同治眼傷胞青黑紫色
腫痛

紫金膏

又芙蓉葉二兩 紫荆皮一兩 生採同
生地搗敷或為末 鷄子清和蜜勻入生地搗敷

之

補肉藥

此膏兼一切傷腫赤嫩熱
又香油一兩 黃蠟八錢 蜜陀僧五分
乳香 沒藥各一錢 熬膏

補肌散

傷齒 點椒五錢 天靈蓋 紅內消 白芷
各二錢 為末 摻即安或已落有血絲未斷 摻
齒齦間亦可復半

破血藥

又柴胡 黃芩 當歸 枳實 五靈脂
赤芍 川芎 生地 桃仁 紅花 大黃
朴硝 蘇木 木煎入童便酒皮破血流者不
用酒

此方主治皮肉不破 瘀血積滯 內攻不能言 諸
論 宜此攻利 若皮破 血流宜作金瘡 亡血過

身形

跌撲閃挫方

卷三十一

十三

多治之

芙蓉膏

又紫荊皮 南星各一兩 芙蓉葉二兩
獨活 白芷 赤芍各五錢 姜汁茶清調溫
貼紫黑不退加肉桂五錢

定痛膏

此方端治跌打損傷腫痛紫黑
胸脯 芙蓉葉二兩 紫荊皮 獨活 天南
星 白芷各五錢 右爲末生抹馬蘭菜墨斗
菜各一兩打爛和末勻葱汁和酒熱卷縛

破血消痛湯

此方端治跌撲損傷折骨
臍痛 羌活 防風 官桂各一錢 連喬
蘇木 當歸各二錢 麝香一字 水蛭三錢
炒令烟盡另研爲末作一服酒兩大碗水一
盞煎一碗另研香蛭二味稍熱調服立止
此方能治跌傷脊骨脇痛

定痛神應散

又乳香 沒藥 雄黑豆 桑皮 獨顆栗
子 當歸各一錢 水蛭五錢 破故紙炒二
兩 爲末每五錢醋一杯瓦器煎入麝少許

清心藥

此方端治跌撲損傷腹皮破傷損折重者
惡心 丹皮 當歸 川芎 赤芍 生地
連喬 黃芩 黃連 山梔 桃仁 甘草
煙心 薄荷 入童便服

二十五味藥

傷重 白芷 醋炒 紫荊皮 醋炒 破故布 醋

炒 草烏 醋炒 孕婦不用 劉寄奴 當歸 乳

黑牽牛 赤芍 川牛膝 生地 川芎 木

香 沒藥 木通 自然銅 骨碎補 木

香 藿香 川烏 火煨 孕婦不用 骨碎補 木

木賊 草 官桂 羌活 獨活 以上各一兩

炒 熟地 杜牛膝 各五錢 炒 蜜丸 彈子大 每

一丸 酒磨 下 金刃所傷 內損重者 以薄荷湯

或木瓜湯 姜湯 皆可服 金刃傷 挫日者 去自

然銅 惟骨碎 骨折者 用之 然此方 須于臨好時

用之 早用 或生他故 此方 主治 跌撲 筋斷 骨碎 折刺 痛

此方 主治 損傷 而感 風寒 者

入酒服 草 紫蘇 陳皮 生地 香附 姜 水煎

活 紫梗 枳殼 柴胡 熟地 羌活 獨

草 生薑 有熱 去姜 桂 肉桂 甘

踈風敗毒散

又 當歸 川芎 白芍 熟地 羌活 獨

活 紫梗 枳殼 柴胡 熟地 羌活 獨

草 生薑 有熱 去姜 桂 肉桂 甘

五積交加散 又 當歸 川芎 白芍 熟地 羌活 獨

活 紫梗 枳殼 柴胡 熟地 羌活 獨

敗毒五積散 又

身形 跌撲損挫方

卷三

十四

黃末子

又炮川烏 醋草烏 降香 楓香 松香

乳香 肉桂 姜黃 沒藥 細辛 各五錢

當歸 赤芍 羌活 獨活 川芎 骨碎

補滿黃 白芷 桔梗 蒼朮 五加皮

牛膝 姜黃 何首烏 爲末酒下 將好時服

如骨折者加自然銅一兩

此四末子治打撲跌傷刀斧傷諸般風癱頑

麻婦人血風 渾身疼痛 白芷 南星 骨碎補

又獨活 蘇木 牛膝 赤芍 川芎

當歸 羌活 細辛 桔梗 川烏 炮 降真

紅花 各三兩 沒藥 血竭 各一兩 爲

香 幽香 加法同上 治亦同上

紅末子

黑末子

又雄雞末 燒存性 桑柴炭 松節 炒另研

末 松心 側柏 葉醋煮各四兩 全當歸

牛膝 首烏 黑豆 酒煮 南星 骨碎補

熟地 赤芍 羌活 獨活 白芷 川芎 各

二兩 細辛 肉桂 川烏 炮 草烏 木鱉

子 南木香 降真香 五靈脂 百草霜 加

楓香 乳香 沒藥 各一兩 爲末酒下 加

法同上 治亦同上

白末子

又白芷 白木 白芍 白楊皮 白欒
白茯苓 南星 桔梗 羌活 獨活 何首
烏川芎 當歸 苡仁 牛膝 骨碎補
續斷 川烏 肉桂 細辛 楓香 乳香
沒藥 各一兩 爲末 酒下 加法同上 治亦

散血定痛補丹

又當歸 川芎 赤芍 生地 白芍 牛膝
杜仲 川斷 白芷 南星 羌活 獨活
活防風 各兩半 骨碎補 五加皮 各兩六
錢 官桂 乳香 沒藥 各一兩 南木香
丁皮 大荷 各五錢 爲末 酒下

活血丹

此方治諸般傷損腫痛
又青桑炭一斤 當歸 牛膝 川芎 赤芍
熟地 黑豆 酒煮 首烏 南星 製 白
芷 松節 燒 杜仲 破故布 羌活 骨碎
補 獨活 蒼朮 桔梗 防風 荆芥 川
斷 各四兩 草烏 醋煮 川烏 炒 肉桂 大
香 地龍 白欒 白芨 細辛 降香 檀
沒藥 木鼈子 五靈脂 桑寄生 醋煮 珠米
糊丸 彈子 大晒乾 以生藥 抹手上 擦
乾 以袋盛 挂當風 久而不壞 用時 以當歸 酒磨

身形 跌撲閃挫方

接骨丹

又南星 木鼈子各四兩 乳香 沒藥 官桂各一兩 生薑一斤去皮搗升米醋少許 白麵爲糊攤布上貼傷處以帛纏之用杉木片 夾定縛之 吹鼻

通關散

澤蘭散

指傷 芙蓉葉 澤蘭葉 地蘇荷 葉 耳草葉 搗敷傷處留口通氣 此方兼治一切跌咬所傷 白佛桑

退熱散

接骨丹

又黃芪 柴胡 黃連 黃芩 甘草 芍 生地 蒼木 當歸 地骨皮 升麻 脫白 生南星四兩 木鼈子三兩 白芷 紫荊皮 芙蓉葉 獨活 官桂 松香 楓 香各一兩 乳香 沒藥 麥麵各五錢 爲 未姜汁酒醋調勻攤貼夾縛如法冬月熱縛夏 月編縛

整骨麻藥

此方兼治傷折出臼 麻法 草烏三錢 當歸 白芷各二錢半 每末五分熱酒調下卽麻木不知痛然後用手 整骨 或用草烏散亦可

草烏散

又白芷 川芎 木鼈子 烏藥 牛夏 猪牙皂角 當歸 紫荊皮 川烏各二兩

消腫膏

草烏 茴香各一兩 木香五錢 共為末
諸骨 折出臼者每服一錢 酒下即麻 倒然後
開皮 剪骨 整頓 安平 用夾板 束縛 然後醫治 或
箭入 不出 亦用此 麻之 庶可 錯出 箭若 欲麻 醒
以鹽 湯或 益水 燻之
此方 治傷 骨節 不歸 窠者 用此 麻之
傷腫 芙蓉 葉 紫荊 皮 各 五兩 白芷 當
歸 骨 碎 補 獨 活 首 烏 南 星 各 三兩 當
橙 橘 葉 赤 芍 各 二兩 石 菖 蒲 肉 桂 各 五
錢 為 末 姜 汁 熱 酒 調 塗 腫 處 須 乘 熱 再 用 蒸
汁 茶 清 調 和 溫 縛 如 動 筋 折 骨 加 山 樟 毛 銀
藤 皮 及 葉 各 五兩 同 煎 為 末 酒 調 煖 敷 縛 定
此方 并治 胸 脇 跌 傷 腫 痛 或 動 筋 骨

定痛散

又 當 歸 川 芎 白 芍 赤 芍 熟 地 牛
膝 羌 活 獨 活 杜 仲 白 芷 川 斷 各 二
兩 川 烏 炮 肉 桂 乳 香 沒 藥 各 一兩
大 苧 丁 皮 南 木 香 各 五 錢 為 末 酒 服
此方 治 骨 節 一 切 損 傷 腫 痛 一 名 定 痛 當 歸 散

補益膏

損傷 人參 茯苓 山藥 熟地 當歸
地骨皮

洗藥水

外 頑 刺 葉 一兩 白 芷 細 辛 夏 荆 子
川 芎 肉 桂 丁 皮 防 風 羌 活 各 五 錢

身形 失榮 月坐 丁皮 防風 羌活 各五錢 卷三十一

鹽一匙 連鬚葱五根 醫水五升 煎三升 去渣
淋洗 冷即易 要避風處 一名洗藥 荆葉散
此方治從高墜下及一切傷損 瘀血凝滯者

小柴胡湯 喘咳 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

東垣當歸湯 腹痛 大黃 當歸 傷在上中下部 用分頭身
尾酒 浸洗 焙乾 各五錢 酒煎
此方治跌撲損傷 瘀滯不行

四物湯 肝脹 川芎 當歸 白芍 地黃

加味承氣湯 大便秘 大黃 朴硝 各二錢 厚朴 枳實
當歸 紅花 各一錢 甘草 五分 水酒煎
加減藥味 量人虛寔

此方端治瘀血在內 胸腹脹痛 大便不通

加味四物湯 既下

四君子湯 肝傷 人參 茯苓 白朮 甘草

十全大補湯 陽虛 人參 茯苓 白朮 甘草 熟地
白芍 川芎 當歸 黃芪 肉桂 姜 鹿

八珍湯 氣血虛 人參 茯苓 白朮 甘草 熟地
當歸 白芍 地黃 白朮 甘草 川芎

六君子湯

胃傷
陳皮

人參 茯苓 白朮 甘草 半夏

參附湯

虛寒

人參 附子

復元通氣散

榮衛滯 穿山甲 酥炙 木香 大茴香 青
皮 陳皮 白芷 甘草 漏蘆 貝母 等

分 每末錢半酒下

此方治跌撲閃挫或怒氣滯血作痛之良劑

經云形傷作痛氣傷作腫又云先腫後痛者形

傷氣也先痛後腫者氣傷形也凡人元氣素弱

或因傷叫號血氣損傷或敷寒涼之藥血氣凝

結者用溫補氣血為善

六味丸

肝腎傷
澤瀉

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

補中益氣湯

脾胃虛
陳皮

人參 黃芪 白朮 甘草 當歸

當歸膏

腫破
陳皮

當歸 升麻 柴胡 白朮 甘草 當歸

加味逍遙散

血滯
甘草

白芍 白朮 麥冬 茯苓 生地 黃芪 七錢 白

東垣聖愈湯

脾肺虛
錢

酒熱地 酒生地 各錢半 川芎 二

黃芪一錢 水煎

身形 跌撲閃挫方

調中益氣湯

元傷白芍

人參升麻

黃芪柴胡

白木陳皮

甘草五味子

當歸

清暑益氣湯

又木

升麻

人參黃芪

陳皮白木

神曲甘草

澤瀉青皮

麥

蒼

麥

冬葛根

五味子

陳皮

神曲

澤瀉

青皮

麥

蒼

加味四君子湯

中氣虛

獨參湯

回陽

人參一味

當歸補血湯

陰虛

當歸

川芎

白芍

熟地

防風

酒

羌活

獨活

杜仲

川斷

白芷

乳香

沒藥

生地

木煎

取湯

煎藥入童便

服不可用酒

補血

以參

芪此

止用

四物者

活血非補血也

況以

羌獨

防芷

之耗

散乎用者

加味歸脾湯

脾鬱

此方

治金

刃跌

磕所

傷去

血太多

服此妙若

二陳湯

痰氣

茯苓

半夏

甘草

陳皮

清胃湯

胃火 黃連 生地 當歸 丹皮 升麻

百合湯

嘔吐 百合水浸半日 川芎 當歸 白芍

百合散

又 荆芥各二錢 又 百合 川芎 當歸 赤芍 生地 側柏葉炒 荆芥 犀角 丹皮 黃芩炒 黃連 山梔 鬱金 大黃 水煎加童便服

二味參蘇飲

喘咳 人參 蘇木二兩 水煎

十味參蘇飲

又 人參 紫蘇 茯苓 半夏 陳皮 桔梗 葛根 前胡 枳殼各一錢 炙甘草五分 加姜三片

竹葉黃芪湯

胃熱 生地 黃芪各二錢 當歸 竹葉 川芎 甘草 白芍 黃芩 人參 花粉各一錢 煨石膏錢半 麥冬二錢 牛 姜三片

竹葉石膏湯

胃火 竹葉 石膏 桔梗 大通 薄荷 甘草 加姜 等分 腎虛熱

地黃丸

托裡散

欬膿 黃芪 人參各二錢 白朮 陳皮
當歸 熟地 茯苓 白芍各錢半

桃仁承氣湯

下寔

奪命散

下寔 水蛭五錢 石灰拌炒焦 黑牽牛頭末
大黃各二兩 每末二錢下不效再一服

復元活血湯

補虛 酒大黃一兩 柴胡五錢 穿山甲
當歸 花粉各三錢 紅花 甘草各二錢
桃仁去皮尖五十個另研 共為末每一兩水
一酒二煎服以利為度利後痛未盡除再服乳

香神應散

此方端治從高墜下血流脇下疼痛難忍

乳香神應散

又乳香 沒藥 桑皮 雄黑豆 獨顆栗
子 破故布炒 當歸各一兩 水蛭五錢炒
烟盡 每末五錢 醋一盞煎六分入麝少許温

當歸鬚散

服 此方治跌撲後脇下痛
又歸尾錢半 赤芍 烏藥 香附 蘇木
各一錢 紅花八分 桃仁七分 官桂六
分 甘草五分 水酒煎服 如腰膝痛加青

皮木香 脇痛加柴胡川芎
此方尚主打撲氣凝血結

蜂霜散

又蜂壳粉 百草霜 等分每末二錢糯米
飲調服

活血散

骨碎 菜豆粉
調成膏敷貼損

燒內炒令紫色用熱酒熱醋
用稀蓋以杉木一二片縛定

接骨丹

神效
此方治一切跌打傷折

又 乳香 沒藥 當歸 川椒 自然銅火
煨醋淬三次 龍骨 川芎 赤芍 骨碎補

酒炙 敗龜板酥炙 白芷 郁李仁各一錢

黃蠟五錢化爲丸彈于大每一丸熱酒一碗
化開向東南攪散熱服

丹溪接骨散

又 乳香 沒藥各二錢半 自然銅五錢醋
淬七次 滑石一兩 赤石脂 白石脂各一

錢 右爲細末以好醋浸沒煮乾炒燥隨服入
麝少許挑一小茶匙在舌上酒下 如骨已接

而痛猶不止去龍骨石脂多服儘好

自然銅散

又 乳香 沒藥 蘇木 降香 麝烏 松
節自然銅醋淬七次各五錢 地龍炒 水蛭

炒焦 生龍骨各二錢半 血竭錢半 土狗
五個油浸焙 每末五錢酒下自頂心尋病至

下兩手兩足周遍一身病人自覺骨力習習往
來遇病處則振振有聲 此治筋骨折傷

接骨紫金丹

又 自然銅醋淬七次 骨碎補 乳香 沒藥
自然銅醋淬七次 骨碎補 大黃 血竭

礪砂 歸梢各一錢 爲末磁器收每服七八厘熱酒下其骨自接 一方加紅花一錢
此方尚治跌打損傷骨折瘀血攻心發熱昏暈不省人事此藥神效

附錄跌撲閃挫雜方

腦傷方

跌打傷腦子偏不能活頭暈嘔吐立不直者將傷人頭扶起立直用細帶一條圍頭看偏在左右何邊大即偏何邊將細帶約三四尺長扶直人身將餘帶繫在柱上用細根蔽帶之中一時即正而愈

薰塌方

此方是即時急救方 此係蒙古醫法最妙
當歸 紅花 桃仁 川斷 杜仲各五錢
羌活 獨活 乳香 沒藥 牛膝下部傷用上部不用 秦艽各三錢 食鹽二兩 牛骨髓三兩 奶酥油二兩半 麝香一錢 酒一斤 水煎濃汁濾渣再入乳沒藥用加麝香新布三塊長二尺同煮熟將布絞乾于痛處更換塌更用手掌揉之
此方尚治跌撲閃挫筋縮骨出白不入 兼治一切風濕痛強及小兒龜胸龜背初起將此藥薰塌亦能平也
絲瓜葉花時清晨帶露摘取不老不嫩肥厚者陰乾研末搽上消腫止痛續筋即愈

神效方

跌打損傷方

此方端治跌打損傷及金瘡大效并一切惡瘡

惡瘡亦治 非地上蚯蚓大者四條去泥陰乾 雄土龍切

斷自續者用十蛋料當歸紅花末喂 養色變透

紅乾為末 自然銅三錢醋淬手搥得碎為度

乳香去油 沒藥去油各一錢 下部傷少

加牛膝 共研末酒服極重者壯人五厘弱者

二三厘服 後用單被覆之 四人四角按之勿使

輕動出聲 卽活 雖極渴欲飲不得與湯水兩時

後方與飲 五加皮半斤酒洗淨 鷄一隻去毛雜入加皮

于肚內纏好水酒煮爛食 鷄存骨五加皮共炙

為末酒糊丸每三錢酒下 此方端治跌傷筋骨痛不能行步服之神效

十字街頭尿管內尿二担大鍋煮熱待溫扶傷

人入尿內卽時不痛卽飲尿一碗一日止卽愈

終身不發傷無痕

雙龍膏

腕蛇 赤芍 羌活各四兩 藥三兩 象

皮 白芷 防風 荆芥 黃芩 烏蛇 山

梔各二兩 金銀花 赤石脂 獨活 連喬

甲 姜 委 全 蝎 蟬 退 各 一 兩 斑 貓 川 山

一 批 乳 香 兒 茶 各 五 錢 蜈 蚣 十 條 頭 髮

身形

跌撲閃挫方

卷三

干

枝三根不住手攪藥枯去渣下丹瀉水不散爲
度 此方端治跌打損傷 以上七方皆業師
孫慶曾先生所傳大有奇效

通導散

大黃 芒硝 各二錢 當歸 蘇木 紅花
桃仁 各一錢 厚朴 陳皮 木通 枳殼

甘草 各五分 水煎空心服

雙鳥散

此方治損傷極重二便秘腹脹悶用此下瘀血
川烏 草烏 各三錢 畧炮 當歸 白芍 蘇
木 大黃 生地 炒紅曲 各五錢 麝香 少

許 爲末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無
害但草烏生用恐太狂故畧炮

此方端治諸傷百損久後時常疼痛及新被傷
作痛亦宜

補損當歸散

川芎 兩半 肉桂 川椒 當歸 甘草 各七
錢半 炮附子 澤蘭 各二錢半 每末二錢

溫酒下效如神

此方治墜撲折傷疼痛三號服此不復大痛三
日筋骨相連

糯米膏

糯米一升 皂角切碎半斤 銅錢百個同炒
焦黑去錢爲末酒調膏貼患處神效

此方端治撲傷筋斷骨折

大乳沒散

白木乳香二錢另研
極細每三錢溫酒下
此方治一切跌撲損傷痛不可忍
人中方醋淬為末每五分酒服
大效

人中白散

此方治閃挫跌撲傷骨極重者
大效
羌活防風官桂各一錢
蘇木錢半
柴胡連喬歸梢各二錢
麝香少許另研

破血消痛湯

水蛙炒烟盡另研三錢
水酒煎調麝香二末
服二服愈
此治跌破脊骨惡血流脇下作痛

接骨如神丹

半夏每一枚配土鼈一個全搗爛炒黃一兩
自然銅二錢醋淬三次
古錢文三錢醋淬三
次乳香沒藥各五錢
骨碎補去皮用七
錢每細末三分用導滯散二錢熱酒下藥到

消腫定痛散

無名異炒木耳炒大黃炒各五分
調塗若腐處用當歸膏敷
此治跌撲腫痛
生地不計數打如泥木香末
以膏隨腫大
小攤帛上搽木香末一層再加攤膏貼患處不
過三五換即愈

地黃膏

此方治損傷及一切腫癰未破可以內消

羌活乳香湯

羌活歸身獨活川芎丹皮赤芍
荆芥防風紅花桃仁陳皮續斷

身形

跌撲閃挫方

卷三

二十一

理傷膏

生地 水煎 有熱加柴胡黃芩
此方治傷折筋骨發熱疼痛按外邪者
黃蠟 猪油各四兩 乳香 沒藥各一兩
松節 麻油各一斤 右以折傷木皮一兩切
碎入油煎數沸去渣入蜜陀僧苗丹各三錢熬
成膏次入松蠟溶化再熬滴水成珠却入乳沒
自然銅末攤貼

大紫荆皮散

此方治跌撲傷 兼治刀斧傷
紫荆皮 降香 補骨脂 無名與酒淬七次
琥珀另研 川斷 酒牛膝 桃仁去皮
蒲黃 當歸各一兩 煨大黃 朴硝另研各
一兩五錢 每末二錢煎當歸蘇木酒下
此方治跌打傷肺脹

閃挫腰痛方

西瓜青皮 陰乾為末 鹽酒調服三錢

折傷筋骨方

無名異 甜瓜子各一兩 乳香 沒藥各一
錢 每末五錢熱酒服 服畢以黃米粥希上
牡蠣末 爨之竹片夾住

拯傷接命丹

紫金皮 官桂 大茴香 甘草節 川烏姜
汁炒透 草烏姜汁炒透 等分為末 沙糖調
酒下年吐而又傷重者每服三錢老弱而又傷
輒者每服錢半婦人臨時酌減

此方端治跌打損傷命在危急者一服如神多亦不過二服服後身上應少發麻不得疑畏須避風出汗爲度神劑也 此方係揚州教師鄭老七傳

跌打損傷方

團瓜子炒存性研末每二錢或五錢沙糖調陳

跌打損傷方

酒下便下瘀血卽愈極重者不過兩三服乳香末 五倍子末 狗骨煨研末各一錢

釜底墨 小麥麵各五錢 酒調敷患處 如爛者只以鳳尾草搗爛患處并煎湯洗

跌打損傷方

乾冬瓜皮 真牛皮膠各一兩 剉入鍋內炒存性研末每五錢熱酒下仍飲一盃厚蓋取微汗痛卽止一宿如初極效

十三太保

海金沙 紅花 枳殼 當歸 延胡索 地骨皮 廣皮 丹皮 五加皮 青皮 自然銅 乳香去油 沒藥去油各二錢輕者各錢半 山羊血一分半 水酒煎去渣下乳沒鎔化熱服蓋煖重者不過二服

身形

跌撲閃挫方

卷三

三

金瘡杖傷夾傷源流

沈金鰲撰

金瘡杖傷夾傷亦由外及內氣血俱傷病也古方書言金瘡俱指
臨陣對敵刀劍箭簇所傷言之是已然如鬪毆金刃之傷工作悞
斲之傷自行剝勒之傷跌磕金鐵之傷皆金瘡也如是則金瘡之
爲患正多非臨陣對敵已也而要其治法則大約相倣自古治金
瘡多從外塗抹所留傳方劑大約非敷卽搽雖未嘗不見功效但
一切金傷之人呼吸生死且既受傷神思不免昏亂若出血過多
因至憤瞋者往往而是其爲傷及氣血也必矣試詳言之凡金刃
傷天窻穴眉角腦後臂裡跳脉髀內陰股兩乳上下心鳩尾小腸
及五臟六腑俞皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中如
沸聲口急唾出兩手妄舉皆不治又腹破腸出一頭見者不可復
連若腹痛短氣不得飲食大腸三日半死小腸三日死以上諸款

身形

金瘡杖夾傷

卷三

三

皆屬不治。固不必言。其餘如腸斷兩頭見者。可連續之。以麻縷爲

線。或桑白皮爲線。以藥敷線上。宜花澀石散從裡縫之。腸子則以清油

擦活。放入肚內。乃縫肚皮。不可縫外重皮。用藥待生肉。宜金傷散或血竭未

敷之。赤妙又有傷破肚皮。腸與脂膏俱出者。先用湯藥與服。宜活血散芎歸湯

用手摩去。高不妨。此是閉肉。放心去之。然後推腸入內。用線縫之。

仍服通藥。勿使二便閉澀。宜導滯散又有金瘡出血不止。宜白芍炒爲

末。酒或米飲服二錢。漸加之。仍以末敷瘡上。大妙。或血出不止。成

內漏。宜雄黃半豆大。約之。仍以小便服五錢。血皆化水。或瘀血在腹。宜葱白二十根。麻子

升半。頓服。當吐出膿。或出血悶絕。宜蒲黃半兩。或被打碎水九升。煮

汁。滴瘡中。滴數口。日。或被斫斷指。宜接上蘇木末。敷至或發腫疼

痛。宜薔薇根。灰白湯。或被刀刃所傷。而犯內血。出不止。宜取所交

三寸。或中風角弓反張。宜蒜一升。去心。酒四升。煎甚。至痙強欲死。

宜乾葛末竹瀝調水送或傷濕潰爛不生肌肉宜寒水石煨一兩

下每服三錢多服取效或瘡口久不得合宜象皮燒灰或針刺入肉

得甚者加龍骨宜鴉羽

三五根炙焦醋或箭簇入骨宜癩或或在咽喉胸膈不得出

調敷數次即出宜蠅或但被箭射傷

以螻蛄搗爛宜塗傷處或在咽喉胸膈不得出

血其人將死宜對傷口吸住其血即流

膿沸爛而死宜汁并糞塗凡若此者皆金瘡必兼之症皆不可忽而

其大要總須調血為生蓋金刃所傷必有瘀血停積必先逐去瘀

血宜奪命散花益石散等帶散破若血去過多其人當苦渴然須

忍之當令乾食或與肥脂之類以止其渴又不得多飲粥則血溢

出殺人又忌嗔怒及大言笑大動作勞力及食塩醋熱酒熱羹皆

能使瘡痛衝發甚者且死并不可飲冷水血見寒則疑人心即死

也其治法亡血甚者必當大補氣血宜八珍湯人參黃芪湯人參

有變症。又當于瘍科惡候諸條。參酌以爲治。而其傷處。又當詳審。

輕重用藥。輕者只用止痛生肌。

宜補肌散或通用封口藥。

重者必須先搯封口。

藥。四圍另用藥。

宜截血膏。

箍住。使心血不潮。最是要訣。秘訣也。至若下。

蚕室。瘡口流血不合。以所割勢煨研爲末。酒調服。不數日愈。卽非。

下蚕室。或自割其勢。或悞傷落其勢者。治亦同。以上金瘡。杖傷之。

患。本屬外因。治之一也。然立齋云。人之膽氣有勇怯。稟賦有吐弱。

懷抱有開鬱。或敷藥雖可同。而調理之藥則少異。然亦不外乎大。

補氣血。旨哉斯言。凡治杖瘡者。所當于補氣血藥中。而察其稟賦。

膽氣懷抱之不同。臨時酌劑製方者也。但丹溪又云。杖瘡只是血。

熱作痛。用涼血去瘀血爲先。須服鷄鳴散之類。外貼藥。

宜五黃散。

黃黃栢爲末。生地汁調敷。或黃栢紫金皮生地同搗敷。是丹溪之。

法。又耑以涼血清熱爲主。總而言之。朱薛兩家之法。皆當。皆不可。

拘。只在醫者神明通變而已。大抵初杖者，以行血解毒為主。宜行

毒湯散血瓜蔓散乳香散乳宜托裡消毒散香膏椒髓丸外治宜血竭散三日後宜托裏排膿神效當歸膏

心境抑鬱者開其懷抱解其鬱結宜木香香附鬱金砂仁氣血虛弱而有瘀

血必于補中行滯。宜花蒞石散痛甚者急為定宜服乳香定痛散隨以

膏或敷貼五黃散或有瘀血壅腫作痛先刺出惡血然後乃貼膏藥或取

鳳仙葉搗貼乾則易一夜血散即愈冬月收取乾者水和塗之他

如杖瘡青腫宜濕棉帛鋪傷處以燒過酒糟搗爛厚鋪帛上良久

杖瘡未破宜乾黃土童尿入鷄子清調塗乾即以熱水洗去復刷

杖瘡已破宜鷄子黃杖瘡血出宜猪血一升石灰七升和燬再以

杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者乃死不治或有杖瘡

潰爛久不愈者宜補氣生血湯或有受杖責後疔甲爛肉疼痛難忍不能

起動者宜烏龍解毒散速去疔甲取鷄子清入麝少許以銀簪打成稀水

用簪尖輕輕點上不多時其疔甲化爛取去一日一換貼膏藥化盡死肉數日如故矣大概杖瘡通滯血藥皆當以酒調服蓋血滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡滿急經絡滿急故腫且痛推之打撲跌磕着肌肉多腫痛者皆以經絡傷氣血不行故如是至于未杖之先亦有服藥保護並能使打着不痛之法宜寄杖散無名異散不可不知以上杖傷夾傷之患消瘀散毒治法亦與杖傷相似故初夾之時尤當調理宜八厘丸宜取小蝦蟆四五個皮硝三分生姜一兩酒糟一碗搗敷其腫者加紅內消或用菘豆粉炒令紫色以熱酒或熱醋調敷傷處如神或以飛麴山梔末水調敷傷處外護以紙死血自散其有筋傷骨損者速補筋骨宜補骨散有惡血在骨節間者急逐瘀宜散如此治之無不痊可以上夾傷

杖傷夾傷症治 種吉曰凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而

溫服。免血攻心。甚妙。寔者鷄鳴散下之。虛者當歸鬚散加柴胡
羌活煎服。仍用葱白搗爛炒熟搭杖處。冷則易。能止痛散瘀如
神。丹溪曰杖瘡用野苳根嫩者洗淨同鹽搗敷神效。千金
曰杖瘡宜服乳香散化瘀散。

治金瘡方三十七

花蕊石散

續腸 花蕊石四兩 硫黃一兩爲末入瓦罐
鹽泥固臍晒乾安方磚上以炭火從巳午時煨
煙宿候冷取出研細每一大匙童便入酒煎熟
調服

金傷散

續肚 五日早朝使四人各出四方採草木莖
葉各半把至午時入石灰一斤同打極爛鑿大
桑木三兩株作孔納藥寔築以桑皮蔽之油調
石灰蜜塗之勿令泄氣更以桑皮填固至九月
九日午時取出陰乾百日搗篩細末如遇傷慘
之神效

活血散

腸肚傷 黃芪 當歸 川芎 白芷 炮附
子 川斷 赤芍 鹿茸 黃芩 細辛 乾
姜 等分每末三錢酒下日三立驗

芍歸湯

又 川芎 當歸

導滯散

通藥 大黃一兩 當歸二錢半 麝少許
每末三錢熱酒下

湧鐵膏

箭簇 鼯鼠頭一個 入油內熬 上消虫十個
芫青 螻蛄各四十九個 巴豆 信 馬

肉內 蝨焙乾 蟹螯焙乾 蜈蚣焙乾 夏枯草
磁石 黃丹 地骨皮 蒿柴灰汁三升 蘇木

各一兩 石腦油三兩 蒿柴灰汁三升 右
爲細末將石腦油蒿柴汁文武火熬成膏入各

末攪勻收磁瓶遇有箭簇入骨者以藥貼之良
久自出 此方兼治針刺入肉

奪命散

逐瘀 水蛭以石灰拌炒焦五錢 黑牽牛頭
末 大黃各二兩 每末二錢熱酒調下過數
時無效再一服以下惡血爲度

破血消痛湯

又 水蛭炒烟盡另研三錢 柴胡 連翹
歸尾各二錢 蘇木錢半 羌活 防風 桂

皮各一錢 麝香少許另研 水煎去渣入蛭
麝末空心服兩貼愈 水酒各半煎更妙

此方兼治損傷墮落惡血流于脇下痛楚不能
轉側

鷄鳴散

又 酒大黃五錢 歸尾三錢 桃仁十四粒
去皮尖 酒煎鷄鳴時服次日下瘀血愈

復元活血湯

大黃二錢半 當歸錢七分 柴胡一錢
穿山甲炒研 花粉 甘草各一錢 桃
仁十個爲泥 紅花五分 水酒煎

八珍湯

白芍 人參 茯苓 白朮 炙草 川芎
當歸 地黃

人參黃芪湯

黃芪一錢 炒黃柏四分 人參 當歸
升麻 麥冬 陳皮 白朮 蒼朮
人參 陳皮 黃芪 肉桂 當歸 白
炙草各一錢 遠志 白芍各五分 茯
苓 熟地 五味子各八分 姜棗

人參養榮湯

十全大補湯

補肌散

生肌 點椒五錢 天靈蓋 紅內消 白芷
各二錢 爲末 參

封口藥

乳香 沒藥 兒茶 當歸 杉木炭各
一錢 麝香五厘 冰片一分 葛葉一錢二
分 各研稱合和勻 入麝次入水勻之 搽之

截血膏

花粉三兩 姜黃 赤芍 白芷各一兩
茶清調敷 加減法詳跌撲條

五黃散

乳香 黃丹 黃連 黃芩 黃柏 大黃
等分爲末 新水調紅絹攤貼日三易
金瘡杖夾傷方

身形

卷三十 二十七

行血解毒湯

初樹 人參 白木 黃芪 歸尾 生地
熟地各一錢 羌活 獨活 茯苓 川芎

陳皮 炙草各八分 蘇木 紅花各五分
金銀花二錢 乳香 沒藥各一錢 杏仁泥

桃仁泥各六分 水煎入童便酒各一杯以
杏桃混乳沒未用藥調膏以藥送下渣再煎杏
仁等四味或分二服或另加一倍俱可

散血瓜蒌散

又 瓜蒌一個 忍冬藤 乳香各一錢 蘇
木五錢 沒藥三錢 甘草二錢 水五碗煎

二碗隔湯頓熱加童便一杯服一日用盡渣為
細末酒糊丸朱砂為衣

乳香散

又 乳香 沒藥各三錢 茴香四錢 歸尾
五錢 自然銅醋煨七次二錢 每末五錢温
酒調下

乳香膏

又 大黃 黃連 黃芩 黃栢 乳香 沒
藥各一錢 冰片少許 為末水調攤紅絹貼

椒鹽丸

又 胡椒八兩 木耳灰 歸尾各六兩 桃
龜虫一百二十個 乳香 沒藥 杏仁泥
仁 髮灰 血竭各兩半 自然銅醋煨七次
二錢 右研末另用胡椒三兩煮濃汁調麵糊
作丸每責十板服二錢熱酒下輕責者不必用

血竭散

又 血竭四兩 大黃兩二錢 自然銅醋煨
七次二錢 姜汁調塗

托裡消毒散

又 人參 黃芪 鹽水炒 酒當歸 白芍
川芎 白木 茯苓各一錢 金銀花 白芷
各七分 炙草 連喬各五分

神效當歸膏

又 當歸 生地各一兩 黃蠟七錢 白蠟
五錢 麻油四兩煎歸地至黑去渣入二蠟不
住手攪至冷收斂確候用

乳香定痛散

痛甚 當歸 生地 丹皮 赤芍 川芎
白木 甘草 乳香 沒藥 等分 每末一
錢酒童便調下 一名活血止痛湯

黃蠟膏

又 香油一兩入油髮如梅大一團熬消入
白膠香三錢 黃蠟一兩 龍骨 赤石脂
血竭各三錢二分攪勻候冷磁器收每用捏作

補氣生血湯

潰爛 人參 白木 茯苓 白芍 當歸
陳皮 香附 貝母 熟地 桔梗 甘草各
一錢 水酒煎

烏龍解毒散

疔甲 木耳炒存性四兩 每末五錢熱酒服
服後少頃藥力行至瘡上從肉裏透如針刺痒
身形 磨杖夾傷方

甚不時流血水卽以藥水洗淨貼膏藥

寄杖散

預服 白蠟一兩細切滾酒泡服雖打着不痛

無名異散

亦不甚傷 無名異末 臨杖時服三五錢則杖不痛

八厘丸

初夾 土髓虫頭足全紙包焙燥 自然銅醋
煨七次 血竭 無名異 乳香 沒藥 歸
梢三錢 硼砂甘草汁飛四錢 巴霜十五
粒 酒糊丸每丸瀉重一分乾重八厘量所責
之數服多寡總不過五丸

芸臺散

又 藕節陰乾 荆芥各二兩 馬齒莧陰乾
芸臺子 芒硝各一兩 每末二錢用蘇木
五錢酒煎服

補骨散

補骨 古錢二百銅絲穿桑柴燒紅米醋淬七
八十次取硬底沉下銅鋪屑就以醋洗淨炭灰
磁瓶收用時以黑雄鷄一隻清水煮熟去肉用
骨醋炙爲末加乳香沒藥各一兩研銅屑亦研
細和勻取患人頂心髮一縷燒灰和藥末二分
五厘酒下止一服如吐再一服痛止不可再用
但終身忌食葶薺但成藥止用二分五厘乳沒
何必各用一兩今特書酌良法莫若各末各自

當歸鬚散

收貯臨時配合骨一分乳沒末各六厘銅末三厘爲妙或作丸臨時酒化服亦可兼治跌撲杖瘡歸尾錢半赤芍烏藥香附蘇木各一錢紅花八分桃仁七分甘草五分水酒煎

化癥散

又蘇木歸尾各三錢大黃紅花各二錢每末三錢酒童便下

附錄金瘡杖夾傷雜方

少保劉寄奴當歸生地熟地合歡樹皮
威公保赤膏男子黑髮洗淨各一兩乳香沒藥血竭

各五錢黃蠟白蠟各八錢龍骨童便煨一錢麻油四兩煎前六味至髮化去渣入二蠟不住手攪離火仍攪至溫將乳香四味研極細慢慢投之攪勻候冷磁器収之遇有傷者塗敷以帛包裹不可見風

定痛乳香散

乳香沒藥各二錢敗龜板一兩紫金皮二兩虎骨酥炙骨碎補歸稍各五錢

蚕蛾散

炮穿山甲二錢半兩錢五枚醋淬每末一錢甚者二錢酒下分上下却服
晚蚕蛾歸頭白芷陳石灰等分爲末
敷傷處即愈

此方端治刀斧傷止血定痛生肌一上即愈

蒲黃散

蒲黃 生地各兩半 當歸 黃芪 川芎

白芷 川斷各一兩 炙草五錢 每末三錢

空心酒下日三四服血化為水而下口噤者抉

開灌之治金瘡血出不止腹脹

桑白皮散

桑白皮四兩 蜜陀僧二兩 烏賊骨 煨龍

骨 枯礬各五錢 炒黃丹二錢半 研敷定

血如神

洗藥

梨皮 荆芥 黃連 黃柏 當歸 白芷

赤芍 連翹 生地 水煎洗

麻藥

川烏 草烏 半夏 南星 川椒 研末唾

調搽