

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十六

雜病源流犀燭 身形門

肩臑肘臂腕手病源流

沈金鰲撰

按銅人圖項旁缺盆之上曰肩。肩下臂上通名曰臑。俗謂之膊。臑下臂上接處曰肘。肘卽臂節。肘下手上名曰臂。臂有二骨。臂下手上接處曰腕。又云掌後爲腕。腕之下曰手。手有掌有指。五指各有名。一曰大指。二曰食指。又曰鹽指。三曰長指。又曰中指。四曰無名指。五曰小指。上部肩至手曰肢。下部膀至足亦曰肢。兩手兩足因曰四肢。此自肩至手之部位名目也。試言其病。肩前屬大腸經。故肩前痛爲大腸經病。蓋肩端兩骨及前臑皆大腸脉所貫。風熱乘肺。肺氣鬱甚。肺先病。當瀉風通肺氣。宜防風羌活升麻柴胡。危仁陳皮桑皮貝母。若面白氣虛必兼補。宜加人參黃芪。肩後屬小腸經。故肩後痛爲小腸經病。以

小腸中感受風熱氣鬱不行。故致此。

宜羌活防風藥。本木通夏劑子。

若心血虛必

養血。

宜當歸熟地。

又有腎氣逆上而痛者。必補腎壯陽氣。

宜杞子山萸牛膝補骨脂。

挾痰飲者。豁之。

宜導痰湯。

當肩背一片冷痛。有熱也。消之。

宜三鞭菴木枳實枳椇。

至于臂則爲六經分布之處。故其爲病。須卽病處分別之。試以兩

手直伸。其臂貼身垂下。大指居前。小指居後。若前廉痛。屬陽明。升

麻白芷。

後廉痛屬太陽。宜羌活。素本。

外廉痛屬少陽。宜柴胡。黃芩。

內廉痛屬

厥陰。

宜柴胡。青皮。

內前廉痛屬太陰。宜升麻白芷。蔥白。

內後廉痛屬少陰。宜獨活。細

辛。此六經分配之處。先不可不辨。其所以痛者。雖不外風寒濕熱。

而要。惟邪之所湊。其氣必虛。固有由來也。若其痛而果係風寒。則

從風寒治之。

宜獨活。身痛湯。

若由血不榮筋。瘦弱臂痛。則兼養血。

宜獨活。身痛湯。

由血燥筋攣。遇寒則劇。肝氣虛弱。風寒客經絡。脈緊細。必從肝治。

宜加味道遙散爲主。泰用舒筋湯。

亦有怒動肝火而臂痛者。

宜小柴胡湯。加川芎當歸。

水虧筋骨失養以致痿痺者。宜六味丸若夫臂連肩背酸痛兩手軟痺。

由痰飲流入四肢也。宜二陳湯星香散合用偶提重物忽痛傷筋也。宜劫勞湯或八

珍湯加官桂丹皮木瓜姜黃延胡劉寄奴因插臂筋痛傷于寒也。宜舒筋湯臂痛不能舉或

痛無定處由脾虛邪氣相搏也。脉必沉細。宜補中益氣湯加威靈仙桂枝桑皮姜黃臂

痿痺手軟麻有痰滯也。宜導痰湯加木香片姜黃臂痛不能舉物氣血凝滯也。

筋舒兩臂流注走痛似覺痠冷爬搔不着難忍寒濕痰流注也。宜天

仙籐散臂脛疼痛至于年久不愈血虛不能養筋且有客邪留着也。

宜虎脛骨酒當歸酒痛起肩膊連臂漸下入環跳髀膝由絡虛也。宜防風左

指脹痛引肩由血虛風動病在肝也。宜桑枝音丸肩膊筋緩連臂不舉

而痛陽明脉衰也。宜黃芪白木防風根音丸如坐卧傷濕或受寒而臂

痛為寒濕氣痛也。宜五積散手腫痛或指掌連臂膊肘腕俱痛為手氣

也。宜獨臂忽發熱極痛為風熱也。宜桑枝濃煎湯多服臂發熱痛從裏徹外

爲血衰也。

宜秦艽  
地黃湯

若夫手掌熱則病屬心與心包。手熱赤痒。兩掌

皮厚皴裂則病屬肝胆血燥。

宜加味道遙散  
加熟地鉤藤

手與足心腫病則屬

風。

宜花椒鹽  
醋和敷

手與足抽掣動搖弄舌吐沫其脉沉弱病則屬脾虛

生風不可遽作風火痰治。

宜歸脾湯

手與足麻木病則屬脾肺氣虛。

宜中益氣湯加茯苓半夏  
桑枝外煎桑枝葉湯洗

手與足生紫斑白點枯厚破裂病則屬血

虛而燥。

宜二礬湯熏

手與足忽如火燃起紫白黃泡病則屬血熱急針

挑破太乙膏貼之若挑破又生血熱之極。

宜防風牛蒡湯

凡言手與足者

以種種皆手足俱有之病非必一時手足齊患此病也論手而言

足亦連類及之後足病源流可與此忝看也如以手指言之大指

屬肺食指屬大腸中指屬心包無名指屬三焦小指內側屬心外

側屬小腸凡五指經脉所到邪氣盛則痛正氣虛亦痛須分其經

絡察其虛寔以治之。

總治指痛宜烏梅  
魚鮮打爛傅之

其有手搯內外發熱者其

肝心二經之火乎。

宜瀉青赤湯素弱者抑肝導赤湯

有手搖目動口瞞面腫者其

胃中有風乎。

宜胃風湯

有手搖臂肘筋痛者其傷于寒乎。

宜射經湯

有手搖

覺衰弱或見弱症者其元氣虛乎。

宜續命煎散

有手搖既愈欲絕其根

者其非滋補不可乎。

宜六味九間服加味逍遙散

總之搖則有止時若非筋變

爲常病無刻不拘急但患搖者皆不可以艾灼或發表以廢理開邪愈易入也夫搖雖非痛病所屬以其在手故由手痛而連及雖然肩病手病臂病不憚瑣屑言之而臚肘腕從畧者非畧也臚肘腕病每與肩臂手相牽連言此卽可知彼耳。

手掌候胃

靈樞曰掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒銅

人圖曰胃中寒則手魚際之絡多青胃中熱則手魚際之絡赤

其暴黑者久留痺也其有赤有黑有青者寒熱氣也又曰大指

本節後白肉際各曰魚以其形似魚也有穴名魚際回春曰

身形

肩臚肘臂腕手方

卷二十六

三

傷寒手心熱者邪在裏也。手背熱者邪在表也。手足溫者陽症也。手足冷者陰症也。

肩肱等病原由症治。內經曰：人有四肢熱，逢風寒如灸于火者，是人陰氣虛，陽氣盛，四肢者陽也，兩陽相得而陰氣虛少，少水不能滅盛火，而獨陽不能生長也，逢風而如灸于火者，是人當內燥也。又曰：四肢懈墮者，脾精之不行也。靈樞曰：胃不寔則諸脉虛，諸脉虛則筋脉懈墮，筋脉懈墮則行陰用力，氣不能復，故爲痺。痺謂手足羸曳也。又曰：肺心有邪，其氣流于兩肘。

保命曰：脾寔則四肢不舉，此謂膏粱之疾，其治宜調胃承氣湯。若脾虛則四肢不用，蓋脾病不能與胃行其津液，其治宜十全大補湯。又曰：手屈而不伸者，病在筋，伸而不屈者，病在骨。直指曰：酒家之癖，多爲項腫臂痛，蓋熱在上焦，不能清利，故醞醱。

日久生痰。聚飲流走項臂。不腫則痛耳。集要曰。忽患手脚胸

背腰疼。隱痛不可忍。連筋骨牽引釣痛。坐卧不寧。時時走易。不定。疑是風症。或癰疽。皆非也。乃痰涎伏在心膈。上下變爲此疾。

資生曰。兩肩頭冷疼。尤不可忽。屢見將中風人。臂骨脫臼。不與肩相連接。多有治不愈者。要之纔覺肩上冷疼。必先灸肩髃等穴。毋使至于此極也。入門曰。留飲之症。四肢歷節痛。氣短脉沉。久則令人骨節蹉跌。宜導痰湯加減用之。扁鵲曰。病人爪甲白者不治。爪甲青者死。手足爪甲下肉黑者。八日死。手掌腫無文者死。

肩者手足三陽交會之所。爲風熱蘊結。或負重傷損。則生肩疽。宜方活命飲加柴胡。桔梗。烏金散。其惡血留結內外榮衛不通。則兩肩生疔。疽五日腫大口。禁寒戰。十二日可刺。不治二十日死。宜四聖旋疔散。陳乾



疽亦生兩肩及兩大臂連髀骨十四日痛不止不可動五十日身

熱不赤六十日可刺刺無血則死宜仙方活命飲飛龍奪命丹疰癰則生于肩

及臙色赤黑令人汗出至足不害五臟宜急治宜化毒丹鎖骨疽

者生肩前陷中故又名缺盆疽屬胃三焦兩經之病宜紫金丹奪

潰後宜十全大補湯若瘡口不合者凶太陽鬱怒所結疽生肩膊後骨上曰

上搭宜仙方活命飲加羌活桔梗心與心包風熱所侵毒生肩膊

下隙內曰夾肢癰治宜分壯盛宜一粒金丹下之老弱宜人參養榮湯其有兩臂

肘起在接骨下引手至小骨上發癰者此處連大小筋骨舉動不

便垂手墜痛膿深徹骨或致傷筋拳縮治宜緩慢其筋脈宜白芷

亦有臙臂表裏俱赤惟肘節處差小者名藕包宜內消散外又有

肘之內生癰由心肺包絡鬱火宜仙方活命飲紫金丹勝金肘之

外生癰由胃大小腸積熱鬱毒者宜紫連消毒丹此肘內外二症皆

當別老弱壯盛爲治。

壯盛宜牡蠣大黃湯下之。老弱宜千金內托散補之。

又有臂內生毒爲

魚肚。

宜神效托裏散。

臂上節生毒腫連肩髃名臂風毒者。

宜仙方活命飲加羌活獨活桂

枝枯。

此臂間二症壯盛者亦宜下。

宜內疎黃連湯。

虛而慢腫無頭服敗毒

藥不動者亦宜補。

宜十全大補湯加桂枝桔梗。

至若毒發于腋下及臂或兩手

掌中憎寒壯熱咽乾飲多嘔吐煩心脈洪大數盛者乃內疔疽也。

七八日可汗失汗者死。

宜初服內托榮衛湯汗之。繼服黃連解毒湯散之。

腕瘡者屬手三

陰經風熱毒也。生手屈之處。焮腫疼痛。

宜玉樞丹少加蟾酥塗。

兩手背生瘡

名手發背漫腫無頭。三陽經風熱鬱滯也。

宜仙方活命飲加芩連山梔桔梗升麻寒加桂

枝熱加

兩手心發毒名穿掌又名穿窟。

天蛇偏于掌邊名穿邊天

此心包絡經積熱也。

宜仙方活命飲加桂枝姜黃。

此二症壯疔者宜酌表裏汗

下之。有表症宜紫金丹汗之。裏症宜一粒金丹下之。

老弱及既潰後宜用參芪補托之。

宜黃芪木香散。十全大補湯。

若乃風熱積毒結于大腸經分致虎口發毒焮赤

腫痛。則名合谷疽。又名臂癩癩。又名手了刺。

宜仙方活命飲加桂枝姜黃升麻桔梗

治之。汗下補三法。酌同前例。至如毒之生于手指者。有五種。一曰

大指疽。端生大指頭上。初則小點如粟。頗覺痒痛。漸大如豆。如桃

如李。或青或紫。乍黃黑。或痒或麻。或木。或微心大痛。此專由肺經

積熱也。急發汗。

宜烏金散紫金丹

壯寔者急下。

宜五利大黃湯

此因大症。故人或

患此。指色黑者。其指已死。宜截去之。不然黑至臂。不治。若攻心痛

嘔吐不食。及牙縫出血者死。一名天蛇頭。除大指外。不拘四指指

頭上生毒。焮赤腫痛。既膿裂開。如蛇頭狀。故名。此則由心包絡積

熱也。

宜芩連消毒飲仙方活命飲加羌活柴胡桔梗

如既裂。急塗藥瘡口內。

宜蛇頭瘡方

一曰

代指。不拘何指。指頭先腫焮熱。掣痛。然後于爪中間結膿潰破。甚

者。爪甲俱脫。蓋爪者筋之餘。筋賴血養。血熱甚。注于指端。故成此

症。俗謂之貢爪。病同大指疽。然無蘊毒。故不青黑。亦不殺人。丹溪

以烏梅入醋研浸患處立效入門以蒲公英摘取白汁多塗立差  
綱日以生鷄子開一孔將指浸之浸三箇卽愈醫鑑以忍冬藤蒲  
公英濃煎湯浸極妙此皆治代指之法以代指爲小症不必服藥  
也一曰魚肚生手指根節或中節上亦微熱亦腫痛亦釀膿亦潰  
爛較大指疽則輕比代指則重此則全由風熱毒也宜清熱  
消毒飲一曰  
發指俗謂之了指生兩指中間相連處其疼痛往往徹骨難當亦  
由風熱毒結聚也宜清熱消毒飲  
外塗拔毒散夫自肩至手皆腫毒之多如此  
安可不詳求治法哉乃若冬月胃受烈風寒冰手足皸裂血出作  
痛宜黃蠟膏  
豬鬃酒雖非腫毒一例然既在手故類及焉以見治法之不  
可畧也是書所及遍身外症方論雖多採前  
人醫籍然大半則以瘍科選粹爲主

一切瘡瘍總論 陳文治曰凡初發壅腫未見膿者其名有三

曰癰曰癰曰疽癰初起浮赤無根腳微軟皮薄先出清水後破

膿。初生紅腫突起。無頭根。濶三四寸。發熱惡寒。抽掣疼痛。四五日後。按之微軟。其名曰癰。然初時毒氣浮淺。或汗或下。早治卽散。膿成。另法治。一等皮色不變。但微腫。肌肉內痛。夜尤甚。發熱惡寒。此熱毒極深。其名爲疽。能傷筋脉骨髓。初生一白粒如粟米。覺痒亦痛。其痛應心。此疽之始兆也。大法。焮高腫痛脉浮者。邪在表。焮痛發熱。拘急頭痛。或煩躁咽乾。亦邪在表。俱宜散。腫硬痛深脉沉者。邪在內。宜下。煩躁飲冷。焮痛脉數者。邪在上。宜清。外無焮腫。內便調和者。邪在經絡。宜調和。榮衛惡寒而不潰者。氣寔兼寒邪也。宜宣補。焮痛發熱。汗多便秘。譫語者。陽結症。宜下。腫痛不作膿者。邪氣凝結。宜解。不作膿。但熱不潰者。氣血虛。宜補。托不作膿。或不潰。或不斂者。陽氣虛。宜扶陽。治瘡之法。大要先明托裏疎通和榮衛三法。托裏者。治其外之內也。潔

古云其脉浮大當先托裏。恐邪氣入于內。蓋以脉浮數。焮腫形症外顯。恐邪氣竭而內攻。故必先托裏。宜內托復煎散。疎通者治其內之外也。潔古云若脉沉遲。當先疎其內。以絕其原。蓋以其脉沉寔發熱煩躁。外無焮腫赤痛。邪氣已深入于內。故必疎通用內疎黃連湯和榮衛者治其中也。潔古云有在內外之中者。邪氣過于經絡。故發癰腫。蓋以外無焮赤。內臟宜通知其在經。當和榮衛。故曰治其中。用當歸黃芪湯。用此三法。雖未必無變。要使邪氣峻減而易痊耳。然托裏用溫劑。疎通用涼劑。設或反投。助邪不淺。輕則危。重則死。不可不慎也。夫癰疽膿熟。自潰。或針烙而潰。毒氣已泄。卽稟賦厚。不免氣血亦虧。宜排膿內補。或膿出反痛。氣血虛也。宜補托定痛。若毒未盡。慎勿生肌收斂。以致復腫。或肉赤不斂。血虛有熱也。肉黯不斂。陽氣虛寒也。

肉死不潰。脾氣虛弱也。肉白不斂。陽氣大虛也。膿多不斂。氣血俱虛也。他如不思飲食。胃氣虛也。飲食不化。脾氣虛也。膿少色赤。血虛也。亦有爲穢氣所觸者。乳香沒藥和解之。有爲風寒所逼者。桂枝防風溫散之。若瘡肉已腐。膿不止。腫痛不已。定有筋隔住。致內膿不得出。必針挑引出之。如畏痛延挨。多致不起。若寒邪凝滯。氣血不能榮衛。致肉白膿少。瘡口不合者。最要避風。用艾湯日洗。丹溪云。諸經之瘡。惟肝胆二經氣多血少。肌肉難長。理宜預防。若用驅毒利藥。伐其陰血。禍不旋踵。斯言宜切記之。若膿已出盡。正趨吉避凶之時。風入卽爲破傷。風水入卽爲破傷。濕倉卒不知其因。害人最速。宜先摻聖效散。毋使風濕攻搏而已。然瘡或再合生膿。仍用通和藥次第治之。不可造次失手。若膿出肉腐。急貼拔毒膏。內補氣血。秋冬微加風寒藥。若膿

雖潰根脚反赤暈開展或大痛毒未退也。總以補氣血爲主。解毒藥佐之。若破後不潰。瘡口堅硬者。風也。蠹肉不腐者。熱毒結也。若瘡口易收而皮嫩薄者。不可便去。拔毒膏藥。若脉緊數。膿未成。但數。膿已成。手按大熱。有膿不熱。無膿外硬未膿。軟輒已膿。手足指稍乳上。宜令膿熟大潰。方可開之。若潰後發熱頭痛。脉緊而浮。虛而兼表邪也。潰後將斂。遍身作痒。脉浮。用消風托裏之藥。若膿潰後。脉溢遲緩。易愈。有胃氣也。脉沉細而直。裏虛欲變症也。洪滑粗散。難治。正虛邪寔也。若壯寔人患瘡。皆腫高。色赤。易腐潰。膿稠易斂。性弱人多不起發。不腐難潰。膿清不斂。如不審察。一槩尅伐。虛虛之禍不免。若瘡瘍皆由胃氣不調而生。其潰由胃氣腐化。其斂由胃氣榮養。丹溪云。治瘡瘍當助胃壯氣。使根本堅固。誠哉是言也。此總論。皆就原文而改竄之。



癰疽惡候

薛立齋曰瘡瘍之症有五善有七惡五善見三則

瘡七惡見四則危如大渴發熱洩瀉淋閉者邪火內淫也宜竹葉黃

芪湯虛宜入珍湯加黃芪山萸麥冬如膿血既瀉腫痛尤甚

五味不應佐以加減八味丸料煎服如膿血既瀉腫痛尤甚色敗臭者胃氣虛而火盛也宜人參黃芪湯不應佐以十

視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上視者肝腎陰虛而目系急

也宜六味丸料加山萸麥冬五味如喘粗氣短恍惚嗜卧者脾

肺虛火也宜六君子湯加姜棗不應如肩背不便四肢沉重者

脾腎虧損也宜補中益氣湯加山萸山藥五味如不能下食

服藥而嘔食不知味者胃氣虛弱也宜六君子湯加木香如聲

嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛也宜補中益氣

應六君子湯加炮姜更不應如腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛

十全大補湯加炮姜附子宜先服托裏溫中湯後用六此七惡之治

寒氣內淫之惡症也君子湯加附子或加姜桂

法也。此外又有潰後發熱惡寒作渴。或怔忡驚悸。寤寐不寧。牙關緊閉。或頭目赤痛。自汗盜汗。寒戰咬牙。手撒身熱。脈洪大。按之如無。或又身熱惡衣。欲投于水。其脈浮大。按之微細。衣厚仍寒。此血氣虛竭。傳變之惡症也。手足逆冷。肚腹疼痛泄利腸鳴。飲食不入。吃呃嘔吐。此陽氣虛。寒氣所乘之惡症也。又考精要論。嘔逆之症。乃因初發時。不曾服內托散。而致伏熱在心。亦有氣虛脾氣不正而嘔吐者。丹溪則謂初發當作毒氣上攻。潰後當作陰虛火逆。分先後而治。老年宜用參芪白朮膏峻補。佐使之藥。隨時隨症加減。河間則謂瘡瘍嘔者。濕氣浸于胃也。宜倍加白朮。可見病之所見者。雖內之所因者各異。惟在人之體察耳。如有汗而不惡寒。或無汗而惡寒。口禁作冷。腰背反張。頸項強勁。此血氣虛極。變症之惡症也。宜急用參芪白朮附子如心

火刑尅肺金。

如人參平肺散

陰火上炎傷肺。

宜六味丸料加五味子

潰後發熱作

渴。出愈多。由真氣虛而邪氣寔。皆為惡候耳。然則臟腑無虧。

氣血充寔。起居如常。其善豈止于五。若稟賦薄。毒氣盛。誤藥受

傷。症變不一。其惡豈止于七。醫者但察其症之變。而酌量治之。

斯得矣。奚必以善惡候之。數目拘之哉。

治肩肱肘臂腕手病方二十六

導痰湯

痰飲橋紅

南星 半夏 赤苓 枳寔 甘草

蠲痺湯

風寒甘草

當歸 薄荷 桂枝 黃芪 姜黃 羌活

蠲痺四物湯

血衰羌活

當歸 赤芍 川芎 熟地 黃芪

加味逍遙散

血燥甘草

茯苓 白朮 白芍 白朮 當歸 柴胡

舒經湯

又木各錢半

姜黃二錢 羌活 赤芍 甘草 當歸 海桐皮 白

小柴胡湯

肝火

柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

六味丸

腎虛 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓

二陳湯

澤瀉 痰性 茯苓 陳皮 半夏 甘草

星香散

又

劫勞湯

負重 人參 黃芪 當歸 白芍 熟地

八珍湯

炙草 阿膠 紫苑 姜黃 歸身 人參 茯苓 白朮 甘草 川芎 當歸 白芍 生地

補中益氣湯

脾虛 人參 黃芪 當歸 白朮 柴胡 升麻 陳皮 甘草

五積散

寒濕 茯苓 白芷 半夏 當歸 川芎 甘草 肉桂 白芍 枳殼 麻黃 陳皮 桔梗 厚朴 乾姜 蒼朮 姜黃

秦艽地黃湯

骨蒸 秦艽 丹皮 茯苓 白朮 鈞藤 甘草 生地 柴胡

二禁湯

斑點 白礬 皂礬各四兩 孩兒茶五錢 柏葉八兩 水煎濃先用桐油搽患處以桐油 紙蘸點烟熏患處再以湯洗之

當歸酒

年久 當歸一味浸酒常飲效

當歸酒

年久 當歸一味浸酒常飲效

虎脰骨酒

又虎脰骨搗碎炙黃新白芍各二兩  
羊角屑一兩酒浸七日秋冬倍之  
腹飲一杯

天仙籐散

癩注天仙籐白芷稍白朮羌活各三錢  
片姜黃六錢半夏五錢每末五錢加  
姜五片煎服

防風根湯

絛虛防風根于朮當歸姜黃生黃芪  
桑枝製首烏杞子歸身三角胡麻

桑枝膏丸

肝病製首烏杞子歸身三角胡麻  
菊花炭柏子仁刺蒺藜桑枝膏丸

歸脾湯

脾虛人參黃芪當歸白朮茯神  
黃仁遠志木香甘草圓眼姜朮

防風牛蒡湯

血熱防風山柅石膏黃芩蒼朮  
木通甘草牛蒡子

瀉青赤湯

心肝火龍胆草青黛羌活防風山  
柅生地黃芩黃連木通甘草加  
大黃亦可

抑肝導赤湯

素弱鈎藤當歸白朮茯苓木通  
柴胡川芎羌活防風山柅生地  
生草炙草

胃風湯

胃風 升麻 蔓荊子 白芷 蒼朮 葛根 當歸 柴胡 黃柏 麻黃 草薺

續命煮散

續命 防風 甘草 蜀活 荆芥 肉桂 人參 葛根 生地 遠志 當歸 細辛 白芍 川芎 牛夏

治肩臑肘臂腕手瘍方四十二

仙方活命飲

肩臑 貝母 陳皮 花柳 白芷 防風 赤芍 甘草 歸尾 穿山甲 炒黃 皂角 刺各一錢

四聖旋疔散

錢半 巴豆五分 醋調用 輕粉 硃砂各二 此方端治疔瘡生于四肢其勢微者先以好醋調藥塗疔道上以紙護之次服內托之藥其疔自出矣

追疔奪命湯

又 蝉退四分 澤蘭五分 青皮 金錢重 襍各七分 防風 細辛各八分 黃連 首

烏 羌活 大黃一錢 加姜葱 臨臥入酒一杯 服衣覆

身形

肩臑肘臂腕手瘍方

卷二十六 十一

# 飛龍奪命丹

取汗

此方尚治疔瘡

陳乾疽

蟾酥

三錢酒化

雄黃二錢

麝香五

五分

乳香

沒藥

銅綠各二錢

麝香五

分另研

冰片

五分另研

蜈蚣一條

去頭足酒炙

辰砂

血竭

各一錢

蜈蚣一條去頭足酒炙

黃

共為末

用蠟牛二十個

和藥搗爛入飛麵

為丸

每服一丸

勢重入壯二

三九以葱白三個

全藥

嚼爛好酒送下

于避風處重衣蓋定

約行

五里

再服熱酒數杯

以助藥力發熱

大汗為妙

痘瘰

乳香

沒藥各五錢

另研

九粒

去皮心另研

草烏頭醋浸炮製

其醋候

用醋調

麵湖丸每服五

七丸食後冷酒下

忌熱飲

利二三

次或吐出惡物為效

此方治一切腫毒初覺一二日咳逆煩悶或咽

喉閉塞發熱惡寒者

# 內消丸

又

青皮

陳皮各二兩

牽牛八兩取頭末

二兩

皂角去粗皮搗碎

薄荷葉各八兩

二

味共用水

一斗煮揉汁浸

火熬膏即

以膏和丸

每三十九丸

食後刺茶湯下

此方尚治瘡腫初生熱毒鬱滯服之內消大有神效

紫金丹

缺盆疽

奪命丹

石人 麝酥 輕粉各五分 珠砂三錢 寒水  
 枯礬 銅綠 麝香 乳香 沒藥各一  
 錢 蝸牛三十個 另研為丸如乾加酒糊每  
 用一丸用葱白三四根嚼爛此手心包藥熱酒  
 送下約行六七里汗出為效重者再一二丸但  
 此為少陰經劫藥用者當量輕重  
 此方兼治一切大腫毒功與飛龍奪命丹相等

十全大補湯

人參 黃芪 當歸 白朮 白芍 熟  
 地 茯苓 川芎 肉桂 炙草 姜 棗  
 人參 黃芪 當歸 肉桂 炙草 姜 棗  
 皮 炙草 各一錢 遠志 肉桂 白朮 陳  
 半 熟地 茯苓 五味子 各八分

人參養榮湯

一粒金丹

夾子尾 沉香 乳香 木香各五分 巴霜  
 錢半 右為末照分數和勻黑棗肉九枚子大  
 每服一丸量人虛寔先呷水一口即行一次胃  
 氣寔者只可三四口後用水一口送下一丸行  
 數次以米飲補之即止



白芷升麻湯

白芷一錢半 升麻 桔梗各一錢  
酒黃芩四錢 生黃芩三錢 炙甘草各五分 水二酒一煎

內消散

藕包 皂角刺七個 桃仁四十九粒 炒黃  
穿山甲 炒羚羊角 大黃各一錢俱為末  
金銀花 花粉 厚朴各一錢 乳香一錢為  
末 水一錢先將金銀花角刺厚朴花粉桃仁  
五味煎六分調送四味末服  
此方未成膿即消已膿從大便出  
時埽塗勿令乾 桐油三倍 和勻以鷲翎時

油泥膏

勝金丹

肘搥 製白砒 麝香各五分 蟾酥一錢  
雄黃 辰砂 乳香 沒藥 血竭各錢半  
炮全蝎 炙天龍去頭足 炒穿山甲各三錢  
炒殭蚕五錢 右研末秤勻每三錢砂糖調  
葱頭酒下取汗

芩連消毒飲

黃芩 黃連 柴胡 羌活 防風 荆  
芥 白芷 川芎 連翹 桔梗 枳殼 射  
干 甘草 大黃 牛蒡子 等分 惟桔梗加  
倍

牡蠣大黃湯

肘搥 煨大黃 牡蠣 木香各錢半 水煎  
春夏露一宿冬月于煖處一宿鷄鳴時溫服得

利後卽勿服

千金內托散

川芎 金銀花

人參

黃芪

當歸

赤芍

甘草各一錢

水煎入酒半盞服日三帖服後

當歸各五錢

神效托裏散

魚肚 黃芪 鹽水炙

酒煎服渣敷患處

忍冬藤

當歸

枳殼

木香

內疎黃連湯

黃芩 山梔

薄荷

枳殼

甘草各一錢

連喬

姜水煎量人虛定用

此方兼治一切密瀉發熱而嘔便結脈洪症

內托榮衛湯

柴胡 黃芪

羌活

紅花

連喬

蒼朮

酒歸

甘草各一錢 杜枝七分

防風

黃芩

人參

炙

黃芪 桂枝 各五錢 蒼朮 紅花 各三錢 防風 羌活

黃芩 當歸 各錢半 爲末服

此方端治風濕熱鬱于手足少陽而致血脈凝

逆元氣消弱面色赤腫微黯時多忿怒瘡色赤

點腫硬奮然高起脈洪緩而弦用此發汗以通

榮衛則邪氣去矣

黃連解毒湯

炒黃柏 黃芩

黃連

山梔

各錢半

此方端治瘡瘍痲腫煩躁飲冷脈洪數發狂言

身形

肩臑肘臂腕手瘡瘍方

卷二十六

七

玉樞丹

腕瘡 五倍子洗淨打碎三兩 山茨藪去皮  
淨末二兩 麝香三錢另研 千金子霜 紅  
牙大戟去蘆焙乾為末各一兩 糯米濃飲丸  
每料作四十錠此藥能應諸病各有神效若瘡  
疽用東流水磨塗并服須端午日合 一方有  
全竭雄黃硃砂各一兩名神仙追毒丸 此玉  
樞丹即紫金錠也

黃芪木香散

手瘡

烏金散

九指疽 牙皂四分 製人信 麝香 蟾酥  
各五分 髮灰 蛇壳 蝦 蜂房 各一錢  
蝉退 血竭 乳香 雄荷 各二錢半 全蠍 三  
穿山甲炙 硃砂 天龍去頭足四錢 川烏尖  
錢湯泡七次 各為末秤准和勻每服三錢砂  
沒藥各錢半 糖調葱頭酒送下取汗  
此方能治一切無名腫毒  
又 大黃根 黃芩 升麻各錢二分 黑山  
梔 芒硝各一錢 水煎稍熱服  
此方端治瘡疽初發年壯氣盛大小便秘宜服  
此藥

五利大黃湯

蛇頭瘡方

蛇頭 雄黃 蜈蚣 全蝎各一錢 共為末  
瘡口開入藥在內以小油抹帛拴住如乾小油  
搽潤

清熱消毒飲

鰾肚 黃連 山梔 連翹 當歸各一錢  
川芎 白芍 生地各錢半 炙甘草八分

拔毒散

此方端治瘡疔發于陽腫痛發熱作渴  
竹指 乳香 泥蜂窩多在壁縫間 為末醋  
調塗乾以醋潤痛立止  
破裂 清油五錢煎沸入黃蠟一塊煎溶入胡  
粉五倍子末各少許熬紫色先以湯洗患處敷  
藥以紙貼之

黃蠟膏

猪腦酒

聖效散

拔毒膏

又 猪腦子研爛入熱酒中或洗或塗皆可  
以兔腦生塗之更妙  
預防風濕 黃柏炒黑 穿山甲炒黃各一兩  
棋榔 木香 鷄內金各五錢 每用末少  
許搽瘡口日五七次方見效  
此方治潰瘍毒已盡先以蛇床子湯洗用此  
外貼 草麻子肉 銅青各一兩同研 大薊  
汁一磅 豆油春夏三兩秋冬四兩 松香一  
斤水煮濾淨 先將油煎滾入松香鎔化下大  
薊汁沸水盡下水缸內如絞糖法入草麻銅青

身形

肩 臑 肘 臂 腕 手 瘡 瘍 方

卷二十六 古

攪勻以器盛之如用重湯煮化難貼  
此方能呼膿長肉

### 竹葉黃芪湯

邪火 生地 黃芪各二錢 當歸 川芎  
甘草 白芍 黃芩 花粉 人參 淡竹葉  
各一錢 熟石膏錢半 麥冬二錢 姜三

此方治瘧疽大渴發熱小便如淋

### 八珍湯

又 人參 茯苓 白朮 炙甘草 川芎 當歸 白芍 地黃

### 加減八味丸

又 熟地八兩 山萸 山藥各四兩 丹皮 茯苓 澤瀉三兩 肉桂 五味各一兩

### 人參黃芪湯

胃虛 黃芪一錢 炒黃柏五分 當歸 升麻 人參 麥冬 陳皮 白朮 蒼朮各五

分

### 六味丸

陰虛 熟地 山藥 山萸 丹皮 茯苓 澤瀉

### 六君子湯

虛火 人參 茯苓 白朮 炙甘草 陳皮 半夏

### 補中益氣湯

又 陽虛 附子 羌活各四錢 乾姜炒三錢 炙甘草二錢 丁香 沉香 木香 茴香

### 托裏溫中湯

陳皮 益智仁各一錢

此方治膿潰元氣虛寒或過服桂枝致胃氣散

隨腸鳴腹痛便泄神昏此寒變內陷爲七惡之症緩則不治

### 人參平肺散

火炷全人參 陳皮 桑皮 甘草 地骨皮 茯苓各一錢 炒知母七分 五味子粒炒 天冬 青皮各四分  
此方端治心火炷肺爲癆爲瘦咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

### 附錄瘡瘍外治雜方

#### 乳香定痛散

乳香 沒藥各五錢 寒水石一兩 水片一錢 研末搽患處痛卽止 此治潰爛後痛

#### 追毒散

全蠍五錢 五靈脂 川烏頭炮 炮姜各一兩 研細末少許搽瘡口深者紙蘸蘸藥條之外貼膏藥惡症重症以蒸餅浸透丸作長細條子緝入瘡口各追毒錠子  
此方治一切惡瘡膿水不快者

#### 翠霞散

滑石一兩 銅綠五錢 輕粉二錢 水片一錢 麝香各三分 粉霜二分半 研末緝瘡口以膏貼之

#### 搜膿散

此方治一切惡瘡去毒生肌  
白芷一兩 川芎二兩 白芍三兩 輕粉三錢 研末搽瘡口深者緝之  
身形 肩膊肘臂腕手瘡瘍方

此方能治年深不斂惡瘡

### 桃花散

白芨 白欬 黃柏 黃連 乳香另研 麝香 黃丹洗淨炒 等分研末 瘡上二三日 卽生肌平滿此方端能生肌

### 萬應針頭丸

麝香二錢 血竭如蠟一塊者 輕粉 蟾酥 辣者 硃砂各三錢 冰片一錢 蜈蚣一對 全用 煉蜜丸如瘡有頭者針挑見血以黍米大藥放瘡口用紙花周圍津濕貼之立愈 此方治一切惡瘡生于腦背毒大欲死者一粒卽愈

### 針頭散

乳香 麝酥各一錢 研勻人乳和如泥磁盒收貯如用以津調一些點腫處以膏貼之毒白消卽發亦輕

### 去腐散

此方端治瘡瘍腫木硬 麻虫 指甲 輕粉 飛麵各五分 蟾酥少許 津調丸麻子大每三四丸入毒內以膏貼 此方能去敗生新神效

### 替針丸

白丁香 硃砂 沒藥 乳香各一錢 糯米四十粒用礮灰拳大一塊放碗內入片水待熱氣將息以米排灰中良久米如水晶狀取出候用 右各另研末和勻將灰內糯米研爛作丸

透膿散

消蝕散

雄黃散

諸般敗毒散

金箍膏

圍藥方

菜豆大如不放量取飯粒研和以一粒粘瘡頭  
 上以小膏貼使不移動其膿自潰  
 已出膿大盞一個燒存性酒服若多用一個  
 則毒多生一孔切記 此治瘡毒無頭者  
 枯白礬一兩 枳殼 雄黃 乳香 遠志  
 肉 胭脂各一錢 蜜水 研膏敷惡肉上麻油  
 調亦可

此方能消惡肉淫疽朽骨  
 雄黃末一錢 巴豆一個不去皮共研如泥再  
 入乳香沒藥各少許再研細點上惡肉自去  
 此膏藥內入雄黃巴豆少許不傷好肉止去惡  
 肉諸瘡瘻有惡肉者皆可去

大黃四兩剉細 先以當歸一兩切用酒二碗  
 煎八分將大黃片拌一宿曬乾為末趁用每服  
 時以白芷一錢連喬六錢酒煎八分露一宿調  
 服大黃三錢其毒盡從大便中出出後以粥湯  
 止之 上部毒飽肚服下部毒空心服用連酒  
 和丸服亦可

鳳仙花子 大黃 五倍子各十兩為細末  
 人中白兩半如無以皮硝代 陳小粉三年者  
 十三兩 共入鐵鍋內炒至黃焦色米醋調腫  
 毒初起圍之

五倍子炒焦黑 陳小粉炒黃黑各五斤 罌  
 板燒 白芨 白欬 朴硝 榆樹皮各十二  
 身形 肩 臑 肘 臂 腕 手 瘡 瘍 方 卷 三 十 六 共



兩 白芷 精 大黃 南星 黃柏 半夏 各  
八兩 黃連 牙皂 葶麻子 各四兩 醋調  
瓦盆內慢火熬成膏  
此方尚治一切瘡疽發背便毒吹乳橫痃及風  
濕疼痛小兒熱毒火丹無名腫毒初起者圍之  
即散已成者圍之即生頭出膿定痛散毒真聖  
藥也每用加白蜜猪胆醋三味和勻圍腫處中  
留一孔綿紙貼之如紙乾以刷子刷上

頸項病源流

沈金

頸項強病肝腎膀胱病也。三經感受風寒濕邪則項強。風熱勝宜加味逍遙散。

肝血虛肝火旺亦筋燥強急。宜烏湯。而其所屬諸病有

項下卒腫堅硬者。由于肝腎之病。昆布海藻海帶必用。外則于風

熱濕三者察之。有常慣項痛者。宜六味丸。間有感冒項強或痛者。

宜鹽。有痰盛項痛者。宜治風。有濕盛項痛者。宜加味。有項筋急不

得轉側者。宜木。有胃氣上攻項筋逆背痛不可轉側者。宜椒。有腮

項相連腫痛發熱使閉者。宜防風。有項面腫眾人一般者。是疫癘。

宜苦。有腦後腫者。恐是疽。宜黃連。若兼堅腫木硬。口燥舌乾惡

心煩渴便秘。宜石決。有頸項腫痛寒熱頭眩者。是氣毒。宜加味。有

頸項結核浮腫先寒後熱者。此風寒所搏。宜防風。有頸項結核堅

腫色紅慍熱者。是熱毒。宜連翹。有項強不能回顧動則腦痛脉弦

數寔者是痰熱客太陽經。

宜二陳湯加酒炒。黃芩羌活紅花。

有傷寒後項前後腫

硬作痛身熱者。

宜柴胡葛根湯。

有傷寒後項腫痛却不紅身不熱者。

宜牛

結

湯有項強卒口噤背反張成痙病者。

宜烏藥散。羌活獨活木瓜。

以上皆項

強之病。而又有項軟者。天柱骨倒也。

宜健骨散。

小兒久患疳疾體

虛不食。及諸病後。往往患此。俗醫謂之五軟。

宜天柱元。

五加皮散。頸項之爲

地雖小。其病亦如此之多。可忽視哉。

頸項部位症治

靈樞曰。前曰頸。後曰項。又曰缺盆之中。任脉

也。名曰天突。一次任脉側之動脈。足陽明也。名曰人迎。二次手

陽明之脉。名曰扶突。三次手太陽之脉。名曰天窗。四次足少陽

之脉。名曰天容。五次手少陽之脉。名曰天牖。六次足太陽之脉。

名曰天柱。七次項中央督脉。名曰風府。

風府穴名。也在腦後。

資生曰。內

經云。巨陽者。諸陽之屬也。其脉連于風府。蓋爲諸陽王氣也。然

則固傷寒之所自起也。北人皆以毛裘之。南人怯弱者亦以帛護其項。故風府宜護也。本草單方曰：風襲項強，不得顧視者，穿地作坑，煨赤，以水洒之，令溫，鋪生桃葉于內，卧席上，以項着坑上，蒸至汗出，良久，卽寢，或以大豆一升蒸變色，囊裹枕之，亦愈也。

頸項瘡瘍最重者，莫如對口瘡。生頸後腦下，緣督脉，陽盛火毒上

炎所致。若焮赤腫痛者，可治。如根脚大，精神憤，便屬惡候，宜量其

虛寔。虛弱者汗之。宜勝金丹壯寔者下之。宜一粒。或用內托內消法。宜

裏稍毒散仙方活命飲。氣血虛者尤宜補托。宜托裏散。外用圍藥圍住，勿令毒走

洩。如漸腫至肩上，或毒邪壅盛，鮮血瀑湧，或毒攻心腹，膨脹譫語，

或潰後風入發搐，皆死不治。其次百脉疽，腫起環頸項，焮赤作痛，

身灼熱，不能食，上氣咳嗽，其發引耳，其原由有所大驚恐也。十五

日可刺導引見血否則八十日死。宜神效托裏散其次天疽生頸上腫大

而色赤黑不急治則熱毒前傷任脈下侵淵腋內入肝肺十餘日

死。宜仙方活命飲其次夾疽生喉兩旁由心肝脾三經火熱上攻也若潰

內者死不治。宜琥珀犀角膏黃連消毒飲其次猛疽生嗑中又名喉癰由任脈

及心小腸積熱憂憤所致。宜琥珀犀角膏黃連消毒飲壯寔人先用下法以洩

毒。宜一粒金丹若過時不治穿爛咽喉者死膿不泄而塞咽亦立死其

次頸癰三焦鬱火所發也。宜仙方活命飲加元參桔梗虛弱人或先汗之。宜奔

壯寔人或先下之。宜一粒金丹老弱人必用補之。宜人參養榮湯神勞多怒者

必當消解之。宜八珍湯加柴胡香附費心過度者急培補之。宜補中益氣湯更有婦

人鬱怒悲憤頸項腫後月水不通小便如淋則又關于血分矣宜

先調之。宜紅丸俟經行腫消補之。宜六君子湯加柴胡枳殼以上皆頸項瘡瘍發

之于暫者也其有累月經年久而不愈者則曰痰核曰癰癧曰馬

刀日瘰癧。痰核者濕痰流聚成塊。不紅不痛。不作膿。推動軟滑。多

生頸項。

宜崇消痰核仙方。海帶丸消核丸。

亦有生手臂肩背者。雖覺微痛。但腫不

紅。

宜二陳湯加防風酒芩。消痰湯。

亦有胸中胃腕至咽門。窄狹如線疼痛。

及手足俱有核如胡桃者。

宜開氣消痰湯。

亦有咽喉結核腫痛。頸項不得

回轉。兩腋下塊如石硬者。

宜消痰湯。

亦有風痰鬱結而成核者。

亦有酒怒氣發。腫痛潰膿。痰核生于腋下。久不能瘥者。

有生于耳後連項下。三五成簇。不紅不腫。不作膿者。

宜內托白散散。

後少陽經中疔瘡。赤硬腫痛者。

宜山藥膏。

亦有痰核紅腫寒熱狀如癰

癰者。

宜石灰火煨爲末。白果肉同搗貼。

亦有枕後生痰。正則爲癰。側則爲痺者。

虛白浮石燒存性入輕粉少許。研麻油調。

總之痰核一症。生在上

體多兼風。熱生在下。體多兼濕熱。

宜加味小胃丹。竹瀝達痰丸。

癰癧者內經通

謂之結核。如大豆。如銀杏。連屬者是也。多起于耳後。其原由怒火

風熱血燥。或肝腎二經精血虧損。虛火內動。或志怒氣逆。憂思過度。風熱之邪。內搏于肝。肝主筋。肝受病。則筋縮累累。如貫珠也。故此症專屬於肝。兼屬胆。與三焦以肝爲雷火。而胆三焦皆有相火。以爲助也。雖然。癰癧者。其總名而就形分類。則各有指名。可按焉。排行成列。或繞遍項。或二三。或六七。或赤。或白。或沉。或浮。初如豆。久似梅。甚如鷄卵。此名蟠蛇癰。憂思勞力。則疼痛赤腫。早治爲急。宜梔子清肝湯。連喬散。堅湯。頸項間止生一個者。名單窠癰。最爲難治。宜小犀角丸外起一胞。中裹十數核塊者。名蓮子癰。手推能動。尙可用藥。宜內消丸若堅硬如石。必發熱躁渴。死不治。初則單生頸項左右。後則重疊而起。名重臺癰。亦死症。且害人甚速。形似燕窩者。名燕窩癰。亦死症。初生在項。破後流注四肢。遍體結毒。如梅李狀。不療自破。孔竅相穿。寒熱疼痛。膿汁淋漓。名流注癰。又名干歲瘡。婦人多患。

之。宜化氣調經湯夏枯草散而治之之法。當細覈其原由形症以用藥。如脉沉

數。是厥赤腫痛。由邪氣之寔。是急當泄之。宜消毒化堅湯如脉浮數。憎寒壯

熱。拘急腫痛。由邪氣在表。急當表散。宜荆防敗毒散如由于大怒。肝邪

橫逆。急疏肝行氣。宜小柴胡湯加青皮如由氣血虛腫硬不潰。急

補氣養血。宜益氣養榮湯如由氣血虛潰後不能收斂。急當調補。宜先服

榮湯。次服十全大補湯。如由虛勞而致。急須補益。宜先服補中益氣

湯。加香附貝母遠志。如由虛勞而致。急須補益。宜先服補中益氣

湯。如脉數寔不消。或不斂。急當下之。宜羌活連翹湯如腫痛發寒熱大便

秘結。當先下後托。宜先服羌活連翹湯如耳下核塊腫痛。發寒作

熱。急發表。宜荆防敗毒散表症退。急消毒。宜散腫潰堅湯如腫硬久不消。亦不作

膿。服敗毒散。堅藥不應。急灸肘尖肩尖。再服藥。宜益氣養榮湯如由血虛

脉大無力。潰後發熱煩躁。急當補陰。宜當歸補血湯總之初覺憎寒壯熱。

咽項強急。腫結疼痛者。急為消散。宜羌活連翹湯又時服消癰九。外以稜針刺出。



血以拔毒湯令洗。一日內時刻時洗至五六次。刺時放蟾酥少許。

于針處上以膏貼。宜琥珀膏更貼內消膏自然消散。若已潰不愈。然後用補

益藥。宜益氣養榮湯或八物湯加柴胡地骨皮夏枯草香附貝母多服取效。此先後之法。其用

藥大身不可紊亂推之。凡屬瘡瘍皆然。不獨癩瘻已也。馬刀者亦

屬三焦肝胆浸淫于陽明太陽流注于胸脇腋。下堅硬如石。形長

如哈者是也。不論已破未破。年近年遠。總宜以夏枯草濃煎食遠

溫服。虛弱人熬膏服。并塗患處。以此草生血。乃治馬刀癩瘻聖藥

也。久服恐嫌尅伐。常以十全大補湯加香附貝母遠志。相開而服。

而其方藥。又不可不詳求以備急用。宜連喬散堅湯消腫湯散腫

補中勝毒餅如此則症雖險惡。亦不患無法以治之也。癭瘤者。氣血凝

滯年數深遠。漸長漸大之症。何謂癭。其皮寬。有似櫻桃。故名癭。亦

名癭氣。又名影袋。何謂瘤。其皮急。有似石榴。故名瘤。亦名瘤贅。是

癭瘰本異症也。其症皆隸五臟。其原皆由肝火。蓋人怒動肝邪。血  
涸筋攣。又或外邪搏擊。故成此二症。惟憂恚耗傷心肺。故癭多着  
頸項。及肩。惟有所勞。慾邪乘經氣之虛。而住留。故癭隨處皆有。陳  
文治曰。自筋腫起。按之如筋聚之狀。而或有赤縷。名曰筋癭。屬于  
肝也。宜六味丸。或四物湯。加山梔木瓜。自肌肉腫起。久而有赤縷。或皮色俱赤。名  
曰血癭。屬于心也。宜四物湯。加茯苓。遠志。自肌肉腫起。按之寔軟。名曰內癭。  
屬于脾也。宜歸脾湯。補中益氣湯。自皮膚腫起。按之浮軟。名曰氣癭。屬于肺。  
也。宜補中益氣湯。自骨腫起。按之堅硬。名曰骨癭。屬于腎也。宜六味丸。補  
中益氣湯。而三因方。又于骨肉血三癭之外。增膿癭。宜海石。散一井散。脂癭。宜治脂  
癭方。謂癭名有六。其初起皆作梅李狀。皮嫩而光。漸如杯  
卵。不可決潰。內癭尤不可破。破則殺人。惟脂癭粉紅色。全是痰結。  
宜用針決去脂粉。或有如茄垂下。根甚小者。用藥點其蒂。宜五侯  
灰膏。

茄落卽以生脂膏貼之自愈。須防其出血。如血出急。以藥止之。宜

血藥桃。三因之言。亦病日變。生多種之謂也。且不但此也。有手背

生瘤。或如鷄距。或如羊角。向明照之。如桃膠。曰膠瘤者。宜以排針

按出黃膿如膠。有生于面曰粉瘤者。宜海藻。有翹花瘤者。宜馬齒

者。二三世立平。洗反研細。薛立齋曰。筋脉呈露曰筋癭。宜玉壺散。亦脉交絡曰血

瘰。宜化癭丹。四。皮色不變曰肉癭。宜人參。隨憂愁消長曰氣癭。宜

頭翁丸。消癭。堅硬不可移曰石癭。宜破。三因言五癭之名亦同。謂

散海帶丸。皆不可決破。破則膿血崩潰。多致天枉。如破宜桃花。其言是也。然

西北方依山聚澗之民。食溪谷之水。受冷毒之氣。其間婦女。往往

生結囊。如癭。皮色不變。不痛不痒。余前遊宣化府。曾立方治數婦

人。皆得效。此方書所未及者。宜沈氏。癭囊丸。故特誌之。

痰核症治。丹溪曰。結核在皮裏膜外。多是濕痰流注。作核不

散問其平日好食何物吐下後用藥散核。入門曰：遍身有核，多是痰注。宜竹瀝逢痰丸。

癩癧症治。外臺秘要曰：肝腎虛熱，則生癩。病機云：癩癧不係膏梁丹熱之變，因虛勞氣鬱所致。宜補形氣調經脈。其瘡自愈，不得妄汗妄下，致有虛虛之禍。陳文治曰：初覺增寒壯熱，咽項強痛，或寒熱癩痛，乃肝火風熱而氣病也。使用梔子清肝湯、柴胡清肝湯以清肝火，加味四物湯以養肝血。若手推可動而軟滑者，屬痰也，以化痰爲主。用二陳湯加防風、桔梗、黃芩、竹瀝。見于少陽之分者，柴胡通經湯。見于陽明之分者，升麻調經湯。若寒熱止而核不消，乃肝經火燥而血病也。用加味逍遙散以清肝火。六味丸以生腎水。或初用牡蠣大黃湯，疎下二三次，或服內消丸。外貼琥珀膏。內外兼治，必使消散。如此用藥，卒不可

退其人面色痿黃。患處腫高稍軟。皮膚壯熱。膿已成也。宜以針刺核中。外貼琥珀膏。仍服托裏之劑。三日後。取去核中稠膿。膿盡。又取核外薄膜。先破初起之核。以絕其源。餘核不消。盡如前法。次用龍珠膏。金寶膏。除去其根。而服除風熱之藥。自是可愈。若已成癭。則用蒜餅子灸法。瘡口貼琥珀膏。先哲立法不一。而必效。散立應。散瓜萋散大有奇效。又曰。男子患此。最怕咳嗽。潮熱。女子患此。亦忌經閉潮熱。但以玉燭散和血通經。服之自消。經久閉者。用加味道遙散。清肝益榮湯。丹溪曰。治癰癧。以必效散與瓜萋散相間而服。效驗如神。然必效立應二散。非王道藥之劑。服後宜酌量調治。

馬刀症治 入門口生胸脇腋下。堅硬如石。形如馬刀。蛤者曰馬刀。又曰。患馬刀者。取立應散一錢。濃煎木通湯調下。臨卧服。

毒從小便出如粉片血塊是也未效再服。斑猫性毒。濟以烏尖。或衝上麻悶。嚼葱白茶清下以解之。如尿澁。益元散。或五苓散。燈心煎湯調下。宜毒後。繼服薄荷丹解其風熱。

瘦瘤症治 入門曰。瘦瘤初起。通用十六味流氣飲。久服蠟礬丸。外敷南星膏。瘍科書曰。此疾宜補脾肺。滋心腎。令木得水。而敷華筋。得血而滋潤。多有可生。

對口瘡治法 瘍科書曰。治對口瘡。用鮮白茄蒂七枚。秤若干。重。又用鮮首烏。秤同茄蒂重。水鍾半煎服。一服出膿。一服收口。如無鮮者。收取乾者亦可。此爲輕劑。不可以治重病耳。

治頸項病方二十一

加味小胡湯

柴胡 風熱 白木

柴胡 當歸

黃芩 黃芪 黃柏

人參

甘草 知母 各一錢

川芎

半夏五分 水煎食前服 痛甚加黃連

加味逍遙散

濕勝 白芍 白朮各一錢 麥冬 茯苓  
生地各六分 甘草 桔梗各二分 當歸  
地骨皮各八分 山梔 黃柏各三分

此方兼治外症潮熱虛甚者  
肝虛 首烏五錢 牛膝三錢 草薢 澤瀉  
甘草各一錢

首烏湯

常痛 熟地 山萸 山藥 丹皮 茯苓  
白芷 獨活 川芎 桑木 葛根 柴胡

六味丸

聖邪湯

防風 獨活 川芎 桑木 葛根 柴胡  
白芷 生薑

治風豁痰湯

痰盛 黃芩 紅花 茯苓 獨活 葛根  
半夏 羌活 陳皮 甘草 防風 白芷  
柴胡 升麻 生薑

加味勝濕湯

羌活 獨活 桑本 防風 川芎  
蒼朮 荆芥 黃柏 蔓荊子

木瓜煎

木瓜一個去瓢 沒藥一兩研細納木  
瓜中兩半繫扎飯上蒸三四次研爛地黃汁酒  
下三匙

椒附散

筋痛 附子一個六錢以上者炮研每用二錢  
川椒廿粒 姜七片 水煎去渣入鹽少許

防風通聖散

項明 防風 白芍 薄荷 川芎 山梔  
桔梗 黃芩 白朮 荊芥 當歸 麻黃  
連翹 滑石 石膏 甘草 芒硝 酒大黃

普濟消毒飲

疫癘 黃連 黃芩 陳皮 元參 柴胡  
甘草 桔梗 連翹 升麻 殭蚕 大黃  
牛蒡子

黃連救苦湯

腦後腫 黃連 葛根 升麻 柴胡 甘草  
赤芍 川芎 連翹 歸尾 桔梗 黃  
芩 羌活 防風 忍冬藤 水酒煎

石決明湯

又 生石決明 殭蚕 防風 穿山甲 連  
翹 羌活 各一錢 乳香 甘草 忍冬藤  
黃連 歸尾 大黃 花粉 各八分 酒水煎

加味藿香散

氣逆 藿香 甘草 桔梗 青皮 陳皮  
柴胡 紫蘇 半夏 白朮 白芷 茯苓  
厚朴 川芎 香附 夏枯草

防風解毒湯

結核 防風 荊芥 桔梗 連翹 甘草  
石膏 薄荷 枳殼 川芎 蒼朮 燈心  
牛蒡子 酒知母



蓮喬消毒飲

熱毒 連喬 陳皮 桔梗 元參 黃芩  
赤芍 當歸 山梔 葛根 射干 花粉  
紅花 甘草 便秘加大黃

柴胡葛根湯

柴胡 葛根 花粉 桔梗 連喬  
石膏 升麻 甘草 牛蒡子  
黃芩 不紅 桔梗 陳皮 黃連 花粉 川芎

牛蒡甘桔湯

赤芍 甘草 蘇木 牛蒡子  
項軋 礬蚕炒為末每五分或一錢酒泡薄荷  
下日三服

健骨散

木鼈子三個 草麻子三十粒 俱去壳  
研勻先抱病人頭起摩項中令熱作片貼之

生筋散

研細入麝香少許飯丸荆芥姜湯下  
又 蛇含石一大塊醋煨七次 鬱金末少許

天柱元

又 五加皮一味為末酒調塗項骨上乾則易

五加皮散

治頸項瘡瘍方八十六

勝金丹

對口 製白砒 麝香各五分 蟾酥一錢  
雄黃 辰砂 乳香 沒藥 血竭各錢半  
全蝎炮 天龍去頭尾炙 炙穿山甲各三錢  
姜蚕炒五錢 每末二錢沙糖調葱頭酒下

一粒金丹

又 沉香 乳香 木香各五分 巴霜一錢  
牛 各為末照前數和勻黑棗肉丸芥子大每

服一丸，聖人虛定，先呷水一口，行一次，胃氣定，只可呷三四口，後用水一口，送下行，後米飲止之。

### 托裏消毒散

又 人參 鹽黃芪 酒當歸 炒白芍 川芎 焦朮 茯苓各一錢 金銀花 白芷各七錢 炙草 連翹各五分 加減法載在前

### 仙方活命飲

花柳 穿山甲 白芷 赤芍 甘草 歸尾 貝母 角刺各一錢 金銀花 陳皮 各三錢 乳香 沒藥各一錢 二味另研末 水酒煎好，送下二木

### 托裏散

又 人參 炒黃芪 各二錢 焦朮 陳皮 熟地 茯苓 白芍 各一錢 半 黃芪 鹽水炙 忍冬葉 當歸 各五錢 粉草 二錢 酒煎服 渣敷患處

### 神效托裏散

此方兼治瘰癧，疔發背，腸癰，乃托裏消毒之良劑

### 琥珀犀角膏

外症 琥珀 生犀角 各一錢 辰砂 人參 茯神 棗仁 各二錢 冰片 二分 半另研 右各另研和勻，煉蜜調成膏，每服一彈子，大麥冬湯化開十五服，凡瘡瘍潰後不宜用

### 黃連消毒飲

川芎 黃連 山梔 當歸 連翹 各一錢 白芍 炒 生地 各錢半 炙草 八分

身形

頸項癆方

卷二十六 三五

奪命丹

金銀花二錢 亦各清熱消毒飲  
此方兼治一切癰疽發于陽腫痛發熱作渴  
致癰 蟾酥 輕粉各五分 硃砂三錢 寒  
水石 枯礬 錳綠各一錢 乳香 沒藥  
麝香各一錢 蝸牛三十一个另研如泥和爲  
丸菜豆大每用一丸生葱白三四根嚼爛吐手  
心包藥在內酒下約行六七里汗出爲效重者  
再服一二丸

人參養榮湯

此方主諸般太腫毒然劫劑也用者當酌輕重  
陰陽之分

又 陳皮 白芍 三兩 人參 白朮 甘草 黃芪  
肉桂各一兩 茯苓 熟地 五味  
子各七錢 遠志 五錢 每貼取末三錢 姜水  
煎空心溫服效 虛甚者煉蜜丸可常服 遺  
精加龍骨 咳嗽加阿膠麥冬 挾火加知母  
黃柏

八珍湯

又 人參 茯苓 白朮 甘草 川芎 當  
歸 白芍 熟地  
補中益氣湯 又 人參 黃芪 當歸 白朮 升麻 柴  
胡 陳皮 甘草

椒紅丸

又 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏 陳  
皮

六君子湯

又 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏 陳  
皮

崑消痰仙方

研細 枳壳十四個破開去子 大黃五錢生  
片對合入斑貓十個去頭足翅 每用枳壳兩

一分入枳壳兩片內錢扎緊再將夏枯草六兩

鋪大鍋底將枳壳排放在內入水六宮碗煮乾

水取枳壳切片曬或烘去大黃斑貓再將草

麻子六十三粒炒去油打爛入藥米糊丸早晚

各用開水送下七丸服至痰核消去大半即止

不服調養半月自然平安而愈

此方兼治癰癤真仙方也

又海帶青皮 陳皮 貝母 等分蜜丸

彈子大食後含化 甚者加昆布

又監水炒橘紅 赤苓 酒煨大黃 連翹

各一兩 酒黃芩 山柰各八錢 半夏 連翹

酒元參 牡蠣童便淨另研 花粉 桔梗

瓜瓣仁各七錢 彌至六錢 甘草節 四錢  
湯浸蒸餅丸白湯下八九十九

二陳湯

又 茯苓 陳皮 半夏 甘草

開氣消痰湯

陳皮 便香附 桔梗 礞石各一錢 黃芩

枳實 羌活 荆芥 射干 威靈仙 各五分

甘草四分 木香三分 姜三片

身形 頸項瘍方

卷二十六 三

消解散

又南星 半夏各一錢 陳皮 枳實 桔梗 柴胡 前胡 黃連 連翹 赤芍 獨活 蘇子 蓬朮 木通 白附子 風 蔓荊子各五分 姜 燈心

消風化痰湯

赤芍 白附子 木通各一錢 南星 半夏 金銀花 連翹 天麻 殭蠶 天冬 桔梗 活 皂角各五分 全蝎 陳皮各四分 甘草 姜五分

內托白斂散

赤芍 當歸 連翹各一錢 酒黃芩 白芷 白斂 瓜蒌仁各八分 川芎 天花粉 乳香各七分 防風 桔梗 柴胡各五

含化丹

酒蒸大黃 生薑各四分 蜜丸 食後含化 蠶 蠶 青黛 胆星 等分

山藥膏

生山藥一塊 草麻子三个 各去皮研 勻攪 煎如神

加味小胃丹

南星 半夏各二兩 牛俱用白礬皂角姜 汁水煮十五次 桃仁 杏仁俱用白礬皂角 水泡 紅花 陳皮 白朮 白芥子 枳實

礬水 泡半日炒 蒼朮 米泔白礬皂角水浸一 宿炒各二兩 姜汁竹瀝煮神曲丸

此方兼治中風痰喘積聚喉痺淡姜湯下

竹瀝達痰丸

癱瘓不語濃姜湯下 痞塊頭風頭痛臨臥食後服神效

又 大黃 茯苓 黃芩 各八兩 沉香 五錢 人參 白朮 煨 茯苓 陳皮 甘草 半夏 各三兩 礞石 煨 硝 煨 過 一兩 以竹瀝姜汁和如稀糊 磁器內晒乾又研細又以竹瀝姜汁和晒共三 次再研仍以竹瀝姜汁和九每服百丸米湯下 此方治有痰而氣弱者能搜逐積痰從大便出 不損元氣孕婦忌用

梔子清肝湯

川芎 山梔 柴胡 丹皮 各一錢 茯苓 五分 白芍 當歸 牛蒡子 各七分 甘草

東垣連喬散

此方治三焦及阻經血虛肝火風熱耳內瘡 或痒或頸項胸乳等處作痛或寒熱瞞甚自汗 口苦或目唇搐動等症 柴胡 錢二分 龍胆草 酒炒 四次 土瓜 根 酒炒 各一錢 黃芩 酒炒 七次 七分 生黃 芩 歸尾 廣皮 三稜 酒炒 連喬 白芍 各五分 炙草 三分 黃連 酒炒 二次 製蒼 木 各二分 水煎食後卧下足高頭低乘熱每 含一口作十數次咽下務使藥氣上留仍以十 倍煉蜜作丸服

此方治耳下至缺盆肩 upper 生瘡堅硬如石動

身形

頸項瘡方

小犀角丸

之無根名曰馬刀屬少陽經已破未破並皆治之及頸項癰癧  
列犀角 黑牽牛半生半炒 青皮 陳皮  
各一兩 連橋五錢 用皂角二條去皮弦子  
泡搥以布絞汁一碗又用鮮薄荷二斤打汁全  
熬膏爲丸每食後連橋煎湯服三十丸間以薄  
荷湯服

內消丸

此方常服能除根諸癰並治應效如神  
又青皮 陳皮各二兩 牽牛八兩取頭末  
二兩 皂角去粗皮搗碎 薄荷葉各八兩二  
味共用水一斗煮採汁去渣慢火熬膏爲丸每  
三十九食後荆芥湯下  
此方治瘡腫初生及癰癧結核熱毒鬱滯服之  
內消大有神效

琥珀散

列木通 白丑頭末 滑石 礞石 黃芩各一兩  
各五分 斑貓去足翅炒三錢 赤芍 柴胡  
琥珀二錢 剉作六貼水煎服 羌活 白芷各一  
兩 廣皮二兩 酒香附 甘草各五錢 每

化氣調經湯

末二錢 酒下日二服 甘草各五錢 每  
此方兼治流注  
又夏枯草末六錢 甘草末一錢 每二錢  
茶清下 又方取一兩煎服虛者多服益妙兼

夏枯草散

茶清下 又方取一兩煎服虛者多服益妙兼

消毒化堅湯

服十全大補湯加香附遠志貝母  
此方治瘰癧馬刀退寒熱之聖藥也

黃芩五

又炙甘草 龍胆草 薄荷各四分  
分花粉 白芍 元參各六分 牛蒡子  
昆布 羌活 升麻各七分 黃芪 當歸  
柴胡 桔梗各一錢 連喬錢半 陳皮八分  
加姜二片 或加甘草節知母貝母海藻更

荆防敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 人參 赤  
茯苓 桔梗 枳殼 麩炒 荆芥 防風各一  
錢 甘草五分

小柴胡湯

又 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

益氣養榮湯

又 人參 茯苓 貝母 陳皮 川芎 當  
歸 香附 監黃芪 酒熟地 炒白芍各一  
錢 炙草 桔梗各五分 炒白木二錢 熱  
服 不拘軟硬赤白或潰而不斂皆可服

十全大補湯

又

羌活連喬湯

又 羌活 連喬 防風 柴胡 夏枯草  
昆布 枳殼 黃芩 川芎 甘草 薄荷  
牛蒡子 金銀花



散腫潰堅湯

又 黃芩一錢 酒洗 牛半炒 龍胆草 酒洗  
六分 花粉 酒洗 酒黃柏 酒知母 苦桔  
梗 昆布 海藻各七分 柴胡六分 炙甘

草 三稜 酒炒 蓬朮 酒炒 連喬各五分  
葛根 白芍 歸尾各四分 酒黃連 升麻  
各三分 剉作一貼 水浸半日 煎食後去枕低

頭而臥 每一口作十次咽下 另搗一料 蜜丸每  
百丸 以二煎藥湯送下

當歸補血湯

又 黃芪一兩 酒拌 當歸三錢 作一服煎

消癰丸

又

琥珀膏

又 琥珀一兩 木通 肉桂 當歸 白芷  
防風 松脂 硃砂各八錢 不薑子 肉五

錢 丁香 木香 各三錢 將珀 桂 硃 二香 各  
爲極細末 和勻 其餘以麻油一斤 半煎藥至黑  
色 去渣 照油寔數 每油一斤 下淘淨炒黃丹八  
兩 膏成 稍溫下 琥珀等末

內消膏

又

消腫湯

馬刀 連喬二錢 黃芩 柴胡各錢二分  
花粉 黃芪各一錢 歸梢 甘草各七分

牛蒡子 黃連各五分 紅花二分

### 海藻漬堅丸

又神麴四錢 半夏二錢 海藻 昆布 龍胆草 蛤粉 通草 貝母 與松蘿茶

枯礬各三錢 蜜丸每三十九臨卧白湯下或

含化或酒調末二錢服俱可

此方治瘰癧馬刀堅硬形瘦潮熱不食兼治一

切瘦氣 忌甘草魚鰾猪肉五辛生冷

### 貓頭丸

又貓頭骨一个炙 蝙蝠一个以硃砂末三錢入肚內瓦上炙焦 南星 白礬各一兩

黃蠟化丸臨卧米飲下三十九

此方治瘰癧馬刀不拘已破未破俱效

### 補中勝毒餅

又黃芪一錢 人參三分 甘草五分以上 三味調氣補中 生地 熟地 白芍 當歸

各三分以上四味和血生血涼血惟白芍兼能

益氣之虛 連喬一錢 升麻 柴胡 防風

各五分 陳皮三分 右研細末湯浸蒸餅調

使作餅子晒乾頭米糕大每三錢白湯下

地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓

又川芎 當歸 白芍 地黃

### 四物湯

### 歸脾湯

又人參 黃芪 當歸 白朮 茯苓 藥 仁 遠志 龍眼 木香 甘草 姜 棗

身形 頸項癆方

卷二十六 二十九

海藻丸

海藻 川芎 當歸 官桂 白芷 細辛 藿香 白欬 昆布 桔槿各一兩 海蛤 松蘿茶各七錢半 蜜丸

神效開結散

此方通治癭瘤 又 沉香二錢 木香三錢 陳皮四錢 真珠四十九粒煨 猪鬃肉子生猪項下如棗大微扁色紅者四十九个瓦上焙乾 每末二錢 臥時冷酒調和徐徐咽下輕者三五服效重者一料全愈

一井散

雄黃 粉霜 硃砂各二錢 輕粉 乳香 沒藥各一錢 上黃三錢 麝香少許 研細末津調塗癭頂以濕紙蓋之後小黃膏塗四圍間日一度上藥 上黃乃造作成方用雄黃二兩木鱉仁二錢去油巴豆五錢研砂二錢各研為末和勻以石腦酒和成一塊注帛包裏埋于地坑四十九日取出劈作小塊磁器裝聽用

小黃膏

黃柏 黃芩 大黃 等分研末水調為糊塗一井散四圍亦日一度 涼肌退腫 又 用針尖去脂粉自愈

治脂瘤方

五灰膏

康柴灰 桑柴灰 荆芥灰 蕎麥桿子灰 桐子壳灰各五兩 以沸湯各淋汁一碗

止血藥

共五碗淨清入斑滿四十枚穿山甲五片煎二碗磁器裝用時入新出雀石灰一兩乳香水片少許調成膏敷上如稠加清水稀稀用之神效  
點瘡贅神效  
又陳京墨煨 百草霜 等分搽血處以手按之

桃花散

又石灰十兩炒紅入麻油半盞大黃一兩煎汁半盞內和勻慢火炒如桃花色磁器收聽用神效

玉壺散

此方能止百般出血不但癩瘡已也  
又海藻洗 海帶洗 昆布洗 雷丸各一兩 青鹽 廣皮各五錢 陳火酒 丸含化  
又神曲四錢 海藻 昆布 龍胆草 蛤粉 通草 貝母 枯礬 松蘿茶各三錢

破結散

半夏二錢 蜜丸葱白湯下三十九或酒下未二錢亦可 此即海藻散堅丸也有人生癩大如茄子潮熱形瘦百治不效得此方去松蘿代真桑寄生一倍服三五日其癩自消

化癭丹

又海帶 海藻 海蛤 昆布以上俱洗淨焙 澤瀉炒 連喬各五錢 猪鬃 羊鬃各十枚 蜜丸茨子大即時含化一二丸須忌油膩酒

人參化癭丹

又海帶 海藻 海蛤 昆布四味俱焙澤瀉炒 連喬各一兩 猪鬃 羊鬃各十枚身形 頭項傷方

白頭翁丸

切片焙 人參八錢 蜜丸含化 一說猪羊  
醫卽猪羊外腎乃囊中之卵存參  
又 白頭翁五錢 昆布一錢 通草 海藻  
各七分 連齋 元參各八分 桂心三分  
白飲六分 蜜丸酒下

消瘿散

又 海馬酒豕 海帶 海藻 海紅蛤蝦  
海藥峭 昆布 石燕各一兩 爲末茶清下  
服此方須兼服含化丸

含化丸

又 海蛤蝦 海藻 海帶 昆布 訶子  
瓦楞子煨 文蛤卽花蛤有斑者 五靈脂各  
一兩 猪鬃子十四個焙乾另研 蜜丸含化

沈氏瘦囊丸

又 雄黃五錢另研 青木香四錢另研 海  
南栝 椰切片晒研 昆布洗淡焙研 海蛤蝦  
研 白欬酒炒研 半夏麴姜汁炒研 各八錢  
肉桂心 白芥子各二錢半 每服二錢食  
後酒調下忌大暈麵食 此再牛自製方也

梔子清肝湯

氣病 山梔 柴胡 丹皮各一錢 茯苓  
川芎 當歸 白芍 牛蒡子各七分 甘草  
五分 水煎服

柴胡清肝湯 柴胡 山梔各錢半 人參 黃芩 川芎各一錢 連翹 桔梗各八分 甘草五分

加味四物湯 又

柴胡通經湯 少陽 柴胡 歸尾 連翹 生草 三稜 黃芩 牛蒡子 桔梗各二分 黃連五分 紅花少許 食後稍熱服

升麻調經湯 此攻裏內消之劑 陽明 升麻八分 酒龍胆草 葛根各四分 酒黃芩 酒廣茂 酒三稜 炙草各五分 歸尾 白芍各三分 酒黃柏二分 酒知母 一錢

加味道遙散 血 白芍 白朮各一錢 茯苓 麥冬 生地各六分 甘草 桔梗各二分 當歸 地骨皮各八分 山梔 黃柏各三分

牡蠣大黃湯 利 牡蠣 木香 大黃 各錢半 水煎 春夏露一宿 冬月于煖處一宿 鷄鳴時服 得利 勿服

金寶膏 外貼 桑柴灰五碗 先以草紙一層 皮紙二層 墊箕底 放于上 以滾水十碗 淋取汁 聽用 穿山甲二兩 麝香五分 辰砂一字 霜錢半 杏仁七枚 全信末 研塗

身形 頸項癆方

卷二十六 三十一



立應散

石各五錢 赤芍 川芎 當歸 甘草 滑

川烏尖七個 土蜂房 水洗飯上蒸晒乾

白牽牛各二錢 每末一錢 濃煎木通湯調

下毒從小便出未效再服繼以宜熱丹解其屬

熱 若宜導癰疽惡毒去黃芩

宜熱丹

又 何首烏 薄荷 皂角 連喬 三稜

荆芥 蔓荊子各一兩 共作末用熱醋浸淡

豆豉二兩半 搗膏丸每三十九粒 熱水下日一服

解癰癰風熱之毒自小便出宜毒之後病雖愈

常宜服之

瓜萸散

又 瓜萸仁 青皮各一錢 石膏二錢 甘

草 沒藥 歸尾 角刺 金銀花各五分

青橘葉取汁二匙 水酒煎空心服

玉燭散

又 酒大黃 當歸 白芍 熟地 甘草

芒硝 黃芩 川芎 等分 每末三錢 姜湯

下七及見效

清肝益榮湯

又 山梔 當歸 茯苓 木瓜各一錢 柴

胡 川芎 炒白芍各七分 白朮二錢 姜

草五分 龍胆草八分 熟地錢半 姜水煎

服



薄荷丹

此方治肝胆小厥經風熱血燥筋學結核或耳  
頂胸乳脇肋作痛  
即宜熱丹

十味流氣飲

肉桂 人參 黃芪 當歸各一錢 川芎  
厚朴 白芷 甘草 防風 枳殼  
烏藥 白芍 枳殼 木香各五分 桔梗三  
分 紫蘇葉一錢半 水煎食後服 若由忿  
怒者加青皮一錢

蠟礬丸

此方乃通行十二經藥病在一經者不用  
又黃蠟二兩 入明礬末四兩 象手和勻  
作丸每三十九酒水任下日二服  
此方端治癰疽發背癩癧癩瘡一切惡瘡衛護  
丙膜驅解諸毒自然內消如因藥毒發疽非此  
莫治 丙疽腸癰尤妙

南星膏

又南星大者一枚 細研入醋調膏先將小  
針刺腫處令氣通却以膏攤紙上如翹大小貼  
之覺痒則換貼取效  
此方治頭面癰大如拳小如粟或軟或硬不痒  
不痛宜用此藥切不可用針灸

附錄頸項瘡瘍雜方

生肌乾膿散

黃連 貝母 降香 煨奇性 白芨 海螵蛸

五倍子 炒黑 芸香 各五錢 輕粉 五分

共研末先將藥水洗患處次搽此末外貼膏

丹溪方

此方治瘰癧初發頭項腫硬未破者

枯癩方

砂 礶砂 黃丹 雄黃 輕粉 各一錢 硃

糯乳香 沒藥 各八分 蟾蜍 三十個 生用

縮癩法

蓋上用黃柏木水調敷之數日白落

甘草膏用筆蘸塗病之四圍愈則又塗凡三次

聚癩法

點其中不得近甘草如是而漸漸收小中點悉

如舊法自然焦縮

化癩膏

荒花根淨洗帶根不得犯鐵器于木石器內搗

取汁用線一條浸一宿取出聚癩經宿即落如


未落再換一二次落後以龍骨詞子末敷瘡口

自合用之屢效如無根泡濃汁浸線亦妙

身形

頸項癩方

卷二十六



腋胠脇肋病源流

沈金鰲撰

腋胠脇肋痛。氣血食痰病也。凡人肩下曰膊。膊下曰臑。臑對腋。腋下爲胠。胠下爲脇。脇後爲肋。肋下爲季肋。卽俗謂之肋稍。季肋之下。則爲腰部分。如此。然腋胠脇肋之病。雖其故皆由氣血食痰。而其位是屬于肝。故四者之病。已詳于肝經門中。茲不必重贅。茲但卽四者之地。所患瘡瘍。脩列之馬刀。本發腋下。堅而不潰。其症治亦已詳頸項篇中。不復贅。而腋下所發。有與馬刀相似。雖堅而色赤。爲米疽者。治之用砒石。欲細而長。疎疎砒之。外塗豕膏。內仍服藥。宜紫金錠。內疝疽亦發腋下。已詳肩臂篇中。不復贅。惟脇下生疽。名曰發脇。由肝與心包火盛。虛而有熱所致。但不可過用陽藥。宜柴胡清肝湯。卽至潰後。亦惟清熱托裏。兼滋腎水。宜清熱消毒神效瓜蒌散。飲去金銀花。多加熟地黃。若自脇下至臑上。及臑下兩旁一二寸。發癰。填硬難膿。且

難穴。穴後難斂。須先用煖內藥。宜排膿內補十宜散外用執藥貼令和軟。宜

金不易比天助陽補。精育及寒瘡蒸膏若急切破之。必至膿出不止。故須緩破。使膿

一湧而出。易于收斂。虛弱人仍用大補之劑。宜十全大補湯又有脇下

瘡如牛眼狀者。往往膿血出而不止。宜以鹽少許入牛耳取其垢敷瘡口即差又有自

脇抵腰。腫赤如霞。名丹毒者。宜榆白皮末和塗甚至遍身青紫。當急破

出惡血。宜荊羊角燒灰鷄子白和塗肋上發瘡。則曰發肋。初起腫

盛。十數日不攻。穴即大如杯。如碗。痛徹內腸。左患應右。右患應左。

急以針刺出膿血。否則毒必內攻而多死也。宜清心內圓金粉散若處荒僻。

時不得方藥。則有簡便之法。可使毒不內攻。不侵臟腑。不傳惡

症。宜黃礬丸不可不知也。

發肋論五 劉涓子曰。發肋及兩肩肘頭。名曰使。使疽九日可

刺。赤白膿相間。多出可治。全無赤白者不治。二十日之久。若仍

不穴者死不治

治腋肢脇肋瘡瘍方十六

紫金錠

米蠟 五倍子三 山茨茹二兩 千金子  
大戟各一兩 麝香三錢 各藥製法詳肩臂  
篇服法亦詳在前 糯米飲丸

內消丸

又 靑皮 陳皮各二兩 牽牛八兩取頭末  
二兩 皂角去皮打碎 薄荷葉各八兩二味  
熬膏作丸每三十九丸食後荆芥湯下

柴胡清肝湯

柴胡 山梔各錢半 川芎 黃芩  
人參各一錢 桔梗 連翹各八分 甘草五  
分 食後溫服

神效瓜蒌散

瓜蒌 生甘草五錢 乳香 沒藥  
各一錢 瓜蒌一個子多者妙 水酒煎  
方有穿山甲貝母一方以各末入瓜蒌內重綿

清熱消毒飲

紙封之微火煨存性爲末每二錢酒下  
芎 黃連 山梔 連翹 當歸各一錢 川  
芎 白芍 生地各錢半 炙草八分 金銀  
花二錢

排膿十宣散

防風 酒當歸 人參各八分 鹽水拌炒黃  
桔梗各一錢 川芎 肉桂各三  
甘草各五分 姜厚朴六分 水

煎或為末木香酒下  
此方宜于元氣虛弱風寒鬱滯不能潰散之人

若熱毒壅滯氣血虛弱又當用托裏消毒散  
托裏消毒散 丹溪謂夏月不宜用此方潰瘍亦

不宜用只冬月癰瘍及些小瘡疔可用耳  
各七分 炙草 連香各五分

白木 川芎 監黃芪 酒當歸 炒白芍 炒  
人參 茯苓各一錢 金銀花 白芷

參芪托裏散

又藥 人參 黃芪 當歸 川芎 麥冬 芍  
黃柏 知母 柴胡 甘草 金銀花

寒瘡熱膏

又藥 歸梢一兩 杏仁百粒 去皮尖 黃丹六  
兩飛炒 麻油一斤 肥嫩柳枝一兩 肥嫩

桃枝三兩半俱切寸許 先熬油下二枝半焦  
以綿裹歸梢杏仁全熬至二枝焦黑去渣極淨

再煎沸入黃丹熬滴水不散為度 其熱瘡寒  
膏同藥只歸梢用全當歸二枝分量倒轉即是

十全大補湯

又藥 人參 茯苓 白朮 炙草 川芎 當  
歸 白芍 熟地 黃芪 肉桂 姜 棗

紫金丹

丹毒

勝金丹

製白礞 麝香各五分 蟾酥一錢 雄  
黃 辰砂 乳香 沒藥 穿山甲各三錢 全  
蝎炮 天龍 去頭足炙 山甲炙各三錢  
炒姜蚕五錢 各研末秤準每服三錢砂糖調  
蔥頭酒送下

千金不易比膏

外則 香油一斤四兩 甘草二兩 遠志  
牛膝 虎頸骨 酥炙 川斷 熟地焙 肉桂  
容 蛇床子 天冬 生地 兔絲子各一兩

肉豆蔻 麩 煨 川棟子 去核 杏仁去皮尖  
谷精草各一兩 紫梢花 去草 大附子

官桂各四錢 入藥油內煎黑色去渣下飛過  
黃丹八兩 透明松香 四兩 用柳條不住手攪

不散為度再下 雄黃 硫黃 龍骨 赤石  
脂各二錢 再沸又下 沉香 木香 蟾酥

沒藥 母丁香 湯起石 煨 阿芙蓉 為末  
再沸即住火 將茶匙挑藥滴水不散為度又下

黃蠟五錢 將此膏收貯磁瓶密封口入水  
五日去火氣然後用紅絹攤勻重七錢貼六十

日方換其效如神不可盡述

清心 金粉散

錢 辰砂另研 茯苓 人參 甘草各三

錢 棗豆四兩 雄黃 麝香 冰片各一錢

各另研 朴硝另研 薏仁各五錢 每一錢

半蜜湯調下

腋肢脇助瘡瘍方

卷二十六 三六



黃礬丸

明礬一兩生研黃蠟五錢以蠟溶  
化入礬末乘熱爲丸每服十九丸漸加至二十九  
酒下又名蠟礬丸  
此方治瘰癧初起未破內消已破自合如服  
金石藥毒而發者加礬末一兩但須日服百粒  
方能禦毒不致內攻最能止痛不動臟腑有  
人遍身生瘡如蛇頭服此卽效

牛膠飲

又牛皮膠明者四兩水一碗重湯煮化加  
酒中飲之至醉不飲卽用白湯  
此方治瘰癧能使毒不內攻不傳惡症此有益  
無損之物法宜酒煮但恐氣味難嘗不若剉碎  
爲丸以酒送下亦權變之法