

類

證

治

裁

類證治裁卷之五

丹陽林珮琴義桐著

男 老人 樂道

頭風 雷頭風附

風邪上干新感爲頭痛。深久則爲頭風。其症頭顱重暉。或頭皮麻痺。或耳鳴目眩。眉稜緊掣。由素有痰火。復因當風取涼。邪從風府入腦鬱而爲熱。爲痛甚。則目病昏眩。頭風不治必害眼。當分偏正、左右寒熱氣血治之。痛在正項。多太陽經風鬱。宜川芎羌活蔓荆蘇葉等散之。太陽經鬱絡腦後也。痛在左右。多少陽經火鬱。宜甘菊花丹皮山梔桑葉鉤藤等。發之。少陽經火鬱下耳。及耳之前後也。痛偏左爲風虛。宜川芎當歸防風薄荷。痛偏右爲痰熱。宜菖木半夏黃芩石

膏氣虛者因勞。

補中益氣湯。加川芎、天麻。

血虛者善驚。

四物湯。加薄荷、白芷。

熱痛者惡熱。

薄荷、白芷、熟地。

消風散。

冷痺者畏寒。

追風散。

寒熱久鬱發時悶痛欲縣裹者多痰。

二陳湯。加

酒茶、荆芥、茺、芩。

薄荷石膏細辛。

風兼熱者。

茶調散。

寒挾溼者。

導痰湯。加

薄荷、石膏。

鈎藤散加。

荆芥薄荷。

痛掣眉棱者。

選奇湯。

鼻流臭涕者。

芎歸散。

散搖鼻出涎。

齒齦

筋掣者。

鈎藤、荷葉追連。

氣上攻痛者。

全蝎散。

年久不愈者。

烏頭南星

塗太婦女血分受風者。

養血祛風湯。

其有因膽火上逆。

爲暉痛治宜泄

陽穴。

用羚羊角、生地、丹皮。

乘胃爲嘔吐治宜

因肝陽乘胃。

用桂枝、甘草、苦丁茶、桑葉。

因肝陽乘胃爲嘔吐治宜

神甘

熱者。

用扶

菊炭、鈎藤、牛夏。

因肝陰虛。

內風動治宜滋液者。

用復脈湯去參蘆

桂加雞子黃、白芍。

因暑熱上蒙清竅治宜清滲者。

用石膏、荷梗、薄荷。

因肝陰虛。

內風動治宜滋液者。

用羚羊角通草、苡米。

因陰傷陽浮齒

痛筋惕。治宜鎮攝者。

用阿膠、牡蠣、生地。

因內風頭痛淚冷目昏治

人參、白芍、鈎藤。

宜潤養者。

用杞子首烏茯神白芍柏子仁甘菊炭。

頭腦鳴響狀如蟲蛀名天白蟻者。

芎

茶子末吹鼻效。

頭多白屑作癩者。

零陵香白芷煎汁入雞子白攬勻敷。

頭、頭、風、腫、痛、起、塊、憎

寒壯熱。頭腦震如雷鳴者。

清震湯解雷湯。

雷頭風病在三陽不可過用。

寒涼重劑誅伐無過河間立清震湯

腦風項背怯寒。頭戶穴冷者。

神聖散。

首風因於新沐汗多惡風者。

川芎

芷九白餘參頭痛門治。

頭風脈候

浮爲風。緊爲寒。浮滑爲風痰。洪數爲風熱。陽弦爲頭痛。細而堅爲溼。弦而濇爲氣虛。芤爲血虛。滑爲痰厥。頭痛脈急短濇者死。凡診寸脈短者頭痛。寸口緊急或浮或短或弦皆主頭痛。

附 方

補中益氣湯見一卷中風

四物湯見一卷中風

消風散見二卷失音

追風散炮川烏

五錢

天麻

製南星

白附子

羌活

荆防草

草各

全蠶爲末

白芷各二錢半

茶調下

二錢半

乳香

沒藥各一錢二分

茶調散

追風散

枳壳

羌活

地龍

導痰湯

石膏

二陳湯

見一卷中風

茶調散

見一卷傷風

菊花散

甘菊花

旋覆花

防風

枳壳

荳蔻各一錢五分

薑三片

甘草各一錢五分

葛根三錢

羌活

石膏

導痰湯

見一卷中風

鉤藤散

鉤藤

陳夏

防荳

荳蔻各一錢五分

葛根三錢

羌活

石膏

甘菊

或加生地

荆芥

參草

麥冬

石膏

甘草

麥冬

石膏

眉棱臭鼻瘡
頭雷頭風滋氣攻血

透奇湯 防風 茉活各三錢 黃芩一錢 半草八分

芎舉散

川芎
細辛

硫砂

右高

片腦

人參

茯苓

炙草

卽愈

透項散

細辛二莖
冰片

麝香各一分半

研均用豆許

隨病左右揩

鼻出涎

卽愈

全蠍散

全蠍廿一个
錢爲末酒調

搘貼太陽穴

地龍六條

土狗二个

五倍子五

養血祛風湯

芎藺本
歸石膏

荆防

羌活

辛夷

地榆

夏枯草

復脈湯

見一卷中風

清震湯

升麻

薯朮

荷葉各四錢

解雷湯

落蒂子三錢
鮮荷葉水加薑

升麻

川芎

薯朮各一錢

先煎

神聖散

葛根半生半炒
薄荷荆芥湯下

麻黃

細辛

藿香

等分爲末

首風首

川芎九

川芎四兩
丸細嚼

天麻一兩

蜜和每兩相半
以水

白芷九

新白芷不拘多少
子大每一丸細嚼

荆芥湯下

一名都梁丸

九彈

茶酒任下

挫細以蘿蔔汁浸晒乾研蜜丸

雷頭風

薛

憎寒發熱頭痛腦如雷鳴一夕頂發塊礶甚多延及項後都

成疙瘩俗醫以爲外症用敷藥屢效診其脈浮大審知爲雷頭

風按東垣先生論此症狀類傷寒病在三陽不可過用寒涼重

劑誅伐無過故劉河間立清震湯治之用升麻

一錢
米泔浸炒四錢


青荷葉

一枚
薄荷

三錢如法二服立消○此痰火上升故成結核腫

痛用蒼朮除溼痰薄荷散風火升麻荷葉引人顛頂升發陽氣

自得汗而腫消



癘風論治

腎臟風

繡毯風

雁來風

蛇皮風

鵝掌風

赤白遊風

紫白癭風

紫雲風

癬疥癩斑附

發風惡疾也俗名大麻風其症皮肉麻頑身面疙瘩搔之則癢痛腐潰漸至目紅鼻赤四體攀搖頭面笑腫蓋中天地間一種風毒厲氣淫於腑臟骨髓注於經絡肢節久而後發亦有骨肉傳染而得者立齋分別五臟受病謂眉先落者毒在肺面發紫泡者毒在肝足底痛或穿者毒在腎遍身如癬者毒在脾目先損者毒在心一皮死麻木不仁二肉死鍼刺不痛三血死潰爛四筋死指脫五骨死鼻柱崩塌至於聲啞目盲皆爲難治內經治法以銳鍼刺其腫上出惡血重洩毒也其惡血滯在肌表經絡者宜汗宜刺汗用紫萍散刺取委中穴毒蘊腑臟非蕩滌不除如涼膈雙解之類毒在外非砭鍼不散砭刺臂腿手足指縫出血表裏

毒盛非外砭內洩不退。上體患多以散取毒血從齒縫中出。井

刺臂腕指縫下體患多以再造取蟲積從穀道中出。仍鍼腿脛趾

縫上下相等用散

必勝

兼取治法內通腑臟外達經絡養營益衛補

正逐邪若妄投燥熱。服水淋滴肝血益潤風熱益燼腎水益傷矣。

初起頭面搔癢發出紅紫疹塊者

用防風通聖散加苦參天麻蠅頭數服接服入珍湯聖愈湯

外用白玉塘浴湯加羌活

白玉塘

擦藥擦凡遍體腫塊以生薑蘸擦之其燥

起白屑繫血不榮膚

四物湯加荆防

白芷地骨皮搔如隔帛繫氣不充表養營湯

面部麻木繫氣血不能上榮

補中益氣湯

加川芎白附藥

風熱入營

實者胡麻散

祛風丸

疮瘡破癰繫風毒傷血羌活當歸散或當

虛者祛風丸

加味逍遙散加鉤藤

鼻赤眉落屬肺經風熱人參消風散加天麻

繫陰火燥筋加味逍遙散加鉤藤與換肌散間服

面發紫泡屬肝經風毒。梔子清肝湯加鉤藤、金銀花兼服。六味丸、筋骨攀痛屬肝腎陰虛。黃湯。

寒熱往來

小柴胡湯

陽虛怯冷

補中益氣湯

附子末各七錢

每服錢半。

口眼喎斜屬風動癲厥

用全蠍酒洗鹽焙研，研末白

穿破

六味湯

固命丹

通治風癲

豨莶丸

一切毒癲危症

五龍丸

千年藥東華玉

髓鴻夷瓊漿

諸方選用

若夫癰瘍類症

則有兩麻如鱗蟲蝕成瘡

者爲腎臟風

用四生散以去風邪

六味丸以滋腎水

腎囊溼瘍者

爲繡毬風

蛇床子湯加川

椒茴皮

頑肌燥至秋癢發者

爲雁來風

宜羌活白芷散

膚裂瘍痛

香葱皮

頑肌燥至秋癢發者

爲蛇皮風

初用火龍散

繼服補劑外用雄黃硫黃

形似蛇紋者

爲蛇皮風

初用火龍散

繼服補劑外用雄黃硫黃

心頑厚白皮鱗屑者

爲鷺掌風

煎湯熏洗再用桐油調鵝糞擦之

臂腿瘡癰遊走不定者

爲赤遊風

赤用加味逍遙散

其肌肉斑駁

白用人參消風散

紫爲紫癰風。通用川附硫黃研末薑汁調勻。茄蒂身發紫斑延暈白爲白癰風。掠之或用冰銀輕粉調薑汁掠之。
如霞者爲紫雲風。何首烏散加豨莶蛇川椒羌活斑蝥朝腦紅砒烟膏明礬以穿山甲刮破筆搽之。
牛皮頑癬皮大楓子雄黃糖醋調黃瓜蒂擦之。雀斑酒刺白屑風癬。新久癥癩一掃。夏月汗斑僧末洋玉肌散搽此因癟風類及之。他如脫跟魚鱗蟬蛻、蛇蛋雞爪等風。不過多立名色。前明沈氏耑科前明沈解圍元敷四卷。以祛風瀉火殺蟲排毒爲先。補血壯元導滯堅筋相濟。忌用熏刺鋒鏟輕粉戒房室禁炙燙鹽醬。大楓子性畏鹽。及一切辛葷動風食品方可延生。否則愈而再發必死。昔孫真人治此症百餘人得免於死者二。朱丹溪治五人得免者僅一婦人。然則癟豈易治哉。

癘風脉候

癘風陽脈浮弦。○前陰脈實大。○關兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者。○後兩寸浮而緊。或浮而洪。浮緩者。○治洪大而數。或沈實者。難治。脈若沈而病反在上。浮而病反在下。皆不治。

附 方

紫萍散紫背浮萍一味晒乾研末每服三錢。以黑豆淋酒

隔臥調服取汗。弱者間二三日再服。

涼膈散

見一卷中風

雙解散

見一卷疫

樟皮散

樟皮四兩炒灰

荆芥穗二兩

炙草五錢

枳壳

肺裏風

表蕩

汗攻

發

醉仙散

胡麻

牛蒡

葛根

洛陽

防風

花粉

各五錢

真珠末每用一

兩五錢

浴氣兩補洗

聖愈湯 見二卷勞瘵

八珍湯 見二卷中風

荳滑石

塊疹

防風通聖散

荆草

連翹

麻黃

薄荷

大黃

木芩

苦杏

梔桔

芒硝

石

下體

再造散

檳榔

未半生

半炒六錢

角刺各五錢

爲末

酒下五錢

大黃製一兩

白牽牛取頭

甘草生熟各半二錢

輕粉二錢

必勝散

檳榔

角刺各五錢

大黃製一兩

白牽牛取頭

甘草生熟各半二錢

輕粉二錢

白牽牛取頭

甘草生熟各半二錢

輕粉二錢

白牽牛取頭

蛤粉

大楓子

藿香等味

蜜香

全薑

蜜香

全薑

蜜香

全薑

蜜香

全薑

入輕粉二錢

拌勻每服一錢

茶清調晨午各一服

服至五

七日齒痛

中出臭

令人如醉下

盡惡物

病根乃去

一方

外治血燥虛氣陷熱風、熱風毒熱血燥

白玉蟾擦藥

白芷

草烏

南星

杏仁

半夏

大楓子

四物湯地

芍

歸

芎

蛇床子

等分爲末

薑片擦之

養營湯

見二卷勞瘵

補中益氣湯

見一卷中風

胡麻散

胡麻

苦參

荆芥

首烏各八錢

威靈仙

防風

菖蒲

牛蒡

甘菊

蔓荆子

白蒺藜炒

每服三錢

祛風丸耆

枳

防

芍

杞

草

地骨皮

生地

熟

羌活當歸散

當歸

黃連

芎

羌活

升麻各一錢

荳蔻

水煎

當歸飲

當歸

地

牛蒡子

荆芥

升麻各一錢

水煎

首烏各一錢

首烏

地

荆芥

防風

蒺藜各錢半

者

加味道逍散

見一卷火

肺風肢攀

消風散

見二卷失音

換肌散

白花蛇 辛 白芷 黑花蛇酒浸各三兩 地龍 當歸
紫參 赤芍 天麻 蔓荆 菊花細
沙參 木賊草 威靈仙 荆芥
木菖蒲 白蒺藜 不灰木
九節菖蒲 定風草 首烏 胡麻
炮去皮膚 川芎 蒼朮 草烏
研末每服五錢溫酒調下

梔子清肝湯

柴 茄各七分 梔丹各二錢 歸芍 苓 萱 荀 牻
甘草五分 水煎

六味丸

見一卷中風

小柴胡湯

見一卷溫

十全大補湯

見一卷中風

紅玉散

文蛤 乳香

白芷 没藥

當歸 兒茶

大黃 雄黃

白芨 血竭

草烏各一兩 韶粉

東丹

爛瘡虛熱寒火肝腎

瘡瘍

虛熱

寒火

肝腎

香油 調搽

各三錢

爲末

見一卷

溫

見一卷

中風

見一卷

中風

敷外

坎離膏

血竭三錢

冰片一錢

輕粉

水銀各二錢

大

麝香二分

楓子一兩

白蠟五錢

研極細加

煮熟香油調入

以甘草湯洗擦

大風久爛

香珠散

木香一錢

硃砂

赤石脂

東丹

車前子

各等分

研細先以茶葉

川椒煎湯洗淨

再摻藥

外用

紺紝

人參

熟地各四兩

杞子

麥冬各六兩

茯苓

固命丹

當歸各十六兩

仙靈脾取葉

一觔去毛酒拌蒸

爲末蜜丸

每服

十九米湯下

豨莶丸

豨莶草五月取赤莖者陰乾以蜜酒蒸晒一觔

歸芍

熟地各一兩

川烏黑豆製六錢

羌活

風各一兩

蜜丸

二錢以酒下

胡麻丸

胡麻一觔

苦參皮五觔酒浸

荆芥穗四觔

豨

酒糊丸

大風丸

殊砂爲衣

茱萸葉

紫背浮萍各二斤晒

研末

每服百丸

通治風虛

通治風虛

通治風虛

通治風虛

通治風虛

追毒

黃龍丸

船上硫黃打碎鎔化傾入釀醋內取淨硫一觔入竹筒內以蠟封口浸糞缸中一年取起放長流水申四十九日松香鎔化加火酒煮七沸傾入冷水內但取淨松

香三兩 川芎各四兩 研末陳米糊丸

肥皂角刮去皮筋子水浸槌爛絞去渣取汁入瓦器

擣香白膠香川烏炮天麻各三兩地龍二兩

茅木米泔浸刮一觔

惡實草烏炮每服五十九

開水下

烏龍丸用黑牽牛末

共搗爲丸桐子大

每服五十九

白湯下利三

五次不傷正氣

白龍丸乳香

沒藥川烏

草烏地龍南星

酒糊

花龍丸蒼术

每服四十丸防已

黃蘆或酒或荆芥湯下

生膝當歸

當歸草薢

赤龍丸麝香

二錢半白膠香各二兩五錢

乳香木鼈子

沒藥當歸各七錢

當歸地龍

脂各二兩京墨線膠炒

紫背浮萍各二兩五錢

木鼈子五錢川烏

當歸五靈

當歸地龍

九龍眼大

日服一丸

酒下

又名一粒金丹

桔梗

防己

防風

千年藥大黃

蕘本

羌活

獨活

烏藥

風藤

防己

柴胡

白芷

黃芩

藏腎

頑麻方傳仙尹

種六十三毒

天麻	細辛	甘松	蔓荆子	五加皮	白蒺藜	川斷
白芍	南星	大腹皮	角刺	薄荷各三兩	荆芥	升
二兩	煎去渣煉成膏用	紫背浮萍一觔	人參	白朮	當歸	苦參各
牛膝	香蛇血竭	大硃砂爲衣	茯苓	胡麻	松脂	羌蠶研末
以前膏和丸彈子大硃砂爲衣	金箔包裹	遠年病服十九				
近年服五七丸	用蘑菇酒磨服汗出則愈	此方張真人				
遇過傳內有蟾蜍	麝香冰片	人牙等				
東華玉髓	大楓子研末隔湯化油四兩	乳香沒藥				
一錢	琥珀珍珠各三錢	雄黃五錢	地龍炙七錢			
冰片三錢	芒硝入分	大楓油調藥每服一錢	酒下			
馮夷瓊漿	荆芥連翹	羌活	阿膠			
生地	川芎黃芩	防風	甘菊花			
何首烏	威靈仙	胡麻	甘草			
用酒二瓶密封煮	每日進一杯	白芷	風藤			
知痛者輕則一料愈	己	黃蓮	當			
四生散	白附子獨活	獨活	彊蠶			
每服二錢	用猪腰子劈開入藥溼紙裹煨熟	右藥勻兩帖	蟬退			

湯

下

蛇床子湯

蛇床子
枯礬五錢

獨活
煎湯薰洗

防風

荆芥各三錢

羌活白芷散

羌活
猪牙皂角

白芷
甘草

柴胡
黃連

荆芥
黃芩各一錢

蔓荆子
大黃酒蒸

防風

火龍散

人牙一兩半
醋蝦各一兩

雄黃
共研末

大黃砂每服三錢

大黃酒蒸

代赭石

大消風散

防風
沒藥各二兩

蒺藜
荆芥

苦參各十二兩

苦參各十二兩

乳香
大楓子

麝香五錢

當歸
黃蘗各二兩

黃芩一兩

胡麻十兩

大楓子

何首烏散

何首烏
胡麻

防風
茺蔚子

白蒺藜
蔓荆子各一錢

枳壳
茴蔴五分

天麻
殼

殼
殼

水煎

一掃光

防風
荆芥

苦參
蜜水調下

地骨皮
薄荷

甘草
爲

玉肌散

菜豆粉入兩
爲末

滑石一兩
每晚用數錢

搽面

白芷一兩

白附子五

白附子五

雀癩

紫雲

鷹來蛇皮鷺掌

繡鵝

疥瘍

當歸

黃蘗各二兩

黃芩一兩

大楓子

大楓子

大楓子

藥擦

肥皂九

荆芥穗
松脂

藁本
山柰

白芷
朴硝各一兩


羌活
大黃末入肥皂角去子絃

防風
薄荷

甘草

三拗

鳴九
酒乾晨擦



癲風

服叔傳藥毒癲由足趾麻木漸至肌肉不仁身發紅暈常服京口
嵩門治風丸散大率瀉毒品味如苦參丸必勝散等類初服大
便日三四行紅暈雖退而精神日削纏綿數載眉脫眼斜予謂
驅毒宜兼補元否則正氣陷下邪毒畱滯非治法矣用八珍九
料加製首烏生杜仲炙黃耆蒸牛膝玉竹天麻獨活秦艽威靈
仙乳香沒藥蜜丸兼服酒藥用白花蛇穿山甲松節金毛狗脊
威靈仙桑寄生苦參丹參當歸玉竹木瓜桂枝浸煮溫服一料
精神稍復癲痛亦定後仍服京口丸散便瀉食減筋攀肉腐卒
成不救

某癘風初起左足跟出水左手麻痺不隨脉虛漏按之不起此陰血虛而受風溼癰毒也用熟地當歸川芎杞子首烏白朮黃耆牛膝生杜仲五加皮獨活桂枝鉤藤葛黃熬膏冲酒服手足運掉得舒然此症乃滲癰毒邪乘虛襲入經絡經謂邪之所瘞其氣必虛若不遠帷幙慎調攝久之筋骨刺痛肩落眼斜鼻塌肉腐十不一生矣

周壯歲感前症初由臂膚腫硬手腕痺痛延至遍體上下骨節攀痛而發紅斑溼毒淋漓多在支節診之脈沈數此癰毒從經絡竄入骨髓須用鍼砭去惡血以洩毒非藥力所及雖不治

痺症論治

諸痺。風寒溼三氣雜合。而犯其經絡之陰也。風多則引。寒多則掣痛。溼多則重著。良由營衛先虛。腠理不密。風寒溼乘虛內襲。正氣爲邪所阻。不能宣行。因而留滯。氣血凝滯。久而成痺。或肌肉麻頑。或肢節攀急。或半體偏枯。或偏身走注疼痛。其不痛者。病久入深也。故在骨則重而不舉。在血則凝而不流。在筋則屈而不伸。在肉則麻木不仁。在皮則皴揭不榮。皆痺而不痛。蓋痺者。閉而不通。邪在陰分也。故經以病在陽爲風。在陰爲痺。陰陽俱病爲風痺。言三氣雜合。耑言痺病所因也。在陰爲痺。分言經痺。言表裏殊也。陰陽俱病。表症更兼裏症也。經痺論曰。風寒溼三氣雜至。合而爲痺。痺非偏一氣。其風勝者爲行痺。如走注之類。寒勝者

爲痛痺。寒凝則陽氣不行。爲病痺。痛有定處。卽痛風。溼勝者爲着痺。重著不移。或腫痛。或不位。溼從土化。病發肌肉。卽麻木也。以冬遇此爲骨痺。在骨。冬氣。以春遇此爲筋痺。在筋。春氣。以夏遇此爲脈痺。在脈。夏氣。以至陰遇此爲肌痺。在肌肉。長夏氣。以秋遇此爲皮痺。秋氣在皮。行腫痛。痺著。痺痺症大綱。又以所遇之時而命名。非此外別有骨筋脈等痺也。五臟皆有合病。久而不去者。內舍於其合。經云諸痺不已。亦溢內也。風勝者易已。留皮膚者易已。留筋骨者。痛久其入臟者死。凡痺逢寒則急。逢熱則緩。故骨痺不已。復感於邪。內舍於肝。脈痺不已。復感於邪。內舍於心。肌痺不已。復感於邪。內舍於脾。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。此經病人臟也。經論五痺之入臟者曰。肺痺。煩滿喘而幅心痺。脾痺。四肢懈惰。發欬。嘔。汗。上爲引。如懷脅。瘦善脹。尻以代踵。脊以代頸。其入腑者。別有腸脾胞痺。另詳本門。此五臟之痺。各以其時重感。

於風寒溼之氣也。風勝脈必浮。寒勝脈必濶。溼勝脈必緩。三癥各有所勝。用藥以勝者爲主。而兼者佐之。治行痺散風爲主。兼去寒利溼。參以補血。血行風自滅也。湯防風。治癇。脾溫寒爲主。兼疏風滲溼。參以益火。辛溫解凝寒也。加減五積散。治著。脾利溼爲主。兼去風逐寒。參以補脾補氣。土強可勝溼也。川芎茯苓湯加耆朮。其症有風溼。羌活勝湿湯。有寒溼。葛根湯。有暑溼。清暑益氣湯。有冷痺。風冷頑麻散。有熱痺。巴戟天湯。有熱毒。千金犀角散。有風熱。散。筋。麻。痺。疼。瘻。有暑溼。清暑益氣湯。有冷痺。風冷頑麻散。有熱痺。巴戟天湯。有熱毒。千金犀角散。有風熱。散。筋。麻。痺。疼。瘻。有暑溼。清暑益氣湯。有冷痺。風冷頑麻散。有熱痺。巴戟天湯。有熱毒。千金犀角散。有風熱。散。筋。麻。痺。疼。瘻。有營虛。當歸建中湯。有衛虛。防己黃芪湯。有氣痺。中湯。有血痺。瘻在血分。因勞汗出。臥被風吹。血敗。入絡。鈎筋丹皮。有營虛。當歸建中湯。有衛虛。防己黃芪桂枝五物湯。當歸。有瘀血。

桃紅飲煎。有停痰遍身走痛。二陳湯加羌活。
成人麝香。有停痰白芥子風化硝薑汁泛丸。有支飲。骨痛不舉。眩
荻苓。有在經木防。有人絡。活絡飲加桑寄生威靈。治法總以補助。
丸。如活血丹。或人參散之類。使氣血流暢。則痺自己。

風寒溼氣。血凝滯。身重而痛。手足攣急。石頭改定三痺
合。痺。或通痺散。

周周真氣不能周於身。渾身痺痛。風寒溼氣客於肉分內。不在臟外。
未發皮命曰周痺。蠲痺湯加桂枝。

白术。狗脊。薏米。

行偏身走注不定。上半身甚者。烏藥順氣散。
下半身甚者。虎骨散。

痺。歷節。攀痛。疏風活血湯。活痛甚者。五靈散。

著。兩節定處。身重痠疼。天陰即發。除溼蠲痛湯。加不應。補中益氣
蠶沙。防己。薏米。不應湯。加附子。

羌活。黃藥。

骨即寒痺。病痺也。苦痛切骨。安腎丸。

痺

即風痺也。風熱攻注筋弛脈緩。羚羊角散。

若溼邪入筋。

續斷湯。

痺即熱痺也。金匱云。經溼則痺。升麻湯去桂麻。

痺絡熱則痺。風溼鬱熱經隧爲壅。加草薢石膏或

秦艽四物湯。

後用人參丸。

肌

痺即溼痺者痺也。渾身上下左右麻木屬衛氣不行。

神效黃芪湯。皮膚

麻木屬肺氣不行。

本方去蔓荆。倍黃耆加防風。丹溪

荆加桂枝羌活防風。

丹溪

曰麻爲氣虛木爲溼痰敗血。

皮

痺邪在皮毛搔如隔帛或癰疹風瘡宜疏風養血。

秦艽地黃湯。

五臟

經病入臟邪勝正虛五臟痺。

本方加獨活肉桂杜仲牛膝黃耆草薢。肝痺本

加棗仁。心痺本方加遠志茯神夢冬犀角。脾痺本方加

砂仁。肺痺本方加夏杏

仁麻黃
紫菀

入門曰。痺初起。雖用參耆歸地。則氣鬱滯邪不散。只以行溼流氣藥主之。久而不愈。宜峻補真陰。使氣血流行。則病邪隨去。參景岳論。

痺與痿相似。但痿屬虛。痺屬實。痿因血虛火盛。肺葉焦而成痺。因風寒溼邪侵入而成也。痺又爲中風之一。然受病各異。痺兼三氣。邪爲陰。受中風。邪爲陽。受也。尊生書曰。陽者表與上。陰者裏與下也。 痺與風瘓形症雖相似。醫治之法可相混乎。沈氏集說。

治痺而用風門通套之劑。醫之過也。痺症非不有風。然風入陰分。與寒溼互結。擾亂其血脉。致身中之陽不通於陰。故致痺也。古方多有用白芷者。以白芷能通陽氣。白芷能行營衛。然已入四君四物等

湯中非耑發表也。至於攻裏。則從無用之者。以攻裏藥皆苦寒。用之則陽愈結。其痺轉入諸腑。而成死症矣。醫通

戴人曰。痺。病以溼熱爲主。風寒爲兼。其脈沈濇。乃治此者不分經絡。表裏臟腑。便作肺氣寒溼治。而用烏附乳沒燥熱。以致便尿滯滯。前後俱閉。虛躁日甚。肌肉日削。飲食不下。雖華扁亦難措手矣。

痺症脈候

脈濇而緊。爲痺痛。脈大而濇。爲痺。脈急亦爲痺。玉機浮濱而緊。風寒溼三氣皆備。訣肺脈微。爲肺痺。心脈微。爲心痺。右寸沈而遲濇。爲皮痺。左寸結而不流利。爲血痺。右關。脈舉按。皆無力而濇。爲肉痺。左關脈弦緊。浮沈有力。爲筋痺。附

附 方

防風湯 見一卷溼

加減五積散 見一卷溼

川芎 茯苓湯 赤芍

桑皮各錢半
當歸各一錢

川芎

防風 麻黃各五分

陳皮

炙草各五分

羌活勝溼湯 見一卷溼

史國公酒 羌活 防風

白朮

當歸

牛膝

草薢

秦艽

桔梗

虎脣骨酥

炙臍印

調沙

各味粗研細袋盛浸

桂枝

桔梗

白芷根

各味粗研細袋盛浸

桂枝

換骨丹

桂枝

葛根湯 葛根

歸黃

葛根

桂枝

羌活

獨活

術草

溼寒溼寒

溼風溼風

痈瘡痛癆行

枝 二

溼寒

三瘴湯地芍歸

杜仲牛膝

續斷桂心細辛

防風草參耆

秦艽獨活

葛根

加味二妙散黃藥酒炒

加當歸牛膝

米泔浸炒

名二妙丸

此防已草薢龜版

蒼朮散

蒼朮爲末

每服二錢

白湯下

虎骨酥炙

二兩

防風一兩

當歸拈痛散

見一卷溼

消風散

見二卷失音

清暑益氣湯

見一卷暑

巴戟天湯

巴戟二錢

附子

五加皮

石斛

炙草

草薢各錢半

茯苓

生薑水煎

木煎

巴戟各五分

當歸各一錢

牛膝

革薢各錢半

肉桂

千金犀角散

犀角二兩

羚羊角二兩

升麻各一兩

前胡五錢

黃芩

大黃五錢

朝朝

干酒炒

黑四錢

豆豉

一升

研末

四物湯

地芍歸葛

當歸建中湯

見三卷脾胃

防己黃耆湯

見一卷溼

蠲痺湯

耆歸薑五片

羌防

薑黃各一錢半

甘草五

黃耆五物湯

耆歸桂枝各三錢

桂枝各三錢

薑六片

棗二枚

桃紅飲

桃仁紅花麝香少許冲服

川芎一方加人參

當歸尾

威靈仙

煎好加

二陳湯

見一卷中風

指迷茯苓丸

見二卷痰飲

木防己湯

木防己石膏

桂枝

薑黃

杏仁

桑枝

通經絡補虛補鎮經絡合瘧行

活絡飲

木歸芍羌獨各一錢

甘草五分葛

活絡丹

川烏草烏各炮去皮臍

南星膽蔻九次地龍

焙乾各一兩

乳香沒藥各二錢

二分酒丸

下酒

活血丹

熟地三兩參术歸芍

續斷各一兩酒

續斷丹

樹丸酒下二錢半

草薢

牛膝木瓜杜仲

黃耆棗仁茯神各二兩蜜丸

人參散

人參二兩

杜仲

黃耆棗仁

茯神各一兩

辛二錢

丹砂研服

五味子

川芎

熟地

秦艽

羌活各五錢細

改定三瘡湯

參芩术

草防已

歸芍

細辛

烏頭

藁本

細辛

菖蒲

棗仁

桂心

通瘡散

天麻三兩研服

獨活三錢

酒下

日二服

烏藥順氣散

見

一卷中風

行

虎骨散

虎骨二兩當歸

白花蛇

天麻防風牛膝僵蠻

生膝僵蠻

每末服二錢麝香一錢

歸

芎

威靈仙

白芷

防己

黃藥

南

痛

疏風活血湯

星

蒼术

羌活

桂枝各一錢

紅花三分

南

片薑五

痛

五靈散

五靈脂二兩蒼朮二錢

川烏兩半白朮

茯苓

沒藥一兩

乳香五錢

痺著

除溼蠲痺湯

蒼朮二錢錢

白朮陳皮一錢

茯苓

甘草五分

澤泻各一錢

匙三

痺

補中益氣湯

見一卷中風

痺著

安腎丸

肉桂

川烏各兩半

白蒺藜

巴戟

山藥

茯

丸蜜

痺著

荅石斛

草薢

菟絲子

補骨脂

各四兩八錢

茯

骨痺補肌皮庫五藏

羚羊角散

羚仁

薏苡歸

芎

防獨

棗仁

茯神杏

升麻湯

升麻

三錢

茯神

人參

防風

犀角

羚羊角

秦艽四物湯

四物湯加

桂心三分

加竹瀝半杯

和服

羚羊角

人參丸

人參耆

麥冬地

茯神

龍齒

石菖蒲

遠志肉

神效黃耆湯

參鴆

身熱加丹皮

陳草

蕷荆子

尿滯加澤

秦艽地黃丸

四物湯加蔓荆

甘草秦艽

大力子

荆防羌芷升麻

五癲湯

參芩引經之藥

芍草大子各一錢

术

五味子細辛或

אַתָּה בְּרוּךְ

בָּרוּךְ הוּא

תִּתְפֹּחֵץ

痺

李 左臂自肩以下骨節大痛經所謂寒勝則痛也來勢甚驟若

遊走上下骨骱卽俗謂白虎歷節風痛如虎咬利不可忍此非

厲劑不除投以川烏頭炮去皮脾皮草烏頭炮去皮薑汁製油松節一劑服後

飲酒以助藥熱逐病所夜半身麻汗出平旦而病若失矣此倣

活絡丹法

張 五旬外左臂素患腫痛因涉江受風一夜全身麻痺脈虛濡

此真氣虛而風溼爲病乃痺中根萌也經曰營虛則不仁衛虛

則不用營衛失門邪氣乘虛襲入經絡蠲痺湯主之數服而效

○準繩云凡風痺偏枯未有不因真氣不周而病者治不用黃

著爲君人參歸芍爲臣桂枝鉤藤荆瀝竹瀝薑汁爲佐徒雜烏附羌活以潤營而耗衛未之能愈也嚴氏蠲痺湯用黃耆炙草以實衛當歸白芍活血以調營羌防除溼疏風薑黃理血中滯氣入手足而驅寒溼用酒和服耑藉以行藥力也

王傷酒涉水溼襲陰絡右腿痺痛由髀骨直至委中穴參用三
痺湯內服桂心茯苓牛膝杜仲白朮蒼朮當歸獨活桑枝煎湯
外用防風桂枝木瓜當歸豨莶葱白煎湯熏洗汗出爲度夫溼
痺重著今腿痛已定通移膝脛仍以逐溼通痺法治川烏桂心
獨活牛膝虎脰骨歸尾沒藥以溺少加茯苓車前子二服兼用
洗藥痛止能行數十日內戒酒肉風冷勞動

王氏女風寒溼合而成癥蘊邪化熱蒸於經絡四肢痺痛筋骨不
舒蓋邪中於經爲痺中於絡爲痿金匱云經熱則痺絡熱則痿
倘經腑治失宜通延爲痿霆杏仁滑石石膏赤芍威靈仙蠶沙
薏仁數服痛減乃用白朮薏仁茯苓桂枝片薑黃釵角歸身玉
竹五加皮桑枝煎湯數十服肢體活動又服丸劑平補肝腎步
履如常

族婦右臂痛手不能舉此爲肢痺用舒筋湯片薑黃當歸羌活炙
草蕷朮海桐皮加桂枝四五服漸瘳。凡筋得寒則急得熱則
縱緩短爲拘弛長爲痠風寒溼三氣雜至合而成痺風勝爲行
痺寒勝爲痛痺溼勝爲著痺宜宣風逐寒燥溼兼通絡如臂通

服舒筋湯必腋下熱汗出則邪不滯於筋節而拘急舒矣如氣虛加參耆血虛加地芍肩背加羌活狗脊鹿膠腰脊加杜仲獨活沙苑子臂指加葛黃桂枝骨節加油松節虎膝下部加牛膝薏苡五加皮虎脛骨經絡加桑寄生威靈仙鉤藤久而不痊必有溼痰敗血瘀滯經絡加桂心膽星川烏地龍紅花桃仁以搜逐之

主 有年盛暑脈沈緩身半以下痠痛脛膝無汗手足不溫便艱夢泄皆溼熱壅阻致痺先通其壅用蒸牛膝當歸秦艽川芎玉竹杏仁陳皮淡荳蔻二服便潤去荳蔻杏仁耑理經絡溼邪加桂枝桑寄生獨活薏苡杜仲熟地炒十數服全瘳

痿症論治

痿者。肢弱而無力。筋弛而不收。爲熱傷血脈之症。經曰。五臟因肺。熟葉焦發爲痿蹙。夫五臟皆有痿。如肺熱爲皮毛痿。宜犀角桔梗湯。心熱爲脈痿。宜鐵粉丸。肝熱爲筋痿。宜紫葳湯。脾熱爲肉痿。宜二陳湯。加參者。腎熱爲骨痿。宜金剛丸。而經論痿蹙必原肺熱者。以肺爲臟之長。體燥居上。主氣而畏火。若金受火燥。則氣傷而不能管攝一身。乃發爲痿蹙矣。其治痿獨取陽明何也。經曰。陽明者。臟腑之海。主潤宗筋。宗筋主束筋骨而利機關也。陽明虛則宗筋縱帶脈不引。故足痿不用。此治痿必使胃納水穀化精微。五臟得所稟。以行血氣濡筋骨。利關節也。河間論。痿主血衰不能榮養百骸。子和謂痿必火乘金。病多作

於五六七月。午爲少陰君火之位。未者涇土。庚金伏火之地。申者少陽相火之分。故病痿者脈浮大。戴人主腎水衰。則骨髓枯竭。直言痿病無寒。丹溪云。瀉南方則肺金清。而東方有制。土不受戕。補北方則心火降。而西方有養。金不苦燥。凡痿症不可作風治。而用風藥。東垣治痿。以黃耆爲君。黃耆爲佐。土材論。胃虛食減成痿。宜藿香養胃湯。治脾虛下陷足痿。用補中石頑主。陽明溼熱。各具確見。今參而酌之。通治溼熱成痿。脈洪滑者。主清燥。二妙丸加味。二溼熱傷肺成痿者。主清上仁石斛百合花粉通草。山溼熱壅胃成痿者。主通腑。大豆黃卷茵陳滑石。石溼著筋。骨成痿者。主理隧。牛膝龜甲五加皮或三妙丸。陽明脈虛宗筋不約者。主潤肺。人參茯苓杞子當歸桑椹。肝胃陰虛。風動肢癲者。主肉蓯蓉桑寄生。芝麻山藥。

通攝然地牛膝遠志杞子石斛鈎藤肝腎陰虛足熱枯痿者填精髓生骨髓指督
肉膠熟地杞子牛膝、肉膠或滋陰大補丸腎督陽虛脊軟腿瘦者壯筋骨四斤丸太

陽督脈虛形俯痿廢者理腰脊

香菖

衰年足軟肌麻蹠維不用者

以溫行流暢奇絡橘絡木瓜杞子杜仲狗脊

肉蓯蓉牛膝當歸鬚鹿膠病後陰傷骨痿六味丹澤加虎胫骨

久病筋骨痿不起於牀金剛丸牛膝丸燶

龜甲牛膝當歸久病筋骨痿不起於牀金剛丸五獸三置丹陰虛挾

溼熱脈滯而數爲痿厥

虎潛丸加減不長夏暑溼成痿

清暑益氣湯加減

腎傷暑暘痿厥

清燥湯加減

膏粱溼熱傷精腫脹痿弱

神龜滋陰丸大補地黃丸血

衰筋緩不收

補血榮氣丸加減十全大補丸

筋弛舉動無力

四君湯加減安胃

右審氣血陰陽

加葛根竹瀝食帶脾氣不得運於四肢成痿

膝麻木或腫屬溼痰

二术二陳湯加減

陽加減屈伸不利行步艱難

安胃肢軟脈滑腰

脈必氣口弦滑而惡食。木香檳榔丸加山藥。查神龜木瓜防己瘀血留於腰胯成瘻。脈必沈濇而兼痛。四物湯加桃仁。心熱亢兼實積者爲脈痿。大承氣湯。瘦人病痿。脈滑或大多血虛有火。二妙四物湯。肥人病痿。脈滑或沈多氣。

虛有瘻。

二妙六君湯

子和云。四末之疾。動而或動爲風。不仁或痛爲痺。弱而不用爲痿。逆而寒熱爲厥。風必兼熱。痺必風寒溼合邪。痿必火乘金。厥則或寒或熱。皆從下起。奈何不察其源。概謂風淫末疾。以風藥樹治耶。

瘻症脈候。

脾脈緩甚爲痿厥。內經診瘻是脈虛者生緊急疾者死。脈經尺脈虛弱。緩濶而緊病爲足痛。或爲痿病。脈訣痿脈多浮而大。子和。

附 方

犀角桔梗湯 黃耆 石斛 天冬 麥冬 百合 山藥
犀角 通草 桔梗 黃芩 杏仁 泰艽
鐵粉丸 鐵粉 銀箔 黃連 茯苓 龍膽
牛黃 秦艽 博皮 白芍皮 地滑皮 雷丸
犀 角、

紫葳湯 紫葳 天冬 百合 杜仲 黃芩 天冬
牛膝 防風 免絲子 白蒺藜 麥冬 百合
二陳湯 陳 茅 夏 草 黃連 茯苓 泰艽
二 陳 茅 夏 草

金剛丸 見二卷虛損

藿香養胃湯 參 木 茅 草 茯苓 黃芩 天冬
烏藥 神 魁 砂 仁 蕤 豐 呵 薑 半夏
補中益氣湯 見一卷中風

二妙丸 見一卷溼

加味二妙丸

見本卷庫

三妙丸

二妙丸加

酒蒸牛膝二兩

熱溼陰虛

陰虛

陽虛

壯筋

督脈

溫傷

理

紅棗

菖蒲
蜜丸

鹿角膠九

鹿角膠
茯苓

鹿角霜

熟地

人參

當歸

牛膝

四斤九

虎脰骨
錢

一兩

牛膝

菟絲子

白朮

杜仲

加乳香

沒藥

各一兩

木瓜

一觔

爲末以菟絲子搗膏酒糊丸

川烏

名加味

四斤九

鹿茸

三兩

生當歸

二兩

麝香

香茸丸

鹿茸
錢

雄羊腎

三對

酒煮搗爛

爲丸

生川烏

六味湯

見一卷中風

牛膝丸

見二卷虛損

煅腎丸見二卷虛損

益陽

五獸三匱丹

鹿茸酥炙
狗脊燒去毛各一兩
其爲末此五獸也

虎脛骨酥炙

牛膝酒浸

一兩

附子一個去皮臍去中心入
辰砂末一兩填滿
木瓜一
却以三匱正坐於磁缸內
和五獸末搗丸木瓜酒下
重湯蒸爛

虎潛丸

見一卷中風

清暑益氣湯

見一卷暑

清燥湯

青錢半

蒼朮一錢

陳水

澤泄各五分

升麻各三分

五

地

草

神翹

黃柏

荅各二分

水煎

苔各二分

歸

神龜滋陰丸

杞子

駉版酥炙四兩

黃藥

知母各鹽酒炒二兩

乾薑五錢

爲末以猪脊髓和丸

每服五錢

鹽湯下

滋燥大補地黃丸見一卷燥

筋

補血榮筋丸

蕤草酒製牛膝酒煮四兩

五味子焙各一兩

鹿茸酥炙一對

天麻燉各二兩熟地六兩

木瓜薑汁炒爲末蜜丸

溫酒下

四君子湯見一卷中風

十全大補湯見一卷中風

安腎丸見本卷廁

二水二陳湯見二卷痰飲

木香檳榔丸木 檳 茄 枳 陳 香附 神翹糊丸

四物湯見一卷中風

大承氣湯見一卷溫

積熱於脾溼痰食氣虛血衰

虛氣血

二妙四物湯

二妙合四物

二妙六君湯

二妙合六君

篇 痘

中年後腎虧火動足膝痠軟脈虛駛而促初用六味湯加懷牛膝繼用虎潛丸去鎌陽服後甚適但坐久腰膝熱騰小腹收引氣升脘膈不舒症因衝督經虛龍盤不伏非理臟真所得效擬龜鹿二仙膏加猪脊髓同熬酒和服得效

李 瘡邪失汗誤藥溼邪入絡四肢痿廢用除溼理絡手足能運然值冬寒氣血斂濶少腹偏窄背脊拘急脛膝麻頑步履歪倒知其陰陽維不司約束浸及任督俱病也用杜仲狗脊強筋骨而利俯仰五加皮牛膝益肝腎而治拘攣當歸白芍以和營茯苓草薢以逐溼泰羌獨活以治痺玉竹桑枝以潤風燥理肢節

加桑寄生通經絡煎服十數劑諸症漸減又將前方參入鹿膠
沙苑子小茴香以通治奇脈丸服酒下獲痊

族兒脊骨手足痿縱此督脈及宗筋病內經治痿獨取陽明以陽
明爲宗筋之會陽明虛則宗筋失養無以束筋骨利機關也童
年坐臥風溼虛邪襲入遂致筋脈失司欲除風溼須理督脈兼
養宗筋乃效方用歸芍參术牛膝鹿膠茯苓木瓜寄生桑枝葛
黃威靈仙十服肢體運動已活去鹿膠葛黃川芎木瓜威靈仙
加杜仲玉竹杞子虎脰骨數十服行方復常

張氏四肢痿弱動履艱難脈濶且弱爲營虛之候經言天癸將絕
係太衝脈衰乃陰吹帶濁宿恙頻興固知衝爲血海隸於陽明

陽明虛則衝脈不榮而宗筋弛縱無以束筋骨利機關法當調
補營血以實奇經人參杞子茯苓牛膝酒蒸熟地當歸杜仲酒燙山
藥炒木瓜蓮棗水煎十數服漸愈

痛風歷節風論治

痛風。痛痺之一症也。其痛有常處。掣者爲寒。腫者爲溼。汗者爲風。三氣入於經絡。營衛不行。正邪交戰。故痛不止。靈樞謂之賦風素謂之歷節。後世更名白虎。初因寒溼風鬱。脾陰分久。則化熱攻痛。至夜更劇。治以辛溫疏散。寒溼風邪開發腠理。宜十全大補湯。若痛處赤腫。焮熱將成風毒。宜敗毒散。如風溼攻注。肢節疼痛。大羌活湯。其歷節風痛無定所。徧歷骨節。痛如虎嚼。又名白虎歷節。蓋痛風之甚者也。或飲酒當風。汗出浴水。因醉犯房。皆能致之。其手指攀曲。身多瘻癟。其腫如脫。漸至摧落。其痛如掣。不可屈伸。須大作湯丸。不可例以常劑治。烏頭湯主之。因於寒。宜從溫散。防風天麻湯。因於火。宜從清涼。犀角散加減。

若筋脈攣痛。伸縮不利。繫血虛燥。四物湯加木瓜。

何首烏。甘杞子。肢節痠痛。脈沈

短。氣繫有畱飲。半夏芩朮湯或導痰湯加減。

肢節注痛。得撻摩而緩者。繫風溼

在經。靈仙除痛飲。肢節腫痛。遇陰雨而甚者。繫風溼入絡。虎骨丸。沒藥散。

或虎骨散。

肢節煩痛。肩背沈重者。繫溼熱相搏。當歸拈痛散。或虎骨散。

或潛陽散。

肢節熱痛者。繫陰火灼筋。加味二妙散。或潛陽散。

用四物湯間服。

周身麻痛者。繫氣血凝滯。五靈脂丸。歷節久痛者。繫邪毒停畱。乳香丸。

定痛丸。

九活、肥人肢節痛。多風溼痰飲流注。宜導丹。宜導丹。

或葛根湯加羌活。

老人性急作勞。患腿痛。宜四物湯加桃仁。牛膝。陳皮。生

物湯。加羌活。防風。

瘀積者。加熱酒服。

甘草煎成大蔴汁。或潛行散。

并刺委中穴出血。風氣遊行。痛無常處。如蟲行遍體。日靜夜劇者。

麝香丸。痛風歷節二症。宜參酌治之。

重垣以痛風多屬血虛。主用芎歸。佐以桃仁、紅花、薄桂威。丹溪以
痛風先由血熱。主用四物。黃芩、白芷，在上加羌活、桂枝、威靈仙、桔梗。在下加牛膝、黃芩。石頑以溼熱挾痰挾血。入絡痺痛。症重日久必加烏附。驅逐
痰溼。壯氣行經。便阻必用大黃。或畏峻攻不知邪毒流注經絡。非
烏附不能散結。燥熱結滯腸胃。非硝黃豈能潤燥乎。

痛風脈候

金匱云。寸口脈沈而弱。沈卽主骨。弱卽主節。沈卽爲腎。弱卽爲肝。
汗出入水。歷節黃汗出。故名歷節。

附 方

痛風 十生丹 歸 茯 苦 防 獅 天麻 川烏 草烏 何首烏 海桐皮 等分蜜丸 茶下一錢

敗毒散兒一卷傷風

大羌活湯羌活 升麻各錢半 獨活一錢 威靈仙 蒼
木 防已 歸草 活澤草各七分 苓 川

烏頭湯

烏頭一枝六錢

防己

白芍各三錢

炙草一錢

甘草

川

防風

天麻湯歸芎

白附子

羌活

防荆芷

天麻

草烏

犀角散

犀角一錢射干

羚羊角

滑石

甘草

前胡

黃芩

四物湯

地芍歸芎

豆豉

研末

梔子

大黃

升

半夏芩术湯

芩二錢

白术一錢半

陳皮

半夏

南星

威黃

靈仙

甘草

香附各一錢

赤芩各五分

導痰湯

見一卷中風

各三分

靈仙除癥飲

麻黃歸芍各一錢

荊防

草枳

蒼朮

羌活

靈仙各八分

芩

歸

芍

芷

荊

防

草

枳

蒼

朮

羌

活

防

草

枳

蒼

朮

靈

仙

除

癥

飲

歸

芍

各

一錢

荊

防

草

枳

蒼

朮

羌

活

防

草

枳

蒼

朮

靈

仙

除

癥

飲

歸

芍

各

八分

芩

風溼風溼風溼

虎骨丸 虎骨一兩半 五靈脂 白膠 疣蠶威靈仙各一兩
烏頭一兩半 酒糊丸

沒藥散 沒藥等分爲末 虎骨酒下二錢

虎骨散 當歸一兩半 防風 牛膝五加皮 沒藥 自然銅 白附子 赤芍
骨碎補 研末服 天麻

當歸拈痛散 見一卷腫

趁痛散 活血 桃仁 紅花當歸地龍五靈脂 牛膝

香附 甘草各二錢 乳 沒各一錢 炙

爲末

酒下二錢

加味二妙散 見本卷痺

潛行散 黃蘿酒浸焙研 每一錢薑汁和酒調服

五靈丸 見本卷痺

久痛

乳香定痛丸

薑木二兩 川烏一錢

歸芎各一兩

丁香五錢

乳沒各三錢

棗肉爲丸

酒下

活絡丹

見本卷瘡

氣風

麝香丸

川烏二個

全蠍甘

一個

生地龍五錢

生黑豆

大酒下七九

麝香丸

川烏二個

全蠍甘

一個

生地龍五錢

生黑豆

大酒下七九

痛風

房弟脛膝痛腫流走不定筋惕足痙風溼久痺都從熱化矣古謂
風從陽受痺從陰受始山絡痺失宣十數年忽止忽發今秋痛
自右移左行立頗難陰絡受病診脈下元先虛搜理絡邪宜兼
滋化源爲有年陰虛痺症治法熟地水杞子當歸牛膝茯苓木
瓜威靈仙桑寄生玉竹獨活杜仲生薏苡地骨皮同熬膏以虎
脛骨膠收開水化服痛止

族某水溼與氣互搏走注上下表裏經絡不定其走注處必畧腫
膚熱如芒刺前自耳項直下胸鄉汨汨走腸別注糞囊後自背
脅走腰注臂行髀膝至右腑腫重手按不卽起口燥咽痛溺少

便艱此溼飲爲風氣鼓動溢於支絡游走升降腸腑鬱痺鍼刺
罔效治用表裏宣泄杏仁石膏山梔赤芩木通秦艽黑豆皮大
腹皮黃藥酒炒二服癰痛減二便爽再用宣理行痺鉤藤薏苡三錢
山梔杏仁車前一錢茯苓腹皮川棟子桑寄生二錢牛膝狗脊防己
錢半四服諸症平再去牛膝狗脊川棟等加神麴半夏椒目以運
水溼而腫退

張 長夏歷節痛渾身重肢軟風溼淫注血脉失於宣通治用驅

風逐溼通調血脉獨活川烏製當歸牛膝蒸薑黃威靈仙防己

松節乳香桑枝尋骨風水酒各半煎外用風藥煎湯熏洗而康
族女風溼走注骨節痛痺四肢筋掣脈沈由產後血虛留邪當歸

木瓜秦艽杞子鉤藤茯苓牛膝薏苡瓢沙葛黃桑枝外用防風
豨莶蒼耳子菖蒲根葱薑煎湯浴取汗六七次痛止如常

麻木論治

麻木營衛滯而不行之症。靈樞云。衛氣不行則爲麻木。素問云。營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛則不仁。如人坐久。壓著一邊。亦爲麻木。東垣以爲氣不行。當補肺氣。丹溪以麻爲氣虛。木爲溼痰。敗血於不仁中。確分爲二。蓋麻雖不關痛癢。只氣虛而風痰乘之。如風翔浪沸。木則肌肉頭痺。溼痰挾敗血。阻滯陽氣。不能徧運。爲病較甚。俱分从暫治之。治麻以氣虛爲本。風痰爲標。用生薑爲嚮導。枳殼開氣。半夏逐痰。羌活散風。木通威瘡。行經絡。手臂用桑枝。足股用牛膝。病減用補中益氣湯。重加參耆。固本治木。以桂爲嚮導。烏藥行氣。當歸。杞子。牙皂。穿山甲。通經絡。病減用八湯。附木香行氣。桃仁。紅花。和血。牙皂。通經絡。病減用珍湯。以培虛。此外如浑身麻木。衛氣不行者。神效黃皮膚麻木。肺氣者。

不行者。芍藥補氣。肌肉麻木營氣不行者。湯。八仙暑月麻木熱傷元氣者。人參益氣湯。冷風麻痺足屈不伸者。獨活寄附湯。腿足麻木忽如火灼屬溼熱下注。二妙丸加牛膝。手臂麻爲氣虛。補中益氣湯加桑枝。春臂麻目淚爲氣虛有痰用補。黃芩。中益氣湯兼服六味丸而愈。不應加肉桂。十指麻木屬胃中溼痰敗血。二陳湯加桃仁紅花。少加附子行經指尖麻屬經氣虛。沈氏桑白皮。面麻木屬陽氣虛。牛皮膠煨化和肉桂。舌麻木吐痰涎止麻消痰湯氣虛加合口則渾身麻木開眼則止東垣以爲陽衰溼伏陰分頭加黃藥膏。川芎當歸身筋骨開結舒筋湯。有自頭麻至心窩而死或自足心麻至膝蓋而死方。麻骨婦多煮葱白食之卽愈一塊不知痛癢遇陰寒益甚屬凝挾死血宜活血行氣二陳湯加川芎當歸懷牛膝韭汁白芥子研末葱薑汁調敷外澆因血瘀。四物湯加韭黃因氣滯。

人因悒鬱氣結致發麻痺者當舒鬱。逍遙散加香附川芎沈氏尊生書曰治麻木須補助氣血不可專用消散方書有謂大指次指忽然麻木不仁者三年內須防中風宜服地黃飲子或十全大補湯加羌活秦艽若古法服愈風湯天麻丸開其元腑漏其真液適以招風取中預防云乎哉。

麻木脈候

脈浮而濤屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體浮而緩屬溼爲麻痺緊屬寒爲痛痺濤而芤屬死血爲木不知痛癢

附 方

補中益氣湯見一卷中風

麻治八珍湯見一卷中風

麻治

神效黃耆湯 菖 肺 氣 涼 風 湿 雜 指 麻 骨 熟 暑 氣 营 氣 清 氣 肺 氣

神效黃耆湯

參

芍

草

黃耆

桂枝

秦

芍藥補氣湯

耆

陳

柴胡

桂枝

秦

八仙湯

八珍湯加牛膝

陳

夏

羌

防

柴胡

桂枝

秦

人參益氣湯

青二錢

參

草各錢半

白芍

七分

柴胡

桂枝

秦

第二日耆四錢

升麻五分

紅花三分半

陳皮五分

澤瀉三分

亦升麻

日二服

第三日耆三錢

黃芩六分

陳皮錢半

升麻

亦升麻

一錢澤薄錢二分

亦日二服

白芍二錢半

炙草五分

五味子

亦升麻

獨活寄生湯

見一卷溼

二妙丸

見一卷溼

二水二陳湯

見二卷痰飲

六味丸

見一卷中風

指 麻 骨 熟 暑 氣 营 氣 清 氣 肺 氣

指

桑尖湯

嫩桑尖五錢
茯苓各一錢半

漢防己三錢

當歸二錢

黃耆

升麻各五分

加人參亦可

天麻一錢半

威靈仙一錢

秦艽各一錢

川芎

口合舌目行氣血瘀氣頭足舒鬱中風

桑尖湯

漢防己三錢

當歸二錢

黃耆

川芎

止麻消痰湯

芩連

芩南星細辛

葛桔陳枳草

三癰湯

見本卷癰

夏南星葛桔陳枳草

二陳湯

見一卷中風

回物湯

見一卷中風

開結舒筋湯

紫蘇陳皮香附

烏藥歸芍羌

桂枝甘草各四分

甘草各四分

麻骨湯

人糞燒灰爲末每服二五錢

豆腐漿調服卽止酒下

又方川棟子燒灰

甘草各四分

逍遙散

見一卷火

地黃飲子

見一卷中風

虛補治通譜

十全大補湯

見一卷中風

愈風湯

見一卷中風

天麻丸

天麻各十兩

牛膝

草薢各七兩

元參

各六兩熟地一斤

當歸

附子三兩

羌活

煉活

蜜爲

丸

麻木

王氏年近六旬肢麻頭暈屢發今春頭右畔麻至舌尖言蹇目紅
齦浮齒痛厥陽升逆鼓燭痰火入竅入絡輕爲麻瞀甚則口眼
喎僻手足不隨偏枯類中由來者漸矣用滋陰鎮陽以熄風緩
效爲宜熟地四錢鉤藤三錢石斛杞子茯神白芍牡蠣磁石各二錢羚羊角七分山梔甘菊俱炒各一錢十數服症減去磁石加冬桑葉黑芝
麻再去鉤藤梔菊羚角等加潞參以桑椹熬膏及阿膠和丸漸

安

痙症論治

痙症體勁直而背反張病在筋也。筋者血之所榮。傷於邪則成痙。經曰。諸痙項強皆屬於溼。亦有因寒因風而分剛痙柔痙者。有誤汗誤下而致痙者。有瘡家發汗而痙者。有中風暴仆而痙者。有產後亡血而痙者。有小兒急慢驚而痙者。有中風暴仆而痙者。有產後亡血而痙者。有小兒急慢驚而痙者。有破傷風溼變痙者。有暴病忽見口噤頭搖戴眼反折者。皆痙病也。其症身熱足寒。項強齒噤。手足抽掣角弓反張。脈皆沈伏弦緊。其因多由血液虛燥。筋脈失榮。風寒溼熱之邪。得以襲入經絡而爲病。此陳無擇薛立齋張介賓諸賢所以切指痙爲亡血陰虛也。故宜滋營液以治本疏風溼以治標。症屬表者如金匱云。太陽病發熱無汗反惡寒爲剛痙。

葛根湯

桂枝湯

葛根湯

太陽病發熱汗出。不惡寒爲柔痙。

桂枝湯屬裏者。痙病胸

滿口噤。卧不著席。腳攣急。必齶齒屬陽明。若便鞦。

可與大承氣湯屬半表

半裏者。如醫通云。一邊牽搐。一眼喎斜。屬少陽。若往來寒熱。

小柴胡湯

加桂枝。此三陽痙也。若三陰痙。俱手足厥冷。筋脈拘急。汗出項強。

水附湯加甘草。生薑。少陰則閉目合面。

參附湯加甘草。生薑。厥

脈沈太陰則四肢不收。

水附湯加甘草。生薑。少陰則閉目合面。

陰則頭搖口噤。

當歸肉桂。此三陰痙也。其血虛發痙。

宜大營煎。血虛挾

火。必脈洪煩熱。

一陰煎。火盛則陰血燥涸。

保陰煎。宜三

汗多兼火。

當歸六黃湯。痰火發痙。

活蘿枳實湯。風熱痰壅發痙。

法風導嘔瀉

發痙。

胃關煎。或溫胃飲。

身冷痙厥。脈沈細。

參附湯。十全大補湯。

湯加羌活。防風。黃耆。白芍。

溫邪刲液成痙。

復脈湯。去薑桂。

產後血虛。汗多成痙。

十全大補湯。不

小續命湯宜去麻黃。

陳無擇曰寒濶血故無汗而惡寒爲剛痙風散氣故有汗而不惡寒爲柔痙原其所因多由亡血筋失所榮故邪得襲之徐忠可曰發熱惡寒無汗本傷寒症若成痙是太陽寒溼相搏而侵少陰故惡寒寒性勁故曰剛發熱有汗不惡寒本傷風而併陽明症若成痙是太陽陽明傷溼兼風風性溫故曰柔仲景以葛根湯治剛痙杜太陽項強漸成陽明胸滿之勢也以桔梗桂枝湯治柔痙潤太陽旣耗之液使經氣通散風行溼也以大承氣湯治裏症以熱邪入內故直攻其胃而邪散也。

薛立齋曰痙以有汗無汗辨剛柔又以厥逆不厥逆辨陰陽仲景

雖曰。痙皆身熱足寒。然陽症不厭。逆其厥逆者。皆陰症也。
張介賓曰。筋脈拘急。故反張。血液枯燥。故筋攣。觀仲景云。太陽病
發汗太多。則致痙。風病下之。則成痙。瘡家不可發汗。汗之。則痙可
知。誤汗傷液。誤下傷陰。陰液傷而筋失所滋也。如中風之痙。必年
力衰殘。陰之敗也。產婦之痙。必去血過多。衝任竭也。潰瘍之痙。必
血隨膿化。營氣涸也。小兒之痙。或風熱傷陰。爲急驚。或吐瀉亡陰。
爲慢驚。此雖不因誤治。而總屬陰虛之症。治此者。先以氣血爲主。
邪甚者。或兼治邪。若邪微。則急培元氣。元氣復。血脈自行。微邪自
去。若從風治。難乎免矣。

丹溪曰。痙與癇相似。而不同。癇病身軟。時甦。痙病身強。直不時甦。

甚有昏冒而遂亡者。

痙症脈候

太陽病發熱脈沈而細。名曰痙。爲難治。痙脈按之緊如弦。直上下行。痙病發其汗已。其脈如蛇。腹裏脹大者爲欲解。脈如故。反伏弦者。痙。正經脈皆沉伏弦緊。但陽緩陰急。則久久拘攣。陰緩陽急。則反張。痙直二症各異。不可不別。因

附 方

葛根湯見二卷汗

栝蒌桂枝湯見四卷癰 加栝蒌

大承氣湯見一卷泄

瘡柔

小柴胡湯見一卷溫

水附湯木附草薑

參附湯參附薑

耆附湯耆附薑

大營煎見三卷關格

一陰煎見二卷咳嗽

保陰煎二地白芍各二錢山藥

各錢半生甘草一錢

續斷

黃芩

黃藥

玉女煎見一卷溫

三陰煎見二卷汗

當歸六黃湯見二卷衄血

火盛兼虛陰少太和直
火盛兼虛陰少陰太和直
火多汗兼虛陰少陰太和直
火多汗兼虛陰少陰太和直

枯萎枳實湯

黃歸

枳

貝

桔

參

茶

陳

李

祛風導痰湯

導痰湯

風

蘇子

梔

貝

桔

參

茶

胃鬱煎

熟地

山藥各三錢

扁豆

扁豆

白朮各二錢

葛

葛

溫胃飲

見一卷中風

十全大補湯

見一卷中風

三物香薷飲

見一卷中風


復脈湯

見一卷中風

小續命湯

見一卷中風

瘧疾風寒暑濕產後邪風桂鴻吐瀉嘔瘞火瘧



痙

服姪少陰伏邪夏至後發協熱下利口乾脈數舌絳目紅譭煩躁擾服蘆梨西瓜等汁轉益狂躁神昏不寐症由心營受燥勢必液涸成痙先用鮮菖蒲根湯下至寶丹開竅滌痰一服神識畧清但指臂動掣脛膝不溫痙厥已露宵分齒噤口喝搖頭直視此火風入筋刲燥血液熱深厥深之象急救營液以熄火風用阿膠水生地犀角汁麥冬鉤藤木瓜山梔石斛生藕汁煎日再服症定脈數減去犀角加生鼈甲龍膽草蒿退肝膽風熱漸平同時一姪孫症同脈更沈數飲以臘雪湯西瓜汁暫定逾時輒復躁擾譴妄服至寶丹稍靜予一見其舌乾薄齒如灰糕決其

醫水枯竭勉用方諸水煎生地犀角生鼈甲元參石斛等熱勢
輒定然卒不救可知溫熱症由伏邪內發者多死於陰虛水涸
之體也

眩暈論治

頭爲諸陽之會。煩勞傷陽。陽升風動。上擾顛頂。耳目乃清空之竅。風陽旋沸。斯眩暈作焉。良由肝膽乃風木之臟。相火內寄。其性主動。主升。或由身心過動。或由情志鬱勃。或由地氣上騰。或由冬藏不密。或由高年腎液已衰。水不涵木。或由病後精神未復。陰不吸陽。以至目昏耳鳴。震眩不定。甚則心悸舌竦。肢麻筋惕。寤不成寐。動卽自汗。起則嘔痰。無痰不作眩。此經所謂諸風眩掉。皆屬於肝也。顧內風肆橫。虛陽上升。非發散可解。非沈寒可清。與治六氣風火大異。法宜辛甘化風。或甘酸化陰。葉氏所謂緩肝之急。以熄風滋腎。之液以驅熱。肝風既平。眩暈斯止。條其治法。如上焦竅絡火鬱用。

羚羊角。山梔。連翹。天花粉。以泄熱。從膽治也。如中虛風陽擾胃。用丹皮。生地。桑葉。鉤藤。天麻。人參。山藥。黃耆。小以填補。從胃治也。肝風內擾。陽明正。如下元水。麥冬草。龍眼肉。以填補。從胃治也。當其衝。故須補中。潤火升用。阿膠。熟地。石斛。何首烏。杞子。以攝納。從肝腎治也。其陽。當其衝。故須補中。潤火升用。天冬。黑芝麻。磁石。五味子。目不濶。川貝。橘紅。淡菜。龜甲。痰多作眩。用茯苓。川貝。橘紅。竹瀝。薑汁。心悸不寐。用棗仁。麥芽。葛根炭。火。動怒鬱勃。痰火風交熾。用二陳湯下。至於熄風之品。如龍膽草。白芍。土被木克。嘔吐不食。宜泄肝安胃。用橘紅。白芍。木瓜。半夏。天麻。鉤藤。之屬。皆可隨症加入者也。

附 方

除 痰 鴻 濟
火 薦 二 陳 湯 見 一 卷 中 風
龍 薑 丸 見 一 卷 火

眩暎

褚氏高年頭暎冬初因怒猝發先怔忡而眩仆汗多如洗夜不能寐左寸關脈浮大無倫此膽氣鬱勃煽動君火虛陽化風上冒顛頂所致用丹皮山梔各錢半甘菊白芍俱炒各錢鈎藤茯神各三柏子仁棗仁生研各八分桑葉二錢浮小麥二兩南棗四枚二服悸眩平汗止熟寐矣隨用熟地潞參五味茯神麥冬適子自芍數服全愈。○凡營液虛膽火上升蒙蔽須丹梔鉤藤桑葉以泄熱炒芍芍以熄風和陽再加茯神棗仁柏子仁小麥以安神涼心風靜江止必收斂營液爲宜。

豐氏眩暎痞嘔多酸苦渴沫肝木乘土胃虛食減瘀濁不降得虛

風翔則傾溢而出厥陽上冒清竅爲蒙故眩暈時乍診脈濶小數兩寸尤甚先用降濁熄風桔梗霜蘇子半夏茯苓杏仁天麻甘菊炭鉤藤橘皮諸症平恩納食矣又照原方去蘇子杏仁鉤藤加茯神蓮子釵石斛荷葉煎湯十數服而安

室人煩勞傷陽無寐耳鳴頭暈欲嘔伏枕稍定虛陽上顛風動痰升眩嘔乃作宜潛陽熄風牡蠣殼研白芍五味甘菊炭天麻煨牛夏青鹽炒生地炒茯神棗仁桑葉二服隨愈

蕭 劋力先曾失血數次近日頭眩耳鳴目昏心悸腕閏兩尺浮大弦勁相火易炎寵雷失制痰隨火乘上干清竅所謂無痰不作眩悸也養陰潛陽淡茅牡蠣熟地炭石斛甘菊白芍貝母茯

輕敷服得效後宜服六味丸

許氏 中年經行太多目眩頭暈用橘陰和陽熟地白芍甘菊俱

各二錢當歸 醋炒丹皮牡蠣粉各錢半
甘草炙黑一錢嫩桑葉三錢紅棗三枚

二服愈

王 伏暑病後失調脈虛疾頭暉熱渴而煩虛風上顛議苦辛泄

熱佐以甘潤山梔甘菊丹皮麥冬，釵斛天麻 煙薰參花粉甘草

嫩桑葉二服而愈

堂兄寤後舌辣津不上朝頭眩肢麻陽升風動主和陽熄風佐酸
味以生津鮮生地玉竹石斛白芍五味花粉烏梅甘菊炭牡蠣
粉桑枝黑芝麻常服効

姜 痛冠勞力傷陽神疲頭眩發熱口苦食減嘔渴兩寸脈數麻

氣上冒有風翔浪湧之勢治以鎮陽泄濁牡蠣白芍茯神橘紅

製半夏吳茱萸甘菊炭金器同煎二服渴降囁止脈仍小數頭

目不清緣春溫膽火上升倣葉氏泄膽熟法丹皮嫩桑葉荷葉

遼鉤藤白芍生山梔生地炭數服眩除熱減去桑葉生地炭加

玉竹茯神杞子焙山梔熟地俱炒潞參蓮棗脈平

蕭 冒雨後溼鬱成熟蒸而爲黃宿恙又經操勞屢次失血當春

虛陽升動欬而頭眩口乾目黃怔忡失寐治先清泄火風生地

石斛山梔心茯神丹皮羚羊角杏仁鉤藤甘菊炒四服頭目清

怔忡息食進寐穩矣但神疲力倦去生地加參芍蓮棗以扶脾

元數服更適後去羚羊角杏仁鉤藤甘菊加茵陳松蘿茶葉黃
漸退

عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ۚ

厥症論治

氣自下逆上。手足冷爲厥。厥者盡也。危候也。經曰。下虛則厥。故陽衰於下。則爲寒厥。陰衰於下。則爲熱厥。陰陽之氣不相順接。則病厥逆。手之三陰三陽相接於手十指。定之三陰三陽相接於足十指。陽氣內陷。陽不與陰相順接。故手足厥冷也。寒厥者。身寒而青。四肢逆冷。指甲冷。踰卧不渴。便利。脈微遲。卽陰厥也。熱厥者。身熱面赤。四肢厥逆。指甲煥煩。渴。昏冒。便短濶。脈滑數。卽陽厥也。按內經論十二經陰陽之厥詳矣。而仲景以厥隸厥陰活人。亦謂諸手足逆冷。皆屬厥陰。以肝臟風火爲厥逆之主。故厥症種種類由肝風痰火衝激閉塞。以至昏煙爲多。今標舉其目。有寒熱氣血食痰。尸蛻煎薄。瘡癰。風癇。瘡癰。骨痛。腎色暴瘡。諸厥。施治。

最所宜審寒厥初病卽肢冷腹痛脈微或表熱裏寒下利

附子理中湯

或表熱裏寒下利

清穀厥逆乾嘔咽痛脈沈細而微四逆獨指尖冷名清厥湯理中熱

湯

厥初病身熱煩躁脈滑數日後忽肢冷乍溫乃熱深發厥火鬱

湯

秘大柴胡湯煩渴躁妄失下而手足冷乃陽極似陰熱極似寒不可疑

湯

作陰症輕用熟藥熟微厥亦微四逆散熱深厥亦深承氣如陰衰於

湯

下足下熱而厥者六味湯凡傷寒之厥辨邪氣寒厥宜溫熱厥可散

湯

可攻若由陰陽之衰則元氣爲重寒厥宜補陽熱厥宜補陰氣厥

湯

症有一氣虛氣實皆能致厥氣虛而厥者必形色消索身微冷脈

脈

微弱爲氣脫參耆歸水地甚者回陽飲

氣質而厥者形色鬱勃脈

沈弦而滑胸膈喘滿爲氣逆先理其氣排氣飲再隨症調之血厥

四七湯

症有二。血脫。血逆。皆能致厥。吐衄。暴崩。及產後血大脫。則氣隨之。
故猝仆。宜先掐人中。或燒醋炭。以收其氣。急煎人參湯灌之。但氣不盡。

脫必漸甦。血逆者。暴怒傷陰。血逆於上。先理其氣。則血自行。

煎化通瘀

肝。脾。行氣。舒。隨症調之。食厥。由醉飽過度。偶感風寒。惱怒。食氣
填。中。脾。陽。不。運。忽。仆。不。省。誤。作。中。風。中。氣。治。則。死。
煎薑鹽湯探吐食出。則
愈。加。感。風。寒。
藿香正氣散。傷。氣。滯。
八味順氣散。縱。飲。痰。升。猝。仆。者。名。酒。厥。
陳

湯。加。青。皮。葛。根。砂。石。瘀。厥。由。痰。熱。阻。蔽。心。胞。肢。冷。猝。仆。先。探。吐。其。痰。
瓜蒂散

開。再。治。本。病。火。痰。宜。清。降。寒。宜。溫。散。溼。痰。宜。燥。利。因。脾。虛。者。健。
脾。因。腎。虛。者。補。腎。戶。厥。卽。中。惡。之。候。因。犯。不。正。之。氣。忽。手。足。厥。冷。
牙。緊。口。噤。皆。不。知。人。或。由。登。塚。弔。死。飛。尸。鬼。擊。語。妄。面。青。
蘇合香湯灌之

候甦。平胃散。仲景云。尸厥脈動無氣。氣閉不通者。還魂丹。蛇厥多因胃寒。蛇蟲攻胃。心腹痛不可忍。或吐涎沫。或吐蛔蟲。發有休止。不宜用寒藥。理中湯加炒川椒、檳榔、水煎下。烏梅丸或安蛇散、蕪荑散。蛇蟲得苦則安。得酸則止。得辛則伏。吐蛇亦有陽症。口瘡咽疼。吐蛇竟以冷劑取效者。不可耑以胃冷概也。煎厥者。諸動屬陽。煩勞則陽氣暴張。勞火亢炎而精絕遷延。至夏內外皆熱。孤陽厥逆。如煎如熬。宜清心益腎。或鹹寒降逆。人參固本丸。抑淡薄厥酒。厥逆者。肝本藏血。怒則火起於肝。迫血上行而厥。蒲黃酒。痿厥亦熱厥症。厥從肝起。致四末不用。因水虧則陽風燥。筋絡熱沸騰。須血肉鹹潤之品。熬膏服以填其隙。鱉甲、龜板、阿膠、淡、薄、厥脚氣、頑麻。初發必身痛。肢節腫。當歸拈痛。其自踝以下痛極者。五獸三匱。厥滋腎丸。風厥手足搐搦。身體強直。名

瘡厥。小續。命湯。癰。厥。肝風發。瘡。肢掣。液涸。固本丸。加阿膠。

黃龍骨。

瘡厥乃類中

風症。瘡。不語。經所謂內奪而厥。則爲瘡。痱。地黃飲。子加減。鬱厥亦血厥。

症。平居無疾。忽默默無知。目閉口噤。惡聞人聲。移時方寤。由熱升。

風動。鬱冒而厥。婦人多有之。

羚羊角散。

虛則填補。奇經。杞子。當歸。鹿角。

骨厥。骨枯爪痛。六味。

九。

痛厥。由胃陽久衰。肝木來乘。濁氣攻胃。

吳萸

茱萸。薄荷。廣皮。之屬。腎厥。火山背脊上升。肢逆。吐沫。

附。

其有腎厥。氣逆至。

頭腦大痛。

玉真。

色厥。乃縱慾竭。情精脫於下。氣脫於上。

獨參湯。

厥脈至如喘。氣閉。肢冷。若鼻及心腹微溫。目中神采不變。口無涎。

卵不縮。皆可救。

急。

瘡。厥。由瘡邪陷陰。發厥。不省。當和正以托邪。

人參。半夏。知母。草。

果。烏梅。生薑。之屬。

凡諸厥脈。大浮洪有力。易醒。脈細沈伏數急。不

連貫凶厥朴大指。指拳內凶指拳外輕而青環口。青唇白鼻青孔
黑人中弔危也。

諸厥脈候

寸脈沈大而滑。沈爲實。滑爲氣。實氣相搏。猝厥血氣入臟。卽死。入腑。卽愈。唇青身冷。爲入藏。猝厥脈大而緩者。生。緊大而浮者。死。戶身溫汗出。爲入府。猝厥脈大而緩者。生。緊大而浮者。死。厥脈伏者。死。凡厥脈。沈微爲寒。沈數爲熱。細爲氣虛。芤大血虛。浮數滑爲痰。脈至如喘爲氣。沈滑緊疾爲食滯。大而滑爲芤。脾脈緩爲痿。浮濶而緊爲痺。

附 方

厥寒理中湯 見一卷中風

四逆湯

見一卷暑

火鬱湯

見一卷火

大柴胡湯

見一卷溫

四逆散

見三卷肝火

小承氣湯

見一卷溫

六味湯

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

四味回陽飲

參附龍草

四七湯

一名七氣湯見二卷欬嗽

排氣飲

見三卷積聚

寒熱厥逆
散熱滋陰
補陽脫氣
秘熱逆氣

通瘀煎 歸尾 山查 香附 紅花 烏藥 青皮 木香

化肝煎 澤鴻

見二卷血

正氣散 見一卷中風

八味順氣散 見一卷中風

二陳湯 見一卷中風

瓜蒂散 見一卷中風

蘇合香丸 見一卷中風

調氣平胃散 見一卷中風

還魂丹 辰砂 雄黃 珊瑚 蘭香

化爲丸黍米大 每服五分

烏梅丸 見三卷嘔吐

白芥子 安息香

木香

安琥散 見三卷嘔吐

燕羹散 見三卷積聚

固本丸 見一卷中風

蒲黃酒 蒲黃一兩炒褐色 清酒十盃沃之溫服

當歸拈痛湯 見一卷溼

五獸三匱丸 見本卷癰

滋腎丸 見一卷火

小續命湯 見一卷中風

地黃飲子 見一卷中風

羚羊角散 見本卷癰

止嗽散 見一卷咳嗽

麻黃散 見一卷風寒

麻黃湯 見一卷風寒

頭暈方

卷之五

厥

卷之五

厥頭痛暴厥

椒附湯 見四卷泄瀉

玉貞丸

硫黃

硝石

石膏

半夏

蘋甘糊丸

備急丸

大黃

乾薑

巴霜各二兩

蜜丸豆大

猝厥者

酒下三丸卽活

厥

房叔秋感時癟煩悶吐瀉筋掣囊縮手足厥逆脈微邪陷厥陰與六和湯去扁豆白朮杏仁加吳茱萸根薑吐瀉止手足溫忽發瘲項背強直時或反張頭面冷至胸背躁擾欲冷飲目閉心口不能語由吐瀉後真陰大傷厥氣上逆陰陽失交虛風入絡故現瘲厥重症雖神明未昏而腎水欲枯微陽垂絕勉用參

二附三回陽歸二芍三錢救陰麥冬五味四生津木瓜鈎藤各半錢分各二錢

舒筋茯神遠志各二錢

斂神服後陽回躁定再劑諸症悉退

類證治裁

卷之五

四

聖

腳氣論治

腳氣。壅疾也。多由蘊溼而成。經所謂緩風溼痺也。頑弱爲緩風。痛著爲溼痺。然有風溼寒溼溼熱厥逆攻注等因。東垣謂南方多感寒溼。北方多傷溼熱。千金方直謂風毒所中。由坐立溼地。風溼襲人。經絡皮肉。遂成腳氣。初起甚微。人多不覺。惟猝起腳屈弱。不能動。或腫不腫。或頑痺。或緩縱。或攢急。其發也。身痛壯熱。大類傷寒。或小腹不仁。或腹痛下利。或二便秘滯。或忡悸昏憤。嘔逆轉筋。但病起自腳。或腫滿。或枯細。便作腳氣治。勿用傷寒等藥。其小腹頑痺不仁者。腳多不腫。頑後三日。令人嘔吐。爲腳氣入心。死在旦夕。腎乘心。水克火也。丹溪以山藥救之。後人又以浮腫爲溼腳氣。當利溼疏風。不腫爲乾腳氣。入味丸去。

當潤血清燥

熱也。乾自

治法大要疏通其壅氣滯者

橫蘇散。食滯者

投

湯勝者自汗走注脈浮弦

越婢加

寒勝者無汗

加

急掣痛脈沈

白朮湯。

清暑益

加

溼勝者脈沈

氣湯。

溼勝者脈沈

加

濁細除溼

寒溼勝者頑弱無力脈細緩

巴九熟甚者

加

湯勝者桑白皮散

腳氣初發渾身痛肢節腫二便秘先用

羌活導滯

散

桑白皮散

腳氣初發渾身痛肢節腫二便秘先用

羌活導滯

湯導之。

川當歸拈痛

後

散除之。風毒甚頭痛身熱肢節痛或一腳偏軟

小續命湯。

三

加木瓜。

陽經熱毒注腳踝赤腫痛寒熱如瘡敗毒散

加

三陰經寒溼著脛

加蒼朮。

膝枯瘦色淡少腹不仁或腹急痛上氣喘急八味丸

加

加沈香

腳氣入腹衝

胸欲絕千金半夏湯入腸作痛杉木筒湯腳氣衝心爲火氣逆上金鈴子散

加黃藥別

以附子末津衝心滿痛二便俱阻沈香導

腹脹喘急蘇子降氣湯

氣湯佐以養正丹

加

嘔逆惡心。平胃散加木香。腿肚轉筋。以蒜擦足心。令熱。卽其厥氣升。溼濁不降。木萸。腎氣虛。小溲不利。金匱腎氣丸。氣血虛。屈伸不利。獨活寄生湯。腳氣走注痛不可忍。提虎骨。節腿痛。五加腿筋。皮丸。筋不舒。湯羌活續斷。腳氣。生。猪。肚。中。白。蝦。脂。搗。敷。油。紙。扎。效。注。踝。成。漏。人。研。數。孔。良。此。症。最。忌。房。室。及。一。切。牛。羊。雞。鴨。魚。肉。葱。蒜。酒。麪。犯。之。則。成。痼。疾。

東垣云。腳氣實由水溼。然有一焉。南方卑溼。清溼襲虛。則病起於下。此爲外感。北方常食獐乳。飲酒太過。脾胃不能運化。水溼下注。此因內至外者也。腳氣脹腫。是爲壅疾。治當疏下。然太過則損。不及則病不去。南方多見兩足粗大。與疾偕老。初起治宜湯。晉。
脚氣

並加橫搘以宣通其氣。不使其壅塞。既成砭去惡血。然後服藥。
于金論云。腳氣有冷有熱不同者。足有三陰三陽。寒中三陽所患
必冷。暑中三陰所患必熱。脾受陽毒必熱。頑腎受陰溼即寒痺。
活人書云。凡腳氣服補藥及用湯藥潔洗。逼邪入於經絡者。皆醫
之大戒也。

醫通云。腳氣服補藥太過。小便不通者。用蓮汁炒山梔木通赤芍
味煎。腳氣遍身腫滿喘促煩悶者。木通散。腳氣上入少腹不仁者。八

丸。

凡腳氣多從暑溼得之。故腫痛多屬溼熱。其兼寒兼風。當詳春夏
病因六淫治之。至於枯細而熱者。屬陰虛瘦弱而寒者。屬陽虛當

別以本症治之

腳氣脈候

腳氣之脈浮弦爲風。濡弱爲溼。遲滯因寒。洪數熱鬱。沈伏毒在筋骨。濶滑不調。毒在血分。夏暑腳膝冷。其脈陽濡陰弱。爲溼溫。浮大緊駛。及沈細而駛。皆惡脈。心下急。氣喘自汗。脈促短數。嘔吐不止者死。

附 方

頑痺
八味丸見一卷中風

擇蘇散芥末二錢 香附 蘿蔴 陳皮 木瓜 檸榔
羌活 生膝各一錢 甘草三分 茄白二莖 薑

片三

四七湯

見二卷欬嗽

枳黃湯

錢

酒浸大黃二錢

羌活錢半

當歸二

越婢加朮湯

麻黃

石膏

白朮

甘草

葛根

牛膝丸

牛膝二兩
酒浸晒研

川椒五錢

附子一錢
虎胫骨六錢

蜜丸

酒下

忌食動風物

清暑益氣湯

見一卷暑

除溼湯

見一卷溼

葫蘆巴丸

葫蘆巴酒浸一宿焙

故飴炒各四兩

共研以

加味蒼葉散

木瓜切頂去瓢入藥令滿盆合蒸爛搗丸

白朮八分

知母

黃芩

黃芩

牛膝三分

木通

羌獨防草

勝溼餅子

白芷黑芷各二兩

取頭末五錢

甘遂五錢

水調作餅如錢大飯上蒸熟空

甚腫

心服以利爲度

桑白皮散

赤芍二錢桑皮

木香

防己

檳榔各一錢

二分

青皮各七分

郁李仁各一錢

蘇葉

木通

大腹子

薑三片

羌活導滯湯

大黃酒燶二錢四分

羌活

獨活各一錢

二分

防己

歸尾各七分

枳實五分

當歸拈痛散

見一卷腫

小續命湯

見一卷中風

敗毒散

見一卷傷風

半夏湯

半夏人參

桂心各三錢

乾薑二錢

附子

炙草各錢半

細辛

蜀椒各一錢

分三服

杉木節湯

杉木節一升

橘葉切一升

無葉則以橘皮代之

童便三升煮一升半

分二服

金鈴子散

見三卷鬱

滿

沈香導氣湯

羌活

白芍

檳榔

各一錢

川芎

香附

各一錢

枳壳

蘇葉

蘇子

木瓜

薑

各六分 炙草

沈香各五分

蘇子降氣湯

見二卷失音

養正丹

見三卷嘔吐

平胃散

术 樸 陳 草 薑 杞

木萸湯

木瓜 檳榔各二錢半 吳茱萸錢半

腎氣丸

見二卷虛損

獨活寄生湯

見一卷溼

羌活續斷湯

羌活 繢 苍

防風

芷

參

地

歸

捉虎丹

五靈脂

龍名兩半

白膠香

乳

草

烏頭

豆同煮

木蠟子

京墨

地

三錢半

糯米糊丸

酒下

五加皮四兩酒浸

遠志四兩酒浸

晒研酒糊

五加皮九錢半

酒下

五加皮四兩酒浸

遠志四兩酒浸

晒研酒糊

苧根湯

杜仲三錢
根各二錢

當歸川斷桑枝炒四錢

胡桃肉紅花

杞子秦艽桃仁各白苧

一錢

煎服將藥渣

乘熱啜之

三將軍丸

茱萸木瓜

大黃等分糊丸

耑治腳氣攻

腳氣湯

草薢五錢牛膝各二錢

茯苓秦艽

桑枝各三錢澤泄各錢半

苦木薏仁

檳榔湯

檳榔木香

茴香

等分加童便

薑汁溫服

香蘇散

香附三兩薑三片

蘇梗二兩葱白連根二莖

陳皮一兩甘草五錢

木通散

木通紫蘇

猪苓各二兩


桑白皮薑汁炒水煎

赤苓

各二兩

每服五錢

葱薑水煎



腳氣

湯氏腳氣宿恙不離溼熱恰逢梅夏陰雨濕寒狼戾黃食少不
飢藥忌渴膩脾惡溼也再以衰年肝腎虛寒氣滯足腫帶下腰
痛季腸目左注右不能仰乃陽經寒凝氣滯治從絡脈佐理
脚氣做古飲子法獨藥精投熟地一錢沙苑子一錢水杞子一錢各
牛膝一錢炒歸鬚酒杵各一錢砂仁壳八分茯苓薏苡生杜仲桑寄生續
斷各二錢橘稍根鬚兩半一劑痛止那劑食進多服並腳氣不數發

鶴膝風論治 膝遊風 膝眼毒 膝癰附

膝者筋之府。屈伸不利。兩膝壅腫。內外皆痛。腿細膝粗。如鶴之膝。是名鶴膝風。多由足三陰經虧損。風邪乘之。使然。治在活血榮筋。兼理風溼。十全大補湯加杜仲。或隔蒜灸內側。牛膝丸活鶴活。初起漫腫不紅。屈伸不利。用陳芥子研細。葱服大防風湯切忌針刺。薄汁和白蜜調塗。一伏時。患上起泡泡乾皮脫。自愈。若寒熱齊作。五積交加散。加烏藥。薊蠶。若皮色不變。大腿通腫。神散。若無根虛火。倏忽發熱。十全大補湯。血虛發熱面赤。脈大而渴。當歸湯。若侵水溼。蒸膝湯。食少面黃。六君子湯。中氣不足。補中益氣湯。屈伸不利。丹。活絡湯。成膿潰爛。大防風湯。膿清肌肉不生。或頭暈吐痰。八味地黃丸。加鹿茸。牛膝。山腳軟。

漸成鶴膝。獨活寄生湯。但一膝引痛。上下不甚腫而微紅者。名膝遊風。防風通聖散加木瓜。牛膝。或換骨丹。或膝兩旁腫痛。憎寒壯熱。膿處手不可近者。名膝眼毒。勝金丹。仙方活命飲加牛膝。或膝蓋上腫痛。亦發寒熱。名膝癰。治同上。

醫通曰。婦人鶴膝風。因鬱怒致損肝脾。而爲風邪所襲。或先肢體

筋攣。膝漸大。腿漸細。如鶴膝狀。其腫高赤痛者易治。漫腫不紅痛

者難治。二三月潰而膿稠者易治。半載後潰而膿清者難治。誤用

攻伐。復傷元氣。尤爲難治。宜固元氣爲主。其食少體倦。六君子湯。肺熱

內熱。寒熱往來。逍遙散。發熱惡寒。十全大補。悸悸少寐。歸脾湯。月經過期。

補中益氣湯。月經先期。加味逍遙散。腎陰虛弱。黃丸。凡潰後宜大補脾胃。

若膿出反痛。或寒熱煩渴。皆屬氣血虧損。治以培補爲宜。湯入珍

小兒鶴膝風。多因先天腎氣衰薄。陰寒凝聚於腰膝。古方以六味
補腎水。以鹿茸補命火。以牛膝引至骨節而北裏。此治本良法也。

喻嘉言曰。鶴膝風。卽風寒溼之痺於膝者也。如膝骨日大。上下肌肉日枯。且未可先治其膝。宜養氣血使肌肉漸榮。再治其膝可也。此與治偏枯之症。大同小異。急溉其未枯者。使氣血流行而復榮。倘不知此。但用防風等散風之藥。鮮有不全枯者。故治鶴膝而急攻其痺。必并其足痿而不用矣。

附 方

溫補
溫 十全大補湯

見一卷中風

大防風湯

首川芎各七分半

地黃洗活

芍藥杜仲人參牛膝各一錢

防風各一錢 阳子
蜜草各

五分白朮錢半

薑、棗見一卷溼

加減五積散見一卷溼

神效散人參二錢歸芍地朮附羌防
杜仲牛膝甘草各一錢薑三片

當歸補血湯當歸黃耆

六味丸見一卷中風

八益龜丸二兩半
龜板各一兩半
黃藥五錢粥丸每五
人參二錢歸芍地朮附羌防
杜仲牛膝甘草各一錢薑三片

二妙散見一卷溫

換骨丹當歸一兩虎腰骨酥炙一具羌防
蘇各二兩秦艽牛膝歸沙杞子油松節
各五兩白芷根八兩蒼朮四兩龜板一兩用無灰
酒一罈浸服盡將藥晒乾研末糊丸酒下
散膝湯黃耆五兩防風三錢肉桂五錢茯苓一兩
水煎服取汗

溼風熱溼熱陽陰血補腫退散溫

淫風

蒸藤湯

生薑八兩 石斛

薏苡各二兩

肉桂二錢

水煎二碗先服一碗覆被取汗

再服汗透三劑全愈

水

金

六君子湯

見一卷中風

補中益氣湯

見一卷中風

活絡丹

見本卷癆

獨活寄生湯

見一卷溼

防風通聖散

見本卷癆風

勝金丹

白砒製 蕁香各五分
乳沒 血竭各錢半

蟾酥一錢

雄黃

辰砂

金蠍

天龍

甲片各三

錢砂糖調

五錢 葱白酒送下

爲末 每三

仙方活命飲

甲片

貝母 防芷

草

赤芍

歸尾

花粉

銀花各三分

乳

沒各一錢

水酒各半煎

補神安蒸除

卷之三

逍遙散

見一卷火

歸脾丸

見二卷勞瘵

八珍湯

見一卷中風

破傷風論治

破傷溼

破傷火附

凡金瘡跌撲損破皮肉及瘡瘍潰後切忌當風用扇若爲風邪所乘皆能傳入經絡名破傷風其症寒熱間作牙關微緊卽宜威靈頭蒜一枚同爛搗甚則發痉口噤項強體直殺人木爲末三錢獨熟酒冲服汗出愈。或用生蠔二兩半切剝如泥入花椒一兩同酒炒熟再入酒二盞熱服少頃通身汗出神效。其破傷重亡血多筋絡失榮賊風易襲經所謂風邪乘虛入之也此爲風虛邪宜桂枝湯合當歸補血湯若因營熱煽風瘡勢焮腫河間所謂熱甚風搏併於經絡也此爲風火邪當歸地黃湯。夫傷風法當疏表然不宜峻用汗劑者仲景謂瘡家不可發汗汗之則變瘡故破傷症輕者但用葱白香白芷苦榔鰣鯉丸麻杏桂尾丸重者亦用本方加防風遠志甚則用萬靈丹煎桂角鰣鯉湯下。

若嘔逆不食。係風引邪毒攻心。內用護心散。外用葱熨法。大便不通。但用蜜煎導。症勢稍退。卽宜保元湯。仍加遠解散。餘毒如久不合口。瘡毒內蘊。熬散數服。日調下。卽用此。倘瘡勢紅腫。用杏仁泥和白麵。全蠍散。或大蠍蛇散。水調敷腫處。卽消如身冷。牙噤。腰脊反張。四肢強直。急服蛤散。擦牙。吐出痰涎。立甦。如服後不解。邪漸入裏。發搖目直視。二便秘。用龍丸。其背後搖者。太陽也。爲在表。太陽經行身後。背後搖。如角弓反張。無汗。急汗之。防風湯。尤味羌活湯。小續命湯。汗過多止之。防風當歸湯。身前搖者。陽明也。爲人裏。陽明經行身前。身前搖。如頭低視。下手足牽引。急下之。先用黃湯二服。後用大芎黃湯。下之。兩旁搖者。少陽也。爲半表半裏。少陽經行身側。兩旁。或左右一足搖。宜和之。小柴胡湯。或防風通聖散。加減此。河間法也。其但言三陽。不

及三陰者。謂風邪傳入三陰。其症必危。惟天靈蓋煅末一錢。鮫鯉湯送下。若少腹滿自利口燥咽乾舌捲囊縮額上珠汗不流肢體痛極不在傷處終爲死候。

凡痛治破傷風。宜曹氏秘方荆芥黃蠅魚螺各五錢。艾葉三片無灰酒一碗重湯煮一炷香熱飲。汗出愈。若發癰。宜鶲病久衰弱。宜主調營。四物湯加防風白芷細辛。瘡瘍風邪攻注。身痛攀急。羌活防風湯加地骨皮荆芥穗如破傷風。腫脹不透出。用王眞散薑汁調敷。又或用湯淋洗。溼氣侵入。瘡口流膿。其人昏迷沈重者名破傷溼。先用除溼湯。後服白朮散。若艾灸火烘火氣逼入。瘡口腫赤。其人煩躁發熱者。名破傷火。小草黃湯加薄荷。黑山脈酒炒黃連。

醫鑑曰。諸瘡欲變癰。宜急風散。防風當歸散。亡血多成瘡。

宜當歸地黃湯。

破傷風脈候

破傷風脈浮而無力。太陽也。長而有力。陽明也。浮而弦者。少陽也。正傳洪數者。傷火。芤細者。傷溼。虛細而濶者。皆不治。

附方

桂枝湯見四卷瘧

當歸補血湯

黃耆

當歸

當歸地黃湯

地黃

當歸

芍藥

防風

芷

藁本

各一錢

葱白香豉湯

見一卷溫

萬靈丹

草烏

首烏

荆芥

防風

辛夷

石斛

茅术

麻黄

天麻

川烏

通表散熱營虛血傷

護心散

研細
早暮各服一兩
大葱三錢
水下

乳香一錢
辰砂一錢
甘草各一錢

葱熨法
大葱一握隔湯蒸熟以線索切平其底乘熱熨背冷

即更換得微汗爲度明日再熨

蜜煎導
用蜜熬捏成如棗核納肚內

保元湯

見一卷火

玉真散

防風 南星

等分爲末每服一錢

筒汁和酒調
再加白芷

天

麻 羌活

白附子 等分杵末

調敷瘡口名玉真散
二錢熱酒童便下二服效

打傷欲死唯是心頭溫者用藥末

二錢熱酒童便下二服效

全蠍散
蠍尾七个爲末熱酒調服日三次 凡破傷風非此

不除

大蜈蚣散

蜈蚣二條魚鱠炒
錢爲末每服二錢

左蟠龍卽鵝糞炒
防風湯下

小蜈蚣散

蜈蚣一條全蟬二个炒研

擦牙出涎 治口

左龍丸

左蟠龍卽鵝糞炒
黃一錢

天麻二錢 飯糊丸
治口

風去入裏

風寒

風寒

五丸溫酒下日三服如症重每藥末一錢飯糊中加入
巴豆霜五厘每服中加一丸漸加至十九以利爲度痛愈
即止一方有

大蜈蚣二條

防風湯

防 菖 羌

獨各一錢二分半

水煎調蜈蚣散

九味羌活湯

羌活 芎 芍 芍 半 防風

茅木各一錢 淬辛五分
地各八分 炙草六分 茴白

二莖 蔡三片

小續命湯見一卷中風

防風當歸散

防

歸 菖

地各一錢半

白朮防風湯

朮

耆各二錢

地各一錢半

小芩黃湯

川芎 香豉四合

黃芩各一錢半

炙草一錢

葱白四莖

大芩黃湯

即小芩黃去甘草

水煎半

加酒炒大黃三錢

羌活錢

小柴胡湯

見一卷溫

防風通聖散

見本卷病風

曹氏秘方

荆芥一兩 藥蠍魚鱠各五錢 艾葉三片 無灰酒一碗 重湯煮一炷 香熱飲汗出愈

蠲癰湯

羌獨防杏地榆

四物湯

地芍歸芍

羌活防風湯

羌防芍歸草藁本各一錢

地榆

細辛各五分

硃砂指甲散

硃砂南星薑製獨活各二錢 人手指甲

六錢燒存性

爲末分三服酒下

除溼湯

見一卷溼

白朮膏

一味生白朮熬

急風散

麝香一字辰砂一兩生黑丑二錢牛膝酒下

雨半生半焙醋淬

每末五分酒下

破傷風

類證治裁卷之五終