

醫
學
三
字
經

醫學三字經卷四

閩吳航陳念祖修園著

男元豹道彪古愚全校
元犀道照靈石

眩暈方

一味大黃散 鹿茸酒

二方見上三字經小註

加味左歸飲 治腎虛頭痛如神並治眩暈
目痛

熟地

七八錢

山茱萸

懷山藥

茯苓

枸杞

各三錢

肉蓯蓉

酒洗切片三四錢

細辛

炙草

各一錢

川芎

二錢

水三杯煎八分溫服

正元丹

秘旨

治命門火衰不能生土吐利厥冷

有時陰火上衝則頭面赤熱眩暈惡心濁

氣逆滿則胸脇刺痛臍肚脹急

人參

三兩用附子一兩煮汁收入去附子

黃耆

一兩五錢用川芎一

兩酒煮收
入去川芎
山藥一兩用乾薑三錢
煎汁收去
白朮二兩用陳皮五錢
茯苓二兩用肉
煎汁收入晒乾
去陳皮
甘草一兩五錢用烏藥
勿見火去桂
藥烏

右六味除茯苓文武火緩緩焙乾勿炒傷藥性杵為散每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚擘煎數沸入盞一捻和滓調服服後飲熱酒一杯以助藥力

嘔噦吐方

二陳湯

半夏

二錢

陳皮

一錢

茯苓

三錢

炙草

八分

加生薑三片水二杯煎八分服○加減法

詳三字經小註

小柴胡湯

方見傷寒

吳茱萸湯

方見隔食反胃

大黃甘草湯

金匱

治食已即吐

大黃

五錢

甘草

一錢五分

水二杯煎八分服

乾薑黃連黃芩人參湯仲景凡嘔家夾熱不利

於香砂橘半者服此如神

乾薑

不炒

黃芩

黃連

人參各一錢五分

水一杯半煎七分服

進退黃連湯

黃連

薑汁炒

乾薑炮

人參人乳拌蒸一錢五分

桂枝

錢一

半夏

薑製一錢五分

大棗

二枚

進法用本方七味俱不製水三茶杯煎一杯溫服退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味製熟煎服法同但空朝服崔氏八味丸三錢半飢服煎劑耳

癲狂癩方

滾痰丸

王隱君

治一切實痰異症孕婦忌服

青礞石

三兩研如米大同煆硝三兩入新磁罐內封固以鉄線札之外以鹽

泥封固煨過研
末水飛二兩實

沉香一兩
另研

川大黃酒
蒸

黃芩

炒各八兩

共為末水泛為丸菜豆大每服一錢至二錢食遠沸湯下

生鐵洛飲

治狂妄不避親疏

鐵洛

一盞用水六杯煮取三杯入下項藥

石膏

一兩龍齒

茯苓

防風各七分

黑參

秦艸

各五錢

鐵洛水三杯煎一杯服一日兩服

當歸承氣湯

秘傳方

治男婦痰迷心竅踰牆越

壁胡言亂走

歸尾兩

大黃酒洗

芒硝

枳實

厚朴

各五錢

炙草三錢

水二杯煎八分服

溫膽湯

駱氏內經拾遺云癲狂之由皆是

膽涎沃心故神不守舍。理宜溫膽亦治癩

病

即二陳湯加枳實鮮竹茹各二錢或調下
飛礬分半

當歸龍薈丸 治肝經實火大便秘結小便
澀滯或胸膈疼痛陰囊腫脹凡屬肝經實
火皆宜用之

葉天士云動怒驚觸致五志陽越莫制狂
亂不避親疎非苦降之藥未能清爽其神
識也

當歸 龍膽草 梔子仁 黃栢 黃連

黃芩

各一兩

大黃

蘆薈

青黛

各五錢

木香

二錢五分

麝香

五分另研

共為末神麩糊丸每服二十九薑湯下

丹礬丸

醫通

治五癩

黃丹

一兩

白礬

二兩

二味入銀礮中煨通紅為末入臘茶一兩不落水猪心血為丸硃砂為衣每服三十

丸茶清下久服其涎自便出半月後更以

安神藥調之

按猪心血不粘宜加煉蜜少許合搗

磁硃丸

治癩狂癇如神

磁石

二兩

硃砂

一兩

六神麩

三兩生研

共研為末另以六神麩一兩水和作餅煮浮入煎藥加煉蜜為丸如麻子大沸湯下二錢○解見時方歌括

五淋癢閉赤白濁遺精方

五淋湯

赤茯苓

三錢

白芍

山楡

各二錢

當歸

細甘草

各一分四分

錢

加燈心十四寸水煎服。○解見時方歌括

滋腎丸

又名通關丸治小便點滴不通及

治衝脉上逆喘呃等證

黃栢

知母

各一兩

肉桂

一錢

共研末水泛丸桐子大陰乾每服三錢淡

鹽湯下

補中益氣湯

方見中風

治一切氣虛下陷

草薺分清飲

治白濁

川草薺

錢四

益智仁

烏藥

各一錢五分

石菖蒲

錢一

一本加甘草稍一錢五分茯苓二錢

水二杯煎八分入鹽一捻服一日兩服

四君子湯

方見時方歌括

歌曰白濁多因心氣虛不

應只作腎虛醫四君子湯加遠志一服之
間見效奇

龍膽瀉肝湯 治脇痛口苦耳聾筋疼陰濕

熱癢陰腫白濁溲血

龍膽草分三

黃芩

梔子

澤瀉

各一錢

木通

車前子

各五分

當歸

甘草

生地

各三分

柴胡

一錢

水一杯半煎八分服

五倍子丸

治遺精固脫之方

五倍子

青鹽煮
乾焙

茯苓

各二兩

為末煉蜜丸桐子大每服二錢鹽湯下日

兩服

妙香散

懷山藥

二兩

茯苓

茯神

龍骨

遠志

人參

各一兩

桔梗

五錢

木香

三錢

甘草

一兩

麝香

一錢

硃砂

二錢

共為末每服三錢蓮子湯調下

疝氣方

五苓散

仲景

本方治太陽證身熱口渴小便少

○今變其分兩借用治疝

猪苓

澤瀉

茯苓

各二錢

肉桂

一錢

白朮

四錢

水三杯煎八分服○加木通川練子各一

錢五分橘核三錢木香一錢

三層茴香丸

治一切疝氣如神

大茴香

五錢同鹽五錢
炒和鹽秤一兩

川練子

一兩

沙參

木香

各一兩

為末米糊丸如桐子大每服三錢空心温
酒下或鹽湯下纔服盡接第二料

又照前方加葶撥一兩檳榔五錢共五兩半
依前丸服法若未愈再服第三料

又照前第二方加茯苓四兩附子炮一兩共

前八味重十兩九服如前雖三十年之久
大如栲栳皆可消散神效。

千金翼洗方 治丈夫陰腫如斗核中痛

雄黃末

兩一

礬石

兩二

甘草

錢七

水五杯煎二杯洗

消渴方

白虎湯 調胃承氣湯 理中丸 烏梅丸

四方俱
見湯寒

腎氣丸

六味湯

炙甘草湯

三方俱見虛勞

麥門冬湯

麥門冬

四錢

半夏

一分錢

人參

二錢

粳米

四錢

炙甘草

二錢

大棗

二枚

水二杯煎八分温服

麻仁丸

火麻仁

二兩

芍藥

枳實

各五錢

大黃

厚朴

各一兩

研末煉蜜丸如桐子大每服十九米飲下
以知為度

痰飲方

王_二符_一齋化痰丸

治津液為火薰蒸凝濁鬱

結成痰根深蒂固以此緩治之

香附童便侵

橘紅一兩

瓜蒌仁一兩

黃芩酒炒

天門冬

海粉各一兩

青黛三錢

芒硝三錢

桔梗五錢

連翹五錢

另研

共為研末煉蜜入生薑汁少許為丸如彈
子大每用一九噙化或為小九薑湯送下
二錢

苓桂朮甘湯

金匱

治胸脇支滿目眩○并治飲

邪阻滯心肺之陽令呼氣短

腎氣丸

治飲邪阻滯肝腎之陰令吸氣短

二方俱見喘證方

甘遂半夏湯

金匱

治飲邪流連不去心下堅滿

甘遂

大者三枚

半夏

湯洗七次十二枚以水一中杯煮取半杯去滓

芍藥

五枚約今之三錢

甘草

如指一錢三分今之一錢三分

水二杯煎六分去滓入蜜半盞再煎至八

分服

程氏曰留者行之用甘遂以決水飲結者散之用半夏以散痰飲甘遂之性直達恐其過於行水緩以甘草白蜜之甘堅以芍藥之苦雖甘草甘遂相反而實以相使此

苦堅甘緩約之之法也。靈樞經曰約方猶約囊。其斯之謂與。尤氏曰甘草與甘遂相反而同用之者。蓋欲其一戰而留飲。盡去。因相激而相成也。芍藥白蜜不特安中亦緩毒藥耳。

十棗湯

金匱

治懸飲內痛。亦治支飲。

方見腹痛

大青龍湯

金匱

治溢飲之病。屬經表屬熱者宜

此涼發之

小青龍湯

金

治溢飲之病屬經表屬寒者宜

此溫發之

已上一方
俱見傷寒

木防已湯

金

人膈中清虛如太空然支飲之

氣乘之則滿喘而痞堅面色黧黑脉亦沉
緊得之數十日醫者吐之下之俱不愈宜
以此湯開三焦之結通上下之氣

木防已

三錢

石膏

六錢

桂枝

二錢

人參

四錢

水二杯煎八分溫服

木防已湯去石膏加茯苓芒硝湯金匱前方有

人參吐下後水邪因虛而結者服之即愈。

若水邪實結者雖愈而三日復發又與前

方不應者故用此湯去石膏之寒加茯苓

直輸水道芒硝峻開堅結也。○又此方與

小青龍湯治吼喘病甚效。

木防已錢二

桂枝錢二

茯苓錢四

人參錢四

芒硝錢五分

水二杯半煎七分去滓入芒硝微煎温服
微利自愈

澤瀉湯

金匱

支飲雖不中正而迫近於心飲邪

上乘清陽之位其人苦冒眩胃者昏冒而
神不清如有物冒蔽之也眩者目旋轉而
乍見眩黑也宜此湯

澤瀉

五錢

白朮

二錢

水二杯煎七分温服

厚朴大黃湯

金匱

治支飲胸滿

支飲原不中正飲盛則偏者不

偏故直驅之從大便出。

厚朴

錢二

大黃

錢三

枳實

一分錢五分

水二杯煎七分溫服

葶藶大棗瀉肺湯

金匱

治支飲不得息

方見氣喘

小半夏湯

金匱

治心下支飲嘔而不渴

半夏

錢四

生薑

錢八

水二杯煎八分温服

已椒薤黃丸

金匱

治腹滿口舌乾燥腸間有水氣

防已

椒目

薤薤熬

大黃

各一兩

共為細末煉蜜丸如梧子大先飲食服一
九日三服稍增之口中有津液渴者加芒
硝半兩

程氏曰防已椒目導飲於前清者從小便
而出大黃薤薤推飲於後濁者從大便而

下。此前後分消則腹滿減而水飲行。脾氣轉而津液生矣。

小半夏加茯苓湯金匱治卒然嘔吐心下痞

膈間有水氣眩悸者

即小半夏湯加茯苓四錢

五苓散金匱治臍下悸吐涎沫而顛眩此水也

澤瀉一兩

猪苓

茯苓

白朮

各十八

六枚
十黍為一株約今四分一釐七毫

桂枝半兩

為末白飲和服方寸匕日三服多煖水汗

出愈

六銖為一分即今之二錢半也澤瀉

應六銖為一分即今之二錢半也澤瀉

應七錢五分也方寸匕者匕即匙也作

是正方一寸六約八九分也余用二錢

愚按臍下動氣去木加桂理中丸法也今

因吐涎沫是水氣盛必得苦燥之白朮方

能制水顛眩是土中濕氣化為陰霾上彌

清竅必得溫燥之白朮方能勝濕證有煎

見法須變通

附方外臺茯苓飲 治積飲既去而虛氣塞滿

其中不能進食此證最多此方最妙

茯苓

人參

白朮

各一錢五分

枳實

一錢

橘皮

一錢二分五厘

生薑

二錢

水二杯煎七分服一日三服

徐忠可曰俗謂陳皮減參力此不唯陳皮

且加枳實之多補瀉並行何其妙也

三因白散

滑石

五錢

半夏

三錢

附子

二錢

炮

共研末每服五錢加生薑三片蜜三錢水
一杯半煎七分服

傷寒方

太陽

桂枝湯

桂枝

芍藥

各三錢

甘草

二錢

生薑

三錢

切片

大棗

四枚

水二杯煎八分溫服服後少頃飲粥一杯
以助藥力溫覆微似汗若一服病止不必
再服若病重者一日夜作三服

麻黃湯

麻黃

三錢去根節

桂枝

二錢

杏仁

去皮尖二枚

甘草

一錢

水三杯先煮麻黃至二杯吹去上沫納諸

藥煎八分溫服不須飲粥餘將息如前法

大青龍湯

麻黃

六錢去根節

桂枝

二錢

甘草

二錢炙

杏仁

去皮尖

生薑

三錢切片

大棗

四枚

石膏

以碎

十二枚
棉裹四錢五分

水四杯先煮麻黃至二杯半去上沫納諸

藥再煮八分溫服溫覆取微似汗汗出多

者以溫粉撲之

白朮根牡蠣龍骨研末

若汗多亡陽

者以真武湯救之

小青龍湯

麻黃

去根節

白芍

乾薑炒不

甘草

桂枝

各二錢

半夏

三錢

五味子

一錢

細辛

八分

水三杯半先煮麻黃至二杯半去沫納諸藥煎八分溫服○若渴者去半夏加栝樓根二錢○若噎者去麻黃加附子一錢五分○小便不利小腹痛滿去麻黃加茯苓四錢○若

喘者去麻黃加杏仁二十一枚。○按論云
若微利者去麻黃加羌活。今羌活不常用
時法用茯苓錢四代之。即指苓澤瀉亦可代
也。但行道人當於方後註明

桂枝加葛根湯

即桂枝湯加葛根

錢四

水三杯半先煮葛根至二杯半吹去沫入
諸藥煎至八分溫服不須啜粥

葛根湯

葛根

錢四

麻黃

錢三

生薑

錢二

甘草

錢二

桂枝

錢二

大棗

枚四

芍藥

錢二

水三鐘半先煮麻黃葛根至二杯去沫入諸藥至八分溫服微似汗不須啜粥

陽明

白虎湯

石膏

八錢碎

知母

錢三

炙甘草

錢一

粳米

三字

卷四

九

錢四
水三杯煎一杯服

調胃承氣湯

大黃四錢清酒潤

炙草二錢

芒硝三錢

水二杯半先煮大黃甘草取一杯去滓入芒硝微煮令沸少少溫服之

小承氣湯

大黃四錢

厚朴

枳實各二錢

水二杯煎八分服初服當更衣不爾者再
煮服若更衣勿服

大承氣湯

大黃

二錢酒潤

厚朴

四錢

枳實

芒硝

各二錢

水三杯先煮枳實厚朴至一杯半去滓納
大黃煮一杯去滓納芒硝微火煮一二沸
服得下勿再服

少陽

小柴胡湯

柴胡

四錢

人參

黃芩

炙草

生薑

各

錢五

半夏

錢二

大棗

枚二

水三鐘煎一鐘去滓再煎八分溫服一日

夜作三服

胸中煩而不嘔者去半夏人參加括樓二錢○渴者去半夏加人參七分括樓根二錢○腹中痛者去黃芩加芍藥一錢半○

脇下痞鞭去大棗加牡蠣二錢○心下悸
小便不利者去黃芩加茯苓二錢○不渴
外有微熱者去人參加桂枝一錢五分濕
覆取微似汗愈○欬者去人參大棗生薑
加五味子一錢乾薑一錢五分

大柴胡湯

柴胡

四錢

半夏

二錢

黃芩

芍藥

枳實

各錢

生薑

二錢五分

大棗

二粒

一木有大黃五分

水三鐘煎八分溫服一日夜作三服

太陰

理中丸湯

人參 白朮 乾薑 甘草

各三兩

共研末蜜丸如雞子黃大研碎以沸湯服
一九日三四服服後啜熱粥以腹熱為度
或用各三錢水三鐘煎八分溫服服後啜

熱粥○若臍上築者去朮加桂○吐多者
去朮加生薑二錢下多者還用朮○悸者
加茯苓渴欲飲水者加朮○腹痛者加人
參○寒者加乾薑○腹滿者去朮加附子
○服湯後如食頃飲熱粥微自溫勿揭衣
被

四逆湯

甘草

四錢

乾薑

三錢

附子

二錢
生用

水三鐘煎八分溫服

通脉四逆加入尿猪膽湯

乾薑

錢六

甘草

錢四

附子

錢二
生用

水三鐘煎八分加猪膽汁一湯匙入尿半

湯匙溫服

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑

各三錢

大棗

四枚

芍藥

六錢

炙草

錢二

水三杯煎一杯服

桂枝加大黃湯

桂枝

生薑

各三錢

芍藥

六錢

炙草

二錢

大黃

七分

大棗

四枚

水三杯煎八分服

少陰

麻黃附子細辛湯

麻黃

去根節

細辛

各三錢

附子

一錢五分

水三鐘先煮麻黃至二鐘去沫入諸藥煎七分溫服

麻黃附子甘草湯

麻黃

去根

甘草

各三錢

附子

一分

煎法同上

通脈四逆湯

乾薑

六錢

炙草

四錢

附子

二錢生

水三杯煎八分溫服

白通湯

乾薑

三錢

附子

三錢
生用

葱白

二根

水三杯煎八分溫服

吳茱萸湯

吳茱萸

三錢
湯泡

人參

一錢
五分

大棗

四枚

生薑

六錢

水煎服

猪苓湯

三字經

卷四

五

猪苓

伏苓

澤瀉

滑石

阿膠

各三錢

水一杯先煎四味至一杯去滓入膠煎化服

黃連阿膠雞子黃湯

黃連

四錢

黃芩

一錢

芍藥

二錢

阿膠

五錢

雞子黃

一枚

水二杯半煎一杯半去滓入膠烺盡小冷入雞子黃攪令相得溫服一日三服

大承氣湯

方見陽明

厥陰

烏梅丸

烏梅

九十
三枚

細辛

六錢

乾薑

一斤
四兩

當歸

四錢

黃連

一斤
六錢

附子

六錢
炮

蜀椒

四兩
炒

桂枝

人參

黃柏

各六錢

各另研末合篩之以苦酒浸烏梅一宿去核飯上蒸之搗成泥入煉蜜共搗千下丸

如梧子大先飲食白飲服十九日三服漸
加至二十九

當歸四逆湯

當歸

桂枝

白芍

各三錢

甘草

炙

木通

細辛

各二錢

大棗

八粒又一粒取
三分之一等

水三杯煎八分溫服○寒氣盛者加吳茱

萸二錢半生薑八錢以水二杯清酒二杯

煮取一杯半溫分二服

白頭翁湯

白頭翁

錢一

黃連

黃蘗

秦皮

各一錢五分

水二杯煎八分溫服

餘詳於時方妙用附錄傷寒門

瘟疫方

人參敗毒散

方見痢疾

防風通聖散

方見中風

藿香正氣散

治外受四時不正之氣內停

飲食頭痛寒熱或霍亂吐瀉或作瘧疾

藿香 白芷 大腹皮 紫蘓 茯苓 各三

兩

陳皮

白朮

厚朴

半夏麴

桔梗

各二兩

甘草

一兩

每服五錢加薑棗煎

神聖辟瘟丹留傳在世間正元焚一炷四季

保平安

此歌出廣
久香棠函

羌活

獨活

白芷

香附

大黃

甘松

三奈

赤箭

雄黃

各等分

蒼朮

倍用

右為末麩糊為丸彈子大黃丹為衣晒乾
正月初一侵晨焚一炷辟瘟

婦人科方

四物湯 統治婦人百病

當歸身

熟地

白芍

酒炒各三錢

川芎

一錢五分

水三杯煎八分服○加製香附二錢研碎
炙草一錢○加減詳三字經

歸脾湯

方見
虛勞

逍遙散

景治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之

源血氣日枯漸至經脉不調者

當歸

三錢

芍藥

一錢五分

熟地

五錢

棗仁

二錢

炒

茯神

一錢五分

遠志

五分

陳皮

八分

炙草

一錢

水三杯煎八分服○氣虛加人參○經滯

痛加香附

按方雖庸陋能滋陽明之原故從俗附錄之。地黄生用佳

當歸散

金匱

瘦而有火胎不安者宜此

當歸

黃芩

芍藥

芩藎

各一斤

白朮

半斤

共研末酒服方寸匕今用一錢日再服○
妊娠常服即易產胎無疾苦產後百病悉
主之。

白朮散

金匱

肥白有寒胎不安者此能養胎

白朮

川芎

川椒

牡蠣

為末酒服一錢匕今用一錢日三服夜一

服但苦痛。加芍藥。心下毒痛。加川芎。心煩吐痛。不食。加細辛。半夏。服之後。更以醋漿服之。復不解者。小麥汁服之。已後渴者。大麥汁服之。病雖愈。服勿置。

保生無憂散

婦人臨產先服一二劑。自然易生。或遇橫生。倒產。連日不生。服

二三劑

神效

當歸

一錢五分
酒洗

川貝母

一錢

黃耆

八分
生

艾葉

七分

酒芍

一錢二分

冬
日
一
錢

兔絲子

四分

厚朴薑汁炒

七分

荆芥穗

八分

枳殼

麩炒
六分

川芎

一錢
三分

羌活

甘草

各五
分

加生薑三片水二杯煎八分空心服

此方全用撐法當歸川芎白芍養血活血者也厚朴去瘀血者也用之撐開血脉俾惡露不致填塞羌活荆芥疏通太陽將背後一撐太陽經脉最長太陽治則諸經皆治枳殼疏理結氣將面前一撐俾胎氣歛

抑而無阻滯之虞。艾葉溫煖子宮，撐動子宮，則胞胎靈動。貝母兔絲最能滑胎順氣。將胎氣全體一撐大具天然活潑之趣矣。加黃耆者，所以撐扶元氣。元氣旺則轉動有力也。生薑通神明，去穢惡，散寒止嘔，所以撐扶正氣而安胃氣。甘草協和諸藥，俾其左宜右有，而全其撐法之神也。此方人多不得其解。程小齡註獨起，故全錄之。

加味歸芎湯

川芎

三錢

當歸身

五錢

龜板

三錢

生研

婦人生過男女頂門髮

燒如雞子大

雞

研

水三杯煎八分服如人行五里路即生

當歸補血湯

當歸

三錢

炙蒼

一兩

水煎服○加附子三錢神效或加桂一錢

失笑散

方見心腹痛

三字經

卷四

三

生化湯

當歸

五錢

川芎

二錢

乾薑

五分

桃仁

一錢

五分去
皮尖

甘草

一錢
炙

水二杯煎八分服。○產後風口噤角弓反
張者宜加荆芥穗三錢。○又方中風口噤
用華陀愈風散即荆芥穗一味焙為末勿
焦黑以童便和酒送下口噤藥不下者用
一兩零以童便煎好從鼻孔灌下

當歸生薑羊肉湯

方見心
腹痛

竹葉湯金匱治產後中風病瘕發熱面正赤喘

而頭痛

鮮竹葉

四十
九片

葛根

三
錢

防風

一
錢

桔梗

桂枝

人參

附子

炮

甘草

各
一
錢

大棗

五
枚

生薑

五
錢

水三杯煎八分溫服溫覆使汗出日夜作

三服○頭項強加附子五分前藥揚去沫嘔

者加半夏二錢

愚按自汗者去葛根加括樓根三錢附子五分○產後痙證十中只可救一除此方外無一善方

甘麥大棗湯

甘草

三錢

小麥

一兩六錢

大棗

十枚

水三杯煎一杯服日作三服

金匱方只錄五首餘見拙著金匱淺說金

匱讀內二書即欲梓行集隘不能盡登。

小兒科方

小兒無專方已上諸方折為小劑用之今兒科開口即曰食曰驚曰風曰疳所用之藥大抵以鈎藤秦艽防風羌活獨活天麻前胡全蝎殭蠶為祛風之品硃砂牛黃膽星石菖蒲天竺黃代赭石青黛赤芍金銀煎湯為定驚之品以山查神麴麥芽穀芽萊菔子枳殼厚

朴。檳。榔。草。果。為。消。食。之。品。以。蕪。荑。榧。子。史。君。子。螟。蛉。土。五。穀。蟲。為。治。疳。之。品。如。杏。仁。葶。藶。酒。苓。桑。白。皮。半。夏。麴。蘓。陳。皮。貝。母。天。花。粉。之。類。謂。為。通。用。調。氣。化。痰。之。善。藥。父。傳。子。師。傳。徒。其。端。方。皆。殺。人。之。具。也。錢。仲。陽。以。金。石。之。藥。為。倡。猶。有。一。二。方。近。道。處。至。鐵。鏡。朱。薇。湯。則。亂。道。甚。矣。近。日。兒。科。只。用。已。上。所。列。諸。藥。任。意。寫。來。造。孽。無。已。實。堪。痛。恨。

附錄

陰陽

識一字便可為醫說

客有問於余曰。醫之為道。乃古聖人洩天地之秘。奪造化之權。起死回生。非讀破萬卷書。參透事事物物之理者。不能。今非通儒而業此。亦能療人病。獲盛名。何也。余曰。天地間有理。有數。理可勝數。則有學問之醫。遠近崇之。

遂得以盡其活人之道。然仲景為醫中之聖。尚未見許於當時。觀傷寒論之序文可見。猶宣聖以素王老其身。天之意在萬世不在一時也。仲景之後。名賢輩出。類皆不得志於時。閉門著書。以為傳道之計。而喻嘉言。柯韻伯二先生書。尤感憤而為不亞之鳴。此理數之可言而不可言者矣。今之業醫者。無論不足為通儒。而求其識字者。則為良醫矣。無論其

識多字也。只求其識一字者。亦可以為良醫矣。客曰。此何字也。得毋所謂下字乎。余曰。亦其類耳。不必他求。即人字是也。人乃陰精陽氣合而成之者也。左為陽。左邊一ノ。陽之位也。右為陰。右邊一ノ。陰之位也。作書者遇ノ處。自然輕手揮之。陽主乎氣。輕清之象也。遇ノ處。自然重手頓之。陰主乎精。重濁之象也。兩畫不相離。陰陽互根之道也。兩畫各自位。

置陰陽對待之道也。入在左者不可使之右。入在右者不可使之左。陰陽不雜之道也。左入由重而輕。萬物生於水。即男女構精。萬物化生之義。由陰而陽也。右入由輕而重。形生於氣。即大哉乾元。乃統天。至哉坤元。乃順承天之義。陽統乎陰也。二者合之。則成人。合之之義。醫書謂之曰抱。周易名之曰交。交則為恭矣。試以形景淺言之。人之鼻下口上水清。

穴一名人中。取人身居乎天地中之義也。天
通於鼻。地氣通於口。天食入以五氣。鼻受
地食人以五味。口受之。穴居其中。故曰人中
自人中而上。目鼻耳皆而竅。自人中而下。
口與二便皆單竅。畫奇。上三畫偶而為陰。下三
畫奇而為陽。取地天之義。合成泰卦也。形景
主外。必合陰陽之象。而成人。況人之所以
生之理乎。人之為義大矣哉。子若遇醫者問
此一字。恐高車駟馬。詡詡以名醫自負者。亦

一字不識也。客聞予言亦大笑而去。

勝腑

十二官

靈蘭秘典論云。心者君主之官也。神明出焉。肺者相傅之官。治節出焉。肝者將軍之官。謀慮出焉。膽者中正之官。決斷出焉。膻中者臣使之官。喜樂出焉。脾胃者倉廩之官。五味出焉。大腸者傳道之官。變化出焉。小腸者受盛

之官。化物出焉。腎者作強之官。伎巧出焉。三焦者決瀆之官。水道出焉。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。按此以脾胃合為一官。恐錯簡耳。刺法補遺篇云。脾者諫議之官。知周出焉。胃者倉廩之官。五味出焉。採此補入方足十二官之數。

心說

心。火臟身之主。神明之舍也。小篆嘗言心字。

篆文只是一倒火字耳。蓋心火也不欲炎上。故顛倒之以見調燮之妙也。祝無功曰。庖氏一畫直豎之則為丨。左右倚之則為丿。為㇇。縮之則為、。曲之則為㇇。圓而神一丨。方以直。世間字變化浩繁。未有能外一丨。一、結構之者。獨心字欲動欲流。圓妙不居出之乎。一丨。一、之外。更索一字與作對。不得正以心者。新也。神明之官變化而日新也。

心主血脉。血脉日新。新新不停。則為平人。否則病矣。其合脉也。其榮色也。開竅於舌。

肝說

肝木臟。魂所藏也。肝者。木也。以其體狀有枝幹也。又位於東方。而主生氣。時醫昧其理。反云肝無補法。宜涼宜伐。只泥木尅土之一說。而不知後天八卦。配河圖之象。三八為木。居東。即後天震巽之位。巽上坤下。則為觀。易曰。

觀天之神道。而四時不忒。上坤下震。則為復。
易曰。復其見天地之心乎。為義大矣哉。其合

其象小也。開竅於目。

脾說

脾為土臟。藏意與智。居心肺之下。故從卑。又
脾者裨也。裨助胃氣以化穀也。經云。納穀者
昌。其在此乎。其合肉也。其榮唇也。開竅於口。

肺說

肺。金。臟。魄。所。藏。也。肺。者。沛。也。中。有。二。十。四。孔。分。布。清。濁。之。氣。以。行。於。諸。臟。使。沛。然。莫。禦。也。內。經。曰。肺。惡。寒。又。曰。形。寒。飲。冷。則。傷。肺。勿。只。守。火。尅。金。之。一。說。也。其合皮也。其榮毛也。開竅於鼻。

腎說

腎。水。臟。藏。精。與。志。華。元。化。謂。為。性。命。之。根。也。又。腎。者。任。也。主。骨。而。任。周。身。之。事。故。強。弱。係。之。甲。乙。經。曰。腎。者。引。也。能。引。氣。通。於。骨。髓。卮。

言曰腎者神也。妙萬物而言也。其合骨也。其榮髮也。開竅於二陰。

胃說

胃屬土。脾之腑也。為倉廩之官。五穀之府。故從田。田乃五穀所出。以為五穀之市也。又胃者衛也。水穀入胃。游溢精氣。上出於肺。暢達四肢。布護周身。足以衛外而為固也。

膽說

字從詹。不從旦。胆音檀。乃口脂澤也。與膽不同。今從胆者。乃傳襲之。

訛

膽屬木也。肝之腑也。為中正之官。中清之府。十一經皆取決於膽。人之勇怯邪正。於此膽之故字從詹。又膽者擔也。有膽量方足以擔天下之事。肝主仁。仁者不忍。故以膽斷。膽附於肝之短葉間。仁者必有勇也。

大腸小腸說

大腸傳道之官。變化出焉。屬金。為肺之腑。小

腸受盛之官。化物出焉。屬火。為心之腑。人納水穀。脾氣化而上升。腸則化而下降。蓋以腸者。暢也。所以暢達胃中之氣也。腸通暢則為平人。否則病矣。

三焦說

三焦者。上中下三焦之氣也。焦者。熱也。滿腔中熱氣。布濩能通。調水道也。為心包絡之腑。屬火。上焦不治。則水泛高原。中焦不治。則水

留中腕。下焦不治。則水亂二便。三焦氣治。則
脉絡通。而水道利。故曰決瀆之官。

手心主說

即心包絡

心乃五臟六腑之大主。其包絡為君主之外
衛。相火代君主而行事也。所以亦有主名。何
以繫之。以手。蓋以手厥陰之脉。出屬心包。手
三陽之脉。散絡心包。是手與心主合。故心包
絡稱手心主。五臟加此一臟實六臟也。

膀胱說

膀胱屬水。為腎之腑。經云。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。言其能得氣化而津液外出。滋潤於皮毛也。若水道之專司。則在三焦之腑。故經云。三焦者。決瀆之官。水道出焉。言其熱氣布濩。使水道下出。而為溺也。內經兩出字。一為外。出一為下。出。千古罕明其旨。茲特辨之。又膀胱者。旁也。胱者。光也。言氣。

海之元氣足則津液旁達不窮而肌湊皮毛皆因以光滑也。

命門說

越人指右腎為命門。諸家非之。余考內經太陽根於至陰。結於命門。命門者目也。靈樞結根篇衛氣篇素問陰陽離合論三說俱同。後讀黃庭經云。上有黃庭下闕元。後有幽門前命門。方悟其處。凡人受生之初。先天精氣聚

於臍下當關元氣海之間。其在女者可以手
捫而得。俗名產門。其在男者於泄精之時自
有關蘭知覺。此北門鎖鑰之司人之至命處
也。又考越人七衝門之說。謂飛門唇也。戶門
齒也。吸門會厭也。賁門胃之上口也。幽門大
倉下口也。關門小腸下口也。魄門肛門也。便
溺由氣化而出。又增溺竅為氣門。凡稱之曰
門。皆指出入之處而言也。况身形未生之初。

父母交會之際。男之施由此門而出。女之受由此門而入。及胎元既足。復由此門而生。故於八門之外。重之曰命門也。若夫督脉十四椎中。有命門之穴。是指外膪而言。如五臟六腑。膪一理。非謂命門即在此也。

經絡

經絡歌訣

汪認菴本草備要後附此。宜熟讀之。無庸再

著

四診

望色

春夏秋冬長夏時。
左肝右肺形呈類。
察位須知生者吉。
更於黥澤分新舊。

又有辨舌之法。舌上

無胎為在表。鮮紅為

青黃赤白黑隨宜。
心額腎頤鼻主脾。
審時若遇尅堪悲。
隱隱微黃是愈期。

火淡白為寒。

主無胎言。非謂胎之淡白也。

若有白胎為

半表半裏黃胎為在裏黑胎病入少陰多死胎潤有液為寒胎燥無液者為火舌上無胎如去油腰子為亡液不治。

聞聲

傳自性傳

肝怒聲呼心喜笑。

脾為思念發為歌。

肺金憂慮形為哭。

腎主呻吟恐亦多。

又法氣衰言微者為虛。氣盛言厲者為實。

語言首尾不相顧者神昏。狂言怒罵者實熱。痰聲漉漉者死。久病聞呃為胃絕。大抵語言聲音以不異於平時者吉。反者為凶。

問症

出景岳全書張心在增潤之

一問寒熱二問汗
五問飲食六問胸
九問舊病十問因
婦人尤必問經期

三問頭身四問便
七聾八渴但當辨
再兼服藥參機變
遲速閉崩皆可見

再添片語告兒科。

天花麻疹處占驗。

切脉

微茫指下最難知。條緒尋來悟治然。舊訣以
實弦緊洪為七表。以沉微遲緩濡伏弱滑為
八裏。以長短虛促結代牢動細為九道。李頻
湖李士材加入數草散三脉。其二十七字實
難摸索。必得其頭緒。如治絲者始有條不紊。
三部分持成定法。左寸外以候心。內以候臍。
胸中。左關外以候肝。內以候脾。右關外以候
胃。內以候脾。而尺外以候腎。內以候腹。腹者
大小二腸膀胱俱在其中。前以候後。後以候
後。上竟上者胸喉中事也。下竟下者小腹腰
背。

度。膝。脛。中。事。也。此。八。綱。易。見。是。良。規。浮。主。表。
照。內。經。分。配。之。法。八。綱。易。見。是。良。規。沉。主。裏。
二。脈。於。指。下。輕。重。辨。之。易。見。也。陰。主。寒。數。主。實。
熱。二。脈。以。息。之。至。數。分。之。易。見。也。大。主。邪。實。
細。主。正。虛。二。脈。以。形。之。測。窄。分。之。易。見。也。長。
主。素。盛。短。主。素。弱。二。脈。以。部。之。長。短。分。之。易。
見。也。以。此。八。脈。為。綱。其。餘。諸。脈。辨。其。兼。見。可。
也。置。而。弗。辨。亦。可。也。起。四。句。總。提。切。脈。之。大。
法。胃。資。水。穀。人。根。本。受。氣。於。胃。肺。土。具。冲。和。
脉。委。蛇。不。堅。直。而。和。緩。也。脉。得。中。土。之。生。臟。
氣。全。憑。生。剋。驗。審。臟。氣。之。生。剋。為。第。一。要。如。
洪。火。剋。金。也。反。是。脾。病。畏。弦。木。剋。土。也。肺。病。畏。
則。與。臟。氣。無。害。天。時。且。向。逆。從。窺。之。願。逆。

為第。三要。如春氣屬木。脈宜弦。夏氣屬火。脈宜洪。之類。反是。則與天氣不應。陽為浮。數形偏亢。仲景以浮大動滑數為陰。則沉遲勢更卑。仲景以沉澹弱弦澀為陰。脈之浮數形偏亢。仲景以浮大動滑數為陰。則沉遲勢更卑。仲景以沉澹弱弦澀為陰。脈之浮數形偏亢。仲景以浮大動滑數為陰。則沉遲勢更卑。仲景以沉澹弱弦澀為陰。脈之

三字經

卷四

五

脉經鋪敘總支離。病之名有萬。而脉象不過
之脉。無不可見。何能診脉。而且一病而數十種
何滿耶。脉書欺人之語。最不可聽。為
運氣

張飛疇運氣不足憑說

諺云不讀五運六氣檢方書何濟。所以稍涉醫理者。動以司運為務。曷知天元紀等篇本非素問原文。王氏取陰陽大論補入經中。後世以為古聖格言。孰敢非之。其實無關於

醫道也。况論中明言時有常位而氣無必然。猶諄諄詳論者。不過窮究其理而已。縱使勝復有常。而政分南北。四方有高下之殊。四序有非時之化。百步之內。晴雨不同。千里之外。寒暄各異。豈可以一定之法。而測非常之變耶。若熟之以資顧問。則可。苟奉為治病之法。則執一不通矣。