


簡明中西匯參醫學圖說

手厥陰心包絡圖



手厥陰心包絡經考正穴法 由胸走手九穴

天池 腋下三寸。乳後一寸。灸三壯。針二分。主胸中有聲。煩滿。頭痛。寒熱。

天泉 曲腋下二寸。舉臂取之。針六分。灸三壯。主目不明。惡風寒。心胸悶滿。

曲澤 肘內廉陷中。大筋內側橫紋中。動脈。灸三壯。針三分。主心痛。逆氣。嘔吐。

郄門 掌後去腕五寸。針三分。灸五壯。主嘔血。神氣不足。間使 掌後三寸。兩筋間陷中。針三分。灸七壯。主心胸驚

痛。中風昏危。婦人月水不調。小兒客忤。內關 掌後去腕二寸。兩筋間。與外關相抵。針五分。灸三

壯。主中風。心痛。目赤。

天陵。掌後骨下兩筋間陷中。針五分。灸三壯。主熱病。心熱。目赤。口乾。

勞宮。掌中央動脈。屈無名指取之。或言屈中指取之。今改正。屈兩指之中間。取之為準。針二分。灸三壯。主中風。善怒。熱病。脇痛。不可轉側。大小便出血。衄血不止。氣逆。煩欬。口中腥臭。口瘡。黃胆。目黃。小兒齕爛。

中衝。手中指端。去爪甲如韭葉陷中。心包絡脈所出。為井木。心包絡虛補之。針一分。灸一壯。主熱病。煩悶。汗不出。掌中熱。身如火。心痛。煩滿。舌強。

心包絡諸穴歌  
手厥陰心包之脈，計有九穴而終。自天池天泉為始，逕內澤卻門。  
而通間使行於內關，大陵近于掌宮。既由掌握抵於中衝。

心包絡圖

手厥陰心包絡經主治

包絡與膈中同一而異名也。包絡隨心君居於膈上代君行事。故名臣使之官。喜樂出焉。症如手中熱。心中大熱。面黃目赤。怔忡等。其實皆是心部之病。既詳言心經。亦不必更言包絡矣。觀者與心經合參可也。

手少陽三焦樹圖



手少陽三焦

經絡

大瀉

右刺

天井

會宗

陽池  
中清  
夜門  
關衝

手少陽三焦經考正穴法 由手走頭二十三穴

關衝 手小指次指外側去爪甲角如韭葉針一分灸一

壯主喉閉頭痛口乾目翳。

液門 小次指歧骨間陷中握拳取之針二分灸三壯主

驚悸咽腫臂痛頭痛目赤耳聾。

中渚 手小指次指本節後陷中在液門下一寸針三分。

灸三壯主熱病頭痛目翳咽腫臂痛。

陽池 手表腕上陷中從指本節直摸下至腕中心針二

分禁灸主煩渴寒熱瘡肩臂痛。

外關 腕後二寸兩骨間與內關相對針三分灸三壯主

耳聾臂硬。

支溝 腕後臂外三寸兩骨間陷中針二分灸二壯主熱



病。臂疲。肢痛。霍亂。口噤。產後血暈。

會宗。腕後三寸空中一寸。灸七壯。禁針。主五癩。肌膚痛。

耳聾。

三陽絡。臂上大交脈支滿上一寸。灸七壯。禁針。主瘡癰。

耳聾。嗜臥。四肢不欲搖動。

四瀆。在肘前五寸外廉陷中。灸三壯。針六分。主暴氣。耳

聾。齒痛。

天井。肘外大骨後肘上一寸。輔骨上兩筋又骨鑄中。屈

肘拱胸取之。灸三壯。針三分。主心痛。發逆。五癩。風痺。

耳聾。咽腫。項痛。

清冷淵。肘上二寸。伸肘舉臂取之。針二分。灸三壯。主肩

臂痛不能舉。

消滯。肩下臂外間脈。針肘分下。針一分。灸三壯。主風痺。  
項強。寒熱頭痛。

臑會。肩前廉。去肩頭各三寸。宛宛中。針七分。灸七壯。主  
臂痛。疲無力。肩腫引胛中痛。癭瘤。

肩髃。肩端。臑上陷中。針舉臂取之。針七分。灸三壯。主臂  
痛不能舉。

天髃。肩缺盆中。上有空起肉。上是穴。針八分。灸三壯。主  
胸中煩悶。肩臂痠痛。項急寒熱。

天牖。頸大筋外。缺盆上。天容後。天柱前。完骨下。髮際上。  
針一寸。禁灸。主耳目不明。頭痛而腫。項強。

翳風。耳後尖角陷中。按之引耳中痛。針七分。灸七壯。主  
耳聾。口眼喎斜。口噤不能言。

瘦脈。耳本後難足青絡脈。刺出血如小豆汁。針一分。灸

三壯。主頭風耳鳴。小兒嘔吐驚恐目不明。

顛息。耳後間青絡脈中。灸七壯。禁針出血。耳痛。喘息。

兒嘔吐涎沫。身熱頭痛等症。主之。

角掾。耳廓中間。開口有空。灸三壯。針八分。主目翳。齒痛。

頭項強。

絲竹空。眉後陷中。針三分。禁灸。主頭痛。目眩。風寒吐沫。

和髎。耳前銳髮下橫動脈中。是穴。針七分。灸三壯。主頭

痛。頭腫。鼻腫。多涕。

耳門。耳前起肉當耳缺者陷中。針三分。灸三壯。不可多

灸。主耳鳴出膿。生瘡。齒痛。唇強。

心 肺 肝 脾 胃 膽 大腸 小腸 膀胱 腎 三焦  
 心 膻中 肺 肝 脾 胃 膽 大腸 小腸 膀胱 腎 三焦  
 心 膻中 肺 肝 脾 胃 膽 大腸 小腸 膀胱 腎 三焦  
 心 膻中 肺 肝 脾 胃 膽 大腸 小腸 膀胱 腎 三焦

三焦腑圖



三焦諸穴歌  
 寸少陽三焦之脈于三穴之關，關衝夜門中渚湯池外關通達走湧會宗。  
 三陽絡四清天有清冷湖消滯，旋有軒相附天髻處天臑之下有。  
 風環頰脈居先，顛息定而月孫迎耳，然竹空而和膠柱為耳門畢經。  
 穴已全。

手少陽三焦經主治 三焦部藥隊

### 手少陽三焦經主治

三焦即人生三元之氣。運行臟腑空處是也。上焦心肺居之中。焦脾胃居之。下焦肝腎膀胱及大小腸居之。其氣總領臟腑。營衛經絡。內外上下左右各處。三焦通。則竟體調和矣。

三焦之病。業已分各臟腑。無可另立病名。

### 三焦部藥隊

補三焦猛將 淫羊藿 黃芪

瀉三焦猛將 青皮 木香

瀉三焦次將 柴胡 香附

溫三焦次將 白豆蔻 烏藥 胡荽

涼三焦次將 地骨皮 黃柏 山梔 麥冬 連翹

### 三焦說

三焦者。決瀆之官。水道出焉。自唐以來。議論紛紜。未識三焦果是何物。孰知即是人身之脂膜。所以行水也。西醫所謂胃之四面。皆有微絲血管。散走膜膈。達於連網油膜之中。而下入膀胱。連網者。即俗呼雞冠油。並周身之膜皆是也。網油連著膀胱。水因得從網油中滲入膀胱。故古人以三焦為決瀆之官。水道出焉之義也。三焦之根出於腎。兩腎之間。中有油膜一條。貫於脊骨。名曰命門。為相火所司。西醫名為精液總管之處。是為三焦之原。從是處發生板油。連胸前之膈。上循胸中。入心包絡。連肺系上咽。其外出為手背胸前之腠理。是為上焦。從板油連及雞冠油。著於小腸。其外出為腰腹之腠理。是為中焦。從板油連及網油。

後連大腸。前連膀胱。中為胞室。其外出為臀脰。少腹之腠。理是為下焦。人飲之水。由三焦而下膀胱。則決瀆通快。三焦不利。則水道閉。而病為腫脹。內經言上焦不治。水溢高。原中焦不治。水停中脘。下焦不治。水停膀胱。此其明證也。

足少陽膽經穴圖





足少陽膽經考正穴法

由頭走足四十四穴

瞳子膠

一名太陽。目外去眥五分。太陽少陽三脈之會。

灸三壯。針三分。主一切目疾。頭痛等症。

聽會

耳微前陷中。上關下一寸動脈宛宛中。張口得之。

針三分。灸五壯。十日後依前數灸。主耳鳴耳聾。齒痛中。

風口喎斜。手足不仁。

客主人

耳前骨上。張口取之。灸七壯。針二分。主口耳兩

症。及齒痛等症。

領厭

曲周下。灸三壯。針七分。主頭痛。耳目一切之症。

懸顙

曲周下。灸三壯。針七分。主頭目一切等症。

懸釐

曲周下。灸三壯。針三分。主面目赤腫。頭上諸症。

曲髻

耳上髮際曲陷中。鼓頰有空。針三分。灸七壯。主口

面頸項諸病。

率谷 耳上入髮際一寸半陷者宛宛中噤而取之針三分。

灸三壯。主頭腦上諸症及煩悶嘔吐。

天衝 耳後髮際二寸耳上如前三分灸七壯針三分。主

牙腫頭痛。

浮白 耳後入髮際一寸針三分灸七壯。主足不能行耳

聾耳鳴齒痛胸病喉痺。

竅陰 完骨下動搖有空針三分灸七壯。主頭面腫痛口

眼諸症。一名枕骨。後有竅陰同名異穴。

完骨 耳後入髮際四分針三分灸七壯。主一切頭項口

耳諸症。

本神 曲差一寸五分直耳上入髮際四分針三分灸七

壯。主頭目頭項風氣吐涎。

陽白 眉上一寸直瞳子針三分。灸三壯。主一切目疾。

臨泣 目上直入髮際五分陷中。今患人正睛取穴。針三分。主一切目疾。後一臨泣。同名異穴。

目窗 臨泣後寸半。針三分。灸五壯。主一切目疾。頭面浮腫等症。

正營 目窗後寸半。針三分。灸五壯。主頭面諸症及齒痛。

承靈 正營後一寸五分。主頭腦風氣鼻衄喘息不利。

腦空 承靈後一寸五分。俠玉枕骨下陷中。針五分。得氣。

即瀉。魏武帝患頭風心亂目眩。華陀針之立愈。

風池 耳後腦空中按之引於耳中。針七分。灸不及針。主

頭目諸症。

肩井 肩。上。陷。中。缺。盆。上。大。骨。前。一。寸。半。以。三。指。按。取。當  
中。指。下。陷。中。針。五。分。灸。五。壯。主。中。風。氣。塞。

淵液 一。名。泉。液。腋。下。三。寸。宛。宛。中。舉。臂。得。之。針。三。分。禁  
灸。主。寒。熱。

輒筋 一。名。神。光。腋。下。三。寸。復。前。一。寸。三。肋。端。橫。直。腋。骨  
旁。七。寸。五。分。平。直。兩。乳。側。卧。屈。上。足。取。之。灸。三。壯。針。六  
分。主。胸。滿。腹。熱。唾。吐。吞。酸。

日月 期。門。下。五。分。針。七。分。灸。五。壯。主。言。語。不。正。四。肢。不  
收。多。唾。

京門 監。骨。下。腰。中。季。肋。本。俠。脊。腎。之。募。灸。三。壯。針。七。分。  
主。腸。鳴。腰。腹。脹。痛。

帶脈 季。肋。下。一。寸。八。分。陷。中。臍。上。二。分。兩。旁。各。七。寸。半。

針六分。灸五壯。主腰腹。婦人腹痛。月事不正。

五樞 帶脈下三寸。水道旁五寸五分。針一分。灸五壯。主男女陰痛。

維道 章門下五寸三分。針八分。灸三壯。主嘔逆水腫。居髎 章門下八寸三分。監骨上陷中。針八分。灸三壯。主腹痛。及肩臂難舉。

環跳 髀樞中。側卧伸下足。屈上足。以右手摸穴。左搖撼取之。灸五十壯。針一寸。主風氣麻木不仁。

風市 膝上外廉兩筋中。以手着腿。中指盡處是穴。針五分。灸五壯。主中風麻木。

中膺 髀外膝上五寸。分肉間陷中。灸五壯。針五分。主寒氣客於分肉間。攻痛筋痺不仁。

陽陵泉 陽陵泉上三寸橫鼻外陷中針五分禁灸主風痺  
膝痛難伸。

陽陵泉 膝下一寸外廉陷中蹲坐取之針六分灸七壯  
主偏風不仁。

陽交 足外踝上七寸斜屬三陽分肉之間針六分灸三  
壯主胸滿膝痛不伸。

外邱 外踝上七寸少陽所生針三分灸三壯主胸脹滿  
毒犬傷小兒龜胸。

光明 外踝上五寸針六分灸五壯主脰痠熱病汗不出  
卒狂。

陽輔 足外踝上四寸輔骨前絕骨端三分去邱墟七寸  
針五分灸三壯主腰膝浮腫百節痠痛。

懸鍾 足外踝上三寸。動脈中。尋摸尖骨者是。針六分。灸

五壯。斜入針二寸許。主頭項手足風氣。便閉痔漏。

邱墟 足外踝下從前陷中。骨縫中。去臨泣三寸。又俠谿

穴中。量上外踝骨前五寸。灸三壯。針五分。主胸滿。久瘡。目翳。腹堅痛。

臨泣 足小次指本節後陷中。去俠谿一寸五分。針二分。

灸三壯。主胸滿。及各處氣痛。婦人月期不正。

地五會 足小次指本節後陷中。針一分。禁灸。主咳血。

俠谿 足小次指歧骨間本節前陷中。針三分。灸三壯。主

胸脇支滿。諸目疾。耳聾。

竅陰 足小次指外側。去爪甲角如莖葉。針一分。灸三壯。

主口痛。手足煩熱。諸瘡毒等。

胆經諸穴歌

膽經圖

足少陽者四十四脈子初起於會同本主人在伯脈其氣由懸壺而  
 行循脊脊各天衝見少白脈陰七骨木冲連陽白經注目當遊止營水  
 靈應空山風池肩井兮淵液腕筋身旁門連帶腋五脈隔下唯  
 道居膝相心經環跳市掖中流清陽朝之下陽溪泉陽支外丘先  
 明穴通輔懸鐘穴可眩垣墜地泣地五會俠數實陰府經全



膽腑



足少陽膽經主治

胆為清虛之府。居半表半裏之交。與厥陰肝經相表裏。氣血足則胆壯。氣血虛則胆怯。胆受邪則陰陽交戰。多寒熱往來。故患瘧症者。不能離乎少陽胆經也。觀夫胆力為事。不偏不倚。作中正之官。而決斷自出焉。

胆之表症。左關脈浮弦。其症為頭汗。寒邪將化火也。胡湯加柴

丹皮寒熱往來。陰陽相爭。胡湯

胆之虛。左關脈細軟。其症為驚悸。即如心血不足。安神

丸主虛則氣促太息者。四君子湯

胆之實。左關脈洪大。其症為胸滿。邪氣結聚。小柴胡湯

梗主邪布脇下痛者。小柴胡湯加枳殼大氣上衝。耳聾閉者。

通遠散加蔓荊石菖蒲  
香附或小柴胡湯注之

胆之寒左關脈遲沉其症為精滑肢腫食少心虛煩悶  
坐卧不安湯胆邪正相爭嘔吐者養有湯主之邪未化  
火舌胎滑者二陳

胆之熱左關脈弦數其症為口苦小柴胡湯移熱於胃嘔吐

者小柴胡湯加熱開腠理盜汗者小柴胡湯加丹皮胆為肝之

腑竅開於目胆熱目眩者小柴胡湯加山梔

### 胆部藥隊

補胆猛將 烏梅

補胆次將 棗仁

瀉胆猛將 桔梗 青皮

瀉胆次將 柴胡 香附 秦艽 川芎

涼胆猛將 龍胆草

涼胆次將

青蒿

槐實

溫胆猛將

肉桂

細辛

溫胆次將

山茱萸

足厥陰肝經穴圖

肝門 章門

陰歷 五里



大敦

行間

大衝

中封

蠡溝

中都

膝關

五里

陰歷

足厥陰肝經考正穴法 由足走胸十三穴

大敦

足大指端去爪甲如韭葉及三毛中針三分灸三

壯主疝氣腹脹陰痛

行間

足大指縫間動脈應手陷中針三分灸三壯主嘔

逆腹腫目赤小兒急驚風

太衝

足大指本節後二寸或云一寸半內間動脈應手

陷中針三分灸三壯主心痛小腸疝氣女子漏下

中封

足內踝骨前一寸筋裏宛中針四分灸三壯主身

體不仁腰痛身熱

蠡溝

內踝上五寸針二分灸三壯主疝痛小腹脹滿女

子赤白帶月水不調

中都

內踝上七寸胛骨中針三分灸五壯主腹痛疝氣

婦人崩中。產後惡露不絕。

膝關 犢鼻下二寸。旁陷中針四分。灸五壯。主風痺。膝內廉痛。喉痛。

曲泉 膝股上內側。輔骨下大筋上小筋下。陷中。屈膝橫紋頭取之。針六分。灸三壯。主血症。陰痛。喉痛。

陰包 膝上四寸。股內廉兩筋間。蹠足取之。看膝內側。必有槽中。針六分。灸三壯。主腰尻引小腹痛。小便難遺溺。婦人月水不調。

五里 氣衝下三寸。陰股中動脈應手。針六分。灸五壯。主腸中滿。熱閉不得溺。風勞嗜臥。

陰廉 羊矢下去氣衝二寸。動脈中。針六分。灸五壯。主婦人絕產。若未經生產者。灸之即有子。

章門。大橫外。直季脇。肋端。膈膈上二寸。兩旁六寸。側卧。屈上足。伸下足。舉臂取。又云。肘尖盡處是穴。脾之募。足少陽厥陰之會。針六分。灸百壯。主煩熱。口乾。胸腰疼痛。腹腫如鼓。

期門。直乳二肋端。不容旁一寸五分。又云。乳旁一寸半。直下又一寸半。肝之募。足厥陰太陰陰維之會。針四分。灸五壯。主煩熱。霍亂。泄利。嘔酸。吐水。男女熱入血室。許學士云。小柴胡已瀝針之立愈。

肝經諸穴歌  
足厥陰一十二穴終  
起大敦於行間循  
大衝於中封蠡溝  
中都之會膝關曲  
泉之宮龍陰包  
於五里陰康乃往  
尋羊矢於臑門期  
門可攻

肝圖





足厥陰肝經主治

肝為東方甲乙木。胆為之腑。其色青。賴血以養。名曰血海。自兩脇以下。及小腹陰囊之地。皆肝屬部位。開竅於目。最易動氣作痛。其風能上。至於頭頂。婦人尤甚。

肝無表症。皆屬於裏。

肝虛者。腎水不能涵木。而血少也。左關脈必柔弱。及空

虛。其症為脇痛。血不營筋。

四物湯

頭眩者。血虛風動也。

散主

目乾。水不養木也。

六味地黃丸

眉稜骨眼眶痛者。

心悸者。血少而虛火煽也。

七厘散

血虛液燥。口渴者。

煩躁發熱。虛火亢也。

六味地黃丸

肝實者。氣與內風充之也。脈左關必弦而洪大。症為左

脇痛。肝氣不和。

柴胡疏肝散

風熱頭痛。

清

癥瘕氣聚。小

腹疼痛者去附桂丸有熱脇下積聚和中丸加柴胡疝氣結

聚於下吳茱萸肉桂加木火刑金咳嗽者止嗽散加柴胡

木旺尅土泄瀉者四君子湯加木火凌胃嘔吐者二陳

炒黃連氣鬱火衝呃逆者藜皮竹茹湯

肝寒者左關脈沉澁其症為小腹痛煖肝丸疝瘕者橘

丸加吳茱萸囊縮者奔豚丸寒熱往來欲化為瘧小柴胡

肝熱者左關脈弦數其症為眩暈風熱上升通達目赤

腫痛蟬花散口苦者胆味苦肝熱胆亦熱也小柴胡湯

風燥消渴者一柴胡火衝頭痛者柴胡火鬱脇痛者柴

疎肝散加小麥霜血燥筋急而生瘰癧者消瘰丸風熱

相搏津液凝聚瘡痛聾耳者通達散白朮加荷葉木

火氣上逆冲心小承氣湯則偏墜者柴胡吐捲囊縮

中西匯參醫學

邪火入厥陰

大承氣湯小便不禁 通

肝部藥隊

補肝猛將

枸杞

北五味

烏梅

補肝次將

山茱萸

鬼絲子

首烏

當歸

白芍藥

沙苑蒺藜

鱉甲

龍骨

牡礪

木瓜

瀉肝猛將

鬱金

桃仁

青皮

莢朮

沉香

瀉肝次將

香附

木香

延胡索

柴胡

山梔

川

棟子

赤芍藥

瓜蒌壳

川芎

勾藤

白蒺藜

涼肝猛將

龍胆草

胡黃連

涼肝次將

羚羊角

夏枯草

石決明

青蒿

菊花

溫肝猛將

肉桂

桂枝

細辛

胡椒

吳茱萸

溫肝次將

鬼絲子

艾葉

茴香

山茱萸

任脈圖



任脈考正穴法 由下而上二十四穴

會陰 兩陰間任督衝三脈所起。督由此穴而行背。任由此穴而行腹。衝由此穴而行足。少陰灸三壯。禁針。主陰痛便閉。女人經水不通。卒死者。針一寸。補之。溺水者。倒拖出水。尿出則活。餘不可針。

曲骨 橫骨上。中極下一寸。毛際陷中。動脈應手。灸七壯。至七七壯。針二寸。主失精。及小腹痛。女人赤白帶下。

中極 關元下一寸。臍下四寸。膀胱之募。針八分。得氣即瀉。灸百壯。有云灸不及針。主腫脹。女人產後惡露不行。胎衣不下。月事不調。若斷緒不生。四度針。即有子。

關元 臍下三寸。小腸之募。針八分。灸百壯。主娠婦針落。胎倘不落。再針外崑崙。立下。及一切淋濁。

石門 臍下二寸。灸二七壯。針八分。婦人忌用。主傷寒小便不利。小腹痛硬。

氣海 臍下寸半。宛宛中。男子生氣之海。針八分。宜瀉。後宜再補之。

陰交 臍下一寸。針八分。灸百壯。灸不及針。主疝痛氣痛。一切出血。

神闕 當臍中。禁針。灸百壯。主中風不省人事。腹痛。徐平仲中風。灸百壯而愈。倘有不起。甚可再灸百壯。

水分 臍上一寸。在小腸下口。此處分別清濁。液入膀胱。渣入大腸。故曰水分。針一寸。灸七七壯。止百數壯。主一切水脹鼓腹。

下脘 臍上二寸。穴當胃下口。小腸上口。水穀於是入焉。

針八分。灸二七壯。止百壯。主六腑氣寒。食不化。腹堅痛。

建里 膈上三寸。針五分。灸五壯。主腫脹嘔逆。

中脘 膈上四寸。針八分。灸二七壯。止百壯。主五膈。翻胃。

膨脹。食積不化。

上脘 膈上五寸。針八分。灸七壯。主翻胃。嘔吐脹滿。

巨闕 鳩尾下一寸。心之募。針六分。灸七壯。主氣逆及欬。

吐霍亂。

鳩尾 在兩歧骨下一寸。其骨垂下如鳩尾。故名。針三分。

灸三壯。主偏頭風。氣悶唾血。

臆中 玉堂下。寸六分。橫量兩乳間陷中。仰而取之。氣會

之處。灸五壯。至二七壯。禁針。主氣促。氣滿。噉病。

玉堂 紫宮下。寸六分。陷中。灸五壯。針三分。主胸滿喘急。

紫宮 華蓋下。寸六分陷中。仰面取之。灸五壯。針三分。主

胸滿氣促。

華蓋 璇璣下。寸六分陷中。仰面取之。灸五壯。針三分。主

胸滿氣促喉症。

璇璣 天突下。寸六分陷中。仰頭取之。灸五壯。針三分。主

氣逆噎喉。水漿不下。胃積。

天突 在頸結喉下一寸宛宛中。針五分。灸不及針。主氣

逆喉瘡。

廉泉 頸下結喉上中央。仰面取之。針一寸。灸三壯。主喘

息。咳逆。舌縮。口瘡。

承漿 唇稜下陷中。開口取之。針二分。灸七壯。止七七壯。

主偏風。半身不遂。口眼喎斜。而腫。



任脈諸穴歌

任脈二十四穴。行腹與胸。會陰始兮。曲骨從中。極關元石門通。氣海陰交會。神闕水分逢。下脘建里兮。中脘上腕。巨闕鳩尾兮。中庭臆中。玉堂上紫宮。華蓋璇璣上天突之宮。飲彼廉泉。承漿味融。

任脈起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元至喉。龍屬陰脈之海。人身之有任督。猶天之有陰陽。地之有南北。可以分。可以合也。分之以見陰陽之不雜。合之以見渾淪之無間。一而二。二而一也。

春中  
 筋候  
 至陽  
 靈臺  
 神道  
 身柱  
 陶道  
 大椎  
 庭門  
 風府  
 腦戶  
 強間

後項  
 白脊  
 前項  
 期會  
 上星  
 神庭  
 素髎  
 水溝  
 舌端  
 新地

腎脈圖



陽關  
 命門  
 懸壺

腰俞  
 強俞

督脈考正穴法 由下而上二十七穴

長強 脊骶骨端計三分。伏地取之。足少陰少陽之會。針三分。灸三十壯。不及針。此痔根本。主腸風下血。久痔五淋。腰脊痛。房勞。

腰膕 二十一椎下宛宛中。以挺身伏地取之。舒身兩手相重支額。縱四體後。乃取其穴。針八分。灸七壯。主腰痛傷寒。四肢熱。使閉。

陽關 十六椎下。坐而取之。針五分。灸三壯。主膝不伸。筋擊不行。舒。

命門 十四椎下。伏而取之。針五分。灸三壯。主身熱如火。懸樞 十三椎下。伏而取之。針五分。灸三壯。主腰脊強。水穀不化。下痢。

脊中 十一椎下。俛而取之。針五分。得氣即瀉。禁灸。至五

痔。黃疸。風癩。

筋絡 九椎下。俛而取之。針五分。灸三壯。主癩疾。狂走。目

瞪。癩病。多言。心痛。

至陽 七椎下。俛而取之。針五分。灸三壯。主腰痛。胃寒不

食。身瘦。背中心行。腹鳴。

靈臺 六椎下。俛而取之。俗用灸一二壯。以治氣喘難卧。

甚效。禁針。

神道 五椎下。俛而取之。灸七七壯。禁針。主頭痛發熱。張

口不合。

身柱 三椎下。俛而取之。針五分。灸七七壯。主癩病。狂走。

亂打。妄言。見鬼。小兒驚悸。

陶道 一椎下。俛而取之。針五分。灸五壯。主瘡病寒熱煩滿頭重。恍惚不樂。

大椎 一椎下陷者。宛宛中。針三分。灸以年壯為可。主肺脹嘔吐。五勞七傷。項強痞硬。當刺大椎第一間。

瘰癧門 項後入髮際五分。項中央宛宛中。仰頭取之。入擊

舌本。針二分。可繞針八分。禁灸。主舌急不語。重舌。衄血。

風府 項後入髮際一寸。大筋內宛宛中。疾言其肉立起。

針三分。禁灸。恐失音。舌項強硬。咽腫。頭上百病。魏武帝

患風傷項急。華陀治此穴立效。

腦戶 枕骨上強間後一寸半。禁灸。令人瘖。針三分。至腦

立死。主面赤目黃。頭痛。此穴針灸均不相宜。

絕間 後項後一寸半。針二分。灸七壯。主頭目痛。心煩。

後頂 百會後寸半。枕骨上灸五壯。針二分。主頭項強急目疾。

百會 前項後寸半。頂中央。旋毛中。可容豆。直兩耳尖。猶天之極星居北。灸七壯。針二分。主頭風。一切中風。不語偏風。心煩。唐高宗頭痛。秦鳴鶴欲刺出血。武后謂至尊頭上不可後刺。出微血立愈。

前項 顛會後寸半。骨間陷中。針一分。灸三壯。主頭風目眩。面腫頂痛。

顛會 上星後一寸陷中。灸二七壯。針二分。八歲以下不可針。因顛門未合。恐傷骨也。主鼻塞而腫。頭風目眩。上星 神庭後入髮際一寸陷中。容豆。灸七壯。針三分。以三稜針瀉諸陽熱。主頭痛鼻塞。不宜多灸。

神庭 直鼻上入髮際五分灸二七壯至七七壯禁針恐失睛。惟張子和針此穴。治目腫翳立退。

素髻 鼻柱上端準頭不宜灸。針一分主鼻中息肉醉風水溝 一名人中鼻柱下溝中央。近鼻孔陷中。針四分。灸三壯至二百壯主水腫口喎中惡黃疸口喎斜。艾炷小如雀糞而腫。針之即愈。

兌端 唇上端。針二分灸五壯主癩病便黃赤舌乾唇強齒痛鼻塞口喎痰涎艾炷小如麥。

斷交 唇內齒上齦縫中。針三分灸三壯主鼻中息肉鼻塞項強目淚牙疳內背赤痒痛目生白翳黃疸寒暑瘧疫等症點烙亦佳。

督脈諸穴歌

督脈在背之中行。二十七穴始長強。舞腰俞兮歌陽關。  
入命門兮懸樞當。脊中筋縮造至陽。靈臺神道身柱維。  
陶道大椎至疵門。風府腦戶強間分。後項百會兮前顛。  
顛會上星兮神庭素膠至水溝。於鼻下。兌端交斷。交於  
內唇。



奇經八脈



奇經八脈歌

督脈起自下極腧並於脊裏上風府過腦額鼻入齶交  
為陽脈海都綱要

任脈起於中極底上腹循喉承漿裏陰脈之海任所謂  
衝脈出胞循脊中從腹會咽絡口唇女人成經為血室  
脈並少陰之腎經與任督本於陰會三脈並起而異行  
陽蹻起自足跟裏循外踝上入風池  
陰蹻起內踝循喉嗑本足陰陽脈別支

諸陰交起陰維脈發足少陰築賓却  
諸陽會起陽維脈太陽之却金門穴

帶脈周迴季脇間會於維道足少陽所謂奇經之八脈  
維繫諸經乃順常

回陽九針歌  
 回陽九針歌  
 每五  
 廣益堂印行  
 下

回陽九針歌

症門勞宮三陰交湧泉  
 大絡中腕接環跳三里  
 合谷并山是回陽九針穴

中腕

勞宮

三里 三陰交

大絡

足陽明

回陽九針圖



症門


合谷

環跳

圖

胎

十二日胚珠



胎口

胎口

孕早日子宮圖

胎清水

胎血

口塞胎

胎論

凡受孕數日。成一胚珠。內係清水。無物無形。至十二日。胚珠大如白豆。重二三釐。珠胞之外。發生絲毛。如水洗飯粒。久而生毛。粒狀剖之。見雙膜。包涵清水。始有小物兩粒。浮其中。一圓一長。長者漸變形為人。積日彌大。即名曰胚。圓者養胚之物。積日彌小。及生胎盤。則茫然烏有。歷二十日。胚珠漸大。珠內胚形如大蟻。重約一分。長約三分。似有頭身之意。至三十日。珠內胚形長四分。大如牛蠅。身首顯然可見。首上具有眼模。三十五日。臍帶始生萌芽。四十二日。頭上有口。四十五日。胚重一錢。長八分。初見四肢臂股。六十日。足手皆全。骨點始生。上有耳鼻。下有肛門。是為受形之始。長寸許。六十五日。腹內粗有五臟。九十日。見全形。男女可辨。長二

寸許重二兩許胎盤成由是月大一月至四月週身內外皆備重五兩五錢長四寸五月長五寸孕婦始覺胎動六月長六寸重十三兩髮甲生七月長八寸骨節粗成壯者生出可活八月長尺一寸重五十兩卵子由腹落至腎竅九月眼始開長尺二寸十月胎足重五六兩人具百體心最先生雜蛋伏一週時黃內始有跳熱漸成難心及終世之時百體先死心死最後嬰兒在胎之日肺小肝大不須呼吸地氣其血色及運行功用皆與出世者不同妊胎二十日心已成模初見一管漸分兩房又漸而成四房上兩房有戶相通出世之後即閉塞否則紫血混行兒死而身藍矣胎兒之血來自胎盤由臍帶透臍而入一半入肝運行肝內一半入迴血總管內上達心右上房即過左上房而落左下房由左下

房入血脈總管。先上兩手頭腦之內。由迴管返心。右下房。即自入肺管。透血脈總管之拱。入肺管與總管之拱。出世後即不相通。

然後落下身兩足之間。胎兒上身大。下身小者。因上身先接好血故也。於是血落下身。行至胯骨盆上。即分一半入足。一半入雙管。繞臍帶而達胎盆。以胎盤為肺之用。改換新血。復由臍帶而回。輪流不息。直待生出。呱呱以啼。肺即開張。以呼吸。氣即入肺。而胸有胎兒者。投肺於水。以驗淨。沉即知兒死。腹中即產後故。故以定其罪。血頗更改而運行。造化之工妙如此。


凡男子精力壯健。成孕倍易。若精出無勢。精水稀淡。成孕必難。或陽莖受病。楊梅結毒。皆不成孕。女子陰中受病。子宮受病。子管閉塞。子核有恙。核無精珠。概不受孕。子核之內。裂一珠成一孕。裂雙珠成孿生。如婦人中年。

病死。剖驗子核。可知其生前受胎次數。西國接生之事。皆以醫士主之。取其諳識血脈臟腑部位。非若中國之用穩婆。如狡媪愚婦所為。故成孕受胎及臨產接生等事。醫士所不深究其理。願此後風氣漸開。俾生命大有裨益。是所厚望。



橫生圖

子先出不能生必須令  
轉其足則母子皆  
安



難產說

難產者。多因產母倉皇。臨盆太早。或胞漿已破。兒身未轉。或兒身已轉。尚未順正。被母用力努擦。以致足先來者。謂之逆產。手先來者。謂之橫生。或漏其肩與耳者。謂之側產。或被臍帶纏絆。謂之礙產。倉卒之間。二命所係。不可無端。攘鬧。大驚小怪。以驚動產母。更不可妄行動手。總以鎮靜為主。無論橫產倒產。側產礙產。總言難產。用後佛手散服之。最為穩驗。

救難產法

令產母正身仰臥。務要安定心神。不可驚怖。卻求慣熟穩婆。先翦指甲。以香油潤手。將兒輕輕送入。又再將兒身推上。必須轉直。待身轉頭正。服以催生之藥。渴則飲以蜜水。

飢則食以薄粥。而後扶掖起身。用力一送。兒即生矣。此在手法純熟。加以小心謹慎。若粗率愚蠢之人。斷不可用。雖又鍼刺足心之法。恐兒痛上緊。母命難保。切不可用。

佛手散

治胎氣受傷。或子死腹中。疼痛不已。口噤昏悶。

或心腹脹滿。血上衝心。服之生胎即安。死胎即落。又治橫生倒產。須先安臥。將此藥煎服。再行安臥。自然順生。若兒手足在外。未能收入。切不可亂動。推少以食鹽塗兒掌內。用指甲輕搔之。又以鹽摩母腹。安臥一時。自然收入。藥須早備。以資急用。當歸一兩。川芎六錢。酒三水。同煎七分。服。若治橫生倒產。則加黑料豆一合。炒焦。泔水。加童便一半煎。藥服少頃。再服一劑。此方又治產後腹痛。發熱。頭痛。能逐惡血。生新血。除諸疾。

簡明中西醫學圖說

下針八法

揣 揣而循之。凡點穴以手揣摩其處在陽部。筋骨之側陷者為真。在陰部。却臍之間。動脈相應。其肉厚薄。或伸或屈。或平或直。以法取之。按而正之。以大指爪切揣其穴。於中庶得進退方有準也。難經曰。刺榮毋傷衛。乃指按其穴。令氣散以針刺之。是不傷其衛氣也。又曰。刺衛毋傷榮。乃撮起其穴。以針卧而刺之。是不傷其榮血也。此陰陽補瀉之大法也。

爪 爪而下之針賦。所謂左手重而切按。欲令氣血宣散。即不傷其榮衛也。右手輕而徐入。欲不痛之因。此乃下針之秘法也。

搓。搓而轉之。如搓線之狀。勿轉太緊。左轉為補。右轉為瀉。以大指次指相合。大指往上進為左補。大指往下退為右瀉。此則迎隨之法。經言迎奪右而瀉。涼隨濟左而補。緩此左右補瀉之大法也。

彈。彈而努之。此則彈於針頭待氣至。却進一豆許。先淺而後深。自外推內。補針之法也。

搖。搖而伸之。搖動針頭。以待氣至。却退一豆許。乃先深後淺。自內引外。瀉針之法也。謂之針頭補瀉。

捫。捫而閉之。經曰。凡補必捫而出之。故補針當出時。就捫閉其穴。不令氣出。如氣血不泄。乃為真補。

循。循而通之。凡瀉針。必以手指於穴上四旁循之。令血氣宣散。方可下針。當出針時。不閉其穴。乃為真瀉。此提

按補瀉之法。男女補瀉。左右反用。

撚者。治上大指向外撚。治下大指向內撚。外撚者。令氣向上而治病。內撚者。令氣向下而治病。如出針內撚者。令氣行至病所。外撚者。令邪氣至針下而出也。此下針八法之要訣也。

按迎隨之法。迎而奪之為瀉。隨而濟之為補。夫行針者。當刺之時。用皮錢擦熱針。再以口溫其針。先以左手大指爪按穴。彈而努之。爪而下之。捫而循之。通而取之。令病人咳嗽一聲。右手持針而刺之。春夏二十四息。先深後淺。秋冬三十六息。先淺後深。徐徐而入。氣來如動脈之狀。針下輕滑未得氣者。若魚之未吞鈎。既吞得氣。宜用補瀉。補隨其經脈。推而按內之。停

針一二時起針。左手開針穴。徐出針而疾按之。瀉迎其經脈。提而動伸之。停針稍久起針。左手開針穴。疾出針而徐按之。補針左轉。大指努出。瀉針右轉。大指收入。補者先呼後吸。瀉者先吸後呼。疼痛即瀉。痺麻即補。

### 神針八法

心無內慕。如待貴賓。心為神也。醫者之心。病者之心。與針相隨上下。先慮針損。次將針尖含在口內。而令其溫。又以左手按摩受疾之穴。如握虎之狀。右手撚針。如持無力之狀。是用針之一法。左撚九而右撚六。此乃住痛之二法也。進針之時。令病人咳嗽。而進針。進針之三法也。針沉良久。待內不脹氣不行。照前施之。如氣來。最針不下。宜左撚而

瀉其實。如不散。令病人呼氣三口。醫者用手抓針自散。如針進無滯無脹。乃氣虛也。令病人吸氣。針宜右撚。而補其虛。此補瀉之四法也。其瀉者。有鳳凰展翅。用右手大指食指撚針頭。如飛騰之象。一撚一放。此瀉之五法也。其補者。有餓馬搖鈴。用右手大食指撚針頭。如餓馬無力之狀。緩緩前進則長。後退則短。此補之六法也。如病人暈針。用袖掩之。熱湯飲之。即醒。補之七法也。如針至深處。而進不能退。不能其皮上四圍起皺紋。其針如生在内。此氣實之極也。有蒼蠅叢咬之狀。四圍飛延。用右手食指。向皺紋皮處。離針不遠。四圍前進三下。後退其一。乃瀉之八法也。

十二字分次第手法及歌訣

一爪切者。凡下針。用左手大指爪甲。重切其針穴。令氣血



宣散於下針不傷榮衛也。

歌訣 取穴先將爪切深。須教母外慕其心。致令榮衛無

傷礙。醫者方堪入妙針。

二指持者。凡下針。以右手持針於穴上着力旋插。直至膝理。吸氣三口。提於天部。依前口氣徐徐而用。正謂持針者。手如握虎。勢若擒龍。心無依慕。若待貴人之說也。

歌訣 持針之士要心雄。勢如握虎與擒龍。欲識機關三

部奧。須將此理細推窮。

三口溫者。凡下針必須入口溫熱。方可與刺。使血氣調和。冷熱不相爭也。

歌訣 溫針一理最為良。口內調和納穴場。毋令冷熱相

爭搏。榮衛宣通始得祥。

四進針者。凡下針。要病人神氣定。息數勻。醫者亦如之。切不可太忙。又須審穴在何部分。如在陽部。必取筋骨之間。陷下為真。如在陰分。却稠之內。動脈相應。以爪重切。經絡少待。方可下手。

歌訣

進針理法取關機。失經失穴不堪施。陽經取陷陰

經脈三思已定再思之。

五指循者。凡下針。若氣不至。用指於所屬部分。經絡之路。上下左右循之。使氣血往來。上下均勻。針下者。然氣至。沉緊。得氣即瀉之故也。

歌訣

循其部分理何明。只為針頭不緊沉。推則行之引

則止。調和血氣兩來臨。

六爪攝者。凡下針時。氣滯滯不行者。隨經絡上下。用大指

爪甲切之。其氣自通行也。

歌曰 攝法應知氣滯經。須令爪切勿交輕。上下通行隨

經絡。故教學者要窮精。

七退針者。凡退針必在六陰之數。分明三部之用。斟酌不可不誠。心着意。洞亂差訛。以瀉為補。以補為瀉。欲退之際。三部一部。以針緩緩而退也。

歌曰 退針十法理誰知。三才訣內總玄機。一部六陰三

氣吸。須臾疾病愈如飛。

八指搓者。凡轉針如搓線之狀。勿轉太緊。隨其氣而用之。若轉太緊。下入肉纏針。則有大痛之患。若氣滯澁。即以第六攝法切之。方可施也。

歌曰 搓針泄氣最為奇。氣至針纏莫急移。渾如搓線悠

悠轉急轉纏針肉不離

九指撰者。凡下針之際。治上大指向外撰。治下大指向內撰。外撰者。令氣向上而治病。內撰者。令氣至下而治病。如出至人部內撰者。為之補。轉針頭向病所。如出至人部。外撰者。為之瀉。轉針頭向病所。使邪氣退。至針下出也。此乃針中之秘旨也。

歌曰：撰針指法不相同。一般在手兩般窮。內外轉移行。上下邪氣逢之疾。豈容。

十指留者。如出針。至於天部之際。須在皮膚之間。留一豆許。少時方出針也。

歌曰：留針取氣候。沉浮出容一豆入容伴。致令榮衛縱橫散。巧妙玄機在指頭。

十一針搖者。凡出針三部。欲瀉之際。每一部搖一部。計六

搖而已。以指捻針。如扶人頭搖之狀。庶使孔穴開大也。

歌曰。搖針三部六搖之。依次推排指上施。孔穴大開無

窒礙。致令邪氣出如飛。

十二指拔者。凡持針欲出之時。待針下氣緩不沉緊。便覺

經滑。用指捻針。如拔虎尾之狀也。

歌曰。拔針一法最為良。浮沉清滑任推詳。勢猶取虎身

中尾。此訣誰知蘊錦囊。

總歌。針法玄機口訣多。手法雖多亦不過。切穴持針溫

口內。進針循攝退針搓。指擦瀉氣針留豆。搖令穴

大拔如梭。醫師穴法叮咛說。記此便為十二歌。

雷火神鍼

治閃挫諸骨間痛及寒濕氣而畏刺者

沉香 木香 乳香 茵陳 羌活 乾薑 穿山甲

以上藥各三錢加麝香少許蘄艾二兩以絲紙方尺先鋪艾茵於上次將藥末摻捲極緊收用按定痛穴筆點記外用紙六七層隔穴將捲艾藥名雷火針也取太陽真火用圓珠火鏡皆可燃紅按穴上良久取起煎去灰再燒再按九次即愈

蒸臍治病法

五靈脂

八錢生用

斗子青鹽

五錢生用

乳香

一錢

沒藥

一錢

天鼠糞

二錢微炒

地鼠糞

三錢微炒

葱頭

乾者二錢

木通

三錢

麝香少許石為細末水和菽麵作團置臍上將前藥以二錢放於臍內用槐皮剪錢蓋之

以艾灸之每歲一壯不時添換

# 仰面尺寸圖



一 山觀相去七寸

二 身前當平門

三 長廣三尺半

四 中胸圍

五 背闊

六 胸圍  
七 背闊  
八 腰圍  
九 膝圍  
十 腳圍

十一 足長  
十二 足寬  
十三 手長  
十四 手寬  
十五 袖長  
十六 袖寬  
十七 領口  
十八 領寬  
十九 領高  
二十 領深  
二十一 領厚  
二十二 領平  
二十三 領斜  
二十四 領圓  
二十五 領方  
二十六 領三角  
二十七 領四角  
二十八 領五角  
二十九 領六角  
三十 領七角  
三十一 領八角  
三十二 領九角  
三十三 領十角  
三十四 領十一角  
三十五 領十二角

三 腰圍至內袖上廣二尺寸

四 膝圍至下地

五 膝內至腳底

六 一尺四寸

七 二寸半

八 內袖上座至下履長半寸

九 內袖下座至內踝長一尺三寸

十 男女右手中間第一節內此兩橫紋項  
十一 相去為寸取備得心量或兩節皆取  
十二 宜為折而不伸唯為單川幅多不學

伏面尺寸圖







伏人經圖



十四經脈長短尺寸長

十四經脈長短尺寸數

手之六陽經脈。從手至頭。長五尺。共計五六合三丈。  
手之六陰經脈。從胸走手。長三尺五寸。共計合二丈一尺。  
足之六陽經脈。從頭走足。長八尺。共計六八合四丈八尺。  
足之六陰經脈。從足走腹。長六尺五寸。共計合三丈九尺。  
督脈任脈。各長四尺五寸。共合九尺。  
兩蹻脈從足至目。各長七尺五寸。共合一丈五尺。  
十四脈部。統共合十六丈二尺。此氣之大經脈也。

# 用艾灸法

孟子所謂七年之病。求三年之艾。蓋艾性至熱。用火灸則上行。入藥煎則下達。艾味苦。氣溫和。陰中之陽。無毒。主灸百病。三月三日。五月五日。採曝乾。陳久者良。火用清麻油。點燈草。或用火珠。火鏡。耀日。以艾承之。得火為上。如用松柏。枳。槁。榆。棗。桑。竹。等火。古來灸病。皆忌之。用蠟燭火。甚佳。灸瘡。至愈。不痛。且有滋潤。可取。

凡灸法。坐點穴。則坐灸。臥點穴。則臥灸。立點穴。則立灸。毋令俯仰。傾側。須四體平直。若任其傾側。俯仰。則穴不正。徒傷人之好肉。不如不灸為妙。

寶鑑云。氣不至而不效。灸亦不發。蓋十二經應十二時。其氣各以時而至。故不知經絡氣血多少。應至之候。而灸之。

者則瘡不發。世醫莫之知也。

艾灸補瀉

氣盛則瀉。之虛則補之。

針所不為。灸之所宜。陰陽皆虛。火自當之。經陷下者。火則當之。經絡堅緊。火所治之。陷下則灸之。

絡滿經虛。灸陰刺陽。經滿絡虛。刺陰灸陽。

以火補者。毋吹其火。須待自滅。即按其穴。以火瀉者。速吹其火。開其穴也。

艾炷大小先後

黃帝曰。灸不三分。是謂徒冤。炷務大也。小弱乃小作之。又曰。小兒七日以上。周年以還。炷如雀糞。凡灸當先陽後陰。言從頭向左而漸下。次從頭向右而漸下。先上後下。

明堂云先灸上後灸下。先灸少後灸多。皆宜審之。  
王節齋云灸須自上而下。不可先灸下後灸上。

灸瘡要法

資生云凡着艾得瘡發所患即瘥若不發其病不愈可知。  
甲乙經曰灸瘡不發者故履底灸令熱熨之三日即發。今  
人用赤皮葱三五莖去青於火灰中煨熱拍破熱熨瘡上。  
十餘遍其瘡三日遂發。又以生麻油漬之而發。亦有用皂  
角煎湯頻點而亦有恐血氣衰不發服四物湯滋養血氣  
不可一概論也。有復灸一二壯遂發有食熱灸之物如燒  
魚煎豆腐羊肉之類而發在人以意取物不可順其自然  
終不發矣。

灸瘡膏法

白芷。金星草。淡竹葉。荈。連。乳香。當歸。川芎。薄荷。蔥白等。炒  
鉛粉。香油煎膏貼。如用別膏。恐瘡口易收。而病氣不得出  
也。如用別物。乾燥作疼。亦且不便。

古時貼灸瘡不用膏藥。要待膿出多而疾除。

資生云。春用柳絮。夏用竹膜。秋用新綿。冬用兔腹細毛。今  
多以膏藥貼之。日兩三易。欲求速愈。此非治疾之本意也。  
苟貼膏藥不壞。久久貼之可也。若頻易。恐病根未盡除也。

### 洗灸瘡法

古人灸艾炷大。便用洗法。其法以赤皮蔥薄荷煎湯。溫洗  
瘡之周圍。約一時久。令驅逐風邪於瘡口出。更令經脈往  
來不滯。自然疾愈。若灸火退痂後。用桃枝青嫩皮煎湯。溫  
洗。能護瘡中諸風。若黑爛加胡荽。若痛甚。加黃連煎洗。

壯數多少

凡言壯數者。千金言丁壯者。病根深篤。可倍於方數。老少羸弱。可減半。扁鵲灸法有至三五百壯。十壯。此亦太過。若曹氏灸法有百壯。五十壯。小病諸方亦然。惟明堂百經云。針入六分。灸至三壯。更無餘治。後人惟以病之輕重而增損之。凡灸頭項。止於七壯。積至七七壯止。

銅人治風。灸上星前項百會。至二百壯。腹背灸五百壯。若鳩尾巨關。亦不宜多灸。灸多。則四肢細而無力。千金方於足三里穴。乃云至三百壯。心俞禁灸。若中風。則急灸至百壯。皆視病之輕重而善用。不可泥一說。而不通其變也。

灸後調攝法

灸後不可就飲茶。恐解火氣。及食。恐滯經氣。須少停一二



時。即宜入室靜卧。遠人事。忌色慾。平心定氣。凡百俱要寬解。尤忌大怒。大勞。大飢。大飽。受熱。冒寒。至於生冷果品。亦宜忌之。惟食清淡。養胃之物。使氣血流通。艾火逐出病氣。若過厚。毒味醎醉。致生痰涎。阻滯病氣矣。鮮魚雞羊。雖能發火。止可施於初灸。十數日之內。不可加於半月之後。今人多不知調養。雖灸何益。故因灸而反致害者。此也。徒責艾灸不效。何耶。

切脈秘旨

脈之為道。最為微渺而難知也。方書論脈愈詳而指下愈加忙亂。何苦張大其言。以人命為戲乎。昔張心在先生所著切脈大法。取八脈為綱。皆顯然可見者。以為實據。如浮沉遲速。細大長短。今列於左。而分解之。

浮者。輕手著於皮膚之上。而即見。為表病也。沉者。重手按於肌肉之下。而始見。為裏病也。

以上二脈。以手之輕重得之。此其顯而易見也。

遲者。一息脈來二三至。或來一至。為寒病也。數者。一息脈來五六至。或七八至。為熱病也。

以上二脈。以息之至數辨之。又顯而易見也。

細者。脈狀細小。如線。主諸虛之病也。

大者脈狀粗大如指。主諸實之病也。

以上二脈以形象之潤窄分之。又為顯而易見也。

短者脈來短縮。上不及於寸。下不及於尺。素稟衰也。

長者脈來迢長。上至魚際。下至尺澤。為素稟之盛也。

以上二脈以部位之過與不及驗之。又為顯而易見也。

互見之辨

浮而數為表熱。浮而遲為表寒。沉而數為裏熱。沉而遲為

裏寒。又於表裏寒熱四者之中。審其為細。則屬於虛。審其

為大。則屬於實。又須於表裏寒熱虛實六者之中。審其為

短。知為素稟之衰。療病須兼培其基址。審其為長。知為素

稟之盛。攻邪必務絕其根株。此憑脈治病之秘法也。

治婦人脈四言詩

婦人乏脈。尺大於寸。尺脈濇微。經愆定論。三部如常。經停莫根。尺或有神。得胎如願。左尺大為男。右尺大為女。婦人有胎。取於左寸。寸有少陰或不如神門。左神門大為男。右神門大為女。胎所過占之不適。月斷病多。六脈不病。體弱未形。有胎可慶。婦人經停。脈來滑疾。按有散形。三月可必。按之不散。五月是實。和滑而代。二月為率。

婦人有孕。尺內數弦。內崩血下。革脈亦然。將產之脈。名曰離經。離經時常脈內動胎氣外變脈形。新產傷陰。出血不止。尺不上關。十有九死。尺弱而瀉。腸也。腸冷惡寒。年少得之。受孕良難。年大得之。絕產血乾。

小兒驗紋按額診脈四言詩

五歲以下。脈無由驗。食指三關。

第一節黃位為風。第二節為氣。第三節位為命。

關以男左女右為脈絡可占熱見紫紋傷寒紅像青驚白疳直同  
影響隱隱淡黃無病可想黑色曰危心為快快若在風關  
病輕弗忘若在氣關病重留意若在命關危急須記脈紋  
入掌內鈎之始彎裏風寒彎外積致五歲以上可診脈位  
一指此指下推求大率七至加則火門減則寒類餘脈  
寸關尺經求之以意更有變蒸脈亂身熱不食汗多或吐或渴原  
有定期與病分別疹痘之初四未寒微而赤氣粗涕淚弗  
輟半歲小兒外候最切按其顏中以前名中食三指候於額  
近髮為上名指病情可晰外感於風三指俱熱內外俱寒  
近眉為下三指冷冽上熱下寒食中指熱設若夾驚名中指熱設若  
食停食指獨熱

小兒面部五位圖歌

面之症類為心鼻為睛上是其真左腮屬肝右屬肺  
承漿屬腎居下唇

命門部位歌

中庭與天庭可空印空額前方屬腦有精定有心  
青黃驚風惡熱和瀉得光不可偏棄損唇黑  
黃斑當青甚足為虛腎暗亦堪傷此是命  
門此醫好妙飯蛋

白眼青肝灼赤心黃脾白肺黑腎病也


- 1 心 01 印空
- 2 肝 02 印空
- 3 脾 03 印空
- 4 肺 04 印空
- 5 腎 05 印空



附傳小兒初生抹毒奇方兼治疹症

初生小兒於三朝日。用雞蛋白調水粉。放在手心。摩擦。小兒腰俞陽關命門等穴。須臾有毛出。如髮而粗。長分許。不必拔動。如法連擦三日。毛自脫落。依此擦過。可除先天胎毒。痘疹輕稀。令兒易養。此法傳自閩中。試之屢效。但毛之疏密稍有不同。初不解其何故。曾經函詢格致。考証西書多種。亦未道其所以然。或謂病症之險者。如羊毛痧。羊毛瘟。羊毛疔。及七十二種痧症。本不有毛之處。忽焉見毛。亦能兼治。此法可謂有益無損之舉。故附錄之。

眼球前圖




眼球後圖





皮膚斷面

1 毛  
2 神經  
3 血管  
4 表皮  
5 脂肪  
6 真皮



1 毛  
2 毛  
3 血管  
4 脂肪  
5 汗腺


頭骨



腕骨及三頭筋



頭骨 腕骨 齒



備用諸方

補中益氣湯 中氣下陷以此升之

黃芪

錢半

當歸

炙草

錢一

土炒白朮

人參

錢一

柴胡

錢一

獨參湯

治元氣虛而不支脈微欲絕及婦人血崩

人參

其功與天地參與天地人並立為三故名

二陳湯

治肺胃寒痰

製半夏

陳皮

茯苓

各錢半

炙草

八分

加生薑片棗二枚

三生飲

治寒風中臟六脈沉細

生南星

生烏頭

生附子

各錢半

生薑片

生木香

五分

四君子湯

治氣虛脾胃不足之症

中西匯參醫學

備用諸方

四十六

廣益書局印行

人參 三錢 土炒白朮 錢二 茯苓 錢二 炙草 分五 加生薑片 二 棗 三

五苓散 治小便不通

茯苓 三錢 猪苓 澤瀉 各八 白朮 錢半 桂枝 一錢

六味地黄丸 滋水制火專治血症亦可煎湯

大熟地 四錢 山萸肉 山藥 各二錢 丹皮 茯苓 各一錢

澤瀉 錢半

七福飲 治心血虛而驚悸者

人參 熟地 各三錢 當歸 棗仁 各二錢 炒白朮 錢半 遠志 分五

炙甘草 一錢

八珍湯 氣血兩補

人參 錢三 白朮 錢二 茯苓 錢二 炙草 分五 當歸 熟地 各三錢 白芍

川芎 各錢

九味羌活湯 四時感冒發散之通劑

羌活 防風 蒼朮各錢 白芷 川芎 黃芩 生地

川芎 黃芩 生地黃 甘草各錢 細辛九分

加生薑蔥白水煎

十全大補湯 治陰陽並虛而畏冷

人參錢三 白朮錢二 茯苓錢二 炙甘草五分 歸身 川芎 地黃錢四

白芍錢二 黃耆錢二 肉桂六分

一柴胡湯 治外邪而內火肝燥胃渴

生地錢三 白芍錢二 黃芩錢 柴胡八分 陳皮八分 甘草五分

二冬湯 治上清

天冬錢二 麥冬錢三 花粉 黃芩 知母各錢 人參五分

炙甘草各五分

三黃解毒湯 治火毒內盛

黃連 黃柏 黃芩 黑山梔 各錢

三化湯 治中風入臟熱極閉結

厚朴 大黃 枳實 羌活 各錢 水煎服

四味香薷飲 治風寒閉暑之症

香薷 扁豆 厚朴 各錢 炙草 五分

若兩足轉筋加木瓜茯苓

四苓散 治小便不通

茯苓 三錢 猪苓 八分 澤瀉 八分 白朮 錢半

五苓散加桂枝 八分

四逆湯 治少陰中寒肢冷厥逆

附子 五錢 乾薑 五錢 炙甘草 二錢

四生丸 治血熱妄行而為吐衄

生地黃 生荷葉 生側柏葉 生艾葉各等分

同搗極爛為大丸如龍眼每服四丸水煎去渣

五皮飲 治小便不利胃經蓄水發為水腫

大腹皮 茯苓皮 桑白皮 陳皮半錢 生薑皮 八分

五痿湯 治五臟受熱而痿

人參 白朮 茯苓各一錢 炙草四分 當歸錢 苡仁三錢

麥冬二錢 黃柏知母各五分

五味異功散 治氣虛即四君子湯加陳皮一錢

六君子湯 治氣虛挾痰即四君子湯加製半夏陳皮

香砂六君子湯 治胃寒吐瀉即六君子加藿香一錢

砂仁二粒



七珍散 治心虛不安氣血虛損

人參 石菖蒲 大生地 川芎 防風 長砂各五錢

細辛一錢 為末薄荷湯調下

七味安神丸 治虛火上炎心神不安

黃連 當歸 麥冬 茯苓 甘草各二錢 硃砂三錢

冰片二分 共研末為丸燈心湯送下一錢

加味七神丸 治腎虛難鳴泄瀉

肉豆蔻 吳茱萸 廣木香各一兩 蒸茯苓 補骨脂炒

車前子二錢 土炒冬朮四錢 大棗煎湯為丸每服三錢

八味地黃丸 治命門火衰

製附子 肉桂各一錢 大熟地四錢 山藥 萸肉各錢

茯苓錢半 丹皮 澤瀉各一錢

知柏八味丸 滋水降火

知母 黃柏 各一錢 大熟地 四錢 萸肉 一錢 山藥 一錢 茯苓 一錢

丹皮 澤瀉 各一錢

加味八珍湯 治產母氣血氣損

人參 白朮 各一錢 茯苓 八分 當歸 五錢 炙草 三分 川芎 一錢

酒芍 二錢 熟地 二錢 乳香 五分 酒炒丹參 二錢 益母草 二錢

生地八物湯 治中消

生地 麥冬 各三錢 山藥 知母 丹皮 各一錢 黃連 一錢

黃芩 黃柏 各一錢 荷葉 二錢

十補丸 治氣血大虧

九製地黃 三兩 黃芪 白朮 萸肉 杜仲 續斷

棗仁 各一人參 當歸 白芍 遠志 茯苓 兩

一併用油方

山藥 兩半 北五味 龍骨 牡蠣 各七錢五分

百藥煎散 治咽痛

百藥煎 五錢 珊瑚 錢半 甘草 二錢 共為末米飲下

人參燕窩百合湯 潤肺清金

人參 一錢 如無力用洋參沙參二三錢代之 燕窩 五錢

百合 五分 共搗爛食之

左歸飲 壯水之劑

熟地 五錢 山藥 枸杞 各二錢 茯苓 錢半 山茱萸 一錢

炙甘草 一錢

右歸飲 補命門真火不足

熟地 五錢 山藥 枸杞 各二錢 杜仲 二錢 山茱萸 肉桂

製附子 炙甘草 各一錢

大承氣湯 治邪熱閉結或食積堅硬

大黃 三錢 枳實 錢半 厚朴 一錢 芒硝 三錢

小承氣湯 治症稍緩即大承氣去芒硝

大柴胡湯 治傷寒邪入肺經脾經

柴胡 錢半 半夏 七分 黃芩 芍藥 各二錢 枳實 一錢

大黃 二錢

小柴胡湯 治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛

柴胡 二錢 赤芍 錢半 甘草 半夏 各一錢 黃芩 錢半 人參

生薑 各五分 大棗 三枚

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之

大黃 六錢 芒硝 四錢 甘遂 二分

研汁

小陷胸湯 治結胸小腹痛滿手不可近

半夏二錢 黃連錢半 瓜蒌仁大者一

細杵

搗鼻散 治一切悶症不省人事吹入鼻中有嚏者生

皂角一兩 生半夏五錢 細辛一兩 為細末收藏勿泄氣

補天大造丸 補五臟虛損

人參二兩 炙黃芪 炒白朮各三兩 炒棗仁 當歸兩半

山藥 茯苓兩半 枸杞子 大熟地各四兩 河車一具

鹿角一斤 龜板八兩 以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸

治痢奇方 暑月痢疾

川連六分 山查三錢 酒芩 厚朴 歸身 白芍各錢

甘草五分 桃仁 青皮 紅花各八分 枳壳 地榆各一錢

檳榔一錢 白痢加木香六分

通音煎 治音啞 白蜜一斤 川貝二錢 冬二錢 胡荽肉十二

右將川貝欵冬花為末四味和勻飯上蒸調服

開喉散 治喉口疔

人參

薑汁炒黃連

各五分

石葛蒲

七分

丹參

三錢

石蓮子

茯苓

陳皮

冬瓜仁

各錢半

陳米

一撮

荷葉蒂

三個

香蘇散

治時邪感冒頭痛發熱

蘇葉

錢半

陳皮

香附

各錢半

荊芥

秦艽

防風

各一錢

蔓荊子

各一錢

川芎

甘草

各七分

加生薑

三片

平胃散

治脾胃不和脹滿嘔吐霍亂等症

藿香

錢半

厚朴

八分

蒼朮

八分

陳皮

一錢

手拈散

治血滯心腹作痛

元胡索

醋炒

五靈脂

醋炒

草果

沒藥

各等分

右共為細末熱酒調服三錢

滾痰丸 治老痰變生怪症

大黃 炒黃芩各四錢 青蒙石 沉香各二錢 辰砂二錢

以水為丸辰砂為衣每服一二錢開水送下

小半夏加茯苓湯 治飲停膈間加茯苓更效

半夏一錢 炒白茯苓各三錢 炙草一錢 生薑三片

越鞠丸 治六般之鬱痞滿

製香附 山查 炒神曲 炒麥芽 川芎 蒼朮

炒梔子 等分為末水調丸如桐子大每服三錢

逍遙散 治肝經血虛木鬱

柴胡 炙草 茯苓 白朮 當歸 白芍 丹皮

黑山梔各一錢 薄荷五分

右為末水調服三錢

葛根湯 治邪傳陽明以此辭肌

葛根 二錢 升麻 秦艽 荆芥 赤芍 各一錢 蘇葉 八分

白芷 八分 甘草 五分 生薑 三片

牛黃丸 治中風痰火閉或喘嗽痰壅不省人事

牛黃 麝香 龍腦 各二錢 羚羊 當歸 防風 黃芩

柴胡 白朮 麥冬 白芍 各七錢 桔梗 茯苓 杏仁

川芎 大豆黃卷 阿膠 各八錢 蒲黃 人參 神麩 一兩

二錢 雄黃 四錢 甘草 二兩 白礞 肉桂 三錢 犀角 一兩

山藥 三兩 大棗 五片 金箔 百五十片 為衣

右為細末煉蜜為丸每兩作十九丸

附子理中 治臟寒將脫之症用以回陽

人參 白朮 各二錢 附子 乾薑 炙草 各一錢



益元散 利竅清暑

甘草一兩 茯苓三錢 滑石六兩 硃砂三錢 茯苓不用亦有

共研極細末冷開水調服

藿香正氣散

藿香 砂仁 厚朴 茯苓 紫蘇 陳皮各一錢 白朮

製半夏 桔梗 白芷各七分 炙甘草五分

茵陳大黃湯 治黃疸熱閉

茵陳三錢 梔子 大黃各二錢

茵陳薑附湯 治陰黃小便自利

茵陳一錢 白朮二錢 附子 乾薑各五分 炙草一錢

肉桂三分

蠲痺湯 治風寒濕三氣成痺

羌活 獨活 桂心 五分 秦艽 一錢 雷歸 桑枝 三錢

川芎 七分 海風藤 二錢 炙草 五分 乳香 木香 各八分

桂枝湯 治太陽中風寒

桂枝 芍藥 生薑 錢半 炙草 一錢 大棗 四枚

麻黃湯 治太陽傷寒無汗此方宜於西北

麻黃 三錢 桂枝 五錢

柴葛解飢湯 治溫熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異

柴胡 一錢 葛根 錢半 赤芍 知母 貝母 各一錢 生地 二錢

黃芩 丹皮 各錢半

白虎湯 治陽明胃腑大熱

生石膏 五錢 知母 三錢 甘草 二錢 梗米 一撮

若熱甚者倍之

白通加猪胆汁湯 治陰盛隔熱藥不入

製附子五錢 乾薑五錢 蔥白二錢 童便半杯 猪胆汁匙五

止咳散 治一切咳嗽

桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前各一錢 炙草十斤 陳皮一斤

共為末每服三錢初感風寒生薑湯下

團魚丸 治久咳將成勞瘵

川貝 知母 前胡 柴胡 杏仁各四錢 大團魚十二兩

右藥與魚同煮熟取肉食

月華丸 滋陰保肺平肝為治癆之聖藥

天冬 麥冬 生地 熟地 山藥 百部 沙參

川貝 真阿膠各一兩 茯苓 槲肝 廣三七各五錢

菊花 桑葉各二兩 膏阿膠化入煉蜜為丸 每服三錢

生地黃湯 治腎火燥金吐血鼻衄

大生地 三錢 牛膝 丹皮 黑山梔 各一錢 丹參 元參

麥冬 白芍 各一錢 鬱金 廣三七 荷葉 各七分

加陳墨汁清童便各半杯沖服

人參養榮湯 治氣虛榮衛不固

人參 白芍 二錢 蜜炙黃芪 當歸 白朮 熟地 各錢

炙草 茯苓 遠志 七分 北五味 桂心 陳皮 四分

加生薑二片 大棗二枚

秘精丸 理脾導濕治濁固精

白朮 山藥 茯苓 茯神 蓮子肉 二兩 芡實 四兩

連翹 牡蠣 兩 黃柏 五錢 車前子 三兩

共為末金櫻膏為丸

澤蘭葉湯 治經閉調血脉

澤蘭葉 二錢 柏子仁 當歸 白芍 熟地 牛膝

荒蔚子 各錢

補天大造丸 補五臟虛損

人參 二兩 蜜黃芪 蒸白朮 各三兩 炒棗仁 當歸身

山藥 茯苓 各五錢 枸杞子 大熟地 各四兩 河車 一具

鹿角 一斤 龜板 八兩

以龜鹿二膠和藥煉蜜為丸

普濟清毒飲 治大頭痘症喉風發癩等症

炙草 桔梗 酒苓 酒黃連 各二錢 馬勃 元參 五分

橋紅 柴胡 各五分 升麻 二分 連翹 牛蒡子 各八分

神虎散 治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食

蒼朮 陳皮 厚朴各二兩 炙草十一兩 藿香 八兩 砂仁四兩

共為末每服二三錢

朴黃丸 治堅積作痢腹痛拒按

陳皮 厚朴十兩 大黃二兩 廣木香四兩 荷葉水為丸

止瘡丹 治瘡二三發後以此止之

大酒炒常山 草果仁去壳 半夏麩 香附酒炒各四兩

真六神麩二兩 薑炒青皮四兩 米飲糊丸

和中丸 治腹脹食積

土炒白朮四兩 炒扁豆二兩 茯苓 砂仁各兩 半夏一兩

麩炒枳實 炒神麩 炒麥芽 炒山查 製香附

丹參酒蒸各二兩 陳皮 五穀蟲炒黃各三兩

右為末荷葉一枚煎水為丸

白朮丸 治氣虛中滿積食

白朮 茯苓 陳皮 砂仁 神麩兩 五穀蟲兩 炒三

用荷葉老米煎水為丸

金匱腎氣丸 治腎經聚水寒濕所致

大熟地八兩 山藥四兩 山萸肉 丹皮 澤瀉各二兩

茯苓 車前子 牛膝各二兩 查肉一兩 附子一兩

如水腫加五加皮八兩 煮煉蜜為丸每服三錢

秘旨安神丸 治驚悸神魂失守者

人參 棗仁 茯神 製半夏各二錢 當歸 炒白芍

橘紅各錢 五味子十粒 炙草五分 生薑三片

歸脾湯 養血安神 人參 白芍 白朮 當歸身

棗仁各錢 黃芪錢半 遠志七分 炙草五分 龍眼肉五

安神定志丸 治心場不卧

茯神 人參 遠志各一兩 石菖蒲 龍齒各五錢

蜜丸以辰砂為衣每服三錢

洋參 麥冬湯 治心經虛熱而痛者

洋參 麥冬 當歸各二錢 生地 三錢 白芍 丹參各一錢

釵石斛錢半 犀角 甘草五分

清心丸 清心火止夢泄

生地四兩 丹參二兩 黃柏 五錢 牡礪 山藥 炒棗仁

茯苓 茯神 麥冬兩半 北五味 車前子 遠志兩一

用金櫻膏為丸每服三錢

清膈煎 治痰壅心膈

製胆星錢一 白芥子錢二 海石錢二 陳皮 木通 川貝錢一



沉香降氣散 治心滯氣痛

沉香 三錢

砂仁 七錢

灸草 五錢

鹽水炒香附 五兩

酒炒

元胡索 一兩 煨淨川棟子 一兩

共為末每服二錢淡薑湯下

化蟲丸 治蟲積心腹諸痛

蕪荑

白雷丸

錢各五

檳榔 二錢

雄黃 錢半

木香

白朮

陳皮

錢各三

炒神麩 四錢

以百部 二兩 熬膏糊丸

每服錢半米飲下

薑附湯 治寒厥心痛又真心痛手足青色或有可救

人參

乾薑

熟附子

錢各三

導赤散 治熱閉小便不通

麥冬

錢三 木通

錢一 生地

錢三 炙草

分四 竹葉

車前

赤苓

錢

瀉心丸 治心火

川黃連五錢 為末蜜丸燈草湯下

生鐵落飲 治心熱

天冬 麥冬 川貝各三錢 胆星 橘紅各一錢 遠志一錢

石菖蒲 連翹 茯苓 茯神各一錢 元參 鈎藤各半錢

丹參錢半 辰砂三錢

用生鐵落煎熬三炷香取水煎服

萸解分清飲 治心移熱勝脫為赤濁者并治諸淋

川萸解 炒黃柏 石菖蒲各五分 茯苓 白朮各一錢

蓮子心七分 丹參 車前子一錢

阿膠散 治尿血

阿膠一錢 丹參 生地各二錢 黑山梔 血餘 丹皮

麥冬 當歸 各八分

甘露飲 治血虛胃熱

枇杷葉 生地 熟地 天冬 麥冬 黃芩 各一

石斛 一錢 甘草 枳壳 五分

柴胡疎肝散 治肝氣燥急脇痛

柴胡 陳皮 一錢 川芎 赤芍 枳壳 製香附 各一

炙草 一錢 水煎服

瓜蒌散 治肝氣燥急脇痛

大瓜蒌 一枚 連皮 甘草 二錢 紅花 七分

清空膏 治肝經風熱入升為頭痛

羌活 防風 各六分 柴胡 五分 黃芩 一錢 川芎 四分

炙甘草 一錢 薄荷 三分 酒炒黃連 六分

芍藥甘草湯 治木侮土而腹痛

酒炒白芍 三錢 炙甘草 半錢

奔豚丸 治小腹氣結作痛疝氣偏墜

川棟子 兩 茯苓 橘核 各半錢 肉桂 三錢 小茴香 七錢

木香 七錢 附子 吳茱萸 各五錢 荔枝核 八錢

橘核丸 通治七疝

鹽水炒橘核 二錢 小茴香 川棟子 桃仁 製香附

山查 各一木香 紅花 各五錢

以神麩打糊 二兩 丸如桐子 每服三錢

橘皮竹茹湯 治氣鬱大衝呃逆

陳皮 二錢 竹茹 一錢 半夏 人參 甘草 各一錢

水煎服

煖肝煎 治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣

沉香一錢 當歸 枸杞三錢 茯苓 小茴香 烏藥二錢

肉桂一錢 生薑三片

蟬花無比散 治目赤腫痛風火所致

蟬脫二兩 羌活一兩 川芎 石決明 防風 茯苓兩

赤芍兩半 白蒺藜八兩 炙甘草 當歸各三兩 蒼朮一兩

為未開水服

柴芩煎 治內火上衝或為痢瘡頭痛之症

柴胡 黃芩 梔子 澤瀉各錢半 木通 枳壳八分

消瘰丸 治療癰初起即散

蒸元參 蒸川貝母 煨牡蠣米醋煨

蜜丸每服三錢

五痿湯 治五臟受熱而痿

人參 白朮 茯苓 炙甘草 四分 當歸 棗仁 三錢

黃柏 知母 各五分

歸芍六君子湯 治脾陰血虛下血

歸身 白芍 各二錢 人參 白朮 茯苓 炙甘草 五分

半夏 陳皮 一錢

大和中飲 治食積脹悶

枳實 一錢 厚朴 錢半 麥芽 查炭 各一錢 陳皮 錢一 砂仁 分

澤瀉 一錢

大無神功散 治一切痞積

地扁蓄 瞿麥穗 麥芽 各五錢 神曲 二錢 沉香 一錢

木香 錢半 炙甘草 五錢 酒蒸大黃 二兩

為末每服二錢燈心竹葉湯女人紅花當歸湯調服

香砂二陳湯 治脾滯腹滿腹痛

木香 砂仁各一錢 製半夏 陳皮 茯苓 炙草各錢

加生薑二片 大棗二枚

蒼白二陳湯 治受濕身痛

即前方去香砂加蒼朮白朮

保和丸 治傷食

麥芽 山楂 萊菔子 厚朴 香附錢 炙草 連翹

陳皮一錢 煎服亦可

木香丸 治寒積腹痛拒按名曰陰結

木香 丁香各錢 乾薑一錢 炒麥芽 五錢 陳皮 三錢

巴豆三十神曲糊丸每服二錢

滋腎丸 治下焦血熱用此滋陰化氣

黃柏 知母各二錢 肉桂 一錢 蜜小丸服二錢

枳朮丸 除脹消食

炒枳實二錢 炒白朮二錢

和胃飲 治霍亂

厚朴 陳皮各二錢 乾薑一錢 炙草六分

玉女煎 治陽明有餘少陰不足

熟地黃四錢 石膏 麥冬各三錢 知母半錢 牛膝半錢 炒

抽薪飲 治一切火盛

黃芩 石斛 木通 梔子 黃柏各二錢 枳壳一錢五分

澤瀉半錢 甘草三分

煎水服



犀角大青湯 治胃火發癩大瀉太熱或咽痛不利

犀角尖 大青 元參 甘草 升麻 黃芩 薄荷

黃柏各二錢 人中黃 黑山梔各錢

或加石膏一兩同煎

安胃飲 治胃火呃逆

石斛 麥芽各三錢 黃芩 澤瀉 山楂 陳皮各一錢

木通一錢 研末米湯調下

加味升麻湯 治胃火上衝頭痛甚熾

升麻 葛根 赤芍 甘草各一錢 石膏三錢 薄荷五分

溫膽湯 治膽氣虛寒夢遺滑精

製半夏錢半 枳實八分 陳皮 茯苓各錢 人參一錢

大熟地 炒棗仁各三錢 遠志一錢 五味 甘草五分 生薑三片

五味子

灸甘草

推氣散 治右脇氣痛

枳壳

鬱金

各一錢

桂心

炙草

各五

桔梗

陳皮

八分

生薑

二片

大棗

二枚

桔梗湯

治肺癰

桔梗

白芨

橘紅

炒甜葶

各六

甘草

貝母

錢

苡仁

金銀花

各五

瀉白散

治肺熱

蜜炙桑白皮

二錢

地骨皮

三錢

蒡根湯

治衄血神煩

蒡根

黃芩

阿膠

側柏葉

生地

各二

甘草

一錢

犀角地黄湯

治血熱妄行及斑疹

中西匯編醫學

備用諸方

六十二

醫書局印行

犀角尖 銹先煎 丹皮 麥冬 白芍錢 生地 四錢

黃芩 知母湯 治火嗽煩熱

黃芩 知母 桑白皮 杏仁 天花粉 山梔錢

川貝 桔梗 生甘草錢

黃芩清肺飲 治肺熱小便不利

梔子二錢 黃芩一錢

生地黄煎 治陰火盜汗

生地 當歸 炙黃芪 麻黃根 浮小麥 炙甘草

黃連 黃芩 黃柏各一錢

王母桃 培補脾腎

炒冬虎 大熟地各二兩 何首烏 炒巴戟 枸杞各一兩

蜜丸 龍眼大每三四丸 飢時服

香砂理中湯 治脾寒腹痛

木香 砂仁各錢 人參 白朮各二錢 乾薑 炙草各一錢

黃芩芍藥湯 治脾熱流涎利如蟹渤等症

黃芩 白芍各二錢 生甘草一錢

加味枳朮湯 治酒疸濕發黃

白朮二錢 枳實 陳皮 麥芽 山查 茯苓 神麩

連翹 茵陳 荷葉各錢 澤瀉五分

如傷酒加葛根一錢

葛花消脾湯 治酒濕生熱生疾頭眩頭痛

葛花一錢 枳實三錢 赤苓三錢 澤瀉 茵陳 酒苓各二錢

山梔 車前子各錢 甘草五分 橘紅 厚朴各一錢

梔子蘘皮湯 治鬱熱在裡陽黃症

梳子三錢 黃柏二錢 灸草一錢

桔梗前胡湯 治肺氣閉塞悶咳

桔梗一錢 前胡 蘇子 赤芍 桑白皮 陳皮各錢

杏仁三錢 薑沙竹茹一錢 生甘草五分

加味甘桔湯 治肝鬱哮喘等症

甘草五分 桔梗 川貝 百部 白前 橘紅錢半

旋覆花 茯苓各錢

貝母瓜蒌散 治肺熱液乾

貝母二錢 瓜蒌仁錢半 膽星 黑山梳各五分 炒黃連一錢

黃芩 橘紅 炒甘草五分

紫苑散 潤肺止咳並治肺痿

人參 紫苑 知母 川貝 桔梗 茯苓 阿膠錢

鴉膽子 治久痢寒積在腸

用鴉膽子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水吞  
下空心團吞

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者

荊芥

炒黑

當歸

五錢

加槐花

三錢炒焦  
史見奇效

通關散 吹鼻取嚏

皂角

細辛

各二錢

生半夏

二錢

共研末極細

益母勝金丹 調經行血

砂仁拌熟地

酒蒸川芎

酒蒸茺蔚子

土炒冬朮

酒炒香附

各四兩

酒炒白芍

酒炒當歸

各四兩

以益母草八兩酒水各半熬膏蜜丸開水下

獨聖散

去瘀積

五靈脂

去土炒

為末醋丸酒送下

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱

龍胆草

澤瀉

各一錢

車前子

木通

生地

山梔

酒炒當歸

黃芩

甘草

各五分

脫花煎 凡將產先服此方催生最佳胎死腹中加朴硝

當歸

八錢

肉桂

三錢

川芎

牛膝

各二錢

車前子

錢半

紅花一錢

歸薑湯

產後去瘀心慌自汗

當歸

三錢

黑薑

七分

炒棗仁

錢半

煎湯服

花蕊石散 治瘀血服此能化水

花蕊石片一土色硫黃四兩一錢和勻為末入瓦罐封固用

炭煨二炷香取出再研童便酒下

生化湯 治產後去瘀要藥

當歸三錢黑薑五分川芎錢半益母草一錢桃仁七粒

神仙太乙膏 治一切癰疽

元參 白芷 當歸 肉桂 生地 赤芍 大黃兩一

黃丹十三兩蘇油二觔熬藥去渣成珠滴水成珠是

也入黃丹再熬成膏聽用

解恨煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿

陳皮 半夏 厚朴 茯苓各錢 蘇葉 芍藥各一

砂仁七分如脇肋脹痛加白芥子一錢胸膈氣滯加枳壳



香附藿香

各七

贊育丹

治男子精衰陽痿而艱子息

大熟地

白朮各八

當歸

枸杞

各六杜仲

仙茅

巴戟肉

山茱萸

淫羊藿

肉蓯蓉

各四蛇

从一山

附子

肉桂

各一

毓麟珠

治婦人氣血兩虛而經不調不孕者

人參

白朮

茯苓

芍藥

川芎

炙草

杜仲

鹿角霜

川椒

各二

熟地

當歸

兔絲子

各四

蜜丸空心服三錢