

臨證指南醫案

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾痺

癱

瀉

臨證指南醫案卷六

許嗣李大瞻翰開

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

姪 旦玉堂

鬱

子五

鬱損心陽。陽墜入陰爲淋濁。由情志內傷。卽爲陰虛。

致病。見症亂治。最爲庸劣。心藏神。神耗如憤。諸數失司。

非偏寒偏熱藥治。必得開爽。冀有向安。服藥以草木功。

能恐不能令其歡悅。妙香散

心脾氣
結神志
不清

陸二人參 桔梗 烏藥 木香 各三分磨汁

又 夜服白金丸

又 入腎心脾氣結利痰佐以益氣

人參 石菖蒲 龍骨 棗仁

遠志 茯神

心下痞
結

胡四悲泣乃情懷內起之病。病生於腎。形象漸大。按之堅

硬正在心下。用苦辛泄降。先從氣結治。

川連 乾薑 半夏 薑汁

茯苓 連皮瓜蒌

李六九老年情志不適。腎則少火。變壯火。知飢。脘中不爽。口

舌糜爲心脾營損木火劫燥精華肌肉日消惟怡悅開
爽內起鬱熱可平但執清火苦寒非調情志內因鬱熱
矣

金石斛

連翹心

炒丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接服養心脾之營少佐苦降法

人參

川連

炒丹皮

生白芍

小麥

茯神

某

腕痛已止味酸乃肝鬱也

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴

橘紅

枇杷葉

某 初起左邊麻木舌強筋引腦後痲痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

玄參

石膏蒲

鬱金花

某 氣鬱不舒木不條達暖則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈

三脈虛清情懷失暢肝脾氣血多鬱牛載不愈難任暖

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛寒爲泥。

吳以勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宜補

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉氏

悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和藥

栝子仁

二錢

歸身

二錢

延胡

三錢

生白芍

一錢

小川連

三錢

川棟子

一錢

某

惱怒肝鬱思慮脾傷胃氣不濟。脘不成寐。宗薛氏法

治之

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏

隱情曲意不伸。是爲心疾。此草木攻病。難以見長。乃

七情之虧損。以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神效紫丸

程頤

脈弦澹外寒內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不舒

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝鬱

吳一

操持過動肝胆陽升胃氣日減脈應左搏從鬱熱治

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸二

鬱傷筋脹心痛

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃
氣逆血

王六

勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便溏風木侮土前方

既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加茯苓仁栢仁當歸薑棗湯法

肝火升

朱三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火
但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之
合乎肝爲剛臟濟之以柔亦和法也

生地 天冬 阿膠 茯苓 川斛

牡蠣 小麥 人中白 熬膏

通四 鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飽肝陽

上管風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也昔氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣從肝胆相火非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

川斛

黑檜豆皮

胆脾氣
血虧

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹滿逆氣。上衝此邪鬱既久。少火化爲壯火。氣鈍不循胞脈。遂痺治以泄少陽補太陰。氣血流利鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上升
升發

吳三

脈弦滿數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆

厚

情志鬱勃，肝胆相火，內風上循清竅。雖清熱直降，難制情懷之陽。是以類藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

本火上
升肺不
肅降

朱

情懷怏鬱。五志蒸蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

牛夏

茯苓

荷汁

竹瀝

又

張左大弦數。頭目如蒙。背俞脹。都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃。頭目已清。而膈暖氣。頗覺穢濁。此肝
胆厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣。自肝而出。
是其明徵矣。

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱先
清上焦

吳氏氣血鬱滯。久乃化熱。女科八脈失調。漸有經阻。痞帶
諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

酸火上
痰

徐氏 火升頭痛來去無定期。咽喉垂下。心悸。二便不爽。帶

下不已。固奇經。通補陽明。及養肝熄風。展轉未能却病。病從情志內傷。治法惟宜理偏。議先用滋腎丸三錢。早上淡鹽湯送。四服。

鬱熱

虞三 脈數。舌白神呆。得之鬱怒。

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷

王三 痰多咽痛。頻遭家難。鬱傷。心中空洞。哈逆不已。痰與

胃藥。金匱麥門冬湯

鬱損
絡痰飲
阻氣

陸二
五病起憂慮上損。兩年調理。幾經反覆。今夏心胸右脇之間。常有不舒之象。此氣血內鬱少展。支脈中必有痰飲氣阻。是宜通流暢脈絡。夏季宜進商矣。

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法女

血絡鬱
痺右脇
痛

趙六
二脈左澹。右弦。始覺口鼻中氣觸腥穢。今則右脇板痛。呼吸不利。卧着不安。此屬有年鬱傷。治當宣通脈絡。

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香

肝陰
肝熱

王女陰虛。齒衄腸血。未出閣。鬱熱爲多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎熱

張六情志連遭鬱勃。腦陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。心動

悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在至陰。鹹補苦泄。是爲醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液

肝腎液。厥陰少陰。臟液乾涸。陽升結痺於喉。舌苔。心境失暢。

所致藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣。

外來之偏耳。

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

栝子仁

茯神

絡氣
血虧

顛五

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫
腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通。五鬱六鬱大旨。

香附汁

白茯苓

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金 氣血久鬱成熱。脘脇痺悶不通。常有風疹腹痛。癢痺
已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜蘆皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

桃仁 杏仁

楊 驚惶忿怒。都主肝腸上胃。血沸氣滯。痰濁宜宣通以就下。因悞投止塞。舊瘀不清。新血又瘀絡中。匝月屢屢反覆。究竟肝胆氣血皆鬱。仍宜條達宣揚。滿瘍在肌。得體中稍健設法。

旋覆花 新絳 青蔥管 炒桃仁 栝子仁

趙氏 癩癧寒熱盜汗。腕中痠聚。經期不來。大便澀。陰咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附 丹皮 歸身 白芍

川貝 茯苓 牡蠣 夏枯草

胡氏頭項結核。暮夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸

炒白芍

炙草

廣皮

茯神

鈎藤

南棗

張氏據說。喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知創不能食。內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期。色變瘀紫。半年來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能爲矣。

人參

當歸

生白芍

炙草

肉桂

炒杞子

茯苓

南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣有

太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱。而况於人乎。故六氣着人。皆能鬱而致病。如傷寒之邪。鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結在三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而成痺症。總之邪不散。即謂之鬱。此外感六氣而成者。也。前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱而成病矣。其症心脾肝胆爲多。案中治法。有清泄上焦鬱火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄胆補脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用鹹補苦泄。種種治法。

未能按症分析詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分久延血分。延及鬱勞沉疴。故先生用藥大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱。斂滯呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯或在形軀。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。鬱則氣聚。聚則似有形。而實無質。如胸膈似阻。心下虛痞。脅脹背脹。腕悶不食。氣瘕攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之滯。放膽用破氣攻削。迨至愈治愈劇。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於藥矣。不知情

志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降閉闔。樞機不利。雖內經有泄折達發奪五鬱之治。猶慮難獲全功。故疏五過論。有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者能移情易性。醫者構思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用辛理氣。而不破氣。用滑潤濡燥澀。而不滋膩氣機。用宣通而不擾。萬助長。庶幾或有倖成。若必欲求十全之治。則惟道家有一言可以蔽之曰。欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華輔雲

肝火

風火上

秦氏

年前肝風眩暈。主以涼血分。和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒。非比天暖開泄。此番病發。必因勞怒觸動。情志。至於嘔逆微冷。條熱交丑寅。漸作耳鳴。咽痺。食納久留。腕中想少陽木火盛於寅。膽脈貫耳。犯逆之威。必向陽明。而後上憑諸竅。脈右濇大。胃逆不降。食味不甘。而腕中逆亂。薰蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寤不肯寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重腕痺。全是上焦爲木火升騰。阻遏清陽。前方滋清血藥居多。必不奏功。

今議湯劑方。以苦降其逆。辛通其痺。然湯宜小。其製度。以久病體虛。初春若此。冬藏未爲堅固。可知。其丸劑當以局方龍薈丸。暫服半月再議。

連翹

一錢半

黑梔皮

一錢

羚羊角

一錢

鮮菊葉

三錢

紫苑

鬱金

八分

大杏仁

去皮尖勿研六粒

土瓜萹皮

一錢

鮮菖蒲根

四分

午服

沈女腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱下焦冷。肝陽尙未和平。

擬進當歸龍薈法。

當歸

龍胆草

川棟子

蘆薈

川連

吳萸

大茴

黃氏 肝膽風火上鬱。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

羚羊角

犀角

山梔

連翹

瓜蒌皮

荷葉梗

薄荷梗

青菊葉

鄭氏 筋脈神迷。經脈抽痛。脹悶不欲納食。一月經期四至。

此鬱傷氣血成病。龍膏丸二錢五分三服。

葉氏 厥陽擾亂神明。經色已黑。肢冷面青便秘。

龍膏丸一錢二分十服

勞心陽
動不火
上蒙

關十誦讀吟咏。身雖靜坐。而心神常動。凡五志之動皆陽。

陽胃無制。清靈遂蒙。易旨以蒙乃外加之義。述病發之時。頭中欲掐。腕欲撫摩。二便必不自利。此腑氣之窒。由

乎肝胆厥佛逆起見矣。議從手經上焦治。

羚羊角

蓮翹心

玄參

石膏蒲根

鬱金

麥冬

竹葉

唐女

脈左瀉右弦氣火不降胸脇隱痛腕不爽最慮失血

川貝

山梔

丹皮

鬱金汁

鈎藤

瓜蒌皮

茯苓

橘紅

又氣火上鬱腕中空痛嘔涎先以開通壅遏

香豉

瓜蒌皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏麴

杏仁

葛 嗔怒喧嚷氣火逆飛致血痺咽痛食物厭惡耳前後

氣火鬱
腕痛

達有閃刺。議解少陽。

夏枯草

丹皮

桑葉

鈎藤

山梔

地骨皮

肝腎虛
虛風陽
主升

朱

五

頭痛神煩。

忽然而至。

五行之速。

莫如風火。

然有虛實。

四

內外之因。非徒發散苦寒爲事矣。如向有肝病。目疾。夜

明。是陰氣久傷體質。今厥陰風木司天。春深發泄陽氣。

暴張。卽外感而論。正內經冬不藏精。春必病溫。育陰可。

使熱清。大忌發散。蓋陰根久傷。表之再傷。陽劫津液。仲。

景謂一逆尙引日。再逆促命期矣。余前主阿膠雞子黃。

湯。佐地冬。壯水。芍甘培土。亟和其厥陽。衝迎之威。鹹味。

入陰甘緩其急與內經肝病三法恰合今已入夏三日
虛陽條上煩躁頭痛當大滋腎母以甦肝子補胃陰以
杜木火乘侮旬日不致反覆經月可望全好

人參

熟地

天冬

麥冬

龜膠

阿膠

北味

茯神

陸 鼻左竅有血左肩胛臂痛皆君相多動營熱氣偏脈
得右虛左數先以清肝通絡

丹皮

山梔

羚羊角

夏枯草

蚕沙

鱉膠

連翹

青菊葉

肝者將軍之官相火內寄得真水以涵濡真炁以制

伏。木火。遂生生之機。本無是症之名也。蓋因情志不舒。則生鬱。言語不投。則生嗔。謀慮過度。則自竭。斯罷極之本。從中變火。攻衝激烈。升之不熄。爲風陽抑而不透。爲鬱氣。腕脇脹悶。眩暈猝厥。嘔逆淋閉。狂躁見紅等病。由是來矣。古人雖分肝風。肝氣。肝火之殊。其實是同一源。若過鬱者。宜辛宜涼。乘勢達之。爲安過升者。宜柔宜降。緩其旋擾。爲先。自竭者。全屬乎虛。當培其子母之臟。至於犯上侮中。乘下。諸累。散見各門。可攷。

邵新甫

不寐

倪 多痛陽升陰液無以上注舌潤赤絳煩不成寐當益

腎水以制心火

鮮生地

玄參

麥冬

菉豆皮

銀花

竹葉心

吳

少陽鬱火不寐

丹皮

牛夏

鈎藤

桑葉

茯苓

橘紅

程氏

上晝氣逆填腕子夜寤不肯寐乃陽氣不降議用溫

陽蹻脈
虛

膽湯 溫膽去思實加金斛 滾痰丸二錢五分

頭四鬚髮已蒼。面色已光亮。操心煩勞。陽上升動。痰飲亦得。上溢。靈樞云。陽氣下交入陰。陽蹻脈滿。令人得寐。今氣越外。泄陽不入。陰勉飲酒醴。欲其神昏假寐。非調病之法。程凡中年已後。男子下元先損。早上宜用八味丸。暇時用半夏秫米湯。

某 陽不交陰。夜卧寐躁。小半夏湯

趙氏 嘔吐眩暈。肝胃兩經受病。陽氣不交於陰。陽蹻穴空。寤不肯寐。靈樞方半夏秫米湯主之。

又 接用人參溫膽湯

某二脈清不能充長肌肉夜寐不適脾胃消索無以灌溉故耳當用歸脾湯意溫之。

嫩黃芪 於木 茯神 遠志 棗仁

當歸 炙草 桂圓 新會皮

某 肝陽不降夜無寐進酸棗仁法

棗仁 知母 炙草 茯神

小麥 川芎

某 不寐六十日溫胆諸藥不效嘔痰不適明係陽升不降用金匱酸棗仁湯

棗仁 知母 茯苓 川芎 炙草

陳 陰精走泄。復因洞瀉。重亡津液。致陽暴升。胃逆食入。欲嘔。神識不靜。無寐。議酸棗仁湯。

棗仁 五錢

炙草 五分

知母 二錢

茯苓 二錢

某^三 寤不成寐。食不甘味。脛羸。脈細數。清陰液內耗。厥陽外越。化火化風。燔燥煽動。此屬陰損。最不易治。姑與仲景酸棗仁湯。

棗仁

炒黑勿研三錢

知母

牛一錢

雲茯神 三錢

生甘草

五分

川芎

五分

田 臟液內耗。心腹熱灼。陽氣不交於陰。陽踞穴空。令人寤不成寐。靈樞有半夏秫米法。但此病乃損及肝腎。欲

求陽和須介屬之醜佐以酸收甘緩庶幾近理

龜膠

淡菜

熟地

黃柏

茯苓

萸肉

五味

遠志

又

醜苦酸收已效下焦液枯須填實肝腎

龜鹿膠

熟地

菴蓉

天冬

萸肉

五味

茯苓

羊內腎

不寐之故雖非一種總是陽不交陰所致若因外邪而不寐者如傷寒瘧疾等暴發營衛必然空塞升降必然失常愁楚呻吟日夜難安當速去其邪按外卽所以安內也若因裏病而不寐者或焦煩過度而離

宮內燃從補心丹及棗仁湯法或憂勞憤鬱而耗損
心脾宗養心湯及歸脾湯法或精不凝神而龍雷震
蕩當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而魂搖
神漾有鹹補甘緩法胃病則陽踏穴滿有靈樞半夏
秫米湯法膽熱則口苦心煩前有溫胆湯先生又用
桑葉丹皮山梔等輕清少陽法營氣傷極人參人乳
並行陽浮不攝七味八味可選餘如因驚且鎮因怒
宜疎飲食痰火爲實新產病後爲虛也 邵新甫

饅

陽升

某

陽升饅雜

麥冬 三錢

生地 二錢

柏子仁 一錢

川斛 三錢

茯神 三錢

黑檀豆皮 三錢

心熱

某

心中煩熱。頭上汗泄。汗止自安。易饅。

淮小麥

栢子仁

茯神

炙草

南棗

辰砂

血虛

程氏

血虛心饅。咽哈。

生地

天冬

麥冬

女貞子

官商登七百有餘

卷之饅

丸

肝陰虛

某氏

經半月一至。夜體痛

生白芍

炙草

茯神

麻仁

生地

阿膠

天冬

茯神

白芍

丹參

體有虛實。真偽其病總在於胃。經云。飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。又云。脾與胃以膜相連耳。又云。脾主爲胃行其津液者也。由此觀之。脾屬陰。主乎血。胃屬陽。主乎氣。胃易燥。全賴脾陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。故一陰一陽互相表裏。冲和之德。而爲後天生化之源也。若脾陰一虛。

則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾不能稍留津液以自潤則胃過於燥而有火矣故欲得食以自資稍遲則饑雜愈甚得食則饑可暫止若失治則延便閉三消噎膈之症治宜補脾陰養營血兼補胃陰甘涼濡潤或稍佐微酸此乃脾陰之虛而致胃家之燥也更有一切熱病之後胃氣雖漸復津液尚未充亦有是症此但以飲食調之可以自愈此二種乃爲虛饑症所謂實者年歲壯盛脾胃生發之氣與腎陽充旺食易消糜多食易饑而饑得食即止此非病也不必服藥以上皆是真饑症所云僞者因胃有痰火以致

飲食輪化不清。或現惡心吞酸。發煩眩暈。少寐。似饑非饑。雖飽食亦不能止。此乃痰火爲患。治宜清胃。積佐降痰。苦寒及膩滯之藥不宜多用。又有胃陽衰微。以致積飲內聚。水氣泛溢。似有凌心之狀。淒淒戚戚。似酸非酸。以辣非辣。飲食減少。此屬脾胃陽虛。治宜溫通。微痰飲門而治之。此二種乃似饑之偽症。若夫所云心饑者。誤也。心但有煩而無饑。胃但有饑而無煩。亦不可不辨明之。今先生之法。僅有四案。倘好善之士。更能搜採補入。則幸甚。華岫雲

三消

腎火

計四能食善飢渴飲日加癯瘦心境愁鬱內火自燃乃消症大病

生地

知母

石膏

麥冬

生甘草

生白芍

煩勞心
宮熱

王五八肌肉瘦減善飢渴飲此久久煩勞壯盛不覺體衰病

發皆內因之症自心營肺衛之傷漸損及乎中下按脈

偏於左搏營絡虛熱故苦寒莫制其烈甘補無濟其虛

是中上消之病

肝陽化胃

又 固本加甜沙參

楊二 肝風厥陽上冲眩暈犯胃為消

石膏

知母

阿膠

細生地

生甘草

生白芍

某

液涸消渴是臟陰為病。但胃口不醒生氣易振。陽明

陽土非甘涼不復肝病治胃是仲景法。

人參

麥冬

粳米

佩蘭葉

川斛

陳皮

犀角 三錢

鮮生地 兩

玄參 心 二錢

鮮白沙參 二錢

麥冬 二錢

柿霜 一錢

生甘草 四錢

鮮地骨皮 三錢

胡五元陽變動爲消與河間甘露飲方 河間甘露飲

錢五陽動消燥甘澀和陽生津

生地 炙黑甘草 知母 麥冬

棗仁 生白芍

楊六渴飲頻飢。漉溺渾濁。此屬腎消。陰精內耗。陽氣上燔。舌碎絳赤。乃陰不上承。非多熱宜。此乃臟液無存。豈是平常小恙。

熟地 萸肉 山藥 茯神

牛膝 車前

野陰 某 脈左數能食 六味加二冬龜版女貞旱蓮川椒

臨證指南醫案 卷六 三消 五

腎陰虛
心火亢

王四
五

形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也。古人謂入水無物
不長入火無物不消。河間每以益腎水制心火。除腸胃
激烈之燥。濟身中津液之枯。是真治法。玉女煎

姜

三

經管無有不勞心。心陽過動而腎陰暗耗。液枯渴愈

燔灼。凡入火之物。必消燥乾枯。是能食而肌肉消瘠。用

景岳玉女煎

三消一症。雖有上中下之分。其是不越陰陽。九津

潤熱滯而已。攷古治法。唯仲景之腎氣丸。助真火。蒸

化。上升津液。本事方之神効散。取水中鹹聚之物。遂

其性而治之。二者可謂具通天手眼。萬世準繩矣。他

如易簡之地黃引子朱丹溪之消渴方以及茯苓丸
黃芪湯生津甘露飲皆錯雜不一毫無成法可遵至
先生則範於法而不囿於法如病在中上者厥膜之
地而成煩原之揚卽用景岳之玉女煎六味之加二
冬龜甲旱蓮一以清陽明之熱以滋少陰一以救心
肺之陰而下瀉真液如元陽變動而爲消燥者卽用
河間之甘露飲生津清熱潤燥養陰甘緩和陽是也
至于壯水以制陽光則有六味之補三陰而加車前
牛膝導引肝腎斟酌變通斯誠善矣 新滋丸

脾瘵

中虛伏熱

某無形氣傷熱邪蘊結不飢不食豈血分臃滯可投口
甘一症內經稱為脾瘵中焦困不轉運可知

川連

淡黃芩

人參

枳實

淡乾薑

生白芍

某

口甜是脾胃伏熱未清宜用溫胆湯法

川連

山梔

人參

枳實

花粉

丹皮

橘紅

竹茹

生薑

口甘一症。內經謂之脾瘴。此甘非甘美之甘。瘴卽熱之謂也。人之飲食入胃。賴脾真以運之。命陽以腐之。譬猶造酒蒸釀者然。倘一有不和。肥甘之疾。頓發。五液清華失其本來之真味。則滯滯之甜味。上泛不已也。胃脘必痞。口舌必膩。不飢不食之由。從此至矣。內經設一蘭草湯。其味辛。足以散結。其氣清。足以化濁。除陳解鬱。利水和營。爲奇方之祖也。夾暑夾溼之候。每兼是患。以此爲君。參以苦辛之勝。配合瀉心等法。又如胃虛穀少之人。亦有是症。又當宗大牛夏湯及六君子法。遠甘益辛可也。邵新甫

脾瘕症經言因數食甘肥所致。蓋甘性緩肥性膩。使脾氣過鬱。致有口甘內熱中滿之患。故云治之以蘭。除陳氣也。陳氣者卽甘肥釀成陳腐之氣也。夫蘭草卽爲佩蘭。俗名爲省頭草。婦人插於髻中以辟髮中油膩之氣。其形似馬蘭而高大。其氣香。其味辛。其性涼。亦與馬蘭相類。用以醒脾氣。滌甘肥也。今二案中雖未曾用。然用人參以助正氣。餘用苦辛寒以開氣。泄熱。枳實以理氣滯。亦祖蘭草之意。卽所謂除陳氣也。此症久延。卽化燥熱。轉爲消渴。故前賢有膏粱無厭。發癰疽熱燥所致。淡薄不堪。生腫脹寒濕而然之。

論余於甘肥生內熱一症悟出治胃寒之一法。若貧人淡薄茹素。不因外邪亦非冷飲停滯。其本質有胃寒症者。人皆用良薑丁香華撥吳萸乾薑附子等以溫之。不知辛熱剛燥能散氣。徒使胃中陽氣逼而外泄。故初用似效。繼用則無功。莫若漸以甘肥投之。或稍佐鹹溫。或佐酸溫。凝養胃陽。使胃脂胃氣日厚。此所謂藥補不如食補也。又有腎陽胃陽兼虛者。曾見久服鹿角膠而愈。卽此意也。未識高明者以爲然否。

華輔美

瘧疾

瘧

孫陰氣先傷陽氣獨發猶是伏暑內動當與金匱瘧瘧同例。

竹葉

麥冬

生地

玄參

知母

梨汁

蔗漿

施發熱身痛咳喘暑濕外因內阻氣分有似寒慄皆肺病也

竹葉

連翹

薄荷

杏仁

滑石

鬱金汁

又微寒多熱。舌心乾。渴飲。腕不爽。此屬瘧瘧。治在肺經。

杏仁

石膏

竹葉

連翹

半夏

橘紅

程 陰氣先傷。陽氣獨發。有瘧熱無寒之處。

鮮生地

知母

麥冬

竹葉心

滑石

唐 未病形容先瘦。既病暮熱早涼。猶然行動安舒。未必

真正重病傷寒也。但八九日。病來小愈。驟食粉糲腥麪。

當宗食穀發熱。損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。

食滯阻其腸胃。大腑不司變化。究其病根。論幼科體具

純陽瘦損於病前。亦陽亢為消燦。仲景謂瘧瘧者。單熱

不寒本條云陰氣孤絕陽氣獨發。熱灼煩冤令人消燥。肌肉亦不設方。但云以飲食清主之。嘉言言主以甘寒生津可愈。重後天胃氣耳。洞瀉既煩。津液更傷。苦寒多餌。熱仍不已。暮夜昏譫。自言胸中格拒。腹中不和。此皆病輕藥重。致陰陽二氣之殘備。法當停藥與穀。諒進甘酸解其煩渴。方有斟酌。

又鼻煤唇裂舌腐。頻與芩連。熱不肯已。此病本輕。藥重於攻擊。致流行之氣結閉不行。帶過不通。其熱愈甚。上則不嗜飲。不納食。小溲頻利。便必管痛。三焦皆閉。神昏痰凝有諸。

連翹心

錢三

鮮石蓴加汁

牛一錢

川貝母

錢三

杏仁

粒二十

射干

二分

淡竹葉

牛一錢

又 自停狼藥日有向愈之機。胃困則痞悶不欲食。今雖未加餐。已知甘美。皆滯之漸也。童真無下虛之理。溲瀉欲出尿管必痛。良由肺津胃汁。因苦辛燥熱烈氣味。劫奪枯槁。腸中無以運行。庸醫覩此。必以分利。所謂泉源既竭。當滋其化源。九竅不和。都屬胃病。

麥門冬

錢二

甜杏仁

錢四

甜水梨皮

錢三

蔗漿

一木

張 舌赤煩汗不寐。取體忽冷。乃穉年痺瘧。暑邪深入所致。

致。

杏仁

滑石

竹葉

西瓜翠衣

知母

花粉

又

熱甚而厥。幼穉瘧症皆然。

竹葉石膏湯去人參半

夏加知母

某

風溫陽瘧

杏仁

滑石

連翹

黃芩

青蒿

淡竹葉

丁

脈右數左小弱面明。夏秋伏暑。寒露後發。微寒多熱。

嘔逆身痛。蓋素有痰火。暑必挾濕。病自肺經而起。致氣

不宣化不飢不食。頻瀉短縮。乃熱在氣分。當與溫瘧同

例忌葛柴足六經藥 桂枝白虎湯加半夏

胡 按仲景云脉如平人但熱無寒。骨節煩疼微嘔而渴者病名溫瘧。桂枝白虎湯主之。 桂枝白虎湯

蓋今年夏秋久熱。口鼻吸暑。其初暑邪輕小不致病。發秋深氣涼外束。裏熱欲出。與衛營二氣交行。邪與二氣遇觸。斯爲熱起。臨解必有微汗者。氣邪兩泄。然邪不盡。則混處氣血中矣。故聖人立法。以石膏辛寒清氣分之伏熱。佐入桂枝辛甘溫之輕揚。引導涼藥以通營衛。兼知母專理陽明獨勝之熱。而手太陰肺亦得秋金肅降之司。甘草粳米和胃陰以生津。此一

舉兼備方下自註云一劑知二劑已知者謂病已知其對症已者中病當愈之稱耳

鄧、寒少熱多胸中痞脹溫邪未解設言止截

淡黃芩 炒半夏 薑汁 生白芍

草菓 知母 烏梅

又 照前方去半夏薑汁加鱉甲

吳 間日寒熱自黃口渴溫邪兼雨濕外薄爲瘧

滑石 杏仁 白蔻仁 淡黃芩

半夏 鬱金

又 脈數舌紅口渴熱邪已入血分

竹葉

石膏

生地

丹皮

知母

青蒿梗

又

飲食不節腹中不和瘧邪攻胃

鮮首烏

烏梅肉

生鱉甲

黃芩

丹皮

草菓

知母

送保和丸二錢

又

人參

生穀芽

枳實汁

茯苓

廣皮

炒半夏

朱

舌黃煩渴身痛心腹中熱躁暑熱不解爲瘧經言暑

脈自虛皆受從前疲藥之累瘵

石膏

知母

生甘草

炒粳米

麥冬

竹葉

何勞倦傷氣遺洩傷陰暑邪變癰熾則煩冤最盛分解使邪勢輕。參朮芪附皆固閉邪氣也。

草果仁

知母

淡黃芩

川貝母

青蒿

花粉

馮暑傷氣分上焦先受。河間法至精至妙。後醫未讀其書焉能治病臻效。邪深則瘧來日遲。氣結必胸中混濛如痞。無形之熱。漸蒸有形之痰。此消導發散。都是劫津。無能去邪矣。

石膏

杏仁

半夏

厚朴

知母

竹葉

黃 脉數。目眦黃。舌心乾白。黃胎。口中粘膩。腕中病悶。不思納穀。由於途次暑風客邪內侵。募原營衛不和。致發瘧疾。夫暑必兼濕。濕也熱也。皆氣也。氣與邪搏。則清濁交混。升降自阻。古稱濕遏必熱自生矣。聖帝論病本乎四氣。其論藥方。推氣味理必苦降辛通。斯熱氣痞結可開。消導攻滯。香燥泄氣。置暑熱致病之因於不治。不識何解。

川連

黃芩

花粉

桔梗

白蔻仁

鬱金

橘紅

六一散

又苦降能驅熱除濕。辛通能開氣宣滯。已經見效。當減其製。仍祖其意。

川連

桔梗

白蔻仁

厚朴

茵陳

茯苓皮

銀花

白通草

胡。開口瘡。痰多。脫悶。汗多。心熱。伏暑。內熾。忌與風寒表藥。

滑石

黃芩

厚朴

杏仁

通草

白蔻

半夏

瓜蒌皮

知母

又黃芩

草果

知母

半夏

生白芍

烏梅

汪氏 微冷熱多。舌白脫悶。嘔惡暑穢。過募原爲瘧。

杏仁

鬱金

滑石

厚朴

黃芩

炒半夏

白蔻

橘紅

某 舌白脫悶。寒起四末。渴喜熱飲。此濕邪內蘊。脾陽不
主宣達。而成濕瘧。

厚朴

一錢

杏仁

一錢

草果仁

一錢

半夏

一錢

茯苓

三錢

廣皮白

一錢

某二 遞止。面浮漸及脫腹。

苡仁

桑白皮

茯苓

大腹皮

薑皮

廣皮

某間瘧寒熱俱微此屬濕瘧

杏仁 三錢

厚朴 一錢

桂枝木 五分

飛滑石 三錢

草果 八分

炒半夏 一錢

茯苓皮 三錢

綿茵陳 一錢

牛 八

寒來喜飲熱湯發熱後反不渴間瘧已四十日今雖

止不飢不思食五味入口皆變初病舌白乾嘔濕邪中

於太陰脾絡濕鬱氣滯喜熱飲暫通其鬱邪蒸濕中生

熱六腑熱灼津不運行至大便鞭秘此爲氣痺濕結當

薄味緩調令氣分清肅與脾約似同但仲景氣血兼治

此病却專傷氣分

炒黃半夏

生益智仁

綿茵陳

廣皮

厚朴

茯苓

又瘧止舌白不飢大便旬日不通此皆留邪堵塞經腑
隧道之流行久延必致腹脹癥瘕。

杏仁

白薤仁 半夏

厚朴

生香附汁

廣皮

茯苓皮 接服牛硫丸二錢

某 脈右弦左弱留邪未盡大便粘稀最防轉痢較七八
日前勢減一二但去疾務盡苦辛寒遂其蘊伏而通利
小便亦不可少。

草果

知母

厚朴

茯苓

木通

滑石

曹 身痛舌白口渴自利此濕溫客氣為瘧不可亂投柴
葛仲景有濕家忌汗之律

飛滑石 杏仁 鬱金 淡黃芩

白蔻仁 防已

又 濕甚為熱心痛舌白便澹治在氣分

竹葉心 麥冬 鬱金 菖蒲

飛滑石 橘紅 化服牛黃丸

又 心下觸手而痛自利舌白煩躁都是濕熱阻氣分議

開內閉用瀉心湯

川連 淡黃芩 乾薑 半夏

人參

枳實

又神氣稍清，痛處漸下至臍。濕傷在氣，熱結在血，吐衄帶血，猶是上行爲逆，熱病瘀留，必從下出爲順。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

白芍

炒查肉

費 舌白渴飲，身痛嘔惡，大便不爽，診脈濡小，乃暑濕從口鼻入，濕甚生熱，四末擾中，瘧發脫痞脹，涼當以苦辛寒清上微邪，不可謂遺泄而病，輒與溫補助邪。

黃芩

知母

白藜

鬱金

藁皮

厚朴

杏仁

半夏

薑汁

石膏

又 尿滯口渴餘熱尚熾

人參

知母

石膏

竹葉

甘草

麥冬

又 熱緩不欲食津液受燥當和胃生津

人參

五味

知母

橘紅

炒白芍

半夏麩

張 瘡家濕癩忌用表散 蒼朮白虎湯加草果

曹 寒從背起汗泄甚面無淳澤舌色仍白邪未盡正先

怯心虛悸震恐亡陽厥脫用仲景救逆法加參

又 舌絳口渴汗泄癰來日晏寒熱過多身中陰氣大傷

剛補勿進。議以何人飲。

人參

何首烏

孫陽虛之體。伏暑成瘧。涼藥只宜少用。身脈屬氣虛。用生薑瀉心法。

半夏

生薑汁

茯苓

炙甘草

南棗肉

沈

陽微復瘧。

桂枝

當歸

黃芪

防風

鹿角屑

薑汁

南棗

范

三五

勞瘧入陰。夏月陽氣發泄。仍然勞苦經營。以致再來。

不愈。用藥以辛甘溫理陽爲正。但未易驟效耳。

人參

當歸

肉桂

炙草

川蜀漆

生薑

南棗

方

寒甚於背陽脉衰也。

人參

鹿茸

炒當歸

炙草

鹿角霜

官桂

鱉甲煎丸

吳_去

背寒舌白粉胎知飢食無味此爲無陽温中下以托

邪

生白朮

厚朴

桂枝

附子

草果仁

茯苓

又

照方去茯苓加人參炙草生薑

程 寒熱經月不止。屬氣弱留邪。以益氣升陽。

補中益氣湯

又 生鹿茸 鹿角霜 人參 歸身

茯苓 炙草 生薑

某氏 建中法甚安。知營衛二氣交餒。夫太陽行身之背。瘡發背冷。不由四肢。是少陰之陽不營太陽。此汗大泄不已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎歟。議用桂枝加熟附子湯。人參桂枝湯加熟附子。

華氏 二十歲。天癸始通。而黃汗泄。內熱外冷。先天既薄。瘡發不復。內經謂陽維爲病。苦寒熱。綱維無以振頓。四肢

骨節疼痛。通入脉以和補。調經可以却病。

淡椀蓉

鹿角霜

當歸

川芎

杜仲

小茴

茯苓

香附

顧氏

進護陽方法。請症已減。寒熱未止。乃久病陽虛。脉絡

未充。尚宜通補為法。

人參

生鹿茸

當歸

紫石英

茯苓

炙草

煨薑

大棗

又經邪不盡。寒熱未止。緣瘧久。營衛氣傷。脉絡中空。乏

厨進補法。僅能填塞絡中空隙。不能驅除蘊伏之邪。擬

進養營法。取其養正邪自却之意。

人參 當歸 杞子 生白芍 茯神

桂心 炙草 遠志 煨薑 南棗

袁 婦 脉弦緩。寒戰甚則嘔吐噎氣。腹鳴漉漉。是足太陰脾寒也。且苦辛寒屢用不效。俱不對病。反傷脾胃。

人參 半夏 草果仁 生薑

新會皮 醋炒青皮

又 靈樞經云。中氣不足。溲便為變。况老年人驚恐憂勞。深夜不得安寐。遂致寒戰瘧發。當以病因而體貼諦視。其為內傷實屬七八。見瘧通套已屬非法。若云肺瘧。則秋涼不發。何傳及於冬。今小雪當以勞瘧稱之。夫勞必

傷陽氣宜乎四末先冷。瘧邪傷中爲嘔惡腹鳴矣。用露
藟飲。

又陽陷入陰。必目瞑欲寐。寒則肉腠筋骨皆疼。其籜籜
護衛太怯。杳不知飢。焉得思穀。老年人須血氣充溢。使
邪不敢陷伏。古賢有取升陽法。

嫩毛鹿角 人參 當歸 桂枝 炙甘草

又前議勞傷陽氣。當知內損邪陷之理。凡女人天癸既
絕之後。其陰經空乏。豈但營衛造偏之寒熱而已。故溫
脾胃。及露藟治中宮營虛。但畏寒不知熱爲牝瘧。蓋牝
爲陰。身體重着。亦是陰象。此辛甘理陽。鹿茸自督脈以

照提非比蓄附但走氣分之剛暴驅邪益虛却在營分
奇經曰陽維脈爲病發寒熱也

鹿茸

鹿角霜

人參

當歸

厚桂

茯苓

炙薑

又

正氣和營。瘧職已止當小其製

人參

鹿茸

當歸

炒杞子

沙苑

茯苓

炙薑

某

瘧後脾胃陽虛便溏畏寒肢體疲倦當防腫脹

附子

白朮

茯苓

澤瀉

薏仁

生薑

大棗

某 陰瘧已亂汗多

桂枝

牡蠣

生黃芪

炙草

歸身

五味

煨薑

大棗

某

脈沉舌白呃忒時時煩躁前係陽虛痰飲瘧發三次

卽止此邪空不能宣越並非邪去病解今已變病陰沍

痰濁阻塞於中致上下氣機不相維續並勢險篤拾通

陽一法無方可擬必得中陽流通瘧症復作庶有愈機

淡附子

一錢

生草果仁

半錢

生白芍

三錢

茯苓

三錢

生厚朴

二錢

薑汁

五分

一劑

此冷香真武合劑

某

伏暑胃涼發瘧以羌防蘇慈辛溫大汗汗多衛陽大

胃受暑
濕聚

百病叢生
百病叢生
百病叢生

三

傷胃津亦被劫乾致渴飲心煩無寐診脈左弱右促目微黃嗜酒必中虛穀少易於聚濕蘊熱勿謂陽傷也
做內經辛散太過當食甘以緩之。

大麥仁

炙草

炒麥冬

生白芍

茯神

南棗

又 藥不對症先傷胃口宗內經辛苦急食甘以緩之
仲景謂之胃減有不飢不欲食之患議用金匱麥門冬
湯麴胃汁以開痰飲仍佐甘藥取其不損陰陽耳金匱
麥門冬湯去棗米加茯神糯稻根鬚

又 脈石大間日寒熱目背微黃身痛此平素酒濕挾時

邪瀆行經脈使然前因辛溫大汗所以輕養胃口今脈
症既定仍從瘧門調治

草果

知母

人參

枳實

黃芩

半夏

薑汁

脾胃虛

項瘧已過月形脈俱衰平素陽虛虛則邪難解散腹脹
是太陰見症治從脾胃

人參一錢

半夏二錢

生於朮二錢

茯苓二錢

草果仁二錢

淡薑一錢

陳邪伏於裏積久而發道路已遠未能日有寒熱汗出
不解攻表無謂平昔用垂骭痛必有濕痰阻隧舌白不

高揮發七日用藥有長

瘧

三

言才下聖多

喜飲治在太陰陽明

炒半夏 厚朴 草果 知母

薑汁 杏仁

某 遺泄瀉陰瘧熱再傷陰聲嘶火升乃木源不充易怒

神躁水不涵木之象用何人飲佐清陰火

製首烏 人參 天冬 麥冬

知母 茯苓

某 瘧已半年今但微熱無汗身弱自乳血去傷陰此頭

痛是陽氣浮越心疴如飢膈熱都是陰虛成勞若不斷

乳經去不至為乾血則服藥亦無用

生地 三錢

阿膠 牛一錢

生白芍 一錢

炙甘草 四分

麥冬 一錢

火麻仁 一錢

粗桂枝木 三分

某 瘧後心悸氣怯便後有血是熱入傷陰用固本九加

首烏阿膠

人參

生地

熟地

天冬

麥冬

製首烏

阿膠

某 陰液消亡小溲短赤皆瘧熱所傷不飢不納陰藥勿

以過膩甘涼養胃爲穩

人參

生地

天冬

麥冬

川斛

蔗漿

另服資生丸

陰虛熱
伏血分

鄭 自來陰虛有遺洩瘧邪更傷其陰寐多盜汗身動氣促總是根本積弱不主斂攝此養陰一定成法

熟地

生白芍

五味

炒山藥

茯神

芡實

湖蓮肉

張 脈數瘧來日遲舌乾渴飲積勞怔忡內傷居多致邪氣乘虛漸劫陰氣熱邪墜於陰熱來小洩頻數故汗多不解議清陰分之熱以救津液

活鱉甲

知母

草果

鮮生地

炒桃仁

花粉

翁 脈左弦暮熱早涼汗解渴飲治在小陽

青蒿

桑葉

丹皮

花粉

鱉甲

知母

沈十九用力失血。無非陽乘攻絡。瘧熱再傷真陰。肌消食減。自述夏暑汗泄。頭頭脹大。都是陰虛陽升。清火皆苦寒。未必能和身中之陽也。

鱉甲

生白芍

天冬

首烏

炙草

茯神

某氏 瘧熱傷陰。小溲淋痛。

生地

鱉甲

丹皮

知母

茯苓

澤瀉

朱五糖久後陰傷湯血 炒焦六味加龜甲黃柏

吳十陰瘧後內熱 清骨散

熱邪結

項 陽氣最薄暑入為瘧先由肺病桂枝白虎湯氣分以

通營衛為正治今中焦痞阻冷飲不適熱邪宜清胃陽

亦須扶護用半夏瀉心法

半夏

川連

薑汁

茯苓

人參

枳實

熱邪結肺

王 汗出不解心下有形自按則痛語言氣窒不爽瘧來

鼻準先寒邪結在上當開肺痺醫見瘧治瘧焉得中病

桂枝

杏仁

炙草

茯苓

乾薑

五味

又 汗少喘緩肺病也然獨心下痞結不通猶自微痛非
關與下結胸。枳胸等法未安况舌白渴飲邪在氣分做
仲景與堅開痞

生牡蠣

黃芩

川桂枝

薑汁

花粉

炒黑蜀漆

又 照前方去花粉加知母草果

又 蠶甲煎丸 一百八十粒

王 舌白不大渴寒戰後熱神躁欲昏而心胸飽悶更甚
瘧係客邪先由四肢以擾中宮痰嗽嘔逆顯是肺胃體

虛邪聚閉塞不通。故神昏煩悶鬱蒸。汗泄得以暫解。營衛之邪未清。寒熱漫延無已。此和補未必中窠。按經設法爲宜。

白蔻仁

大杏仁

焦半夏

薑汁

黃芩

淡竹葉

又寒熱瘧邪交會中宮。邪聚必脹悶嘔逆。邪散則安舒。當心胸之間。竝無停食之地。夫不正之氣爲邪。穢濁癩漫。原非形質。可以攻消。苟非芳香。何以開其蒙閉之穢。濁欲小望見效。捨此捷徑。無成法可遵。道中知否耶。

牛黃丸二服

樂九熱多昏譫舌邊赤舌心黃煩渴脉弱是心經熱瘧醫
投發散消導津劫液涸瘵脈至矣

犀角

竹葉

連翹

玄參

麥冬

銀花

陳前方復瘧昏迷此皆陽氣上胃救逆湯去薑加芍

又鎮逆厥止譏養心脾營陰乃病後治法

人參

炙草

杞子

桂圓

炒白芍

棗仁

茯神

遠志

某三四舌白渴飲咳嗽寒從背起此屬肺瘧桂枝白虎湯

加杏仁

范 脈寸大汗出口渴伏邪因新涼而發間日瘧來議治

手太陰

淡竹葉

大杏仁

滑石

花粉

淡黃芩

橘紅

金氏 肺癰脫痞

黃芩

白薤仁

杏仁

橘紅

青蒿梗

白芍

張姬 暑風入肺成瘧

淡黃芩

杏仁

滑石

橘紅

青蒿梗

連翹

陳六 冷豉不調。夜熱多汗。咳嗽。忌葷腥油膩。可免疴勞。溫邪如瘧。當治手太陰。

竹葉心

麥冬

粳米

飛滑石

知母

炙草

麻痘

柳 暑濕都傷氣分。不渴多嘔。寒起四肢。熱聚心膈。乃太

陰瘧也。仍宜苦辛。或佐宣解裏熱之藥。

川連

黃芩

炒半夏

枳實

白芍

薑汁

煩躁甚。另用牛黃丸一丸。

某 寒起嘔痰。熱久不渴。多煩中焦之邪。仍以太陰脾法。

草果

知母

生薑

烏梅

炒半夏

桂枝木

早服驚甲煎方

葛 瘧久。舌白泄瀉。太陰脾傷。肌肉微浮。宜補中却邪。大
忌消尅發散。

人參

草果

白芍

茯苓

煨老薑

炙草

王 脈濡不渴。嘔痰不飢。是太陰脾瘧。當辛溫以理中焦
之陽。

生於木

半夏

草果

紫厚朴

茯苓

薑汁

又 太陰脾瘧。必有寒濕凝阻。其運動之陽所防。久虛變

幻浮腫腹脹人參未能多用權以生朮代之但與絡方少遜佐以通藥則無礙

生於朮

桂枝木

炒常山

茯苓

生鹿角

生薑汁

某二寒起四末湯喜熱飲屬脾瘧狀先當溫散

杏仁

厚朴

草果仁

知母

生薑

半夏

金 既成間日寒熱瘧嘔吐痰涎其瘧邪大犯脾胃故不
飢不食脉仍虛舌白治在太陰不必攻表

人參

半夏

草果

橘紅

黃芩

知母

薑汁

沈

十

脈濡寒熱瘧日遷腹微滿四肢不暖是大陰脾瘧用

露薑飲以升陽

人參 一錢

生薑 一錢

露一宿溫暖服

厥陰瘧

華

用動藥瘧止新沐瘧來陽弱失衛外邪直侵入裏試

以瘧來不得汗邪不從外解大著

川桂枝

炮黑川烏

生白朮

炒黑蜀漆

全蝎

厚朴

薑汁九

陽陰瘧

王

五暑濕傷氣瘧久傷陰食穀煩熱愈加邪未盡也病已

一月不飢不飽大便秘阻仍有潮熱全是津液暗傷胃

口不得甦醒。甘寒清熱。佐以酸味。胃氣稍振。清補可投。

麥冬

乾首烏

烏梅肉

知母

火麻仁

生白芍

高 陰虛。溫瘧雖止。而腰獨痛。先理陽明胃陰。俾得安穀。

再商治腎

北沙參

麥冬

木瓜

蠶水炒知母

大麥仁

烏梅

周 舌白。脈小。暑邪成瘧。麻黃劫汗。傷陽。遂變瘧症。今痰鹹有血。右脇痛。引背部。不知飢飽。當先理胃津。

大沙參

桑葉

麥冬

茯神

生扁豆 苡仁

胃逆不降

楊 高年瘧熱劫胃汁遂不飢不飽不食不便渴不嗜飲

味變酸渴藥能變胃方魁

人參 川連 枳實 牡蠣

淡乾薑 生薑

徐 脈數左寸大關弦瘧後食大葷太早胃氣受傷不得
下墜致痞悶惡心痰多唇燥大便不利俱是膽氣不宜
之象擬進溫膽湯法以和胃氣

炒焦竹茹 炒焦半夏 草果仁 生枳實

杏仁 橘紅 金斛 花粉

黃 瘧後不飢咽卽吐此脫隔痰與氣阻胃不降則不覺

納做溫膽湯意佐以苦味降逆

鮮竹茹

枳實

炒半夏

茯苓

橘紅

川連

苦杏仁

鬱金汁

李 不飢口渴甜水瘧邪未清肝胃不和

川連

乾薑

枳實

瓜蘆仁

半夏

廣皮白

薑汁

又 口渴甜水脾瘰

川連

黃芩

厚朴

半夏

生乾薑

廣皮

煎送脾約丸

肝胃

又 橘半枳木丸

金 寒自背起。衝氣由臍下而升。清涎上湧。嘔吐遂飢。不能食。此瘧邪深藏厥陰。邪動必犯陽明。舌白形寒。寒勝都主胃陽之虛。然徒補鈍守無益。

人參

半夏

廣皮白

薑汁

川椒

烏梅

附子

生乾薑

方 先厥而墜。蛇蟲下出。嘔逆腹鳴。脫痛室寒。此厥陰瘧疾。勿得亂治。

川連

淡乾薑

薑汁

川桂枝

生白芍

烏梅肉

黃芩

秋露水煎藥

又陽微寒勝瘧久不已理胃陽以壯中宮使四末之邪不令徒犯脾胃。

人參

炒半夏

生薑

烏梅

草果

炒常山

秋露水煎

又辛酸兩和用胃已效

人參

草果

生薑

生白芍

烏梅

炙鯨甲

吳體豐色白陽氣木虛。夏秋伏暑。挾痰飲爲瘧。寒熱夜作邪已入陰。冷汗頻出。陽氣益傷。今診得脉小無力。舌白。虛象已著。恐延厥脫之慮。擬進救逆湯法。

人參

龍骨

牡蠣

炙草

桂枝木

炒蜀漆

煨薑

南棗

又 開泄陽氣偏泄今年久熱傷元初癘發散不能去病
便是再劫胃陽致邪入厥陰昏冒大汗思肝腎同屬下
焦厥陽挾內風胃厥吐涎沫膠痰陽明胃中久寒熱戕
擾空虛若谷風自內生閉醫燕不分經辨症但以梅虛
道實宜乎鮮有厥效議用仲景安胃泄肝一法

人參

川椒

烏梅

附子

乾薑

桂枝

川連

生牡蠣

生白芍

又

諸症畧減寒熱未止尚宜宣陽

爲法

人參

炒牛夏

淡乾薑

桂枝木

茯苓

生牡蠣

又天暴冷。陽傷泄瀉。脉得左手似數而堅。口微渴。舌仍白。陰液既虧。飲水自救。非熱熾也。通塞兩用。冀其寒熱再緩。

人參

淡附子

桂枝木

茯苓

生牡蠣

炒黑蜀漆

蔡 惡進穀食。舌乾。腿脹。不飢。不知味。寤多。聚少。皆由瘧汗。嘔逆。都令諸陽交。升胃氣不降。則不食。陽不下。潛則無寐。肝風為震。則火升。心熱法當和胃。陽平。肝氣肝平。

胃氣必殺進能寢矣。

知母

北沙參

麥冬

新會皮

烏梅肉

新殺露冲

金_五七

強截瘧疾裏邪痞結心下水飲昏嘔吐無餘病在胃

口之上老年陽衰防其呃厥舍瀉心之外無專方

人參

枳實

乾薑

半夏

川連

黃芩

又舌白氣衝心痛噎噫味酸嘔吐涎沫皆胃虛肝乘做
仲景胃中虛客氣上逆可與旋覆花代赭石湯

旋覆花

代赭石

人參

半夏

茯苓

薑汁

粳米

又諸恙向安。寢食頗逸。平昔肝木易動。左脈較右脈略長。味變酸。木侮土。秋前宜慎。

人參

半夏

茯苓

廣皮

生穀芽

生白芍

腸痛半月不止。左脇下已有瘡母。寒熱時必氣痞嘔逆。乃肝邪乘胃。有邪陷厥陰之象。擬進瀉心法。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

朱女厥陰衝氣上攻。眩暈間痛。安胃丸三錢。枳梅湯送。

陳氏源母是瘧邪入絡與血氣扭結必凝然不動今述遇冷勞怒衝氣至腕痛必嘔逆必三日氣降痛緩而後水飲得入此厥逆之氣由肝入胃衝脈不和則經水不調

延胡

川棟子

半夏

菴朮

蒲黃

五靈脂

薑汁

韓七瘧不止欲吐

炒半夏

一錢

厚朴

一錢

青皮

一錢

炒焦知母

一錢

草果仁

一錢

檳榔

一錢

臨服調入薑汁一錢

脾胃

吳背寒瘧來漸晏邪有入陰之意此伏邪不肯解散都

因久積煩勞未病先虛也飲水少腹如墜腕中痞結不

舒中焦。屢受邪。迫陽氣先已。餒弱。議兩和。太陰陽明法。

草果

知母

半夏

厚朴

薑汁

烏梅

黃芩

花粉

又 進兩和陰陽。寒熱已止。診脈右滿。明是氣衰。宜和胃生津。使餘邪不攻自解。

人參

知母

炙鱉甲

生白芍

烏梅肉

大麥仁

炒丹皮

又 脈左數。舌絳。暮渴。

炒麥冬

人參

首烏

白芍

丹皮

茯神

另更衣丸二錢

陸六口湧清涎不飢不食寒熱邪氣交會中焦脾胃日困

半夏

薑汁

茯苓

厚朴

炒常山

草果

烏梅

又

大半夏湯加草果烏梅

凌三瘡久脾胃氣傷不食倦怠半年不肯復元論理必用
參朮益氣但貧窘豈能久用然久延不甦倘腹滿浮腫
便難調治白朮膏加砂仁末

某三瘡邪由四末以擾中宮脾胃受傷無疑但寒暑更遷
病邪既久臟腑真氣自衰兩年來納穀不運漸覺衰微
不耐風冷之侵竝無疑痰聚氣見疔此必胸中宗氣自

餒致清陽不可轉運當以神景冬桂朮甘湯

又六君子湯去甘草加檀香泥桂枝朮

吳糖已復瘧。溺濁淋痛。羸年脾瘧。食物不慎。色黃腹膨。有滯。脾胃愈衰。東垣云。中氣不足。溲便乃變。初秋交冬。迭加反殺。久則五疳勞瘵。當慎於食物。令脾胃氣靈可效。宗脾胃論升降疎補法。

人參

茯苓

炙草

麩皮

使君子

神麩

查肉

麥芽

瀉瀉

祝 此勞傷陽氣更感冷熱不正之氣。身熱無汗。肢冷腹熱。自利。舌灰白。微嘔。顯然大陰受病。診脈小右濡不飢。

入夜昏譫語。但如寐。不加狂躁。論脾爲柔臟。體陰用陽。治法雖多。從未及病。當遵前輩。葷冷香。縮脾遺意。

人參

益智仁

茯苓

新會皮

生厚朴

苡仁

木瓜

砂仁

又 脈右弦來去不齊。左小更弱。舌邊紅。舌心白黃微絳。鼻冷四肢冷。熱時微渴。不飢不想食。前議太陰脾臟受病。瘧邪從四末乘中。必脾胃受病。鼻雜四肢皆冷。是陽氣微弱。因病再傷。竟日不暖。但形肉消燥。不敢剛劫攻邪。以宣通脾胃之陽。在陰伏邪無發散清熱之理。

人參

草果

炒牛夏

生薑

茯苓

新會皮

蒸烏梅肉

二帖後加附子後又加牡蠣

吳^七瘧傷脾胃腹中不和脈右澹食入脹甚前方通調氣血佐以泄木服之積滯既下痛隨利減仍宜制木安土不可作陽虛溫補治

生於朮

川連

椒目

麥芽

雞肫皮

廣皮

厚朴

沙山查

升五

陳^四瘧邪由四末以擾中皆陽明厥陰界域陽明衰則厥

陰來乘津液少斯內風必動昔賢以麻屬氣虛木是濕痰敗血今戊亥頻熱行走沐汗顆然液虛陽動風生脂

液不得灌。脫末非濕痰氣分之恙。

冬桑葉九 熟首烏 黑芝蔴 柏子仁 茯神

當歸 杞子 菊花炭 蜜九

李 脉左弦。嘔吐發熱後。腕中痞悶不爽。宜慎口腹。清肅

上中二焦。不致再延成瘧。進苦辛法。

杏仁 鬱金 山梔 豆豉

白朮 枳殼

孫 高年發瘧。寒熱夜作。胸悶不欲食。煩渴熱頻。最慮其

邪陷為厥。進陽旦法。

桂枝 黃芩 花粉 生白芍

生左牡蠣 煨薑

南棗

姬

瘧脈沉瀆。中脘痞結。此屬裏症。用瀉心法。

牛夏

川連

橘紅

枳實

黃芩

生薑汁

又

脈沉。右關大。瘧未止。寒熱子後作。煩渴中悶。不欲食。

醋炒牛夏 杏仁

黃芩

花粉

草果

生薑

陸

瘧截。虛氣痞結。成身痛。

桂枝

炒焦牛夏

薑汁

廣皮白

當歸

茯苓

錢氏暑熱傷氣成癰胸痞結嘔吐痰瀉皆熱氣之結前醫瀉心法極是

人參汁

枳實汁

黃連

黃芩

炒半夏

杏仁

厚朴

薑汁

汪此濕熱與水穀交蒸全在氣分嘗得三焦分清解既成間日瘧疾邪正互爭原無大害初悞於混指傷寒六經再謬於參朮守補致邪瀰漫神昏喘急妄譫痙攣皆邪無出路內閉則外脫求其協熱下利已不可得診脈細澹按腹膨滿夫痞滿屬氣燥實在血今洞利後而如腹滿諸氣皆結豈非閉塞而然潰敗夾裂至此難望

挽救

細葉菖蒲根汁 二錢

草果仁 五分

茯苓皮 三錢

紫厚朴 一錢

綿茵陳 三錢

辰砂益元散 五錢

連翹心 一錢

金銀花 三錢

另用牛黃丸一服用涼開水緩緩以茶匙化服

潘氏 伏邪發熱厥後成瘧間日一至咳嗽痰多惡心中痞

其邪在肺胃之絡。擬進苦辛輕劑。

杏仁

黃芩

半夏

橘紅

白蔻

花粉

程氏 脈右大寒熱微嘔。脘痞不納。四末瘡邪交於中宮。當

苦辛泄降酸苦泄熱邪勢再減二三必從清補可愈

川連

炒牛夏

薑汁

黃芩

知母

草果

炒厚朴

烏梅肉

毛氏用玉女煎寒熱未已渴飲仍然惡已減周身皆痛

診脈兩手俱數舌色灰白邊赤汗泄不解擬用酸苦泄
其在裏熱邪務以癉止再調體質

黃芩

黃連

草果

白芍

烏梅

知母

用秋露水煎藥

又寒熱由四末以擾中官胃口最當其戕害熱悶不飢
胃傷邪留清熱利痰固爲要法但有年氣弱兼之病經

匝月清邪之中必佐補正議用半夏瀉心法

人參

半夏

黃連

黃芩

枳實

薑汁

勞瘧再發

人參

草果

生薑

烏梅

秋露水煎

又補中益氣湯加草果知母薑棗

陳 絡虛則痛陽微則服左脇有瘧母邪留正傷此勞瘧

人參

當歸

肉桂

焦朮

炙草

茯苓

廣皮

生薑

南棗

四劑後用五苓散一服

勞瘡
瘡

某 勞瘡畏寒下虛不納 六味加肉桂五味

某 瘡未止熱陷下痢中痞不欲食

人參

川連

黃芩

生白芍

廣皮

炒當歸

炒山查

乾薑

枳實

銀花

又 瘡後勞復

人參

當歸

白芍

棗仁

茯神

廣皮

生薑

南棗

氣血凝
結

范 一 脉小滿病起瘡後食物不和仍誦讀煩勞遂至左脇

連及少腹當有厥起或攻胃脘或聚腹中凝着膜脹古

語六瘡不離乎肝膽亦猶咳不離乎肺也蓋肝得邪助

木勢張揚中上必然受傷本氣自怯運納之權自減清
陽既少展舒濶陰口踞漸爲痞滿上年溫養辛甘久進
未見病去其治體之法諒不能却自述靜處病加煩動
小安其爲氣血久阻爲鬱議用通絡法以病根出瘡久
邪留絡中耳

紫降香 桃仁

小香附 淡薑渣 神麩

雞腕皮 南山查 韭根汁法丸

高 瘧發既多邪入於絡絡屬血分汗下未能逐邪仲景
製鱉甲煎丸一法搜剔絡中留伏之邪五六日必效

早午暮各服七粒

某 瘧邪經月不解。邪已入絡。絡聚血邪。攻則血下。究竟
寒熱煩渴。目黃舌膩。溺赤短少。全是裏邪未清。凡腥羶
宜禁。蔬食不助邪。選閱醫藥。柴葛攻表。消導通便。與煎
無與。用仲景鱉甲煎丸。朝十粒。午十粒。黃昏十粒。開

水送

費 瘧邪迫傷津液。胃減不飢。腸燥便紅。左脇微堅。有似
瘧母結聚。當宣格熱。以肅餘邪。

生地

知母

丹皮

麻仁

生鱉甲

某氏 瘧邪內陷。變成陰瘧。久延成勞。務以月經通爽。不致
邪劫乾血。

疔母

生鱉甲

一兩

桃仁

三錢

炒丹皮

一錢

穿山甲

三錢

查肉

一錢半

生香附

一錢半

顛

左脇有瘡母，乃氣血交結之故，治宜通絡。

鱉甲

桃仁

金鈴子

牡蠣

丹皮

夏枯草

江

遠客水土各別，胃受食物未和，更遭嗔怒動肝，木犯

胃土，瘡傷。脇中有形瘰聚，三年宿恙，氣血暗消，但久必

入血，湯藥焉能取效，宜用緩法，以疎通其絡，若不追援，

致陽結陰枯，釀成噎膈難治矣。

生鱉甲

桃仁

麝香

麝香

韭白根粉

歸鬚

郁李仁

冬葵子

熬膏

吳四瘡反覆左脇瘡母

生鱉甲

生牡蠣

炒桃仁

當歸鬚

炒延胡

柴胡稍

桂枝木

炒查肉

青皮

某 夏秋濕熱瘡癩。正虛邪留。混入血絡。結成癢癩瘡母。

夫濕氣熱氣本屬無形。醫治非法。血脈蘊邪。故寒熱間發。仲景立法。務在緩攻。急則變爲中滿。得之。兼服鱉甲。

煎丸

知母

草果

半夏

黃芩

烏梅

生薑

秋露水煎

金十經年老瘡左脇已結瘡母邪已入絡與氣血膠結凝
形區區表裏解散之藥焉得入絡通血脈致聚毒以
辛香是絡病大旨

生牡蠣

三錢

歸鬚

一錢

桃仁

三錢

桂枝

五分

炒芫花

一錢

公丁香

三粒

某三少陰三瘡已久當升陽溫經

鹿茸

熟附子

人參

粗桂枝

當歸

炒黑芫花

呂四陰瘡一年方止流膿瘦妨食貧人不運不飲湯水四肢
無力診脈微弱不鼓屢進六君益氣無效後服溫中香通湯

從火生土意

人參

熟附子

生益智

茯神

白芍

生薑

吳四
邪
三瘧愈後反覆寒多有汗勞則陽洩致痞謹護陽部

川桂枝

熟附子

生於朮

炙草

生薑

南棗肉

某
陰虛汗多下焦冷用升陽法

人參

鹿茸

桂枝木

當歸

炙甘草

生薑

大棗

形變

邪深留陰。三日始有瘧發。但熱來必神昏譫妄。是屬中震動所致。議定未病兩日。日進清心牛黃丸一服。試看後期瘧至何如。

所對

蔡氏 三日瘧。一年有餘。勞則欲發。內熱素有結痞。今長大攻走不定。氣逆欲嘔酸。經閉四載。當厥陰陽明同治。

半夏

川連

乾薑

吳萸

茯苓

桂枝

白芍

川芎

烏梅

脾經

蔡三 三瘧不飽不納。惡心渴喜熱飲。診脈沉細。脾陽困頓。不能送邪外出。治以四獸飲。

沈五 三瘧腹脹不渴。嘔水邪在脾胃之絡。濕疎裏邪勿用。

官印卷七 日月醫案

完

表散

草果

粗桂枝

生薑

厚朴

炒蜀漆

茯苓

又

溫脾通胃得效。

生於朮

淡附子

川桂枝

炒黑蜀漆

厚朴

生薑

某四五三歲經年。至今復受濕邪。及發日來舌白腕問渴喜熱飲。當溫太陰。

杏仁

草果

知母

桂枝

半夏

生薑

厚朴

烏梅

詹九三病脾發用露豎法寒止熱盛加入烏梅五分取其酸味以和陰謂其瘧久陰亦傷耳。

胡陰瘧。滯傷脾胃。用苦辛溫得效。瘧未已。腹脹便泄。議理中陽。

人參

益智

木香

茯苓

厚朴

廣皮

生薑

錢三週勞瘧數年。初起卽三陰。此傷損已在腦陰之終。最難速效。甘溫益氣。久進益氣湯。

某三三瘧早截。中陽室寒。脫服不寤。背寒肢冷。

草果仁

杏仁

半夏

茯苓

桂枝

厚朴

廣皮

生薑

某 脉濡面黃舌白。腕中格拒。湯水皆嘔。三日瘥。至按色脉診。乃足太陰陽微。飲結。當以溫藥和之。

半夏

草撥

丁香柄

草薤

厚朴

薑汁

象五經

李

初病勞倦。肺熱。投東垣益氣湯。未嘗背謬。而得湯反

劇。聞穀氣穢。聞日瘧。來渴思涼飲。此必暑邪內伏。致營衛週流。與邪觸着。爲寒熱分爭矣。故甘溫益氣。升舉脾胃氣血。與暑熱異岐。胃中熱灼。腸土愈燥。上脫不納。虛結。便閉。其初在經。在氣。其次入絡。入血。由陽入陰。間日

經爲三瘧奇脈。脈維皆被邪傷。內經謂陽維爲病。苦寒熱也。維爲一身綱維。故出四末寒凜而起。但仍是脈絡爲病。故參芪朮附不能回陽以益其虛。歸桂地芍無能養營以却邪矣。昔軒岐有刺瘧之旨。深慮邪與氣血混成一所。汗吐下無能分其邪耳。後漢張仲景推廣聖經。蘊奧謂瘧邪經月不解。勢必邪結血中。有瘕瘕瘧母之累。瘕製方鱉甲煎丸。方中大意。取用蛭蟻有四。意謂飛者升走者降。靈動迅速。追拔沉混氣血之邪。葢散之不解。邪非在表。攻之不驅。邪非着裏。補正却邪。正邪並樹無益。故聖人另闢手眼。以搜剔絡中混處之邪。治經千

經母

百歷有明驗。服十二日。干支一週。倘未全功。當以升其八脉之氣。由至陰返於陽位。無有不告安之理。

某陰瘧兩月。或輕或重。左脇按之。痠痛。邪伏厥陰血絡。恐結瘕母。議通絡以逐邪。用仲景鱉甲煎丸。每早服三十粒。當寒熱日勿用。

昌二三瘕皆邪入陰絡。故汗下為忌。經年瘕。能癥瘕。瘕母仍聚。季脇邪攻血氣之結。攻逐瘀聚。升降以通陰陽。乃仲景成法。但診脉細微。食減神衰。攻法再施。恐擾中滿。前與溫補通陽頗安。然守中之補。始緩為宜。

人參

當歸

淡附子

淡乾薑

茯苓

肉桂

鯨甲膠丸

諸瘧由伏邪而成。非旦夕之因爲患也。六淫之氣。惟燥不能爲害。而新涼收束。實屬有關。考之聖訓。獨手三陽手厥陰。却無其症名。醫者當辨其六氣中所傷何氣。六經中病涉何經。若小柴胡專主少陽。豈能兼括也。夫溫瘧瘧瘧。痰食瘧癘。諸瘧皆有成方。予不復贅。但此症春月及冬時間有。惟夏秋暑濕爲患者居多。暑必挾濕。而傷氣分。第一要分別其上焦中焦之因。暑濕二氣何者爲重。若暑熱重者。而究上焦肺臟清氣。瘧來時必熱重。而寒微。唇舌必絳赤。煩渴而喜

涼飲飲多無痞滿之患其脉色自有陽勝之候。當宗
桂枝白虎法及天水散加辛涼之品爲治。若濕邪重
者當議中焦脾胃陽氣。瘧來時雖則熱勢蒸燔舌必
有粘膩之苦。渴喜爰湯。胃脘覺痞脹。嘔惡其脉色自
有陽氣不舒之精狀。當宗正氣散及二陳湯去甘草
加杏蔻生薑之類。主之。必要陽勝於陰。而後配和陽
之劑。日後方無貽累。倘症象兩兼。則兩法兼之可也。
大凡是症。若邪氣輕而下不甚虛者。寒熱相等。而作
止有時。邪氣重而正氣怯者。寒熱模糊。來勢必混而
不分。又云邪淺則一日一發。邪深則間日一發。邪

最深則三日一發。古稱爲三陰大瘧。以肝脾腎三臟之見症爲要領。其補瀉寒溫亦不離仲景治三陰之法爲根蒂。可知陽經輕淺之方治之無益也。所云移早則邪達於陽。移晏則邪陷於陰。陰陽勝復於此可參。若久而不已。必有他症之虞。大陰之虛浮脹滿。有通補之理。中法開胸之五苓湯。少陰之痿弱成勞。有滋陰之復脈湯。溫養之升奇法。厥陰之厥逆吐衄。及邪結爲瘕。母有烏梅丸。與醫甲煎法。又如心經瘧久。勢必動及其營。則爲煩渴見紅之累。肺經瘧久。理必傷及其津。則爲胃秘腸痺之候。一則涼陰爲主。一則

清降爲宜。然而癰之名目不一。而癰之兼症甚多。若不達權通變。而安能一一盡善。卽如暑濕格拒。三焦而嘔逆不納者。宗半夏瀉心法。穢濁蒙蔽膈中。而清靈昧甚者。用牛黃清心丸。心陽暴脫。有龍蟄之救逆。胃虛嘔呃。有旋覆代赭之成方。如表散和解通陽補氣。滋陰化營。搜邪入絡。勅藥劫截。辛酸兩和。營氣血補。及陽瘧之後。養胃陰。陰瘧之後。理脾胃等法。已全備矣。某集諸家論。通無拘。所謂用藥如用兵。先生不號良工之名也。邵新甫

泄瀉

周 因長夏濕熱食物失調所謂濕多成五泄也先用甘

苓湯分利陰陽 胃苓湯去甘草

濕 長夏濕勝爲瀉腹鳴瀉少腑陽不司分利先宜導濕

和中 胃苓湯

又 向年陰分傷及陽位每有腹滿便溏長夏入秋常有

滯下此中焦氣分積弱水穀之氣易於聚濕或口鼻觸

入穢邪遂令脾胃不和是夏秋調攝最宜加意擬夏秋

應用方備採天暖氣蒸南方最宜有中痧痞脹諸恙未受

病前心懷疑慮即飲芳香止氣之屬毋令邪入為第一

義

藿香梗

白蔻仁

橘紅

桔梗

杏仁

薤白

降香

厚朴

夏至後熱勝濕蒸氣傷神鑿用東垣益氣湯若汗出

口渴兼生脈散飲液

某 秋暑穢濁氣從吸入寒熱如瘧上咳痰下洞泄三焦

蔓延小水短赤議芳香辟穢分利溼濕

藿香

厚朴

廣皮

茯苓塊

甘草

猪苓

澤瀉

木瓜

滑石

檀香汁

又進藥稍緩所言穢濁非臆說矣其陰莖囊腫是濕熱甚而下墜入脬與方書莖欬症有間議河間法

厚朴

杏仁

滑石

寒水石

石膏

猪苓

澤瀉

絲瓜葉

某陰瘡久傷成損俛不能臥脊強脉垂足跗浮腫乃督脉不用漸至僂廢疾近日暑濕內侵泄瀉先宜分利和中

厚朴

藿香

廣皮

茯苓

澤瀉

木瓜

炒扁豆

炒查肉

炒砂仁

蔡一氣短少續爲虛近日腹中不和泄瀉暑傷先以清暑

和脾預防滯下。

厚朴

廣皮

炙草

茯苓

澤瀉

炒扁豆

麥芽

木瓜

炒查肉

砂仁

又 香砂異功散

葉五

平素操持積勞。五志之火易燃。上則鼻衄堵塞。下有

肛痔腸紅。冬春溫邪。是陽氣發越邪氣乘虛內伏。夫所

伏之邪。非比暴感發散可解。况兼勞倦內傷之體。病經

九十日來。足跗日腫。大便日行五六次。其形粘膩。其色

黃赤紫滯。小便不利。必變大便而稍通。此腎關樞機已

廢。二腸多貯大司所進水穀。脾胃不主運行。釀濕墜下。

轉爲癆瘵之形。正當土旺入夏脾胃主氣。此濕熱內滯。由乎脾腎日傷。不得助理之醫。一誤再誤。必致變現腹滿矣。夫左脈之緩濇。是久病陰陽之損。是合理也。而右脈弦大。豈是有餘形質之滯。卽仲景所云弦爲胃減。大則病進。亦由陽明脈絡漸弛。腫自下。日上之義。守中治中有妨。食滋滿之弊。大旨中宜運通。下宜分利。必得小溲自利。腑氣開闔。始有轉機。若再延綿月餘。夏至陰生。便難力挽矣。四苓加椒目厚朴益智廣皮白。

又服分消方法五日。瀉減。溺通。足跗浮腫未消。要知脾胃久困。濕熱滯濁。無以運行。所進水穀。其氣蒸變爲濕。

濕勝多成五瀉欲使濕去必利小便然滲利太過望六
年歲之人又當慮及下焦久病入夏正脾胃司令時候
脾臟宜補則健胃腑宜疎自清扶正氣驅濕熱乃消補
兼施治法 晚服資生丸炒米湯送下

服早

人參

廣皮

防已

厚朴

茯苓

生朮

澤瀉

神麴

黃連

吳萸

濕熱

朱 口腹不愜濕熱內起泄瀉復至此濕多成五泄氣瀉
則腹脹矣

人參

茅朮

川連

黃芩

白芍

廣皮

茯苓

澤瀉

查肉

陳 脉緩大腹痛泄瀉小澀不利此水穀內因之濕鬱蒸腸胃致清濁不分若不清理分消延爲積聚粘膩滯下議用苓芍湯

淡黃芩

生白芍

廣皮

厚朴

藿香

茯苓

猪苓

澤瀉

張 脉緩瀼腹滿痛瀉不爽氣鬱滯久濕凝在腸用丹溪小温中丸

針砂

小川連

蒼朮

白朮

香附

半夏

廣皮

青皮

神麴漿丸

程 診脉肝部獨大脾胃緩弱平昔納穀甚少而精神頗

好其先天充壯不待言矣。目今水瀉少腹滿脹少腹爲厥陰肝位。由陰陽不分濁踞於下。致肝失疎泄當以五苓散導水利濕。倣古急開支河之法。

黃九歲久瀉兼發瘡痕。是濕勝熱鬱苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 廣皮 炙草 生於木

羌活 防風 升麻 柴胡 神麴 麥芽

朱三形瘦尖長木火體質自上年泄瀉累用脾胃藥不效。此陰水素虧酒食水穀之濕下墜。陰弱不能包涵所致。宜苦味堅陰淡滲勝濕。

炒川連

炒黃柏

厚朴

廣皮白

茯苓

猪苓

澤瀉

炒查肉

陳

寒濕已變熱鬱六腑底窒爲瀉

生白朮

厚朴

廣皮

白茯苓

益智仁

木瓜

茵陳

澤瀉

其三

酒濕內聚痰飲餘濕下注五泄常用一味茅朮丸

炒半夏

茯苓

苡仁

刺蒺藜

新會皮

王氏

頭脹喜冷飲咳嗽心中脹泄瀉不爽此爲中暑故止

瀉血藥更甚舌色白議清上焦氣分

石膏

淡黃芩

炒半夏

橘紅

臨證指南醫案

卷六

泄瀉

矣

中陽
滯

厚朴

杏仁

王_七自春徂冬瀉白積至今腹痛。小水不利。想食物非宜。脾胃水寒偏注大腸。當分其勢以導太陽。胃苓湯主之。
胡_三三瘧劫截不效。必是陰臟受病。衄血熱渴。食入不化。痛瀉二者相反。思病延已久。食物無忌。病中勉強進食。不能充長精神。卽爲滯濁阻痺。先以脹瀉調理。不必以瘧相混。

草果

厚朴

陳皮

木香

茯苓皮

大腹皮

猪苓

澤瀉

郁_四八經營勞心。食違時飢飽。勞傷脾胃。受病脾失運化。

夜屬陰。海至天明。洞瀉粘膩。食物不喜。脾弱惡食。柔瀉之味。五苓通膀胱分泄。濕氣已走。前陰之竅。用之小效。東垣謂中氣不足。溲便乃變。陽不運行。濕多成五泄矣。

人參

生白朮

茯苓

炙甘草

炮薑

肉桂

某人形寒使瀉舌白

厚朴

廣皮

半夏

茯苓皮

桂枝木

生薑

程氏寒濕腹痛惡心泄瀉

厚朴

藿香梗

益智仁

廣皮

炒茅朮

煨木香

茯苓

澤瀉

吳氏 寒凝胃腸腹痛泄瀉

草果

厚朴

茅朮

廣皮

吳更

炒查肉

程氏 瀉後腹膨

人參

生益智

炮薑

茯苓

厚朴

廣皮

砂仁

陸氏 氣滯爲脹濕鬱爲瀉主以分消

炒厚朴

大腹皮

茯苓

澤瀉

生益智

廣皮

炒查肉

某氏 雨濕涼氣乘於脾胃泄瀉之後腹膨減食宜健中運

濕

焦白木炭

厚朴

廣皮

生穀芽

炒扁豆

木瓜

茯苓

澤瀉

程女

濕傳脾陽腹滿肢冷泄瀉

四苓散加厚朴廣皮

鄒婦

濕傷泄瀉小便全少腹滿欲脹舌白不飢病在足太

陰脾宜溫中佐以分利

生茅朮

厚朴

草果

廣皮

茯苓

豬苓

澤瀉

炒砂仁

又

早服真武丸薑湯送二錢五分 一兩

夜服針砂丸開水送一錢五分 六錢

又 人參

附子

枳實

茯苓

乾薑

生白芍

某氏 脉沉緩。肌肉豐盛。是水土稟質。陽氣少於運行。水穀聚濕布及經絡。下焦每有重着筋癢。食稍不進。便易泄瀉。經水色淡。水濕交混。總以太陰脾虛。調理若不中法。恐防脹病。

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

羌活

獨活

防風

澤瀉

凡此湯傷濕聚。使滯足腫。

粗桂枝 生白朮 木防己 茯苓 瀉瀉

又 脈緊足腫便溏腸微濕聚氣不流暢怕成單脹

照前方加茵陳

又 晨泄肢腫

生白朮 桂枝木 淡附子 茯苓 瀉瀉

陸五一當齋動氣子夜瘦泄晝午自止是陽衰寒濕沍凝腸

陽不運每瀉則脹減宜通不宜瀉

製川烏 生茅朮 茯苓 木香

厚朴 廣皮

朱 消渴乾嘔口吐清涎舌光赤泄瀉熱病四十日不愈

熱邪入陰。厥陽犯胃。吞酸不思食。久延爲病。傷成勞。

川連

烏梅

黃芩

白芍

人參

訶子皮

陶六病由春木正旺中焦受尅先泄瀉繼以腹痛小便不利食不思納皆是六腑不和所致夫胃爲陽土肝屬陰木腑宜通肝宜柔宜涼治胃必佐泄肝制其勝也閱方呆補不知臟腑陰陽故辨及之

泡淡黃芩

炒小川連

炒廣皮

厚朴

生白芍

炒烏梅肉

猪苓

澤瀉

楊 因驚而瀉腹痛欲嘔是爲蚊厥當用酸苦忌進甜物

川椒

烏梅肉

川連

淡乾薑

金鈴子

延胡

桂枝木

生白芍

腹中不和。不飽。少寐。肝風震動。頭暈。泄瀉。高年經月未復。兩和厥陰陽明。

炒牛夏

人參

枳實

茯苓

炒烏梅肉

滯。入夜咽乾欲嘔。食納腹痛即瀉。此胃口大傷。陰火內風劫燥津液。當以肝胃同治。用酸甘化陰方。

人參

一錢

焦白芍

三錢

訶子皮

七分

炙草

五分

陳倉米

三錢

又 去陳米加南棗一枚

又 咽乾不喜湯飲。腹鳴瀉瀉。五液消燦。虛風內風擾於

腸胃

人參

木瓜

焦白芍

赤石脂

炙草

朱

經月減食泄瀉。下焦無力。以扶土泄木法。

人參

焦木

炒益智

茯苓

木瓜

麝皮

某

病後陰傷作瀉。

烏梅

白芍

炙草

麝皮

茯苓

荷葉

王

霍亂後痛瀉已緩。心中空。洞肢節痿弱。此陽明脈虛。

內風。閉燥。益虛。象也。異功去參。木加烏梅。木瓜。白芍。

又 上吐下瀉之後中氣大虛身痛肢浮虛風內動以補
中爲法 異功散加木瓜薑棗

某 腹鳴晨泄顛眩旋暈形質似屬陽不足診脈小弦非
二神四神溫固之症蓋陽明胃土已虛厥陰肝風振動
內起久病而爲衄泄用甘以埋胃酸以制肝

人參

茯苓

炙草

廣皮

烏梅

木瓜

某 頭痛損目黎明腸鳴泄瀉煩心必目刺痛流淚是木
火生風致脾胃土位日戕姑議泄木安土法

人參

半夏

茯苓

炙草

丹皮

桑葉

肝犯脾

徐六

自春季胸脇肌脹。以及腹中疼痛。從治肝小愈。腹鳴泄瀉不止。久風飧泄。都因木乘土位。東垣云。治脾胃必先制肝。做此。

人參

焦木

炙草

木瓜

烏梅

炒炙絲餅

程。勞損。逐年。食入。腹脹。痛瀉。心中。寒凜。腐脹。熱蒸。此陽不內潛。脾胃久困。萬無治。嗽清降之理。議用。皮已湯。扶土制木法。

葉三。左。弱氣脹。在皮膚之裏。此絡脉中病也。泄肝破氣久。

服脾胃受困而爲泄瀉得養中小愈然以藥治藥脈絡
之病仍在

半夏

桂枝

茯苓

遠志

歸鬚

橘紅

薑棗湯泛丸

張^婦

腹鳴臍脹清晨瘦泄先以熄肝風安脾胃方

人參

茯苓

木瓜

炒烏梅

炒菟絲子

又泄肝醒胃方

吳萸

生白芍

炒烏梅

人參

茯苓

起發湯

某脈右弦腹膨鳴响痛瀉半年不痊此少陽木火鬱傷

脾上久則浮腫脹滿法當疎通泄營非辛溫燥熱可治

黃芩

白芍

桑葉

丹皮

柴胡

青皮

脾胃虛

吳

陽虛惡寒。惡心吞酸泄瀉。乃年力已衰。更飲酒中虛。

治法必以脾胃扶陽

人參

茯苓

附子

白朮

乾薑

胡盧巴

趙

晨泄難忍。臨晚稍可寧耐。易飢善食。仍不易消磨。其

故在乎脾胃陰陽不和也。讀東垣脾胃論。謂脾胃宜升則

從胃宜降則和。援引升降為法。

人參

生薑

炮附子

炙草

炒歸身

炒白芍 地榆炭 炮薑灰 煨葛根 煨升麻

又 腸風鳴震。泄利得緩。猶有微痛而下。都緣陽氣受傷。垢滯永不清楚。必以溫通之劑爲法。

生茅朮

錢三

炙草

五分

生炮附子

錢一

厚朴

錢一

廣皮

錢一

製大黃

五分

金_五能食不化腹痛泄瀉。若風冷外乘。肌肉着冷。其病頃刻卽至。上年用石刻安腎丸。初服相投。兩旬不效。知是病在中焦。不必固下矣。自述行走數十里。未覺衰倦。痛處透臍。議用治中法。是太陰陽明主治。

生於朮

生茅朮

生益智

淡乾薑

胡蘆巴

茯苓

木瓜

藜蘆

王_三五_三三年久損氣快神奪此溫養補益皆護元以藜却病
原不藉乎桂附辛熱以劫陰液今胃減咽乾大便滯泄
經月夏三月脾胃主候宜從中治

人參

炒白芍

炙草

煨益智

炒木瓜

茯苓

廣皮

金 冲年遺恙先天最薄夏秋瘧傷食少不運病脹滯瀉
都是脾胃因病致虛當薄味調和進治中法

人參

益智

廣皮

茯苓

木瓜

炒澤瀉

穀芽

煨薑

李氏 脉沉形寒腰膝牽強腹鳴有形上下攻觸每晨必瀉
經水百日一至做仲景意

茯苓

炮淡乾薑

生於朮

肉桂

某氏 陽微濁滯吐瀉心痛當辛溫開氣胃腸甦醒乃安

炒半夏

厚朴

廣皮

益智仁

煨木香

烏藥

香附汁

薑汁

脾陽虛

某二 色白脉爽體質陽薄入春汗泄神力疲倦大便溏洩

不爽皆脾陽困頓不克勝舉無以鼓動生生陽氣耳刻
下姑與和中爲先

益智仁

八分

廣皮

一錢

薑灰

七分

茯苓

三錢

生穀芽

二錢

楊 小便不利大便溏泄補脾法中佐以淡滲分其陰陽

人參

熟木

茯苓

象牙屑

澤瀉

苡仁

廣皮

白芍

薛三十水穀濕邪內着脾氣不和腹膨不飢使滯四肢痿痺

厚朴

茯苓皮

大腹皮

防已

麝皮

澤瀉

苡仁

桂枝木

又 肢痿腹膨使滯

木防已

生白木

苡仁

木瓜

桂枝木

澤瀉

馬四飲酒少穀中氣久虛晨泄下部冷腎陽脾陽兩憊知

飢少納法當理腸酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茯苓

覆盆子

生益智

炒薏苡仁

補骨脂

芡實

朱

四

酒濕內因脾腎陽虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐

五

晨泄病在腎少腹有痼亦是陰邪若食葷腥厚味病

卽頭發乃腸氣積衰議用四神丸

席

五

陰瘧初愈不慎食物清陽既微健運失司腸胃氣滯

遂爲洞泄且足跗微腫慮其腹竒欲滿夏季脾胃主令

尤宜淡薄藥以通陽爲先平時脾腎兩治

胃苓湯去白朮甘草 接服黑地黃丸去五味

朱四久瀉無有不傷腎者。食減不化。陽不用事。八味腎氣。乃從陰引陽。宜乎少效。議與升陽。

鹿茸

人參

陽起石

茯苓

炮附子

淡乾薑

又久瀉必從脾腎主治。但痛利必有粘積。小溲短縮不。爽溫補不應。議通腑氣。

厚朴

廣皮

茯苓

豬苓

澤瀉

川連

煨木香

炒山查

炒神麩

僧五痕泄一年。食減。腹鳴。屬脾腎陽衰。近腹中微痛。兼理。氣滯。用陳無擇三神丸。

某 背部牽掣入脇晨瀉 苓桂朮甘去甘加鹿角薑棗

奠二五診脈兩關緩弱尺動下垂早晨未食心下懊懣納穀

仍不易化蓋脾陽微中焦聚濕則少運腎陰衰固攝失
司爲澱泄是中宜旋則運下宜封乃藏是醫藥至理議
早進治中法夕用四神丸

高氏 經來腹膨臍脊痠垂自秋季泄瀉不已脫痞妨食用
濟生丸不應

鹿角霜 炒薏絲餅 生杜仲 淡菴蓉

茯苓 炒苑 焦歸身 炒黑小茴

陳氏 產育十五胎下元氣少固攝晨泄自古治腎陽自下

涵蒸脾陽始得運變王氏以食下不化爲無陽凡腥膩
沉着之物當忌 早用四神丸晚服理中去朮草加益

智木瓜砂仁

張^冠泄瀉脾腎虛得食脹

人參 炒菟絲子 炒黃乾薑 茯苓

煨益智 木瓜

某 瀉五十日腹鳴渴飲溲溺不利畏寒形倦寐醒汗出
用溫中平木法

人參 胡蘆巴 炮薑 茯苓

訶子皮 附子 粟殼

某 脾腎不攝五更瀉

巴戟 菟絲子 五味 補骨脂 芡實

建蓮 山藥 炙草

某 久瀉脈虛

人參 五味 禹餘糧石

張氏 產後不復腹疼瀉瀉

炒菟絲餅 鹿角霜 生杜仲 淡補骨脂

炒黑小茴 炒杞子 茯苓

黃氏 因病原是勞損自三陰及於奇經第腹中氣升胃痛

暨有形動觸衝任脈之守補則滯涼潤則滑瀉瀉久瀉

寒熱最爲吃緊先固攝下焦爲治

人參

炒菟絲餅 芡實

湖蓮

茯神

赤石脂

某 腎虛痲泄

炒香菟絲子

生杜仲

炒焦補骨脂

茴香

雲茯苓

又 陽微子後腹鳴前方痲泄已止

人參

炒菟絲子

炒補骨脂

湖蓮肉

芡實

茯苓

顧 脾腎痲泄腹膨肢腫久病大虛議通補中下之陽

入參 川熟附 茯苓 澤瀉 炒黃芩

某 腎虛疲泄乃下焦不攝純屬恐傷陰液以腎惡燥也

早服震靈丹

二十九

晚間次飲湯調服參苓白朮散

二錢 二藥服十二日

中虛

高 脈細下垂高年久咳腹痛泄瀉形神憔悴乃病傷難

復非攻病藥石可愈擬進甘緩法

炙甘草 炒白芍 炒飴糖 茯神 南棗

汪 過食泄瀉胃傷氣陷津不上涌臥則舌乾微渴且宜

薄味調攝和中之劑量進二三可安

人參 葛根 生薑芽 炙甘草

廣皮

荷葉蒂

泄瀉。注下症也。經云。濕多成五泄。曰飧。曰瀉。曰鶩。曰濡。曰滑。飧泄之完穀不化。濕兼風也。滑泄之腸垢汚積。濕兼熱也。鶩泄之溼清。瀉曰濕兼寒也。濡泄之身重軟弱。濕自勝也。滑泄之久下不能禁固。濕勝氣脫也。是以胃風湯治有血之飧泄。清六九療腸垢之熱瀉。登瀛便清瀉白中有硬物。選用理中治中滑泄。脉微氣脫洞下不禁。急投四柱六柱。飲惟濡泄有虛有實。或以胃苓或以木附。至於脾泄胃泄腎泄大腸泄小腸泄大瘕泄。黃泄鶩泄。傷酒傷食泄。古方古法條

載甚詳其急則治標必使因時變症理固然也及其
緩則治本惟知燥脾滲濕表有未盡者乎蓋脾同坤
土本至靜之體而有乾健之用生萬物而役於萬物
從水從火爲寒爲熱歷觀陽熱下利者十不得一二
從水之寒泄者寸常八九焉言當然者主治在脾推
所以然者必求之水火因思人身水火猶權衡也一
勝則一負火勝則水負水勝則火負五泄多濕濕水
同氣水之盛則火之衰也於是推少陽爲三陽之樞
相火寄焉風火易胃而熟腐五穀少陰爲三陰之樞
龍火寓焉薰蒸臟腑而轉輸糟粕胃之納脾之輸皆

火之運也。然非雷藏龍馴。何能無燥無濕。勢有冒明。療上之傳。如果土奠水安。從此不泛不流。定無清氣。在下之患矣。吾故曰。五泄之治。平水火者。清其源。崇隄土者。塞其流耳。今觀葉氏診記。配合氣味。妙在清新縱橫治術。不離規矩。依然下者升。滑者固。寒者溫。熱者清。脈弦治風。脈濡滲濕。總之。長於辨症立方。因而投劑。自能輒效。所謂讀古而不泥於古。採方而不執於方。化裁之妙。人所難能者。余友吳子製文。昔在葉氏門牆。曾言先生洞達人情。諳練時務。使之應世。一以僕也。以故小道居此盛名。又聞其應酬之暇。好

謹兩漢出辭自必高古。惜乎著作長家不能一見。令人嘆息不忘耳。蕭文玉