

新刊纂圖元亨療馬集

新刊纂圖類方元亨療馬集卷之三

○七十二症病形圖論歌治法

○馬患翻胃吐草第一

出師呈秘集

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾脾傳於胃脾胃受邪遍傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾冷而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也令獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫廉甲毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

○歌曰


下咽草穀胃收藏 脾化相傳遞入腸 清氣上升爲津液
濁氣下滲入膀胱 苦生心血辛生氣 鹹味生精腎部藏

酸生筋甲甘生肉 渣糞由腸轉出肛 脾敗上虛無化導
胃衰火弱不收藏 脾胃不和芻水逆 爲緣蓄養致傷寒
秋收逢淋冬臥濕 晝浴淵深夜露霜 鼻浮面腫精神慢
勝拖腹細糞如漿 益仁薑棗頻頻嚙 風雨霜寒百日防
五經衰敗休醫療 醫工仔細要斟量 血枯神敗渾如醉
水虧眼腫閉無光 骨痠腿癱眠不起 土虛形體若豺狼
金敗喘齋繫尾癢 驛駟致此療無康 謹請醫工休妄作
百古從今無治方

凡馬吐草脉色平和松骨未腫者醫家斟酌勿得倉皇差誑誤
施熱劑噬之

無疾吐草幼馬生賊牙者吐草五歲擇槽牙者吐草生料糞腫
者吐草

翻胃吐草之圖



脾虛

岐伯曰吐草者脾胃衰也面腫者脾胃虛也五臟論曰脾衰吐草饒翻胃脾虛面腫鼻如鼯師皇曰凡馬翻胃松骨腫者可治腮骨脹者難醫羸瘦吐沫者亦難治也王良歌曰松骨連腮腫傳經四足疼胃翻加吐沫何藥效能成**形狀**四肢倦怠耳搭頭低鼻平山腫廉吊毛焦色脉舌唇赤脉沉遲治法火針脾脘穴者通門唯之喂養每朝麩料

熟料各八分熟米湯一日一次飲之調理厥宜温煖臥宜草鋪拌草莫宜大濕寒夜羶屣背上搭之戒忌空腸冷水厨下惡水麩漿水米泔水菜荳寒涼等皆忌之

益智散 治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁 肉豆蔻 五味子 廣木香 檳榔 草果

細辛 青皮 當歸 厚朴 川芎 官桂

砂仁 白朮 芍藥 白芷 枳壳 甘草

右爲末每服兩半棗五枚姜五片苦酒一升同煎三沸温嚥之又方加丁香一錢 煎嚥之

温脾散 治馬翻胃吐草歌曰

冬冷凍物寒凝胃 夜擊霜天濕地眠 初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳 糞粗糜弔精神慢 吐草傳經四足攣

藥用煖日溫脾散 當歸與木 縮砂甘 木朴青陳五味子
枳榔豆蔻細辛兼 香附麥牙 同共使 薑棗搗和盛酒煎
十朝五服頻頻嚙 月餘之外自安痊

通關散 治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼 把前把後步難行 水草遲遲依舊食
賺弔頭低吞似弓 調經須用通關散 當歸沒藥與金鈴
茴香巴戟麒麟礪 蒿本胡巴共木通 白朮破故牽牛子
一撮紅花酒半升 同煎三沸溫利嚙 十朝五服病除根

○馬患胎氣胎風第二 出伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因姙娠太重外感內傷傷勞大盛
清氣不升濁氣不降清濁不分以致子宮煩燥胎膜不寧自
久遍行經絡令獸四肢虛腫抽搐難行把前把後耳塔頭低

此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之硬臨簷傍巷近道衝門賊風乘虛而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣令獸前行後拽勝痛胸疼日久傳於筋骨致使腰癱腿痲四足拳拳起而不起臥地昂頭此謂產後胎風之症也麒麟竭散治之

歌曰

牝馬妊娠懸後蹄

頭低腰曲步行遲

腹裏細小精神慢

水草須食肉漸輸

內傷濕氣凝於腎

外感風寒經絡虛

血凝氣滯諸關閉

子宮煩燥莫能舒

安胎補益當歸散

調和血氣自然愈

產後胎風筋骨痛

拖股軟膝步難移

掠草穴中須用烙

眷問百會穴中施

麒麟竭散頻頻囉

十朝半月效徐徐

臥攬草少庭羸瘦

縱有靈方莫令醫

馬妊娠未及十餘日者如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛者謂之胎風醫者分

別治之

胎氣者駒煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者少
令用藥候胎月足產後自然愈矣


胎風者產後風也凡治者強肋壯髓止痛消風臥攤不起羸痺
草少者不堪治也

五十四死曰產後胎風筋骨痛瘦攤草少命須虧

王良歌曰產後胎風痛癱臥腿拳攣草少產羸瘦能醫療不疾

胎氣形狀拘行束步膝鞞腰拖後蹄虛腫耳首頭低胎風形狀
腰癱腿瘦四足拳攣起而難起氣喘昂頭脉色胎氣者雙鳧
洪數唇舌鮮紅胎風者腎脉遲澹口色如綿治法胎氣者當

胎氣風之圖



歸散嚙之胎風者火針百會穴

掠草穴搶風穴麒麟竭散嚙之

喂養增加料草慈料喂之

調理散縱於廐聽其自臥自起

乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌拴濕地眠

補益當歸散治馬胎氣

當歸全 破故芷 麒麟竭

白芍藥 自然銅 煎紅花

胡蘆巴 甜瓜子 骨碎補

益母草 炒荷藥 沒藥

連翹 海帶 龜板

虎骨酥 漏蘆

已上各等分爲末每服兩牛苦酒一升煎三五沸待溫嚙之

當歸散 治馬胎氣

當歸全 熟地黃 白芍藥 川芎 枳實 青皮

右等分爲末每服一兩牛紅花一錢水一盞同煎三沸候溫之

麒麟散 治馬產後胎風把前把後病

麒麟竭 胡蘆巴 當歸 沒藥 白朮 木通

川練子 巴戟 破故芷 牽牛 茴香 蒿木

已上各等分爲末每服一兩牛苦酒一升同煎三五沸候溫之

○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬妊娠太重肉滿肥壯起行不便睡臥失調仰四處起之大急過峽道猛轉廻身以致虧傷

孕馬閃損胎駒令獸肚腹脹滿脊蹠躑腰駒胞溺濁氣促喘
僉此謂動胎之症也醫工人手驗之駒活者養血安胎藥灌
駒亡者水道卽與取之休令損傷胃迴澀臟腑膀胱補益當
歸散嚙之 歌曰

馬患胎病最難醫 脊蹠躑腰捉四蹄 腹脹本因子有病

胎傷痛悶澁淋漓 菜汁生油塗手內 水門輕入卽須知

駒活卽啞安胎藥 駒亡水道取包衣 連煎補益當歸散

辟惡須用酒調之 嚙後宜當拴煖處 冷水三朝忌喫煙


師皇曰凡馬妊娠不足週年未布妳乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹胞脹脊蹠躑腰駒胞溺濁氣促喘僉

脈色雙見浮滑口色青黃

治法駒存者嚙安胎白朮散復皮散亡者取出駒補益當歸

馬患胎病之圖



散嚙之

喂養增加料 草熟米湯溫水飲

之

調理散縱於 窠穰草鋪地臥之
戒忌寒來休 拴外喂三朝冷水

忌之

白朮散治馬胎動安胎

白朮

當歸

川芎

人參

甘草

砂仁

熟地黃

各三錢

陳皮

錢紫蘇

黃芩

各一錢

白芍

阿膠

各六分

右為細末每服一兩以錢生薑

大

五片水一升同煎五沸候溫曬之

復皮散 治孕腹痛不寧

大復皮

人參

川芎

白芍藥

熟地黃

陳皮

甘草

桔梗

半夏

紫蘇

已上共爲細末每服兩半細切青葱三枝水一升調煎三沸候溫曬之

當歸散

治孕馬胎死駒中取駒曬此藥

西江月

當歸沒藥海帶

漏蘆荷葉紅花

自銅破正及胡巴

虎骨敗龜酥化

骨補連翹益母

麒麟芍藥甜瓜

胎前產後足頑麻

升酒調煎曬下

○馬患揭鞍風第四

出王御車集

夫揭發風者揭鞍外感風也皆因騎來有汗簷下卸鞍賊風乘
虛而入皮膚初患渾身指捺次傳肌肉腠理凝滯日久延之
於內則令四肢僵硬口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不
食水草此謂外感風邪之症也追風散嚙之歌曰

遠來有汗發簷前

未逆風邪卸却鞍

眼急尾高兼項直

脊腰殭硬板如椽

風門伏兔須煩烙

腎角百會火針投

追風發表三朝驗

口緊涎多瘡不痊

師皇曰揭鞍風者卸鞍

冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬


牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

士良歌曰尾揭遍身硬耳緊閃骨生此風從得後一汗顯功動

伯築歌曰凡馬風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫脊

腰板硬者亦難治也五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如

馬患揭鞍風圖



椽死必知

觀形狀耳緊尾直眼急驚狂牙
關緊閉口內垂涎脉色雙鳥遲
細口色鮮紅治法徹鶻脉血烙
風門火伏兔穴百會穴追風散
嚙之殊砂散鼻內吹之

畏養增加料草口不住食牙關
自是開矣調理時常騎走騎迴
繫於煖厩汗息方可卸鞍
戒忌厩前拴濕地臥空腸水
切風寒忌之

大盂

夏夏

追風散 治馬患揚風

雄黃半兩 烏頭四兩

去毒

白朮兩半 川芎二兩

一兩 細辛兩

白芷二兩

蒼朮六兩

水浸

右爲細末看病大小涎多大者每服五錢小者四錢溫酒半盞同調嚥之

珠砂散 療風開孔

珠砂一錢

雄黃二錢

皂角一挺

瓜蒂二錢

射香少許

已上共爲細末每服一字裝竹筒中於兩孔吹之一日兩次吹之

○醫思薑芽第五

出發家纂要

夫薑芽者燔氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾胃胃火微弱陰氣生而傳入心經心傳於肺肺氣燔盛攻之

於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生痲骨有似生
薑萌芽而發也令獸腸中作痛觀腹飽蹄連連臥地鼻咋喘
齋此謂燭氣攻心肺受其邪也宜順氣散薩之歌曰

燭氣攻心肺受邪

鼻中發骨似薑芽

連連臥地腸中痛

微微氣喘鼻頭咋

先針四足蹄頭血


次取雙薑鼻半芽

葱酒同煎順氣散

伯樂會醫八駿驂

師皇曰燭氣攻心者腹中疼痛也俗名薑芽正名水谷併也凡
治者和血順氣止痛通腸橘皮葱酒噀之王良歌曰起臥腸
中痛先須用橘皮枳椇爲第一葱酒最相宜卞氏曰薑芽者
卽冷痛也鼻頭有骨形似薑芽馬嘶鼻胎氣而生个个有之
先聖諸書未載始出纂要之章此者未見其實也醫者望之
趙氏曰凡馬有薑芽有等青醫又稱喉中有骨名曰骨股妄用

馬患箕芽之圖



針刀割去眼中閃骨然其一病未愈又且加之一患如雪上加霜返成其害也何異揠苗助長緣木求魚後學者慎之戒之又曰起臥者脾胃寒也骨眼者肝經熱也此二者寒熱非同愛病不一遵道先生戒語曰古來骨眼何曾臥起臥林將閃骨鈞形狀前蹄跑地觀腹迴頭連連起臥鼻咋喘麤麻色臥蠶白色鼻脉微遲治法割雙蠶穴針三江血徹蹄頭血順氣散囉之吹

鼻散吹之調理不住騎走或弱或瀉通利愈矣戒忌當日勿
令飲水寒夜不可拴外孕馬不可吹鼻

順氣散 治馬蕞芽腹痛起臥方

陳橘皮 青橘皮 檳榔 厚朴 桂心 細辛 當歸

茴香 白芷 木通 砂仁 甘草

右件爲末每服二兩飛鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升
同煎三沸候溫嚥之

吹鼻散 治馬傷水起臥方

藜蘆 胡椒 半夏 白芷 瓜蒂 射香 皂角

共了

右爲細末每用一字裝竹筒吹於鼻內不住擗行鼻中出
水或溺之大效

○馬患脫肛第六

出岐伯治對症

脫肛者臟頭脫出也皆因力敗羸驢勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜臥仰於四處爲因努力以致肛頭弩出風吹癩膜冷硬難收令獸不時努噉尾揭腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臄冷氣虛力乏弩傷之症也養臄通開散治之歌曰

久寒積冷在腸中

臄出難收號脫肛

風吹結硬腸頭腫

耳搭頭低脊似弓

蓮花穴剪風皮膜

沸湯洗淨血和臄

泛溫履底連三叙

通開散確有能功

履底鞋底也

早曰脫肛者臄冷氣虛也凡治者和血順氣養臄消風健脾胃


煖胃治之觀形不時揭尾弩拽弓腰頭低耳搭草細毛焦

脉色雙鳧遲細口色微黃治法剪蓮花穴通開散確之防風

散煎湯洗之調理增料草減勞傷巽夜煖處拴之戒忌七日

勿令騎驟

馬患脫肛之圖



遺糞

通關散治馬大腸風膿頭翻出
頻頻努擗拋糞不下

郁李仁 麻子仁 桃仁

當歸 防風 羌活

大黃 皂角子

已上各等分爲末每服一兩五

錢生油半盞水一升同調勻

煎嚙之

防風散 治馬脫肛

防風 荆芥 花椒 白芷

蒼朮 艾葉

右咀一處水二升共煎三五沸

去渣帶熱洗淨血膿先用剪刀去盡風皮膜納以中指入肛
取出硬糞一粒再洗去血送入肛頭乾履底炙熱熨之

○馬患黑汗第七

出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因蓄養太盛肉重臃肥喂多騎少料寡
聚於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅極致
成其患也令歌渾身肉顫汗出如油行如醉犬目瞪頭低此
謂血瘀之症也茯神散嚙之歌曰

良馬渾身汗不收

由來熱積在心頭

三江眼鼻須針徹

尾尖鶻脉兩針抽

襪汁共調人糞嚙

裙衣蒙腦水淋頭


猪清半盞同調嚙

嚙之不瘥命須休

師皇曰黑汗者汗之極也凡治者汗出有乾處者可治汗出無

休者難醫舌如煮豆汗出如油者亦難治也五臟論曰舌如

馬患黑汗之圖



煮豆心經死汗出如油心血危
至及歌曰四足難移步渾身汗
似油臥歪青紫色此病必難留
形狀渾身汗出氣促喘急擇行
不動耳搭頭低
脈色色黃脈洪者生色黑脈沉
者死
治法微鵲脈血三江大脈血痰
神散唾之
巧治利刀於尾尖血上十字燒
調理一繫於涼處裙衣裳腦井
花水頭上澆之

戒忌勿令擗行休拴煖處

茯神散 治馬黑汗

茯神三錢 硃砂一錢 雄黃一錢

石研爲細末糞浸水半盞擅襪取汁半盞猪膽汁半盞同調嚼之

又方 乾馬糞安於瓦內上用人髮蓋之以火燒令烟入馬鼻

中少刻立瘥

○馬患寒傷阻 傷腰膂痛第八

腰膂痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遠行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗晝縱於淋雨之中夜臥於寒濕之處濕氣乘虛而入腎經受寒邪而傳之腰膂又或奔走失調閃傷蹙滯氣凝膂內痞血注積腰間令獸前行後

拽勝鞞腰拖毛焦廉弔耳搭頭低此謂前熱後寒氣血凝滯之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

羸馬嚴冬濕地眠 冰寒冷水過多食 寒凝濕濁停於腎

勝鞞腰拖行步難 醋炒麴麩腰上熨 汗滿邪氣火針攢

空腸剪嚙茴香散 十朝半月復依元

師皇曰凡馬腰勝痛病治者先令相其行步蹲腰行者鴈翅痛也弔腰行者脊筋痛也鴈翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷也醫者分別治之

伯樂曰凡馬寒傷蹲腰行者火針大勝汗溝穴閃傷弔腰行者徹尾本血大效治者鑿之


王良歌曰氣把腰勝痛掉連鴈翅疼抽尾木血其效應如神形悲前行後拽勝鞞腰拖頭低耳搭廉弔毛焦脉色腎命脉瀆

寒傷閃腰疔之圖

大府

大府

平溝



唇舌鮮紅治法 寒傷香苗香散

確之閃傷者紅 花散確之

調理香糞於郊 夜散於廐穰草

鋪地臥之戒忌 切忌臥於濕地

堤防簷巷風吹

荷香散治馬寒 傷冷拖腰膈痲

茴香 肉桂 檳榔 白木

木通 巴戟 常歸 牽牛

蒿本 附子 刺子 肉蔻

澄茄 巴上各等分爲末每

一兩中飛爲三錢苦酒一升

日疏三洗候溫空草確之

本草綱目卷之...

三

後溫散 治馬後寒冷拖後脚

高良薑 白附子 茱萸 蒼朮 厚朴 白朮

白芷 細辛

右爲細末用藥一大匙酒一盞調膏三沸候溫送入糞中
廣腸中不住捺行以拋糞帶出曰頭爲驗凡三次者瘥矣

又五 治馬後寒

用麵麩一升以醋拌溫令氣勞熱茅入袋內搭於腰上隔宿
去之

紅花散 治馬閃腸後膺滯氣把腰病

紅花 當歸 沒藥 茴香 續子 巴戟

枳殼 木通 烏藥 蒿木 以上爲末每服二兩

飛臨一稔春冬溫酒一升秋夏白湯一盞同調空草藿之

方 治馬腰痛久不愈

杜仲

半兩炒

兔絲子 三錢

蛇床子 三錢

已上三味共爲

細末飛鹽一稔滾酒一盞調勻揚去大氣帶熱嚙之

○馬患敗血凝蹄第九

出淵源論

敗血凝蹄者蹄甲焦枯也皆因乘騎遠驟卒至卒拴未得控散血瀝於蹄又或久拴久立血注蹄胎以致蹄中漸長日久失於修削致筋甲焦枯蹄頭堅硬令獸把前把後腰曲頭低臥多立少起走如攢此謂血毒之症也烏金膏治之歌曰

敗血凝蹄實可悲

頭低腰曲步難移

醫上莫作胸堂治

胎甲焦枯血注蹄

削去硬蹄桃去襖


烏金膏烙合宜定

先賢規矩修蹄甲

後學神針莫妄施

獸劑凡馬走傷料傷五攢痛病與此症形狀相同受病不一治

敗血凝蹄之圖



繫

垂泉

者勿令帶也

師皇曰敗血凝蹄者蹄頭堅硬也凡治者修蹄天妙塗膏於蹄

穴燒鐵器烙之

王良歌曰膊痛緣騎苦蹄傷敗

血攻痛時針且妙蹄損火能通

形狀把前把後腰曲頭低臥多

立少起走如攢

脈色部關平正舌口鮮明

治法削垂泉穴烏金膏塗蹄烙

之三修三烙瘡夫

調理豈縱於郊夜散於概沙下

鋪於底內陳猪脂塗於蹄甲間

戒豈切忌火灰墊地六脉不可施針

烏金膏 治馬血毒蹄頭痛

紫礬 力青 黃蠟 人髮 燒灰

已上四味於銚內鎔成膏先用利刀削去死蹄硬甲塗膏於蹄火燒鐵器烙之


○馬患睡寒吐沫第十

出造父難經

大肺寒吐沫者氣滯肺竅也皆因乘騎緊驟過冷水飲之大急搶於肺脫肺氣凝結津液變化成痰致使精神困倦耳搭頭低頰類割齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半夏散治之 歌曰

口中白沫吐連連 唇舌無瘡肺寒 奔行飲急因傷肺

肺寒吐沫之圖



氣結津液變作痰 棚下流痰
渾似雪 槽邊滿地恰如綿
理氣化痰清肺部 津液滋生
病自痊

凡馬心經伏熱舌上生瘡
口內垂涎者與此症寒熱相同
治者勿得錯之

肺燥且吐沫者津液不清也凡
治者和血順氣理肺清痰酸地
藥水噴之

觀形狀口吐白沫唇症清涎現
低耳搭口鼻俱寒

肝色脉洪唇赤者心熱發涎脈沉唇白者肺寒痰沫
治法清痰半夏散嚙之調理喂養廐內飲水莫令太多騎乘
鞍轡移時解卸戒止寒夜不可外拴五更不可野放

半夏散 治馬肺寒馬口吐涎沫

半夏 升麻 防風 飛錫


右爲末每服兩半喬麩一匙蜂蜜一兩生薑一分酸漿水
一升同調服飽嚙之

○馬患慢症第十一

出療驥方

慢症者絕症也皆因暑月炎天乘熱過陰雨淋之太過復於脾
經傳於胃胃火微弱傳入肝經肝木虧傷遍傳五臟五經
衰敗致成其患也令獸精神倦怠脈弔毛焦頭低眼腫行立
如痴此謂肝危之症也無方無則治之歌曰

馬患慢症之圖



卷之三十九

十六

牧野衰羸過度淋寒宵久繫露
霜中弔毛草細頭垂地口色如
綿脉細沉四肢倦怠行無力
目虛浮閉不睜此般病症從來
死總有靈方命不存

節皇曰慢症者秋症也九經衰
敗肝膈由勝也凡治者脉大唇
紅者可治脉微唇白者難醫頭
低眼腫者難治也逢秋者亦難
治也

王良歌曰秋病口中白醫之不
必症臥蚕雖有色望退也無絲

形狀四肢倦怠行立如痴眼胞虛腫耳搭頭低

唇色淺黃微細口色如綿

凡馬慢症眼胞腫者肝絕也逢秋盛者金克木也脈微唇白者氣衰血敗也

脈色論曰慢症脈微伯樂難醫三秋口白十中九絕

五臟論曰肝危眼腫頭垂地五十四死曰慢症逢秋命必危


○馬患羅漏傷第十二

出胡卜經

羅漏傷者一名肺癆黃也皆因蓄養太盛肉重臃肥草飽乘騎奔走大急湧勢覺損心胸氣塞咽喉吐之不及肺頭脹烈羅漏傾頰令獸喘籠氣促空嗽連聲口垂血沫鼻孔流紅此謂漏破肺傷之症也無方可治之

歌曰 良馬鼻中血兩行 多因草飽下坡忙 漏傷肉痛渾

馬患羅膈傷圖



盜

身頭 啞嗽連聲喘息狂 鼻
脉蝦遊枯骨口 胸前汗出似
油漿 此般形症從來死 復
起師皇無治方

師皇曰羅膈傷者胸膈傷也喘
籠氣促者肺咋也鼻中血出者
肺破也難以治之

五臟論曰肺氣抽金部收鼻
中血出肺金危

王良歌曰鼻內流鮮血喉中氣
出忙唇口枯骨色此病必須亡
觀形狀瘦身肉頰鼻孔流紅曰

咳血沫別管如痛

脈口管如枯骨脈似蝦遊遵道先生曰管如枯骨諸經絕脈似蝦遊五臟虧

○馬患水掠肝第十三

出玉照集

水掠肝者水沁復肝也皆因久渴失飲更傷飲水太過失於擗散積注腸中不能運化滲於腸中停於膈下沁掠其肝也今獸行如醉大雨眼如痴鼻迴血水汗出無休此謂肝絕之症也無方無則可治之歌曰

遠驟騎迴汗未乾 久渴逢津過飲泉 陰陽結塞膀胱門


腸虛沁疹損傷肝 擗行似醉無高下 目瞪如痴似淚漫

古來章典無方救 從教一命染黃泉

師曰水掠肝者冷水傷其肝也行如酒醉鼻迴血水者肝之

馬患水掠肝圖

五
非
身
開
另
三
卷



○喉脉血

絕也難以治之

王良歌曰：持行似醉，唇如煮
豆色，鼻中迴血，水先賢無治則
觀形如醉犬，目瞪頭低，鼻迴
血水汗出無休。

脉色脉如屋漏色似蛤煤

趙氏曰：凡馬水傷臥蚕青紫，渾
身汗出不住者，陰氣太盛，血之
所化也，難以治之。
五十四死曰臥蚕，青紫真難救。
汗出無休，死不醫。

○馬患蟬虫咬袖第十四

田發蒙論

蟬虫者氣化也昔因喂養大盛肉滿臙肥日久失於洗浴痰汗
沉於毛竅垢塵凝滯肌膚尿溺交混汗濕相攻痞氣化生而
爲虫矣在於袖袋之中有似蜂錐蝎蝥令獸忽時倒地四足
稍空起而後食水草如常此謂虫咬陰勝之症干工擇去其
虫貫仲散煎湯洗之

歌曰

在腕如常水草食 下槽臥地仰觀天 脉平色正但無咎

袖上紅光腫有痕 晚學于人休望治 於良騏驎不能言


袖藏隱蟬虫咬擇 却之時便得安痊

師皇曰蟬虫者汗垢相生也凡泊者翻裏捲袖子家尋取摘之

安藏集曰勞動于入袖上覓摘却之時便得失

元亨療馬疾 形症三卷

蟬咬袖之圖



觀形忽倒在地足仰稍空起而復舊水草如常

脈色雙見平正口色平和

治法神口內蟬虫摘之貫仲散煎湯洗之

調理冬控淨室只繫涼棚槽下

糞溺潔之

糞忌穢處勿令控之

貫仲散 殺虫

貫仲 鶴虱 花椒 臭橘

蕪荑 蛇床子

又胆一處水二升煎三沸去渣

將獸搏倒拘去蟬虫次令藥湯將裨口翻過帶熱洗之

○馬患前結第十五


出安驥集

前結者大腸前面而結也皆因料後乘騎緊驟歸來復又喂之
况其喘息未定口唾未清又且食之太急以致痰聚料草相
纏一塊通入大腸前面四尺聚散而成結也令獸肚腹脹痛
咬臆跑胸不時臥地足仰朝天此謂前結之症也以龍虎通
關散噉之歌曰

草飽騎廻復又食 谷草相纏裹住痰 大腸四尺前邊結
跑自咬臆仰觀天 酒煎龍虎通關散 灰汁生油四兩兼
噉了棒行還又噉 三服必定得安然

師皇曰凡馬起臥肚脹滿仰咬臆者前結也醫工入手驗之人
手短促不見糞者通腸利藥噉之喘麤氣促口色青黑者內

馬患前結之圖



蹄頭

蹄頭

傷腸胃也不堪治之

辛

王良曰大抵怕青黑兼憂喘息

發神功也不救遲治氣全無

形迷不時臥地足仰朝天口咬

胸臆氣促喘發

脉色右鳧中瀆兩沉口色赤而

帶紫

治法徹蹄頭血通關散嚙之二

服不效魚沫湯調馬價丸嚙之

調理不在揀行用掃帚於腹下

刮之

戒忌當日芻水忌之

海國散 治馬大腸閉結

續隨子 膩粉 滑石 木通 鼠糞 牽牛 酥油 一合

皂角 炙

右爲末每服二兩生油四兩灰湯半盞苦酒一盞調服三沸入火黃末一兩硝一兩曬之

○馬患中結第十六

出起臥論

中結者大腸中面結也皆因臆肥肉重遠驟奔馳乘熱而喂生料料後而飲冷水冷熱相繫致使脂纏谷料積於大腸中面而結也令獸肚腹脹痛仆臥飽胃連連起臥鼻咋喘麤此謂中結之症也將獸繩縛塗油入手膈腸握破病瘞刻時而見效次人手短促不能足者馬價九疇之歌曰


臆馬腸中熱氣攻 脂纏谷料水相冲 中門滯滯難通度

馬患中結之圖

本草綱目卷之九 形類三 卷

雙姜

以



蹄頭

蹄頭

跑胸仆臥腿稍空 藥丸溫酒
油調嚙 人手塗油向裏尋
陽腸打手輕輕按 少可通宜
便得寧
師皇曰凡馬脹痛仆臥跑胸者
中結也醫工入手取之腸中餘
積未盡不住起臥者巴豆爲未
和爲馬價九疔之
王良歌曰仆臥咬胸臆糞結在
中宮若能醫療得巴豆最爲珍
形狀肚腹飽脹仆臥跑胸連通
起臥鼻咋喘急

豚色石臭中瀼而沉口色赤而帶紫

治法放蹄頭血塗油入手取之馬價丸嚥之

調理不住捧行竹掃帚腹下刮之

戒忌當日不許飲喂巴豆不可生用用之卽死

馬價丸治馬中結

巴豆三百去殼五靈脂 牽牛 甘遂 大戟 滑石 瞿麥

木通 續隨子 川欒 香附子

已上每味二兩共爲細末醋打麵糊爲丸如彈子大每用

一丸搗碎溫酒一盞和生油四兩嚥之

又方用鮎魚一尾水一升於銚內煮一沸去魚取半生牛熟入

湯和生油四兩嚥之

○馬患後結第十七

出通玄論


馬患後結之圖

藥

藥

後頭

後結



後結者大腸後面結也皆因空腸而喂乾料料後而飲冷水充谷料積於大腸後面而結也令獸壯腹飽腹觀後迴頭起而復臥臥而復起此謂後結之症也醫工入手取之起臥不住者打結丸嚙之

歌曰

料後空腸過飲泉水充谷料塞腸門迴頭覷腹蹄跑地擺尾伸腰蹶跳眠通關苦洒油調下谷道塗油入手痊穿腸左右搜尋

糞氣脉通宜便得安

師皇曰凡馬肚腹脹痛迴頭覷腹者後結也塗油入手取之氣脉不通不住疼者打結丸嚥之

形狀連連臥地臥而又起弓腰脊氣覷腹迴頭

脉色口色赤而帶紫石臍中澇而沉

治法徹三江大脉血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結

丸嚥之

調理不住牽走木杖肚下刮之

打結丸 治馬臟結

續隨子

兩四

郁李仁

兩一

皂角

半兩

瞿麥

兩一

鼠糞

兩四

榆白皮

兩二

牽牛

兩一

芫元

醋炒

共爲細末大麥麩半斤打糊爲丸如彈子大每服一丸細切

元亨療馬集 疔形疔工卷

三

青葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞曬之

○馬患冷痛第十八

出穆公論

冷痛者陰氣大盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水太過停立不散傷之於脾脾傳於胃胃火微弱不能傳送膀胱積於腸內氣不升降腹中作痛令獸渾身發顛腹迴頭運運臥地鼻咋喘急此謂冷傷之症也橘皮散治之歌曰

冷水飡多肚腹疼

伸腰擺尾顛伶伶

迴頭腹迴踏腰臥

腸中虛氣响鳴雷

酒煎順氣青皮散

一捻飛鹽兩並葱


噤了擗行三二里

自然痛可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水太過腸中作痛也凡治者和血順氣煖臟溫腸橘皮葱酒曬之

子良歌曰識得尋常病先須用橘皮檳榔爲第一葱酒最相宜

馬患冷痛之圖



趙氏曰冷痛者寒傷所致也其痛有五醫家先令觀其外形分其內痛藥施加減隨之

形狀直尾行大腸痛捲尾行小腸痛蹲腰踏地跑經痛腸鳴泄瀉冷氣痛急起急臥脾經痛脉色左脉中沉而瀉臥蚕唇舌如綿

治法針四蹄頭血三江大脉血橘皮散曬之射香散鼻內吹之調理不住騎走用竹掃帚於腹下刮之

戒止寒夜休拴冷處當日冷水忌之胎馬勿令吹鼻

橘皮散治馬傷水腹痛起臥

青橘皮 陳橘皮 厚朴 桂心 細辛 茴香 當歸

白芷

檳榔

右件爲末每服二兩葱三枝飛鹽三錢苦酒一斤同煎三五沸候溫嚥之

加減

大腸痛本方減白芷加蒼朮木通同煎嚥之小腸痛本

方加吳茱萸蒼朮同煎嚥之胞經痛本方減茴香加木通枳殼茵陳滑石同煎嚥之冷氣痛本方加皂角艾葉同煎嚥之脾經痛本方減茴香加白木甘草同煎嚥之

射香散

治馬傷水方

射香

瓜蒂

藜蘆

半夏

胡椒

皂角

一延

已上共爲細末每用一字柴竹筒中吹於鼻中滴下清水服之
之大效

急救方 行在途間針藥不備用此方治馬起臥

青葱三枝

飛鹽兩

山胡椒

煎菜黃馬半兩

已上三味共同搗爛好酒一大碗調煎二沸傾出湯去大氣帶熱嚥之嚥後住行溺之大效

用黑羊膽內裝乾薑俟陰乾復碾爲細末點眼中不住


擗行溺之大效

○馬患熱痛第十九

出賈公集

熱痛者陽氣太盛也皆因暑月炎天乘騎地里駕遠鞍屨失於解卸乘熱而喂料草熱積於胃胃火遍行經絡也令獸頭低眼閉行立如痴臥多立少惡熱便陰此謂暑傷之症也香薷

馬患熱痛之圖



○肺脈

○委中

散嚙之 歌曰

盛暑炎天遠出奔肺心熱極兩
相攻四肢倦怠行無力兩目昏
蒙閉不睜茶連香需同花粉歸
草梔翹等分停童尿蜜水相和
嚙兩針鵝脈自然寧

師皇曰熱痛者熱之所致也凡
治者清頭目降陰火滋腎水化
胸痰兩針喉血刺之

岐伯曰凡為熱症腰膝痛者前
熱後寒之症也凡治者清心解
暑滋腎補陰寒涼之藥不可太

過嚙之

王良歌曰前面熱未退腰膝却行遲是熱須醫熱少將冷藥醫
形狀精神倦怠兩眼如痴臥多立少惡熱便陰

脈色雙白洪數唇舌鮮紅

治法微鶻脈血香薷散嚙之調理散養清涼之處水浸青草喫
之戒忌休拴煖處諸料忌之

查而散治馬熱症中暑

香薷 黃芩 黃連 甘草 柴胡 當歸 連翹 花粉

山梔子

右等分爲末每服二兩蜜一兩漿水半升童便半盞同調
遠草嚙之

○馬患胞轉第二十

出起臥論

胞轉者一名小腸結也。背因乘騎湧急卒熱而飲冷水水未入腸又且加之緊驟清氣未升濁氣未降清濁未分冷熱相擊以致膀胱閉塞也。令獸用腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄此謂胞轉之症也。滑石散治之。

歌曰

胞經無入氣通傳 分利陰陽似湧泉 清氣不升濁氣閉
積而盈滿不通宣 踏地不眠獅子坐 蹲腰不臥尾梢彎


塗油入手於谷道 膀胱輕按卽時安

師皇曰凡馬起臥肚腹脹滿蹲腰踏地者胞轉也。凡治者清膀胱利小水瀉相火順陰陽水道入手撥之。

觀形肚腹脹痛踏地蹲腰欲臥不臥打尾跑蹄

脉色右見中滑而沉口色紅而帶紫

馬患膈轉之圖



治法

徹三江血滑石散嚥之水道
入手撥之

調理徐徐擗走腹下刮之

戒忌當日禁止飲喂

滑石散治馬膈轉

滑石 澤瀉 燈心 茵陳

知母 黃蘗酒炒 猪苓

右件爲末每服二兩水一升

調煎三沸入童便半盞帶熱

空草麤之

○馬患陰腎黃第二十一

出瘡黃論

陰腎黃者濕氣流注膀胱也皆因久渴失飲空腸誤飲濁水太過停立不散積在腸中陰氣生而傳之於腎水水相合水勝而火衰不能運化沉於臍下凝於外腎也令獸腎囊硬腫如石如少痿行不動胯拽腰拖此謂外腎陰黃之症也苜香散治之歌曰

外腎虛浮冷若水

爲緣陰雨過多淋

誤食硝石凝於腎

宿水停臍冷氣浸

捧拽後胯精神慢

口色如綿脈細沉

苜香酒煮連三嚥


火針陰脬自然寧

師皇曰陰腎黃者膀胱積濕也凡治者溫中煖後滋腎補陰陰

脬火針治之

王良歌曰腎黃腎脈腫積冷致如然火針陰脬穴旬日始安痊

馬患陰腎黃圖



岐伯曰陰黃者飲喂失調也凡
砂石硝土濁惡麩漿一切不可
飲之

十八大病且誤食砂石多生水
腎空腸飲濁必腫陰黃

觀形捧拽後脰耳搭頭低腎囊
硬腫如石如水

脉色雙鳧沉細口色如綿

治法火針陰脘穴煖腎茴香散
確之

調理晝縱於郊麓日晒之夜散
於廐穰草鋪地臥之

禁止戒飲空腸水思控濕地眠

茴香散 治馬外腎腫硬如石如水捧拽後膈病

茴香 練子 甘草 貝母 秦丸 官桂 梔子 青皮

乾薑 知母 酒炒


右爲末每服一兩二錢青葱三枝苦酒一盞同煎三沸候

濕空草曬之

○馬患偏次黃第二十二 出瘡黃論

偏次黃者心肺黃也皆因喂養太成奔走過谷料熱毒積於腸
內瘀血痞氣結在胸中三焦壅極榮衛相攻痰血結於心肺
而成黃也致令胸傍膈畔布滿癰疽氣引枝苗腫之於外故
名偏次實爲心肺之黃也令獸喘急氣促耳搭頭低行如酒
醉目睛唇垂此謂肺發偏黃之症也無方無則治之

馬患偏次黃圖



疾勞輕者疾此二穴

歌曰

偏次生黃實可愛，患人不識病。
根由膈內有黃根，始肺氣引枝。
苗腫出臑胸，傍有腫終無瘡。臑
腫生癰，命必休，謹告醫生休令
治，枉施針藥反為羞。

師皇曰：偏次黃者，心肺黃也。此
黃直透心肺，醫者鑒之。

王良曰：偏次黃雖少，皆緣積熱
成黨，間連五臟，根向肺中生。

宿樂曰：凡馬偏黃，腫於擔風骨
上，硬而多痛者，可治。腫於臑骨

兩傍軟而不痛者難醫

瘡黃論曰硬而多痛者爲毒軟而不痛者爲黃

形狀胸傍軟痛鳧跗虛浮精神倦怠耳搭頭低

脉色雙鳧散亂唇舌如煤

五十四疔見前篇後撰休醫療肺黃膈毒總無醫

○馬患脾氣痛第二十三 出坐觀經

脾氣痛者胃氣痛也皆因衰羸老瘦外感腸傷野放遭逢淋雨

外拴夜露風霜久渴失於飲水空腸飲水太過傷於脾經脾


傳於胃胃火微弱氣不升降兩相促迫而成痛也令獸蹇唇

似笑泄瀉腸鳴擺頭打尾臥地躡腰此謂脾胃冷傷之症也

健脾散嚙之

歌曰

馬患脾氣痛圖



脾膈穴

馬病須看戎已寒擺頭打尾口
唇塞料草不食兼泄瀉脈行遲
細口如綿有時肉顫平身臥
地舒腰起覺難健脾薑酒同煎
曬火針脾膈自然安

師皇曰脾氣痛者胃氣痛也凡
治者健脾暖胃順氣溫腸脾膈
火針大效醫者鑒之

王良曰治脾人問妙針脾第一
功火針脾膈穴氣脈常時通
形狀塞唇似笑擺尾搖頭躡腰
臥地泄瀉腸鳴

脉色雙危遲細口如縮

治法火針脾腧穴健脾散嚥之

調理不在揅行背上臆履搭之

戒忌寒夜休揅冷處當日冷水避忌之

健脾散

當歸

白朮

甘草

葛蒲

砂仁

澤瀉

厚朴

官桂

青皮

陳皮

乾姜

白茯苓

五味子

右件爲末每服二兩薑三片鹽一捻酒一升調煎三沸揚

去大氣帶熱嚥之

○馬忠草墮第二十四

出發蒙論

草墮者咽喉噎寒也皆因乘騎遠驟奔走歸來喘息未定卒然而喂料草乘飢而食之大急口唾未清銜環未卸喘之少刻

燕之太猛以致口中涎沫裹住料草相纏一塊遞至喉中牛而噎也令獸伸頭縮項鼻口廻涎連連啞氣促喘愈此謂咽噎之症也芸臺散治之歌曰

馬患草噎少人知 縮項伸頭口沫垂 射香灰帶芸臺子
細張裝筒鼻內吹 好把遊韉繫後脚 急行十步不宜遲
生沖清水相和嚥 胸前棒捍自然愈

師皇且元馬草噎油水嚥入咽喉隨啞而不下者咽中噎也可治沖水下咽不轉少刻廻出者胃脘噎也難醫

五十四死且胃咽不通終是死玉關閉塞莫能愈
形狀伸頭縮項侵白廻涎喘急氣促啞嗽連聲

脉色雙危洪數口色青黃

治法遊韉繫後脚捧往高坡趕返急行十數遭噎自下矣油水

元亨廣馬集 形症三卷

手

馬患草噎之圖



噎之芸臺散吹之

調理額下用手捺抹胸前木杖

刮之

元日噎通停止草料移時方許

喫之

芸臺散 治馬咽噎不下

芸臺子

即芥菜子也射香少許

瓜蒂

胡椒 皂角一匙

已上共碾羅爲細末一字裝

於竹筒之中於兩鼻孔內吹

之卽下

○馬患新駒妳瀉第二十五

出元朝集

新駒妳瀉者熱乳所傷也皆因大馬喂拴暴日之中又或遠驟歸來喘息未定幼駒乘飢誤食熱乳停之於胸清濁不分釀成其瀉也令駒腹肚脹瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭此謂大馬血熱新駒妳瀉之症也烏梅散治之歌曰

新駒妳瀉糞如漿

臥地迴頭顧兩相

乘熱渴飢食熱妳

陽相引到空腸

烏梅乾柿同爲末

黃連柯子共薑黃


溫水調和同共嚥

便是師皇真藥方

且新駒未及滿月泄瀉者大馬產血未盡也血熱致使妳瀉妳熱致成其患用藥者大馬調和血氣幼馬分理陰陽母子各各治之

駒形狀肚腹飽脹瀉糞如漿臥地不起顧腹迴頭

馬患新駒瀉之圖



騎脉色雙鳧洪大唇舌赤細

治法大馬當歸散嚙之新駒烏

梅散嚙之

調理喂養清淨之所大馬生料

減半喂之

戒品酷熱休拴廐內寒夜莫令

外拴

烏梅散治新駒瀉瀉

烏梅

一个乾柿半个黃連

薑黃

二錢桐子肉二錢

已上搗羅其爲細末白湯半盞

同調嚙之後移時喂乳

當歸散 治母馬產後瘀血未盡血熱病

當歸 全荷葉 紅花 妙海帶 芍藥 青皮 遠翹 天粉

右件爲末每服一兩水一盞調煎二三沸帶熱入童子小
便半盞嚥之

○馬患五攢痛第二十六 出玉照集


五攢痛者氣血凝溢也皆因喂養大盛肉滿脹肥草飽乘騎奔
走太急卒至卒挫失於擗散瘀血凝於膈內痞氣結在胸中
滯而不散致成其痛也令跌胸症脘痛腰曲頭低把前把後
賺弔毛焦此謂肺把五攢之病也苗陳散治之歌曰

把驟騎來木得擗 爲緣血脈不通連 毛焦賺弔精神倦

腰曲頭低行步難 六脉兩空俱令徹 紅花止痛藥骨先

章使半盞同調嚥 二服必定得安勿

馬患五攢痛圖



師皇曰凡馬三攢痛病其症有
二一謂走傷一謂料傷此二者
針血相同醫各別治者情之
至良口凡馬五攢痛爲綠氣聚
壅雨掌俱出血疑滯自然通
形狀把前把後腰曲頭低毛焦
賺弔氣促喘急
脉色肺脉沉而細小臥番唇舌
鮮紅
治法徹骨堂血腎堂血四蹄頭
血走攢者茵陳散嚙之料攢者
紅化散嚙之

又方 凡馬走傷料傷五攢痛者前四蹄用大妙童便嚥之
調理晝縱於郊夜散於廐聽其自臥自起
戒忌勿令久立生料忌之

茵陳散 治馬走傷五攢痛

茵陳

當歸

沒藥

甘草

桔梗

柴胡

紅花

青皮

陳皮

紫苑

杏仁

白藥子

右件爲末每服二兩清油一兩水半升童便半盞同調草
遠嚥之

紅花散 治馬料傷五攢痛

紅花

沒藥

桔梗

神麴

枳壳

當歸

山查

厚朴

陳皮

甘草

白藥子

黃藥子

以上各等分爲末每服二兩麥芽一兩童便一升同調草遠

嗜之

○馬患腸入陰第二十七


出金朝論

腸入陰者寒極之症也皆因外感內傷陰寒過度或騎來急渡
深淵或執渴空腸飲水或野放淋雨之中或夜繫嚴霜之下
以致外感風寒內傷陰冷傷於五臟致成其患也今獸肚腹
疼痛臥地躑腰起而跪地顧腹迴頭此謂五臟純陰之症也
卧蚕青黑者無方無則治之

歌曰

馬病須看腸入陰 迴頭跪地痛連心
熱瀉逢河又占深 脉如亂髮烟煤口
縉書揀盡無方救 百驥之中無一存
師皇曰凡馬腹痛起臥無度跪地顧腹出不存者五臟純陰之

馬患腸入陰圖



症也醫方無則治之

五十四死曰腸痛入陰須莫救

汗出無休死不醫

至良且起臥無時度將身似狗

蹄漿頻覘脈上多應腸入陰

形狀連連起臥顧腹迴頭行如

酒醉汗出無休

脈色如亂髮色似焰煤

脈色論曰脈如亂髮終難療也

似焰煤命必虧

○馬患腸斷第二十八

山療驃方

腸斷者弩傷腸胃也皆因食之太飽負重乘騎奔走太急逢溝
遇澗跳躍太猛前失後跌蹶腹腸令獸渾身肉顫汗出如
漿鼻烈糞水臥地昂頭喘急氣促此當腸斷內傷之症無方
無則治之

歌曰

馬因太飽上高崗

奔走爭先損肚腸

臥地昂頭張口喘

滿身肉顫汗沫漿

脉似蝦遊枯骨白

二孔之中糞水搶


饒若總有師皇術

腸斷三能接方

師皇曰斷者飽驟弩傷也鼻瀉糞水汗出如漿者痛之所致也

不堪治也

馬患腸斷之圖



五十四死曰鼻廻糞水當時死
汗出如漿刻地危

王良曰臥地昂頭喘渾身汗若
漿鼻中廻糞水此症必難康

脉色唇如枯骨脉似蝦遊

脉色論曰形如枯骨諸經絕脉
似蝦遊臟腑虧

○馬患肺風毛燥第二十九

肺風者肺熱生風也皆因蓄養太盛肉滿腠肥少騎多喂日久失於洗浴痰汗沉於毛竅垢塵迷塞肌膚榮衛壅極熱積心胸傳之於肺肺受其邪遍傳經絡也令獸渾身癢痒遍體風生皮膚揩擦脫落鬃毛此謂肺熱血風之一也五參散治之

歌曰

馬病肺熱風氣成 渾身癢痒似虫行 血凝氣瀉塵迷竅
熱盛腠肥血未針 體脈兩針須索去 五參瀉肺竅調勻
消風涼血煎湯洗 復本還元毛更生

師臯曰肺風者肺熱也凡治者凉心血瀉肺火清孔竅潤皮毛
兩針鷓麻刺之

玉良曰肺毒若生毒醫之要肺凉塗藥先須可用甘草湯下

岐伯曰凡羸瘦老馬三冬月冷寒主者與此症寒熱不同醫者

分別治之

疹狀

渾身瘙痒擦樹揩椿尾鬃脫落皮破成瘡

脈色

脉馬熱燥者雙鳧洪火唇舌鮮紅老瘦疼瘙者雙鳧沉

細口色如綿

治法

肺風熱燥者徹鵝脉血五參散嚙之甘草湯洗之老瘦

疼瘙者肺風散嚙之葶廬散洗之塗疥方搽之

調理夏繫涼棚冬拴煖厩凡馬睡臥不可用火灰地下鋪之

戒忌夏焮不宜加料冬瘙少令去血


五參散 治賧馬肺風熱燥

人參 苦參 玄參 紫參 沙參 秦朮 何首烏

右件爲末每服兩半蜜二兩酸漿水一盞皂角一延搗碎

馬患肺風毛燥之圖

○盆



○尾本血

取汁半盞同調嚙之

甘草湯 洗馬熱燥

甘草 梨盧 防風 荆芥

皂角 苦參 黃栢 薄荷

臭椿皮

右咀一處并花水三升同煎三

五沸去渣帶熱洗之洗後候乾

蠟燭油搽之

肺風散 治老馬血弱瘦瘠

蔓荆子 威靈仙 何首烏

玄參 苦參

已上各等分爲末每服兩半炒

糖一兩溫水一大盞同調早遠嚼之

煮麩散

治馬乾癢風痒尾葉脫落

馬根

臭椿皮

白蕪荑

苦亭藜

皂角

藜蘆

茵茹

右件爲末每用一大匙薑汁三升同煎三沸入生油少許

帶熱洗之冬月嚴寒洗於燄廐待乾方可搽出

搽疥方

搽馬乾癢

芫花

蛇床子


已上二味等分破羅共爲細末生油調勻洗後令乾塗之

○馬患項脊悵第三十

出造父經

項悵者風悵也一名低頭難也皆因乘騎遠至帶汗卸鞍夜繫舍簷之下斜風斜雨漂之瘀血凝溢脊項痞氣鬱結胸腰令獸伸頭直脊板如椽顛迴不轉首悵難低此謂外感風寒之

馬患項脊之圖



毛穴

夾

六五

伏黃

風門

症也連翹散治之歌曰

項脊悒病說根源脊項連腰硬
似椽卸鞮帶汗當風立邪氣乘
虛諸竅潛風門伏兔兼三委腎
棚百會火針攢鵝脈兩針須出
血速翹散囉得安痊

師皇曰項悒者筋悒也凡治者
療風解表破氣通關火針脊項
百日成其功矣

王良曰項悒難低首脊腰硬若
椽饒伊能善治百日始安痊

形迷伸頭直項脊悒如椽顛顛

不轉首候難低

色脉舌唇赤紫見脉沉遲

治法項上九針腰門七穴火針治之微鶻脉血連翹散治之

調理喂養煖廐晴明野放於如鹿日晒之

戒止寒夜休捨冷處隄防瘡巷風吹

連翹散 治馬項脊候病低頭不得

連翹 知母 紫蘇 當歸 桔梗

貝母 山藥 白芷

杏仁去皮馬兜苓

瓜蒌根

甜瓜子

石爲末每服兩半蜜二兩薑五片水一升同煎二三沸溫嚥之

○馬患胃冷吐涎第三十一

出伯樂新書

胃冷者脾胃冷也皆因久渴失飲困傷冷水太過或縱於淋雨之中或繫於霜露之下陰氣侵入肌肉肌肉傳入脾經脾寒


四旁胃潮百脉脾胃令之陰冷令獸渾身發顛口吐清涎
寒耳冷廉帛毛焦此謂脾胃冷傷之症也健脾散治之歌曰
口吐清清不斷涎 脾寒胃冷致如然 雙鳧沉細精神少
口色青黃耳鼻寒 健脾散內加官桂 苦酒生薑一處煎
背上捲煙過一宿 氣血調和病自安

師皇曰吐涎者胃冷也凡治者健脾胃補臟溫腸火針脾脘穴
效醫者鑒之

王良曰脾寒冷內顛胃冷吐清涎火針脾上穴屢胃藥宜先
仔細 凡馬心經伏熱舌上生瘡口內垂涎者與此症形狀相
同受病不相同也治者勿令錯之

形狀 渾身發顛口內垂涎鼻寒耳冷廉帛毛焦
脉色 雙鳧沉細口色青黃

胃冷吐涎之圖



脾輸

治法火針脾腧穴暖胃健明散

治之

調理喂養煖厩增加料草寒夜

加鹽於背上搭之

戒忌飲水莫令飲足當甘余

是之

健脾散治馬脾胃寒傷口吐粘

涎

當歸 枳壳 甘草 葛

厚朴 澤瀉 升麻 芫

石脂 官桂 白朮

已上為未每服二兩生薑一分

苦酒一升同煎三沸温嚥之

○馬患廉黃第三十二

出岐伯對症

廉黃者內腎黃也皆因喂養大盛料草餘多谷氣積於臟內熱毒流注三焦致使腰傍廉畔鬱結而成黃也令獸臄傍軟腫廉上虛浮頭低耳搭行立無神此謂廉黃之症也無方無則治之

歌曰

廉上黃腫起

源流號腎癱

熱積三焦內

血氣不運通

根從內腎發


苗向廉邊生

飽君千百治

徒勞枉費工

師皇且廉黃者內腎黃也根坐內腎苗長腰膀頭低耳搭舌色青紫者不堪治也

馬忠賺黃之圖



交黃

去血

玉良曰

耳搭雙睛閉 頭低喘息微
臥垂青紫色 此症必難醫

形狀

腰傍軟腫 賺畔虛浮
頭低耳搭 行立如神

脈色

脈如解索 色似始煤

五十四死曰

前偏後賺 休醫瘻口腎腰黃
死必期

○馬患冷拖捍第三十三

出御車集

冷拖竿者下元寒也皆因力敗羸縮勞傷瘦馬空腸過飲冷水帶汗簷下卸鞍邪氣乘虛而入腎經腎受其邪傳之於膽令微蹲腰無力腿直如竿捍拽不動行走艱辛此謂腎冷之症也苗香散治之

歌曰

冷拖後脚恰如椽

腰曲頭低行步難

髓寒骨冷筋變硬

肝風邪濕轉筋酸

邪氣巴山溫火治

金膏醋煮貼安然


空腸煎藥苗香散

任從馳驟復佞元

師皇曰冷拖者腎冷也後腿直者濕氣盛也曲池腫者腎經虛也

五臟論曰腎虛腿腫難行步腎冷拖腰直脚行

馬患冷拖掙圖



邪氣

形狀躑腰無力腿直如桿毛焦
一膝弔耳搭頭低

相行步並脚行胯丸痛直脚行

濕氣痛

脉色腎命脉齒唇舌青黃

治法膺毛痛火針大膺汗溝穴

濕氣痛火烙掠草穴茴香散

噤之

調理喂養煖厩穢草鋪地臥之

戒忌寒夜忌控冷處隄防瘡下

風疔

茴香散治馬冷拖後脚

茵香 青皮 牽牛 細辛 巴戟 陳皮
胡蘆巴 川練子 葦澄茄 破故芷 木通 甜瓜子
已上爲末每服二兩飛鹽三錢苦酒一升煎三沸空草嚙
之

○馬患舌瘡第三十四

出李林經


舌上生瘡者心經積熱也皆因喂養大盛肉滿脹肥負重乘騎
地里寫遠乘熱而喂料草大多熱積於胃胃潮百脉毒氣衝
咽唇舌發生瘡也令獸咽哽噎口內垂涎料草難嚙耳聾頭
低此謂心熱舌瘡之症也消黃散治之歌曰

良馬唇中涎沫生 舌乾口腫色鮮紅 脉數唇焦脾土燥

火炎金削肺心壅 清咽緝袋噙於口 消黃散嚙有奇功

鶻脉雨針散去血 三朝之內病除根

馬患舌瘡之圖



喉脉血

師皇曰舌瘡者心熱也凡治者
洗心涼膈降火清咽體脉兩針
徹之

王良曰舌赤口垂涎心熱致如
然有熱頭用袋裹藥口中銜

仔細凡馬唇角生瘡口內垂涎
者此謂鐵磨口角五赤之症也
與此症受病不同治者無令錯
之

形狀頭低耳搭唇口生瘡水草
難嚥口內垂涎

脉色雙鳧洪散唇舌鮮紅

治法徹鵲脉血消黃散嚙之青黛散口內噙之

調理喂養淨處水浸青草喂之

禁止諸雜生料忌之

消黃散 治馬心經積熱方

大黃 知母 甘草 瓜婁 朴硝 黃柏 山梔子

右件爲末每服兩半雜子清一雙米泔水一盞同調草飽

嚙之

青黛散 青黛 黃連 黃柏 薄荷 桔梗 孩兒茶

右爲末生絹袋內盛貯水中浸濕於口內噙之

○馬患宿水停膈第三十五 出玉照集

停留宿水者臍冷氣虛也皆因勞傷瘦馬力敗羸胸空腸誤飲

濁水太過失於捧散停住于腸不能運化沁滲出關積於膈

下皮裹膜外鬱結而相凝也令獸毛焦草細體瘦形羸頭低耳搭行立無神此謂宿水停臍之症也健脾散治之

歌曰

良馬經年喂不肥 只因宿水注於臍 毛焦草細精神慢
口色青黃脉滯遲 雲門穴上金針徹 羽毛穿度莫差移
健脾酒煮連三嚙 氣血調和病自愈


師皇曰夫馬者稟清氣於天飲清淨之水凡一切濕滯之水空腸切忌飲之

十大病日久渴空心過飲濁毛焦滯瘦水停臍

王良曰濁水休教飲多饒毛色焦時問雖不覺月內不生膿

吸伯曰停留宿水者濕濁注於臍下也凡治皆健脾煖胃滋腎補陰調和血氣雲門病水徹之

馬患宿水停臍



形狀毛焦，廉吊，草細，肢羸，精神

短慢耳搭頭低

脉色雙見遲澁，口色清黃

治法：一雲門穴放水，健脾散噤

之

調理：喂養煖廐，增加料草熟米

湯一日一次飲之

戒忌：寒夜不可外拴，飲水莫令

飲，凡宅腸冷，水成之

健脾散治馬脾土虛弱，留宿

水偷瘦病

當歸 桂枝 甘草 薑瀟

澤瀉 砂仁 厚朴 白朮 一青皮 陳皮 白茯苓
五味子

右爲末每服二兩生薑二分飛鹽一捻苦酒一升同煎三沸嚥之


○馬患心黃第二十六

出八十一問

心黃者心風黃也皆因肌肉重氣壯神強暑月炎天負重乘
駒奔走太急鞍屨未卸卒熱而喂料草太多料毒積於腸肉
瘦氣布滿胃中痰血鬱結迷亂其心也令獸渾身肉醜汗出
如漿咬胸喘足取急驚狂此謂心竅痰迷之症也鎮心散嚥
之散曰

馬患心黃自咬身 舌似硃砂脉數洪 熱狂蹄啮逢人咬
闕亂奔馳見物驚 苓連楮子同甘草 茯神遠志與防風

馬患心黃之圖



參砂蜜膽同調嚙 三服不效 救無門

師皇曰心黃者邪然忡心也凡 治者定心定魄降火清痰風門 伏兔火燒鐵器烙之

王良曰燥悶忽嘶疆此卽是心 黃先須用火烙時下得安康

倘樂且凡馬心黃脉數舌赤者 可治脉亂舌紫者可醫咬身喘

足者亦難治也

五十四死曰咬齧身心絕休教

治心黃舌紫命歸陰

子其渾身肉顫汗出如漿咬身齒足跟急驚

脈色雙鳧洪數舌似雞冠

治法徹胸堂血瀉心抽鶻脈血定心鎮心散嚙之

火烙天風門穴小風門二穴伏兔穴百會穴已上燒鐵烙之

調理揜繫清涼之處并花水頂上澆之

戒忌少令持行休揜煖厥

鎮心散 治馬心風黃

硃砂 伏神 人參 防風 甘草 遠志 山梔子

蔚金 黃芩 黃連 麻黃去節

右件爲末每服一兩蜜一兩膽汁半盞雞子四個并花水

同調嚙之