

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十二 明 周王朱橚 撰

喘嗽門

咳嗽上氣唾膿血

夫咳嗽唾膿血者損肺傷心之故也肺主氣心主血脉感于寒微者則成咳嗽傷于陽脉則有血血于氣相隨而行咳嗽極甚傷血動氣俱乘于肺以津液相搏蘊結成膿故咳嗽而有膿也 久咳嗽上氣者是肺氣虛極

風邪停滯故其病積月累年久不瘥則冒背痛面腫甚  
則唾膿血久咳嗽唾膿血者肺感于寒微則成咳嗽  
極甚傷于經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯  
積久其血黯瘀與膿血相雜而出也

方

欽冬花丸 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧

欽冬花 紫菀 細辛 石斛 防風 莩蒻

人參 當歸 藥本 甘草 蜀椒 白朮 半

夏天雄 葛蒲 鍾乳 桂心 麻黃 各三  
活二兩烏頭 芫花 附子各一 桃仁二十兩 大棗五十枝

右為末蜜丸如梧桐子大每服二十丸酒下日二不知加之酒漬服亦得

款冬花丸 治積年咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 石斛去根土 紫菀去苗葉 細辛去苗葉 防風去苗葉

鶯人參 當歸切焙土去苗 藜本去苗 甘草炙剉 蜀椒去目並開

口炒白术剉炮裂去皮汗出  
葛蒲切各二兩桂去粗皮半兩  
麻

黃根節湯浸煮去滑焙  
半夏湯洗七遍去皮尖雙  
獨活去蘆

頭剉芫花醋浸炒乾鍾乳粉研各二兩  
桃仁湯浸去皮仁研各二兩

右為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸煎

桑白皮湯下日三夜一

補肺湯 療咳逆上氣吐膿或吐血胃膈滿痛不能食

黃耆一法五兩桂心 乾地黃 茶芩 厚朴 乾薑

紫菀 橘皮 當歸 五味子 遠志心去麥門冬

去心各三兩 甘草 炙鍾乳 白石英 各二兩 桑根白皮

人參各三兩 大棗二十枚擘

右切以水一斗四升煮取四升分四服日三夜一忌

海藻菘菜生葱酸物

款冬花凡 治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不得卧

款冬花 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心 菖蒲

各五分 人參 細辛 芫花 紫菀 甘草 桔梗

防風 茶芩 皂莢 各三分

右為末蜜和丸如梧桐子大每服三丸酒下每日三服

羊肺湯 療咳嗽晝夜無間息氣欲絕傷肺唾血

鍾乳五兩牡蠣煅桂心各六兩射干去皮桃仁尖貝母

橘皮 百部根 五味子各三兩生薑六兩白石英

半夏洗各三兩款冬花 甘草炙厚朴炙各一兩羊肺一具

右切以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉鴆生葱

貝母散

出聖惠方

治久咳嗽晝夜不息氣奔欲絕傷肺唾

膿血宜服之

貝母

三分煨微黃

桂心

一射干兩鍾乳粉

一兩桃仁

三分浸去

仁炒

二兩皮尖雙陳橘皮

半兩洗去白穰

百部

半兩浸去

仁炒

二兩皮尖雙陳橘皮

三分洗去白穰

百部

半兩浸去

五味子

一兩白石英

半兩洗去滑

款冬花

三分甘草

半兩微剉

細研

二兩半夏

三分湯洗去滑

款冬花

三分甘草

半兩微剉

厚朴

半兩微剉

甘草

半兩微剉

厚朴

去皮塗薑汁炒令黃

杏仁

一兩湯浸去皮

杏仁

一兩湯浸去皮

羊肺

一具以水三大碗煮取汁

羊肺

一具以水三大碗煮取汁

羊肺

半

右為散每服五錢用羊肺汁一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

欽冬花丸出聖惠方 治咳嗽氣逆眠睡不安唾膿血喘急連

年不瘥

欽冬花一兩杏仁一兩湯浸去皮尖  
兩雙仁炒研如膏 紫菀一兩去蛤

蚧一對頭尾全者柏葉分白石英一兩半細人參

酥慢火炙黃苗土飛研水

甘草三分

炙剉

五味子三分

白茯苓一兩

天門冬一兩半

去心焙

桂心三分

熟地黃二兩

乾薑半兩

鹿角膠三兩

炮炒黃燥碎

右為末煉蜜和丸擣三百杵丸如梧桐子大每服

三十丸以粥飲送下不拘時

葶苈散

出聖惠方

治肺壅咳嗽唾膿血不得睡卧

甜葶苈

二兩半隔紙炒令紫色

右為末每服二錢水一盞煎至六分不拘時候溫服  
又療傷肺唾血

右用茅根為散每服方寸日三亦可絞取汁飲之主

熱渴

治一切肺疾咳嗽膿血不止

出肘後方

右用猪臢一具削薄竹筒盛于塘火中炮令極熱食  
上喫之一方以黃酒煮食令盡不過二服

款冬花散 刪繁療肺偏損腎中應肺偏痛唾血氣短

款冬花 當歸各六兩 桂心 蒴翁 五味子 附

子炮各七分 細辛 貝母各四分 乾薑 乾地黃 白朮

甘草炙去尖 杏仁去皮尖各五分 紫菀三分

右為散清酒服方寸日二服忌生葱菜桃李雀肉海

藻菘菜猪肉蕪荑

黃耆散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血胷滿痛不得能食

黃耆

一兩

桂心

熟地黃

赤茯苓

紫菀

去苗

陳皮

湯浸白穰

去桂心當歸

五味子

麥門冬

去心

甘草

炙赤

剉白前

人參去蘆各一兩

桑白皮

一兩半

鹿角膠

二兩搗碎

燥炒黃

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去

滓溫服不拘時

茜根散

出聖惠方

治久咳嗽不瘥氣喘欲絕肺唾膿血

茜根三百合一桑白皮一兩

款冬花分三貝母

半兩  
娘黃

紫蘇葉一兩

阿膠一兩

搗碎炒黃麥門冬一兩

去心焙川升麻半兩

熟地黃一兩

黃芩一兩

甘草半兩

炙赤剉杏仁湯浸去皮尖

分

右為散每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓不拘時溫服

款冬花丸

出千金方

治三十年上氣咳嗽唾膿血喘急不

得卧

欵冬花 乾薑 桂心 紫菀各三  
細辛分二杏仁

皂莢 肉石一作  
礮石菖蒲 烏頭各一  
蜀椒五合 吳茱

萸合

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服五丸日三夜二治  
二十年嗽不過五十日患愈咳嗽喉鳴上氣服一劑  
永瘥

白膠湯出千金方 治肺傷咳唾膿血胸滿上氣不能食惡

風目暗睞足脰寒冷

白膠 生薑各五兩 桂心 人參 紫菀各二兩 大棗

枝二十升 乾地黃切半斤 桑白皮切二升 茯苓大麻仁

飴糖各一升 大麥三升

右㕮咀水一斗五升煮麥下藥煮取三升分作五服  
桑白皮煎 療咳經年不瘥氣喘欲絕傷肺見血

桑白皮切五合 白羊肺一具芍藥十錢冬花六錢  
分

貝母十二分 麥門冬六分杏仁六分去皮尖熬為膏升麻十二分

分 生地黃汁一升 黃芩十二分 蜜一升

右切以水一斗煮取三升去滓內杏仁脂地黃汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布濾每服食後含一合日夜三四度老小以意減之微含之佳忌生冷油醋麵魚蒜蕪羨

團參飲子

出濟生方

治病因抑鬱憂思喜怒飢飽失宜致

臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿憎寒壯熱羸瘦困頓

將成癆瘵

人參

紫苑

阿膠

蛤粉炒

百合

蒸

細辛

洗去苗土

款

冬花 咯去皮杏仁

湯浸半夏

湯浸七次經霜

粟

尖炒

天門冬

去心半夏

七次經霜

葉 五味子各一兩

甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五大片煎至七分去滓食後溫服因氣而嗽者宜加木香咳而唾血有熱者加生地黃咳而唾血有寒者加鍾乳粉因痰極而咳者加黃耆因損咳而唾血者加沒藥鴟節咳而嘔逆腹滿不食者加白朮仍倍加生薑咳而小便多者加益智仁咳而大便湧者去杏仁加鍾乳粉咳而

面浮氣逆者加沉香柑皮煎

地黃散

出聖惠方

治久咳嗽唾膿血四肢瘦弱

熟地黃

一兩茜根三兩

白芍藥

三分

甘草

半兩炙

赤芍

三分

柏葉

白茯苓

三分當歸半兩

杏仁

三分尖雙仁炒黃

子芩

半兩

鹿角

膠

一兩炒令燥

羚羊角屑

半兩

貝母

半兩微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

欬冬花丸 療咳逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣

連年

欬冬花

十二分

杏仁

八分去皮

尖雙仁煮熟

香豉

十八分熟

人參

二分

甘草

三分分

蜀椒

三分炒出汗

天門冬

六分去心

乾薑

六分去心

桂心

乾地黃

各三分

右擣篩蜜和丸如彈子含稍稍嚥汁日四夜三神良

忌海藻菘菜生葱薑羨鯉魚

紫菀湯 治咳嗽吐膿血胸膈滿痞不思食

紫菀

去苗土

欬冬花

去梗去

杏仁

去皮尖雙仁炒令黃色

生乾地黃

麻黃去根節

甘草炙去節

秦艽去土

桑根白皮炙去苗

炒黃明膠

炒馬兜鈴

糯米

右各等分麌擣篩每服五錢水一盞半入棗三枚擘碎同煎至八分去滓食後溫服

杏仁湯 治肺氣壅熱咳嗽上氣或唾膿血

杏仁去皮尖雙仁炒黃色

桑根白皮炙去節

炒茈胡去苗各三分

甘草炙去節

麻黃去根節

桔梗去蘆頭

款冬花去梗去苗土

葛根炙去節

半夏湯浸去滑生薑汁製焙

右各等分麩擣篩每服五錢水一盃半生薑三片煎至八分去滓溫服

補肺白石英散

出聖惠方

治久咳嗽唾膿血胸滿不能飲

食卧則短氣

白石英

一兩碎研

款冬花

三分桂心

兩鍾乳粉

兩乾薑

一分炮裂剉

麥門冬

一兩去心

五味子

一兩赤茯苓

一兩甘草

半兩

炙微赤剉

桑白皮

一兩剉

熟地黃

一兩半

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗一枚煎

至六分去滓不拘時溫服

蛤蚧湯 治咳嗽唾膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧

酒浸  
酥炙

知母

焙

貝母

炮

鹿角膠

炙令燥

甘草

炙

杏

仁

湯浸去皮  
尖雙仁炒

葛根

剉

桑根白皮

炙

人參

一兩

枇杷葉

去毛炎  
各一兩

右龜殼每服三錢水一盞半煎至八分去滓不拘

時溫服

阿膠煎 治久咳嗽唾膿血

阿膠

二兩 捣碎  
炒令黃

薯蕷

一兩 煥  
微黃

白茯苓

一兩 天

門冬

去心一兩半焙

酥一兩 生地黃汁

一升 生薑汁

合白蜜

二合

杏仁

一兩 湯浸去皮尖雙  
炒微黃研如膏

右為細末與後五味相和于銀器中以慢火熬令得  
所用不津器盛不計時候含半棗大嚥津

鹿角膠散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血日夜不止喘息短氣

鹿角膠

搗研炒黃

柏葉炙令黃

川椒者炒汗出

乾薑炮裂

白蒺藜

微炒去刺

麻黃節去根

紫菀去苗土

人參去蘆頭刺蘭

炒  
茺花 醋拌炒乾  
各半兩

右為散每服一錢水一小盞煎三兩沸不拘時候溫  
服

紫菀散

海藏濟生拔萃

治咳嗽唾中有膿血虛癆症肺痿變

癰

紫菀 人參 知母 貝母 桔梗 甘草 五

味子 茯苓 阿膠各等分

右為麩末生薑水煎

百部散

出聖惠方

治咳嗽肩髀漸高唾膿血其味腥鹹

百部兩枳殼

一兩炒去穰

麥門冬

一兩去心

木通

一兩剉

天門

冬一兩

紫菀去苗土

貝母

一兩微黃

赤茯苓

甘草

三分  
炙剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分竹葉二七

片煎至六分去滓不拘時候溫服

百部丸

出聖惠方

治咳嗽唾膿血

百部兩

黃芩一桂心一兩五味子一兩

甘草

一兩炙微赤剉紫

菟一兩去苗土 乾薑一兩炮裂剉 生地黃一兩 茵根一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九以粥飲下不拘時候服

生地黃煎出聖惠方 治肺臟虛熱咳嗽咽乾痛時唾膿血

生地黃取自然黑錫合八合 白蜜三合 白沙糖三合 生薑汁

川升麻三兩 鹿角膠三兩炒酥 合一兩 菓末

右件藥都于銀鍋中以慢火煎攪勿住手候稀稠得  
所以不津器盛之不計時候含一茶匙嚥津

補肺湯 治咳嗽逆唾膿血咽喉悶塞胸滿上氣不能

飲食卧則短氣

款冬花

三兩桂皮去粗皮

鍾乳粉

研乾薑

炮裂

白石英各三

麥門冬

四兩去心焙

五味子

炒兩桑根白皮

炮裂

剉半斤

右箇擣篩每服五錢水一盞半入棗二枚擘粳米數十粒煎至一盞去滓溫服日二夜一

枯萎湯 治咳嗽吐血喘滿肺痿

枯萎

一枚取瓢仁蛤

馬兜鈴

炒黃防已

葛根剉貝

母心去甘草

杏仁

湯浸去皮  
尖雙仁炒

阿膠

剉入糯米二合  
同剉炒去米

右箒篩每服三錢水一盞蜜半匙煎至七分去滓溫

服日三夜一

五味子湯

出千金方

治咳嗽唾膿血牽胸脇痛

五味子

炒

生地黃

焙桑根白皮

炙剉各一兩

桔梗

紫

菟土

去苗續斷

甘草

炙剉各半兩

赤小豆

各半兩

右箒擣篩每服三錢入竹茹少許水一盞半煎至八

分去滓溫服日三夜一

乾地黃散

出聖惠方

治肺傷咳嗽唾膿血腹中有氣不欲

食惡風目闇足脰酸寒

熟地黃一兩

白茯苓

三分 茯苓一兩

芍藥

一兩 鹿角膠

碎炒 一兩

桂心

三分 紫菀

去苗土 三分去

人參

一兩去蘆頭 一兩去

大麻仁

一兩

右為散每服三錢水一中盞入棗二枚大麥一匙煎至六分去滓不拘時候溫服

百部丸

出千金方

治諸嗽不得氣息唾膿血

百部根

三兩

升麻半桂心

五味子 甘草 紫菀

去苗  
土 乾薑各一  
兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十丸日三以知  
為度一方去乾薑有桑根白皮一兩粥飲下

阿膠散 治肺痿嗽血唾血

阿膠炒酥二分 人參 茯苓 生乾地黃 天門冬浸水  
心去北五味子一分 白芨二分

右白芨別為末餘藥剉散每服三錢水一大盞入蜜  
二匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白芨少許食後

服之

桑白皮湯 治咳嗽出膿血痰涎

桑根白皮

炙

麥門冬

焙

款冬花

各二兩

貝母

去心一錢

甘草

炙

黃明膠

炙令燥

乾

草

剉

黃明膠

炙令燥

各半兩

右箋擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服日三

菜菔子煎 治咳嗽多痰上喘唾膿血

菜菔子

研爛

半兩

桃仁

去皮尖雙

仁研如膏

杏仁

去皮尖雙

仁研如膏

蜜

菜菔子

研爛

半兩

桃仁

去皮尖雙

仁研如膏

杏仁

去皮尖雙

仁研如膏

蜜

酥錫各一  
兩

右慢火同煎如稀餉每服半匙沸湯化下不拘時候

桂心散

出聖惠方

治咳嗽唾膿血氣短不得眠卧宜服

桂心人參

三分去蘆阿膠一兩搗碎炒

紫菀

三分去苗熟地黃

桑白皮

二兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓入黑錫半兩更煎候錫消不拘時候溫服

杏仁膏

出聖惠方

治咳嗽喘急候中似有物唾血不止

杏仁二兩湯浸去皮尖雙仁炒微黃研如膏

酥三兩阿膠一兩搗碎炒黃

生薑

汁合白蜜五合研如膏

紫蘇子二兩微炒

右件藥相和于銀鍋內以慢火熬成膏每服以溫粥飲調下一匙每日進四五服

生薑煎丸

一名生薑汁煎出千金方

治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血

生薑汁

杏仁各二升

糖

蜜各一升

猪膏二合

右先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令靜擣如膏

合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜  
六七服漸漸增加

鱉甲丸

出聖惠方  
宣明論

治吐血咳嗽神効

鱉甲

一个九肋  
者醋炙

柴胡

酒浸

杏仁

童子小

便炒

甘草

炙各

一兩

人參

半兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九至十五丸煎  
生薑湯下又一方用厚朴一兩薑製

雞子湯 療咳逆唾膿血

雞子一  
甘草二  
炙  
甘遂一分  
大黃二  
分  
黃芩二  
分

右切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻松菜

瀉肺湯 療肺中膿咳嗽血氣急不安卧

芍藥 麻黃去節細辛 川椒炒出汗當歸各一兩

右切以水七升煮取三升分為三服日進微汗或吐

膿血忌生菜一方有生薑一兩

鍾乳七星散  
出聖惠方 治寒冷咳嗽上氣胸滿唾膿血

鍾乳 磐石 款冬花 桂心 各等分

右治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送  
下先食服日三不知加之數試大驗又云臨卧吸服  
之

黃耆散

出十便良方

治咳嗽唾血

黃耆

糯米

炒

阿膠

各等分

右擣羅為細末每以米飲調二錢七服不計時候

薤白湯 治久患咳嗽肺虛將成癆瘵吐血

鱉甲去裙襕  
醋炙 阿膠炙令燥 鹿角膠炙令燥 甘草炙剉各一兩

兩

右麓篩每服二錢水一盞入薤白二寸同煎七分去滓食後卧服

白前湯 療久嗽兼唾血

白前 桑白皮 桔梗各三兩 甘草一兩  
炙

右切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十

數剗忌猪肉海藻菘菜

人參散

出肘後方

廣濟療瘦吐膿損肺

人參分

三瓜蒂分

二杜衡五分

右為散平旦空腹以熱湯服方寸當吐淡水惡汁一

二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服

忌生冷油膩豬魚肘後古今錄驗用杜衡三分人參

一分服一錢若有攬停滯在心胸膈中不利宜當服

之

茅根散

出聖惠方

治咳嗽傷肺唾血宜服

茅根二兩 生地黃二兩 生薑一錢

右細剉和勻每服半服以水一中盞煎至五分去滓  
不拘時溫服

黃耆方

一名黃耆 四一散 出肘後方

治虛中有熱咳嗽膿血口舌

咽乾又不可服涼藥

好黃耆四兩 甘草一兩

右為末每服三錢如茶點羹粥下亦可服

貫衆湯 治年久咳嗽出膿血

貫衆  
剉蘇楞木

剉各  
一兩

右龜擣篩每服三錢水一盞入薑三片煎七分去滓

溫服日二

療積年咳嗽唾膿血

莨菪  
升大棗

一百顆  
青州者

右以水三大升取馬糞燒火煎熟之候令汁盡取棗  
早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸  
熱則以為度不吐下痢忌並如前

法治一切肺病咳嗽膿血及唾血不止

出千金方

右好酥三十斤三遍煉停取凝當停出醍醐服一合  
日進三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方

出千金方

右以三煉酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日再夜又以  
局方大阿膠丸加木香少許食後服

華蓋散

出三因方

治肺虛或感風寒暑濕及勞逸抑鬱憂

思喜怒飲食飢飽致臟氣不平咳嗽膿血漸成肺痿

憎寒發熱羸瘦困煩皮膚甲錯將成癆瘵

甜葶藶

半兩隔紙炒

茯苓

人參

細辛

苦葶藶

隔紙炒乾薑炮

桔梗

剉杏仁去皮尖炒

紫菀

款冬花

去梗甘草

炙陳皮各一兩

右為細末用羊肺一個心血不透者切細研爛旋旋入藥滲肺內再研勻藥盡為度泥土牆上以濕紙七層蓋覆每日去紙一層七日藥就後乾刮下再研羅為細末每服二錢溫酒鹽湯調下米飲亦得空心日

進二服

麻黃湯 療新久咳嗽壅膿血連年不瘥晝夜喘息

麻黃去節四兩  
一方二兩桂心二兩甘草二兩大棗十四枚

右切以水九升煮取三升去滓分作三服日進溫用  
有効忌海藻菘菜生葱等物

白术丸出指  
南方 治喘嗽時血

麥門冬 人參 地黃 白术 澤瀉 茯苓

大豆各一兩 桑白皮五錢

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸用米  
飲下

四聖散

出經驗良方

治咳嗽有血

晉鹽

槐花子 乾葛 山梔子仁

各等分

右為末每服二錢加烏梅甘草少許水一盞同煎至  
七分食後服之

天門冬丸

出永鈴方

止嗽潤肺安血吐血咯血

天門冬

一兩

甘草 杏仁 貝母 白茯苓 阿膠

炒各  
半兩

右為末蜜和丸如彈子大每丸噙津含化日夜可服  
十九不拘時

大効潤肺杏仁散出衛生家寶方 治咳嗽上氣喘急唾血咯

血

紫菀

一兩半去腥

半夏

一兩煮

五味子

一兩杏仁

湯浸去皮尖泡七次

罂粟殼

半兩炙

紫蘇葉

右籠末每服三錢薑三片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓食後服

治肺嗽吐血

出本草

以菜菔研如泥和麪作餽飪食之佳飽食亦不發熱

治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血

出本草

以蘿蔔子一合研煎湯食上服之

參香丸

出朱氏集驗方

治咳嗽吐紅

辰砂 人參 乳香

右各等分以烏梅肉為丸麥門冬湯下

藁本湯

出朱氏  
集驗方

治男子咳嗽吐紅不止

藁本

二兩

晉誓 青皮 陳皮

瞿栗皮殼

各一

而一

右五味不犯鉄器杵爛用瓦瓶久煮為妙食後服之

咳嗽痰唾稠粘

附論

夫肺氣壅實上焦有熱飲水停留在于胸腑與熱相搏滯積而成痰也肺主于氣令邪熱搏于肺氣氣道否澁不得宣通但心胸煩悶痰滯不利故令咳嗽痰唾稠粘也

方

天門冬膏

出聖惠方

治咳嗽稠粘上氣喘急心胸煩悶不

能飲食

天門冬

二兩去心半兩半

紫菀

一兩去蘆頭

桔梗

一兩去蘆頭

貝母

一兩

赤茯苓

三兩半

桑白皮

一兩半

木通

一兩半

以上七味俱擣羅為末

生地黃汁

五合

麥門冬汁

二合

生薑汁

一合

藕汁

二合

酥合

白蜜

三合

右將諸藥汁及酥蜜內于銀鍋中入諸藥末都攪令  
勻以慢火熬成膏不計時候以粥飲調下一茶匙

天門冬九

出聖惠方

治肺臟壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬

一兩半去心焙三分湯浸

百合

二分去滑蘆頭三分去皮尖雙

前胡

三分去蘆頭微黃研如膏

半夏

七遍去滑蘆頭三分去皮尖雙

桔梗

三分去蘆頭三分去皮尖雙

漢防己

三分去蘆頭三分去皮尖雙

赤茯苓

三分去蘆頭三分去皮尖雙

生乾地黃

三分杏仁三分湯浸去皮尖雙

杏仁

三分仁炒微黃研如膏

右為末鍊蜜和擣三二百杵如梧桐子大每服二十

丸生薑湯下日進三服

旋覆花散

出聖惠方

治咳嗽痰唾稠粘肩背壅悶喘促不食

旋覆花

一兩紫菀半兩

桔梗一兩去蘆頭

射干一兩川升麻

一兩甘草三分

微赤剉三分炎湯浸去白穰

陳皮三分湯浸去白穰

麻黃三分去根節

大腹

皮

三分剉

杏仁三分湯浸去皮

尖雙仁炒微黃

右為散每三錢一服水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

細辛散

出聖惠方

治咳嗽痰唾稠粘心胸壅滯飲食減少

細辛一兩 紫菀一兩半 去苗土 五味子三分 貝母一兩 嘴 赤茯

芩一兩 杏仁三分湯浸去尖炒黃 人參三分去蘆頭 甘草一分炙微黃 赤剉

青橘皮三分湯浸去白穰

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服

木通散出聖惠方 治咳嗽痰唾稠粘不散胸中壅悶

木通半兩 刺 麻黃半兩去根節 甜葶苈半兩隔紙炒令紫色松羅一

桔梗一兩 甘草三分炙 烏梅半兩微炒桑白皮半兩剉

右為散每服四錢水一中盞煎至七分去滓溫服以  
吐為度虛羸人相度服之

桔梗散

出聖惠方

治肺氣咳嗽痰唾稠粘

桔梗

一兩去蘆頭

紫菀

一兩去苗土

桑白皮

一兩剉

木通

一兩剉

旋覆花

三分

檳榔

一兩冬花

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至七  
分去滓不計時候溫服

前胡散

出聖惠方

治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱

前胡一兩去

麥門冬一兩半

貝母一兩

煨黃桑白皮一

兩

剉甘草

蘆頭一分

去心

杏仁半兩湯浸去

赤剉

杏仁皮尖雙仁炒

仁炒研

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分  
去滓不拘時溫服

皂角丸

出聖惠方

治咳嗽上氣痰唾稠粘

皂角

三挺大者去黑皮

酥炙令焦黑色

旋覆花兩

杏仁一兩湯浸

仁炒研

如膏

右為末蜜和丸如梧桐子大每服十九食後煮棗粥

飲下

咳嗽不得卧

附論

夫肺氣不足為風冷所傷則咳嗽而氣還聚于肺則肺脹邪氣與正氣相搏不得宣通胸中痞塞痰飲留滯喘急短氣晝夜常嗽故不得睡卧也

方

寧氣湯

出御藥院

治肺氣不利咳嗽聲重咽嗌乾燥痰唾

稠粘不得睡卧

甘草

炙

杏仁

去皮尖

紫菀

去梗

桔梗

各七

五味子

甜葶苈

炒隔紙

人參

半夏

生薑

紫蘇葉

桑白皮

陳橘皮

去穰各

御米穀

二兩蜜

水淹

一宿炒黃

右為末每服五錢水一大盞生薑七片煎至六分去

滓稍熱食後服

治肺氣咳嗽不得睡卧

出聖惠方

人參

一兩去蘆頭

大腹皮

一兩剉

白蒺藜

三分微炒

百合

麥門冬

三兩去心

枇杷葉

半兩拭去毛

桔梗

三分去蘆頭

葛根

三分  
剉  
黃芩  
三分  
剉  
赤茯苓  
三分  
剉  
葡萄枝  
一兩  
微炒  
酸棗仁

香令

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時

溫服

人參殼散 治七情所傷飲食不美憂悶之氣忽患咳嗽有痰倒頭不得氣急喘促睡卧不得每日咽喉如拽鋸之聲不思飲食胸膈滿悶用之見効

枳殼 陳皮 杏仁 甘草 檳榔 香附子

火麻灰 桑白皮 人參各一錢  
紫蘇二錢

右㕮咀每服用水二盞薑三片棗一枚煎服肚腹實加枳實青皮有痰加半夏

百部散出聖惠方 治咳嗽晝夜不得卧胷中不利

百部一兩 細辛一兩 貝母一兩 微黃 甘草一兩 赤剉 紫菀一  
半去 苗土桂心一兩 白术一兩 麻黃三兩 去根節 五味子一兩 杏仁  
二兩湯浸去皮 尖雙仁炒黃

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

天門冬膏 治咳嗽肺臟壅熱咽喉閉塞不得睡卧

天門冬

二兩去心

麥門冬

二兩去心

款冬花

一兩貝母微黃

紫菀

一兩去苗土

白前

一兩生地黃汁合

白蜜

五分杏仁一兩

湯浸去皮尖雙酥

二兩仁炒研如膏

右天冬等六味以水五盞煎至一大盞去滓內入地黃汁杏仁膏酥蜜等于銀鍋中以慢火煎成膏盛不津器中每日夜五七度含一茶匙噙津下極効

百部根散湯 治嗽不得卧兩眼突出

百部根 生薑各一斤 細辛 甘草各三兩 貝母 五

味子 白术各二兩 桂心四兩 麻黃六兩

右㕮咀以水一斗二升煎分三服去滓古今錄驗用  
杏仁四兩紫菀三兩

治咳嗽氣喘上焦煩壅不得睡卧

赤茯苓二兩 桑白皮一兩 剁 人參一兩 去蘆頭 麥門冬一兩 去心

甘草半兩 炙 酸棗仁三分 麻黃一兩 去根節 大腹皮一兩 剁

杏仁三分湯浸去皮尖  
雙仁炒研如膏

右為散每服水一中盞生薑半分煎至五分去滓溫  
服不拘時

又方 調肺止嗽消痰順氣如嗽不得息者服之必得  
安寧

佛耳草 白茯苓去皮款冬花 陳皮湯浸桔梗

知母 貝母各一兩 漢防已 猪牙皂角去皮酥炙  
各二兩半

右為細末每服三錢水一大盞入黃蠟烏梅各少許

同煎至五分去烏梅和滓溫服

小青龍湯 治感寒邪喘水飲咳逆倚息不得卧

麻黃 芍藥 細辛 桂心 乾薑 甘草炙各三兩

半夏

半升

右以水一斗入麻黃減二升去上沫乃內諸藥煮取  
三升分為三服弱者服半升若渴去半夏加桔梗根  
三兩若微痢去麻黃加蕘花如雞子大若飲食噎者  
去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃

加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升咳而上氣  
腹脹其脉浮心下有水飲者胸中缺盆痛加石膏二

錢研

安眠散 治上喘咳嗽久而不愈者

款冬花 麥門冬去心烏梅肉 佛耳草各二錢陳皮

去白甘草三錢半御米殼七錢半

右為細末每服三錢水一盞入黃蠟如棗核許同煎  
至八分去滓大溫臨卧服之

寧神丹 治遠年近日咳嗽喘滿不得眠卧或因風寒入于腠理不得眠者並皆醫療

防風一斤 乌梅肉 桔梗 甜葶苈各半斤 人參 知

母紫蘇葉各四兩

右為細末麻黃膏子為丸如彈子大每服一丸水一盞煎至四五沸化開如不開時用匙杓研開臨卧時熱服汗出為度煎藥可用銀石沙磁器內不用銅鐵器服藥後忌房室驢馬肉雁雞豬肉魚鴨等又忌濕

麵油膩發病等嗔怒熬麻黃湯法用麻黃五斤去根  
切作二寸走水洗過用長流水三斗運取于銀石器  
內同麻黃熬水至五升將麻黃就于水內一把搓盡  
去麻黃將麻黃水用羅子隔去淨再于銀石沙器內  
熬成膏點些入水中不散為度將前項藥末同麻黃  
膏子相和勻杵一千以上然後為丸

治咳嗽喘氣不得睡卧宜服

桑白皮

一兩剉

木通

一兩剉

桔梗

三分去蘆頭

紫蘇苗

三分大

腹皮一兩判 款冬花半兩 郁李仁三分湯浸去皮

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去

滓不拘時候溫服

治咳嗽晝夜不得睡卧咽喉作聲

川烏頭半兩炮裂去皮臍 桔梗半兩去乾薑  
蘆頭根裂判 前胡  
三分去蘆頭 射干半兩 五味子半兩 川椒半兩去目及開口者炒去汗

右為末煉蜜和擣二三百杵圓如半棗大每服一丸

含嚥津日進三服四服

治咳嗽不得睡卧

杏仁

三兩湯浸去皮尖  
雙仁

炒研如膏

黃耆

一兩  
剉

酸棗仁

一兩  
微炒

青

橘皮

半兩湯浸  
去白穰

甘草

半兩失  
微赤剉

桑白皮

一兩  
剉

右件藥除杏仁外搗羅為末入杏仁膏拌勻鍊蜜和  
搗三百杵丸如梧桐子大每服二十丸不拘時以粥  
飲下一方有麻黃

青龍散

一名橘皮  
五味子湯

治咳嗽上氣不得卧及嘔吐

出御  
藥院

人參

去蘆頭

陳皮去

五味子

紫蘇葉各一  
兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

知母丸 治遠年近日一切喘嗽連不得睡卧者

知母 貝母 甜葶藶炒黃 杏仁去皮研各等分

右為細末用錫鑄籠內蒸七遍與藥末相和為丸如豌豆大每服三十九淡薑湯下蜜湯亦可

安眠散 治一切咳嗽夜不得卧睡

瞿栗殼去蒂 杏仁 烏梅 甘草

右咬咀每服半兩白水煎卧服

定喘餅子 治咳嗽虛喘悶亂不眠

白芷 貝母 苦葶藶並生各一兩

右為細末每服一錢白麵和作餅子慢火燒熟細嚼  
生薑湯下食後日進二服

葶藶子散 治咳嗽引氣不得卧或遍體氣腫或面腫  
或足腫上氣並主之

右用葶藶子三升微火炒搗篩為散以清酒五升漬

之冬七日夏三日初服如桃大日三夜一冬日二夜  
二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待  
日滿亦可以綿紬絞即服其莖葉單莖面上葉端出  
角龕且短又有一種苟於草葉近根下作竒生角細  
長取時又須分別前件乃二種也

殼蠶湯 治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

方見喘門  
喘嗽類

五味子湯 治咳嗽晝減夜加不得眠卧食即吐逆

五味子

蒺藜子

炒去角

麻黃

去根莖熬  
掠去沫焙

桑根白皮

剉白石脂 杏仁去皮尖雙仁炒百合各一兩半兩貝母心去煖款

冬花 枳殼去穰炒紫菀去苗土柴胡去苗各一兩旋覆花

兩桂去皮半兩

右為散每服五錢水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去滓溫服不拘時候

無憂丸 治年深日遠咳嗽涎喘夜卧不安

經霜桑葉 經霜草麻葉 御米殼去蒂蜜炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食後白湯

化下日進一服

治咳嗽不得睡

杏仁去皮  
尖 人參 胡桃肉 生薑各等分

右搗成膏加熟蜜丸如彈子大臨睡嚼一丸

又方一名治  
痰喘方 治咳嗽不得睡方見喘  
門喘類

咳嗽熏法

方

療飲咳烟法

鍾乳

研

白石英

研

人參

研

丹參

研

雄黃

各七分研

水銀

研三  
分  
烏羊腎脂一  
具  
淨紙十  
張

右為末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置紙中令勻使厚一分散藥令周遍剪紙一張作三分瘦弱婦人五日用半寸熏未服藥前齋戒五日服藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十年上氣悉皆愈忌生血物

治咳嗽

款冬花

三錢

鵝管石

一錢半

寒水石

二錢半

雄黃

一錢半

鍾乳

粉

一錢半

箭草

一錢半

枯礬

半錢半

官桂

一錢半

右為細末令病者睡着喚醒急用作筒子燒烟吸之

清茶送下

治咳嗽用藥熏方

出聖惠方

鳬黃

一錢

猪牙皂莢末

一錢蠟細切

膩粉

一錢人乳合大

麻仁

一合研爛

右件藥都以人乳調和令勻以蘆葦筒長一尺二寸

破作四片一尺塗藥二寸令空却令相合以綿繫定  
須令心中通氣餘有一半藥塗在一張蠟紙上裹定  
筒子煞乾一頭點火一頭吸烟逐口嚥下如覺口乾  
便喫稀粥喫小蜜其烟筒子歇口時權以物塞定如  
此熏三四遍肺內有蟲即吐出如無蟲亦有黑涎及  
出血吐便瘥

秘方煙筒兒 治一切不問遠近日久咳嗽及婦人胎  
前產後產前皆治

雄黃五錢佛耳草  
款冬花各二錢人參  
父葉各三錢半

右為末以蠟打厚紙潤四寸鑿八寸長捲一眼裝藥  
在內燒煙熏喉

煙筒兒

雄黃  
款冬花各二兩  
硼砂二錢

右為細末雞子青一個攤紙上晒乾做管每日空心  
火上燒煙吸之一口用茶送下忌酸鹹等物

治久冷痰咳嗽及多年癆嗽服藥無効者熏法

雄黃 雌黃

不央石者各半兩  
二味同研極細 蟻三兩

右先鎔藥成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段  
濶五寸長一尺鎔藥蠟塗其面令厚以箭捲成筒子  
令有藥在裏乾令相著乃拔去箭臨卧熨斗內盛火  
然筒子一頭令有煙乃就筒子長引氣吸取煙陳米  
飲下又吸每三吸為一節當大咳嗽咯出冷涎即以  
衣覆卧良久汗出若病三五年者二三吸即瘥十年  
以上瘦甚咳聲不絕胸中常有冷痰服過寒藥補漏

俱無効者日一為之不過五七日愈昔有人病嗽胸  
中常如冰雪三年治之莫愈用此法即瘥

治久嗽

熟艾 款冬花各二錢 雌黃末半錢

右件用紙緊捲燒口吸烟湯送下

莨菪子散 治十年呷嗽

莨菪子新者 木香 雄黃無石者研各半兩

右為散與雄黃同研令勻用青紙一張先以羊脂塗

次以散藥再繆脂上捲裏之早晨空腹燒令煙出吸  
十喫每日三度

欬冬花熏方 治肺虛咳嗽日久

欬冬花 木薑子各一兩

右細剉每服二錢燒酒餅慢火焚之吸煙良久吐出  
涎凡如是熏五六次每次以清茶潤喉次服補肺藥

治咳嗽用藥熏方

右熏黃一兩細研以蠟紙一張上用熏黃薄塗令勻

與蠟相乳入急捲如上法熏之以吐為度七日將息後喫羊肉羹補之

治咳嗽用藥熏方

右以爛青布廣四寸上鋪熟艾上又布少白礬末礬上又布少熏黃末及少鹹又布少政末急捲之以火燒令着內乾罐子中以紙縵罐子上面開一小孔以口吸取烟嚥之以吐痰涎為度若心悶時略歇煙盡乃止每日三度作不過三五度瘥三七日慎油膩物

治久咳嗽不瘥熏方

右每旦取款冬花半兩用小蜜拌使潤內于一小鐸  
中以磁碗合鐸磁碗底上鑽一孔孔中內一小竹筒  
如無竹葷筒亦得其筒稍長作之碗當相合令密安  
筒處以麪溼之勿令通氣鐸下着炭火燒之少時款  
冬花煙自筒出則口含筒吸取煙嚥之如覺心少悶  
須暫舉頭即以指捻筒頭勿使漏烟吸使盡即止凡  
如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉餽飪則

便水瘡

治咳嗽腹脹上氣不得卧亦治身體水腫用藥熏之

右用蠟紙一張以熟艾勻薄布遍紙上熏黃末一分  
款冬花末三分並布艾上著一葦筒捲之每取三寸  
以籠綿繫定燒下頭吸煙喫之盡三劑即瘥後斷鹹  
醋一百日

治嗽熏法及久嗽不瘥者

右以熟艾薄薄布于紙上廣四寸後以硫黃末薄布

艾上務令調勻以荻一枚如紙長捲作十枚先以火燒纏下去荻煙從孔出口吸煙嚥之取吐止明日復熏之如前日熏一二自瘥後食白粥其餘皆忌恐是熏黃如硫黃見火必焰炎

款冬花散 治年深日久咳嗽肺虛及寒熱

右款冬花不拘多少于密室中如香焚之煙起以筆管吸其烟則嚥之或坐卧處如香焚之不吸亦妙重病數日見効輕者便効一方咽乾口燥清茶送下

歌曰

遠年咳嗽人難治 休要相醫枉使錢

細研欵冬花作善 燒煙口吸奔喉咽

三奇散 治一切咳嗽不問新舊喘頑不止晝夜無時

欵冬花

二百文

熟乾地黃

二兩

佛耳草

五十文

右三味焙乾碾為末每次二錢裝猛火于香爐中  
燒之用紙作筒子一頭大一頭小如粽樣安在爐上  
以口吸嚥盡為度即以清茶嚥下有涎出吐之經驗

方陳氏云予家一隻久苦此疾數令醫治如水投石偶在曲江置得沅州一婢親製此藥兩服而愈



普濟方卷一百六十二

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十三

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

賸錄監生臣林大本

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十二 明 周王朱橚 撰

喘門

總論

夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華蓋百脉取氣于肺喘既動氣故以肺為主病者右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀自汗皆肺實證若氣口以前脉虛者必咽乾無

津少氣不足以息此乃肺虛氣乏也 夫諸氣者皆屬於肺諸喘者亦屬於肺是以人之一呼一吸謂之息呼吸之間脾受其氣通乎榮衛合乎陰陽周流一身無過不及然後權衡得其平矣將理失宜六淫所傷七情所感或因墮墮驚恐渡水失跌仆飽食過傷動作用力遂使臟氣不和榮衛失其常度不隨陰陽出入以成急促迫于肺不得宣通而為喘也 診其脉滑手足溫者生脉濇四肢寒者死數者亦死謂其形損故也亦有痰停胃

脫痰與氣搏肺道壅塞亦令上氣夫有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出于陽明之氣逆真元耗損喘生于腎氣之上奔如是等類皆當審證而主治之肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如冰之證法當溫補如官桂阿膠之類是也肺實肺熱必有壅盛胸滿外關上炎之狀法當用清利如桑白皮葶苈之類是也水氣者漉漉有聲怔忪浮腫與之逐水利小便如小半夏

茯苓湯五苓散輩驚憂者惕惕悶悶引息鼻張與之寬  
中下氣如四七湯桔梗枳殼湯輩陽明之氣下行令逆  
而上行古人以通利為利如分氣紫蘇飲指迷七氣湯  
加半夏二陳湯加縮砂施之為當真陽虛憊腎氣不得  
歸元固有以金石鎮墜助陽接真而愈者然亦不可峻  
驟且先與安腎丸八味丸輩否則人參煎湯下養正丹  
主之雄黃麻黃馬兜鈴漢防己雞內金諸品非不主喘  
也如前治法大要究其受病之源至若傷寒發喘表汗

裏下脚氣喘滿疏導收功此則但療本病其喘自安然  
喘有利下而愈者亦有因瀉而殂者喘有數年沉痼而  
復瘳者亦有忽因他疾大喘而不救者汗出髮潤喘者  
為肺絕身汗如油喘者為命絕直視讞語喘滿者不治  
諸有篤疾正氣欲絕之時邪氣盛行多壅逆而為喘然  
則喘之危惡又安可以尋常目之 婦人產後喘急為  
病尤亟因產所下過多榮血暴竭衛氣無所生獨聚于  
肺故令喘急謂之孤陽難治治法當推所感詳虛實冷

熱治之縱是得愈必年年遇此時必發喘急者有之千  
金云治肺熱悶不止胸中喘急客熱往來欲死不堪服  
藥此可以治胸中喘用桃皮芫花各一升二物以水四  
升煮取一升半去滓以布蘸汁薄胸中再蘸再薄即効  
凡上喘中滿酸心腹脹時作聲痞氣上下不能宣暢  
叔和云氣壅三焦不得昌也可用獨聖散吐之次用導  
水禹功散輕瀉三五行使上下無礙氣血宣通並無壅  
滯後復平胃散五苓散益元甘露散分陰陽利水道之

藥則愈矣

喘

方

團參丸

出簡易方

治五臟相乘榮衛失度不能隨陰陽出

入以成呼吸故氣經于臟不能受納諸氣促迫上併

于肺壅管溢而氣爭則喘

桑白皮

剉炒兩 團參各三

人參

白术

杏仁

去皮尖炒

麥

門冬

去心桂心

陳皮

荳子

炮核去皮

附子

炮去皮

大腹

皮剉 榴榔剉 芙花炒 澤瀉 積實炒 吳茱萸 半  
炒

夏麴各半  
兩

右為末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸食前  
米飲下未効漸加至三十丸

紫蘇子湯

出危氏方

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘  
促煩悶腸鳴氣走瀉瀉有聲大小便不利脉虛緊而  
濶

紫蘇

一兩一方用紫蘇子

大腹皮

草果仁

半夏

湯浸洗七次

白术

枳實

去穰  
炒

人參

甘草

炙各半兩

厚朴

去皮薑  
汁製

木香

火不見

陳皮

木通

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎至七分

服不拘時

杏參飲

濟生方

治因墜墮驚恐渡水跌仆疲極筋力喘

急不安

人參

桑白皮

橘紅

大腹皮

檳榔

白术

訶子

麵裹煨取肉

半夏

湯泡七次

桂心

火不見

杏仁

去皮尖炒

紫菀

洗  
甘草 炙

右等分咬咀每服四錢水一盞半生薑五片入紫蘇葉七葉煎至七分去滓溫服不拘時候

玉華散

出直指方

治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和

神氣

甜葶苈

培香

桑白皮

炒

天門冬

去心

馬兜鈴

半夏

製

紫菀

杏仁

去皮尖

貝母

炮百合

人參

各半兩

百部

甘草

炙各一分

右剉散每服二錢半薑四片大棗三枚服一方無生

薑煎

神祕湯

出直指方

治水氣作喘

陳皮

北梗

紫蘇

人參

五味子

檳榔

桑白皮

炒半夏

製甘草

炙各等分

雄黃丸

出直指方

治喘

雄黃

研白礬

木香

生葶藶

各一分

馬兜鈴

去殼雞

內金

淡豆豉

各三分

信砒

絳芒營者研

生用一錢半

錢半

右各取實分數並細末研米漿煮糊為丸如胡椒大  
每服五丸清茶稍冷臨卧送下至七丸次日飲食勿

用熱藥豆生嚼解砒霜毒

加減瀉白散

出拔草方

治陰氣在下陽氣在上咳嗽喘促

桑白皮

一兩

甘草

五錢

陳皮

五味子

人參

各五錢

地

骨皮

七錢

青皮

二錢

白茯苓

一錢

右㕮咀每服四錢水一盞半入粳米十粒煎至一盞  
去滓食後服之

加味控涎丸

出危氏方

治風熱上壅或中脘停留水飲喘

急及四肢浮腫脚氣入腹平常腹中痰熱諸氣結聚

服之得利則効

大戟

芫花

甘遂

甜葶苈

巴豆

各一兩去殼

黑

牽牛

三兩炒去頭尾

白芥子

炒二兩

右為末米糊為丸粟米大每服三七丸清茶送下或溫水亦可服後莫可服甘草藥及熱水

五味子湯

出直指方

治寒熱喘

北五味子 杏仁 橘紅各一  
麻黃去節一兩 甘草

炙生乾薑 辣桂各半

右庵末每服二錢半蘇三葉煎服肺虛加炒阿膠喘甚加馬兜鈴

五味子湯選方 百一治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀郎

中姪發喘嗽諸藥皆不瘥得此三服遂愈

乾薑炮半 甘草炙半 陳皮去白三分 桂 茯苓 五味

子各一  
兩

右剉為散每服五錢水一大盞煎至六分熱服

麥門冬湯

出三因方

治嘔逆上氣喘急咽喉不利止逆下

氣

麥門冬

去心兩一錢

半夏

製六錢

人參

分一分

甘草粳米

二錢  
大棗

右為龕散每服四錢水三盞棗三個煎至六分去滓

空心服之

五味子湯

出一百選方

治寒喘

橘皮

三兩去白

甘草

一兩半錢

麻黃

四兩去根節

杏仁

二兩炒去皮尖

真

北五味子

二兩重

右為籠末水一盞半藥末二錢煎七分去滓通口服  
不拘時如喘甚加藥末入馬兜鈴桑白皮同煎夏月  
減麻黃一兩無不効者昔日高申之每苦喘疾發甚  
時非此不能治

秘方黃丸子

出簡易方

治消痰定喘

雄黃

研易

雌黃

研各一錢

山梔

七枝去皮

菜豆

四十粒信石少許

右為末麵糊和為丸菉豆大每服兩丸生薄荷清茶  
臨卧之時送下

神秘散

一名神秘湯  
出三因方

治定喘嗽補心腎下氣

阿膠

三兩  
分炒

雞胫骨

一兩  
半

白仙芍

半兩  
三宿晒乾炒

團

參

一分

右為末每服二錢糯米飲空心下

八寶丹

出朱氏  
集驗方

治痰實發喘

雄黃

雌黃

朱砂

信砒並生  
用

白礬飛  
過菉豆粉

黑豆生巴豆去油皂角炙去黑皮各一錢

右為細末煮糊為丸如菜豆大磨刀水下一丸至三

丸

四磨湯出濟生方 治七情傷感上氣喘息妨氣不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右各濃研水和作七分盞煎三五沸稍溫服或下養

正丹黑錫丹

杏參散

一名杏參湯  
出和劑方

治上氣喘滿咳嗽倚息不能卧

降痰下氣胸脇脹滿神思昏憒並宜服之

杏仁 桃仁

並炒去皮尖桑白皮蜜炙三度油浸一人宿控乾各一兩

參一  
兩

右為末每服二錢水一盞薑三片棗一箇煎至七分  
服不拘時

五靈丸

出直指方

治肺喘久不愈漸成息貴

木香半兩

馬兜鈴去穀炒

草薢微炒各一分

川五靈半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九杏仁

二枚搗碎薑三片煎湯下一方棗肉為丸

人參丸 治喘

人參

二錢半

苦蔖蘆

炒五兩

南星

三錢半

夏

三兩

右為細末生薑自然汁麪糊為丸如黍米大每服五  
十九薑送下漸加亦可小兒減數服之

坎離湯

出朱氏集驗方

專定喘

革澄茄

石菖蒲

各半錢

白术

茯苓

各一錢

甘草

半夏

泡七次

紫蘇子

各二錢

右為末水一盞半煎不用薑

二黃丸

出濟生方

治停痰在胃喘息不通呼吸欲絕

雌黃

雄黃

各一錢

右研末羅極細鎔黃蠟為丸如彈子大每服一丸半夜時候熱煮糯米粥乘熱以藥投在粥內攪轉和粥喫之

棗杏丸

出朱氏集驗方

治喘

大棗

五十箇去核

荸薺

黃者二兩微炒

杏仁

三兩去皮尖

土

右搗細末取棗肉研成膏為丸如梧桐子大每服三十丸桑白皮湯下當令人大便鴨溏不妨

杏參散出仁存方 治喘氣息

桃仁 杏仁並去皮尖炒 人參 知母 貝母 桑白

皮米泔浸蜜炙三度

右等分為末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分食後服

菖蒲煎 治肺中風喘鳴肩息

菖蒲 款冬花 紫菀 人參 桂心 各等分

右為細末煉蜜和丸皂子大每服一丸煎糯米飲化

下

紫參湯散 出拔萃方

治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安

卧

米穀 二兩蜜炮黃色 麻黃 桔梗 五味子 甘草 炙紫

參 各一兩

右為細末每服四錢水煎臨卧服

神秘湯出拔草方

若病人不得卧，卧則喘者，喘者水氣逆

上乘于肺，肺得水浮，使氣不通流其脉，沉大宜服之。

橘皮洗 生薑 紫蘇葉或用子 人參 桑白皮炒各半兩

右咬咀以水三升煎至一升去滓，分作三服，溫用一方。有白茯苓、木香各二錢，指迷方以五味子湯加去

桑白皮

玉蟬散出仁存方

治氣發喘，坐卧不得。

人參 草麻葉 霜桑葉各半兩 詞子肉半兩 鐘乳粉

一  
兩

右搗羅細每服二錢溫糯米粥飲調下每于食後服之

理氣丸 治氣不足動便喘促遠行久立皆不任汗出  
鼻乾心下急痛苦悲傷睡卧不安

杏仁去皮尖翹  
炒研別 桂枝去皮各  
一兩 益智去皮  
乾薑  
炮各  
二兩

右為末蜜丸如桐子大以鍾乳粉為衣每服三十九  
空心米湯送下

宣肺湯

出百一選方

治喘

細辛 甘草各一兩 防風二兩去蘆 麻黃四兩不根節

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

天南星散

出本草方

定喘

南星 半夏 青皮並炒令黃等分白礬煅各

右為末每服一錢好北棗去核入藥在內細嚼噙下  
治久患肺氣喘急至妙

用杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一

日三四換浸半月取焙乾研爛極細每服一棗大丸  
薄荷一葉蜜一雞頭大水一中盞同煎取七分食後  
溫服甚者不過一劑瘥永不發動忌腥

棗杏丸

一名大乾  
棗三味丸

治喘

方見咳嗽門久咳  
類出仁存方

大黃散

出附後方

治大熱行極及食熱餅竟欲飲水過多

衝咽不即消仍以氣呼吸喘息方瘥

大黃 乾薑 巴荳

各等分

右為末每服半錢若得吐下即愈

五礬散 治喘并痰嗽一名炎  
肝散

五倍子 白礬

右各等分為末和勻每服三錢以生豬肺火上炙熟  
蘸藥末細嚼噙食後服一方用生豬肝蘸藥亦可漢  
陽公庫兵黃六者舊苦此病百藥不效于岳陽路上  
遇一道人傳此方兩服病不復發

杏仁散 治喘

馬兜鈴一兩  
杏仁一兩去皮尖炒

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓食後服之  
定喘飲子

訶子肉三肉四兩不  
麻黃去節

右為麩末每服四錢水二盞煎至一盞二分去滓入  
好臘茶一錢再同研至七分通口不拘時候臨卧服  
之尤佳立如神効老幼可服一方加人參二兩名訶  
參散本方只兩味

如神湯 治喘

芍根一握生剉臨時取生者妙桑白皮

右等分用水一碗煎至八分一服即止甚者三服

竹葉橘皮湯 治大走馬及奔趨喘乏便飲冷水因得

上氣發熱方

竹葉三斤橘皮三兩

右件藥以水一斗煮取三升濾去滓分為三服令三

日服一劑

神秘方 治喘

右以猪爪甲二枚燒灰細研入麝香當門子一枚同  
研臘清茶調下

故錦散 治喘

右燒故錦一寸燒灰清茶調服神効

荪蕘散 治喘

右用荪蕘二箇入明礬一塊如棗子大入荪蕘內燒  
煅存性為末將蘿蔔爛煮蘸藥末服之汁過口藥盡

病除

大黃散 治肺喘

右用川大黃為末以新水調下

躁鑿飲子 治下氣定喘導涎消腫

人參 木通 半夏 附子炮 草果仁 木瓜

秦艽 檳榔 杏仁 赤茯苓連皮 橘紅各一兩 厚朴

一兩半 木香 甘草各半

右㕮咀每服半兩水一盞半生薑七片煎至八分去

滓服不拘時

加減滲濕湯出朱氏集驗方 先用靈砂合米復丹服若只丹

服靈砂則秘合則通次用後藥

嫩蒼木

三錢炒

白术

三錢赤茯苓四錢

丁香

錢炒縮砂仁

木瓜

神麃

綿薑

陳皮

草菓

厚朴

製炒各三錢

錢甘草

半二錢

右前咬咀薑棗煎厲端明得喘疾醫下痰疎導之藥引客邪腎經而兩足并外腎發腫有僧云此脾胃虛用此則大小便自流利

妙方出鮑氏方 治喘息諸方治不効者

代赭石煅末一兩 牡蠣粉一兩 皂角去皮尖一兩 貝母半兩

右為末每服二錢鹽水入麻油一二點調下

葶苈丸出本事方 定喘急肺積

苦葶苈一兩 當歸 肉桂 白蒺藜 乾薑 川烏頭 吴茱萸 鰐甲 大杏仁 茶芩 人參各半  
兩 檳榔一兩

右為細末煮棗肉和杵如梧桐子大每服二三十丸

薑棗湯下日進三四服不拘時候

皺肺丸

貝母炒知母 秦艽 阿膠炒款冬花 紫菀耳

百部去穡米心炒各一兩杏仁去皮尖別研四兩

右為末將羊肺一箇先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧桐子大每服五十九食前桑白皮湯下

三分茶

出儒門

事親

茶

二錢

蜜

二兩

蕎麥麵

四兩

右以新水一大碗約打千餘數連飲之飲畢良久下氣不可停人喘自止妙矣

葶藶散

出仁存方

治氣喘滿急腹脹不得卧

苦葶藶

炒搗細一兩

桑白皮

一兩陳皮

去白一兩

右為末每服三錢水一盞棗兒二箇煎至七分去滓

服之

人參胡桃湯

一名觀音散  
出直指方

治胸滿喘急不能睡卧

方見

咳嗽門  
痰嗽類

神應丹

出危氏方

治肺氣喘息晨夕不得睡卧不問久新

一服見効

砒石

一兩

菜豆

六兩

右同煮以豆爛為度取出砒石入黃丹一兩同研爛用紙做捲五七重如豆筒又入砒石黃丹以黃涇固濟復燒紅為度又入黃丹一兩麪四分為丸如粟米

大又以黃丹二兩為衣每服二粒新井花水下得効  
即止

真應散

出三  
因方

治遠年喘氣急不能眠卧百藥無効者

右白石英四通明者以生絹袋盛用雄猪肚一箇以  
藥入線縫定煮熟取藥出再用猪肚一箇如前法煮  
三煮了取藥出控乾研為末以官局欵冬花散二錢  
更以桑白皮二寸生薑三片棗二箇水一盞半煎至  
七分通口服猪肚亦可喫只不得用醬醋椒薑等調

和

治喘急妙方

北五味子 大甘草

等分  
為末

右用生薑自然汁調安在手心喫

薑蘆散

出濟  
生方

治過食煎燉或飲酒過度致壅喘不得

卧及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶

炒去  
梗蘆

蘇葉子

川升麻

薏苡仁

桑白皮

炎  
葛根

各一  
兩

甘草

炎半  
兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去滓食後溫服

瀉肺湯

出御藥院方

治肺氣逆上甚

防已

陳皮

湯浸去穰

桔梗

去蘆頭

赤茯苓

杏仁

湯浸去皮

尖生用半兩

苦葶藶

二錢半

右咬咀每服一錢水一盞半同煎至六分去滓食後溫服日進二錢或三服亦可

黃牛散

出仁存方

治肺熱脉滑大氣急喘滿

大黃一兩白牽牛二兩

右為末蜜水調二錢立止又用皂角膏為丸亦可

半夏湯出仁存方治定喘下痰

半夏一兩甘草三錢皂角炙去皮子半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片煎至七分去滓食後溫服

治痰喘方出百選方

右以胡桃肉三箇薑三片是夜服之湯嚥下即睡自

旦嗽上喘亦不作神驗如此未瘥再嚼胡桃并薑如  
前數且飲湯勿行動就枕即愈

定喘化涎

出肘後方

右用猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每個指甲內半夏  
白礬各一字入磁罐子內封閉勿令煙出火煅赤去  
火細研入麝香一錢人有上氣咳嗽喘急用糯米飲  
下小兒半錢至妙

芫花散

出百一選方

治實喘肺氣脹喘急心胸滿若氣虛

而喘者不可服

芫花

不以多少醋浸一宿取  
出醋炒令黑焦為細末

大麥麴

一方作麴

右等分和拌極勻以濃煎柳枝酒調下立定一方不

用酒水煎食後服之

葶苈湯

出朱氏  
集驗方

治肺壅氣喘急不得睡卧飲食不進

右用葶苈子三兩炒令黃搗為細末以水三升煮大  
棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合  
頓服一方大人分三服小兒分四服

治氣喘痰盛

右以檳榔為末湯調下

木防已湯

出本草方

療人膈間肢滿其人喘滿心下痞堅

面黧黑其脉沉緊得之數十日吐下即愈

用大防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩  
人參四兩四味以水六升煮取二升分再服虛者便  
愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加  
芒硝三合以水六升煮三味取二升去滓內芒硝分

再服微下利則愈禁生薑孫思邈療遺溺小溲澁亦

用三物木防已湯

葶苈散

治上氣喘急遍身浮腫

方見咳嗽門咳  
嗽不得卧類

四七湯

出直指方

治驚憂氣逼上喘

半夏

製二兩半

茯苓

二兩半

厚朴

製一兩半

紫蘇葉

一兩

右㕮咀每服三錢半生薑七片棗二枚煎服

五味子

湯出人書半

治喘促脉浮而厥者

五味子

兩人參半

麥門冬

杏仁

橘皮

去白生薑

各二錢半  
棗兒破一枚

右㕮咀以水二盞煎至一盞去滓分作二服用之

玉液散  
出南方指

治喘

團參 川芎 茯苓 官桂 知母 杏仁 莖  
蘆 茜胡 半夏各一兩 麻黃 石膏 橘皮 白  
术各一兩 蘭子 羌活 秦艽 甘草各半兩

右為麩末每服五錢水二盞薑五片棗一枚煎一盞

去滓溫服

平肺湯

出指  
南方

天門冬 馬兜鈴

百部

各半  
兩

右為龐末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

定喘餅子

出衛生  
寶鑑方

累經神驗

芫花

醋浸一宿炒黃

桑白皮

炒吳茱萸

炒陳皮

去白已上  
各一兩

白牽牛

半生半炒  
取末二兩

馬兜鈴

一兩寒食麵  
三兩

右件五味先杵為末細入牽牛頭末共麵再拌勻羅過滴水為丸如櫻桃大捏作餅子取熱灰半碗在錚

內同餅子熱每服一餅嚼爛煎馬兜鈴湯下夜卧服之如患人心頭快加上一餅至明微痢下神効婦人有胎者不可服

平氣散

出衛生寶鑑方

治盛則為喘已未歲初秋三日奉詔

至六盤山至八月中霖雨時承上命治不憐吉吳元帥夫人年逾五十身體肥盛因過飲酒及鐘乳腹脹喘滿聲聞舍外不得安卧大小便澁滯氣口脉大兩倍于人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱

濕熱大盛上攻于肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則  
實實者宜下之故制平氣散以下

白牽牛

二兩半生半炒熟取用頭末

青皮

三錢去白

大黃

七錢

雞心檳

榔

三錢半兩去白

內經曰肺若氣上逆急食苦以泄之白牽牛苦寒瀉  
氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦溫體浮理其  
肺氣青皮苦辛散肺中滯氣為臣檳榔辛溫性沉重  
下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使

右為末每服三錢煎生薑湯一大盞調下無時一服減半再服喘愈止有胸膈不利煩熱口乾時時咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

出衛生寶鑑方

桑白皮一兩  
地骨皮五錢  
知母去皮五錢  
青皮去白二錢  
陳皮三錢  
細黃芩三錢  
桔梗五錢  
甘草三錢

右件剉如麻豆每服五秤水二大盞煎至一盞去滓食後溫服數服良愈華陀云盛則萬喘減則萬枯活

人書云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意  
盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣  
有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作促肺氣果盛  
又為有餘當清肅下行而不喘以其火入于肺衰而  
不足為喘焉故言盛非言肺氣盛也言肺氣中之火  
盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也  
故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火實補肺氣用者  
不可不知

蘇子降氣湯出如宜方 治喘虛陽上攻喘促

當歸 甘草 厚朴 製前胡各二兩 陳皮 桂各二兩

蘇子 半夏各五兩

右㕮咀薑棗煎

杏仁膏 治氣喘促浮腫小便澀

右用杏仁一兩去皮尖熬研和米煮粥極熟空心喫  
二合

人參散 若猶覺停滯在心胃膈中不利者

方見咳嗽門上

氣喘膜

血類

獨聖散

又名必  
効散

得効定喘

右用訶子大者為末每服一錢糯米飲調下

治卒上氣喘息鳴息便欲絕

用人參末服之日五六服

治喘殊妙

右用露蜂房一枚須取似盞大者燒灰存性入白丁  
香七粒即雄雀糞每服一錢半濃煎人參湯調下立

止不拘時候

喘嗽

論

夫五臟者皆稟于肺若肺氣虛為風冷所乘使經絡否  
濁氣不宣通則肺壅脹則氣逆則心胸滿塞故令咳嗽  
喘急也夫肺為五臟六腑之華蓋主行氣于皮毛形寒  
飲冷則傷于肺肺一受邪安能統攝諸氣氣亂胸中而  
疾生焉重則為喘輕則為嗽喘之為病由痰實而氣不

散上激咽喉哮呷作聲咯不出嚥不下憧憧而急渴渴  
而數張口擡肩搖身輒肚噉之為疾病由氣急而痰隨  
上浮風生喉屬淫淫如痒習習如硬涕唾稠濃聲音重  
濁甚則續續不已坐卧不安諸方定喘散皆以三物拘湯  
為主麻黃散冷杏仁下氣甘草和中故也九寶湯一方  
于中皆增六品深有理焉本草云麻黃久服令人虛患  
喘人無時而發此方中有肉桂實表不致亡陽薄荷桑  
皮清利膈道紫蘇陳皮大腹寬和氣宇造化精深政如

千金方小續命湯用麻黃佐肉桂云久服不令人虛亦此意也

方

神効散 治老幼喘嗽神効

杏仁去皮尖炒一兩半 甘草 炙旋覆花各三兩 白术 莲肉

射干去心皮半兩半米泔浸 前胡 御米畧百合水浸去沫 白扁豆

畧川芎各三兩 人參 白茯苓各四兩 神麴炒五兩 桑白

皮炒 乾葛 桔梗各六兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一個煎至  
七分食後溫服

知母茯苓湯

出醫方大成

治肺痰喘嗽否塞往來寒熱自

汗方在肺臟門肺痰類

調降湯

出直指方

治喘嗽

枳殼製兩

夏製

北梗

青皮

陳皮

真蘇子

檳榔 茯苓 莢蘆

隔紙炒各半兩

木香

白豆蔻仁

縮砂仁

紫蘇葉

各二錢半

甘草

炙三分

右剉散每服三錢薑五片食前服

神應丹

出御藥院方

治諸遠年喘嗽

麻黃

一十斤走水洗淨去土爛搗用河水

桔梗

一個皂角二定去皮

貝母

炒去心桑白皮

去土紫蘇子

款冬花

桔梗

知母

各二兩已上

八味搗爛入黃汁內熬至一半去

滓澄取清汁再熬成膏

白茯苓

去皮阿膠

杵碎炒為末秤入藥拌勻各二兩

紫

菟

洗去土

天麻

人參

去蘆三味各一兩

右件十四味以藥末搜和前膏杵熟為丸如小彈大

每服一丸溫薑汁化開臨卧飲之便去枕仰卧不許  
久坐如不得睡乃藥之効也此治嗽較慢如治喘不  
以新久如神服此藥三服後似見瘳一般

平肺湯出簡易方

治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾

口燥

陳皮一兩半夏七錢

洗七次

苦梗炒

薄荷各七錢

紫蘇烏梅

去核紫菀各七錢

知母桑白皮

蜜

杏仁炒

五味子炒

瞿

粟殼七錢甘草半兩

蜜炒

右為粗末每服三錢生薑三片水煎六分食後溫服  
加味白术散出危氏方

陳皮 半夏 人參 白茯苓 白术 甘草

山藥炮各二兩 白扁豆製一兩半 紹砂 桔梗炒 石蓮肉

薏苡仁各二兩

右剉散治喘嗽每遇飲酒必發生薑桑白皮煎服効

杏蘇飲出直指方

治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉 杏仁去皮

尖各一  
兩半  
陳皮  
北梗  
麻黃去節  
桑白皮  
炒各

三  
分紫菀  
甘草炒各

一兩

右㕮咀每服三錢薑五片煎服

參蘇半夏湯出御藥院方  
治咳嗽痰涎咽膈不利喘滿氣

不宣通

人參  
桂去粗皮  
甘草炙  
木香各一  
五味子  
桑白

皮  
炒陳皮去白  
白术  
紫蘇葉  
半夏薑製各二兩

右為末每服五錢水一大盞半生薑十片煎至八分

去滓食後溫服

定肺湯

出直指方

治上氣喘嗽

紫菀茸 北五味子 橘紅 杏仁

去皮尖  
畧炒

真蘇

子炒桑白皮 炒半夏 製枳殼

製各等分

右為末每服三錢薑五片紫蘇五葉食後煎服

八仙丸 治喘嗽神効

棗

三個去核紙裹巴豆慢火燒烟盡

天南星

炮一兩

半夏

洗一兩

小皂角

皮子

甘草

炒

款冬花

白礬

枯各半兩

巴豆

七個

杏仁

三十五个

去皮尖炒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二三十丸溫  
菜薹汁下喘嗽細嚼燒蘿蔔栗子生薑湯下

五靈蟬退丸出本  
事方 治年久近日喘嗽

蟬退一兩去頭足 五靈脂半兩 砒生用 雄黃生 杏仁去皮  
尖各 輕粉一兩 淡豆豉四十粒 馬兜鈴一兩  
半兩

右件除輕粉研為末用生薑荸薺自然汁合粉藥丸  
如龍眼大每服一丸臨卧細嚼生薑湯送下忌毒

人參蛤蚧散

出濟生  
拔萃方

治三十年間肺氣上喘嗽咯

唾膿血滿面生瘡癩身黃腫惡皆治之亦治肺痿咳

嗽及肺壅咽燥

蛤蚧

一對全者以河水浸五宿逐日換水淨浸去腥氣酥火炙香熟

甘草

炒紫杏仁

炒去皮尖各五兩

人參 茶芩 貝母 桑白皮 知母

各二兩

右為細末淨磁盒子內盛每日如茶點服一料永除  
神効一方有生薑二斤煎服

青金丹 治涎喘嗽胸膈刺痛久積痰飲痞塞噎悶

五靈脂

豆豉

各半兩

生杏仁

生半夏各四個

生巴

豆二个生白礬

各一錢半

青黛為衣

右為細末蜜煉為丸如豌豆大每服一丸菜葉裏溫  
薑汁送下食後臨服以青黛為衣

款花貝母散 治喘嗽虛弱病

款冬花

人參

半夏

姜製知母

貝母

甜葶苈

炒御米殼

蜜烏梅肉

已上各等分

右為末每服一錢水一盞生薑五片煎至七分食後溫服

平肺湯 治肺與腎皆以至陰積水喘嚙咳嗽益水乘之

葶藶

微炒

桑白皮

炒

北梗

枳殼

製

紫蘇莖葉

半

夏

製各

一兩

麻黃

去節

三分

甘草

炒半兩

右剉散每服三錢薑五片煎服腎水用青木香丸

紫蘇半夏湯

出御藥院方

治喘痰涎寒熱往来

紫蘇葉 半夏 湯洗七次 紫菀草 五味子 陳皮 各半

桑白皮 炙一兩 半杏仁 去皮尖炒一兩

右為粗末每服三錢水二盞生薑七片煎至一盞去滓取六分清汁食後臨卧熱服日進三次

神應丹

出宣明論

治涎噦喘滿上攻心腹卒痛及痢下血

兼婦人帶下病一切脇肋痛滿

薄荷葉 四錢 甘草 四錢 巴豆 去皮燈燒存性用 五靈脂 盆硝

各二錢 輕粉 一錢 豆豉 一兩 慢火炒

右研勻鍊蜜為丸如梧桐子大食後溫薑汁一橡碗  
許化下一丸續後空嚥津三五次禁飲食少時須覺  
咽喉微熱即効或飲子過多送藥在胃中即効少以  
引子少炒或咽喉過熱即少少吸冷水解之如止心  
腹急痛熱酒或熱醋少許化下兩丸無時未効再服  
得利尤良或利後痛未止者每服一丸以為度止痢  
溫米飲下兩丸食前日進三服治帶下溫酒下兩丸  
或大便利後每服一丸

理肺散 治喘嗽 脘肋刺痛不得眠睡

杏仁去皮  
尖炒 馬兜鈴炒 漢防已 營芩 陳皮 桔

梗各一  
兩 莢蘆

右為末每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分和滓食後溫服

沉香散出傳信  
適用方 定喘治嗽

好沉香半  
兩 阿膠半兩  
炒成珠子 結實人參一  
兩 桑白皮一  
塊  
兩微  
虛人  
減半 陳皮半  
兩 紫蘇半  
兩 甘草一  
錢

右為細末每服二錢生薑三片水一大盞煎至七分去滓通口服元方只以棗湯調下

硃砂丸

出楊氏家藏方

治老人小兒喘嗽喎痰等症晝夜不得眠

輕粉

雄黃

另研各二錢

桑白皮

半夏

生薑製鬱金

甜

葶苈

隔紙炒各三錢

右為細末麪糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服六七丸食後睡時生薑湯下病大者三十九

賺氣散

出御藥院方

治新久喘嗽不已

御米殼

用鹽或  
御米殼一兩  
一宿再用  
蜜水拌勻炒  
各一

杏仁

兩  
湯浸去皮尖  
炒一兩

烏梅肉

三錢  
甘草  
炒桔梗各二  
兩半

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓稍熱服不

拘時

安肺散 治涎喘嗽日夜不止

款冬花

五味子

烏梅肉

焙微

紫菀草

各一  
兩

甘

草

炒半  
兩  
御米殼去蒂蜜  
炒四兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫服日進二服癆嗽加人參二錢

人參款冬花散

濟生  
拔萃方

治喘嗽人不已者咳謂無痰

而有聲肺氣傷而不清也嗽謂無聲而有痰脾濕動而為痰也咳嗽謂有痰有聲也

人參 款冬花各半兩 知母 貝母 半夏各三錢 銀

米穀

二兩炒  
黃色

右為粗末每服五錢烏梅同煎臨卧服之

人參理肺散

出醫方  
大成

治喘嗽不止

麻黃

一兩炒去節

御米殼

三錢炒

人參

二兩炒

當歸

木香

各一兩

杏仁

二兩炒

右為粗末每服四錢水煎服之

玉液方

出危氏方

治久近喘嗽口乾作渴

荳蔓根

一兩知母去心炒

甘草

炙半兩

人參

半兩

右為末每服二錢先鎔下黃蠟二錢同入米飲調下

食後服

阿膠散

出傅信通用方

治一切咳嗽定喘補肺化痰

阿膠炒

一兩

紫園參

一兩

夏

湯洗七遍同生薑

鱉甲

括洗淨醋煮黃半兩

甘草剉

半兩

右為細末每服二錢水一盞薑二片煎至七分通口服如癆盛加薑白二寸同煎熟先嚼薑次呷藥人參針頭丸專治風飲喘嗽

巴豆

五個去皮

半夏

五個研湯洗七次

杏仁

五個去皮尖

草麻

五個去皮

白礬

二錢

右為細末棗肉為丸針簽藥于燈焰上燎過青煙起  
吹息藥蓋葉裏之漿水送下臨卧服之

訶子散海上名方 治喘嗽

漢防已一兩 麻黃去根節 詶子炮 杏仁炒去皮尖各半兩

右為粗末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓入好  
茶一錢再煎至七分食後溫服

知母丸 治一切遠年上氣喘嗽方見咳嗽門咳  
嗽不得卧類

右剉散生薑三片煎食後臨卧服之

清膈散

出危氏方

治喘嗽吐唾不利膈熱口中苦氣

南星一兩

白霜少許

桑白皮半兩

白附子一錢

少許

白附子五錢

白附子五錢

右剉為散生薑三片煎食後臨卧服之

安神散

出宣明論

治遠年近日咳嗽不已

御米殼蜜炒

陳皮去白

人參甘草炙各

一兩

一兩

右為末每服一錢烏梅湯下臨卧服之

百部散

百部

款冬花

麻黃去根節

杏仁去皮尖炒

各一兩

右為末入杏仁勻每服二錢水一盞半糯米二十粒  
同煎米軟食後溫服

馬兜鈴散 治喘嗽咯膿涎

馬兜鈴炒甘草炒百部 杏仁去皮尖炒熟各一兩

右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓食後溫  
服

白雲換肺丸 專治遠年近日喘嗽不止

款冬花一兩半夏 明礬 寒水石各二兩

右為細末生薑汁糊為丸如梧桐子大每服三四十

丸薑湯下

黑神丹

一名青  
金丹

治氣喘咳嗽

方見咳嗽門五  
臟指咳嗽類

天南星散

出本  
事方

治氣喘咳嗽

各等

天南星

大者二個

蚌粉 甘草

各分

右為末每服一錢水一盞薑三片煎至七分臨卧溫

服

防已丸

出宣  
明論

治肺不足喘嗽久不已者調理血氣清

消化痰涎

防已 木香 各二錢  
杏仁 三錢

右為末鍊蜜和丸如小豆大每服二十丸煎桑白皮湯下如大便利加葶苈一兩食後服之

馬兜鈴湯 治喘嗽咽燥煩渴咳膿血腥臭

桔梗 甘草 炒一兩  
馬兜鈴 二兩

右為末每服五錢水二盞糯米一合同煎至七分去滓溫服浮腫者加茯苓白朮各半兩

馬兜鈴散

出肘後方

治肺氣喘嗽

馬兜鈴

二兩面子去殼

只用裏酥半兩入碗內拌

慢火炒乾

甘草一兩和勻

右為末每服一錢水一盞煎至六分溫呷或以藥末

含嚥津亦得

大黃葶苈丸

出本草方

治氣喘咳嗽

大黃

半兩炒

葶苈子

一兩瓦上炒

洗淨

右為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服五七丸桑白皮

湯下

又方

出本  
事方

草烏

五錢  
重

麻黃

三錢  
重

右為末每服三大錢蘿蔔一個同煮令熟只喫蘿蔔妙

殼蠶湯

出瑞  
竹堂

治嗽喘喉中如鋸不能睡卧

好茶末

一兩  
白殼蠶一兩

右為細末放碗內用蓋益定傾沸湯一小盞臨卧再

添湯點服

治諸般嗽喘

出傳信通用方

罂粟殼

十個大者用新瓦一片細拍碎于瓦上炒黃

大白梅

五個湯浸三五次去

鹽味

右件用生薑五片棗二個水二盞煎至一盞去滓臨  
卧服留滓天明再煎服之

治大人小兒喘嗽

鷄子良方出經驗

右用糯米泔少許磨茶子滴入鼻中令吸入口服之  
口橫咬竹管片時則口間與鼻中涎出如線當日即

愈不過三二次絕其根源屢試驗

治遠年近日喘嗽

出本  
事方

右用皂角不蛀者三大莖一味刮去黑皮刀切開去子每子倉內入巴豆肉一粒合就麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令匝慢火炙又塗又炙以焦黃為度擘開去巴豆不用以好明礬一兩枯過草麻七個薑汁和蜜塗炙前三味為末却以杏仁二兩去皮尖研成膏却與前藥和勻每服一錢用柿子乾炙過候冷

點藥細嚼臨卧服忌熱毒魚鮓鮫油麪酒米醋煎

燬熱毒等物

神効散

一名神効湯  
出危氏方

治一切喘嗽

右用不蛀大皂角一條作兩邊去子每孔入巴豆肉一粒線繫定童子小便浸一宿火炙令焦黃去巴豆不用或入一二粒亦不妨却以杏仁半夏各一合入麻油內煎令拆裂為度同為細末每服一字乾柿點藥細嚼或用白糖點喫亦可臨卧時服服了不可喫

湯水一應物妙不可言

蛤蚧膏

出御藥院方

治遠年近日咳嗽上氣喘滿如神

蛤蚧

一對用雌雄各半兩米泔刷洗淨二十遍酥黃色潞參一兩

半末紫菀草

麻黃

一斤去根節

艾葉

槐角

二味炒

陳皮

枇杷葉

去毛

桑白皮

甜葶藶

款冬花

杏仁

去皮尖

薄荷葉

佛耳草

五味子

紫蘇葉

皂角

去皮子

貝母

各半

兩

右件除蛤蚧潞參外取十六味搗羅為粗末用河水

三斗於鍋內慢火熬至一斗半撓搥勻濾去滓令極細再用生絹袋濾過以文武火再熬成膏然後入蛤蚧潞參細末與膏和勻丸如彈子大每服一丸任意湯磨下食後臨卧服之

馬兜鈴散

出聖惠方

治咳嗽喘急面目四肢浮腫

馬兜鈴

一兩隔紙炒黃

人參

一兩去蘆頭

貝母

一兩煨微黃

甘草

一兩炙微赤色

甜葶苈

一兩隔紙炒黃

杏仁

一兩去皮尖雙仁炒微黃

麻黃

一兩去根節

知母

一兩去黑皮酥炙黃去子

五靈脂

一兩歲靈仙去子桑

白皮一兩

款冬花一兩  
陳橘皮一兩  
湯浸

黃明膠二兩  
去白穰  
搗碎

炒令

黃

右為散每服五錢以淡漿水一中盞煎至六分去滓  
溫服不拘時

天門冬丸

一名調肺丸  
出御藥院方

治肺臟客熱喘促咳嗽心神

煩悶

方在肺臟門  
肺臟壅熱類

紫菀散

出聖惠方

治咳嗽喘急咽喉不利胸中似物妨塞

紫菀

一兩去苗土

桑白皮

一兩剉

款冬花

半兩

歲靈仙

半兩

紫

胡三分

桔梗一兩去

甘草半兩炙

赤茯苓一兩

川升

麻三分

射干半兩

枳殼一兩炒去

棗去核

右為散每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去滓不計時溫服

百部丸

出濟方

治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶唇乾

口燥面目浮腫咽嗌不利積久不瘥咯唾膿血者亦

宜服之

方見咳嗽門熱嗽類

人參清肺湯 治肺胃虛寒咳嗽喘急坐卧不安胸膈

噎悶脇肋脹滿迫塞短氣喜欲飲冷咽噫引痛及療  
肺痿癆嗽唾血腥臭乾嘔煩熱聲音不出肌肉消瘦  
倦怠減食

地骨皮 人參 甘草 阿膠熟去皮尖 桑

白皮 知母 烏梅去核 暢栗殼去蒂 杏仁炒熟去皮尖 桔梗去蘆

右等分為散每服三錢水一盞半烏梅棗兜各一枚  
同煎至一盞去滓食後臨卧加蜜半匙攪勻澄清吸  
服効一方無桔梗

紫蘇子煎 治咳嗽喘急形體虛羸不思飲食

紫蘇子五合炒生地黃汁一升麥門冬五合白前一兩生薑

汁二合貝母二兩煨人參一兩去蘆白蜜一升杏仁五兩湯  
微黃

尖雙仁炒炒如膏紫菀二兩去土五味子一兩

右六味為末以諸藥入杏膏等同于銀鍋中攪勻以慢火煎成膏子不津器中盛不計時候服一茶匙含化嚥下津

桑白皮湯 治咳嗽胸滿氣急

桑根白皮

剉

紫蘇葉

連並

知母

焙

貝母

去心焙

款冬花

梗去半夏

湯浸七遍焙乾

五味子

各一兩

厚朴

去粗皮生薑汁煎

甘草

剉人參

各半

右搗篩每服三錢水一盞薑三片同煎至七分去滓

日三服溫服

紫菀湯 治咳嗽喘急胸腹脇脹悶痛疼

紫菀

去苗土

桔梗

剉

款冬花

去梗枳殼

炒熟炒去根

陳皮

去白半兩

赤茯苓

去黑皮

赤芍藥

百合

各一兩半

大腹子

剉  
二枚

右擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服  
日進三服

人參紫菀湯 治肺氣不調咳嗽喘急胸膈煩悶痰涎  
不利坐卧不安晝夜不止久不愈者以致形容瘦減  
力氣羸劣者並宜服之蘇司法再三禱之于勝舉二  
剉

人參 五味子 甘草 桂枝各一 京紫菀 款

冬花 杏仁

各半兩

縮砂仁

罂粟殼

去頂殼用蜜汁炒各一兩

葶苈散 治痰嗽喘急

葶苈

半兩

夏

黃色為度

浸軟切片

巴豆

四十九粒去殼同上

二味一處炒

炒至半

巴豆不用之

右以前二味為細末每服一錢用薑汁蜜同調食前  
嗽下

人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者四五服日

近者三四服

加減三奇散 治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利方見  
啜

門 在前咳  
啜上氣類

人參 知母 貝母 半夏 杏仁生用馬兜鈴十個

麻黃不去節各半兩 天僊藤二兩

右為粗末每服三錢用烏梅一箇水二盞蜜一匙煎至八分去滓食後溫服忌酒醋雞麵鹹酸生冷等物人參定喘湯 治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽氣急喉中涎聲冒滿昏沉氣逆坐卧不安飲食不下及治

肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

人參  
片切

麻黃

去節

甘草

炙

阿膠

炒

半夏

炒

麴

各一兩

桑白

皮  
五味子

各一兩

瞿栗殼

蜜刷炙

二兩

右為粗末入人參片拌勻每服三錢水一盞半入生薑三片煎至七分去滓食後溫服又治小兒久病肺氣喘急喉中涎聲胸膈不利嘔吐痰沫更量歲數加減服之一方無桑白皮

辰砂利膈丸 治胸膈痞滿痰飲氣滯上焦窒塞肺氣

不利咳嗽喘滿嘔吐痰涎咽嗌不利風熱相搏頭目昏痛精神困倦並皆治之

天南星 炮白茯苓 乾生薑 生犀各二兩 半夏半斤

白礬半生半枯 乾山藥各三兩 皂角一斤去皮子紅水三升熬成膏

右為細末用皂角膏子和丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十九至七十九食後生薑湯下

細辛五味湯一名青龍湯 治肺氣不利咳嗽喘急胸膈煩悶痰盛涎多喉中有聲鼻塞清涕頭痛目眩肢體倦

悶痰盛涎多喉中有聲鼻塞清涕頭痛目眩肢體倦

急咽嗌不利嘔逆惡心

方見咳嗽門喘  
嗽不得卧類

人參潤肺湯

治肺氣迫促喘急咳嗽不已并傷寒頭

疼憎寒壯熱四肢疼痛

人參

桔梗 白芷 麻黃

去節乾葛

白朮 甘

草

各一兩

白薑

半兩

右為末每服二錢生薑三片葱白二寸水一盞煎至

八分如出汗連進二服通口溫服

馬兜鈴散 治咳嗽喘急胸膈煩悶

馬兜鈴一兩桑白皮一兩

川升麻半兩

燈心三束

甘草三分

炙微赤剉枳殼一兩

炒

黃去穰

右為散每服五錢水一盞生薑半分煎至五分去滓

溫服

杏仁丸 治咳嗽喘急腹肋堅脹小便不利

杏仁三兩湯浸去皮尖雙仁炒研如膏

桂心一兩

馬兜鈴一兩

枳殼一兩

麸炒微黃瞿麥穗一兩

甜葶苈一兩隔紙

炒紫色

木通剉一兩

大腹皮一兩

皮剉一兩

右為末以杏仁膏入少許鍊蜜同和丸如梧桐子大  
每服三十九不計時候煎棗湯下

養肺丸 治脾胃呼吸風冷咳嗽上氣喘急語聲不出  
喉中似噎

人參去蘆頭  
取淨官桂去粗皮甘草炒五味子 乾薑

紫菀去土  
取淨細辛去苗葉各一兩

右為細末鍊蜜和丸每兩作二十九每服一丸綿子  
裏口內含化隨津液下之食後服

麻黃散 治男婦久近肺氣咳嗽喘急上冲坐卧不安

痰涎壅塞咳唾稠粘手脚冷痺心脇疼脹兼傷風咳

嗽膈上不快

訶子皮

去核

款冬花

去梗格枝

甘草

燼各五兩

麻黃

去根節一十兩

肉

桂

六兩去皮

杏仁

去皮尖炒三兩

右為末每服二錢水一盞入好茶一錢同煎八分食後夜卧通口服之如夜半不能煎但以藥末入茶和勻沸湯點或乾嚥亦得忌魚酒炙燙猪肉腥燥物

紫園參丸 治肺氣有餘咳嗽喘急胸膈痞痛短氣噎

悶下焦不利腿膝微腫

潞州人參

二錢半  
蛤蚧一對  
炙黃酥

白牽牛

苦葶藶一兩

炒木香

甜葶藶  
微炒上二味各半兩

右為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服四十九食後煎人參桑白皮湯送下

白木湯 治五臟受濕咳嗽痰多上氣喘急身體痛

腫脉來濡細

白术

二兩

五味子

七次

半夏

湯洗

白茯苓

去皮橘紅各一兩

甘草

炙半兩

人參

桑白皮

各半兩

右為㕮咀每服四錢水盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時候此方比三因多橘紅

定喘丹 治男女久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧齁  
齁亦宜服之累年不瘥漸致面目虛浮

杏仁

去皮尖炒別研

馬兜鈴

洗去土並足蟬蛻

翅膀各一兩

煅砒

錢二

別研

右為末蒸棗肉為丸如葵子大每服六七丸臨卧苦  
茶清于冷送下忌熟物半日一名定喘瑞應丹

漢椒丸 治咳嗽喘急坐卧不得宜服

漢椒一兩去目及開口者炒出汗三分紙隔 猪牙皂角一兩去黑皮酥炙黃去子乾薑

炮剉甜葶苈三分紙隔炒熟色

右為末用棗肉和丸如梧桐子大每服二十丸不拘  
時以桑白皮湯送下

三拗湯 治寒燠不常人多暴嗽咽痛聲嘎鼻塞痰稠

喘急

麻黃不去節杏仁不去皮尖甘草不炙各二兩

右㕮咀每服三錢薑五片煎七分去滓無時服有汗即愈

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參  
款冬花  
紫菀草以上各等分兩

右為末每服二錢水一盞烏梅一個煎至七分去滓食後溫服

寧肺湯 治咳嗽喘急不間久新患皆療治

瞿房半兩去枝梗  
剉安炒黃色五味子

去枝梗半兩

烏梅去核四兩

右為粗散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去

滓食後溫服

玉津丸 治久年喘急咳嗽欲死者

雄黃 雌黃 硫黃 信砒各一錢南星七錢

右為末薑汁調搘盃內大皂角七八條燒烟覆盃其上盃極熱烟盡冷取出丸如梧桐子大人一服四

丸小兒一服一二丸含薑片津滿口去薑以津下藥  
訖便睡神効

甜葶藶散 治咳嗽喘急方

甜葶藶一兩隔紙炒紫色 桑根白皮一兩剉

右為散每服二錢水一中盞入燈心一束大棗五枚  
煎至六分去滓食後調下

人參方一名人參散  
出肘後方 治咳嗽上氣喘急嗽血吐血宜

服此藥

右以人參好者擣為末每服三錢雞子清調之五更  
初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹  
鮓醬麵等并勿過醉飽將息

導痰丸

出經驗良方

治痰飲氣滯胸膈不利喘咳氣促脇

肋滿脹咳嗽多痰鼻塞稠涕氣不升降胸膈痞結並  
宜服之

天南星 大半夏

各不剉

白明礬

生薑

各半斤洗淨切作片

猪牙皂角

四兩剉碎

皂角

四兩無虫蛀去皮尖剉碎

已上六味一處用瓦罐以水浸過為度煮乾令透去  
白礬生薑皂角止取南星半夏剉焙同後藥同研為  
末

真紫蘇子 蘿蔔子 麥蘆各四兩 糖桂花四兩  
並炒

糖桂花去核

即山果子又名候楂此藥名  
楊氏家藏方橘核散內見

右為末麵糊為丸每服五六十丸淡薑湯下不拘時

候服

祛痰丸

出瑞竹堂

治風痰喘嗽

人參 木香 天麻 白术 煙苓 青皮 去  
陳

皮 去白以上各一兩 槐角子 半夏 各七錢半 猪牙皂角 經酥去皮

分五

右為末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五  
七十丸食後臨卧溫酒送下薑湯亦可

人參半夏丸 出宣明論 治一切痰飲喘嗽不已

白藥 天南星 半夏 各半兩 甘草 二錢半 人參 二錢赤

小豆 四十粒 杏仁 四十九個炒 猪牙皂角 一錢

右為末秫子三合醋一升熬粥和丸如梧桐子大每服十五丸炒蘿蔔子湯臨卧送下

神御散出百一選方 治痰盛喘乏咳嗽不已

御米穀出項帝寒炎細剉四兩 款冬花去皮尖雙仁炒 佛耳草 甘草炙  
人參 陳皮去白阿膠蛤粉炒 杏仁去皮尖雙仁炒各一兩

右為末每服五錢水一盞半生薑三片肥烏梅一箇拍碎煎至七分去滓溫服不拘時臨卧服尤妙

安神散 治痰涎喘嗽久不愈

欵冬花 佛耳草各三錢  
鍾乳石 白礬 甘草各

生

錢

鍾乳石

白礬

甘草各

一分

右為末每服二錢水一盞入蠟少許煎至七分和滓溫服食後每日二錢

郁李仁丸 治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

方見咳嗽門

嗽面浮腫類

辰砂半夏丸 治大人小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈

痞滿心忪煩悶痰涎不利呴呷有聲

半夏

湯  
炮

葶苈

別研

杏仁

去皮尖別研各半兩

五靈脂

硃砂別研

各一兩

右將五靈脂半夏為細末却入杏仁葶苈硃砂末攪勻生薑汁打糊為丸如梧桐子大每服二十丸食後

蘿蔔湯下

葶苈

散出宣明論

治肺氣喘滿痰嗽睡卧不安不思飲食

苦葶苈

蛤蚧粉

各三錢

桑白皮

山梔子

人參

各五分

荆介穗

薄荷葉

赤茯苓

桔梗

杏仁

去皮甘草已上各  
尖半兩

右為末每服三錢水一大盞生薑三片煎至六分去  
滓食後溫服

參蘇溫肺湯 治形寒飲冷傷肺喘嗽煩心胸滿氣不  
得動暢

人參 紫蘇葉 甘草各五  
錢 香各四 陳皮 白术各六  
錢 半夏姜白茯苓去皮各  
半兩

桑白皮 一  
兩

右為籠末每服五錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓大溫服食後如冬寒每服中加不去節麻黃半錢先洗去沫下諸藥

九寶湯出潘  
察方 治老人小兒婦人室女素有喘疾遇寒

暄不常發則連綿不已喘嗽哮吼夜不得睡

麻黃 薄荷 陳皮各一兩 官桂 紫蘇 杏仁去皮 皮

尖桑白皮 甘草 大腹子連皮各半兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片烏梅半箇煎

至六分去滓專心服餌其効甚著或入童子小便尤  
佳感冒鼻流清涕亦効病各有主對不可疑其發散  
耗氣之說惟虛勞自汗不當用之一方瞿栗殼二箇  
去頂人參少許

救生丹 治大人小兒呴喘咳嗽其効如神

號丹 馬牙硝 人言各一錢細研一  
各夜露七宿用 甜葶藶隔

炒桑白皮半兩 杏仁去皮尖半兩 雞肫脰十個

右為細末同煎三味和勻棗肉為丸如梧桐子大每

服七丸臨卧清茶下

紅椒丸

出危  
氏方

治虛勞喘嗽眩晕

靈砂

一兩  
細研

人參

木香

大香附子

杵

大紅椒

去合

口并子焙出  
汗各半兩

右為末糕糊丸如麻子大每服二十丸空心搗皮湯  
下

胡椒半夏丸 治虛寒喘嗽冷痰不止

半夏 乾薑 各一兩 胡椒 丁香 各一分

右為細末生薑自然汁煮薄糊為丸如梧桐子大每  
服三十九細嚼乾柿湯食後送下

鍾乳丸

出危氏方

治喘嗽痰涎稠粘晝夜不止不得坐卧

遠年近日並皆治之

滑石半兩

鍾乳粉見成者

南星一兩

炮切片生薑製

右為末煮乾柿去蒂核搗細搜藥為丸如梧桐子大

每服四十九薑棗煎湯下氣弱人更服養正丹

百花膏

出濟生方

治喘嗽不已或痰中有血

款冬花 百合

蒸培

右等分為細末鍊蜜為丸如龍眼大每服一丸食後  
臨卧細嚼薑湯嚥下噙化尤佳

杏仁煎

出濟生方

治久患肺喘咳嗽不得已睡卧不得服

之即愈

杏仁

去皮尖

胡桃肉

右等分為細末研成膏鍊蜜少許丸如彈子大每服  
一丸或二丸食後臨卧細嚼用薑湯嚥下人參湯亦

可生薑煎服亦可

寧神散

一名寧肺散  
散門五臟諸咳嗽類方見喉

雌黃丸

出聖惠方

治咳嗽喘急

雌黃一雄黃

一七枚湯浸去皮尖分杏仁雙仁炒微黃色

右為末以蟾酥為丸如粟米大以燈心煎湯每服三

五丸送下

治喘嗽上氣

華陀中藏經方

蒲頤葉治一切肺喘劇甚者効如神焙碾為末米飲

調服二錢七併服取瘥氣味清香其實酸澁夏紅可  
食核如棗核類山茱萸揀葉背白者用江西謂之盧  
都子

七七散

余居士選奇方

治喘嗽

長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十  
粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十枚用生薑汁製  
杏仁麻油製巴豆蜜製半夏右件一處火炙黃色碾  
為細末每服用一字安在手掌中臨睡用生薑汁調

舌點喫立有神効

雄黃丸

余居士  
選奇方

治喘嗽

雄黃 雌黃 信

各一錢  
巴豆半粒  
半夏半兩  
湯浸七次

右搗末糊為丸如板子大每服五丸臨睡茶清下忌  
熱物小兒加減與服之

四寶丸

出仁  
存方

治喘嗽化痰

知母

貝母

款冬花

白礬

桔

右等分為末以稀糊丸如梧桐子大覩上蒸過每服

二十九食後薑湯送下

千金丸出仁存方 治證同前

南星 半夏各一兩  
白礬半桔一兩

右以生瓜蔞一個去子入藥在內濕紙裹煨熟取出  
為末再用生白礬一兩將瓜蔞穰汁并瓜蔞仁研細  
同丸如梧桐子大每服十五丸用淡薑湯下臨卧服  
之

一方出仁存方 治喘嗽

雄黃 雌黃 信石 黃丹

右等分用鯿魚一箇去腸肚洗淨量魚大小入藥在  
內令滿以線縛定鹹渥固濟用炭三斤燒紅候冷取  
出研細末浸蒸餅為丸菉豆大臨卧沙糖水下三五  
丸小兜一二丸每夜只一服

化痰延壽丸海岳居士秘方 治痰喘中滿咽喉作聲或中風  
偏枯不能行步並宜服之

香附四兩炒 南星一兩炮 半夏四兩水浸 菴殼二兩炒去穰 白礬

半  
兩 黑牽牛 頭末四兩  
炒微黃 商陸 一  
兩

右為細末酒打麵糊為丸如梧桐子大每服五六十丸生薑湯送下食遠臨卧服之嗽加人參一兩喘加

紫參一兩

甜葶苈丸 出聖惠方 治一切喘嗽不瘥

甜葶苈一兩隔紙炒令紫色人參三分去蘆頭 赤茯苓三分蛤蚧一對

頭尾全酥  
笑微黃 杏仁一兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為細末以棗肉和丸如梧桐子大每服三十九日

進三四服以粥飲下

控痰良方

出直指方

治喘嗽通用

虢丹 白礬

各二兩

右以錢王搏剝一大孔先入虢丹以白礬益頂用炭一斤煅至火盡礬枯丹黑出火毒研細煮調麪和丸如麻子大每服十五丸沸湯泡生薑汁送下諸頑痰迷塞關竅不通聲音不出以三十九研末入全蝎少許用自然薑汁下澄取清者調灌須臾吐痰立愈凡

喘促胸膈膨湃寸脉急數須從權吐之中滿內實而喘者與解毒雄黃丸

二黃丸

衛生家  
寶方

治喘嗽哮呷氣急雌雄

雄黃

三錢  
雌黃

三錢  
信砒一錢

馬兜鈴

三錢  
重

杏仁

七粒  
去皮尖

右件研細將皂角五條不蛀者搗碎搗取汁一盞熬成膏子和藥安乳鉢內燒皂角烟熏過丸如蘿蔔子大每服三丸臨卧薑水送下小兒一丸孕婦不可服一夜只一服喘退不可服也

治感冒寒喘嗽久不瘥或身有煩熱其脉弦緊者

澹寮方

小紫胡湯加桑白皮北五味子薑棗煎服

治喘嗽

右用陳橘皮一兩水浸去穰細切用巴豆十粒去殼同橘皮炒令十分赤色傾在桌子上揀去巴豆須淨盡不用巴豆擣橘皮為末每服二錢水飲調下臨卧時服遠年二三服或瀉一兩行不妨以溫粥補之忌

食毒物

哮喎

論

夫治哮喎者一名齁齁涎在咽喉間令人喘嗽不寧甚者搖身滾肚上氣喘急頭汗身冷或時發作多由小年冷水驚恐所致也

方

青金丹 治喎

天南星一  
人參二錢  
半  
半夏一兩  
半  
款冬花三  
錢  
杏仁二  
兩

去皮半  
尖 螺青錢百藥煎二兩五味子五錢殼殼二個白礬半錢

訶子五錢皂角一兩

右為細末薑汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸臨  
卧茶清送下忌生冷膩熱之物日三服

黃明膠散出本事方 治十六般哮喘

黃明膠一兩炒 馬兜鈴仁 甘草各半兩 半夏薑汁浸三日重

杏仁去皮尖兩 人參半兩

右為末每服一大錢水一盞隨病湯使煎至七分臨

臥後服 心嗽面赤或汙流加乾葛煎一方白芷

肝嗽眼中淚加烏梅一箇糯米十四粒煎 脾嗽不思飲食或恶心入薑三片煎 胃嗽吐通吐醍酸水蚌粉煎 肺嗽上氣喘急入桑白皮煎 膽嗽令人不嗜用茶半錢調 脳嗽咳出痰丸塊生薑自然汁調點下 勞嗽入秦艽末同煎 冷嗽天晚時嗽甚加葱白同煎 血嗽連頓不住當歸生薑一方棗產後嗽背髀疼痛甘草一寸黃蠟少許煎 黎嗽涕

唾稠黏烏梅生薑煎 氣嗽吐痛脹滿青皮去白煎

熱嗽夜甚蜜一匙葱頭白煎 咳嗽聲如拽鋸入

半夏二個煎 腎嗽時復三兩聲入黃蓍白糖煎

已上十六件哮嗽病依法煎服無不効驗

青金丹

一名定喘  
寧肺丸

治齁嗽

方見咳嗽  
門久嗽類

內金丸

出仁存方

治呴喘

雞內金

二十  
一箇信石

二錢半  
黃丹

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半

兩半夏二錢半共為末蒸棗肉取膏為丸如麻子大  
露星二宿硃砂為衣每服七丸臨卧冷清茶送下

金粟丹一名雄黃解毒丸  
出經驗良方

雞冠雄黃研令極細各二錢半巴豆十四粒去殼  
模壓令油盡

右為末醋煮麪糊為丸如粟大津唾嚥下或茶清下  
大人十九小兒量其大小與服見効

治遠年近日哮嗽妙方出本事方

砒一錢麪錢海螵蛸一錢

右為末水調作餅子慢火炙黃再研令細每服一字  
用井花水調一大鍾呷空心服良久吐出為度小兒  
加減與之忌食毒物

紫金丹

出本  
事方

治呴喘

信石

一錢半研  
淡豉

一兩水潤去皮研成膏

右以豉丸如菉豆大每服七丸至十九丸冷淡茶清下  
臨卧只一服後不可喫一應湯水之類今以信八分  
豉一兩每服二十九一法二件成膏搽盤內艾熏入

生珠末丸有一風疾婦人患十年遍求醫者皆不効忽有一道人貸此藥漫贖一服是夜減半數服頓愈遂多金丐得此方予屢用以救人特為神異

鬼哭丹

一名破敗丸  
出經驗良方

治鶴禲亦能治瘧

白信石

一錢白砒霜者良不用黑者

寒水石

四錢

右各研為細末取端午日三五家粽角極薄切用建蓋盛粽一過用寒水石鋪一過却信石鋪之如後用粽角用前法鋪之如鋪盡仍將粽子蓋却用淡豉冷

水微浸取濃汁滴于盃內用乳搘搗鍊成丸取剝左  
右心盛藥丸如大栗米大每服大人止服五丸五歲  
後止三丸周歲已上止一丸瘧疾未發前五更東流  
水化下 水鰕鹹芻燒灰調沸湯候冷吞下 食鰕  
茶芻燒灰調沸湯冷下或冷蠟茶清下 老鰕用半  
夏五粒生薑一大塊同擂自然汁吞下永遠不  
發

古老飲

出存方

治魚哮喘喎

古今錄 卷之二  
古老錢 白梅肉 各七

箇

右水一大盞浸二宿每服一茶腳許空心服良久吐

出惡物

鯽魚丸

出家藏  
經驗方

治肺經久受邪氣嗽喘急初發則寒

從背起冷如冰雪漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯  
吐不出坐卧不得莫可支吾兩肩聳豎曲背弩目困  
憊欲絕宜服或未効再服即愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只于肚下近頭處開

一孔入信石一塊重一錢令深入在內却以魚入竹筒內外用青蒿搗搘固濟候乾火煅竹筒通紅候冷出搘取魚去燒不過者研細入蚌粉三錢研得所丸如菉豆大硃砂為衣每服四丸或五六丸沙糖冷水下臨卧服之忌熱物一方喘正急時宜服不可多過丸數欲試此藥先用猪肺一枚吹脹入數粒于肺院內頃刻漸瘥方表其効

千金丸 治哮喎

喞藥子兩金丸奇 神仙留與故人知 一兩雄  
黃雞冠色 半兩明信燬如灰 一兩玄精龜背  
樣 雌黃一兩最相宜 一兩蠶管如雪色 二  
兩明霜火上飛 二兩蛤蚧巴豆炒 去了殼兒  
六十枚 同炒去豆只用粉 荷葉乳為極細末  
浥糕調糊莫令稀 丸如菉豆顆兒大 每服  
七丸用冷薑 小兜服時歲加減 喫了忌酒三  
日期 嘴如拽鋸聲鳴響 審問莫與藥差池

此藥家傳百餘載 且莫輕傳寶秘之

紅散子 治諸呴呷有聲睡卧不得

右土珠不拘多少極為細末米醋調時時進一二服

治一切癰勦

右用處州磁器不以多少打碎碾為細末如勦發時  
每用二三錢用手指頭點津液醮藥點舌上嚥下即  
効

黑馬蹄香散 治哮喎

右用馬蹄香焙乾研為細末每服二三錢如正發時  
用淡醋調不少時刻吐出痰涎為驗

馬屁勃丸 治哮喎

方見咳嗽門久嗽類

白前方出肘後方 主久患呀呷咳嗽喉中作聲不得睡卧

右取白前搗為末溫酒調二錢服

治久哮

右用梧桐子一連紙包濕放在火煨取出安地上出  
火氣為末空心井花水一盞送下痰出即愈

治哮喘嗽

右以大南星切作片香油煎至黑色研末睡覺細嚼  
喫茶清漱口不語之

治吼喘咳嗽病脾胃寒不思飲食面色黃羸瘦古人名  
為肺脹今人却做胸喉大黃黑白二牽牛等分修合  
成就更加檳榔為末名為奪命因由冷漿調下便時  
休免得胡針亂灸

治齁喘

出朱氏  
集驗方

右用苦丁香三個為末水調細呷吐出稠痰即愈

治軀齁

鈴方 永類

白礬

半兩 炒

天南星

半兩 炒至烟起

巴豆

半錢 去皮油

甘遂

二錢 半末

右作末和勻每服大人一錢小兒半錢薑片夾嚼燈心湯臨卧一服尋常華蓋散打和參蘇飲服婦人九寶湯和清肺湯加芎歸煎服

寮齁

本草方

右取榆白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合

末二錢煎至如膠服瘥

治齁齁及吐風涎

右用石覓與甘草同煮服

治喉中呴呴有聲不絕

右以不蛀皂角燒灰存性碾細以生薑自然汁調一  
錢許于掌中旋旋舌舐之

金匱要略

卷一百六十三



普濟方卷一百六十三