

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十二

詳校官太醫院醫士臣程恭
編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣戈廷模

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十二 明 周王朱橚 撰

水病門

風水

附論

夫內經言腎者牡臟也腎生水故也人勇而甚勞則腎汗出既出復感於風內不得入於臟腑外不得越於皮膚客於玄府行於皮裏傳於肢體本之於腎名曰風水其脉自浮其外證骨節疼痛而惡風且身腫如裹水之

狀頸脉動時刻按之隨手凹者是也金匱方云脉浮而洪浮則為風，洪則為風氣相傳身體洪腫汗出乃愈惡風者為風水不惡風者小便通利上焦有塞其口內多涎此為黃汗二者之證不可不察

大豆散

出三因方

治風氣通身大腫眼合不得開絕氣骨

節疼惡風自汗其脉浮

大豆

杏仁

清酒

各一升

麻黃

木防己

各四兩

生薑

七兩

半夏

六兩

防風

豬苓

各四兩

澤鴻

黃耆 烏頭各三 甘遂

甘草各二
兩

右㕮咀以水四斗四升煮豆取一斗去內豆藥及酒
合煮取七升七服日四夜三小便快利流通為度腫
消停藥不必盡劑若不利小便者加生戟一斤葶藶
二兩紙炒香無不快利深師方無猪苓澤瀉烏頭半
夏甘遂及甘草甘草併不當用而用之却效非人情
所可測也

大豆茯苓散

出千金方

治風水腫

大豆

升三

茯苓

白术

防風

橘皮

半夏

生薑

各五兩

鱉甲

當歸

防已

廣黃

猪苓

各三兩

大戟

一兩

葵子

升

桑根白皮

五升以水二斗煮一升

斗去滓

內煎

右咬咀納前藥汁中煮取五升每服八合一日三服
去如人行十里久

麻黃煎

出千金方

治風水通身腫欲裂利小便

麻黃

茯苓

澤鴻

各四兩

防風

澤漆

白术

各五
兩

杏仁 大戟 清酒各一

黃耆 猪苓

斗

各三
兩

獨活 大豆

二升水七升
煮取一升

右㕮咀以豆酒及水一斗合煮取六升分六七服一日一夜令盡當小便極利為度

防風散

出聖惠方

治風水腫通身皮膚欲裂宜利小便

防風去蘆

去皮

澤鴻 赤茯苓

麻黃去節

澤漆各一兩

兩

白朮一兩半

半

大戟一兩

微炒

黃耆一兩

獨活一兩

兩

杏仁一兩

湯浸去皮尖
雙仁炒微黃

右為散每服五錢水一大盞入煮赤小豆汁一合煎至五分去滓溫服每日早晚服良久當小便極利不利晚再服之

大腹皮散出聖惠方 治風水身體虛浮腫發歇不定肢節疼痛上氣喘促

大腹皮剉 桑根白皮剉 芳窮各三兩 漢防已

羌活 青橘皮湯浸去白焙 檳榔 川大黃碎微炒一兩

甘草半兩微炒剉 桂一兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時溫服

大豆湯

出聖濟總錄

治風水舉身腫滿短氣欲絕

黃耆

一兩

杏仁

去皮尖雙炒二兩

防風

去蘆

白朮

剉各一兩

半
防已

麻黃

去根節

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各一兩

一兩

右粗搗篩每服五錢先用水三盞煮豆一合取熟去豆入酒一合與藥同煎至一盞去滓溫服日三當下

小便愈

蒼术飲

出聖濟
總錄

治風水頭重面腫

蒼术

米泔浸
切炮乾

杏仁

去皮尖
雙仁炒

赤茯苓

去黑
皮

桑根白皮

各一
兩半

商陸根

二兩
半

連皮大腹皮

四枚

嫩楮枝

切三
合

右㕮咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服日三

防已散 治風水面腫骨疼惡風喘急

防已 赤茯苓去皮

桑根白皮

羌活去蘆頭
各一兩

蒼术

米泔浸
一宿焙

郁李仁

去皮尖各
一兩半

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去
滓溫服不拘時候日三

楮白皮散 治風水毒氣偏身腫滿

楮白皮

二兩剉

桑白皮

三兩剉

陳橘皮

一兩焙
去白穰

紫蘇葉

三兩

猪苓

三兩去皮

木通

二兩剉

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

麻黃散 治風水偏身腫滿骨節痠疼惡風脚腫皮膚

不仁

麻黃

二兩去根節

石膏

二兩

白朮

二兩

附子

二兩炮

漢防己

二兩

桑根白皮

二兩剉

右為末每服五錢水一盞半入棗三枚生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

赤小豆散 治風水腹臍俱腫腰不轉動

一名食法

赤小豆

一升 桑根白皮

三兩 剁

白术

三兩

生薑

三兩

切

鱠魚

二斤去
鱗腹肚

陳橘皮

三兩湯
浸去穰

右細剉一斗都煮令熟出魚量力食之兼食小豆勿著鹽便以任性下之

漢防己散 治風水面腫脉浮而緊者

漢防己 桑根白皮

剉

蒼术

剉

郁李仁

去皮
尖

羌活

以上各
一兩

右為散每服五錢水一大盞至五分去滓溫服如人

行十里再服之

麻黃湯 治風水身體面目盡浮腫腰背連引髀股滿

不能食

麻黃 三兩去根節

桂 去皮二兩

甘草 一兩炙

附子 二兩去皮

騎

右㕮咀如麻豆每服三錢水一盞半生薑棗大拍碎同煎至一盞去滓溫服日三

防已湯 出金匱方 治風水脉浮為在表其人或頭面汗出

表無他病但腰下痛

防己 白术

剉各二兩

甘草

炙一兩

黃耆

三兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞半生薑棗大拍碎棗二枚同煎至七分去滓溫服如喘加麻黃二兩去根節身腫胃中不和加桂二兩去粗皮心下久寒加細辛二兩去苗葉服訖厚衣覆取汗則愈

越婢湯

出聖惠方

治風水惡風舉身悉腫脉浮不渴自汗

而無大熱

麻黃

二兩去根節

甘草

炙一兩

石膏

碎一合

白术

四兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半生薑一片棗三枚同煎至一盞去滓溫服日再如惡風加附子一枚咳嗽肺脹加半夏一兩

橘皮湯

出聖濟總錄

治風水偏身腫

陳橘皮

一兩湯浸焙去白

楮白皮

一兩半炙剉

桑白皮

二兩

半剉

紫蘇子

炒二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半生薑一棗大指碎同

煎至一盞去滓溫服日三

椒目丸

出聖惠方

治風水面腫小便澀

椒目

一兩半

漢防己

一兩半

硝石

二兩

杏仁

去皮尖雙

黃仁炒

右為細末煉蜜和丸如桐子大每於食前煎桑根湯
下十五丸

甘遂丸 治風水黃疸體大如囊面目皆腫陰如斗正

如霜瓜

甘遂 二兩 焙

葶苈子 一升 焙

杏仁 五十枚 去皮

尖雙仁 焙

巴豆

四十枚 去心皮 焙

右下篩蜜和丸如大豆一服三丸飲下當吐不知可至五丸禁野猪肉蘆筍

治瘡中有風水腫疼秘澁

青葱葉 乾薑 黃蘖

右相和煮作湯浸洗之立愈

治風水腰腿腹臍俱腫不可轉動

出聖惠方

郁李仁

三兩湯浸去皮尖水研取汁三升

薏苡仁

二合

右以郁李仁汁煮薏苡仁作粥每日空腹一服

治風水通身腫欲裂小便澁

出千金方

用薑石燒令赤納黑健牛尿中乘熱服一升日二方

單服牛尿一合瘥

鯉魚方 治鯉刺在肉中風水腫痛者

用鯉魚睛燒作灰傅瘡中汁出即可

治風水臍腹俱腫腰不可轉動

出聖惠方

用鼠粘子二兩微炒搗細為末每服以煖水調下二錢日三四服

商陸酒 療風水腫癰癧酒癖

用商陸根一斤薄切以淳酒二斗漬三宿服一升量小者減半升日三服

療風水毒氣偏身腫方

殼皮三兩 橘皮一兩 桑根白皮五兩 紫蘇 生薑

各四升 大豆二升

右切以水九升煮取一升絞去滓分為四服其藥必須
煖不過三劑必當瘥百日來唯禁犬酢

療諸瘡中風水腫

出本草

以薤生搗熟塗上或煮之服

治患寒熱毒風水虛脹

出本草

即取水獭一頭剥去皮和五臟骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸七日二服十日瘥

治人素為物所傷及有諸瘡觸犯毒水覺瘡頑不痒漏

當中有風水所為身必反張似角弓

出草本

以鹽豉和麵作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令

抽去惡水數升舉身覺痒瘡處知痛瘥也

治風水腹大臍腰腫痛不可轉動

出草本

以冬麻子半升碎水研濾取汁米二合以麻子汁煮
作粥着葱椒薑豉空心食之

石水

附論

夫腫從內起堅塊四肢浮腫名為石水其根在膀胱蓋

腎主水歸膀胱內膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣今腎虛則膀胱氣弱膀胱氣弱則不能氣化而隱氣不通水液停結於膀胱間故其證胸腹皵滿按之如石脇下脹痛其脉沉遲身體發熱四肢頭目皆腫也聖惠云尺脉微大亦為石水腫起臍已下以至小腹垂然上至胃脘則死也

澤漆湯

澤漆

五兩

桑白皮

六兩

射干

湯浸六兩

黃芩

赤茯苓

白术 各四兩 澤鴻 防己 各三兩

右㕮咀每服五錢以水三盞烏頭一合煎至二錢內藥同煎至七分去滓空心日三服一方無烏頭以水三盞煮大豆一撮至一盞半去滓豆下藥末三錢煎至七分去滓溫服日二夜一服之効

猪皮湯

一名白术散
出聖惠方

治石水四肢細瘦腹滿濁腫大

肚如懷娠中心方悶食即氣息

楮白皮

炙

桑根白皮

剉

防己

剉各一兩半

澤漆

莖葉
炙剉半兩

射干 白术

赤茯苓

去皮各一兩

大豆
炒半兩

右粗搗篩每服五錢水二盞去滓溫服日三夜二一

方有積郴一兩無大豆

牽牛子丸

出聖惠方

治石水腹脹坐臥不得小便澀少

牽牛
一兩

京三稜
炮一兩

陳橘皮

三分焙

訶梨勒

皮
一兩

微炒

川大黃

三兩剉炮

吳茱萸

半兩湯浸七遍

乾炒

甘遂

一兩煨令微黃

鱉甲

二兩醋炙黃去裙襕

右為末煉蜜為和搗三二百杵如桐子大每服於食
前生薑橘皮湯下十九以利為度

海蛤丸

出聖濟
總錄

治石水四肢細瘦腹獨腫大

海蛤

研三

葶苈

隔紙
炒

桑根白皮

各一
兩切

赤茯

芩

去皮

郁李仁

湯浸
去皮

陳橘皮

湯浸去白穰
焙各半兩

防已

半兩

右為末煉蜜丸如小豆大每日服二十九漸加至三
十九米飲下早晚各一服

桑根白皮湯

出千金方

治石水四肢細瘦腹腫心中妨滿

食即喘急

桑根白皮

剉

澤漆

灸

剉各三兩

防己

剉

射干

白术

楮白皮

剉

大豆

各一兩

右粗搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日

三夜一

海蛤丸

出聖惠方

治石水脾腹妨悶身體腫滿大小便不

利喘促

海蛤

一兩
研細

漢防已

半兩

桂心

半兩

木通

一兩
剉

牽牛子

一兩
微炒

白术

半兩
兩

甘遂

半兩
煨
令微黃

右為末以棗肉和搗三百杵丸桐子大每服濃煎
香菜湯下二十九以利為度不利再服

鱉甲丸

出聖
惠方

治石水

鱉甲

去裙
醋炙
欄

訶梨勒皮

剉

右為末醋煮麵糊和丸如桐子大每服二十九生薑

橘皮湯下以利為度

桑根白皮散

出聖惠方

治石水四肢瘦腹大胸中滿悶食

即喘急

桑根白皮

一兩剉

漢防已

一兩

澤漆

二兩

赤茯苓

二兩

紫蘇莖葉

一兩

右為散每服四錢以酒一大盞入炒焦熟黑豆五十粒煎至五分去滓不計時候溫服

甜葶藶

出聖惠方

治石水腹堅漸大四肢滿腫

甜葶藶

二兩隔紙炒紫色

川芒硝

三兩

椒目

二合微炒出汁

水銀

一兩以棗肉收
研令星盡用

漢防已

一兩

海蛤

一兩

右為末研入水銀令勻煉蜜和搗三百杵丸如桐子大每服三十九以粥飲下日三四服

桑白皮湯 治膀胱石水四肢瘦腹腫

桑白皮

穀白皮

澤漆葉各三升

大豆

五升

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分服

檳榔散

出聖惠方

治石水病腹膀胱緊急如鼓大小便澁

檳榔末

半兩

甘草

一分

生薑

一升

桑根白皮

一兩

劉半 商陸切
一兩

右除檳榔外用水二大盞煎取一大盞去滓五更初分作二服每服調下檳榔末一分至平明當利如未利即再服之

杏仁丸

出聖濟總錄

治石水四肢瘦腹腫

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

苦瓠

取膜微炒各一兩

右為末煮麵糊和丸如小豆大每服十九米飲下日

三服水利為度

治水鼓石水腹脹身腫

用把鼠一枚剥皮細切煮粥空心喫之頻食三兩度
瘥

治腹堅腹脹滿世號石水

用白石英十兩明淨者趙如大豆大以甕瓶盛用好
酒二升浸以泥固封瓶口以馬糞及糠火燒之長令
酒小沸從卯至午即令住火日可三度煖中盃飲之
如不飲酒即隨性少食之其白石英可更一度用也

椒仁丸 治石水

椒仁 甘遂

炒
焦黃

續隨子

去皮
研

郁李仁

去皮
研

牽牛子

炒令
極熟

五靈脂

附子

炮去
皮臍

吳茱萸

湯
浸

次
七

玄胡索

木香

各半
兩

芫花

醋浸一
宿炒

石膏

火蝦紅細研
如粉各一兩

信砒

膽礬

各一
錢

巴豆

六十粒
取霜

右為末麵糊丸如菉豆大每服十九生薑湯下

皮水 附論

夫肺主於皮毛腎主於水虛則水妄行流溢於皮膚故令

身體面目悉腫按之沒指而無汗也復如故不滿亦不渴四肢重而不惡風是也脉浮者名皮水也

桑根皮散 治皮水頭面四肢浮腫心胞不利喘促煩悶

大小便澁

桑根白皮

一兩
剉炒

杏仁

一兩去
雙仁炒

陳橘皮

一兩湯
浸去白

甘遂

一兩
煨
令微黃

澤鴻

一兩

赤茯苓

一兩

黃芩

半兩

赤小豆

一升水五升
煮取二升

右為散每服三錢以小豆汁一中盞煎至六分去滓

五更初溫服如人行十里當利如未利即再服

漢防已散 治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習習然

動

漢防已

一兩

黃耆

一兩
剉

桂心

一兩

赤茯苓

二兩

甘草

半兩
炙剉

桑白皮

一兩
剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓溫服

日三服

木香丸 治皮水身體面目悉浮腫

木香一

乳香一

硃砂半錢

甘遂半錢

炒黃

檳榔二枚

一炮熟

苦葫蘆子一分

炒

右為末以爛飯和作四十九丸用麵裹於銚子內以水煮熟令患人和汁吞之以盡為度從早晨服藥至午時其小便即下計數行水盡自止

加味越婢湯

治水皮

方見風水類

木防己湯 療皮水如腫氣在皮膚中四肢俱動

木防己

兩三

黃耆

兩三

桂心

兩三

茯苓

六兩

甘草

二兩

灸

右切以水六升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱

酢物

五皮散

治皮水四肢頭面悉腫按之沒指其腹如鼓

不喘不渴脉亦浮心腹膨脹上氣促急堅並治妊娠

胎水

大復皮

桑白皮

茯苓皮

生薑皮

陳皮

右咬咀每服四錢以水二盞煎至七分去滓熟服日

二三服更磨木香水同煎尤好如大便不通者加烏柏木根皮等分同煎極効五皮散局方用五加皮地骨皮此方及出中藏經用陳皮桑白皮乃有功於肺肺所以多効或加附子皮其說亦有理大小便不通又加烏柏木根皮等分更加蘿蔴根尤妙小便不順加豬苓皮一方加白术磨沉木香入此藥活人頗多昔於江市見一婆子患腫疾服此藥和縣寶女患此但脉沉細此方加附子皮及復元丹有効又有一人

腹腫小腑不快兼素有白濁便多之患不流通而腫聚前藥加豬苓皮亦取効不可輕忽三因方加木香磨水煎者却反不驗尤不可曉常服忌油膩物切不可服瀉水藥或云添五加皮亦得益欲腫從水道去故也陳世德云太學諸生姚子大劉亨叔並患此病勢可畏服之而安

又方

取服牛溺商陸羊肉臚及香柔煎等如肢體腫滿其

千水丸諸大方在別卷若止皮膚小腹內稍腫者服
諸發汗藥得汗便瘥然慎護風寒為急若腹腫大下
之不去便針臍下二寸入數分令水出孔合須臾減
乃止若皮膚頑痺以羊脂塗上炙手及熱摩之即退

水癥 附論

夫水癥者由經絡痞澀水氣停聚在於腹內大小腸下
利所為也其病腹內有結塊堅強在兩脇間膨脹滿遍
身腫所以謂之小癥。水癥者由經絡痞澀水氣停聚

在於心下腎經又虛不能宣利溲便致含水氣結聚而成形瘕在心於腹之間抑按之作水聲但欲飲而不用食遍身虛腫是也

水癥丸 療水腫大腹

礬石 焙
礞 跖花 細辛 半夏洗七次 梨盧

丹參 承露各十分承露是落葵也

巴豆十枚去心皮

苦參

雄黃 大黃 芒硝

大戟各十

烏頭二十分炮

狼毒十

野葛二

右搗篩蜜和藥成以置腫上并服如黍米大三丸日

三欲取下者服五丸禁食生魚生菜肥肉

海藻丸

出聖惠方

深師療癥水胸腹內牢強通身腫不能

食

海藻

一兩洗

水銀

一兩

椒目

一兩

芒硝

一兩

葶藶

一兩

炒

大黃

一兩

甘遂

炒一兩

桂心

一兩

附子

一兩炮

茯苓

一兩

大戟

一兩

松羅

一兩

乾薑

一兩

巴豆

十三

枝去皮炒

杏仁

三十枚去皮尖炒

右下篩蜜和小豆大服二十九日三不知稍稍加之忌

肉大酢生葱蘆筍

白礬九

出聖惠方

治水癥腹大腫硬小腸不通

白礬半兩

燒令湯浸

躡躅花

半兩酒炒曝乾

細辛

半兩

梨蘆

半兩去蘆頭

半夏七

半兩湯浸洗遍去滑

丹砂

半兩細研水飛過

苦參半兩剉

巴豆裹去油

半兩製希

雄黃

半兩研

川芒硝一兩

川大黃半兩細剉炒

半兩細剉

大戟

半兩碎微炒

川烏頭半兩炮

去皮臍

狼毒

半兩醋拌

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如黍米大空心以溫水下五丸以通利為度

木香丸

出聖惠方

治水癥腹內堅脹喘促大小便澁

木香

三分

甘遂

半兩生用

青橘皮

湯浸半兩去白焙

膩粉

一分

蘿蔔子

半兩

水銀

半兩入少朱砂肉研令星盡

防已

二分

澤鴻

三分

巴豆

一分去皮心研
帝累壓去油

瞿麥

半兩

右為末以糯米飯和丸如菉豆大每服空心以木通湯下三丸

鱉甲散

出聖惠方

治水癥心下痞堅上氣喘急眠臥不安

大腸祕澀

鱉甲

一兩半塗酥炙
令黃去裙襡

桑根白皮

二兩剉

訶梨勒

皮

赤茯苓

大腹皮

各一兩半

吳茱萸

半兩湯浸七遍炒乾

郁李仁

半兩湯浸去皮微炒

川大黃

一兩半剉炒

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓溫服如人行四五里再服

治水癥

出本草

用草麻子水研二十粒服之吐惡沫加至三十枚三

日一服瘥則止

水氣 附論

夫腎主水腎虛則水妄行肺主氣肺虛則胃氣不能循環水之與氣留滯皮膚令身體四肢腫故名水氣腫也

桑皮飲 出直指方 治肺間積水頭面浮腫

桑白皮 炒 青皮 陳皮 檳榔 枳殼 當歸

赤茯苓 青木香 川芎 石韋 去毛 羌活 各

兩
牽牛炒
半夏製
葶藶炒
甘草炙各一
分半

右剉每服三錢薑四片煎服

神仙秘訣丸 治水氣浮腫黃疸病每件秤來一兩宜
酸皮青皮及陳皮三稜巴豆五靈脂大黃神麃并烏
梅大戟芫花用甘遂葶藶杏仁淡豆豉搗羅為細炒煙
微醋糊為丸便是劑年深所患黃腫肚皮却似筲箕
內傷飲食冷傷脾坐處偎牆傍濕此藥華山碑記食
勞酒疸偏宜神仙秘術甚希奇服了頓除積氣

右為咬咀炒烟微起為細末醋糊為丸如菉豆大每
服七丸量虛實加減五更生薑湯送下百物所傷仍
用傷物湯下忌甘草諸藥湯

蘿蔔子飲

出醫方
大藏

治水病浮腫

蘿蔔子

半兩
生

赤茯苓

半兩
去皮

牽牛末

炒

葶苈

炒香

甘草

炙各
四兩

半夏

製

川芎

剉

擗榔

煨

青木香

辣桂

青皮

陳皮

白色商陸

各三分

右咬咀每服三錢水一盞薑四片不飢不飽煎服

擯榔丸

出聖濟
總錄

治水氣第一日空心先服擯榔丸一

丸日中後服枳實湯一服次日亦然第三日空心臨

臥服萬靈丸各一服第四日早晚服水銀丸一服其

病當於大小便俱利則喫煮赤小豆如渴不可飲水

當服白朮湯然後常服鹿茸丸

擯榔

煨剉

牽牛子

半生半炒

葶藶

隔紙炒各一兩

惡實

木香

青橘皮

去白湯浸

郁李仁

去皮尖炒

白茯苓

去皮

枳殼

不去穰

防已

各半兩

大黃

紙裹灰中煨令香熟一分

右為末煉蜜和丸如桐子每服四丸空心煎桑根白

皮湯下

枳實湯

出聖濟
總錄

治水氣

枳實

去穰
炒

升麻

甘草

炙剉

桑根白皮

剉炒

知母

焙

紫苑

白朮

黃耆

細研

赤茯苓

去皮

秦艽

去苗土

黃芩

去黑心

麥門冬

去心
焙乾

右等分粗搗篩每服三錢水一盞葱白兩莖同煎至
七分去滓溫服

萬靈丸

出聖濟
總錄

治水氣腫滿

苦葫蘆

焙乾
五兩

苦葫蘆瓣

焙乾
兩半

牽牛子

三兩
一半

生一半
炒熟

右為末醋糊和丸桐子大每服三十九空心臨臥各

一服煎桑根白皮湯下

水銀丸

出聖濟
總錄

治水氣腹滿小便不利

水銀

一兩酒煮
一日研

椒目

苦蘿

二兩隔紙炒

馬牙硝

一兩
碎

右同研勻煉蜜和入臼內千百杵丸如桐子大每服
三十九空心臥間各一服米飲下其病當從大小便
利出可食少小豆平補

鹿茸丸

出聖惠方

治水氣平愈體瘦如舊可服

鹿茸毛

炙去

肉蓯蓉

去皮焙酒浸去皺皮

乾地黃

焙

柏子仁

研

兔絲子

酒浸一宿焙各一兩

黃耆

細剉炙

白茯苓

去皮

桂皮

去皮

防風

去蘆

車前子

五味子

各半兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服三十九空心米飲
下加至四十九

白术湯

出聖濟
總錄

治水氣渴腹肋脹滿

白术

赤茯苓

去皮

人參

甘草

炙

右等分粗搗篩每服五錢水二盞煎至一盞半去滓

溫服

大腹皮散

出聖濟
總錄

治水氣腹滿喘促小便澀

大腹皮

一兩
剉

桑根白皮

三分
剉

前胡

一兩去
蘆頭

擯榔 赤茯苓各一 陳橘皮一兩湯浸 木通

剉二兩 漢防已一兩 赤芍藥一兩 去白穰
甘草半兩 炙剉

右為散每服五錢水一盞煎至五分去滓溫服日三

四服

人參木香散 治水氣病

人參 甘草 滑石 木香 枳殼 茯苓

琥珀 海金沙 擧榔 猪苓各等分

右為末每服三錢入生薑同煎至七分溫服日進三

服

猪苓湯

出聖惠方

治水氣腫滿喘急小便澀

猪苓

去皮一兩

麻黃

一兩去根節

滑石

二兩

陳橘皮

一兩

湯浸去白穰

百合

赤茯苓

檳榔

各一兩

桑根白

候溫服

木香丸

出聖惠方

治水氣腫上氣喘促

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

木香

海蛤皮

肉桂

半兩去
皮炒

檳榔

剉

漢防己

各一
兩

旋覆花

半
兩

郁李仁

一
兩去
皮炒

桑根白皮

一
半
兩炒

訶梨勒皮

一
兩

右為末煉蜜和丸搗三百杵丸如桐子大每日服
煎大腹皮湯下二十九日四五服

牛榔丸 治水氣腫滿

檳榔

枳殼

黑牽牛

白牽牛

各半生
半炒

右等分為末丸如桐子大每服煎大腹皮湯下二十

九日四五服

木防己湯 療腫一切水氣四肢腫攝動

木防己

三兩

甘草

二兩
炙

桂心

二兩

茯苓

六兩
去皮

黃耆

三兩

生薑

三兩

白朮

三兩

芍藥

二兩

右切以水八升煮取三升二合分四服相去二十里
許再服當見效不效再服之忌海藻菘菜桃李雀肉
生葱大酢

消腫散 治水氣腫喘呼不得睡煩熱躁擾渴燥大小

便不利

大黃

蜜蒸去節

山梔

炒

甘草

炙各等分

甘葛

陳橘皮

麻黃

去節

馬牙硝

川芎

各等分

右為細末蜜湯調下二錢

牽牛散 治水氣體浮腫腹肋妨悶大小便澁上氣急

喘促

牽牛子

四兩炒

白术

半兩

木香

桑根白皮半兩

桑根白皮

半兩湯浸剉

木通

半兩剉

肉桂

半兩去皮

陳橘皮

半兩去白穰

右為末五更初以生薑茶調二錢服之至明更喫生

薑茶粥投轉三兩行自愈臨時相度虛實增減服

治寒熱去水氣溫中散結氣

以薤可作羹食之

治水氣以服藥未平除者

用單服麝香如大豆三枚細研麝汁調分四五服

治水氣鼓脹浮腫

用狗肉一斤細切和米煮粥空心喫作羹臘喫亦佳

鱉甲飲 治水氣心下痞緊喘息氣急大腸秘澁

鱉甲去裙襡
醋炙

訶梨勒皮煨

郁李仁研

赤茯

苓去皮各
一兩半

桑白皮剉炒
一兩

吳茱萸湯浸焙乾
炒一兩

檳榔剉四
枝

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前
溫服如人行十五里再服

檳榔丸飲 治水氣四肢不和面目浮腫小便澀氣急

促

檳榔

剉五枚

桑白皮

剉

防已

陳橘皮

湯浸去白炒

郁李仁

研各一兩半

吳茱萸

湯浸洗焙乾炒半兩

木通

剉二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前

溫服如人行五里再服

檳榔飲 治水氣四肢不和面目浮腫小便澀氣急促

方有大腹皮無檳榔名大腹散

沉香除氣丸 治水氣病愈後服此藥

當歸

青皮

甘草

木香

沉香

白豆蔻

檳榔各等分

右件藥水打麵糊為丸如桐子大每服二十九溫水送下只可服白粥一百日忌鹽拍菓子并房事

葶藶丸 治水氣腫滿急大小便難

甜葶藶

一兩半隔紙炒
紫色別研如膏

甘遂

一兩根
令微黃

牽牛子

一兩
微炒

川大黃

一兩剉
碎微炒

陳橘皮

一兩湯浸去
白猿焙乾

羌活

一兩

右為末煉蜜和搗二三百杵丸桐子大每服空心溫

水下七丸取利三兩行以瘥為度

桑白皮飲 治水氣面目浮腫胞滿短氣小便不利

桑白皮剉炒 赤芍藥 郁李仁

研各一

百合

各半兩半

木通剉兩枝五 大腹

右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前溫服如人行五里再服

消腫丸 治水氣腫腹脹頭面四肢陰囊皆腫喘急欬
嗽睡不安小便赤澁

淡豉碎二兩好者

巴豆一兩水半升煮令

乾去心并出油

京三棱

煨大戟新者

杏仁燒存性研各半兩

五靈脂去沙石一分

當歸

右為末以生麵水調搜和杵千百下如菉豆大每服

五丸煎桑白皮湯下大便祕者加至十九至十五丸
喘急者加杏仁去皮尖煎湯送下忌甘草鹽醬

牽牛子散治

腫滿喘急小便澀

牽牛子三兩炒

桂心半兩

羌活半兩

當歸半兩炒

陳橘皮半兩

白穰培炒

右為末不計時候以生薑湯下二錢

葶藶茯苓丸 治水氣腹皺脹硬

葶藶子

七兩
熬

茯苓

三兩
雨

吳茱萸

三兩
雨

椒目

三兩
沉水

者

甘遂

五兩
上者
絕

右搗篩密和為丸如桐子大以米飲服五丸日三服
不知稍加丸以利為度禁食如藥法并酢物

大戟散 治水氣

大戟

大黃

木香

商陸

均分

右為末每服一二錢空心溫酒調下白湯亦可

商陸丸 治水氣浮腫

商陸 麉牛 赤小豆 蘿蔔子各等分

右為末糯粥丸桐子大約量丸數仍用蘿蔔子湯下

忌魚鮓麵食

海蛤丸 治水氣頭面俱腫四肢無力小便澀

海蛤

研一
兩半

硝石

研二
兩

葶藶

一兩半
微炒

杏仁

去皮

尖雙仁炒黃
研一
兩湯浸

右為末棗肉和丸桐子大每服十九食前用木通湯

下日二服

輕粉丸

出聖濟
總錄

治水氣

水銀粉

四分

滑石

二錢

凝水石

三錢

海金沙

一錢

右細研勻用白麵水和濕者燒麵搜為丸如菉豆大

每服第一日三丸第二日六丸二服第三日十二丸

三服煎漿水燈心生薑湯下若病勢未行第四日更

服十二丸然所服不可過多若能不服第四服得行

乃住恐藥力太過須慎不可服若服第一服牙齒便動水行則不必治不須與藥若得第三日小便行乃為妙服藥後腹中作聲者此乃脾疼以致牙齒搖動也既動即貼封滯牙方

封滯牙方

出聖惠方

青黛 藜肉

等分

右和研如泥封牙斷更以荆芥湯渫三五度若逐動小腹中水往往小便中淋滴一日夜身便瘦而愈若

水行患渴者則調生凝水石末一錢新汲水下渴自減小便去疊服後補藥一月得平復

草撥湯出聖惠方 服前藥補後藥

草撥 草澄茄 紅豆蔻去皮 蓮花 甘草等分

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一小塊切棗肉一枚擘煎至七分和滓溫服

楮實子丸出醫方大成 治水氣皰脹潔淨府

楮實子一斗五升
養成膏 白丁香一兩
半 茯苓二兩

右為末用楮實子膏為丸梧桐子大每服至小便清利及腹消為度後服中治調養藥疎其中五補七宣即其理也

蒲黃酒 治通身腫者是風虛水氣亦療暴腫

蒲黃一斤 大豆一升 小豆一升

右以清酒一斗煮取三升去滓豆分三服

棗仁散出三因方 治水氣浮腫無問久新老小悉可服

棗仁 桂心 赤茯苓各等分

右為末每服二錢米飲調下禁鹽必効

治一切水氣脹腫

大戟一兩
木香錢五

右加黑牽牛淨末半兩深者加淺者不加為末每服
錢半重五更敲鳴好酒半盞調下至明下碧綠水或
惡物三四行為度後用粥補之忌鹽醬豆腐麵筋六

十日

羌活散

治水氣

方見水氣篇
身腫滿類

爪桂散

出百一
選方

治水氣

用暑中冬瓜一枚去瓢以肉桂十兩剉入於冬瓜中
蓋口濕紙裹數重振地坑簇以灰火煅令存性為末
每服二錢米飲調下二服一方冬瓜不限多少任喫
一方冬瓜自然汁和大麥麵作餅食之

治水氣

出百一
選方

用宣州木瓜一箇竹刀下蓋子去子并瓢入吳茱在
內却將蓋子用竹簾定蒸熟各細焙乾為末以紫

蘇熟水下不拘時候積熟水自消退

治水氣方

出肘後方

用商陸根白者去皮切如小豆大許一盞以水三盞
煮取一升已上瀝即粟米一大盞煮成粥仍空心服
若一日兩度服恐利多每日服一頓即微利不得食生
冷一方取汁半合和酒半升服利即差不可雜食

續隨子 治水氣方

用聯步一兩去殼研以紙裹用物壓出油重研末分

作七服每治一人只可一服丈夫生餅子酒下婦人
荆芥湯下凡三更服之至晚自止後以厚朴湯補之
頻喫益善仍不用喫鹽醋一百日差聯步續隨子是

一方宣一切宿滯治肺氣
水氣惡瘡疥癬服十粒

治水氣皮膚痒明目

用枳殼一兩杵末茶煎用呷之

又方 主補水氣

用赤茯苓二兩米醋煮爛細研為膏九桐子大椒湯

下七丸空心服

小半夏茯苓湯 治諸水氣

半夏製五兩

茯苓三兩

右剉散每服三錢水二盞半煎一盞秤生薑二錢半研取汁入藥煎沸溫服

治一切水氣四肢浮腫並宜喫此方大凡治水只可徐徐輕取不要暴使過脾之藥以殘伐人之腎氣如是病勢甚盛各依方喫前面藥倘終不速愈但合此方

進數服以取必驗緣此方具治五藏水氣但水未入五臟喫此藥俱可安痊若是戒口不得服藥無益大凡患水氣鹽醋醬五味並不可入口

羌活
牽牛
炙
甘遂

醋

微炒

葶苈

須於別一處研細為末各一兩

右細研杵羅為末煉蜜丸桐子大空心熟下十九若疎轉未快第二次加至十五丸已快更加添丸數每服三日一服取得水盡腹不脹四肢不腫喫前石庭脂方以補之此方初日喫十九不轉第三日加至十

五丸又不踈轉第三日加至二十丸以轉為度若初
服十九便踈轉更不加添丸數凡治大腹水氣四
肢浮腫不明水在何臟但初得病時面目脚手初腫
並宜服此方踈轉了喫前方石庭脂藥以補之

治脾受水氣子母相生傳之與肺肺之受水面目腫起
漸次遍身俱腫小腹脹逆肉色黃兼亦有白色此為水
在肺宜服此方藥取轉後急喫後方藥以補之

麻黃去

乾薑各半

兩

黃橘皮二

兩

椒目二

錢

吳茱萸銖

葶苈

一分

半夏

牽牛

各四

兩

右除牽牛一味自作一處杵羅為末先以老薑二兩
搗碎煮赤小豆一升候爛熟取出焙乾去生薑不用
杵豆斐小為末每服衆藥末二錢牽牛二錢豆末二
錢滾作一服滴熱水丸如桐子大食後葱湯下為一
服取水若已轉且遂旋喫後方藥停待一兩日更取
水一度如此進惟取水盡更不取也却也喫金液用
以效為期若只一服取得水盡更不進取水藥氣強

者牽牛只使三錢

乾薑 桔梗 甘草 川芎

各一 分

黃橘皮

半兩

吳茱萸

銖三

右細杵羅為末每服二錢煎兩三沸空心和滓服
治腎受水相傳於肝致水氣兩肋逆脹小腹膨滿遍身
腫起面色黑兼帶黃色此為水在宜服此方轉後急喫
下面兩方藥以補之即硫黃丸當歸散

黃橘皮

半兩

白芷

川芎

細辛

各一分

吳茱萸

半夏各三
銖 牽牛

右先杵羅牽牛一味為末餘衆藥只作一處杵羅末先以生薑水煮赤小豆半升令爛熟焙乾杵炒少為末每服牽牛末三錢衆藥末二錢豆末二錢相滾滴熟湯丸桐子大非時熟湯下為一服

治肝受水氣喫藥疎轉後宜喫此方以補之此藥對硫黃丸服

川芎 當歸 白芷 吳茱萸 通草各一分

椒目二
兩

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩空心和滓熟
服

治肝臟受水子母相感一傳與心受水氣便從心前腫
起臍腹逆脹忽時嘔出清水面色雖黃兩臉上輕有
赤色此為水在心而後求藥亦已晚矣但水病傳至
於心缺盆未滿者猶可進一二服分藥者得痊減亦
火中之生蓮也

椒目二兩 錄 人參 蕙香 遠志去心 細辛各一分

牽牛二兩

右先以生薑一兩搗碎用水煮赤小豆半升令爛焙乾去薑不使杵碎小為末除牽牛一味別作一處杵為末却將衆藥作一處細杵羅為末每服藥二錢豆末二錢牽牛末三錢相滾作一服滴熟水丸如桐子大非時葱湯下為一服

治水心受水氣喫藥取轉了宜喫此遠志散以補之將

此藥對硫黃丸服

人參 遠志

去心

藿香 肉豆蔻 川芎

各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎三沸空心去渣

滓任意服

治脾受水氣傳之與腎蓋五行受病變化多端不獨傳其所勝此腎之所以受水也然五行受病又不獨傳其所勝天下萬物之理亦有同氣相求各從其類者故脾土之虛不能制水或流歸於腎注於腎者脾之

酸水也腎既受之不能無病此世人患水病先從脾以傳之於腎此其土邪入於水治之不可后時

牽牛

四兩醋熬二兩
焙乾二兩生使

續斷

乾薑

吳茱萸

豆蔻

川芎

檳榔

各一
分

椒目

二
銖

半夏
二
銖

右件藥味先牽牛一味為細末所餘衆藥另作一處杵羅為末每服牽牛末三錢半衆藥末二錢相滾作一服食後以葱湯調下取水未盡停待兩三日更取一度若踈轉不利不快第三服加衆藥末作二錢半牽

牛末作四錢滾為一服以快為度取水盡喫後方藥
以補之而不腫腹不脹是為取水盡也

此方治脾腎受水氣水氣轉盡了後服此藥以補之

山茱萸 吳茱萸 白朮 巴戟去心 川羌活

黃橘皮 草豆蔻去皮 肉豆蔻 乾薑 木通草

牽牛醋煮焙乾使 檳榔各一 川芎半兩 半夏二錢

椒目一銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心去

淬喫又煉蜜丸梧桐子大早朝空心米湯下四十九

若作散子不用椒目

茯苓琥珀丸

治水氣乘肺遍身浮腫中焦痞隔氣

不升降咳嗽喘促小便不利

赤茯苓

去木

漢防已

二味各一兩半

陳橘皮

去白一兩三錢

苦葶藶

擣令淨秤三兩半無根

紫蘇

擣淨一兩

真琥珀

別研一兩

郁李仁

揀淨秤一兩半湯浸去皮

杏仁

湯浸去皮尖及雙仁者炒一兩一分

右件將前三味為細末後五味各研為膏同前藥拌

勻煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九煎人參湯送
下不拘時候

海蛤湯 治水氣肢體腫滿元氣不足發動遍身壯熱
小便不通

海蛤 澤鴟 木猪苓去皮 木通去皮 滑石淨

桑白皮 蓼采子七味各一兩

右件為細末每服二錢水一盞入燈心十根通草二
寸煎至七分溫服食前

治水氣王尚之提刑傳云武義縣方已治數人甚妙

黃頸魚

一
個

菉豆

一
合

大戟

澤瀉

黑牽牛

生
木通

檳榔

桑根白皮

大黃

濕紙裹
煨熟用

乾漆

炒

甘遂

蕤炒
令黃

榆根白皮

草三日

郁李仁丸

出永
鈴方

治水氣乘肺動痰作喘身體微腫

葶苈隔紙炒

杏仁去皮尖

防已炒去皮尖

真蘇子

陳皮

赤茯苓各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服四十九食後紫蘇湯下

方出如意方

如積久水攻頭面目氣急腰已上俱浮腫宜用麻黃一兩甘草一兩㕮咀水煎空心用服汗出即愈

治水氣虛腫風癰肌膚惡痒

出本草

用陸英取湯入少酒浴之妙

陸英乃荊棘也

治水氣血氣心疼

出本草

以青魚鯫用醋摩服之

治水氣脚氣方 最急用其法

出本草

以赤小豆五合葫一頭生薑一分並碎破商陸根一條切同水煮豆爛湯成適寒溫去葫等細嚼豆空腹食之旋汁令盡腫立消便止

下水氣濕瘴利小便

以鴨跖草和赤小豆煮服

治水氣

出本草

以葶藶二兩以物盛甌上蒸令熟即搗萬杵若丸得
如梧桐子大不須蜜和一服五丸漸加至七丸以得
微利即住不可多物令人不堪矣食若氣發又服之
得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患惟服
此得瘥

下水氣

用赤小豆花煮一頓服之

治熟氣水氣

以牛肝和腹內百藥作生薑醋食之

去水

以木苗作飲服甚香美

下氣

以烏臼子炒作湯服

治水氣利小便除浮腫

用鯉魚一頭重一斤治如食法修事食之

桑煎 療水氣肺氣癰腫風氣

以桑條二兩用大秤大兩一物細切如豆以水一大升煎取二大合如欲得多造准此增加先煮令然煎每服肚空時喫或茶湯或美粥每服半大升亦無禁忌也

下水

以紫藤作煎如糖服之

療水及斷利

以櫟樹皮煮汁服之

治水氣浮腫

右以白葛六兩取汁半合和酒半升看大小相度與
服當利下水瘡

十珍散 治水氣

芫花

醋浸
焙

赤茯苓

桑白皮

炒

澤瀉

葶藶

炒

黑牽牛

炒各
三錢

川椒

并目
二錢

甘遂

雄黃

大戟

各一
錢

右為末頭夜不曉食五更溫酒下三錢七小利愈須
審度其腫先從足起倍葶苈先陰腫倍澤瀉先眼腫
倍牽牛先腹腫倍川椒先口腫倍大戟先手腫倍桑
皮先脇腫倍甘遂先頭腫倍羌活先腰腫倍茯苓先
腎腫倍雄黃並照元兩加至如在先小便不通者先
服通小便方通病不退用此更須審度病體強弱久
近冷熱不可輕投

十珍散 治水氣消腫神妙第一

巴豆 玄參 乾漆 青皮

右每服一錢菉豆湯下

氣癰腫

用白欵赤小豆茜草為末雞子白調塗

主氣水惡瘡腫

用水紅花草煎湯浸之佳

治水氣

用蘿勒生食之

蘿勒北人呼為爛者香
又俗呼為西王母菜

又方

用烏臼木方停一寸劈破以水一盞半煎取汁小半

盞服之立効

不用多喫
其功神聖

又方

用草麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之

盡日中當有青黃水下

水飲

附論

夫水之與飲同出而異名也人惟脾土有虧故平日所

飲水漿不能傳化或停於心下或聚於脇間或注於經絡或溢於膀胱往往因此而致病矣孰為氣血痰涎能生諸疾而水飲之不能為恙乎惟水與飲滻滻有聲為喘為咳為嘔為泄為痞隔為脹滿為脅運為怔忪為寒熱為堅痛為浮腫為多唾為短氣為體重氣為飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痛冷痺水氣滯於經絡血脉不行四肢洪腫則曰血分凡此等類皆水之所由作也據病驗證可不究其所受之原乎然則療治之將何先曰能以表裏

虛實訂之斯得矣表有水者其身熱嗽喘怔忪嘔微利

青龍湯汗之而愈裏有水者其身涼嘔嗽痞滿引脇痛

硬十棗湯下之而安虛者脉虛心腹滿而濡當以安腎

丸為主加青皮香丸

方見水腫

少許以行之實者脉實心腫

滿而硬當以青木香丸為主用五皮散加枳殼以道之

方見浮腫

尋常水氣心下怔忪大半夏茯苓小半夏茯苓湯

散輩通用可也然而瘧家多積黃水或於心下停滯或

於脇間結癖為辨為能生寒熱所以瘧劑多用常山蓋

水在上焦則吐之水不在於上焦則常山亦能破其癥
而下其水也其水腫證候亦此種類也

桂苓湯出直指方 治血分前證

辣桂 赤茯苓 當歸 川芎 赤芍藥 檳榔

蓬莪术 京三稜 蒼朮 桑白皮 炒 大腹皮

瞿麥穗 青皮 陳皮 甘草 炒各半兩 莩蘆 炒香

大黃 濕紙裹煨炒各一分

右剉散每服三錢薑五片煎服

調榮飲

出直指方

治療血留沸血化為水四肢浮腫皮腫

肉腫名曰血水分

華陰細辛

莪术

辣桂

赤芍藥

延胡索

當歸

川芎

白芷

檳榔

大腹皮

桑白皮

瞿麥穗

赤茯苓

陳皮

葶藶

炒香

大黃

煨各一錢

甘草

炙一分半

右剉散每服三錢薑四片食前服

續斷飲

出直指方

治血分如前

延胡索 當歸 川芎 牛膝 川續斷 辣桂

赤芍藥 白芷 五靈脂 炒各一 赤芍

芩 銀牛 炒取末 半夏 製 甘草 炙各一分半

右剉散服三錢薑四片食前煎服

加味枳术湯 出直指方 治氣為痰飲所阻隔心下堅脹名

曰氣分歌云氣分中滿并胞脾三者雖殊皆此類胞
脾氣實中滿虛氣分痰飲茲為異關尺微遲寸遲濇
兩處推求病端的陰氣不通則骨寒陽氣不通身

冷據陰氣前通，痺不仁陽氣前通，惡寒濕陰陽相得。
氣乃行，氣轉即散，分虛實實則失氣，虛遺尿腹滿。
脇鳴何以療，心下堅大似旋盤，桂附木湯為最妙。

枳殼

製

白术

紫蘇莖葉

辣桂

陳皮

去白

檳榔

北梗

木香

五靈脂

炒各一分

半夏

製

茯苓

甘草

右剉每服三錢，生薑四片煎服。

芎夏湯

出直指方

逐水利飲通用

川芎 半夏
製 茯苓
各一 青皮 陳皮
去白

枳殼
兩製 白朮 甘草
各一 分炒

右剉散每服三錢薑五厚片煎服川芎半夏能逐水也喘加去節麻黃嗽加炒桑白皮嘔加生薑半夏泄加蒼朮白朮痞隔加枳殼桔梗腹脹滿加縮砂白豆蔻眩運加半夏南星怔忪加白茯苓寒熱疼痛下其癬浮腫體重滲其濕餘以類推

桂木湯
出直指方 治氣分前證

辣桂

三兩

白术

去根

麻黄

去苗

細辛

去土

甘草

炒各

二兩

枳殼

製

乾薑

炮各兩半

右判散每服三錢煎服

平肺湯

出直指方

肺與腎皆以至陰積水喘嘈嗽咳蓋水

乘之

方見諸喘門

小青龍湯

出直指方

治表不解有水氣發熱乾嘔怔忪咳嗽

喘微利

方見咳嗽門不得卧類

十棗湯

出直指方

治表不解裏有水身涼汗出乾嘔短氣

微嗽微利心下痞滿引脇硬痛

方見痰飲門支飲類

枳术丸

出寶命集方

治胸膈痞悶有飲

枳殼

白术

右末糊丸梧子大每日服三十九至五十丸溫湯下

治冷熱久滯實痞不能飲食心下虛滿如水狀方

出千金方

前胡

生薑

茯苓

半夏

各四兩

甘草

枳實

白术

各四兩

桂心

二兩

右咬咀以水八升煮取三升分三服

諸腫 附論

夫腎者主水脾則主土土惟尅水脾與胃俱相為表裏胃為水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水氣滲液經絡浸漬腑臟脾得水濕之氣加之則病脾病則不能制水故水氣獨歸於腎三焦不瀉經絡閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裏上微腫如卧起之狀頸脉動時欬股間冷以手按腫如隨手而起如物裹水之狀口苦舌乾不能伏偃偃則欬清水不能卧卧則驚驚則欬甚

小便黃澀是也

消水腫歸氣飲子 治面虛腫浮四肢腫大甚者入腹
腸致胸滿氣喘微嗽冷食睡卧不能只消六服盡退

腫

蘇葉

連嫩枝一兩二錢

大腹皮

三錢

川木通

四錢

薑皮

茯苓皮

陳皮

桑皮

桔梗

地骨皮

茯苓

五加皮

麥門冬

甘草

五味子

草果

各二錢分

服為六

右每服七八錢用水二鍾薑三片煎至八分食前臨
卧日進連滓四服服腫消藥盡六服全安大忌生冷
油膩酒醋鹹雞鴨子麵食硬飯蔬菜等物只喫白粥
十日半月二十日宜若不忌口其疾後作甚之

防風散

出直指方

治風腫皮粗麻木不仁或時疼痛

麻黃

去節

牽牛

炒

甘草

炙各一分半

杏仁

去皮尖

防風

半夏

製

芍藥

辣桂

白芷

防己

當歸

川芎

羌活

獨活

檳榔

各一分

右剉每二錢薑四片蘇三葉煎服

分氣補湯

出醫方
集成

治心鬱氣結發為體浮腫上氣喘

急

大腹皮

炒

香附子

炒去毛

白茯苓

桔梗

各一兩

木通

甘草

炙

川芎

前胡

青皮

炒

枳殼

去白
猿炒

白朮

各三分

細辛

去苗

各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚同煎食前
服

茯苓散

一名檳榔散
出醫方集成

治諸般氣腫等疾

芫花

醋拌炒

澤鴻

郁李仁

甜葶藶

漢防己

各二錢半

陳皮

去白半兩

瞿麥

半兩

白檳榔

半兩

藁本

二錢半

滑石

三分

大戟

炒三分

白茯苓

半兩

右為末每服一錢取桑白皮煎湯濃空心調下取下
碧綠水如爛羊脂即差如未盡隔日又服腫消如故
不用服忌鹽百日効一方無白茯苓

紅豆散

出危氏方

緊皮

丁香 木香各三錢 縮砂 紅豆 白薑 桂皮

陳皮 青皮 桔梗 胡椒各五錢

右末每服二錢秋石湯調下

赤小豆湯

出醫方
集成

治血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿

或煩渴小便不利

赤小豆

當歸去蘆炒

商陸

澤瀉

桑白皮

連翹仁 赤芍藥

漢防已

木猪苓

去皮

澤漆

兩各半

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎八分溫服熟甚

加犀角

加味腎氣膏

出醫方
集成

治腎虛腰腫小便不利

附子

炮二兩

白茯苓

去皮

澤瀉

各一兩

山茱萸

取肉淨

山藥

炒兩

車前子

酒煮

牡丹皮

各一兩去木

官桂

不見

大

川牛膝

去蘆酒浸

熟地黃

各半兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服七十丸空心米飲

下食前

氣寶丸 治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如皺
兩脚腫滿曲膝仰卧不能屈伸自頭至頸中瘠瘦露
骨一切氣積食積并腳氣走注大便祕結寒熱往來
如傷寒並服之

黑牽牛 大黃一兩 半 檳榔 青皮去白穰各一兩炒

南木香 羌活 川芎 陳皮炒 茴香炒

當歸各半兩

右為末用皂角膏九梧桐子大每服五七十丸生薑

燈心煎湯下

雄黃神金散

出宣明論

雄黃

澤瀉

椒目

減半

大戟

巴戟

茯苓

去黑

皮

甘遂

芫花

醋五升浸一百炒

葶苈

一兩

糯米和

不
用

桑白皮

各一
兩

右為末發時加減一分空心用甘遂花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒物油膩血物從脚腫根在心加葶苈從肚腫根在腹加椒

目 從陰腫根在胸加澤瀉 從面腫根在肺加桑白皮 從心腫根在肋加雄黃 從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小腸加巴戟 從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在胃加茯苓 從膝腫根在肝加羌花

木香丸 治退脹消腫

木香三錢 檳榔二錢半 枳實一兩 枳殼半兩 蘿蔔子一兩 黑牽牛一兩 白豆蔻一兩 檀香半兩 甘草

一
兩

右為末醋糊為丸如黍米每服四十九用淡薑湯下

葱白膏

葱青白

切半

菘菜子

半升

葶藶

半升

蒴藋

切半

升
莽草

一兩

青木香

二錢

丹參

升

生蛇

升
唧

蒺藜子

炒一升

右以猪肪五升煎之三沸令水氣竭去滓傅痛處

大丸
出三因方
治通身腫滿及痰氣食積傷寒感風脾氣

漬泄

羌活 白朮

各半兩

陳皮 木通

去皮

黃耆

去蘆

桑白皮

各三分

木香

一分

黑牽牛

五兩炒

大黃

五兩生

右為末蜜丸如彈子大每治風痰散腹脇壅滯清頭目濃煎生薑湯下飲食傷下赤白痢煎棗湯下小便不利燈心湯下傷寒葱茶下如未快用稀粥投之用熱茶亦可須七日後方可服已得瀉急欲止之投白粥即自止婦人產前並服之既服此藥須住他藥三

日及不得喫生冷葷腥及滋味等物一日只軟飯淡粥
可也次日早進千金散

千金散

藿香 甘草炙 神曲炒 乾薑炮 茯苓各一
人參 桂心各半兩 陳皮 厚朴製各二兩

右為末每服二錢水一盞薑三片煎至七分鹽一捻

通口服

神秘湯

出微生寶錄

治喘嗽吐痰腫滿肺脾虛損

陳皮 生薑 紫蘇 茼苓 人參 木香

桑白皮

各等分

右㕮咀水三升煎至一升去滓大溫分作三度服

鱉甲湯

出聖濟
總錄

治水氣面目浮腫因虛勞脚氣所致

鱉甲

去裙襡醋
炙焦二兩

桃仁

七枚湯浸
去皮尖

人參

柴胡

當歸

功倍
去苗去
焙二兩

枳殼

去穰炒
各二兩

甘草

炙半
兩

白朮

根
二

右粗搗篩先用小便二盞浸藥三錢經半日煎七分

去滓溫服以瘥為度婦人病狀同者加牛膝半兩

葱白膏方

出千金方

葱白 茼菜子 莩蘆子 葫蘆根 疾梨子

丹參

各半兩

猪膏

五升

右㕮咀煎膏法去滓用之

疾梨子湯

出千金方

凡虛熱石淋當因中冷濕傷飢熱聚
在裏變成熟及水病腫滿腹大脹及大小便不利腫
如皮紙盛如日光如老蠶色堅腫如石水出此皆腎

熱虛損強取風陰濕傷脾胃故也治之法內宜依
方服諸利小便藥外以此湯洗四肢竟以葱白膏傳
之別以猪蹄湯洗

疾梨子 赤小豆 葱心 青皮各一
升 三 葫蘆升 巴豆一枚合
升 五 皮 焚

右咬咀以水二斗煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯出千金方 治體腫發熱因勞損熱盛當風露臥腫

方

豬蹄

一雙

葫蘆升

蒺藜碎

葶藶合

五

黃蘖

兩五

右咬咀以水一斗煮取三升冷浴日三

郁李仁散

出經驗良方

治腫滿不利小便

郁李仁

陳皮

檳榔

茯苓

白朮

各一兩

甘遂

五錢

右為末每服二錢薑煎棗湯調下食前服

茯苓蘇子丸

出三因方

治面腫小便澀心腹脹滿

茯苓 蘇子

杏仁 去皮尖 各二兩

橘皮 去白

防已

葶藶

隔紙炒各一兩一分

右為末蜜丸如小豆大以桑白皮湯下一二十丸食

後服

無礙丸

出衛生
寶鑑

治脾病橫流四肢腫滿及心腹脹滿

喘不得臥

大腹皮

二兩

木香

半兩

蓬莪茂

京三稜

檳榔

郁李仁

各一兩

右為末炒麥糵為丸梧桐子大每服二三十丸生薑湯下不拘時候一方無郁李仁尤佳

紫金丸

出危氏方

白薑

香附子

炒去毛

紫金皮

石菖蒲

去蘆毛

青木香

針砂

時紅蝦

右各等分細末米糊為丸用三丸第二商陸根湯下

第三赤小豆常喫用好酒吞下

小女麴散 療利後虛腫水腫者服此藥小便得利上

腫亦消

女麴

一升
生用

乾薑

細辛

椒目

附子

炮去皮臍

桂心

各一
兩

右為末散酒服方寸匕不知服二三七日三產後虛滿者大良忌猪肉生葱生菜

中軍侯黑丸

出千金方

治膽亥水從頭面至脚腫頭眩痛

身虛名曰亥水體腫大小便澁

芫花

三兩

巴豆

八分

杏仁

五分

桂心

桔梗

各四分

右為末煉蜜丸如胡豆大每日三丸稍增得利即止

大戟散

出經驗良方

男子用藥治脾元虛憊心水氣腫滿

紅牙大戟

炒主脾

甜葶藶

炒主脾

黑牽牛

半生半熟主腎

續隨子

炒去壳主肺

甘遂

炒去心

右各用一兩觀其五臟病症量病加藥加一兩共二兩並為末煎燈心湯五更初面東服一錢用藥之時相老少虛實加減至天明其水下三五次其腫即消却用生葱薑煮粥止之隔日服平胃散補貼如體虛

不堪再下者只可用前藥麵糊為丸三日一服二十丸謂之磨化丸屢効食忌如後

女人用此方

出經驗良方

治證同前

芫花

醋浸毛炒七次

牽牛

黑者半生半炒各等分

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸相虛實茶清下嚥五更初面東方服天明其水即下用前法粥藥補之婦人止用二味用手撩有窟深者可醫忌生鹽油醬豉麵醋羊鵝等毒食生冷只可喫精

肉如飲食鹽炒鹽食之以少為貴不食猶好服之日
須忌以甘草

木香丸

出直指方

木香

青皮

黃連

橘紅各一錢

胡椒半錢

右為末入巴豆肉不用去油一錢麵糊丸椒大每服
三四丸薑湯下大便利腫自消未利再服停積滯滯

通用

枳殼丸

出經驗良方

治偏身黃腫外腎亦腫

枳殼炒 香附子炒去毛 茴香微炒 蘿蔔子微炒各等 分

右為末煮麵糊為丸如梧桐子大煎橘葉湯空心
服下黃水即安每五十九

桑根白皮飲 療脾胃水氣面目手足跗腫胃脘堅腹
滿短氣不能動搖

桑根白皮切二升 桂心一尺 生薑三兩 人參

右切以水三升煮桑白皮得一升絞去滓內桂心等

各飴一十兩煮之竭得七合消息更服須臾當下不
盡復一升忌生葱

吹鼻散 治身面四肢浮腫殺虫去鼻中瘻肉陰黃黃

痘及暴急黃

瓜蒂 丁香枝各七

小豆七

右為末黑豆粒於鼻中少時黃水出瘥

摩膏出千金方 治表久腫病須按方內外攻之可一槩除

生商陸一斤煎可得二升

右和煎令黃去滓以摩腫亦可服少許並塗以紙覆上燥輒傳之不過三日瘥

羊胃湯 治久病羸瘦不生飢肉水氣在脇下不能食

四肢煩熱

羊胃一枚
切 白朮一升
切

右用水二斗煮取九升服一升日三三日盡更作兩

劑乃瘥忌李桃雀肉等

治心下有水

出肘
后方

白本三兩
澤瀉五兩

右剗以水三升煎取一升半分服

黑龍丸 治食氣偏身黃腫喘而不得食心胸滿悶

白角去皮子醋炙
黃為末一錢

巴豆七枚去皮油

右為末用醋及好黑土為末丸如麻子大每服三丸
橘皮湯下一日添一丸以知為度如常服清酒毒治

腹脹忌油膩菓子

大豆煎出千金方 治男子女人新久腫病風氣入腹婦人

新產上則風入臟腑中如馬鞭者噓吸短氣咳嗽宜
用大豆一斗淨揀以水五升煮取一斗五升澄清內
蟬中以一斗半美酒內中更煎取九升夜宿勿食平
旦一服三升溫覆取汗兩食頃當下去風氣腫退慎
風冷服之十日可全愈若急不可待遂急合服腫不
盡退加之腫差更服三服倘若十分差勿服病中亦
可任飲之使酒氣相接腫差後渴慎勿多飲

又方

出千金方

用楮皮枝葉一大束切煮取汁隨多釀酒但飲醉為佳不過三四日腫少退瘥后可常服之一方用楮椒枝葉

又方出千金方

用鯉魚長一尺五寸以尿漬一宿平旦木籠從口貫至尾微火炙令熟去皮宿勿食空腹頓服之不能者分再服勿與鹽

香附子

出經驗良方

治酒腫及腫脾虛發腫

用香附子淨洗去皮毛用酸米醋煮焙乾嚼一二十粒久之敗水漸從小便利去腫退仍能飲食體壯勝前委有神功如憚咀嚼醋煮香附子焙乾為末醋糊丸服亦可一方用皂角五片剉同煮生蘿蔔汁水吞服難服晾乾為末醋糊丸服亦可一方用皂角五片剉同生蘿蔔十分吞服難丸加乾宿蒸餅丸一方用大附子童子小便浸一宿一日一夜取出換童尿又浸一日一夜以生絹袋擦去皮於臼中細麵糊米醋

為丸如桐子大每服七十丸煎湯飲下

治脚氣水腫臍丸

用釣樟柳煎服并將皮煎湯洗瘡瘍風癩疥癬

又方

用豪豬取其肚燒乾和肚屎用之搗細末每朝空心溫酒調下二錢有患水病鼓脹者服此藥猪肚一箇瘥

桑椹方 治水腫水不下則滿溢若水下則虛竭還脹

十無一活

用桑椹子并心皮二件先將心皮細切以水二斗煮取一斗去滓入桑椹重煮五升以好糯米五升釀為酒每服一升

若腫偏有所起者

出肘后方

以水和灰塗之燥腹更塗

又方

出肘后方

用赤小豆麻子合搗以傅腫上

又方

出肘后方

用削楂或桐木煮取汁漬之并飲下少許加小豆妙

又方

出肘后方

用煮豉汁飲之以滓傅脚

治一切腫方

用紅藍花熟橘搗取汁服之不過再三服便愈多服更妙若腫而大喘者亦宜進此藥

治水病瘥后口中乾燥熱瘡出方

用鐵鑄中着水一小斗煮金器不問多少煎取二小升出金取金水著病人口中含良久應欲言語有要事方可吐勿嚥之改藥氣

背腫方

出危氏方

以煉石塗之立瘥

大棗湯

出本
事方

治四肢腫滿

以白朮三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚拍破同煎至九分去滓溫服日三四服不拘時候

烏梅醋法

出危
氏方

治手指甲頭腫

用烏梅搗碎去核肉只取仁研米醋入鹽以指浸之

自愈

治面目手足有微腫常不能好者

出千
金方

用楮葉切二升以水四升煮取三升去滓內米煮作粥食如常食勿絕冬則預取葉乾之準法作粥周年永差忌生冷一切發物

抵聖丸

出楊氏
家藏方

治男子婦人頭面手足虛腫

以苦葶藶不計多少於火上隔紙炒過杵為細末棗肉為丸如小豆大每服十丸煎麻子湯下食前日進三服五七日小便腫消為効如喘嗽煎桑白皮湯下忌生冷醋滑物及鹽須另丸一等小丸兒與小兒服者大小加減服煎棗肉湯下

夏月飲紅白酒后食冷麵但覺胸中不快次日手背面皆浮腫服五子五皮飲送紅丸子見効後多服紅丸子尤妙

又方

凡體腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布緩更以醋洗蒜鑿食亦可也如頓服食不盡作三兩頓食

香薷丸

出平便良方

療暴水風水氣水腫或瘡中有水通

身皆腫

甘香薷

一斤

白术

七兩

右搗术下節濃煮香薷取汁和术為丸飲服如梧子十九日夜四五服利小便夏取花葉合用忌桃李雀

肉青魚酢等物

加減五苓散

出朱氏
集驗方

治水疾

木猪苓

白茯苓

白术

板桂

各七錢

澤瀉

一兩

南木香

丁香

沉香

檳榔

各三錢

白豆蔻

二錢

半

右為細末每服一錢半煎白樟柳空心溫點服如要取水加甘遂半錢在藥內利三五次又當以勺氣藥服下止之但凡治腫三日兩日又一服之取三二次

水必去矣續用勻氣藥調理治腫之法無出此也勻
氣之藥或烏沉湯勻氣內去甘草者蓋緣治腫藥內
有甘遂相反故也服時須濃煎燈心木通湯下點服
為妙不要甘遂利小便亦甚穩更量虛實用之大要
看尺脉腫盛而尺脉如絲或洪浮按之無根者皆不
可下此藥外臺云脉大者生小者死叔和云氣浮大
得延生沉細應當死

沉香大腹皮湯

出朱氏集驗方

治腫

沉香 陳皮 良薑 附子 丁香 白豆蔻

川芎 草豆蔻仁各半兩 厚朴 大腹各一兩
炙 白朮

半兩

右細剗為散每服三大錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓食前通口服信庵趙魯公母雍國夫人腫三十年后在襄陽得此藥服半月愈之

沉香附湯出朱氏集驗方

治腫病大凡腫病因積水而得先用涼藥稍效而腫再作小便不利到此束手蓋涼藥利

小便藥性寒而小便愈不通也小便不利則中焦下焦氣不升降為寒氣所結滯故水凝而不通但用沉

香附湯

附子一隻

生去皮臍
切成片

右用生薑十數片水三盞煎至八分次用沉香濃磨二錢許加入藥再煎二沸去滓空心服如此則小便自通喘自去矣屢試效驗即服三五十隻附子無碍男子婦人皆可服

生料五苓散

出直指方

去水退腫

澤瀉

剉二十兩

猪苓

去皮一兩

赤茯苓

去皮各一

白朮

去蘆各一

十五兩

桂

去皮一兩

右為末每服二錢熱湯調下不拘時又治療熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服但病發渴及中暑引飲亦可用水調下服小兒加白朮末少許如發虛熱加黃耆人參末少許

治胃水四肢腫滿方

出千金方

猪腎一具 茯苓四兩 防己 橘皮 玄參 黃芩

杏仁 澤瀉 桑白皮各二兩 猪苓 白朮各三兩

大豆三升

右十二味㕮咀以水一斗八升煮猪腎大豆澤瀉桑白皮取一斗澄清去滓餘藥煮取三升分三服若嗽加五味子三兩凡服三劑間五日一劑常用有効

泄水丸

右料加芒硝半兩商陸半兩為末水丸依前服如小

豆大每服五十九水下

胡椒宣氣丸 治浮腫

厚朴

薑汁製用巴豆六粒破開外
殼厚朴四兩炒熟去豆用

菌頭蘿子

一兩

羌活

一兩
兩

藿香

半兩

木香

一兩生用一兩同蘿子
十四箇拌炒止擇七箇

全者

用

右為末用蒜磨水打糊為丸以菉豆大每服三十九
用燈心棗湯下用木通湯下亦得不拘時候
寸氣丸 治脾腎氣虛腎水流溢四肢作腫

大蒜五枚去皮碎

附子一大隻去臍切作塊

赤小豆揀五兩

右同於砂鍋內用水五升煮取乾為度水三升漸添至五升口取附子為末餘不用却入後藥

白花商陸根半兩

車前子二錢半

沉香二錢

木香

三錢

右件同附子薏苡仁末煮糊為丸如梧桐子大每服五十九粒薏苡仁湯下空心日進三服其效如神

平胃散 治腫病不進飲食

蘿蔔子一盞白水煎候清汁煎平胃散

右每服二錢以煎蘿蔔子汁一盞加薑棗煎至七分
仍入蘿蔔一搗同煎服此方累有神効

胃苓丸 治腫 平胃散 五苓散

右各一貼用大蒜蒸熟丸藥胃苓二藥五十九煎木
通湯吞下

磁石丸 治諸氣腫大有妙効

羌活 陳皮去白 木香 澤瀉 附子炮去皮
臍焙乾

檳榔 白术 赤茯苓去皮 肉蓴蓉 訶子炮去皮用

官桂去皮

黃耆研為細末

桑白皮另杵為末秤

能引鐵者醋碎十瓣

鱉甲炙

醋

黃令

烏頭炮

磁石細研水飛過為度

能引鐵者醋碎十瓣

橘紅炙

右件等各半兩為末用羊腎子或豬腎子去脂膜生研細和末再杵一二千下如硬再入酒糊丸如梧子大焙乾空心日午溫酒下二十九至三十九切忌房事并鹽及諸毒物須至百日內

治酒遍身黃腫方

五靈脂

一兩

右為末入麝香少許研令勻飯丸小豆大每服十九

用米飲吞下

防風湯 治四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣
溫溫悶亂欲吐者方

防風 白术 知母 桂心各四 芳窮 菖蒲

杏仁

甘草

各三

半夏

生薑

各五

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

古方無半夏杏仁芳窮用附子

治腫氣

以秦荻藜子為末和釀醋封腫如乾再易日數次以
差為度

治腫氣

以韭杵極爛灸熱搗瘡上便愈以馬齒燒灰唾和紺
帛貼腫上根出

治腫氣

用拳參五月採擣末淋燶

去浮腫

用破黍莖穗提掃煮取汁浴之

有人虛肥積年氣上如水病面腫腹不腫

以楮葉八兩下水一斗煮取六升去滓內米煮粥喫

治浮腫下水兼惡毒腫

搗芫花茺蔚苗絞汁服之

白朮湯 治脾虛浮腫

橘皮 大腹皮 荻苓 生薑皮各半兩 白术一兩

右為細末每服三錢米飲下

銀珠丹 治正水大便利者

硫黃四兩火煅過 銀珠

右研極細麵糊丸如桐子大每服三十丸米飲下

大豆散出指南治利水

大豆一升炒香 白术二兩

右為細末每服三錢溫米飲下



普濟方卷一百九十二