

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百二十三

詳校官太醫院吏目臣吳尊斐

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣王永鎮

欽定四庫全書

普濟方卷二百二

明 周王朱橚 撰

霍亂門

霍亂欲死

夫霍亂欲死者真氣厥而邪氣盛也或邪氣暴爭而未得吐痢或吐痢雖極而邪氣猶盛故真氣為之困乏其證煩悶痞滿四逆自汗脉微若絕者是也此由陰陽痞悶不得升降內經所謂出入廢則神機化滅升降息則

氣立孤危

方

赤茯苓湯

出聖惠方

治霍亂吐痢不止腹痛轉筋煩悶欲死

赤茯苓

去黑皮

五味子

各半兩

藿香葉

半兩

黃耆

切

當歸

切培白朮

炒各一分

乾木爪

人參

各一

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候再服

治霍亂困篤不識人方

出聖惠方

用雞蘇三兩剉以水三大盞煎至一盞半去滓分溫

三服

治霍亂頭旋倒欲絕方

用陳橘皮二錢湯點灌之取磚燒熱沃醋其上布厚

裹熨心下便活又治轉筋

胡椒湯出聖惠方治霍亂煩悶欲死

胡椒三十粒鷄屎白半合微炒高良薑剉桂心各半兩木瓜

乾麥門冬去心培者各一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓  
不拘時候溫服

阿魏九出聖濟總錄治霍亂不止下痢氣腹滿脹悶欲死者

阿魏研青橘皮湯浸去白焙各一兩酸榴皮焙各一兩五味子各半兩

陳麵炒一兩

右先搗後四味細羅為末與阿魏同研令勻用糯米  
糊丸如梧子大每服二十九溫熱水下如脚轉筋絕  
甚者研開溫熱水調下

附子散出聖惠方治霍亂吐瀉欲垂絕者

附子

一兩去皮  
炮

乾薑

半兩  
炮  
切

甘草

二分  
炙  
微赤剗

桂心

三分

右搗節為散每服三錢匕水一中盞煎至六分不計

時候溫服

生薑散治霍亂吐不止欲死

生薑

二兩切

陳橘皮

湯浸白  
焙去

乾木瓜

各一兩

右為散每服二錢以水調下連三五服

雄雀糞散出聖濟總錄治飲食傷飽取涼過度霍亂脹滿

欲死及上下不通用雄雀糞二十一粒研細用煖酒  
半盞調服未效再服

生薑飲

出聖惠方

治霍亂吐下不止欲死

生薑

五兩

牛屎

一升

右切薑以水四升煎取二升分溫服

治霍亂醫所不能治秘方

出千金方

用童女月經衣合血燒末方寸調匕百方不瘥者用

之

活命散出護命方治一切男女并小兒上吐下瀉霍亂不止面  
色青黑命欲臨死宜服此

防風 羌活 獨活 乾薑 細辛各半分一草豆蔻  
肉豆蔻 芫各半分官桂去皮半分吳茱萸 乾木爪各一

兩

右杵羅為末每服五錢濃煎木瓜湯空心調下和滓

喫

霍亂心腹痛

附論

夫霍亂者由脾胃虛弱客風冷之氣陰陽不和致水穀相併清濁莫分變亂於腸胃之間令人心胸煩懊悶亂不安因名霍亂然邪氣上干於陽絡之間則心痛而嘔吐下搏陰經則腹痛而瀉痢故謂之霍亂心腹痛也

方

沉香丸出聖濟總論治霍亂心腹疼痛

沉香 丁香 犀角镑枳實去穰肉豆蔻去壳木  
香 茴木茂炮各半兩胡椒一 槟榔剉四 乳香研 没藥

研各半兩  
巴豆去皮心研出油一錢

麝香研各一錢

右搗前九味為末與巴豆沒藥乳香麝香和令勻糯米粥為丸如菜菔子大每服五十九生薑橘皮煎湯

下加至十九

抵聖散

出聖濟總錄

治霍亂宿食不消心腹疼痛

厚朴

去粗皮塗鹽斗炙四兩

白术

二兩高良薑

吳茱萸

半兩湯浸焙乾

炒兩

枳殼

去瓢炒一兩

人參

白茯苓

去黑皮

甘草

炙半兩剉

木

香

陳皮

去白皮各一兩

草豆蔻

去皮

右搗羅為散每服一錢以沸湯調下不拘時

附子散

出聖惠方

治霍亂虛煩吐瀉轉筋冷汗出腹中痛

附子

炮裂皮

去臍

草豆蔻

去皮三分

人參

去蘆頭

甘草

炙微赤剗

當

歸

剗炒微

乾薑

炮裂剗

桂心

各半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓  
不拘時候溫服

人參散

出聖惠方

治霍亂吐瀉心腹痛四肢不和

人參

去蘆頭

白术

赤芍藥

甘草

炙微赤剗

當歸

切微炒

赤茯苓 肉豆蔻 桂心

以上各半兩

乾薑

一兩炮製

右搗為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不

拘時候溫服

縮砂蜜散

出聖濟總錄

治霍亂心腹冷痛嘔逆惡心大腸滑

瀉

縮砂蜜

去皮炒

陳麵

炒

白朮

切乾薑

炮龍骨

炮

赤石

脂 吳茱萸

湯浸焙用

芎藭

芍藥

右等分搗羅為散每服二錢以熱米飲下不拘時

候

肉豆蔻散

出聖惠方

治霍亂吐瀉不止冷氣入脾胃攻心腹

切痛

肉豆蔻

去壳

白术 桂心

枇杷葉

去毛炙微黃

吳茱萸

湯浸七次微炒各半兩

培乾三分

高良薑

三分剉

甘草

一分炙微赤剉厚朴一兩

去粗皮塗薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓  
不拘時候溫服

高良薑散

出聖濟總錄

治霍亂吐瀉不止心腹疼痛煩渴

高良薑

剉炒二分

肉豆蔻

去壳湯浸培

吳茱萸

乾炒

人參

蒼

术

米泔浸宿剉炒

麥門冬

去心培

诃梨勒皮

陳橘皮

右搗為散每服三錢匕米飲調下不拘時候服藿香正氣散治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂心小便不利加車前子每料各一兩一方有茯苓無車前此藥溫

散風寒濕氣若暑證加香薷

厚朴人參湯療霍亂心痛煩嘔吐不止

厚朴

四兩  
炙

橘皮

人參

各二兩

高良薑

當歸

藿

香

各一兩

右以水七升煮取二升半絞去滓分溫三服各相去如人行六七里忌生冷粘膩

理中加二味湯

出十便良方

治霍亂胸滿腹痛吐下

人參 乾薑

炮

白术

各三兩

當歸

甘草

炙

芍藥

各一兩

兩

右咬咀以水七升煮取三升絞去滓溫服一升日三

夜一良忌海藻菘菜

溫中湯

出聖濟  
總錄

治霍亂吐下虛煩不止心腹絞痛

人參

乾薑

白朮

甘草

炙當歸切  
培

右等分粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫  
服不計時候

厚朴湯

出聖濟  
總錄

治霍亂心腹痛煩不止或嘔

厚朴

去粗皮  
薑炙剉

桂

去粗皮  
炒

枳殼

去瓢麸  
三兩

芍藥

各剉

槟榔

右搗篩每服三錢以水一盞入薑五片煎至七分去滓溫服不拘時候

桔梗湯療霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止

桔梗四兩白术五兩乾薑二兩茯苓各二兩倉米一升

右切以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升絞去滓分服忌桃李雀犬肉酢

理中丸出十便良方治霍亂嘔吐心腹疼痛

高良薑切白术各一兩桂去皮甘草炙各半兩

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸不計時候濃煎橘皮湯化下

香薷湯療霍亂初覺不好則用此方主腹痛吐痢

香薷切小蒜碎各一升厚朴炙六兩生薑炙十兩

右切以水一斗煮取三升分三服得吐痢止服皆須溫

吳茱萸治霍亂心腹痛嘔吐不止

吳茱萸湯浸培炒各一兩乾薑炮炙一兩乾甘草炙半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服  
日三

茯苓理中湯療霍亂臍上築而悸

茯苓

大如東者一枚一方二兩

乾薑

炮一兩

甘草

炙三兩

人參

木瓜

各三

右咬咀以水六升煮取三升去滓適寒溫服為四服

忌海藻菘菜酢物

理中去末加桂湯

出聖濟總錄

治霍亂吐過多臍上築悸恐

作奔㹠

乾薑

炮一兩

甘草

炙

人參

桂

去粗皮各三兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

茯苓湯

出聖濟總錄

治霍亂心下築悸腎氣動

白茯苓

去皮一兩

人參

各三兩

甘草

炙

白术

各二兩

乾薑

炮一兩

兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日三

附子湯

出聖濟  
總錄

治霍亂臍上築博四肢逆冷

半夏

生薑  
汁製

甘草

炙各  
一兩

附子

炮製去皮  
臍半兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞棗一枚擘破粳米一撮煎至七分去滓溫服日三

霍亂心下痞逆

夫霍亂結心下不散則氣不通故字書以痞為否言其不通然痞為虛按之不痛氣雖妨悶不須決利唯和調其胃升降其氣則痞氣自散霍亂自寧

方

木瓜丸治霍亂心下氣痞不通

木瓜

去皮 糯切  
培十枚

木香

三兩

人參

一兩半

肉豆蔻

去皮半兩

右搗篩為粗末每服二錢以水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治霍亂吐瀉心腹痞痛方

出聖惠方

黑豆

半合炒熟

生薑

黃連

去皮各

草豆蔻

去皮各半兩

右細剉和勻分為四服每服以水一中盞煎至六分

去滓服良久再服

備急方丸治霍亂心腹症痛冷氣築心

方見本門乾濕霍亂類

薺莞飲治霍亂心腹痛

方見本門霍亂吐瀉類

桂心湯一名厚朴湯治霍亂中冷心腹痛

當歸湯

當歸

切焙三兩

桂去粗皮

甘草炙各二兩

拘時

右搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服不

蘆根湯治霍亂心腹痛

生蘆根

切一升入上者

生薑

一升橘皮

五兩

右以水八升煮取二升分二服服相去以意消息之

治霍亂心腹脹痛不得利方

出聖惠方

牛糞

絞取汁一合

百日兒乳汁

一合

右攪勻頓服

治霍亂轉筋腹脹不止方

出聖惠方

小蒜

鹽

各一分

右爛搗納少許臍中上以艾火炙五七壯立效  
療霍亂苦絞痛不止

用生薑二塊豉二升合搗中分為兩分手攬如  
攤令勻更番以熨臍中

治霍亂

出肘後方

用溫酒二升以臍如彈子丸一枚置酒中消乃飲無  
臍以鹽二方寸匕代亦得

又方

出肘後方

用桂半夏等分末方寸匕水一升和服之瘥

又方

出聖惠方

用蘆葉一握剉以水一大盞煎至五分去滓頓服

菖蒲汁治霍亂腹痛急如中惡

用生菖蒲剉碎四兩以水同搗絞取汁一盞分為四服每用熱湯和溫服三服

桃葉飲

出聖惠方治霍亂吐痢不止腹俱痛

用桃葉秋冬取枝搗二升以水五盞和絞取汁每服

一盞不拘時候肘後方用葉三升千金方以桃葉煎  
汁服一升立止冬用皮

治霍亂腹痛吐下亦治轉筋不止煩悶出經驗良方

用桑葉汁冬月乾者濃煮服之

治霍亂心痛煩滿未得吐下出肘後方

用好苦酒三升飲小老羸者亦可飲

治霍亂下氣上心腹痛冷氣內外腎釣痛

用茱萸葉熱無毒鹽研罨神效乾即浸濕復罨霍亂

轉筋和爻以醋湯拌罨妙也

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下

出肘後方

用生薑一觔切水七升煮取二升分三服又用生薑大片燒皮黑色槌碎水浸服之亦可

鹽熨方

出危氏方

治霍亂吐瀉心腹作痛

用炒鹽二盜紙包紗護頓其胸前并腹肚上一截以熨斗火熨氣透則續又以炒鹽熨其背鹽湯飲之即止

又方用生大豆屑酒和服方寸匕

木瓜湯治霍亂臍下絞痛

木瓜半兩桑葉七片棗三枚

右以水二升煮取半升頓服瘥

訶梨勒丸治霍亂吐逆腹痛或便利數多冷熱不調

訶梨勒皮微炒一兩乾生薑切三分甘草炙半兩陳橘皮去白二兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十九煎生薑米飲

下不計時候

良薑湯

出難  
本方

治脾胃傷冷心腹大痛霍亂吐瀉

厚朴 良薑 桂

各等分

右細末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

主霍亂

出本草

以銅盆盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者復漸漸熨之腹痛熱瘥

霍亂心腹築悸附論

夫霍亂而心腹築悸者由吐下之後三焦五臟不和而水氣上乘於心故也腎主水其氣通入於陰若吐下三焦五臟不和故脾氣亦虛不能制水水不下宣與氣俱上乘其心故起膈下從腹至心築然而悸動不定也

方

草豆蔻散治霍亂吐瀉膈下氣築悸妨悶

草豆蔻去皮

木香 陳橘皮湯浸去白焙

人參去上各一兩

去蘆頭以

桂心 甘草

炙微  
赤剉

白朮 乾薑

炮製剉以  
上各半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候熱服

乾薑湯

出聖濟  
總錄

治霍亂洞泄不止臍上築悸

乾薑

炮

人參 甘草 白朮

茯苓 去粗皮

陳橘皮

湯浸去白

焙各四兩

桂

去粗皮

黃耆

剉各二兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日

三

理中湯治霍亂吐瀉心煩築悸

人參

一兩去  
蘆頭

白术

三分甘草

炙製赤剗

乾薑

炮製赤剗

赤茯苓

麥門冬

去心各半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

人參散治霍亂吐瀉過下脣下氣築悸

人參

去蘆頭

附子

炮製去皮  
臍各一兩

甘草

炙微赤剗

乾薑

炮製赤剗各半兩

桂心

澤瀉

各三分

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候熱服

附子湯

出聖濟總錄

治霍亂心腹築悸

附子

炮製去皮臍一兩

白茯苓

去黑皮

人參

甘草

炙乾薑

陳橘皮

湯浸去白培二兩

胡椒

檳榔

剉各二兩

吳茱萸

草豆蔻

去皮厚朴去粗皮薑三兩

桂

去粗皮縮二兩

生薑

一觔搗絞

砂皮

高良薑各三兩

蒼术

米泔浸一宿刮去皮培二兩

汗取汁

右除生薑汁外為細末取生薑汁拌勻用甕瓶盛於  
鍋中以重湯煮一復時取出更搗令勻衆手和如  
梧桐子大每服十九熟水下服

吳茱萸湯治霍亂嘔吐酸水結氣在心下

吳茱萸

湯浸焙炒二兩

白术 赤茯苓

去黑皮各三兩

陳橘皮

湯浸

去白焙一兩半

草薢

一兩半

撥一檳榔

剉二兩半厚朴去粗皮生薑汁炙二兩

人參

半一兩

大黃

剉焙二兩

右搗篩為散每服五錢水一盞半竹茹彈子大生薑

三片煎至一盞去滓溫服

茯苓湯治霍亂心下結氣連胸背痛及吐酸水日夜不

止

赤茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮生薑汁炙

吳茱萸

湯浸焙炒各一兩

人

參

陳橘皮

湯浸去白皮各二兩

白术

三兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時

半夏橘皮湯治霍亂心下痞滿飲米吐逆水穀不化

半夏

湯洗七次去滑切焙一兩

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

人參

半兩厚朴

去粗皮薑  
汁炙一兩

白术 高良薑

各半兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片大棗二枚去核煎至一盞去滓溫服

半夏湯

出聖濟總錄

治霍亂心下痞滿

半夏

湯洗七次去滑切焙三兩

人參

二兩赤茯苓

去黑皮四兩一  
方用白茯苓

右㕮咀如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大拍碎煎至六分去滓溫服

厚朴湯

出肘後方

治霍亂心下痞滿煩嘔不止

厚朴

去粗皮生薑  
汗炙四兩

桂皮

去粗皮  
枳實炒去穰各三兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時候腹痛加當歸二兩服之

霍亂心腹脹滿

附論

夫冷熱不調則成霍亂霍亂若心腹脹滿者是寒氣與  
臟氣相搏真邪相攻不得吐痢故令腹脹滿也其有吐  
痢過多臟虛邪猶未盡邪氣與脾氣不宣發亦令心腹

脹滿也。陰陽氣不升降，胃中虛客氣內實，故脹而悶亂也。挾穀不化，內煩嘔者，降氣於下，則病可愈。

方

鱉甲丸

出聖濟  
總錄

治霍亂一切冷氣宿食不消，心肋脹痛。

胃冷嘔噦并諸痰飲

鱉甲

九肋厚重綠色者一枚打鐵，脚子格得鱉甲者，平穩置爐中，趁炭火炙之，取米醋五合少傾于甲中，旋次雞翎

塗于甲內，令勻醋盡即已，勿令火猛，使甲背色變矣。  
了洗以薄醋打碎曝乾，搗羅成粉，取五兩入後藥。

京三稜

炮

附子

炮製去皮  
臍各三兩

白石脂

研

赤石脂

研白

龍骨

研各半兩

肉豆蔻

一兩

白豆蔻

一兩半如無以草豆蔻一兩代之

木

香

牛膝

酒浸去苗培

枳殼

去穰熟炒

當歸

洗淨焙

白术

桂

去粗皮

防風

去焰炒藥

陳橘皮

湯浸去白炒

革撥

牛乳

右除牛乳外為細末取革撥末一兩和牛乳慢水煎如  
鴆與衆藥杵勻衆手丸如梧桐子大霍亂甚者取五  
十九嚼破以人參橘皮湯下立愈未全愈更服三丸

高良薑湯

出聖濟總錄

治霍亂心腹脹滿疼痛破氣消食

高良薑

剉厚朴

去粗皮生薑汁三度炙乾

陳橘皮

湯浸去白培乾

白术

桑根白皮

甘草

人參

木爪

去皮  
穰并子  
培乾三兩

五味子

桂皮

楨榔

剉

诃梨勒皮

木香

肉豆蔻仁

鹽

淘去泥滓

研成鹽花

右先搗前十四味為末

與鹽花末同研令勻以水五升下藥末一匙入鍋中和鹽花同煎不住攪候水涸

出藥於盆中乾即貯之每服兩錢匕入生薑少許煎

湯點服之

木香散

出聖惠方

治霍亂下痢氣脹飲食不消

木香

丁香

白术

炮葛蒲

山薑子

桂皮

去粗

甘草

炙

人參

吳茱萸

湯浸炒

白豆蔻仁

陳橘皮

白湯  
焙

肉豆蔻

去皮炮

高良薑

草豆蔻

去皮炮

高良薑

草豆蔻

去皮炮

高良薑

草豆蔻

去皮炮

右等分搗羅為細散每服四錢匕木瓜湯調下

白豆蔻丸

出聖惠方

治霍亂及脾胃氣虛腹脹妨悶不思飲食

食

白豆蔻

三分

去皮乾薑

半兩炮

製剉

白术

二兩

甘草

半兩炙

微赤剉

人

參

三蘆頭去

桂心

半兩

厚朴

一兩去粗皮塗

薑汁炙令香熟

陳橘皮

一兩

湯洗去  
白穰培  
訶梨勒皮

三

分

右搗羅為散煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每  
服以生薑東湯下二十九日四五服

梔榔湯  
出聖濟  
總錄 治霍亂嘔吐腹脇脹滿

梔榔剉陳橘皮  
湯浸去  
白培乾 白茯苓  
去黑  
皮 防風  
去  
根黃去核 人參

麥門冬  
去心  
培 紫蘇葉  
甘草  
炙 訶梨勒  
各一兩

右搗篩每服五錢匕入生薑一分拍碎陳米半合  
水兩盞煎至九分去滓溫服日三每嘔逆時相次熱

服

厚朴丸

出聖濟總錄

治霍亂脾氣冷腹脹不能食胸膈氣痞

厚朴

去粗皮  
汁炙二分

白术

人參

枳殼

去穰  
炒桂皮

乾木瓜

各半兩  
乾薑

甘草

炙一  
分

胡椒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎蘭香湯下

藿香散

出聖惠方

治霍亂吐瀉多脾胃氣乏心腹脹滿不思

飲食

藿香 當歸剉微炒 人參去蘆頭各半兩 桂心 茴薺各半兩 木

瓜乾者 白术各一分兩 附子三分炮製去皮臍

右搗篩粗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

桔梗散 治霍亂不吐不利壅悶腹脹或疼痛

桔梗炒去白芯兩 一桂去粗皮 柴柳剉各三分 白术各二兩 人參二兩青橘

皮去白芯炒剉各三分 大黃剉各三分 木香

右為細散以冷生薑湯調下以瘥為度

桂心散

出聖惠方

治霍亂吐痢心煩轉筋腹脹滿

桂心

半兩

人參

三分去蘆頭

香菜

二兩

木瓜

乾者二兩

陳橘皮

一兩

湯浸去白穰培

甘草

半兩炙赤剉

乾薑

半兩炮製剉

榔

一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服

訶梨勒散

出聖惠方

治霍亂吐瀉心腹脹滿脾胃虛弱四肢

逆冷

訶梨勒皮

微炒

陳橘皮

湯浸去白穰炒

桂心

各一兩

白茯苓

各一兩

厚朴二兩去粗皮搣一錢  
薑汁炙黃香熟甘草一分炙  
微赤剉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入棗三枚生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

香薷湯出聖惠方治卒霍亂吐瀉腹痛刺上吐下瀉

香薷剉二錢木瓜去穰子  
焙乾剉荆芥穗各半兩陳廩

米炒半合黑豆炮一

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服日三如人行三五里進一服

真珍散治喜怒不常憂思兼并致臟氣鬱結留積涎  
飲胸腹滿悶或腹疼痛憎寒發熱吐痢交作

附子

二個一生一  
炮各去皮臍

半夏

湯浸二十宿洗去滑一兩半

滑石成

煉鍾乳

各半兩

辰砂

三錢別研

右為末每服二錢水二盞薑七片藿香二三葉蜜半  
匙煎至七分食前冷服小便不利加木通茅根煎

金針丸

出聖濟總錄

治霍亂心脹滿氣迷或內煩而嘔手足

厥冷

陽起石

煅

不灰木

研各半兩

阿魏

研各半兩

巴豆

去皮心膜不去油二十五粒

杏仁

湯炮去皮尖及仁研二十五粒

右為細末軟粟米飯丸如櫻桃大每服一丸先穿一眼子欲服時燈上燒烟盡放冷為末生薑米飲調下以利為度

大腹湯

出聖濟總錄

治霍亂未得痢腹脹疔刺嘔逆不止

大腹

和皮用

厚朴

去粗皮生薑

防風

去汗三度炙乾

半夏

湯浸七次去滑

焙乾各半兩

人參

一兩

右搗篩每服五錢匕木瓜三片小麥半合生薑一分  
拍研水兩盞煎至一盞去滓溫服如吐時熱服

吳茱萸湯

出聖濟總錄

治霍亂不得利氣急膨滿疗刺疼痛

吳茱萸

淘沙半兩草豆蔻仁十枚甘草炙一分

乾木瓜

去皮穰并

子培三分

右搗篩每服五錢匕黑豆一百粒水一盞半煎至一  
盞去滓熱服如人行五六里再服

溫中丸

出和濟方

治脾臟傷冷宿食不消霍亂吐瀉心腹脹脹

痙刺

良薑

去蘆乾薑

炮青皮

去白各

陳皮

去白各五兩

白

鹽

酒

右為細末用鹽打麵糊為丸如梧子大每服三十九

米飲吞下不拘時候又療丈夫小腸疝氣疔痛炒面

香少許細嚼用鹽湯鹽酒任下日進二服

白术散

出惠方聖

治霍亂心腹脹滿

白术

枳殼

麸炒微黃各三兩

桂心

一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚生薑

半分煎至六分去滓不計時候熱服

人參散

出聖惠方

治霍亂及脾胃氣虛腹脹不能飲食

人參

三分去蘆頭

香菜

一握剉

陳橘皮

一兩酒浸去白穰焙

右搗篩為散分為四服每服以水一中盞入棗三枚  
生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

陳橘皮散

出聖惠方

治霍亂嘔逆腹鳴不利心下脹滿

陳橘皮

一兩湯浸去白穰焙

半夏

三分湯洗七次去滑

乾薑

半兩炮製剉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不拘時候溫服

白术湯治霍亂脾胃氣攻腹脹滿不下食

白术一兩  
枳殼去穰炒焙半  
一兩一分

右搗篩每服三錢入大棗二枚擘去核水一盞煎至六分去滓空心溫服早晨午時日晡各一服

厚朴湯治霍亂紅痢腹脹乾嘔

厚朴去粗皮生薑汁三度炙乾四兩  
枳殼去穰炒微黃一兩半

右搗篩每服三錢七生薑一分拍碎水一盞煎至七分

去滓溫服日三

救命散治霍亂腹脹煩悶不止手足厥逆

地龍自死者或踏  
死者培乾

蛤粉

右等分搗羅為細末每服二錢蜜水調下

吳茱萸散治霍亂吐逆不利心腹脹痛脚轉筋手足冷

吳茱萸

半兩湯浸七次焙乾微炒去粗皮生薑汁令黃

厚朴

去粗皮生薑汁令黃

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服

治霍亂心腹脹痛

取摘木樟木大如掌者削之以水三升煮三沸去滓  
令濯之

治霍亂心腹脹滿氣未得吐下

取小藉一升咬咀以水三升煮取一升頓服一方用  
小蒜五升煖湯潰取汁服之

又方

取桂心屑半升以飯飲二升和之盡服忌生葱

又方

取人血合丹如梧子大二丸

又方

取竹瀝飲少許赤嘉

又方

取賣解家机上垢如鷄子大溫酒服之瘥

又方

取生蘇汁頓服乾蘇煮服蓼葉亦佳蓼二升水五升

煮服之

靈脂丸治大人小兒吐瀉腹脹胸膈痞悶

五靈脂 青皮 陳皮 硫黃 芒硝以上各等分

右將硫黃芒硝於銚子內以文武火鎔開用匙刮聚  
自然結成硝取出研碎與前三藥同為末麵糊為丸  
如菉豆大小兒麻子黃米大每服二十九量虛實加  
減米飲湯下無時服

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

用鹽二升以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方

出肘後方

服乾薑屑三方寸匕

生熱湯

出本草

治腹脹欲為霍亂

以生熱湯熬鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈

主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調

以蓼蕎煮服之

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下並轉筋

出肘後方

燒梔子二七枚研末熱水調服

治霍亂心腹脹

出本草

用蔓菁子水煮飲之

治霍亂心腹脹滿宿食不消常吐酸臭水

用樟木酒煮服之

急無藥處可以用之江東船上多用樟木研取屑用之味辛烈者佳

霍亂昏塞下痢

附論

夫霍亂昏塞下痢者其人肝腎久虛陽氣不足因風冷

之氣客於三焦傳於胃府水穀不化清濁相干吐痢不止致令其氣暴陰陽離守神識不明大便遺痢無所覺知

方

訶梨勒丸

出聖濟總錄

治脾胃氣冷霍亂下痢不自知

訶梨勒皮

黃連

去鬚

鍾乳粉

五倍子

白朮

燒汁

盡各一兩

縮砂

去皮去粗皮

厚朴

去薑汁炙

樗皮

當歸

切焙

酸石榴

皮

各二兩

木瓜

切一兩半

胡椒

半兩

乾薑

炮一兩

肉豆蔻

去殼炮五兩

杖甘草炙 橡實各一 陳橘皮 湯浸去皮  
兩 培炒二兩

右為細散先醋煎艾葉一兩去滓取汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九煎棗湯下不計時候溫服一方有烏梅肉無甘草

吳茱萸餅

出聖濟總錄

治霍亂昏塞下痢

吳茱萸

湯浸培炒

厚朴去粗皮  
薑汁炙

陳橘皮 湯浸去白  
培切炒

人參

一兩高良薑

胡椒各一兩

一兩

木瓜切香薷各一兩

一兩烏牛潤

右先以八味為細末先將烏牛溺捻作餅子暴乾臨用時炙燥再為細末每服二錢以水一盞煎至七分溫服

黃連湯出聖濟總錄 治霍亂昏塞下痢或病後瀉黃白無度

腹中虛痛

黃連

去鬚四兩

黃蘖

去粗皮

當歸

切焙

厚朴

去粗皮薑汁炙

乾薑

各四兩

三兩

地榆

阿膠

炙燥

石榴皮

各四兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

不拘時

茯苓安心湯

出聖濟  
總錄

治霍亂虛寒精神不守泄痢不止

語聲不出

白茯苓

去黑皮

人參

乾薑

炮桂去粗皮

桂

去心各一兩半

遠志

去心各一兩半

甘草

炙二兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服日

三不拘時

龍骨湯

出聖濟  
總錄

治霍亂心下手足逆昏塞不自知

龍骨 烧附子

炮製去皮  
臍各一兩

人參

乾薑

甘草

炙各一兩

半

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫

服日三

吳茱萸散

出聖濟  
總錄

治霍亂暴痢昏塞不自知

吳茱萸

湯浸培炒  
一兩

陳橘皮

湯浸去白  
培二兩

右為細散每服三錢匕米飲調下不拘時

乾濕霍亂

附論

夫霍亂者多吐痢也乾霍亂者冷氣搏於胃飲食不消但腹滿悶亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐痢名為乾霍亂也

方

厚朴湯

出聖濟總錄

治乾霍亂

厚朴

去粗皮生薑汁炙三分

大黃

剉炒二兩枳殼

去穰炒

朴硝

枳

榔

高良薑

各三分

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

人參湯

出聖濟  
總錄

治乾霍亂

人參 厚朴

去粗皮  
炙各一兩  
薑汁

高良薑 桂

去粗皮  
各半兩

白茯苓

去黑皮  
一兩

甘草

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓不拘時溫服

活命飲

出聖濟  
總錄

治脾虛損霍亂不止瀉腹脹如皺心胸

痰壅

鹽合 生薑

半兩  
兩

甘草

炙一  
分

葛根

半兩

丁香

七  
粒

右細剉用童便一盞半煎一盞去渣分二溫服

乾薑丸

出聖惠方

治乾霍亂心腹疼痛氣短急四體悶不吐

痢燒難忍此名乾霍亂斯須不治即殺人

乾薑

三分炮製剉

川大黃

一兩碎微炒

巴豆

三枚去皮心研紙包壓去油

吳茱萸

一兩湯浸七次焙乾炒

右搗羅為末入巴豆令勻煉蜜和搗一二百下丸如桐子大每服以粥飲子十五丸須臾以熱茶投當利即瘥

冬葵子湯治乾霍亂大小便不通手足心俱熱悶亂

冬葵子 滑石 碎  
香薷 擇各二兩

乾木瓜 細切去皮  
一兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服  
大小便通利心中快立瘥日四五服

大黃九

出聖濟  
總錄

治乾霍亂不吐痢

大黃

剉炒  
一兩

乾薑

炮半兩

桂

去粗皮  
三分

巴豆

十四枚去皮  
心膜炒研

右先搗前三味為細末與巴豆同研令勻煉蜜丸如梧桐子大每服五丸至七丸溫分下服久未動更服

三丸以溫粥飲一盞投之取利為效

肉桂湯

出聖惠方

治乾霍亂衆醫無效

肉桂

末一兩

诃梨勒皮

末一分

巴豆

一枚去皮心研紙裏壓去油

右除桂先將二味綿裹內一中盞湯浸良久搗下黃  
汁更入酒一合下桂末令勻頓服須臾得吐痢大效

木香散

出聖惠方

療霍亂無間乾濕冷熱不止宿食不消煩

亂腹痛

青木香

長寸半

高良薑

二兩

豆蔻子

二枚

右㕮咀以水一大升煮取半升頓服之則定一方入  
生薑半分棗三枚同煎服不拘時

備急丸

出聖惠方

療乾濕霍亂凡乾霍死者多濕霍死者少

俱由飲食不節將息失宜霍之狀心腹脹滿攬刺疼  
痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不  
通求吐不出求痢不下須臾不救便有性命之慮濕  
霍之狀腹亦攬痛諸候有與乾同但吐痢無限此病  
始得有與天行相似者亦令頭痛骨肉酸楚手足逆

冷四體發熱乾霍大小便不通煩悶欲死宜急與巴豆等三味丸服之

巴豆

一百枚熬令熟去心皮

乾薑

三兩桂氏以芒硝五兩代換千金同

大黃

五兩

右藥先搗乾薑大黃為散復別搗巴豆如膏和前二味同搗令調細細下蜜堪丸出之以飲下三丸如梧桐子大服訖數揀肚令轉動送下利良久不覺則以熱飲投之又良久不利更服一丸須臾當利利後好將息食飲寒溫以意取進如渴者煮漿水粥少少喫

之忌野猪肉蘆筍等物

高良薑散療濕霍亂吐痢無限宜合高良薑等三味服

之

高良薑

三兩

豆蔻子

二枝

桂心

二兩

右藥切以水四升煮取一升去滓細細啜之亦有於  
此方加乾薑人參二物忌生葱

治濕霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷

出聖惠方

用烏牛屎二兩以水二升煮沸絞濾頓服黃牛犁牛

屎亦佳無牛處乾者亦好用

又方

壁土一把薑一大兩碎之以水一大升煎半升熱服

鹽湯

出金方

治忽然心腹脹滿痞刺痛疼蟲蟲毒煩惱欲吐

不吐欲痢不痢狀若神靈所附須刻之間便至悶絕

亦涉三因或臟虛或腸胃素實故吐痢不行及乾霍

亂宿食不消積冷心腹煩滿惡氣

用極鹹鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不

吐更服吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為易舍淺近鄙而不用守死而已凡有此痛即先用之續以理中湯倍加橘紅與之或藿香正氣散官桂茯苓煨枳殼就吞蘇合香丸妙一方用童子小便一用枳殼散調下

薑鹽飲出直指方治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹絞痛手足厥冷治之

鹽半兩生薑半兩

切

右同炒令色變以水一碗煎熟溫服甚者加童子小便一盞

陳橘皮湯

出聖濟總錄

治乾霍亂腹脹滿不吐痢心胸悶

亂不可忍

陳橘皮

湯浸去白  
焙三兩

蜀椒

去目并閉口炒四十粒

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓溫服不拘時

二勝散

出聖濟總錄

治乾霍亂不吐不痢令人昏冒煩亂

氣短上下隔塞冷汗自出

訶梨勒皮 乾薑

成塊者各二兩

右不搗碎同用水二升於銚子內煎水盡為度取出  
重細切焙乾搗羅散每服二錢匕陳米飲調下

枳榔湯

出聖濟總錄

治霍亂上氣衝急欲悶絕大小便不通

用枳榔七枚剉搗篩每服五錢以水一盞童子小便

半盞煎至一盞去滓溫服日三

治乾霍亂不吐不下方

用丁香四十枚以熱湯一升和頓服不瘥更作服

治乾霍亂不吐不痢煩悶不知所為

出聖惠方

用巴豆一粒去皮心以熱水研服之當快利三兩行

以漿水粥止立定

紫蘇子丸

出聖濟總錄

治乾霍亂

方見本門霍亂逆吐類

木香散

一名桔梗散

治乾霍亂不吐不瀉但腹脹滿或疼痛

方見本門霍亂心腹脹類

水蓼飲

一名香薷湯

治乾霍亂不吐痢四肢煩身冷汗出

方見

本門霍亂

煩渴類

又有乾霍亂一證不吐不瀉只是心腹絞痛自汗如流

須臾悶絕

出仁好方

右以鹽一大匙炒黃色用湯泡四五碗入童子小便一碗灌令喫盡須是一頓盡方可却以雞羽掃喉咽則大吐鹽湯隨出不害則愈唐柳州云元和十一年十月得乾霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通

如霍亂俗名攬腸沙豆鹽湯下吐以羽刷咽中鹽湯能吐鹽毒鬼飲又飲艾湯又丁香末熱酒下

治上吐下痢者為濕霍亂

出本草

以黃牛屎半升水一升煮三兩沸將牛屎濾過取汁服半升則止牛子屎亦得

治霍亂不吐

出本草

用白梁米粉五金水一升合之頓服如粥食

中惡霍亂

附論

夫中惡霍亂者邪內干正氣為暴使胃中食物不化氣道痞結不得宣通令人心腹卒痛吐痢煩悶甚有精神冒昧靡所知識此得之鬼氣所作也

方

十香丸

出聖濟  
總錄

治霍亂中惡不識人心痛腹脹不思飲食

丁香 蘇合香

白檀香 沉香 木香

莎草根

炮毛去

白术

炒高良薑

安息香

研麝香研薰、陸香研

丹砂 研龍腦

研各半兩

草撥

訶梨勒

煨去皮

犀角

鏤厚屑

朴

去粗皮  
炙各一兩

右除別研外為細末與別研者藥同令勻煉蜜丸如

梧桐子大每服五丸溫酒下老少加減服之甚者溫

酒研下收貯於甕盒中日四五服以瘥為度

桃枝湯

出聖濟總錄

治中惡霍亂心痛胸膈疔瘍喘惡

向東桃枝白皮

一握

丹砂

碎一兩

梔子仁

十四枚

當歸

培

附子

炮製去皮臍

去一兩

吳茱萸

淘炒各一兩

桂

去粗皮各三兩

右剉如麻豆大每服四錢匕水二盞生薑三片煎至一盞去滓溫服日三夜一

木香散

出聖濟  
總錄

治中惡霍亂心腹痛煩悶

木香

炮  
三分

枳榔

剉一兩

青橘皮

湯浸去  
白穰

桂皮

去粗

桃仁

去尖皮  
仁炒研  
雙分

人參

各半兩

右為細末每服二錢七溫酒調下不拘時

白朮湯

出聖濟  
總錄

治中惡霍亂吐痢手足麻痺或轉筋

白朮

剉木瓜  
切焙

人參

去穰  
各兩

甘草

炙

乾薑

炮各  
半兩

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘同  
煎七分去滓溫服不拘時

橘皮湯

出聖濟  
總錄

中惡霍亂吐痢心煩

陳橘皮

湯浸去  
白穰

木瓜

切去  
桂皮

草豆蔻

去粗  
皮甘草

兩一

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

丹砂丸

出聖濟  
總錄

治中惡霍亂垂死

丹砂

研半分

附子

炮製去皮臍一分

雄黃

二豆為末

許研

右以巴豆七粒去心皮別研出油後入諸藥末研令極勻煉蜜丸如麻子大每服三丸米飲下若下痢未止加三丸至五丸與少冷粥食之即定

麝香散

出聖濟總錄半錢

治中惡霍亂心腹刺痛去惡氣

麝香

研半分

犀角

銷屑

木香

各半兩

右為細散空心熱水調一錢日三

麝香方

出聖濟總錄半錢

治中惡霍亂

用麝香一錢細研和醋半盞調二服即瘥

又方

用沉香主心腹痛霍亂中惡邪鬼亡精失神並宜酒  
煮服之

主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痙攣毒癰疽

惡赤白遊疹

出海藥  
明本門

用海桐根以酒及水磨服傳之亦佳

治霍亂中惡

用海桐皮煮汁服之

霍亂煩渴

附論

夫上焦如霧言五臟津液之所薰蒸其氣潤澤故能分佈令諸脉也今霍亂吐之人重亡津液則臟腑不和上焦熱津液不足故因霍亂而煩渴也煩渴不止則引飲引飲則利

方

藿香湯

出聖濟總錄

治霍亂吐逆冷熱不調心膈煩悶咽

乾多渴

藿香葉

三  
分

枇杷葉

去毛

陳橘皮

浸去

白焙

各半厚

朴

去粗皮生薑  
汁炙二兩

白茅根

麥門冬

去心

乾木瓜

各一兩

甘草

各二兩半

右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓早晚食前溫服

麥門冬湯

出危氏方

治霍亂已愈煩熱不解多渴小便不利

麥門冬

去心

橘皮

去白

半夏

湯泡

七次

白茯苓

去皮

白术

各一兩

人參 甘草 炙各半兩 小麥

半兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片烏梅少許煎至八分去滓溫服不拘時止渴湯治霍亂煩渴

甘草 人參 麥門冬 去心 茶荳子 桔梗 瓜蔞根

乾葛 澤瀉 各等分

右為細末蜜湯調下二錢

人參散 出聖惠方 治霍亂卒吐下痢不禁脉數煩渴

人參去蘆頭

白术 白茯苓 葛根 剁陳橘皮 湯浸

穢麥門冬去心各一兩

甘草半兩微赤剉

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服

木瓜湯

出聖濟總錄

治霍亂煩渴喘促無力食即嘔吐

木瓜一兩

人參三分

木香 桃榔 生薑各半兩

黑豆炒合

甘草

右剉如麻豆每服五錢水一中盞半煎取一盞去滓

早晚食前溫服

肉豆蔻丸

出聖濟總錄

治霍亂吐瀉渴燥煩悶不止

肉豆蔻

去殼炮

丁香

甘草

炙

陳橘皮

湯浸白焙

高良

薑

藿香葉

各半兩

右為細末用棗肉丸如梧桐子大每服三十九溫生  
薑米飲下不拘時

麥門冬湯

出聖濟總錄

治霍亂吐瀉不止渴甚

麥門冬

去心培

瓜萎仁

陳橘皮

湯浸去白培半兩

人參

半兩

厚朴去粗皮薑汁炙一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日

三

人參湯出聖濟總錄治霍亂吐痢渴燥不止

人參三分葛根剉白朮桔梗去蘆頭剉炒各半赤茯苓去黑皮各

兩

右搗篩每服三錢匕漿水一盞煎至七分去滓溫服

日三

梔子散

出聖惠方

治霍亂吐下後煩渴

梔子仁

半兩  
生敲  
不搗

陳橘皮

三分  
湯浸  
去白  
穰焙

右搗篩為散分為三服每服以水一中盞入生薑半

分去滓溫服

麥門冬散

出聖惠方

治霍亂吐瀉煩渴心燥

麥門冬

去心

生薑

梁米

各半兩

桑葉

一兩

右細剉以水一大盞煎至六分去滓入蜜半合更煎  
三兩沸放令溫時服之

石膏散

出聖惠方

治霍亂煩渴頭痛

石膏

二兩

麥門冬

一兩去心

甘草

三分炙微赤剉

白茯苓

一兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

一百粒竹葉二十七片煎至六分去滓不計時候溫

服

白茯苓散

出聖惠方

治霍亂心煩渴

白茯苓

一兩

大棗

十枚去核

麥門冬

半兩去心

右細剉分為五服以水一中盞煎至六分去滓溫頓

服

木爪散

出聖惠方

治霍亂吐痢煩渴不止

木爪枝

一桂心

二麥門冬

一兩去心

右細剉每服半兩以水一大盞煎至五分不計時候

溫服

青竹茹湯

出聖濟總錄

治霍亂津液少渴甚

青竹茹子

一鷄大參兩

半烏梅二枚去核

右搗篩水三盞煎取一盞去滓溫服分三服不拘時

蘆葉湯出聖惠方治霍亂吐瀉煩渴心燥

蘆葉一兩糲半兩

右以水一大盞入竹茹一分煎至六分後入蜜半合生薑汁半合更煎三兩沸去滓放溫時時呷之

草豆蔻湯

出聖濟總錄

治霍亂心煩渴吐瀉不下食

草豆蔻去皮一兩黃連去鬚一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞烏豆五十粒生薑三片煎至七分去滓溫服

香薷湯

出聖濟  
總錄

治霍亂吐痢四肢煩疼冷汗出多渴亦治

乾霍亂及轉筋者

一名水  
蓼飲

香薷

二兩  
蓼子一兩

右搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日

三

薑 蘭 飲

出聖濟  
總錄

治霍亂吐下止兼渴

生薑

一兩  
洗切

生薑

一兩  
洗切

右研絞取汁分三服不拘時

木瓜湯

出聖濟  
總錄

治霍亂吐痢煩渴不止

木瓜

一枚無生者  
乾者亦得  
桂去粗皮  
二兩

右㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分  
去滓溫服一方以豆蔻代桂

厚朴桂心湯療霍亂復渴口乾腹痛不止病源云霍亂  
而渴者由大吐逆上焦虛氣不調理氣乘於心則煩  
悶也大痢則津液竭津液竭則臟燥臟燥則渴也煩  
渴不止則引飲引飲則痢亦不止

厚朴  
炙桂心

四兩

三兩

右切以水四升煮取一升二合絞去滓分六合細細飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之忌生葱

糯米飯

出聖惠方

治霍亂渴甚不吐卒噦心煩渴不止卧不

安

用糯米二升淘取泔飲之即定研米粉取白汁飲之又以水煮澄清稍溫服黃粱米亦得一方研白米汁用

蜜調

療霍亂不吐不下胸腹脹滿方

出聖惠方

用木瓜一枚切以水四升煮取二升細細飲盡更作吐不止者亦瘥若渴惟飲此湯佳枝莖亦可用此湯令取吐一方煮木瓜汁服之治霍亂轉筋

人參散

出經驗良方

治吐逆及瀉後除煩渴常服調中和氣

人參

白茯苓

白乾葛

各二兩

藿香

木香

甘草

嫩黃耆

去蘆各二兩半

右剉散每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服瀉後

渴甚者每服加滑石末二錢同煎一方無嫩黃者

茯苓澤瀉湯出危氏方治霍亂吐痢後煩渴欲飲水

茯苓八兩澤瀉四兩甘草炙二兩桂心各二兩白朮二兩

右剉散每服四大錢水一盞薑三片煎七分去滓食

前服一方有小麥五兩

豆蔻丸出仁存方治吐痢不定煩躁渴

肉豆蔻炮丁香 陳皮各半兩良薑 薤香各一

右為末棗肉丸如梧桐子大每服二十九加至三十

丸薑汁米飲送下

香薷湯

一名香  
薷散

治吐瀉霍亂煩渴腹痛或轉筋體冷脉

微

方見本門霍  
亂吐痢類

葛根散

出指  
南方

治霍亂有熱煩渴

乾薑

丁香

藿香

甘草

赤茯苓

枇杷葉

分等

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服

五苓散

出和  
宣方

治伏暑煩渴引飲吐痢

澤瀉

二兩半

肉桂

一兩半

白术

各一兩

猪苓

各一兩半

赤茯苓

右末小麥煎湯

治霍亂吐下後水渴多飲則殺人方

出肘後方

用黃米五升水一斗煮之令得三升澄清稍稍飲之

莫飲餘物也

主霍亂後虛渴煩悶不能食

出本草

以藕實生食之

治霍亂煩躁

出本草

以黃粱米粉半升水一升半和絞如白飲頻服糯米亦得

普濟方卷二百二

欽定四庫全書

普濟方卷二百三

明 周王朱橚 撰

霍亂門

霍亂心煩

附論

夫霍亂而心煩者由大吐大痢腑臟氣暴極大吐者胃氣逆痢者腸虛也大吐大痢者氣逆則甚三焦不理五臟未和冷搏於氣逆上乘心故心躁亦有未經利心煩者是冷氣入於腸胃水穀不消蘊瘀不宣氣亦逆上故亦

煩也霍亂心煩者緣心下有水水害心火其氣不宣故  
令人心煩悶亂而不安也蓋胃土氣衰不能運化飲食  
氣鬱於中使清濁不分陰陽干擾故霍亂而神情煩躁  
也

方

白豆蔻丸

出聖濟  
總錄

治霍亂後脾胃尚虛穀氣未實津液

內燥令人煩躁睡卧不安

白豆蔻

去皮

陳橘皮

去白皮

厚朴

去粗皮

生薑

去皮

草豆蔻

去皮

桂

去粗  
皮

白术

炒去皮  
乾木瓜

人參

半夏

湯洗去滑七  
次以上各二

兩

縮砂蜜

去皮

高良薑

炒甘草

炙剉陳麴

炒麥蘖

香

乾薑

炮皮

白茯苓

去黑皮上各一

兩桃仁

四兩去皮尖雙仁炒

右搗研為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九至  
四十九空心米飲下

人參散

出聖惠方

治霍亂吐痢汗出心煩

人參

去蘆頭

茯神

麥門冬

去心各三分

白朮

黃耆

甘草

赤剉炙微剉

乾薑

炮剉製

桂心

以上各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫頓服

蘆根散治霍亂心煩乾嘔

蘆根剉半兩人參去蘆頭半兩陳橘皮拭去白穰培泡以上各一兩杞杷葉毛去微黃麥門冬去心半兩木瓜二兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫頓服之

麥門冬湯一名人參散出聖惠方治霍亂心煩坐卧不安

麥門冬

去心培

茯神

去木

人參

陳橘皮

湯浸去白焙

甘草

炙各一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分小麥五十粒竹葉十片煎至七分去滓溫服不拘時

亂髮湯

出聖惠方

治霍亂吐痢後心煩

亂髮

一箇如鷄子大燒存性

吳茱萸

湯浸培乾三分

甘草

炙各一兩

人參

各一兩

右搗篩每服五錢水一盞酒半盞煎至八分去滓溫

服日三服之

蘆根飲

出聖惠方

治霍亂乾嘔心煩

蘆根

剉炙一兩一分

人參

水萍紫者

培乾把杞葉拭去毛

各一兩

右搗篩每服五錢匕水一盞酒半盞薤白四顆拍碎

煎至八分去滓溫服日三一方無水萍

生薑飲

出聖惠方

治霍亂吐瀉心煩悶亂

生薑

汁一合

蜜一合

糯米一合

以新汲水淘令並研如粉

右以新汲水一大盞相和時時服一合

又方

甘草

一分  
微赤剉

槐葉

桑葉

各一  
兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

香豉湯

出聖濟  
總錄

治霍亂心中煩悶

豉

七合  
綿裹

梔子仁

厚朴

去粗皮  
黃連  
各三兩

右㕮咀如麻豆大每服六錢水二盞煎至一盞去滓

溫服

治霍亂心煩躁

出聖  
惠方

棗

枝  
十三

生薑

剉  
二兩

右用水二大盞煎至一盞去滓分溫二服

又方

桂心

一分  
末

人參

半兩  
去  
蘆頭

右以水二大盞煎至七分去滓分溫二服

又方

出聖  
惠方

蘆根

半兩  
剉

麥門冬

一兩  
去心

右以水二大盞煎至一大盞去滓分溫二服

橘皮湯

出聖濟  
總錄

治霍亂吐後煩滿嘔逆

陳橘皮

湯浸去  
白焰

梔子

各二  
兩

右搗篩每服三錢入豉半合水一盞煎至七分去滓

溫服日三服

竹瀝飲

出聖濟  
總錄

治霍亂狂悶煩渴吐瀉無度氣欲絕者

淡竹瀝

一合以水二盞  
研去滓取汁用

右和勻頓服之

葱白大棗湯

出聖  
惠方

治霍亂後心煩卧不安席

葱白

二十莖  
去鬚

大棗

二十枚  
去核

右以水三盞煎取一盞半去滓分溫二服

治中熱霍亂暴痢心煩脉數欲得冷水者

出千金方

用新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服之  
治霍亂煩躁心腹脹痛

出十便良方

一方治不吐不痢胸膈

煩渴

用燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服

厚朴湯治霍亂心煩不止

方見本門霍亂心下痞逆類

桑葉飲

出聖惠方

治霍亂已吐痢心煩悶不止

用桑葉一大握切以水一盞煎至七分頓服立定

治霍亂煩悶

出草本

取向陽壁上土水煮服

治霍亂後胃氣逆

出草本

用苦苣菜生搗汁飲之雖冷甚益不可用熱服

霍亂後煩躁卧不安

夫霍亂後煩躁卧寐不安者胃虛餘勢未盡穀氣鬱蒸

津液內耗血氣散亂故煩躁不得安卧也當安其胃氣  
則病可愈

方

丁香白朮丸

出聖濟  
總錄

治霍亂煩躁不得安卧

丁香一兩

白朮

沈香剉各半

胡椒

肉豆蔻殼去

五味

子一分

二分 芎芢 白殼蠶各一

右為末研勻好酒煮木瓜一枚取肉丸如梧桐子大  
若患渴煎木瓜湯下十九若氣病溫酒下

神應散

出聖濟  
總錄

治霍亂後煩躁眠睡不安

白茯苓

去黑皮  
一分

丹砂

研  
硫黃

研各  
一錢

朴硝

二錢  
蛤粉  
三錢

半人參

一分

右搗羅為散每服一錢用芝麻水調下不計時候服  
木香湯

出聖濟  
總錄

治霍亂煩躁懊惱不得安卧

木香

乾木瓜

紫蘇

不去莖  
各一兩

草豆蔻

去皮  
一兩半

右搗節每服三錢水一盞入黑豆半合許生薑一棗  
大拍碎煎至七分去滓溫服日三

甘草湯出聖濟總錄 治霍亂躁不得息

甘草炙

湯洗七分

半夏次去滑

人參

陳橘皮

湯浸去白焙各二兩

右搗篩每服五錢水一盞半入豉半合生薑五片煎

至八分去滓溫服日三

枇杷葉

出聖濟總錄

治霍亂心煩懊不得安卧

枇杷葉

拭去毛一分

蘆根三分洗焙

人參一分

右搗篩每服五錢水一盞半薤白五十粒煎至一盞去滓溫服有頃再服

香薷飲

出聖惠方

治霍亂後胃氣虛不能安卧脹滿手足冷

香薷

一握生薑

三兩木瓜一枚

右細切研攪取自然汁空心頓服白米煮粥入藥汁

少鹽為味食之佳

橘皮湯

出聖濟總錄

治霍亂煩躁卧不安

陳橘皮

湯浸去白焙各三兩

人參

各三兩

右搗篩每服四錢水一盞半入生薑三片煎至八分

去滓溫服日三

橘薑湯出聖濟總錄 治霍亂後煩躁卧不安

陳橘皮湯浸去白培一兩 生薑二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入醋少許煎至一盞去

滓溫服之

豆薑湯出聖濟惠方 治霍亂後煩躁卧不安

大豆淘合 一升薑切半

右以酸漿水三盞煎至一盞半去滓分溫二服

薑茶散出聖濟總錄 治霍亂後煩躁卧不安

乾薑炮為末一錢

炒二錢

好茶末一錢

右以水一盞先煎茶末令熟即調乾薑末服之

調胃乾薑散

出肘後方

治霍亂吐痢後煩躁卧不安心腹脹痛

痛

用乾薑炮一兩或用生薑為細末每服二錢七溫粥

飲調下熱酒調服亦可以水煮沸頓服愈

竹葉湯

出聖惠方

治霍亂痢後煩熱燥渴卧不安

用濃煮竹葉汁飲五六合佳

木瓜子方治霍亂後煩躁卧不安有生食氣急

用木瓜子不拘多少每服七粒微嚼破以溫水半盞

吞之瘥

既濟湯治霍亂後虛煩不得眠

人參

甘草

淡竹葉

炙各

麥門冬

去心四兩

附子

炮半兩

半夏

湯洗五錢

右㕮咀每服四錢生薑五片粳米百餘粒水煎空心

服

治霍亂後煩躁卧不安穩

出本草

以葱二十莖大棗十枚以水三升煎取二升分服

治霍亂腹中不安消穀理胃氣溫中除邪疫毒氣溫脾

胃

用小蒜煎湯服之

霍亂逆滿

附論

夫霍亂逆滿雖本於飲食不消亦或痰水積聚滿逆不行皆氣分之痞也證胸膈窒塞脇脹滿或不得吐或

吐而不止治法順其升降則愈

厚朴丸出聖濟總錄 治腑臟不調內寒外熱脾胃氣冷宿食

不消乍秘乍利不時霍亂逆滿

厚朴去粗皮生薑汁炙 赤石脂各一兩半 白朮 乾薑炮 麥蘖

炮人參 白茯苓去黑皮 當歸切培 橘皮湯浸白焙 甘草

剉炙 詞梨勒煨取汁各一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大空心米飲下二

十九至三十九

柴胡湯

出聖濟總錄

治霍亂逆滿兩脅下妨悶嘔不下食

柴胡

去粗皮  
苗

厚朴

去粗皮  
薑汁炙

白茯苓

去黑皮  
各三兩

陳橘皮

湯浸去白

培人參

訶梨勒

去皮  
梗

桔梗

去蘆頭炒各一兩半

紫蘇葉甘草

草

炙各一分

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大柏碎煎至一盞去滓溫服日三

蘇桂丸

出聖濟總錄

治霍亂逆滿氣痞胸膈咽寒妨悶食不

消腹脇虛脹腸鳴刺痛

紫蘇葉

桂

去粗皮

陳橘皮

湯浸去白

人參

白朮各一兩

甘草

炙半兩

高良薑

三分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸溫酒下來飲亦得如緩急無湯酒細嚼藥蘸津

薰香散

出聖濟總錄

治霍亂逆滿開胃口

薰香葉

一兩

培

火去核

訶黎勒

十枚

人參

丁香各半

半糯

米

一百粒

甘草

一兩

分

石蓮心

二百個如無以白

豆蔻半兩代之

右為細散每服一錢用煨和皮生薑一塊棗二枚去

核煎湯調下早晚食前服

紫蘇子丸

出聖惠方

治霍亂逆滿胸膈噎悶飲食不消乾嘔

不吐者

紫蘇

一方無莖葉

陳橘皮

湯浸去白皮培各二兩

桂

去粗皮

高良薑

人參

各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九米飲下  
不拘時食生冷過多欲作霍亂者含化蘸汁氣滿惡  
心欲吐不吐乾嘔者溫酒下

麥門冬湯

出聖濟  
總錄

治霍亂逆滿不下食食即吐出煩卧

不安

麥門冬

去心  
三兩

茅根

剉焙  
五兩

甘草

炙剉  
各一兩

人參

各一兩

右搗篩每服五錢水一盞半入竹茹彈子大一塊生

薑一棗大拍碎煎至一盞去滓溫服日三

麥門冬人參湯

出聖濟  
總錄

治霍亂逆滿風邪熱氣衝心心

悶氣短吐不下食

麥門冬

去心  
二兩

人參

三兩

陳橘皮

湯浸去白  
焙

羚羊角

镑屑

各一  
兩

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑七片煎至一盞去滓溫服日三

半夏湯

出聖濟  
總錄

治霍亂心下逆滿吐逆冒悶

半夏

湯浸去滑  
七次

四兩厚朴去粗皮  
薑汁炙二兩

赤茯苓

去黑皮  
二兩

右搗篩每服五錢水一盞半入生薑一束大拍碎煎至一盞去滓溫服不拘時

豆蔻湯

出聖濟  
總錄

治霍亂逆滿不下食或腹中氣妨悶

草豆蔻仁半兩 人參一兩 甘草炙三分

右搗篩每服五錢水一盞入生薑一棗大拍碎煎至

半盞去滓溫服

半夏人參湯出聖濟總錄 治霍亂逆滿心下痞塞

半夏為末薑汁 人參各三分

右搗篩每服三錢水一盞入白蜜一匙煎至七分去滓溫服日三不拘時

霍亂乾嘔附論

夫霍亂乾嘔者胃氣逆也本於吐痢之後脾胃俱虛三焦不理氣時遂上故但嘔逆而無所出即謂之乾嘔若遇冷傷胃氣則變喰也

方

白术散

出聖惠方

治霍亂胃氣虛乾嘔不止

白术 霍香 人參

去蘆頭各一兩

枇杷葉

拭去毛炙微黃

高良

薑 草豆蔻

去皮各半兩

右搗羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不拘時候溫服

薤白人參散

出聖惠方

治霍亂乾嘔不止

薤白人參

去蘆頭

白术 香菜 厚朴

去粗皮塗生薑汁矣

右細剉和勻每服半錢以水一中盞入生薑半分棗

三枚煎至六分去滓不計時候溫服

生薑飲

出千金方

治霍亂引飲飲輒乾嘔

用生薑五兩咬咀水五升煮取二升半分二服又高

良薑佳

薤白湯

出聖濟  
總錄

治霍亂乾嘔不止

用薤白一握細切水三盞煎一盞半溫分二服去滓

不拘時

木瓜湯

出聖濟  
總錄

治霍亂乾嘔

木瓜

乾者去  
穰一枝

厚朴

去粗皮薑  
汁炙半兩

乾薑

炮兩

人參

一兩  
一錢

右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓熱服

不拘時

乾薑人參湯

出聖  
惠方

治霍亂乾嘔

乾薑 人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸去白穰培各二兩

右細剉和勻每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

不計時候溫服

又方

吳茱萸

半兩湯浸七次培乾微炒

乾薑

半兩炮製剉

人參

二兩去蘆頭

右搗羅為散每服三錢以水一中盞煎至七分去滓

不計時候溫服

生薑香菜湯

出聖惠方

治霍亂引飲飲即乾嘔

生薑

切香菜

陳橘皮

湯浸去白穰  
焙各一兩

右以水二大盞煎至一盞去滓分二服

薤白湯

出聖惠方

治霍亂乾嘔不息

薤白

一握

生薑

半兩

陳橘皮

三分去白穰焙

右以水二大盞煎至七分去滓分溫二服

人參湯

出聖濟總錄

治霍亂乾嘔

人參

炙甘草

陳橘皮

湯浸去白  
焙各二兩

右搗篩每服三錢匕水一盞葱白二寸煎至六分溫

服

木香湯

出聖濟  
總錄

治霍亂乾嘔不止

木香

乾木瓜

去穰一兩

紫蘇

莖二兩

右搗篩每服三錢匕水一盞半入黑豆一百粒生薑五片煎至一盞去滓溫服良久再服

丁香人參散

出聖  
惠方

治霍亂胃氣虛乾嘔不止

丁香

人參

一分去  
蘆頭

右搗羅細為散分為二服每服以牛乳三合煎三五

沸去滓溫服如人行五里再服

又方

出聖惠方

生薑汁

半合

牛乳

一合

右煎一兩沸頓服之

吳茱萸湯

出聖惠方

治霍亂乾嘔不止

吳茱萸

湯浸焙乾炒

乾薑

炮各一兩

右搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服  
治霍亂乾嘔不息

出本草

取薤一虎口以水三升煮取半升頓服不過三服

霍亂嘔噦

夫霍亂嘔噦者陰陽冷熱不調清濁相干胃氣不和風  
冷加之故嘔吐不止則噦昔人謂嘔噦發下焦之間是  
也此甚於嘔吐治宜降氣於下令上下通達升降無礙  
則病可愈

方

人參霍香散

出御藥院方

治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲

食化痰益氣背治

人參

白茯苓

青皮

去皮白乾薑

炮杞杷葉

去毛半

夏

生薑

製各一兩

甘草

炎七次錢半

丁香

半兩藿香葉

厚朴

製各二兩

草豆蔻

六分去皮

右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓熱服不拘時一方有棗子煎

理中散

出千金方

治年老羸弱冷氣惡心飲食不化心腹急

短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗不止

麥門冬

乾薑

兩

各六

人參

白朮

甘草

兩

各五

子 茯苓

兩

三

右治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜丸如梧桐子大酒服二十九

當歸湯

出聖濟  
總錄

治霍亂嘔噦手足冷

當歸

切  
培

桂

去粗皮

吳茱萸

湯浸  
培乾

細辛

去苗葉

木通

剉

甘草

炙  
一兩

乾薑

各炮

右搗篩每服五錢水一盞酒半盞大棗二枚煎至一

盞去滓溫服

豉湯療霍亂嘔噦氣厥不得喘息

豉

升半夏半兩洗

生薑二兩

人參一兩

柴胡二兩

甘草一兩

炙

右以水五升煮取二升半溫服七合忌羊肉鷄海藻

菘菜等半金方有桂心一兩

藿香吐液散治大人小兒諸嘔逆吐瀉或霍亂不安

丁香

錢桂府滑石四兩燒

藿香四錢

右為極細末每服二錢小兒半錢清米飲調下溫冷

服大人吐瀉水打臘茶調下二錢立效及治大人小兒傷寒瘧病前後嘔噦躁不得眠睡腹脹或小便赤澁大便瀉躁渴悶亂並宜服之

橘皮湯

出聖濟  
總錄

治霍亂嘔噦不止

陳橘皮

湯浸去白  
培二兩

甘草

炙兩

一  
枇杷葉

拭去毛  
炙二兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服如人行五七里

半夏湯

出聖濟  
總錄

治霍亂氣厥嘔噦不得息

半夏

湯浸七次  
培二兩

甘草

炙

人參

去蘆頭

前胡

桂皮各去粗

一  
兩

右搗篩每服五錢水一盞半生薑一分切破五十粒  
煎至七分去滓溫服

枳實湯

出聖濟  
總錄

治霍亂卒噦

用枳實去穰麸炒二兩搗篩每服三錢匕羊乳一盞

羊脂一彈子大煎至七分去滓熱服不拘時

治霍亂嘔逆及人常嘔吐

出本草

用蘇方木水煎服之破血可用酒煮為良

糯米粉飲

出聖濟總錄

治霍亂卒噦

用糯米粉一升每服三錢以井花水調下不拘時

生薑飲

出聖濟總錄

治霍亂嘔噦

用生薑二兩切以水三盞煎取一盞半去滓分溫三服不拘時候

治霍亂後惡心

出本草

以蒲萄根濃煮汁飲之

治吐逆霍亂

出本草

以椰子皮煮汁服之

霍亂轉筋

附論

夫霍亂轉筋緣風冷傷於三焦傳於脾胃得冷陽氣不得宣行致四肢筋絡不得舒緩此蓋中下不足其候胃膈不安經筋繫結腸肉緊痛反急於上蓋足陽明之經處膀胱之脉塞也然足陽明之脉塞者起冒下口循腹裏下至氣衝中而合以下髀闊抵伏免下入膝腹中

下循脾外廉足太陽之經其脉循髀外復廉下合膕中  
下貫膕內是動則病脾不可回轉膕如結膕如裂治宜  
調胃腑而溫膀胱之經如此則小水得宣寒冷自下胃  
腑溫和霍亂可愈轉筋之疾無由作也

方

草豆蔻散

出聖惠方

治霍亂吐瀉後轉筋

草豆蔻

去皮

高良薑

剉

丁香

白术

人參

去頭蘆縮

砂

皮

陳橘皮

湯浸去白穰

培各一兩

甘草

半兩

木瓜

二兩

乾者

右搗細羅為散不計時候以熱生薑湯調下二錢

桂苓白朮散

出濟生拔萃方

治冒暑濕熱吐瀉轉筋腹痛小兒

吐瀉驚風

桂 茯苓 白朮

各半兩

甘草 澤瀉 寒水石

各一

兩 滑石

二兩

右為細末熱湯調下三錢食後冷飲汲新水或生薑  
調下小兒一錢

治霍亂轉筋方

出聖惠方

附子

三兩炮去皮臍川椒三分

葱根鬚三握白礬兩

柳葉三握

桃

枝三握

生薑一兩以綿包繫在脚下

右以水三斗煎三十沸已來看冷暖淋多時為妙如急即加醋五升同煎

高良薑散

出聖惠方

治霍亂吐痢轉筋疼痛

高良薑三兩剉

甘草三分

半兩炙微赤剉

陳橘皮二兩湯浸

去白穰焙

木瓜

人參二兩剉

甘草一兩去蘆頭

厚朴一兩去粗皮搗

生薑汁炙令熱

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候熱服

雞舌香散

出聖惠方

治霍亂吐瀉多後心神煩躁及轉筋不

止

雞舌香

香菜各三分

木爪乾者

人參頭去蘆

陳橘皮浸湯

去白  
穰培

厚朴去粗皮

塗生薑汁

炙令香熟各一兩

桂心半兩

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服

雞白湯

出聖濟總錄

治霍亂轉筋悶絕欲死

雞糞白

一合  
熱

胡椒

二粒  
切焙

高良薑

十  
粗

桂皮

去粗  
白术

各  
各

木瓜

三分  
生薑

六分  
切焙

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半取八分去滓不  
計時候溫服

胡椒湯

出聖濟  
總錄

治霍亂轉筋

胡椒

吳茱萸

湯洗  
淨炒

肉豆蔻

去殼各  
半兩

人參

桂皮

去粗

乾薑

炮半兩

右搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服

厚朴湯

出聖濟總錄

治霍亂轉筋脉微而細此風寒客於胃

吐瀉不止

厚朴

去粗皮生薑汁炙五度各兩

乾木瓜

各二兩

高良薑

香薷

陳橘皮

湯浸去白焙

紫蘇子

各半兩

右搗篩每服五錢匕生薑三片鹽少許水一盞半煎至八分去滓溫服

懷香子散

出聖濟總錄

治霍亂吐瀉轉筋煩悶

懷香子

炒木香

陳橘皮

湯浸去白焙

人參

各半兩

菖蒲

切末

泄浸一日  
炒二兩 甘草一分

炙

右搗羅為散以冷米飲調下三錢如人行二里再服  
茱萸湯出聖惠方療霍亂轉筋不止及疼痛欲入腹者

吳茱萸一升甘草二兩炙乾薑三兩炮乳髮一兩吹汁洗却膩蓼子

一把桂心一兩

右切以水七升煮取二升二合絞去滓分溫三服每  
服相去如人行六七里忌生葱海藻菘菜生冷粘膩  
等一方無亂髮

高良薑散

出聖惠方

治霍亂吐痢轉筋疼痛引入腹者

高良薑

剉

各三兩

木爪

二兩乾者

肉豆蔻

二兩去殼

陳橘

皮

一兩湯浸去白焙

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎六分去滓不計時候熱服

半夏湯

出保命集方

治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏

茯苓

去皮

白术

各半兩

淡味桂

一錢半

甘草

二錢半

右為細末渴者涼水調下不渴者以微溫水服

薑附湯治中寒霍亂轉筋手足厥冷

方見本門  
寒暑類

附湯治霍亂轉筋

肉豆蔻湯

出聖濟  
總錄

治霍亂轉筋

肉豆蔻

去殼半兩

人參

二桂皮兩

吳茱萸

湯洗淨炒各一兩半

右搗篩每服三錢入生薑三片煎至六分去滓溫服之

附子湯

出聖濟  
總錄

治霍亂轉筋淋足方

附子

去皮剉一枚

葱

半斤拍碎

生椒

綿包切碎各一分

右以水一斗煎三兩沸入瓷盆中瀘去滓以鹽漿水

解之冷熱得所淋洗立效

神聖香薷飲

出聖濟總錄

治胃氣霍亂吐瀉轉筋腹痛

香薷穗

經霜者一兩半皮

厚朴

去粗皮二兩

黃連

去鬚各一兩培

白扁豆

右先用生薑汁四兩一處搗黃連厚朴二味令細炒成黑色入香薷扁豆二味都粗搗篩每服五錢水一盞酒一盞共煎至一盞瓷瓶內蠟紙封沉入井底候極冷併服二服至死者亦可救

糯米乾薑湯治霍亂轉筋

糯米

二兩  
為末

乾薑

炮製  
為末

甘草

生用  
為末

人參

二錢  
為末各

右拌勻冷水調下三錢不拘時服因腎氣虛吐瀉轉筋

筋木附湯和木瓜鹽煎服或理中湯亦煎服良

吳茱萸湯

出經驗  
良方

治乍感冷濕氣吐瀉轉筋

吳茱萸

四兩

木瓜

五兩

蒼朮

二兩

鹽

一兩

右酒醋各二盞同煮至乾為末白湯調服三錢

高良薑散

出聖惠方

治霍亂吐痢過多偏身筋轉及心腹痛

高良薑

半兩

桂

一兩

木瓜

三兩

乾者

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候熱服

木瓜湯

出聖惠方

治霍亂瀉後脚轉筋

木瓜

二兩

生薑

半兩

吳茱萸

一分

湯浸七次

焙乾微炒

右細剉以水二大盞煎至一盞二分去滓分為三服

頻服之

桂心湯

出聖惠方

治霍亂轉筋

桂心

木瓜

乾者

烏梅肉

各二兩

右搗篩為散每服半兩以水一大盞煎至五分去滓

溫服日三服

杜仲湯

出聖濟  
總錄

治霍亂轉筋

杜仲

去皮剉炒

桂

去粗皮一兩一分

甘草

炙剉一兩一分

右搗篩每服三錢生薑三片水一盞煎至六分去滓

溫服

木瓜湯

出聖濟  
總錄

治霍亂轉筋吐瀉不止

木瓜

切兩

青銅錢

四十文九文

烏梅

五枚碎炒拍

右以水二盞煎至一盞去滓分三服細呷

治霍亂轉筋不止

出聖惠方

高良薑

五兩

木瓜

二枝

川椒

二兩

右細剉以水二斗煎三二十沸去滓入醋一升於桶內看湯緊慢淋蘸水冷即止綿衣裹勿令傷冷  
胡椒丸治霍亂轉筋諸藥不除

胡椒

末一兩

木瓜

汁一升

硇砂

研極細一錢

右將木瓜汁浸椒砂二末攪勻熬令稠和如梧桐子

每服十九藿香湯下

棠梨枝散

出惠方

治吐痢不止兼轉筋

棠梨枝

一握木瓜

二兩

右細剉和勻分為四服每服一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服

木瓜粳米湯

出惠方

治霍亂吐瀉轉筋

木瓜

一枚大者四破

倉梗米一合

右以水二大盞煎至一盞半去滓時時溫一合服之

桂心半夏湯

出聖惠方

治霍亂轉筋

桂心一  
半夏一

兩 次去滑

兩 湯浸

右搗羅為末每煎生薑酒調下一錢如人行十里再  
服水服亦可

蜀椒湯

出聖濟總錄

治霍亂轉筋

蜀椒

去目并閉口者炒出汗一分

烏梅

一枚

右㕮咀以水二盞煎取一盞再入蜜一匙煎兩沸空

腹頓服

木瓜湯

出聖濟總錄

治霍亂轉筋

木瓜

汁一  
蓋

木香

末一  
錢

右以熱酒調下不拘時

治霍亂轉筋心痛鼻洪并兼及痢後人不分寒熱急痛

用艾葉和蠟并訶子燒薰艾葉絞汁煎服亦可

治脚轉筋疼痛癉急者

出肘後方

用松節一兩細剉如米粒乳香一錢拌藥用銀石器

內慢火炒令焦只留一分性出火毒研細每服一錢

至三錢木瓜酒調下凡是筋病皆治之

高良薑湯療霍亂吐痢轉筋欲入腹

高良薑 桂心各四兩

右切以水七升煮取二升去滓分三服如行四五里  
一服忌生冷生葱

治霍亂轉筋

出千金方

用舊木梳燒灰為末酒一匙調服永瘥

又方

出千金方

用車轂中脂塗足心下瘻

又方出本草

用柏葉搗裹脚上及煎汁淋之又用柏樹末煮酒淋之暖物裹脚瘥

又方

用楠木皮煎湯洗之

又方出本草

用皂角末吹一字入鼻得嚏即瘥

又方

用醋調南星末傅之及用老壁土佳

又方

出本草

用單繩頭尾燒灰和南星敷却以桑白皮縛敷處即止

桃仁煎

出聖惠方

治霍亂轉筋不止

用桃仁一百枚湯浸去皮尖雙仁研如麵以牛乳五升同入漿水於銅器內盛在重湯內煎瓷器中盛每服

空心溫酒調下兩匙良

生薑酒

出肘後方

治霍亂轉筋入腹欲死亦瀉痢不止

用生薑五兩切以無灰酒一升煎取八合頓服便瘥

雞白湯

出十便良方

治霍亂轉筋入腹或腹中如欲轉臂脚

直脉上下行微弦

用雞白糞炒一兩為粗末每服二錢以水七合煎三

沸去滓頓服勿令病人知之方熱酒調下

鹽搗方

出肘後方

治霍亂轉筋入腹

用鹽三合以水五升煎取三升浸青布搗轉筋上一方煮令熱薰灼再漬手足在胸肋者湯洗之入腹者倒擔病人令頭在下腹中平乃止劇者并陰縮者必死一方極鹹鹽湯於槽中暖漬之

苦酒絮裹足方

出肘後方

治霍亂轉筋

用苦酒一升半取衣絮內苦酒中煮令溫從轉筋處裹之一方浸毡裹轉筋上入以少粉尤佳又以綿纏膝下至足

裹足法

出本草

治轉筋入腹氣急煩渴

用木瓜二枚切破以水五升煮取三升取故青布浸  
湯中用裹轉筋上如無木瓜煎枝一兩亦得木瓜者  
汁服亦可一方無前藥口默念木瓜二字轉筋立愈  
治霍亂轉筋冒堂及臍下痙攣

用銅器並衣被襯後貯火熨之

又方

出本草

用故麻鞋底燒令熱投酒煮粟穀汁頓服之

治霍亂轉筋

出本草

用香薷煮飲服之無不瘥者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同煮飲服之

治霍亂轉筋垂死

用敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫服一方燒灰酒調服

又方

出肘後方

用蓼子一握香豉一升先切葉以水三升煮取二升

內豉汁中更煮至一升半分三服又與大麥麵相宜  
一方去香豉用酒煮服熏洗亦可水煮服佳

治轉筋

出本草

用米粉和醋裹脚又皂角灰主理氣下血

治霍亂轉筋腹痛

出本草

用煮淡竹葉湯五六升令灼上轉筋處

黃龍膝湯療舌強筋縮牽陰股引胸腹脹霍亂

用黃龍膝切一升

黃龍膝者擣木膝也斷以吹氣從裏面度者好也

以水四升

煮取八合為一服一劑不止更至一劑良驗或宿食  
不消霍亂或乾霍亂或吐痢不止或不吐痢並悉療  
之

療霍亂轉筋及四肢已冷強氣絕心上微暖者猶可救

之

用硃砂二兩熱研蠟三兩和之為丸待冷著火籠中  
如薰衣被厚覆勿令咽洩兼牀下著火令復微暖徹  
良久當汗則漸氣通便活忌生血物

療脚轉筋及渾身轉筋立効

用暖水稍熱於浴斛中坐浸須臾便瘥如湯沃雪  
又方治霍亂轉筋不止

用芥菜子不拘多少擂細水調傅臍上

又方治脚轉筋

用獨頭葱一個嚼一半於患處脚上猛擦一半用水  
送下一時立效

治轉筋方

出肘後方

用燒鐵令赤以灼踵白肉際上近後當從鐵以隨足  
為留停令成瘡兩足皆爾須臾間熱入腹不復轉筋  
便愈燒蝦尾用之即瘥

又方

出肘後方

用燒蜈蚣膏傅之即瘥

又方

出聖惠方

用橘皮二兩湯浸去白穰焙以醋漿水一大盞煎至  
五分去滓稍溫服

又方 出聖惠方

用釜底黑土末煖酒調下二錢頻服之

又方 出聖惠方

用釀醋和米粉摩塗轉筋處三二升煎五七沸看緊慢冷換之

治脚轉筋方 出聖惠方

用木瓜一兩以酒一升煎三七沸溫酒服之

治霍亂轉筋 出聖惠方

用木瓜櫑子煮汁食之與木瓜梢等餘無有益江外常為果食

人參散

出廣南四時攝生論

治霍亂吐逆及痢并脚轉筋

人參

去蘆頭

吳白术

木瓜

乾者各一兩

鹽

炮半兩

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

木瓜散

出聖惠方

治霍亂吐痢轉筋心膈煩悶

木瓜

乾者各一兩

桂心

各一兩

草豆蔻

半兩去皮

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時  
候溫服

火方

出聖惠方

扁豆

五十粒

木瓜

一隻

皂莢子

十枚

右炒黃為散以水一大盞煎至六分去滓頓服立效

治卒轉筋

出醫方集成

以香薷煮汁頓服半升止

治霍亂轉筋入腹無可奈何者

出醫方大成

用酢煮青布搗之冷即易

治蹙筋急

出草本

以白酒研桂塗之

治霍亂轉筋

用山梔子二枚燒灰為末水調服之

廣濟療轉筋方

出草本

取故綿入釀醋甌中蒸及熟用裹病人脚冷更易

又方

出聖惠方

治霍亂轉筋不止

右燒編薦索灰研三指撮以熱酒調服之瘥

治肝虛轉筋

出肘後方

用赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合去滓

溫分二服

治霍亂腳轉筋

出本草

用吳茱萸和艾以醋湯拌塗之妙

治霍亂轉筋

出本草

取蓼子一把去兩頭以水二升半煮升半頓服之

治霍亂轉筋

出本草

多取蓼煮湯及熱將脚浸之

治霍亂轉筋

出本草

以鹽一升水一升半作湯漬之

治霍亂轉筋

出本草

以檳榔煮汁飲之

主霍亂身冷轉筋

於床下取廁籌燒取熱氣徹上

治霍亂轉筋

出本草

以新研粟米清水和濾取汁服之腹胃冷者不宜多  
服

治霍亂手足轉筋

出本草

以銅器或瓦器盛熱湯熨之亦可令蹋器使腳底熱  
徹亦可以湯搗之冷則易用醋煮湯更良煮蓼子及  
吳茱萸汁亦好以綿絮及破毡擗脚湯淋之貴在熱  
徹

治脚轉筋無暴風通身冰冷如癱瘓者

出本草

取蠟半斤以舊帛絀絹並得約五六寸隨患大小加減濶狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒即便乘熱纏腳仍須當脚心便著襪裹脚得冷即更易之亦治心躁驚悸如覺是風毒無裹兩手心

治脚膝筋急痛

出本草

以木瓜煮令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即易一宿三五度熱裹便瘥煮木瓜時入一半酒同煮之

導引法

治轉筋不止者

出十  
金方

男子則以手挽其陰牽之女子則挽其乳分左右邊

灸霍亂法

附論

夫霍亂灸之或須未能立瘥終無死憂不可逆灸或但先腹痛或先下後吐當隨病狀灸之

灸法

治先心痛及先吐者

出肘  
後方

灸巨闕七壯在心下一寸不效更灸如前數外臺秘  
要療下痢不止上氣灸五十壯各巨闕

治吐下不禁兩手陰陽脉俱疾數者

灸心厭骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

治下痢者

灸穀門三七壯在臍傍二寸男左女右一名大腸募  
不瘥更灸如前數甲乙鍼經天樞一名長谿一名穀  
門夾臍兩傍各二寸陷者中

治下痢不止者

出肘後方

灸大都七壯在足大趾本節後內側白肉際

治先腹痛者

灸太倉二七壯穴在心厭下四寸臍上一寸不止更

灸前數

治苦繞臍痛急

灸臍下三寸二七壯名關元良

療霍亂心腹痛脹吐痢煩悶不止則宜灸之

令痛人覆卧伸兩臂膊著手則以小繩正當兩肘骨  
尖頭從背上量度當脊骨中尖繩下點之去度又以  
繩度病人口至兩吻截斷便中折之則以度向所點  
背下兩邊各依度長短點之三處一時下火灸絕便  
定神驗艾炷火稍加也

治瀉痢所傷煩欲死者

灸慈宮三七壯柱橫骨兩邊各二寸半橫骨在橫臍  
下橫門骨是轉筋在兩臂及胸中者灸手掌白肉際

七壯及灸膻中中府巨闕胃管尺澤并治筋拘頭及

足背愈

灼艾法

出仁存方治霍亂轉筋欲死絕惟腹中有暖氣者

灸承筋七壯取繩量圍足從趾至跟匝捻取等折平以度令一頭至跟踏地處引繩上至度頭即是穴起死人又以鹽內臍中令實就鹽上灸二七壯一方灸氣海穴臍下一寸半二七壯妙

療霍亂神秘起死

出濟生方

用以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下頭五壯橫度左右復灸五壯此三處併當先灸中央畢更橫度左右也又灸脊上以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七壯是腹背各灸三處

療霍亂已死上屋喚魂者又以諸療皆至而猶不瘥捧病人覆卧之伸臂對以繩度兩肘尖頭依繩下夾背脊大骨穴中去脊各一寸灸之百壯無不活者所謂針灸法此最善已試數百人皆灸即起坐或以此

術傳其子孫世世皆稱之

療手足逆冷者

灸三陰交穴在足內踝直上三寸廉骨際陷中左右七壯不瘥更灸如前數

治手足逆冷

出肘後方

灸大指上爪甲際七壯

治乾嘔者

灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不瘥更灸之

治乾嘔者

灸心主各七壯在掌腕上約中吐不止更灸如前數  
療苦煩悶脹滿

灸心厭下三寸七壯名胃管

治轉筋四逆

灸兩乳根黑白際各一壯外臺秘要灸兩乳邊連黑  
外近腋白肉際各七壯可至二七壯療吐下痢者

治走哺轉筋

灸踵踝白肉際各三七壯及灸小腹下橫骨中央如  
前數

治轉筋

灸湧泉六七壯在足心下當拇趾大筋上又灸足大  
趾下約中一壯

治轉筋不止

灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

治轉筋入腹痛欲死

出肘後方

四人持手足灸脅上一寸十四壯如不動勿復傷之

又灸股裏大筋去陰一寸一分半脅左邊二寸

治霍亂轉筋

令病人合面正卧伸兩手着身以繩橫量兩肘尖頭  
依繩下夾脊骨兩邊相去各一寸半灸一百壯無不  
瘥

主霍亂脚轉筋及入腹

以手拘所患脚大拇指灸當脚心下急筋上七壯

療霍亂轉筋不止漸欲入腹

凡轉筋能殺人起死之

法無過於灸灸法惟三處要穴第一承筋穴在脚腨

下際取穴法

以繩從脚心下度至脚踵便截斷度復迴此度從脚  
踵還量向上盡度頭當腨下際宛宛中是穴灸三七  
壯則定又不止則灸涌泉在足心下當足大指中節  
後一寸半正當大筋上是穴又灸足跟後黑白肉交  
際當中央此三處要穴灸之不過二三七壯必定

療轉筋在兩臂苦胸脇者

灸手掌白肉際七壯

療轉筋十指筋攣急不得屈伸

灸手踝骨上七壯良

扁鵲療筋脛骨痛不可忍

灸屈膝下廉橫筋上三壯

腹腸轉筋

灸臍上一寸十四壯

沙證

夫沙證之病在江南舊無今多有之原其證古有不載所感如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人宜先濃煎艾湯試之如吐即是

方

艾湯方

出仁存方

用五月蚕退紙碎煎安椀中以碟蓋之以百沸湯泡艾椀許仍以綿紙封裹縫良久乘熱飲之就卧即愈

又方

出危氏方

近時多看頭額上胸前兩邊有小紅點在於皮膚者  
用紙燃成條或大燈草微蘸香油燈上點燒於紅點  
上焌爆者是又名水傷寒用樟木煎湯服或葱豉湯  
汗出愈如腹痛不止又用針於兩手十指近甲稍針  
出血即愈

又法

出危氏方

治沙證

用苧麻蘸水於頸項兩肘及臂兩膝腕等處戛掠見

得血凝皮膚中紅點如粟粒狀然後蓋覆衣被喫少粥或葱豉湯清油葱茶得汗即愈使皮膚腠理開發鬆利誠不藥之良法也

又法出危氏方治兩足墜痛亦名水波

於兩脚曲腕內兩筋兩骨間刺出血愈名委中穴  
絞腸沙方 有一證心腹絞痛冷汗出悶脹欲絕俗謂攬腸沙今考之此證乃名乾霍亂而致此亦由山嵐瘴氣或因饑飽失時陰陽暴亂而致急用鹽湯吐法

此法救人不一

用鹽半盞以熱湯數椀泡鹽令患人盡服連至數椀不住手方可却以雞羽埽咽喉間即時吐所喫鹽湯盡出其證即愈

又方

出醫方  
集成

治絞腸沙證手足厥冷腹痛不可忍者

用手蘸溫水於病者膝灣內拍打有紫黑點處以針刺去惡血即愈

治絞腸沙痛不可忍或輾轉在地或起或卧其腸絞縮

在腹此是中毒之深須臾令人死古方乾霍亂是也  
急用鹽一兩熱湯調灌入病人口中鹽氣一到腹其  
痛即定也

又方

用石沙炒令赤色冷水淬之良一二合服之愈

又方

出經驗  
良方

陳樟木 陳艾 陳壁土

各等分

右為細末水濃煎去滓連進三四服即安

又方

出經驗良方

治心痛絞腸沙腹痛嘔吐瀉及霍亂中暑

煩渴不省人事

用馬糞研同蜜搗濾過新汲水下隨手即愈

治絞腸沙痛欲死者可活

用蚕生子連紙用手掌一片剪如錢大按於枕內上  
用一盞覆之然後將熱滾水一盞沿盞縫澆入去待  
少刻熱服立效

又方

用飲艾湯亦可

治絞腸沙其病身熱肚腹疼痛咽喉刺刺澁疼是也

用礦灰一小塊為細末半盞服之立效

治沙子絞腸病危急之甚用黑神散

用童子小便調服如不止再調服立愈