

本草蒙筌

本草蒙筌卷之三

新安和門月朋陳嘉謨廷采

纂錄

門生

欵色萊斐 鮑倚

校刊

婿胡一貫 姪晨

草部下

**附子**

味辛甘氣溫大熱浮也陽中之陽也有大毒係

烏頭傍出故附子僉名皮黑體圓底平山芋狀相仿

佛畏人參黃耆甘草併黑豆烏韭防風惡蜈蚣使地

膽種蒔川蜀蜀人種蒔冬月收採者汁全頂擇正圓一

兩一枚者力大製宗陶氏槌法以刀去淨皮臍先將

薑汁鹽水各半醃入砂鍋緊煮七沸次以甘草黃連

各半兩加童便緩炙一時撈貯罐中埋伏地內晝夜

週畢固音固音曝乾藏須密封用旋薄剉仍文火復

炒庶劣性盡除氣因浮中有沉功專走而不守凡和

群藥可使通行諸經以為引導佐使之劑也除四肢

厥逆去五臟沉寒噤閉牙關末納鴉管吹入紅突丁

毒末調醋塗消口瘡久不差醋麵和末貼脚底脚

氣暴發腫醋汁攪末敷患間漏瘡剉片如錢封口加

艾可灸煖脚膝徒步堅筋骨強陰佐八味丸中壯元

陽益腎非附子不能補下焦陽虛故入味丸加桂附

也附溪謂加為少君木附湯內散寒濕溫脾陰經直

陰向導恐非是真寒薑附湯煎可禦此須生用不在製拘助其緩

參耆成功。健潤滯地。黃建効。內傷熱甚。速入勿疑。

治外感證。非得身表涼。四肢厥者。不可借用。經云。世火食氣。故也。治內傷。證縱身表熱甚。而氣虛。脈細者。

正宜速入。經云。溫能除大熱。是也。俗醫不知。誤為補劑。日相習用。寧

不殺人。孕婦忌煎。墮胎甚速。○立春生者。乃謂烏頭

因有腦。類烏鳥頭。願竟假名。為醫家呼喚。氣味製度。

俱與附同。本經云。春採為烏頭。冬採為附子。又云。附

子頂圓正。烏頭頂歪斜。宗此別之。庶弗差謬。忌豉汁。

蔥藜蘆。及半夏。括萎。暨貝母。及欬。白蠟。遠志。為使。諸

經亦行。理風痺。卻風痰。散寒邪。除寒痛。破滯氣。積聚

去心下痞堅。亦善墮胎。孕婦切忌。煎膏名**須識**

敷箭射禽獸。即亡。倘誤中人。甘草急嚼。藍青萍草。亦

可解之○烏喙

音兩岐

頂上兩狀如牛角喙者乃烏

之口因類亦假爲名一應俱同烏頭惟使別用莽草

主風濕陰囊瘙癢止寒熱歷節掣疼亦墮妊娠更消

癰腫○天雄亦係一種其體畧細而長氣味相同製

度弗異惡腐婢使亦遠志忌豉汁制須乾薑專補上

焦陽虛善治一切風氣肢寒濕痺緩急拘攣卻頭面

風往來疼痛助武勇力作不倦消結積身輕健行調

血脉益精墮胎孕通竅○圓錐狀如棗核又從附子

傍生長悉無差但宜生用理脚氣驗散風癭良掃鼻

癩惡瘡却冷氣濕痺如前墮孕女科當知○毗穗亦

一名木鼈子者是令人喪目藥中忌之

誤按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七名實出一種。但治各有不同。今尊會編附其總論。天雄長而尖者其氣親上。故曰非天雄不能補上。焦陽虛附子圓而矮者其氣親下。故曰非附子不能補下。焦陽虛烏頭原生苗腦形如烏鳥之頭得母之氣守而不移。居乎中者也。側子散生傍側體無定在其氣輕揚宜其發四肢。克皮毛。爲治風膠之神妙也。烏喙兩岐相合形如鳥嘴其氣最銳宜其通經絡利關節。尋蹊達徑而直抵病所也。煎爲射罔禽獸中之即死非氣之鋒銳捷利者能如是乎。又有所謂木鼈子乃雄喙烏附側中有毗穗者其

形摧殘其氣消索譬如疲癯殘疾之人百無一治徒爲世累且又令人喪目宜其不入藥用也

**天南星**

味苦辛氣平可升可降陰中陽也有毒下濕

極多在處俱有苗類荷梗直起高僅尺餘葉如蕩葉  
杪生兩枝相抱花若蛇頭黃色子結作繆鮮紅根比  
芋猶圓肌細膩且白本經載虎掌草即此後人以天  
南星改稱亦與鬼蒟蒻相伴每逢冬月間候採殊不  
知蒟蒻莖斑花紫根極大肌麓南星莖青花黃根畧  
小肌細炮之易裂得此纔真製須多泡生薑湯炒佳  
或研填入牯牛膽臘月黑牯牛膽一筒用南星研末取汁并勻填入內風乾過  
年成塊剉碎復炒搔疔方書謂之牛膽南星即此是

也。倉卒不能得此，依前法湯泡，或火炮並殺毒，用但性猶烈也。乃上行治肺經本

藥，欲下行資黃蘗引之。畏生乾薑及黑附子。散跌撲

即疑瘀血墜中風不語，稠痰利胃，瀉下氣墜胎，破堅

積，誅癰消腫。水摩龜蛇蟲咬毒，醋調貼破腦傷風，癩

突，頰頰麝加敷愈。先用小針十數，按作一把，癰上敷

日敷二次，任如

視大半月全消

**苦參**一名味辛微苦，氣平。生寒熱溫，沉而降。陰中陽也。

有毒。山谷川澤處處有之。苗起一莖，莖端三葉，根名

半夏。八月採收。反烏頭、惡皂莢、畏雄黃、生薑、乾薑、秦

皮、龜甲。忌羊肉、羊血、海藻、飴糖。使宜射干、柴胡。經入

足、膽、脾胃。久藏入藥，同橘皮謂二陳。生嚼戟喉，則生翳。



喉人宜沸湯製七次仍加薑制纔可投籠若研末攪

少枯礬每泡過半夏四兩共研拌薑汁捏作小餅楮葉包

裹風際陰乾此又名**半夏麴**也片則力峻麴則力柔

總主諸痰驗證佐助火痰黑老痰膠加芩連栝樓海

粉寒痰清濕痰白入薑附蒼木陳皮風痰卒中昏迷

皂角天南星和痰核延生腫突竹瀝白芥子攪切痰

厥頭疼止痰飲脇痛散逆氣除嘔惡開結氣發音聲

脾瀉煎酸心汗且歛蓋脾惡濕半夏專能燥濕勝水

故爾孕婦忌用恐墮胎元如不得已用之復加薑汁

炒過消渴及諸血證尤禁莫加因燥反助火邪真陰

愈被熬害津枯血耗危殆日侵不得不預防也

**半夏**

夏消癰腫成顆者摩水敷蠟子蝥人塗上即愈婦人產後暈絕爲丸塞兩鼻中能頃刻回甦此扁鵲捷法謨按內經云腎主五液化爲五濕自入爲唾入肝爲淚入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕丹溪又云有痰曰嗽無痰曰欬是知痰者因嗽而動脾之濕也半夏惟能入脾以瀉痰之標不能入腎以瀉痰之本然欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以爲流濕潤燥之劑也又小柴胡湯中加之以治傷寒寒熱半助柴胡以主惡寒半助黃芩而能去熱及往來寒熱皆用之有各半之意故因而名曰半夏云本經別以守田目之者蓋緣夏半前後人多耘

蔣在田。斯又指名而生意也。

第二卷貝母款後。謾按宜叅看。

**石三稜** 味苦辛。氣平。陰中之陽。魚毒生。荆襄。岐澤。近霜降採根。狀若鯽魚。黃白。體重者。莢。麩。包。火炮。加醋。復炒。過。靈。色。白。屬。在。氣。邊。專。破。血。中。之。氣。故。消。癥。瘕。血。塊。證。煎。豉。積。聚。氣。滯。疼。虛。者。忌。煎。恐。損。真。氣。○。仍。有。三。種。亦。附。其。名。**黑三稜** 色。若。烏。梅。輕。鬆。去。皮。則。白。○**石三稜** 形。如。鷄。瓜。屈。曲。根。上。生。根。○。又**石三稜** 色。黃。體。重。堅。硬。如。石。總。消。積。氣。主。治。相。同。

**蓬萊**

味苦辛。氣溫。無毒。多產廣南諸州。或生江浙。田野。子。如。乾。椹。葉。似。蕤。荷。莖。錢。大。畧。高。根。類。薑。成。塊。

茂生根底相對似卵大小不常九月採收依煎炮製  
色黑屬在血分氣中之血專破瘀癥止心疼通月  
經消瘀血治霍亂積聚理惡瘧邪傷入氣藥仍發諸  
香在女科真爲要劑凡求速効摩酒單葷

**骨碎補**

味苦氣溫無毒陰濕山谷生長最多根着樹

石上有毛葉附兩小葉相對

每一大葉還附小葉槎牙兩兩相對不結

花實至冬乾黃入藥採根刮去毛用補骨節傷碎瘀  
風血積疼破血有功止血亦効本名曰胡孫薑唐明  
皇以其主折傷甚驗故易名骨碎補也

**牡丹**

味辛苦氣寒陰中微陽無毒多生漢中巴郡花

開品色異常富貴來先賢贊揚賞玩爲當世貴重凡

資治療。惟採根皮。家園花千層根氣發奪無力。山谷花單瓣根性完具有神。記專利多。自蒸補最入劑之際不可不知。今市多取枝梗皮代充。或採五加皮雜賣。乖謬殊甚。選擇宜精。經入足腎少陰及手厥陰包絡。忌葫蒜畏菟絲。涼骨蒸不遺。止吐衄必用。除癥堅瘀血留舍於腸胃中。散冷熱血氣。攻作於生。產後仍主神志不足。更調經水欠勻。治風癩。定搐止驚。療難腫。排膿住痛。

謹

按牝牡乃天地稱。牡則為群花首。花為陰成實。

葉為陽發生。丹係赤色象離。陰中之火能瀉致。

漢云地骨皮。治有汗骨蒸。牡丹皮。治無汗骨蒸。蓋

有見於此爾。本經又云：主神志不足，神不足，手少陰也。志不足，足少陰也。張仲景八味丸用者，又非主於斯乎？

**大葉薊**

味甘苦，氣溫。一云氣涼，無毒。雖係兩種，氣味

不殊。隨處田野俱生。北平今燉出者力勝。蓋薊門以

薊取名，則可徵矣。凡資治病。五月採根。**大薊**高三四

尺餘，葉多青刺而皺，花開如髻，赤若紅藍。比人因之

呼爲千針草也。破血捷，消腫奇。吐衄唾咯立除。沃漏

崩中即止。去蜘蛛蠍子咬毒，平熈突，痛甚癰疽並搗

爛絞濃汁半甌，攪薑便，或醇酒飲下。**小薊**苗高尺許，

花亦如前，但葉畧差，有刺不皺，僅理血疾，不治外科。

**劉寄奴草**

味苦氣溫無毒山側道傍春煖即產凡用入藥隨時採收下氣止心腹急疼下血卻產後餘疾消焮腫癰毒戒湯火熱瘡子研泡熱水下咽腸瀉無度者即已原因劉裕小名寄奴用此以治金瘡獲效竟指名曰劉寄奴草也

**紅藍花**

味辛甘苦氣溫陰中之陽無毒各鄉俱蒔五月旋收因葉似藍故此為譽堪染顏色可作臘脂欲留日曝乾入藥手揉碎推入血分專治女科下胎死腹中為未生聖藥療口噤血暈誠已產倦丹多用則破血通經酒煮方妙少用則入心養血水煎却宜喉車壺塞不通搗取子旋曬天行痘瘡難出研細子

未酒吞固搗敷遊毒殊功○固脂滴聒耳立效

**延胡索**

御藥味辛苦氣溫無毒來自安東縣歸龍生從

奚國因避宋諱改玄為延形類半夏色黃用須炒過  
咀片專入太陰脾肺一云又走肝經調月水氣滯血  
凝止產後血衝血暈跌撲下血淋露崩中心腹卒疼  
小腹脹痛並治之而即効也

**蜀金**

味苦氣寒純陰屬土與金有水無毒色赤蕪蕪

生蜀地者勝體圓有節類蟬肚者真倘或入藥難求  
採山茶花可代燒灰存性涼心經下氣消陽毒生肌

禁尿血除血淋蕪蕪血氣作痛破惡血止吐血仍散  
積血歸經因性輕揚上行又治鬱遏殊効名由此得



曾載本經

**薑黃**

味辛氣溫無毒。圖經云：是經種三年已上老薑

也。多生江廣。

江西湖廣

亦產蜀川。色比鬱金甚黃。形較鬱

金稍大。論主治功力。又烈過鬱金。破血立通。下氣最捷。主心腹結氣。併疰忤積氣作膨。治產血攻心。及撲損瘀血爲痛。更消癰腫。仍通月經。

謨

按鬱金薑黃兩藥實不同種。鬱金味苦寒色赤。

類蟬肚圓尖。薑黃味辛溫色黃。似薑瓜圓大。鬱金最少。薑黃常多。今市家惟取多者欺人。謂原本一物。指大者爲薑黃。小者爲鬱金。則世間之物俱各大小不齊。何嘗因其異形而便異其名也。此但可

與不智者道爾。若果爲是，則鬱金亦易得者。又何必以山茶花代耶？

**艾葉**

味苦，氣生寒，熱溫陰中之陽，無毒。各處田野有。

以復道者爲佳。初春布地生，與草蒿狀頗類，但葉背白風動微香。每端午朝天明多採，或懸戶資禳疫，厲或藏家防治病邪。煎服宜新鮮氣，則上達灸火宜陳久氣，乃下行。揉碎入四物湯，安胎漏腹痛，搗汁撓四生飲，止吐衄唾紅。艾附丸同香附末開鬱結調月經醋糊丸溫煖子宮，使孕早結。薑艾丸同乾薑木蜜丸散冷氣，去惡氣，逐鬼邪氣，免證久纏。和研細雄黃，熏下部，墜疰濕痺，及疥癬神效。和蠟片訶子，熏剃後寒熱急痛，并帶漏。

殊功。作炷灸諸經穴不差。鑿竅拔風濕毒尤驗。取

入藥。令人有娠。助水臙。壯陽煖腰膝。明目。

○又

產筠州山

屬湖廣

葉圓長。背白。有芒。莖獨植高二尺。

許氣香似艾。採亦端陽。治諸般風勞。止遍身疼痛。

謨按艾葉本經及諸註釋。悉云生于田野。類蒿。後

道者爲佳。未嘗以州土拘也。世俗反指此爲野艾。

至賤視之。端午節臨。僅採懸戶辟疫而已。其治病

症。遍求蘄州所產。獨莖圓葉背白有芒者。稱爲艾。

之精英。儻有收葺。不吝價買。彼處仕宦亦每採此。

兩京送人。重紙包封。以示珍貴。名益傳遠。四方盡

聞。今以形狀考之。九牛草者卽此人。多不識。並以

艾呼經註明云氣雖艾香實非艾種醫用作炷以  
灸風濕痺疼癆熱積聚嘗獲効者亦因辛胤可以  
通利開竅而已謂之全勝真艾未必能然大抵人  
之常情貴遠賤近泥于習俗膠固不移縱有本經  
之文諸家之註何嘗着一目視以爲真僞之別耶  
噫可勝嘆哉可勝嘆哉

**地榆**

味苦甘酸氣微寒氣味俱薄陰中陽也無毒山  
谷俱有生長八月採根曝乾惡麥門冬宜人頭髮  
理血病惟治下焦止婦人帶下崩中及月經不斷卻  
小兒疳熱瀉痢致積熱時行寒痔瘻來紅禁腸風下  
血散乳瘰愈金瘡因性沉寒故諸血熱者可用倘若

鹿寒水瀉冷痢切宜忌之

第一卷五加皮款後謹按宜參看

**紫草**

味苦氣寒無毒人家園圃多有種栽三月採根可煎染紫凡資入藥去根取茸益氣補中通竅利水治目黃成疸療腹滿作疼合膏敷癩癧瘡癩單煮托

斑痘瘡癩

**蒲葦**

味苦氣寒陰中微陽無毒多產郊原一名地血苗牽長蔓延草上根紫色收採春初煎汁可染絳紅入藥勿犯銅鐵療中多蠱毒吐下血如爛肝治跌打損傷疑積血成癰塊虛熱崩漏不止勞傷吐衄時來女子經滯不行婦人產後血暈凡諸血證並建奇功

除乳結爲癰。理體黃成疽。

**馬鞭草**

味甘苦。氣微寒。有小毒。江淮州郡多。村墟陌

路有。苗葉類菊。又若狼牙。高二三尺。莖圓。抽四五穗。

花紫。

春開細碎。紫色。秋後復再花。

穗較鞭草不異。故以馬鞭爲名。主

下部墜瘡。併金瘡積血作疼。研末敷妙。曾治楊梅瘡。

重後洗湯氣。綿到便覺爽。候溫洗之。痛腫隨減。

通女人月水。及血氣成癥。

結癥。生搗煎良。

醇酒煎服。

去小腹痛難當。禁久瘡發熱。

不斷。絞腸沙即効。纏喉痺極靈。殺諸般疰蟲。消五種

痞塊。

**夏枯草**

味苦辛。氣寒。無毒。曠野平原。隨處俱有。葉類

旋覆花。似丹參。冬至後發生。夏至時枯。故謂夏枯。

草也。四月收採，洗淨陰乾。凡用拯疴，王瓜爲使。破癥  
堅癭，癰結氣散，瘰癧，鼠瘻，頭瘡，寒熱，堪毆濕痺，蕪卻。  
謨按：夏枯草，稟純陽之氣，得陰氣即枯，故逢夏至  
槁枯也。丹溪有言：善補養厥陰血脈之功能，治肝  
虛目疼，冷淚不止，羞明怕日，久甚昏花，用夏枯草  
五錢，香附子一兩，研細爲散，茶調下咽服之，誠有  
神功，惜乎本經未之及也。

**百部**

味甘苦，氣微溫。又云微寒，無毒。一云有小毒。隨  
處生長，用惟取根，劈開去心，酒浸，火炒，主肺熱上氣，  
止年久欬嗽，急求治傳尸骨蒸，殺寸白虵蟲，須用。又  
專除蠶，亦可去疥，燒湯洗牛馬身，蟲不生，燒煙薰樹。

木蛀蟲即死。人家燒燼盡逐蝶蠅。

**百合**

味甘氣平無毒。洲渚山野俱生。花開紅白二種。

根如胡蒜。小瓣多層。人因羨之。稱名百合。者養

臟益志定膽安心。逐驚悸狂叫之邪。消浮腫痞滿之

氣。止遍身痛。利大小便。辟鬼氣。除時疫。欬逆。殺蠱毒。

治外科癰疽。乳腫喉痺。殊功。發背搭肩立効。又張仲

景治傷寒壞後。已成百合病。證用此治之。固取名同。

然未識有何義也。蒸食能補中益氣。作麵可代糧。過

荒亦者。僅治外科。不理他病。凡採待用。務必分留。

**前胡**

味苦氣微寒無毒。山谷多產。秋月採根。色白蕪

黃氣香甚竄。凡用入藥。須日曝乾。畏藜蘆惡皂莢。以



半夏爲使。去痰實如神。胸脇中痞滿立除。心腹內結氣即逐。治傷寒寒熱。又推陳致新。消風止頭疼。保嬰利疳氣。

**旋覆花**

味鹹甘。氣溫無毒。一云冷利。有小毒。叢生深谷中。又名金沸草。顏色深黃如菊。人又呼金錢花。七月採收。曝乾入葯。治頭風明目。逐水濕通便。去心蒲噫氣痞堅。消胸結痰唾膠漆。驚悸亦止。寒熱兼除。倘病者稍涉虛羸。防損氣。不宜多服。藥理金瘡止血。根主風濕續筋。

**大黃**

味苦。氣大寒。味極厚。陰中之陰。降也。無毒。形同牛舌。產自蜀川。必得重實錦紋。勿用溼。後汚黑。使黃。

苓一味入陽明二經。欲使上行。須資酒製。酒浸達龜頂上。酒洗至胃脘中。並載舟楫。少停。仍緩國老。草不墜。有斯佐助。纔去病邪。如欲下行。務分緩速。欲速生使。投滾湯一泡。便吞。欲緩熟宜。同諸藥。久煎。方服入劑。多寡。看人實虛。蓋性惟沉不浮。故用直走莫守。調中化食。霎時水穀利通。推陳致新。頃刻腸胃蕩滌。奪土鬱。無壅滯。定禍亂。建太平。因有峻烈威風。特加將軍名號。仍導瘀血。更滾頑痰。破癥堅積。聚止疼。敗癰疽熱毒。消腫。勿服太過。下多亡陰。若研末。鷄清調稠。可敷上火瘡。取効。

謨按大黃極寒。硫黃極熱。二黃氣味懸隔。何號將

軍相同。蓋硫黃係至陽之精，大黃乃至陰之類，一能破邪歸正，挺出陽精，一能推陳致新，裁定禍亂，並有過乎諸藥之能，宜其同得居上之號也。

**連翹**

味苦，氣平，微寒，氣味俱薄，輕清而浮，升也。陽也。

無毒，莖短微赤，葉狹常青，花細瓣深黃，實作房黃黑，因中片片相比，狀如翹，應故名。凡用採收，須擇地土生川蜀者，實類椿實，殼小堅，柳殼實未開者，外完而無跗萼。剖則中解，氣甚芬香，纔乾便脫，莖間不擊自然落下。生江南者，實若菴菴殼，柔軟，外有跗萼抱之，解脉絕，無香氣，自少。乾久尚著莖上，任擊亦不脫離，以此爲殊。惟蜀最勝，去梗旋研入劑，方靈。餘剩密截，氣味免。

失經入少陰心臟手足少陽陽明瀉心經客熱殊功  
降脾胃濕熱神効。毆惡癰毒蠱毒去寸白蟲虻蟲瘡  
科嘗號聖丹血證每爲中使通月水下五淋義蓋取  
其結者散之故此能散諸經血疑氣聚必用而不可  
缺也。實人宜用。虛者勿投。○**通**藥係根之名。仲景方  
云去熱本經未載。此亦附之。

**射**

音夜

**藥**

味苦氣平微溫。屬金。有木。與水火陰中陽也。

無毒。川澤郊原隨處生長。葉如翅羽。扇俗呼烏嬰根。  
一說葉類萱草。堅強。根多短鬚。黃黑。花開四種。紫白。  
紅黃。丹溪取紫爲真。只因試過有驗。三月三日採根。  
曝乾。凡藥劑投煎。務米泔浸宿。散結氣。旋平癰毒。逐

瘀血竟通月經止喉痺刺疼。口熱穢臭去因勞而發之濕熱潰硬腫殊功。行太陰厥陰之積痰消突核甚捷。仍治胃滿氣脹。更療欬急涎多。

**藜藿**

味苦氣平無毒。春月布地生在處沿路有苗類瞿麥根若蓬蒿葉細竹葉相同。莖赤釵股近似。節間花綻色微青黃。五月採收。陰乾入藥。主浸淫疥瘙疽痔。治卅石發衝眼疼。去小兒蛇蟲。療女子陰蝕。

**苦參**

味苦氣寒沉也。純陰無毒。田野山谷隨處有生。採根曝乾嚼之極苦。反藜蘆莫入。惡貝母菟絲。使宜。玄參惟作丸服。不入治腸風下血及熱痢刮痛難當。療溫病狂言致心燥結胸垂死。赤癩眉脫者。感風有。

功黃疸遺溺者逐水立效掃遍身瘡癬止平暴心疾  
除癰腫殺疥蟲破癥瘕散結氣養肝氣明目止淚益  
腎精解渴生津利九竅通便安五臟定志<sub>子</sub>生作莢  
十月堪收亦明目輕身惟久服有驗

**牽牛子**

味苦氣寒有毒不拘州土處處有之種春時

旋生苗作藤蔓繞墻垣籬軒待秋月方開花<sub>如鼓子</sub>

<sub>日</sub>出開結實白皮裹外成毬葉發枝間有三尖角子

歲毬內亦三蕪稜九月採收曝乾多有黑白兩種<sub>子</sub>

者屬水力速<sub>子</sub>者屬金効遲炒研煎湯並取頭末除

壅滯氣急及疔癬蠱毒殊功利大小便難併脚蒲水

腫極驗

護按東垣云牽牛非神農經藥出名醫續註云味苦寒能除濕利小便治下疝脚氣據所說氣味主治俱誤凡藥中用牽牛者少則動大便多則瀉下如水乃導氣之藥試取嘗之味則辛辣又嚼雄壯漸漸不絕非辛而何續註謂味苦寒果安在哉牽牛但能瀉氣中濕熱不能瀉血中濕熱況濕從下受下焦主血是血中之濕宜用苦寒之味也張仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者非不知牽牛能瀉濕利小便也爲濕病之根在下焦是血分中氣病不可用辛辣氣藥反瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用夫何世醫不分血氣而

一槩用之乎。夫濕者水之別。不形者也。若肺先受濕。則宜用之。今則不問有濕無濕。但傷食或欲動大便。或有熱證。或作常服尅化之藥。罔不用之。豈不悞哉。殊不知牽牛比諸辛藥。瀉氣尤甚。張文懿公嘗謂牽牛不可躑躅。脫人元氣。吾初疑藥有何躑躅。後每見人因酒食病痞者。多服神芎丸等藥。皆犯牽牛。初服則快。藥過復痞。仍前再服。隨藥而効。由是愈信躑躅。嗜久服。暗傷元氣。而猶不知悔悟也。治當益脾健胃。使元氣生發。自然腐熟水穀。此治無以加矣。經云。辛瀉氣。肺氣病者。無多食辛。况飲食勞倦。所傷在胃。胃氣不行。心火乘之。胃受



火邪名曰熱中。脈經云：脾胃主血，其所生病當于血中瀉。火潤燥，破惡血，瀉胃之濕熱也。胃熱上炎，肺受火邪，當用黃芩之苦寒以瀉火，當歸之辛溫以瀉血結。桃仁之辛甘油膩以破惡血，蕪除燥潤大便，然猶不可專用。須于黃耆人參甘草諸甘溫甘寒補元氣瀉陰火正藥內，兼而用之。何則？上焦元氣已自虛弱，津液不足，口燥舌乾。若反用牽牛氣味俱陽大辛之藥，重瀉其已虛之元氣，復耗其津液，利其小便，以致陰火愈甚。故重則死，輕則夭，誠可憫也。牽牛感南方熱火之化所生者也。血熱而瀉氣，差悞甚矣。若病濕勝，氣不得施化，改大小。

便不通則宜用之耳。濕去則氣行。所以謂五臟有邪更相平也。經云一臟不平以所勝平之。火能平金而瀉肺者即此也。近世錢氏瀉黃散中獨用防風過于他藥一二倍者以防風辛溫能于土中瀉金之子不使助母也。經云從前來者爲實邪。謂子能令母實故以所勝平之也。晦菴語錄中有秋食薑則天人天年經止言辛瀉氣而晦菴云然戒之深也。何則秋分食薑令人瀉氣故禁之。夏月食薑不禁者熱氣主旺之時宜以汗散薑能發汗以越其熱也。薑尚如此况牽牛乎。可見味辛之物皆有宜禁之時亦猶牽牛不可一緊用之也。

**苦參**

味辛苦氣大寒沉也陰中之陰無毒一云小毒

用之當熬陝西河北俱多曹州嶺山出者獨勝延生

田野收採夏間粒如黍區小微黃製隔紙文火畧炒

惡殭蠶石龍芮使榆皮得酒良種因甜苦兩般證量

輕重各用苦參行水走泄迅速形壯證重者堪求

**甜菜**

行水走泄緩遲形瘦證輕者宜服苟或鹵莽

易致殺人逐膀胱伏留熱氣殊功消面目浮腫水氣

立効肺癰喘不得卧非此難痊華蓋大葉芎藭房痰

飲欬不能休用之易愈主癥瘕積聚結氣理風熱瘡

癢癩瘡久服虛人須記勿犯

**苦參**

味苦甘一云苦辛氣微溫無毒水澤多生家園

亦種苗高二三尺許紫節方莖有四葉出莖生有毛

但不光潤八月花開白色狀與薄荷花同初採微辛

此爲異耳採收入藥防已使良埋胎產百病淹纏文

科須覓消身面四肢浮腫濕中宜求破宿血去癥瘕

殊功行瘀血療撲損易効散頭風目痛追癰腫瘡膿

長肉生肌利關通竅○根色紫黑如漆爲名與栗根

相侔凡血證俱治女人產後堪作菜蔬○又種如漆

收彷彿澤蘭葉類莖色畧異細認纔知果益妙續

斷乳如神仍去痔收脫肛最捷炙令香燥漬酒飲之

味苦氣溫純陽無毒本經云乃番國蘿蔔子

也原本產諸胡地今亦蒔于嶺南春月生苗夏間結

子子作細茨至秋採收得桃仁六箇香治膀胱疝氣

効

三味麩炒各等分研末半以酒糊丸半爲散每用五七十九丸煎酒下散以燕米飲調下與九子相同

空

心服日各一

服即効得硫黃黑附子療腎臟虛冷佳歐脹痛

腹脇中退青黃面頰上

**車釐**

味苦甘氣平無毒盛出河陝荆蜀蔓生葉作三

叉秋月採根狀類山芋一種莖有刺者根白實一種

莖無刺者根軟虛種雖兩般白者爲勝又與菝葜小

異凡收切勿混真蓋菝葜根作塊赤黃草薺根細長

淺白博物誌亦曰菝葜與草薺相亂時人每呼白菝

葜者即草薺也利刀切片酒浸烘乾凡用採疴忌食

牛肉畏葵根牡蠣及柴胡大黃爲使宜薏苡仁治痺

靈風寒濕腰背冷痛止筋骨掣痛除補水髓益精縮  
小便明目逐關節久結老血掃肌膚延生惡瘡仍主  
毒怒傷中尤療老人五緩○別種亦保蔓生俗  
呼金剛根又呼蔓兒於根延發山野地採根秋月切片曝乾  
浸赤汁糞米粉掌辟時疫瘟瘴極驗搗碎末釀醇酒  
飲去風毒脚痺殊佳止小便益血氣腰背疼甚煎服  
亦靈

蕙按近道所產呼爲冷飯團即草薺也俗之淫夫  
淫婦多病楊梅瘡劑用輕粉愈而復發久則肢體  
拘攣變爲癰漏剉草薺三兩或加皂角刺牽牛各  
一錢水六碗煎耗一半溫三服不數劑多差原因

水衰肝挾相火凌土土屬濕主肌肉濕熱鬱于肌  
滕故爲癰腫經曰濕氣害人皮肉筋脉是也草薺  
味甘淡去脾濕濕去則榮衛從筋脉柔肌肉長而  
拘攣癰漏並愈此亦理也初病服之不効者火盛  
而濕未鬱草薺長干去濕而劣于去熱病久則火  
已衰而氣已耗氣耗則濕鬱用之去濕故効也

**預知子**

味苦氣寒無毒出淮南及漢黔諸州係藤蔓

附大木直上葉三角綠色背淺面深實五月作房生  
青熟赤子藏房內六七多枚如皂角子褐斑似飛蛾  
蟲光潤欲求極貴因得甚難取二枚綴衣服領中遇  
毒物則有聲側側能先知覺故有此名服須去皮研

細湯下殺蟲誅蠱諸毒並歧根搗水煎獲効尤速

**猪簽**

味苦氣寒有小毒一云氣熱無毒沃壤多生平

澤亦有氣作猪臭故名猪簽

此草多生江東其葉言呼猪為猪呼臭為簽

因美氣類

故此名之五六月採收

五月五日六月六日並宜採枝葉

花實俱用

惟去

蜜酒層層和灑九蒸九曝完全細末

研成蜜丸豆大空起空腹吞服酒下多寡隨宜療暴

中風和口服啗斜者立効治久滲濕痺腰脚痠痛者

殊功搗生汁服之主熱鬱煩滿服多則吐惟少為宜

諺按此草處處俱生視之多有異狀金陵銀線素

根紫髮對節生枝方梗圓葉如玳修製服誠益人

百服則耳目聰明千服則鬚髮烏黑追風逐濕備



本草綱目 卷三  
作泛開古方每竭贊勸深功難盡著述可見至賤之類却有殊常之能醫者不可因賤而不收病家亦勿謂賤而不製服也

**藜蘆**

味苦氣平有小毒平原曠野俱有莖圓一二尺高葉皺大彷彿紫蘇花白黃儼若耳菊八月結子粒細而尖任收研散爲丸大能殺蟲追毒虻虻咬心腹卒痛者肥肉汁調下即安砒霜毒吞腸胃未裂者濃蠶汁送下立吐

**酸漿**

味酸氣平寒無毒園田坂處處有生春開

白花旋結青殼子蔽殼內大若櫻珠臨熟盡綠深紅五月堪取啖食孕婦吞下立分娩無臭小兒食之能

除熱有益**眼**搗汁極苦治黃疸易消**羅**採陰乾亦利水道定志益氣解燥除煩

**石莖**

味苦甘氣平微寒無毒叢生山谷石上者真不

聞人聲水聲者効葉長似柳背有黃毛不拭射人肺中即成欬嗽難治務先去淨復拌羊脂炒變焦黃方入藥劑得舊蒲妙使杏仁良治遺溺成淋通膀胱利水療癰疽發背去惡風止煩益精氣補五勞除邪熱

安五臟○生瓦上者**石莖**爲名治淋亦佳本經曾載

**海金**

本經不言氣味只云出產黔州屬一二尺

高株材甚小七月收取拔起全科晴日襯紙地間將此曝於紙上以杖敲擊自落細沙且曝且敲沙盡爲

度用爲丸散專利小腸得梔子牙硝蓬砂可共療傷  
寒任熱本註又云小便不通臍下滿悶者用此一兩  
臘茶五錢絕細研成煎生薑甘草梢調下三錢不通  
再又服之旋可以取効也

**海藻**

味苦鹹氣寒無毒一云有小毒東海所生葉類

海藻根着水底石上莖如亂髮而烏七夕採收性反  
甘草治項間瘰癧消頸下癭囊利水道通癥閉成淋  
瀉水氣除脹滿作腫辟百邪鬼魅止偏墜疝疼○又  
種產長乃名**海帶**柔軟堪以繫物入藥多用催生亦  
療風濕煎下水濕○**彭布**亦係海菜治與海藻功同  
散結潰堅並著奇効

護按榮氣不從外爲癰腫堅硬不潰仗此可消蓋  
三藥味俱鹹經云鹹能軟堅隨各引經藥治之則  
堅無不潰腫無不消也

**雞**

味苦辛氣寒無毒川蜀多生湖浙亦有擇如鷄

骨入藥方靈忌菘菜鷄肉葱畏玉札勿令犯截溫瘡

吐痰沫殊功解傷寒肢寒熱立効水脹堪逐鬼蠱能

消勿滾熱下痢必露冷過宿此服此須頭晚煎熱露  
天空下一宿次早晚服

年老久病人全忌形瘦稍虛者少煎蓋性悍兇肢逐

甚捷功不掩過者也○苗名雞味苦純陽五月收

採陰乾使宜結菱桔梗散火邪錯逆破癰疽癥堅除

痞結積凝辟蠱毒鬼疰久瘡兼治欬逆且調切勿服

本草綱目卷三  
多亦防惡吐

**白** 味苦甘。氣大寒。有毒。多產京西川谷。二月採根。陰乾。狀若連珠。使瓜蒂反甘草。惡遠志。破癥堅積。聚如神。退面目浮腫。立効。食停胃內。有之即敗。水結胃中。非此不鮮。蓋氣直透所結之處。專于行水攻決。利從穀道出也。凡用斟酌。切勿妄投。

**白** 味苦甘。氣平微寒。無毒。一云有毒。隨處蔓生。深林猶盛。根如鷄鴨卵。三五同窠。採待中秋時。黑皮洗淨。破片以竹穿。日曝入藥。與白及並行。反烏頭。使代赭退赤眼。除熱散結。氣止疼。理小兒溫瘧。驚癩。療女子陰戶腫痛。殺火毒。爲火煨湯炮聖藥。治外科。敷背。

癰疔腫神丹

**白及**

味苦辛。氣平微寒。陽中之陰。無毒。多出石山。苗

高尺許。葉青。兩指大。莖端生一莖。花開紫紅。實熟黃

黑。根如菱米。節間有毛。二八月採乾。紫石英爲使。恐

理石畏杏仁。名擅外科。功專收斂。不煎湯服。惟熬膏

敷。除賊風。鬼擊。疔緩不收。去潰瘍。敗疽。死肌。腐肉。敷

山根。類之上止衄。塗疥癬。殺蟲。作糊甚粘。裱畫多用。

**白及** 味甘辛。氣溫。純陽無毒。一云有小毒。巴郡涼

州俱多。砂磧卑濕。纒有。獨莖發葉甚細。周匝生于穗

間。形類天雄。入藥炮用。治面上百病。可作面脂。主血

痺冷疼。且行藥勢。豉諸風冷氣。解中風失音。摩醋擦

身皆汗斑尤去疥癬用始蒂者造然葉研末收陰囊  
濕癢併滅癩痕擦三日愈忌滌洗

**白頭翁**

味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云味

甘苦有小毒山谷田野在處有之苗作叢柔細稍長

葉生杪有毛不澤毛細風來反靜風去則搖與獨滑

赤箭苗莖三者無差異也近根底處白茸寸餘狀類

老翁名由此得交秋收採向日曝乾陰乾一云入藥拯疴

豚實爲使主溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼逐血

愈金瘡毆風煖腰膝消癰癰散癭瘤小兒頭禿羶腥

及兩鼻血衄神効男子陰疝偏腫併百節骨痛殊功

牙齒痛亦除赤毒痢必用經云腎欲堅急食苦以堅

之劑則下焦虛故必用此

以堅之也

**首**

味辛甘酸氣溫有毒一名樟柳多產郊原葉如

牛舌舒長

純青色

莖高三尺柔脆

青赤色

秋開花作朶色

赤白兩般花赤者根赤相同花白者根白無異

**白根**

入藥劑專利水對證可煎**赤根**見鬼神甚有毒貼腫

堪用儻鹵莽誤服必痢血喪身釋文又云如人形者

有神

其根有似人形雙手隻足者能通神

今術家每云樟柳神者即此

是藥**赤根**亦入神之藥**赤根**名蔦花尤良若陰乾搗末水

吞能治人健忘善候服後卧思所事開心後記詳明

並墮妊娠孕婦切忌

護按白根治水方載多般或取根雜鯉魚熬湯或



咀粒攪粟米煮粥。或搗生汁調酒。或和諸藥爲丸。空心服之。並可獲効。赤根貼腫。方亦不同。喉痺窒

塞不通。醋熬敷外腫處。石癰堅如石者。搗擦取軟成膿。如或搗爛加鹽。總敷無名腫毒。古讚云。其味酸辛。其形類人。療水貼腫。其効如神。斯言盡之矣。

**王不留行**

即剪金花味苦甘。氣平。陽中之陰。無毒。江浙近道

俱有。莖青七八寸長。葉尖如小匙頭。花開係黃紫色。子如黍粟。殼黑微圓。三月採根莖。五月取花子。先灑酒蒸一伏。復浸漿水一宿。微火焙乾。收留待用。主金瘡止血逐痛。治女科催產調經。除風痺風痙。內寒消乳。雞背癰外腫。出刺下乳。止切岐煩。

蒲公草

即黃花地丁草味苦氣平無毒一名耨耨草俗呼字李

丁田側道傍逢春蒲地葉如苦苣有細刺花類金錢

開莖端斷其莖

莖中盡如葱狀

白汁竟流開罷花飛絮隨起

絮中有子落地則生庭院有之因風吹至採宜四月

五月經入陽明太陰煎汁同忍冬臨服加醇酒漬堅

腫消結核屢著奇功解食毒散滯氣每臻神効

穀精草

味辛氣溫無毒生長穀田中採收三月後花

白葉細圓小似星故又名戴星草也埋咽喉痺塞止

牙齒風疼口舌諸瘡眼目瞽膜並堪煎服取効霎時

又餵馬驢騾能殺蟲額內益力健步長毛生鬣

旱蓮草

一名燈癆味甘酸氣平無毒濕地多生苗若旋複花

本草綱目 卷三 三十一  
細而白色。實圓而作房。摘斷枝莖。汁出漸黑。或煎酒服。或熬膏敷。染白髮。回烏。止赤痢。變莖。鬚眉稀少。可望生速。而繁。火瘡發紅。能使流血立已。

**金星草**

味苦。氣寒。無毒。多生陰濕石上。葉長。凌冬不凋。背有黃點兩行。狀若金星相對。故因得此名也。五月採。收風乾入藥。解毒消腫。專理外科。凡百初起惡瘡。但諸未潰。陽毒沿頸。瘰癧。發背。癰疽。或剉碎。煮酒類吞。或研末。調水。旋服。或煎汁。淋洗。或搗爛。敷塗。並可建功。立能獲効。諸丹石毒。悉解。硫黃毒。亦能破。搗浸真麻油。搽頭。大生毛髮。

**佛手草**

味酸。氣熱。無毒。郊原野坂。處處有之。春生苗。

尺餘夏開花黃色葉與馬齒莧類細小微有白毛俗呼黃蒿人每收採搗爛和米粉作糗柔翻音而香美可嘗藥劑凡資曝乾終用以軟冬爲使治寒嗽及痰尤去肺寒大升肺氣切勿過服損目失明

**燈籠草**

味苦氣大寒無毒在處俱有八月採收花實

根莖並堪入藥苗高三四尺許花紅而類燈籠故此爲名專主熱嗽蓋因苦而除燥熱輕能治上焦故也丹溪嘗云燈籠草治熱痰嗽佛耳草治寒痰嗽

**三白草**

味甘辛氣寒有小毒出自夔州音生臨池

澤每次初夏之月葉端半白如霜農人候以蒔田三葉白草便秀故此爲譽用惟取根利大小便逐脚際

氣除痞滿去塵破堅癖毆痰疔腫仍消積聚尤卻

**燈心草**

味甘氣寒屬金與火無毒江南澤地叢生苗莖圓細長直多採蒸熟向日曝乾拆取中心白穰用之燃燈照夜此謂熟草不入醫方務求生剝者為良揉碎煎湯液終効通陰竅利小便除癰閉成淋消水濕作腫鉉播乳香少入油潤全無罐藏冰片多加分兩不耗**眼**採煎服功力尤優○**燈心**止小兒夜啼亦能治大人喉痺金瘡敷上血禁肌生

**蛇含草**

味苦氣微寒無毒一云有毒石土上並生遠近處處有一莖五葉七葉兩種畧殊當用細葉黃花此品繞妙昔田父見蛇含著別傷蛇即活嘗採此治

癰腫去內惡毒立痊。由此得名。外科多用。主驚癩瘰  
熱邪氣。心腹邪氣。除濕痺。疽痔。惡瘡。鼠瘻。惡瘡。諸丹  
石煉毒殊功。但蛇蠍蜂傷。悉効。人家多種。亦令無蛇。  
又用搗爛成膏。堪續已斷手指。○其根收取。乃名**天**  
**青**搗細末。帶之。則疫癘不犯。主蠱毒。而逐邪惡。殺鬼  
魅。以辟不祥。

**水葶草**

即天

味鹹。氣微寒。無毒。一云味辛。有毒。雖生各

處。多在水傍。苗莖高尺餘。葉大色赤白。五月採。實用  
者最稀。去痺氣。除惡瘡。下水氣。解消渴。去熱明目。奇  
効咸臻。○**馬蓼**葉大。同前。卑濕之地亦產。夏收。採曝  
乾入劑。主腸中蟲。蛭。輕身。○**水蓼**生淺水中。大葉上

有黑點根莖並採可用煎湯搗脚止霍亂轉筋消脚氣腫滿吞服止蛇毒攻內去疔癰脹疼水蠱黃腫腹膨用蒸汗出立愈二月勿食傷腎弱陽若合魚鮮食之令陰冷痛欲絕○**芫花**冬根不死葉上有毛亦主瘰癧癰疽引膿長肉○**白蔘**造酒並佳

**山茨菇根**

味辛苦有小毒俗呼金燈籠多生沙濕地

初春萌芽葉如韭葉長青二月開花狀若燈籠色白瓣有黑點子結三稜立夏終交其苗即稿依時掘地可得遲久腐爛難尋與老鴉蒜畧同在包裹上分別蒜却無毛光禿茨菇包裹有毛得之去皮生培任用生搗爲拔毒敷藥頻換則靈焙研合玉樞神丹必資

作主消癰疽無名疔腫散癰瘡有毒惡瘡蛇虺咬傷  
並服神効。

**山豆根**

味苦氣寒無毒各處山谷俱有廣西出者獨  
桂俗呼金鎖匙苗長一尺許葉兩傍而有曲紐子成  
簇而色鮮紅粒似豆圓名因此得凡資療病惟取其  
根口嚼汁吞止咽喉腫痛要藥水調末服除人馬急  
黃捷方敷蛇蟲咬傷去血氣腹痛。

**萱草根**

俗名鹿葱

味甘氣涼屬木無毒園圃多種五月開花

療酒疸遍身通黃絞生根汁煎下治沙淋小便澀痛  
煑熟嫩苗食之咀和酒煎為破腦傷風要藥搗挽薑  
汁係大熱衄血僂方安五臟輕身利胃明目久久



服餌歡樂無憂稽康云合歡觸怒萱草忘憂是也○  
**宜男** 係花之字孕婦佩則生男冊奚曰性下行走陰

意存焉

**蘆根**

味甘氣寒無毒洲渚多生秋冬總取掘土擇其

美者有效露出及浮水者損人解酒毒退熱除煩止  
嘔噦開胃下食食魚蟹中毒即劫懷胎孕發熱即敲  
○花白名曰**蘆葦**主卒霍亂危急煮汁頓飲霎時可

安

**菰根**

味甘氣大寒無毒多生江湖陂澤葉如蒲葦尖

長抹馬甚肥作薦誠軟江南呼為菰草即此是焉四  
時取根搗爛絞汁止小便利鮮渴主腸胃熱除煩久

浮水面者燒灰延片火灼瘡數愈用藥

**菘菜**

即春生

芡筭煮食治心腹卒疼雜鯽魚爲羹鮮酒毒開胃丹

石熱發頓食即差須防滑中不宜多食又**菘菜**當作

菘手係歲久中生白莖與小兒臂同故取爲名喚食

少追風去熱止上膈渴消食多發氣弱陽冷下焦冷

滑食同白蜜瘡疾復生臺中有黑者所名用之治

小兒赤痢効**藥**利五臟亦驗食巴豆人忌之細若

青麻黃名彫胡米俗每合黍粟煮過凶荒年大抵菘

之種類皆極冷利不可過食惟服金石人相宜爾

**芋根**

味甘氣寒無毒鄉落地多種養宿根春自發生

葉取飼池魚面青背白皮剥績暑布一年三收根輕

虜白黃採無時入藥搗敷小兒赤游丹毒及諸癰疽  
發背乳房剪療女人胎動不安併產前後發熱煩悶  
塞胎漏下血晉箭毒蛇傷時疫大渴狂呼非此莫卻  
金石服多燥熱飲下立除藏留產婦堪用作枕  
眠止血暈安臍上去腹疼大堂大解消渴蠶咬  
中毒一飲即斃故近蠶室種之則蠶竟不產也

**黃跡根**

味甘氣寒屬水無毒葉如萵苣多產道傍根

取醋摩善走血分主小兒頭禿疥癩除熱治女子陰  
蝕浸淫殺蟲去痔瘡除風癬或採多熬膏加蜜用防  
風研末和丸稻樓甘草酒吞治前諸證益妙日服三次  
飯三作菜茹小兒疳蟲立追食多滑腸作瀉苦澁平赤

白薇能止

**白薇**

味辛苦氣溫有小毒川谷甚多遠近俱有莖紫

花白一二尺長密開花盈舊枝莖如紫梢作穗木出葉採嫩者蓋向晴日曝乾花落葉生不堪用也得之煮醋數沸漉出漬水一宵復曝乾收纔免毒害反其草使決明散皮膚水腫發浮消胃隔痰沫善唾欬逆上氣能止咽腫短氣可安敗血癥癰疽除蠱毒鬼瘡令人虛損久服不宜汁漬線絲繫痔易落○根採尤毒乃名爲**毒魚**搗爛堪毒魚研末能敷疥

謨按荒花瀉濕利水爲頭夫水者脾胃腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭目中而四

肢下而腰膝外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有寸關尺之殊。診有浮中沉之異。必當審其病在何經何臟。乃可用之。倘若悞投。爲害非淺。

**羌花**

味苦辛。氣寒。有毒。生咸陽川谷及河南中牟。苗似胡荽。刺無花。類羌花色。白狀極細。四五月採。力甚猛。熬令赤。收入藥劑中。急欲行水。有是證者。斟酌投煎。破積聚。大堅癥。瘰癧。瘵。瘵。瘵。瘵。逆上氣。咽喉內腫痛。疰氣可散。臍腹下疰。瘵。瘵。塊能消。

**實衆**

味苦。氣微寒。有毒。在廩山谷。有背日陰濕生。莖有三稜皮。係赤色。葉青綠。如小鷄翅。根紫黑。似老鷄頭。故本經歟中亦載曰。此謂草鷄頭也。一說根形如大瓜。下有黑

毛鬚二八月採根陰乾赤小豆蘗菌爲使豉諸毒濕金

瘡惡毒殺三蟲去寸白蛇蟲仍除頭風更破癰疽

**烏芋**

味甘氣平微寒無毒苗似龍鬚葉如芋狀根黑

指大皮厚有毛

又一種皮薄無毛者亦同

今人謂之勃臍本經載

曰烏芋危爲喜食以得此名水田蒔之在處有者三

月三日採根曝乾主產後血悶攻心理產難子胞不

下壓卅石除胸膈痞氣下石淋退面目疸黃風腫能

消痺熱堪卻開胃進食益氣溫中性善毀銅着之即

碎故爲消堅削積要劑也多食則生他症卒食則嘔

水來孕婦食動胎小兒食臍痛醫採搗爛蛇咬可敷

**水萍**

味辛酸氣寒無毒係柳絮隨風飛起入池沼得

水生。成小者藻，皆面俱青。大者萍，面青背紫，下無根。

蒂水面漂浮，入藥拯疴，惟鮮萍可用。七月半採，依法曝。

之竹篩攤開，水盆架住，曝向烈日，終得燥乾。盆無水則不燥。

研末，細羅，蜜丸，彈大豆淋酒化，空心頓吞，發汗驟來。

豉風速退，仍治時行熱病，堪浴遍身癢瘡。煎消水。

腫利小便，去暴燥，止消渴。夏夜蚊蠅燒煙可除。

謨按普濟大風丹云：東京開河，掘得石碑，梵書天

篆，無有曉者。林靈素逐字釋解，乃是治中風方。歌

曰：天生靈草無根幹，不在山間不在岸。始因飛絮

逐東風，泛梗青青飄水上。神仙一味去沉疴，採時

須是七月半。怕甚攤風與中風，酒下三丸都汗發。

**大戟**

味辛甘。氣大寒。陰中微陽。有小毒。種其猥賤處。

處有生春發紅芽。日漸叢長。凡實入藥。惟採正根。傍附誤煎。冷瀉難禁。惡薯蕷。使赤豆。反甘草。海萍。芫花。畏菖蒲。蘆根。鼠屎。每與甘遂同利。小便消水。腫腹滿。急疼。除中風。皮膚燥痛。毆蠱毒。破癥堅。通月信。墮胎。散頭癰。逐瘀。○苗名羅漢。味苦。兼辛。退邪熱。皮膚。卻浮腫。面目。大腹水。氣立遣。陰氣不足。堪扶。

**蚤絲**

一名紫河車

味苦。氣微寒。有毒。川谷俱有。江淮獨多。不

生傍枝。一莖挺立。莖中生葉。葉心抽莖。年久發三四層。上有金線垂下。故又名金線重樓。俗呼七葉一枝花也。圖經云。葉如鬼臼。根若肥薑。凡入藥中。惟採根。



用主驚癩。搥頭弄舌。除濕熱。發腫作瘡。下三蟲。解百毒。或摩酒飲。或摩醋敷。

**簡茹**

味辛酸。氣寒。有小毒。近產河陽。原出高麗。苗逢

春煖方起。葉類大戟。常青花。色黃。結子絕無。根皮赤

似蘿。斷則流汁。累疑如漆。故云漆頭。五月採根。陰乾

惟取頭黑者。勝。使甘草節。惡麥門冬。戟。素問中云。去

惡血。古姚僧坦用治癰疽。作散頻敷。肉滿便止。破癥

瘕。殺疥蟲。逐敗瘡。死肌。除大風熱氣。善忘不樂。亦著

本經。○又**簡茹**。其根色白。因醫取黑頭入劑。採多

燒熱鐵燂之。作假代真。主治不異。敷潰瘍作散。載古

方亦多。

**箭筈**一名筈 味苦氣寒無毒深山谷多產平陸地絕無

莖類栢皮褐黃葉似山茶青綠幹有三羽狀如箭翎

削取皮羽陰乾拭淨赤毛酥炙一說只使箭頭每兩用酥一分緩炒酥盡

為任煎湯液專治女科能墮妊娠善療血氣遺邪崇

殺蠱毒破癥結通月經腹滿汗出立瘳崩中下漏即

止消皮膚風腫去腹臍白蟲產後血絞肚痛殊功惡

疰卒暴心痛捷效

**狼毒**味辛氣平有大毒出陝西郿州似商陸苗葉採

根八月肉白皮黃重實者良入水浮虛者劣使黑大

豆惡麥句薑破積聚痰癖癥瘕去惡瘡鼠瘻疽蝕逐

欬逆上氣殺蠱毒鬼精走獸飛禽亦堪殺害

羊脂即仙靈

即仙靈

味辛氣寒無毒莖細而堅葉圓而薄所在

俱有凌冬不凋俗呼爲三枝九葉草也但生處不聞

水聲者爲美凡採製須先酒浸過曝乾剉碎對拌羊

脂每斤用四兩火炒脂盡爲度羊食貪合故此著名治

男子絕陽不興治女人絕陰不產卻老景昏耄除中

年健忘益骨堅筋增力強志久服有損明載本經

味辛氣溫有大毒向陽山谷逢春則生起苗

一尺餘高結莖二月半後葉如桃葉深綠花似瓜花

正黃羊悞食之嚙躑而死故本經竟名羊躑躑今南

人又喚黃杜鵑依時採花陰乾入藥主風濕歲肌肉

裏澱澱痺麻治賊風在皮膚中淫淫掣痛鬼疰蠱毒

並卻瘟癘惡毒齊敵

**葶藶**

味辛苦氣寒有毒近道俱有深谷多生反芍藥

細辛及五參

人參沙參玄參丹參苦參

勿用惡大黃使黃連三月

採根陰乾去蘆微炒入藥專能發吐不用煎湯

惟作散用

主頭禿疥癬療腸癖瀉痢殺諸蟲除蠱毒去死肌愈

惡癰治喉痺不通理風痰上壅亦能醫馬塗解併敷

馬刀爛瘡

**葶藶**

音藶音藶

即天仙子

味苦甘氣寒有毒山谷各處生苗高

四尺許葉潤三指夏開白花實同罌子作房子如黍

米成粒五月收採向日曝乾主風癩癩狂瘰濕痺拘

急助足健行見鬼理齒蛀蝕出蟲久服輕身走及奔

馬炒熟方益生則瀉人別說云煮一二日尚入土萌芽用者尤宜審也

**續隨子**

一名千金子

味辛氣溫有毒苗如大戟葉中抽莖開

花黃小多層結實青而有殼人家亭園每種觀瞻又因秋種冬生春秀夏實故名曰拒冬實也用須取仁紙裹壓以重石去油復研成霜方可入藥宣一切宿滯積聚敷諸般疥癬惡瘡逐水利大小二腸散氣除心腹脹痛毆蠱毒鬼疰消痞癰疽癥通月經下痰飲不可過服防毒損人其**白**旋收敷白癩面疔即去

**芫花**

味甘辛氣平有小毒園圃中俱種胡地者益

良子如牛蟬色斑葉類火麻厚大得名由此其性善

收剥殼取仁脩製忌鐵鹽湯入砂鍋煮透半日撈起

以石臼搗糜用敷無名毒瘡吸出有形滯物刺骨立

起膿血盡追塗足心下胎孕子胞如神塗巔頂收生

腸脫肛甚捷塗口眼啞僻即牽正復元左患塗右見

効急除久則反損因性峻急故也亦堪服餌方法須

依毆卒仆風癩取仁一兩黃連切成豆粒一兩水一

週三日功夜為度取去黃連只用仁風乾不得見日

每仁一粒竹刀切四段每服五粒作二十段煎芥湯

送下食遠日三服不拘年消中滿水脹十年壯人水研

無沫旋加至二十粒煎逐尸疰惡氣又主寒熱風虛

服過者一生忌食豆入喉悞犯之頃刻作腹脹傾命

攝生之士不可不知。用榨取敷疥癩瘡癩。調銀硃可為印色。搗蒸敷脚氣風腫。剝額上即止。衄紅。油

煨驗

謨按病分血氣。藥別陰陽。丹溪云。蓖麻子屬陰。主吸出有形質之滯物。故取胎產胞衣剩骨膿血者。用之。荔枝肉屬陽。主散無形質之滯氣。故消瘤癧。赤腫者用之。苟不明此理。而錯用治。則不應也。

葶藶

味辛。氣大溫。無毒。出藩國中。旌竹林內。苗作叢

高二尺許。葉圓綠潤。一寸餘。五月開花。白色在表。七月結子。小指般長。秋末收。子陰乾。辛烈過於蒟醬。嶺南海舶貿易常多。老黑者不堪。紫褐者為上。消宿食。

下氣除胃冷溫中。痲痺陰疝痛並驅。霍亂冷氣痰立。却禁水洩虛痢。止嘔逆醋心。得訶子人參桂心乾薑。為丸。治臟腑虛冷。腸鳴洩痢神效。仍殺腥穢食味。堪調久服。走泄真陽。令人腸虛下重。根名黑硬。近似柴胡。能治諸勞傷。陰汗寒疝核腫。

**鬼白**

味辛。氣微溫。有毒。齊杭峽最多。深山陰地。絕

有。獨莖起土內。一葉豎莖端出。

狀如傘莖。一云葉六。且或五出。如鴈掌。

東向暮西傾。隨日出沒。枯一莖為一白。逐歲增添。每

長一莖。莖枯為一白。二十年則二十白也。要求真採之。勿買假誤也。垣表

所畏。制伏可資。辟瘟疫惡氣不祥。殺蠱毒鬼疰精物。

去目赤膚醫。療喉結風邪。不入湯煎。惟作散用。



**乾石**

味鹹氣寒。一云溫無毒。即地面青苔是也。滲濕

有背陰生。療心腹悶煩。研調水飲。治霍亂嘔吐。採煎

汁。嘗發諸般瘡疥。殺蟲。下一切丹石去毒。但服不可

過劑。令人少血痿黃。○生老屋上者名**石**。利膀胱

吊氣。及浮熱在皮膚間。○生古墻側者名**石**。主黃

疸。心煩。致蒸熱攻腸胃內。○**石**。生水石面。止洩痢

強胃氣。消穀溫中。○**石**。生土墻頭。涼骨蒸。止鼻

衄。敗毒。敗熱。○**石**。從井底覓。療水腫。漆瘡。熱瘡。○

**石**。向船底求。治五淋。鼻洪吐血。○**石**。生山石。去

小兒時熱驚癇。○**石**。生瓦溝。通女人經絡。閉澁

謹按至賤之類。如許之名。蓋因所附不同。以致主

療各異。瓦松雖則別種，亦由溼而生，故併錄之，以便查考。

**鬼督郵**

味辛苦，氣平，無毒。所在山谷，有必叢生。苗惟一莖，類小箭筈，葉出莖端，如繖，根橫而不發鬚，花開葉心，其色黃白。二月八月，用惟採根，甘草水煮一伏時，漉曝乾，任凡煎服。主鬼疰、卒忤、中惡及百精毒。去溫瘧，時行疫癘，併心腹邪，強脚胠，益腎力，腰腿諸疾，並可毆除。今醫不審其真，每每以徐長卿充代，乖戾殊甚。夫長卿赤箭，鬼箭雖皆有鬼督郵別名，而治大相異也。務辯的實，切勿混淆。

**蜀葵花**

味甘，氣寒，陰中之陽，無毒。即家園紅白葵花。

惟川蜀產者最勝。色因有二。治亦不同。紅葵花治赤

帶。赤痢如神。血燥兼治。白葵花。白帶白痢。速効。氣

燥亦。能催生。墮胎。更療淋澁。水腫。一切瘡疥。癰

毒。研末。俱可敷之。搗爛。貼金瘡。火瘡。又煮食。除熱

痢。丹痢。理惡瘡。散血。主客熱。通便。根莖共煮。汁

吞。即解。丹石熱結。黃蜀葵花。各種葉狹多缺而尖。

催生產。尤靈。敷金瘡。更驗。炒研。調酒。亦催產。捷方。

**大青**

味苦。氣大寒。無毒。多生。郡蜀濠淄。亦產江東州。

郡。葉綠似石竹。莖紫。花紅如馬蓼。根黃。入藥。用葉。煎

莖。春末夏初。收採。仲景書內。每每擅名。傷寒熱毒發

斑。有大青。四物湯。飲効。傷寒身強。脊痛。有大青。葛根

湯服靈。又單味夫青煎湯治傷寒黃疸天行時疫尤多用之。仍習腫。且鮮煩渴。○異種惟產福州。福土人用治癰瘡。取生搗敷上。

**甜瓜**

味苦氣寒無毒。一云有小毒。生平澤田野及籬

塹垣墻。一名土瓜。處處俱有。月令四月王瓜生。即此是也。作藤蔓發葉多刺微圓。逢夏至開花深黃單瓣。實結一二寸許成熟七八月間外殼紅黃如稻稜狀。中子紫赤似螳螂頭。採入醫方。兩用治小便數遺不祭潤心肺。鮮蠱毒。卻黃病黃疸。用子宜生。擦下。刺赤白雜來。歐腸風除肺癆止血溢血泄。用子須炒根搗汁去小兒閃癖痞滿及天行熱疾發狂痰癰暴。

生並可服也。但少爲奇。下服則根煎湯破。婦人血癥。堅癥。併撲損瘀血作痛。乳汁不下。俱當飲之。過多不  
妙。仍逐骨節中伏水。更消項頸上癭瘡。去濕痺。癢疼。  
散癰疽。焮腫。通經墮孕。益氣愈斲。

瘦