

金匱玉函經

重刻張仲景金匱玉函經序

金匱玉函經八卷漢張仲景論著王叔和所撰次也其標題蓋亦後人所加取珍秘之意仲景當漢季年篤好方術以拯天下其用心仁矣故自素難本草湯液諸書咸抉根得髓其為傷寒雜病論實為萬世羣方之祖自叔和尊尚以後年歲久遠錯亂放失者屢矣宋治平初命諸臣校定其

目有三曰傷寒論金匱方論一名金匱以玉函要畧

及此經是也雖未必盡復仲景本書之舊然一家之學粗完余幼讀二論精微簡要務令上口以通思索徧求是經獨不可得後檢鄱陽馬氏經籍考雖列其目而所引晁序則實金匱玉函要畧也則此經蓋自元時而不行于世矣歲壬辰義門何內翰以予粗習張書句讀手抄宋本見授拜受

卒業喜忘寢食惜其訛脫者多甚或不能以句既無他本可校乃博考衆籍以相證佐補亡滅誤十得八九稿凡數易而始可讀則掩卷而歎曰是可報命于內翰矣內翰嘗以古明醫多以醫案示人見愛過實囑刻其平生醫藥病狀之驗者予瞿然不敢當語云三折肱為良醫予雖老是然處方設劑吾斯未信因念是經世久未見而

內翰既得禁方不自秘匿雖古人尤難之
開以傳後其弘濟豈但一師之說哉夫岐
黃之書經也仲景之經律也臨證療疾引
經案律十不失一二論所述畧具矣是書
則兼綜兩者而整齊形證附類方藥各有
門部次第不可淆亂則知經又論之自出
尤醫門之金科玉條也八卷之中上順天
和以療人患非通三才之道而得徃聖之

心者不能觀者苟能潛心玩索而知其所
以則因病發藥應如桴鼓順之則能起死
畔之則立殺人先儒以孫思邈尚為粗曉
其旨得其書者未可謂不過與傷寒論及
要畧相出入而鹵莽治之也不揆淺陋願
與同志者熟讀而精思之

啓

康熙丙申陽月上海陳世傑書

重刻金匱玉函經序

吾宗懷三先生自幼學儒以多病廢遂篤嗜方書壯年由上海流寓吳門坐臥一閣近十年所手不釋卷帙精通諸禁方然未嘗以醫自夸所治輒效益務實不近名名久大震性高亮疎豁無軟熟態兩遊京師貴人爭迎之皆翩然謝歸出入里中乘壞肩輿有謁必往切脉診病其可藥與否常直言以對不爲挾要欺倖富貴人或

爲藥所誤垂死乃相招或投藥有起勢遽以庸醫間之先生益厭苦常謾語來者曰吾不能醫富貴人也儒門單戶有急相告卽毒熟巖凍隨早晚必赴愈不計其所酬薄厚其學長于仲景嘗謂綱要精微實軒岐之繼別而自晉唐以還名家撰論悉衍其緒故讀傷寒論及要略不但誦數悉能心知其意惟恨未見金匱玉函經市中見杜光庭所撰書標題恰同喜極購歸旣啟

乃知非是于是求之益亟義門何先生知先生
最深得宋抄本授之窮日夜校閱卽有脫誤以
他書是正歷三四寒溫而後可句尋考本序爲
宋館閣秘本元明以來相沿以要畧爲此經雖
丹溪之精通安道之淹貫蓋皆未見先生于是
刻而傳之間嘗語余黃岐之經義深以遠仲景
之書理切而要不深其書而求以通經如討源
而末有楫也然年久散失晦蝕于諸家之說多

矣故吾讀是書自成無已外注凡七十有二家皆皮而不觀懼文多而益昧其經爾今吾刻是幸其久未見不爲注所厖學者潛心刻意庶幾得之雖然其間條緒同于傷寒論者幾什之七懼或者之又畧而弗觀不知發凡起例仲景別有精義存焉讀論與畧者不可闕也余曰經晉之顯晦存乎其人仲景憫宗人之彫喪拯後世之夭橫其利溥矣是經不絕如綫而今章之其

用心既與古密契來者難誣其寶而傳之決也
則仲景一家之書自此大昭矣丙申長至後長
洲弟汝楫書

漢書藝文志載成帝之世詔李柱國技方
技劉氏七略有醫經七家二百一十六卷
經方十一家二百七十四卷其存於今獨
黃帝內經而已素問難經本草之屬皆見
於鄭荀經簿王阮志錄要之最為古書比
于六經繼出者東漢張仲景傷寒論西晉
王叔和撰次王禹經二書寔相表裏詳病
處方具有條理各詣其極乃方技中之論

語孟子書不得其門者末由語於生生也
隨書經籍志與唐宋藝文志卷目時有不
同然行於世者猶出宋治平間三館校定
可以據信吾友陳先生懷三研精覃思於
張王二書有年所矣遇疾危懸羣疑共却
必予全濟於是同術驚詫目為神奇不知
惟能熟復古賢方劑視證所宜不肯妄行
貄臆以人之寄命為戲剝爾以書考之一

一可覆也先生深閱其道之曠昧務思援
古正今謂傷寒論甚多有而金匱玉函經
幾無傳乃從藏書家訪求善本与遺中本
再三勘校重開以通流之蓋仁人之用心
也博與愛其禁而戒勿洩者殊絕矣昔東
垣李明之著傷寒會要書遺山元裕之為
之作序余無遺山之文辭而此書為醫學
之論語孟子其已試之效亦不假予言而

始張特重先生之用心可與進於孔孟之道也輒書其後蓋先生本儒者云
康熙丁酉正月義門何焯

校正金匱玉函經疏

金匱玉函經與傷寒論同體而別名欲人互相檢閱而爲表裏以防後世之亡逸其濟人之心不已深乎細考前後乃王叔和撰次之書緣仲景有金匱錄故以金匱玉函名取寶而藏之之義也王叔和西晉人爲太醫令雖博好經方其學專于仲景是以獨出於諸家之右仲景之書及今八百餘年不墜于地者皆其力也但此經

自晉以來傳之既久方證訛謬辨論不倫歷代
名醫雖學之皆不得彷彿惟孫思邈麤曉其旨
亦不能修正之况其下者乎國家詔儒臣校
正醫書臣等先校定傷寒論次校成此經其文
理或有與傷寒論不同者然其意義皆通聖賢
之法不敢臆斷故並兩存之凡八卷依次舊目
總二十九篇一百一十五方恭惟

主上大明撫運視民如傷廣頒其書爲天下生

生之具直欲躋斯民於壽域者矣治平三年正
月十八日太子右贊善大夫臣高保衡尚書員
外郎臣孫奇尚書司封郎中秘閣校理臣林億
等謹上

金匱玉函經目錄

卷一

疏序

證治總例

卷二

辨症溼渴第一

辨脉第二

辨太陽病形證治上第三

卷三

辨太陽病形證治下第四

辨陽明病形證治第五

辨少陽病形證治第六

卷四

辨太陰病形證治第七

辨少陰病形證治第八

辨厥陰病形證治第九

辨厥利嘔嘯病形證治第十

辨霍亂病形證治第十一

辨陰陽易差後勞復病形證治第十二

卷五

辨不可發汗病形證治第十三

辨可發汗病形證治第十四

辨不可吐病形證治第十五

辨可吐病形證治第十六

辨不可下病形證治第十七

辨可下病形證治第十八

卷六

辨發汗吐下後病形脉證第十九

辨可溫病形證治第二十

辨不可火病形證治第二十一

辨可火病形證治第二十二

辨不可灸病形證治第二十三

辨可灸病形證治第二十四

辨不可刺病形證治第二十五

辨可刺病形證治第二十六

辨不可水病形證治第二十七

辨可水病形證治第二十八

論熱病陰陽交併生死證第二十九

卷七

方藥炮製

桂枝湯方第一

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝二越婢一湯方第四

桂枝加桂湯方第五

桂枝加附子湯方第六

桂枝去芍藥湯方第七

桂枝去芍藥加附子湯方第八

桂枝去桂加茯苓白术湯方第九

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

第十

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方第十一

桂枝倍加芍藥湯方第十二

桂枝加大黃湯方第十三

桂枝人參湯方第十四

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

桂枝甘草湯方第十六

桂枝加葛根湯方第十七

葛根湯方第十八

葛根加半夏湯方第十九

葛根黃芩黃連湯方第二十

麻黃湯方第二十一

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃附子細辛湯方第二十四

麻黃連軺赤小豆湯方第二十五

麻黃升麻湯方第二十六

大青龍湯方第二十七

小青龍湯方第二十八

小建中湯方第二十九

小柴胡湯方第三十

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

柴胡桂枝湯方第三十二

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

大柴胡湯方第三十四

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十五

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

茯苓甘草湯方第三十九

五苓散方第四十

甘草乾薑湯方第四十一

芍藥甘草湯方第四十二

炙甘草湯方第四十三

甘草湯方第四十四

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

梔子豉湯方第四十六

梔子甘草豉湯方第四十七

梔子生薑豉湯方第四十八

梔子厚朴湯方第四十九

梔子乾薑湯方第五十

梔子黃檗湯方第五十一

卷八

小陷胸湯方第五十二

大陷胸湯方第五十三

大陷胸圓方第五十四

又大陷胸湯方第五十五

文蛤散方第五十六

白散方第五十七

大黃瀉心湯方第五十八

附子瀉心湯方第五十九

半夏瀉心湯方第六十

甘草瀉心湯方第六十一

生薑瀉心湯方第六十二

禹餘糧圓方 缺

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

旋覆代赭石湯方第六十四

瓜蒂散方第六十五

白虎湯方第六十六

白虎加人參湯方第六十七

桂枝附子湯方第六十八

术附湯方第六十九

甘草附子湯方第七十

芍藥甘草附子湯方第七十一

乾薑附子湯方第七十二

十棗湯方第七十三

附子湯方第七十四

大承氣湯方第七十五

小承氣湯方第七十六

調胃承氣湯方第七十七

桃仁承氣湯方第七十八

豬苓湯方第七十九

蜜煎導方第八十

麻子仁圓方第八十一

抵當圓方第八十二

抵當湯方第八十三

茵陳蒿湯方第八十四

黃連阿膠湯方第八十五

黃連湯方第八十六

桃花湯方第八十七

吳茱萸湯方第八十八

豬膚湯方第八十九

桔梗湯方第九十

苦酒湯方第九十一

半夏散方第九十二

白通湯方第九十三

白通加豬膽汁湯方第九十四

真武湯方第九十五

烏梅圓方第九十六

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

白頭翁湯方第九十八

黃芩人參湯方第九十九

黃芩湯方第一百

黃芩加半夏生薑湯方第一百一

理中圓及湯方第一百二

四逆散方第一百三

四逆湯方第一百四

通脉四逆湯方第一百五

人參四逆湯方第一百六

茯苓四逆湯方第一百七

通脉四逆加豬膽汁湯方第一百八

當歸四逆湯方第一百九

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

燒裯散方第一百十一

枳實梔子豉湯方第一百十二

牡蠣澤瀉散方第一百十三

竹葉石膏湯方第一百十四

麥門冬湯方第一百十五

附遺

金匱玉函經目錄

終

金匱玉函經卷第一

上海陳世傑懷三重校

漢仲景張機著

門人張邵煥有文參

晉王叔和撰次

平江余謙牧心恭重校

宋林億等校正

門人張嵩峻天閱

證治總例

夫二儀之內惟人最靈稟天地精英之氣故與
天地相參天生水剛柔漸形是以人之始生

先成其精腦髓旣足筋骨斯成皮堅毛長神舍
於心頭圓法天足方象地兩目應日月九竅應
九州四肢應四時十二節應十二月五藏應五
音六府應六律手十指應十干足十指莖垂應
十二支三百六十節以應一歲天有風雨人有
喜怒天有雷電人有音聲天有陰陽人有男女
月有大小人有虛實萬物皆備乃名爲人服食
五味以養其生味有所偏藏有所勝氣增而久

疾病乃成諸經藏中金木水火土自相尅賊地
水火風復加相乘水行滅火土救其母迭爲勝
負藏氣不精此爲害道不知經脈妄治諸經使
氣血錯亂正氣受刑陰陽不和十死一生經云
地水火風合和成人凡人火氣不調舉身蒸熱
風氣不調全身強直諸毛孔閉塞水氣不調身
體浮腫脹滿喘麤土氣不調四肢不舉言無音
聲火去則身冷風止則氣絕水竭則無血土敗

則身裂愚醫不思脈道反治其病使藏中金木水火土互相攻尅如火熾然重加以油不可不慎又使經脈者如流水迅急能斷其源者此爲上也

凡四氣合德四神安和人一氣不調百一病生四神動作四百四病同時俱起其有一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病難治難愈一百一病真死不治

問曰人隨土地得合陰陽稟食五穀隨時相將
冬得溫室夏遂清涼消沴調寒暑四季不遭傷
恐懼畏無時忽然致不祥肺魄不能靜肝魂欲
飛揚心神失所養脾腎亦乖方六府彷徨亂何
以致安康非鍼藥不定盍自究精詳答曰肝虛
則目暗其魂自飛揚肺衰則氣上其魄自掩藏
心虛則不定諸藏受速殃脾腎虛衰至內結作
癰瘡六府病蝟集諸脉失經常及時加鍼藥勿

使及淪亡

古者上醫相色中醫聽聲下醫診脈診候之法固是不易又云問而知之別病深淺命曰巧焉上醫相色知病者色脉與身形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生之類中醫聽聲知病者聲合五音火聞水聲煩悶驚悸木得金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物回助四傍善者不見惡則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六

識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診
脉知病者源流移轉四時逆順相害相生審知
藏府之微此爲妙也

夫診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未
進經脈未盛絡脈調勻氣血未亂精取其脉知
其逆順必察四難而明告之然愚醫不能如斯
逆四難而生亂階者此爲誤也

肝病治肺心病折腎其次取俞募不令流轉藏

府見肝之病當瀉肺金補肝木木子火爲父報仇故火尅金子病以母補之母病以子瀉之蓋云王者不受其邪而爲邪傳以得姦賊之侵病及於一藏之中五賊相害於彼前路當先斷之一藏不可再傷精神不中數勞次取俞募其令五邪氣當散去之

凡婦人之病比之男子十倍難治攷諸經言病本一體所以難治者婦人衆陰所集常與濕居

十五以上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿容月水去留前後交互瘀血停凝中路斷絕其中傷嘯不可具論生熟二藏虛實交錯惡血內漏氣脈損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或出行風來便利穴廁之上風從下入便成十二痼疾男子病者衆陽所歸常居于燥陽氣游動強力施泄便成勞損損傷之病亦衆多矣食草者力食穀者智食肉者勇以

金治金真得其真以人治人真得入神
凡欲和湯合藥灸刺之法宜應精思必通十二
經脈三百六十孔穴營衛氣行知病所在宜治
之法不可不通湯散丸藥鍼灸膏摩一如其法
然愚醫不通十二經脈不知四時之經或用湯
藥倒錯鍼灸失度順方治病更增他疾惟致滅
亡故張仲景曰哀哉烝民枉死者半可謂世無
良醫爲其解釋

吾常見愚人疾病有三不治重財輕命一不治
服食不節二不治信邪賊藥三不治若主候常
存形色未病未入腠理鍼藥及時服將調節委
以良醫病無不愈咸共思之又自非究明醫術
素識明堂流注者則身中榮俞尙不能知其所
在安能用鍼藥以治疾哉今列次第以示後賢
使得傳之萬世

張仲景曰若欲治疾當先以湯洗滌五藏六府

開通經脉理導陰陽破散邪氣潤澤枯槁悅人皮膚益人氣血水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用散散能逐邪風濕掉表裏移走居無常處者散當平之次當用丸丸能逐沉冷破積聚消諸堅癥進飲食調營衛能參合而行之者可謂上工醫者意也聖道非不妙愚醫不能尋聖意之要妙怨嗟藥石不治者此爲謬也非聖人之過也又能尋膏煎摩之者亦

古之例也虛則補之實則瀉之寒則散之熱則去之不虛不實以經取之虛者十補勿一瀉之實者瀉之虛實等者瀉勿太泄膏煎摩之勿使復也若虛者重瀉真氣絕實者補之重其疾大熟之氣寒以取之盛熱之氣以寒發之又不須汗下而與汗下之者此爲逆也仲景曰不須汗而強與汗之者奪其津液令人枯竭而死又須汗而不與汗之者使諸毛孔閉塞令人悶絕而

死又不須下而強與下之者令人開腸洞泄便溺不禁而死又須下而不與下之者令人心內懊憹脹滿煩亂浮腫而死又不須灸而強與灸之者令人火邪入腹干錯五藏重加其煩而死又須灸而不與灸之者使冷結重冰久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死又須珍貴之藥非貧家野居所能立辦由是怨嗟以爲藥石無驗者此弗之思也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升合消
滅之法則云何答曰凡草木有根莖枝葉皮毛
花實諸石有軟硬消走諸蟲有毛羽甲角頭尾
骨足之屬有須燒煉炮炙生熟有定一如後法
順方是福逆之者殃又或須皮去肉或去皮須
肉或須根去莖又須花須實依方揀採治削極
令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相
殺相惡相反相畏相得氣力有強有弱有君臣

相理佐使相持若不廣通諸經焉知草木好惡
或醫自以意加減更不依方分配使諸草石強
弱相欺勝負不順入人腹內不能治病自相鬪
爭使人逆亂力勝刀劍若調和得宜雖未去病
猶得利安五藏令病無至增劇若合治湯藥當
取井花水極令潔淨升斗勿令多少煮之調和
一如其法若合蜜丸當須看第七卷令童子杵
之極令細熟杵數千百下可至于萬過多益佳

依經文和合調勻當以四時王相日造合則所求皆得禳災滅惡病者得瘥死者更生表鍼內藥與之令服可謂千金之藥內消無價之病

夫用鍼刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩營衛常行勿失其理行其鍼者不亂乎心口如銜索目欲內視消息氣血不得妄行鍼入一分知天地之氣鍼入二分知呼吸之氣鍼入三分知逆順之氣鍼皮毛者勿傷血脉鍼

血脉者勿傷肌肉鍼肌肉者勿傷筋膜鍼筋膜者勿傷骨髓經曰東方甲乙木主人筋膜魂南方丙丁火主人血脉神西方庚辛金主人皮毛魄北方壬癸水主人骨髓志中央戊己土主人肌肉智鍼傷筋膜者令人悖視失魂鍼傷血脉者令人煩亂失神鍼傷皮毛者令人上氣失魄鍼傷骨髓者令人呻吟失志鍼傷肌肉者令人四肢不舉失智鍼能殺生人亦能起死人

凡用鍼之法補瀉爲先呼吸應江漢補瀉應星
斗經緯有法則陰陽不相干震爲陽氣始兌爲
陰氣終坎爲太玄華坤爲太陰精欲補從卯南
欲瀉從西北鍼入因日明鍼出隨月光夫治陰
陽風邪身熱脈大者以烽鍼刺之治諸邪風鬼
疰痛處少氣以毛鍼去之凡用烽鍼者除疾速
也先補五呼刺入五分留入十呼刺入一寸留
二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之

刺緩者淺內而疾發鍼刺大者微出其血刺滑者淺內而久留之刺澁者必得其脉隨其逆順久留之疾出之撫穴勿出其血刺諸小弱者勿用大鍼然氣不足宜調以甘藥餘三鍼者止中破癰堅痛結息肉也非治人疾也

夫用灸之法頭身腹背肩臂手足偃仰側其上中諸部皆是陰陽榮衛經絡俞募孔穴各有所主相病正形隨五藏之脉當取四時相害之脉

如浮沉滑澁與灸之人身有大小長短骨節豐
狹不可以情取之宜各以其部分尺寸量之乃
必得其正諸度孔穴取病人手大拇指第一節
橫度爲一寸四指爲一部亦言一夫又以文理
縫縱會言者亦宜審詳

凡點灸法皆取平正身體不得傾側寬縱縮狹
也若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立
灸之反此者不得其穴

凡諸言壯數者皆以中平論也若其人丁壯病重者可復一倍其人老弱病微者可復減半然灸數可至二三百也可復倍加火治之不然則氣不下沉雖焦而病不愈又新生小兒滿一朞以還者不過一七止其壯數多少隨病大小也凡灸須合陰陽九部諸府各有孔穴而有多少故頭背爲陽部參陰而少臂腳爲陽部亦參陰而少胸爲陰部參陽而少腹爲陰部亦參陽而

少此爲陰陽營衛經脈事也行壯多少在數人
病隨陰陽而灼灸之若不知孔穴勿妄灸之使
病增重又人體腰以上爲上部腰以下爲下部
外爲陽部內爲陰部營衛藏府周流名曰經絡
是故丈夫四十以上氣在腰婦人四十以上氣
在乳以丈夫先衰于下婦人先衰于上灸之生
熟亦宜撙節之法當隨病遷轉大法外氣務生
內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之

所注氣血精明三百六十五絡皆歸于頭頭者
諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂
灸過多傷神或陽精立精陰魄再卒是以灸頭
止得滿百背者是體之橫梁五藏之繫着太陽
之會合陰陽動發冷熱成病灸大過熟大害人
也臂脚手足者人之枝榦其神繫於五藏六府
隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經其
地狹淺故灸宜少過多則內神不得入精神閉

塞否滯不仁卽手臂不舉故四肢之灸不宜太
熟也然腹藏之內性貪五味無厭成疾風寒固
結水穀不消灸當宜熟若大杼脊中腎俞膀胱
八竅可至二百壯心主手足太陰可至六七十
壯三里太谿太衝陰陽二泉上下二廉可至百
壯腹上上管下管太倉關元可至一百壯若病
重者三復之乃愈耳若治諸沉結寒冷必灸之
宜熟量病輕重而攻治之表鍼內藥隨宜用之

消息將之與天同心百年永安終無橫死此要
畧說之非賢勿傳請秘而用之今以察色診脈
辨病救疾可行合宜之法并方藥共成八卷號
爲金匱玉函經其篇目次第列于卷首

金匱玉函經卷第一

終

金匱玉函經卷第二

辨痙溼暍第一

太陽病痙溼暍三種宜應別論以爲與傷寒相似故此見之

太陽病發熱無汗而反惡寒是爲剛痙

太陽病發熱汗出而不惡寒是爲柔痙

太陽病發熱其脉沉細是爲痙

太陽病發其汗因致痙

病者身熱足寒頭項強惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者爲痙

脊強者五痙之總名其證卒口噤背反張而瘛瘲諸藥不已可灸身柱大椎陶道

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痙葛根湯主之

剛痙爲病胸滿口噤臥不著席脚攣急其人必齦齒可與大承氣湯

痙病發其汗已其脉洽洽如蛇暴腹脹大者爲欲解脉如故反復弦者必痙

痙脉來按之築築而弦直上下行

痙家其脉伏堅直上下

夫風病下之則痙復發其汗必拘急

太陽病其症備身體強几几然脉沉遲此爲痙

括樓桂枝湯主之

痙病有灸瘡難療

瘡家雖身疼痛不可發其汗汗出則瘻
太陽病而關節疼煩其脉沉緩爲中溼
病者一身盡疼煩日晡卽劇此爲風溼汗出當
風所致也

溼家之爲病一身盡疼發熱而身色似熏黃也
溼家之爲病其人但頭汗出而背強欲得被覆
向火若下之蚤則噦或胷滿小便不利舌上如
胎此爲丹田有熱胸上有寒渴欲飲而不能飲

則口燥煩也

溼家下之額上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死

問曰病風溼相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨溜不止師云此可發汗汗之而其病不愈者何故答曰發其汗汗大出者但風氣去溼氣仍在是故不愈若治風溼者發其汗微微似欲出汗者則風溼俱去也

病身上疼痛發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其
脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒溼故
鼻塞內藥鼻中卽愈

溼家身煩疼可與麻黃湯加术四兩發其汗爲
宜慎不可以火攻之

風溼脉浮身汗出惡風者防已湯主之

太陽中熱渴是也其人汗出惡寒身熱而渴也

白虎湯主之

太陽中暎身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷
水水行膚中所致也瓜蒂湯主之

太陽中暎發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細芤
遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身卽
熱口開前板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫鍼
發熱益甚數下之則淋甚

辨脈第二

問曰脉有陰陽何謂也答曰脉大爲陽浮爲陽

數爲陽動爲陽滑爲陽沉爲陰澁爲陰弱爲陰
弦爲陰微爲陰陰病見陽脈者生陽病見陰脉
者死

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉自
浮而數能食不大便名曰陽結期十七日當劇
其脉自沉而遲不能食身體重大便反堅名曰
陰結期十四日當劇

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何也答曰陰

脉不足陽往從之陽脈不足陰往乘之何謂陽不足答曰假令寸口脉微爲陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒何謂陰不足答曰尺脉弱爲陰不足陽氣下陷入陰中則發熱

陽脈浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急

其脉沉者營氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也營氣微加燒鍼血留不行更發熱而燥煩也

脉藹藹如車蓋者名曰陽結也

脉纍纍如循長竿者名曰陰結也

脉聾聾如吹榆莢者名曰散也

脉聳聳如羹上肥者陽氣脫也

脉縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

脉綿綿如瀉漆之絕者亡其血也

脉來緩時一止復來名曰結脈來數時一止復

來名曰促脈陽盛則促陰盛則結此皆病脉

陰陽相搏名曰動陽動則汙出陰動則發熱形
冷惡寒者此三焦傷也若數脉見于關上上下
無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也

陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰與陽同等者
名曰緩也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不
移也脉緊者如轉索無常也

脉弦而大弦卽爲減大卽爲芤減卽爲寒芤卽

爲虛寒虛相搏脉卽爲革婦人卽半產漏下男子卽亡血失精

問曰病有戰而汗出自得解者何也答曰其脉浮而緊按之反芤此爲本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故當汗出而解若脉浮而數按之不芤此本不虛若欲自解但汗出耳卽不發戰也

問曰病有不戰而汗出解者何也答曰其脉大

而浮數故不戰汗出而解也

問曰病有不戰復不汗而解者何也答曰其脉自微此以曾發汗若吐若下若亡血內無津液陰陽自和必自愈故不戰不汗而解也

問曰傷寒三日其脉浮數而微病人身自涼和者何也答曰此爲欲解也解以夜半脉浮而解者濶然汗出也脉數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也

問曰脉病欲知愈未愈何以別之答曰寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解者此脉陰陽爲和平雖劇當愈

師曰立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濺濺然自出者明日便解矣何以言之立夏脉洪大一本作浮大是其時脉故使然也四時倣此

問曰、凡病欲知何時得、何時愈、答曰、假令夜半得病者、日中愈、日中得病者、夜半愈、何以言之、日中得病、夜半愈者、以陽得陰則解也、夜半得病、日中愈者、以陰得陽則解也、

夫寸口脉浮在表、沉在裏、數在府、遲在藏、假令脈遲、此爲在藏、

趺陽脉浮而濇、少陰脉如經、其病在脾、法當下利、何以知之、脉浮而大者氣實、血虛也、今趺陽

脉浮而澀故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脈
弦而浮緩見此爲調脈故稱如經而反滑數者
故知當溺膿也

寸口脉浮而緊浮卽爲風緊卽爲寒風卽傷衛
寒卽傷營營衛俱病骨節煩疼當發其汗也
趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮
則傷胃數則動脾此非本病醫特下之所爲也
營衛內陷其數先微脉反但浮其人必大便堅

氣噫而除。何以言之。脾脉本緩。今數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便堅。氣噫而除。今脉反浮。其數改微邪。氣獨留心中。則饑邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脉因前後度數如法病者。則饑數脉不時。則生惡瘡也。

師曰。病人脉微而澁者。此爲醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒而發熱。無休止。時夏月盛熱。而欲着複衣。冬月盛寒。而欲

裸其體所以然者陽微卽惡寒陰弱卽發熱醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷內以陽微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱內以陰弱不能勝熱故欲裸其體又陰脉遲澁故知亡血也

脉浮而大心下反堅有熱屬藏者攻之不令發汗屬府者不令洩數洩數則便堅汗多則熱愈

汗少卽便難。脉遲尙未可攻。

趺陽脈數微濶少陰反堅微卽下逆瀉卽躁煩少陰堅者便卽爲難汗出在頭穀氣爲下便難者令微溏不令汗出甚者遂不得便煩逆鼻鳴上竭下虛不得復還

脉浮而洪軀汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂此爲命絕未知何藏先受其災若汗出髮潤喘而不休此爲肺絕陽反獨留形

體如烟熏直視搖頭此爲心絕唇吻反青四肢
熱習此爲肝絕環口黧黑柔汗發黃此爲脾絕
溲便遺失狂語目反直視此爲腎絕又未知何
藏陰陽先絕若陽氣先絕陰氣後竭其人死身
色必青肉必冷陰氣先絕陽氣後竭其人死身
色必赤腋下溫心下熱也

寸口脉浮大醫反下之此爲大逆浮卽無血大
卽爲寒寒氣相搏卽爲腸鳴醫乃不知而反飲

之水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人卽餉
趺陽脉浮浮卽爲虛浮虛相搏故令氣餉言胃
氣虛竭也脉滑則爲曖此爲醫咎責虛取實守
空迫血脉浮鼻口燥者必劙

諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處食飲
如常者畜積有膿也

脉浮而遲面熱赤而戰惕者六七日當汗出而
解反發熱者差遲遲爲無陽不能作汗其身必

癢也

脉虛者不可吐下發汗其面反有熱色爲欲解不能汗出其身必癢

寸口脉陰陽俱緊法當清邪中上濁邪中下清邪中上名曰潔濁邪中下名曰渾陰中于邪必內慄表氣微虛裏氣失守故使邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強腰痛脰痠所謂陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣爲慄

足膝逆冷。溲便妄出。表氣微虛。裏氣微急。三焦相溷。內外不通。若上焦怫鬱。藏氣相熏。口爛食斷。若中焦不治。胃氣上衝。脾氣不轉。胃中爲濁。營衛不通。血凝不流。衛氣前通。小便赤黃。與熱相搏。因熱作使。游于經絡。出入藏府。熱氣所過。卽爲癰膿。陰氣前通。陽氣厥微。陰無所使。客氣內入。嘔而出之。聲喎咽塞寒。厥相追爲熱。所擁血凝。自下狀如豚肝。陰陽俱厥。脾氣孤弱。五液

注下若下焦不闔清便下重令便數難躋築湫
痛命將難全

脉陰陽俱緊口中氣出脣口乾燥蹉臥足冷鼻
中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以來其人
微發熱手足溫此爲欲解或到八日以上反大
發熱此爲難治設惡寒者必欲嘔腹痛者必欲
利也

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去人安

此爲欲解。若脈遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也。爲未解食自可者爲欲解。

病六七日手足三部脉皆至大煩口噤不能言其人躁擾此爲欲解若脉和其人大煩目重臉內際黃亦爲欲解。

脉浮而數浮卽爲風數卽爲虛風卽發熱虛卽惡寒風虛相搏則灑淅惡寒而發熱也。

趺陽脉浮而微浮卽爲虛微卽汗出

脉浮而滑浮卽爲陽滑卽爲實陽實相搏其脉數疾衛氣失度浮滑之脉數疾發熱汗出者此爲不治

脉散其人形損傷寒而欬上氣者死

脉微而弱微卽爲寒弱卽發熱當骨節疼痛煩而極出汗

寸口脉濡而弱濡卽惡寒弱卽發熱濡弱相搏藏氣衰微胷中苦煩此非結熱而反劫之居水

瀆布冷銚貼之陽氣遂微諸府無所依陰脉凝聚結在心下而不肯移胃中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒在心下當奈何

辨太陽病形證治第三

夫病有發熱而惡寒者發於陽也不熱而惡寒者發於陰也發于陽者七日愈發于陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽之爲病頭項強痛而惡寒

太陽病其脉浮

太陽病發熱汗出而惡風其脉緩爲中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆
其脉陰陽俱緊爲傷寒

傷寒一日太陽脉弱至四日太陰脉大

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲吐

酒客不可與桂枝湯得之則嘔。酒客不喜甘故也。

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳。

服桂枝湯吐者其後必吐膿血。

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難

四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之。

太陽病下之其脉促胸滿桂枝去芍藥湯主之。

若微惡寒者桂枝去芍藥加附子湯主之。

太陽病得之八九日如瘧狀發熱而惡寒熱多而寒少其人不嘔清便自調日二三發脈微緩者爲欲愈脉微而惡寒此陰陽俱虛不可復吐下發汗也面反有熱色者爲未欲解以其不能得小汗出身必當癢桂枝麻黃各半湯主之

太陽病初服桂枝湯反煩不解者當先刺風池風府却與桂枝湯卽愈

服桂枝湯大汗出若脉但洪大與桂枝湯若其

形如瘡。一日再發。汗出便解。宜桂枝二麻黃二
湯。

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解若脈洪大者
白虎加人參湯主之

太陽病發熱而惡寒熱多寒少脉微弱者此無
陽也不可復發其汗宜桂枝二越婢一湯

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗
心下滿而微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓

白术湯主之

傷寒脉浮自汗小便數頗微惡寒論曰心煩微惡寒兩脚攣急反與桂枝湯欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和讞語少與調胃承氣湯若重發汗復加燒鍼者四逆湯主之

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾

兩脰拘急而讞語。師言夜半手足當溫。兩腳當伸。後如師言。何以知之。答曰。寸口脈浮而大浮。卽爲風。大卽爲虛。風則生微熱。虛則兩脰攣其形象。桂枝因加附子於其間。增桂令汗出。附子溫經。亡陽故也。厥逆咽中乾煩躁。陽明內結讞語。煩亂更飲甘草乾薑湯。夜半陽氣還。兩足當熱。脰尚微拘急。與芍藥甘草湯爾。乃脰伸與承氣湯微溏。止其讞語。故知其病可愈。

太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之
太陽與陽明合病必自利葛根湯主之不下利
但嘔者葛根加半夏湯主之

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表
未解喘而汗出葛根黃連黃芩湯主之

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風
無汗而喘麻黃湯主之

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃

湯主之。

病十日已去。其脉浮細嗜臥此爲外解設胸滿
脅痛與小柴胡湯。脈浮者與麻黃湯。

太陽中風。脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出
而煩躁頭痛大青龍湯主之。若脉微弱汗出惡
風不可服。服則厥筋惕肉瞞此爲逆也。

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰
證者可與大青龍湯發之。

傷寒表不解心下有水氣欬而發熱或渴或利
或噎或小便不利小腹滿或微喘小青龍湯主
之

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已
而渴者此爲寒去欲解小青龍湯主之

太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝

湯主之

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴

杏仁湯主之

太陽病外證未解者不可下下之爲逆解外者宜桂枝湯主之

太陽病先發汗不解而下之其脉浮不愈浮爲在外而反下之故令不愈今脉浮故知在外當解其外則愈宜桂枝湯

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表候仍在此當發其汗服藥已微除其

人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之

太陽病脈浮緊發熱其身無汗自衄者愈

二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹

因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證

不罷不可下下之爲逆如此者可小發其汗設

面色緣緣正赤者陽氣怫鬱不得越當解之熏

之。當汗而不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中

乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出
不徹故也更發其汗卽愈何以知汗出不徹以
脉澁故知之

脉浮數法當汗出而愈若下之身體重心悸者
不可發汗當自汗出而解所以然者尺中脉微
此裏虛須表裏實津液自和卽自汗出愈

脉浮而緊法當身疼頭痛宜以汗解之假令尺
中脉遲者不可發其汗何以故此爲營氣不足

血氣微少故也

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯一云桂枝湯
脉浮而數者可發汗宜麻黃湯

病常自汗出者此爲營氣和衛氣不和故也營
行脈中爲陰主內衛行脈外爲陽主外復發其
汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣
不和也先其時發汗卽愈宜桂枝湯

傷寒脉浮緊不發汗因致畊者宜麻黃湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱未可與承氣湯
其小便反清此爲不在裏而在表也當發其汗
頭痛者必畊宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可與復
發汗宜桂枝湯

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽
自和者必自愈

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治之
其小便利必自愈

下之後發其汗必振寒脈微細所以然者內外
俱虛故也

下之後復發其汗晝日煩躁不得眠夜而安靜
不嘔不渴而無表證脈沉微身無大熱者乾薑
附子湯主之

發汗後身體疼痛其脈沉遲桂枝加芍藥生薑

人參湯主之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯

發汗過多其人父手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘草湯主之

發汗後其人臍下悸者欲作貢豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

發汗後腹脹滿厚朴生薑甘草半夏人參湯主

之

傷寒若吐若下若發汗後心下逆滿氣上衝胃
起卽頭眩其脈沉緊發汗卽動經身爲振振搖
茯苓桂枝白朮甘草湯主之

發其汗不解而反惡寒者虛故也芍藥甘草附
子湯主之不惡寒但熱者實也當和胃氣宜小

承氣湯

發汗若下病仍不解煩躁茯苓四逆湯主之

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠其人欲引水當稍飲之令胃中和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之

發汗後脈浮而數煩渴者五苓散主之

傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴者茯苓甘

草湯主之

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入卽吐此爲水逆五苓散主之

未持脉時病人久手自冒心師因教試令欬而不卽欬者此必兩耳聾無聞也所以然者以重發其汗虛故也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

發汗後水藥不得入口爲逆

發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣梔子甘草豉湯主之若嘔梔子生薑豉湯主之

發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之
傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此
爲未解梔子豉湯主之

傷寒下後煩而腹滿臥起不安梔子厚朴湯主
之

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩梔子乾
薑湯主之

凡用梔子湯證其人微溏者不可與服之

太陽病發其汗而不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞶而動振振欲擗地者真武湯主之

咽喉乾燥者不可發其汗

淋家不可發汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛不可攻其表汗出則癰

劙家不可攻其表汗出必額上促急而緊直視不能昫不得眠

亡血家不可攻其表汗出則寒慄而振

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼與禹
餘糧圓

病人有寒復發其汗胃中冷必吐衄

本發汗而復下之爲逆先發汗者治不爲逆本
先下之而反汗之爲逆先下之者治不爲逆
傷寒醫下之續得下利清穀不止身體疼痛急
當救裏後身疼痛清便自調急當救表救裏宜
四逆湯救表宜桂枝湯

病發熱頭痛脉反沉若不瘥身體更疼痛當救其裏宜四逆湯

太陽病先下之而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因致冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也裏未和然後復下之

太陽病未解脉陰陽俱停必先振汗而解但陽微者先汗之而解陰微者先下之而解汗之宜桂枝湯下之宜承氣湯

血弱氣盡。腠理開邪氣因入與正氣互相搏結於
脇下。正邪分爭往來寒熱。休作有時嘿嘿不欲
食飲。藏府相連其痛必下。邪高痛下故使嘔也。

小柴胡湯主之

服柴胡湯已渴者此爲屬陽明以法治之

得病六七日。脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三
下之不能食其人脇下滿痛面目及身黃頸項
強小便難與柴胡湯後必下重本渴飲水而嘔

柴胡湯不復中與也食穀者噦

中風五六日傷寒往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞堅或心中悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯主之

傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴小柴胡湯主之

傷寒陽脈澁陰脈弦法當腹中急痛先與小建

中湯不差卽與小柴胡湯主之

傷寒中風有小柴胡證但見一證便是不必悉具

凡柴胡湯證而下之柴胡證不罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

傷寒二三日心中悸而煩小建中湯主之

太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡證仍在先與小柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱

微煩者爲未解與大柴胡湯下之愈

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡發潮熱而
微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫
以圓藥下之非其治也潮熱者實也先再服小
柴胡湯解其外後以柴胡加芒硝湯主之

傷寒十三日過經而譏語內有熱也當以湯下
之小便利者大便當堅而反下利其脈調和者
知醫以圓藥下之非其治也自利者其脈當微

厥今反和者此爲內實也調胃承氣湯主之
太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者
卽愈其外不解尙未可攻當先解其外外解小
腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語一
身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之

傷寒腹滿而譫語寸口脈浮而緊者此爲肝乘
脾名曰縱當刺期門

傷寒發熱嗇嗇惡寒其人大渴欲飲酢漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫當刺期門

太陽病二日而反燒瓦熨其背而大汗出火熱入胃胃中水竭躁煩必當譏語十餘日振而反汗出者此爲欲解也其汗從腰以下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風大便堅者小便當數而反不數及不多大便已頭卓然而痛

其人足心必熱穀氣下流故也

太陽中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛卽欲劙陰虛小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譏語甚者至噦手足躁擾尋衣摸牀小便利者其人可治

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽驚狂臥起不安

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之
傷寒其脉不弦緊而弱者必渴被火必譫語弱
者發熱脉浮解之當汗出愈

太陽病以火熏之不得汗者其人必燥到經不
解必清血名火邪

脈浮熱盛而灸之此爲實實以虛治因火而動
咽燥必吐血

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛

逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋
血難復也

脈浮當以汗解而反灸之邪無從出因火而盛
病從腰以下必重而痺此爲火逆

欲自解者必當先煩乃有汗隨汗而解何以知
之脈浮故知汗出而解

燒鍼令其汗鍼處被寒核起而赤者必發貢豚
氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂枝

加桂湯

火逆下之因燒鍼煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣
湯主之

太陽傷寒加溫鍼必驚

太陽病當惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而
發熱關上脉細而數此醫吐之故也一日二日
吐之者腹中饑口不能食三日四日吐之者不
喜糜粥欲食冷食朝食夕吐以醫吐之所致也

此爲小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近衣此爲吐之內煩也

病人脈數數爲熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣微膈氣虛脉則爲數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下嘔嘔欲吐而又胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐

下者與調胃承氣湯不爾者不可與反欲嘔胸
中痛微溏此非湯證以嘔故知極吐下也

太陽病七八日表證仍在其脉微沉反不結胸
其人發狂此熱在下焦少腹當堅而滿小便自
利者下血乃愈所以然者太陽隨經瘀熱在裏
故也

太陽病身黃其脉沉結少腹堅小便不利爲無
血也小便自利其人如狂者血證諦也

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者爲
有血也當下之不可餘藥宜抵當圓

太陽病小便利者爲多飲水心下必悸小便少
者必苦裏急也

金匱玉函經卷第二

終