

金匱玉函經

金匱玉函經卷第七

方藥炮製

凡野葛不入湯入湯則殺人不謂今葛根也凡
半夏不咬咀以湯洗十數度令水清滑盡洗不
熟有毒也茱萸椒之類不咬咀生薑一筋出汁
三合半生薑皆薄切之乃擣絞取汁湯成乃熟
煮如升數無生者用乾者一兩當二兩附子大
黃之類皆破解不咬咀或炮或生皆去黑皮刀

剗取裏白者故曰中白用木芍藥剗去皮大棗
擘去核厚朴卽斜削如脯法桂削去皮用裏黑
潤有味者爲佳細辛斬折之麻黃亦折之皆先
煮數沸生則令人煩汗出不可止折節益佳用
桃核杏核皆須泡去皮乃熬勿取兩人者作湯
不熬巴豆去皮心復熬變色瞿麥小草斬折不
咬咀石葦手撲速吹去毛盡曝令燥復撲之不
盡令人淋藜蘆去頭毛葶藶皆熬黃黑色巴豆

桃仁杏仁皆不可從藥別擣令如膏乃稍納藥末中更下麤羅凡咬咀藥欲如大豆麤則藥力不盡凡煎藥皆去沫沫濁難飲令人煩膠乃成下去滓乃納之飴亦然凡圓藥膠炙之乃可搗用膠炙令盡沸凡搗圓藥欲各異搗藥有難易搗耳凡煮藥用遲火火駛藥力不出盡當以布絞之綿不盡汁也凡篩藥欲細篩篩訖更合治之和調蜜圓者益杵數爲佳凡散石藥以藥計

分之下絹篩佳散藥麤篩佳凡作膏欲生熟則力少

桂枝湯方第一

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘草 二兩
炙

生薑 三兩
切

大棗 十二枚
擘

右五味㕮咀三物水七升微火煮取三升去滓温服一升須臾飲熱粥一升餘以助藥力溫覆令汗出一時許益佳若不汗再服如前

又不汗後服當小促其間令半日許三服盡
病重者一日一夜服晬時觀之服一劑盡病
證猶在當復作服若汗不出者服之二三劑
乃解

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝

一兩十
六銖

芍藥

生薑

甘草

炙

麻黃

各一
兩

大棗

四枚

杏仁

二十
四枚

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去
上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合
本方二湯各三合併爲六合頓服今裁爲一
方

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝

一兩十
七銖

芍藥

一兩
六銖

麻黃

十六
銖

生薑

一兩
六銖

杏仁

十六
枚

甘草

一兩
二銖

大棗

五
枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫
內諸藥煮取二升去滓溫服一升本方桂枝
湯二分麻黃湯一分合爲二升分再服今合
爲一方

桂枝二越婢一湯方第四

桂枝

芍藥

甘草

麻黃

各十八銖

生薑

一兩三銖

大棗

四枚

石膏

二十銖

右七味，以水五升，先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取二升，去渣，溫服一升。本方當裁爲越脾湯。桂枝湯合之，飲一升，今合爲一方。桂枝湯二分，越脾湯一分。

桂枝加桂湯方第五

桂枝

五兩

芍藥

三兩

甘草

炙

二兩

生薑

二兩

大棗

十二枚

右五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升。

本方桂枝湯今加桂

桂枝加附子湯方第六

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩炙

生薑

三兩

大棗

十二枚

附子

一枚炮去皮破八片

右六味呖咀三物以水七升煮取三升去滓
溫服一升本方桂枝湯今加附子

桂枝去芍藥湯方第七

桂枝

三兩

甘草

二兩炙

生薑

三兩

大棗 十二枚

右四味咬咀以水七升煮取三升去渣温服

一升本方桂枝湯今去芍藥

桂枝去芍藥加附子湯方第八

桂枝 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

附子 一枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓温服

一升本方桂枝湯今去芍藥加附子

桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩

大棗

十二
枚

茯苓

白朮

各三
兩

右六味，㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，小便利，即愈。本方桂枝湯，今去桂，加茯

苓、朮。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方第十

桂枝

三兩

甘草

二兩
炙

生薑

三兩

蜀漆

三兩洗去腥

大棗

十二枚

牡蠣

五兩熬

龍骨

四兩

右七味咬咀以水八升先煮蜀漆減二升納諸藥取三升去渣溫服一升本方桂枝湯今去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣一法以水一斗二升煮取五升

桂枝加芍藥生薑人參湯方第十一

桂枝

三兩

芍藥

生薑

各四兩

甘草

二兩
炙

人參

三兩

大棗

十二
枚

右六味咬咀四味以水一斗一升煮取三升

去滓温服一升本方桂枝湯今加芍藥生姜

人參

桂枝倍加芍藥湯方第十二

桂枝

三兩

芍藥

六兩

生薑

三兩

甘草

二兩
炙

大棗

十二
枚

右五味咬咀以水七升煮取三升去滓温服

一升本方桂枝湯今加用芍藥

桂枝加大黃湯方第十三

桂枝 三兩

芍藥 六兩

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

大黃 三兩

右六味咬咀以水七升煮取三升去滓溫服
一升

桂枝人參湯方第十四

桂枝

甘草 炙各四兩

人參

白朮

乾薑

各三兩

右五味以水九升煮四味取五升去滓內桂更煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

桂枝 一兩

甘草

龍骨

牡蠣

熬各三兩

右爲末以水五升煮取二升去滓溫服八合日三服

桂枝甘草湯方第十六

桂枝 四兩

甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

桂枝加葛根湯方第十七

桂枝 三兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

葛根 四兩

右六味以水九升先煮葛根減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似

汗不須啜粥餘如桂枝法

葛根湯方第十八

葛根 四兩

麻黃

生薑 各三兩

桂枝

芍藥

甘草 各二兩

大棗 十二枚

右七味。㕮咀。以水一斗。先煮麻黃葛根減二升。去上沫。內諸藥。煮取一升。去滓。溫服一升。取汗。不須啜粥。

葛根加半夏湯方第十九

葛根 四兩

麻黃

生薑

桂枝

芍藥

甘草

各二兩

大棗

十二枚

半夏

半升洗

右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去

上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取汗

葛根黃芩黃連湯方第二十

葛根 半觔

甘草 二兩炙

黃芩

黃連

各三兩

右四味，咬咀，以水八升先煮，葛根減二升內諸藥，煮取二升，去滓，溫分服。

麻黃湯方第二十一

麻黃

三兩

桂枝

二兩

甘草

炙 一兩

杏仁

七十枚

右四味，咬咀，以水九升先煮，麻黃減二升，去上沫，內諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，溫。

覆出汗不須啜粥餘如桂枝法

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二

麻黃 四兩

杏子 五十枚

石膏 半觔碎
綿裹

甘草 一兩
炙

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫

內諸藥煮取二升去滓溫服一升

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃 二兩

附子 一枚泡去
皮破八片

甘草

二兩
炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫
內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

麻黃附子細辛湯方第二十四

麻黃

二兩

附子

一枚去皮破
作八片炮

細辛

二兩

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升

麻黃連軹赤小豆湯方第二十五

麻黃

連軹

生薑

各二兩

赤小豆

一升

杏仁

三十枚
去皮尖

甘草

一兩
炙

大棗

十二枚

生梓白皮

一升

右八味以潦水一斗先煮麻黃一二沸去上

沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升

麻黃升麻湯方第二十六

麻黃

二兩
半

升麻

當歸

各一兩
六銖

黃芩

萎蕤

知母

各十八銖

石膏

碎綿裹

甘草

炙

桂枝

芍藥

乾薑

白朮

茯苓

麥門冬

去心各六銖

右十四味，咬咀以水一斗先煮麻黃一二沸，去上沫，內諸藥，煮取三升，去渣，分溫三服，一飯間當出汗愈。

大青龍湯方第二十七

麻黃 六兩

桂枝 二兩

甘草 二兩
炙

石膏

雞子大
碎綿裹

杏仁

四十
枚

生薑

三兩

大棗

十二
枚

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆令汗出
多者溫粉撲之一服汗者停後服若復服汗
多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠

小青龍湯方第二十八

麻黃

芍藥

細辛

桂枝

乾薑

甘草

五味子

碎

半夏

各半升

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫
內諸藥煮取三升去滓溫服一升 渴者去
半夏加栝樓根三兩 微利去麻黃加薤花
如雞子熬令赤色 噎者去麻黃加附子一
枚炮 小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓

四兩 喘者去麻黃加杏仁半升 蕤花不
治利麻黃定喘今反之者疑非仲景意

小建中湯方第二十九

桂枝

甘草 炙

生薑

各三兩

芍藥

六兩

大棗

十二枚

膠飴

一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更
上火消解溫服一升嘔家不可服以甘故也

小柴胡湯方第三十

柴胡 半觔

黃芩

人參

甘草

生薑

各三兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右七味，咬咀，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煮，取三升，溫服一升，日三。若胸中煩，不嘔者，去半夏、人參，加枳實一枚。若渴者，去半夏，加人參、合前成四兩半。枳實根四兩。若腹中痛者，去黃芩，加芍藥三兩。若脅下

痞堅者去大棗加牡蠣四兩 若心下悸小

便不利者去黃芩加茯苓四兩 若不渴外

有微熱者去人參加桂三兩溫覆微發其汗

若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾

薑二兩

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

柴胡 半觔

桂枝 三兩

乾薑 二兩

甘草 二兩

牡蠣 二兩

栝蒌根 四兩

炙

熬

黃芩 三兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升溫服一升初服微煩復服汗出愈

柴胡桂枝湯方第三十二

柴胡 四兩

黃芩

人參

各一兩半

半夏 二合半

甘草 一兩炙

桂枝

芍藥

生薑 各一兩半

大棗 六枚

右九味以水七升煮取三升去滓溫服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

柴胡

四兩

黃芩

生薑

龍骨

人參

桂枝

牡蠣

熬

黃丹

茯苓

各一兩半

半夏

二合半

大棗

六枚

大黃

二兩

右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮

取二升去滓溫服一升本方柴胡湯內加龍

骨牡蠣黃丹桂茯苓大黃也今分作半劑

大柴胡湯方第三十四

柴胡

半觔

黃芩

三兩

芍藥

三兩

半夏

半升

生薑

三兩

枳實

四枚

大棗

十二枚

大黃

二兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎
取三升溫服一升一方無大黃然不加不
得名大柴胡湯也

柴胡加芒硝湯方第三十五

柴胡 二兩十
六銖 黃芩 一兩 人參 一兩

甘草 一兩
炙 生薑 一兩 半夏 五枚

大棗 四枚 芒硝 二兩

右七味以水四升煮取二升去滓分二服以

解為差不解更作服

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六

柴胡 二兩 黃芩 人參

甘草 炙 生薑 各十
八銖 半夏 五枚

大棗 四枚

芒硝 三合

大黃 四兩

桑螵蛸 五枚

右前七味以水四升煮取二升去滓下芒硝
大黃桑螵蛸煮取一升半去滓溫服五合微
下卽愈本方柴胡湯再服以解其外餘一服
加芒硝大黃桑螵蛸

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七

茯苓 半觔

桂枝 四兩

甘草 二兩
炙

大棗

十五枚

右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

茯苓

四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便卽利

茯苓甘草湯方第三十九

茯苓

三兩

甘草

炙 一兩

桂枝

二兩

生薑

三兩

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

五苓散方第四十

豬苓

十八銖

澤瀉

一兩六銖

茯苓

十八銖

桂

半兩

白朮

十八銖

右五味爲末以白飲和服方寸七日三服多

飲煖水汗出愈

甘草乾薑湯方第四十一

甘草 二兩
乾薑 二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升五合去滓
分溫再服

芍藥甘草湯方第四十二

芍藥 四兩
甘草 四兩

右二味咬咀以水三升煮取一升五合去滓

分温再服。

炙甘草湯方第四十三

甘草

四兩
炙

生薑

三兩

人參

二兩

生地黄

一觔

桂枝

三兩

阿膠

麥門冬

半升
去心

麻子仁

半升

大棗

三十
枚

右九味酒七升水八升煮取三升去滓內膠
烱盡温服一升日三服

甘草湯方第四十四

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓温服七
合日二服

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

厚朴

生薑

半夏

各半
觔

甘草 二兩

人參 一兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升去滓温服

一升日三服

梔子豉湯方第四十六

梔子

十四枚擘

香豉

四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得快吐止後服

梔子甘草豉湯方第四十七

梔子

十四枚擘

甘草

二兩

香豉

四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子甘草得二升半

內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服
得快吐止後服

梔子生薑豉湯方第四十八

梔子 十四枚擘

生薑 五兩

香豉 四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑得二升半
內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進一服
得快吐止後服

梔子厚朴湯方第四十九

梔子

十四枚擘

厚朴

四兩

枳實

四枚去穢炒

右三味以水三升煮取一升半去滓分爲二服溫進一服得吐止後服

梔子乾薑湯方第五十

梔子

十四枚擘

乾薑

二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分爲三服溫進一服得快吐止後服

梔子黃蘗湯方第五十一

梔子

十四枚擘

黃蘗

二兩十六銖

甘草

一兩炙

右三味咬咀以水四升煮取一升半去滓分

溫再服

金匱玉函經卷第七 終

金匱玉函經卷第八

小陷胸湯方第五十二

栝樓實

一枚

黃連

二兩

半夏

半升

右三味以水六升先煮栝樓取三升去渣內諸藥煮取二升去滓分溫三服

大陷胸湯方第五十三

大黃

六兩
去皮

芒硝

一升

甘遂

一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內

芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利
止後服

大陷胸圓方第五十四

大黃 半觔

葶藶

芒硝

杏仁 各半升

右四味搗和取如彈圓一枚甘遂末一錢七
白蜜一兩水二升煮取一升頓服一宿乃下
又大陷胸湯方第五十五

桂枝 四兩

甘遂 四兩

大棗 十二枚

栝樓實

一枚 四兩
去皮 人參

右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升
胸中無堅勿服之

文蛤散方第五十六

文蛤 五兩

右一味爲散沸湯和服一方寸匕

白散方第五十七

桔梗

貝母

各十八銖

芭豆

六銖去皮心熬黑

右三味爲散白飲和服強人半錢羸人減之
病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一
杯利過不止進冷粥一盃

大黃瀉心湯方第五十八

大黃

二兩

黃連

一兩

右二味咬咀以麻沸湯二升漬之須臾絞去
滓分溫再服

附子瀉心湯方第五十九

大黃 二兩

黃連

黃芩 各一兩

附子

一枚炮去皮
破別煮取汁

右四味，咬咀，三味以麻沸湯二升漬之，須臾絞去滓，內附子汁，分溫再服。

半夏瀉心湯方第六十

半夏 半升

黃芩

乾薑

甘草 炙

人參 各三兩

黃連 一兩

大棗

十六枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升温服一升日三服

甘草瀉心湯方第六十一

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升

黃連

一兩

大棗

十二枚

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

生薑瀉心湯方第六十二

生薑

四兩

人參

甘草

黃芩

各三兩

半夏

半升

乾薑

黃連

各一兩

大棗

十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

禹餘糧圓方

闕

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

赤石脂

一觔碎

禹餘糧

一觔碎

右二味以水六升煮二升去滓分溫三服

旋覆代赭石湯第六十四

旋覆花

三兩

代赭石

一兩

人參

二兩

大棗

十二枚

生薑

五兩

半夏

半升

甘草

二兩

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三

升溫服一升日三服

瓜蒂散方第六十五

瓜蒂 熬黃

赤小豆

各六銖

右二味各別搗篩爲散合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

白虎湯方第六十六

石膏

碎 一觔

知母

六兩

甘草

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

白虎加人參湯方第六十七

人參

三兩

石膏

一觔

知母

六兩

甘草

二兩

粳米

六合

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服

桂枝附子湯方第六十八

桂枝

四兩

附子

三枚

甘草

二兩

大棗

十五枚

生薑

三兩

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

朮附湯方第六十九

白朮

四兩

附子

三枚

甘草

三兩

生薑

二兩

大棗

十五枚

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服
一服覺身痺半日許再服如冒狀勿怪也卽
是附子與朮並走皮中逐水氣未得除故使
之耳法當加桂四兩其人大便堅小便自利
故不加桂也

甘草附子湯方第七十

甘草

炙 三兩

附子

炮 二枚

白朮

三兩

桂枝

四兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升
日三服汗出卽解能食汗止復煩者服五合
恐一升多者宜服六七合爲始

芍藥甘草附子湯方第七十一

芍藥

甘草

各一兩

附子

一枚炮

右三味咬咀以水三升煮取一升三合去滓
分溫三服

乾薑附子湯方第七十二

乾薑 一兩
附子 一枚

右二味以水三升煮一升頓服之

十棗湯方第七十三

芫花 熬

甘遂

大戟

右三味等分爲散以水一升半先煮棗十枚
取八合去滓內藥末強人一錢羸人半錢若
下少病不除明日加半錢

附子湯方第七十四

附子

二枚
炮

茯苓

三兩

人參

二兩

白朮

四兩

芍藥

三兩

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓溫服
一升日三服

大承氣湯方第七十五

大黃

四兩
酒洗

厚朴

半觔炙
去皮

枳實

五枚
炙

芒硝

三合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內

大黃煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩
沸分溫再服得下餘勿服

小承氣湯方第七十六

大黃

四兩

厚朴

二兩炙
去皮

枳實

三枚大
者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫
三服初服當更衣不爾盡飲之若更衣勿復
服

調胃承氣湯方第七十七

大黃

四兩清酒浸

甘草

二兩炙

芒硝

半升

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

桃仁承氣湯方第七十八

桃仁

五十枚去皮尖

大黃

四兩

桂枝

二兩

甘草

二兩炙

芒硝

二兩

右五味以水七升先煮四味取二升半去滓內硝更煮微沸溫服五合日三服微利

豬苓湯方第七十九

豬苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

碎各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠消盡溫服七合日三服

蜜煎導方第八十

蜜

七合

右一味內銅器中微火煎如飴勿令焦俟可

丸捻作挺如指許長二寸當熟作令頭銳內
穀道中以手急抱欲大便時乃去之

又大豬膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中
如一食頃當大便出宿食惡物

麻子仁圓方第八十一

麻子仁 二升 芍藥 半觔 大黃 一觔

厚朴 一觔 枳實 半觔 杏仁 一觔

右六味爲末煉蜜爲圓桐子大飲服十圓日

三服漸加以和爲度

抵當圓方第八十二

水蛭

二十箇熬

蝨蟲

二十箇

桃仁

三十箇
去皮尖

大黃

三兩

右四味杵分爲四圓以水一升煮一圓取七合服之、晬時當下血若不下更服

抵當湯方第八十三

水蛭

三十箇熬

蝨蟲

三十箇熬
去翅足

桃仁二十箇 大黃三兩
去皮尖 酒浸

右四味爲末以水五升煮取三升去滓溫服
一升不下再服

茵陳蒿湯第八十四

茵陳蒿 六兩 梔子 十四枚 大黃 二兩
去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味
煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂
角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

黃連阿膠湯方第八十五

黃連 四兩

黃芩 一兩

芍藥 二兩

雞子黃 二枚

阿膠 三兩

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

黃連湯方第八十六

黃連 二兩

甘草 炙一兩

乾薑 一兩

桂枝 二兩

人參 二兩

半夏 五合

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓分五服日
三服夜二服

桃花湯方第八十七

赤石脂

一觔一半全
用一半篩末

乾薑

一兩

粳米

一升

右三味以水七升煮米令熟去滓温服七合

內赤石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

吳茱萸湯方第八十八

吳茱萸一升洗人參三兩

生薑六兩

大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

豬膚湯方第八十九

豬膚 一觔

右以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和相得溫分六服

桔梗湯方第九十

桔梗 一兩

甘草 二兩

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服
苦酒湯方第九十一

雞子

一枚去黃內
苦酒於殼中

半夏

洗破如棗
核大十四

枚內若
酒中

右以雞子殼置刀環中安火上三沸去滓細
含嚥之不差更作

半夏散方第九十二

半夏

桂枝

甘草

炙各
等分

右三味各別搗篩合治之白飲和服方寸七
日三服若不能散服以水一升煎七沸內散
一二方寸匕更煎三沸下火令小冷少少嚥

之

白通湯方第九十三

蔥白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚生用
去皮破

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

白通加豬膽汁湯方第九十四

蔥白 四莖

乾薑 一兩

附子 一枚
生

人尿 五合

豬膽汁 一合

右以水三升煮一升去滓內人尿膽汁和相

得分温再服無膽亦可

真武湯方第九十五

茯苓

芍藥

生薑

各三兩

白朮 二兩

附子 一枚

炮

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合

日三服 若欬者加五味子半升細辛乾薑

各一兩 若小便利者去茯苓 若下利者

去芍藥加乾薑二兩 若嘔者去附子加生

薑足前成半觔

烏梅圓方第九十六

烏梅

三百箇

細辛

六兩

乾薑

十兩

黃連

一觔

當歸

四兩

附子

六兩炮

蜀椒

四兩去子

桂枝

六兩

人參

六兩

黃蘗

六兩

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿

去核蒸之五升米下飯熟取擣成泥和藥令

相得內曰中與蜜杵二千圓如梧桐子大先
食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷
滑物食臭等

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

乾薑

黃芩

黃連

人參

各三兩

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

白頭翁湯方第九十八

白頭翁

黃連

黃檗

秦皮

各三兩

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升
不愈更服一升

黃芩人參湯方九十九

黃芩

人參

桂枝

乾薑

各二兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取二升去滓分溫再服

黃芩湯方第一百

芍藥 二兩

黃芩

甘草 二兩

大棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升
日再服夜一服

黃芩加半夏生薑湯方第一百一

黃芩 三兩

芍藥

甘草 炙各二兩

大棗 十二枚

半夏 半升

生薑 一兩半

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

日再服夜一服

理中圓及湯方第一百二

人參

甘草

炙

白朮

乾薑

各三兩

右四味搗篩爲末蜜和圓如雞黃大以沸湯
數合和一圓研碎溫服之日三服夜二服腹
中未熱益至三四圓然不及湯湯法以四物
依兩數切用水八升煮取三升去滓溫服一

全圖三百卷
升日三服

加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

吐多者去朮加生薑三兩下多者還用朮

悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加朮足前成四兩半

腹中痛者加人參足前成四兩半

寒者加乾薑足前成四兩半

腹滿者去術加附子一枚

服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發
揭衣被

四逆散方第一百三

甘草

炙

柴胡

芍藥

枳實

炙各十分

右四味爲散白飲服方寸匕日三服 欬者

加五味子乾薑各五分并主久痢 悸者加

桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹痛者加附子一枚炮 泄利下重者先以水五升煮薤白三升取三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫再服

四逆湯方第一百四

甘草

二兩炙

乾薑

一兩半

附子

一枚生去皮破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服 強人可大附子一枚乾薑三兩

通脉四逆湯方第一百五

乾薑

三兩強
人四兩

甘草

二兩
炙

附子

大者一枚
生用破

右三味以水三升煮取一升二合去滓分温再服其脉即出者愈

面色赤者加葱九莖 腹中痛者加芍藥二

兩 嘔者加生薑二兩 咽痛者加桔梗二

兩 利止脉不出者加人參二兩

人參四逆湯方第一百六

人參 一兩

甘草 二兩

乾薑 一兩

附子 一枚

生

右四味以水三升煮取一升二合去滓分温

再服

茯苓四逆湯方第一百七

茯苓 四兩

甘草 二兩

乾薑 一兩

附子 一枚

生

人參 一兩

右五味咬咀以水五升煮取一升二合去滓

分温再服

通脉四逆加猪膽汁湯方一百八

乾薑

三兩

甘草

二兩
炙

附子

大者一
枚生

猪膽汁

四合

右三味以水三升煮取一升二合去滓内猪
膽汁分温再服

當歸四逆湯方一百九

當歸

桂枝

芍藥

各二
兩

細辛 一兩

大棗 二十枚

甘草 炙

通草 各二兩

右七味，咬咀，以水八升，煮取三升，去滓，溫服。

一升，日三服。

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

當歸

桂枝

芍藥

細辛

甘草 炙

通草 各三兩

大棗 二十枚

吳茱萸 二兩
生薑 半觔

右九味、咬咀以水四升、清酒四升、煮取三升、去滓、溫服一升、日三

燒裩散方第一百十一

右取婦人中裩、近隱處剪燒灰、以水和服、方寸匕、日三服、小便卽利、陰頭微腫、則愈、婦人病、取男子裩、當燒灰。

枳實梔子豉湯方第一百十二

枳實 三枚

梔子

十四枚

豉

一升

綿裹

右以清漿水七升空煎減三升內枳實梔子
煮取二升內豉更煮五六沸去滓分溫再服
取汗出若有宿食加大黃如博棊子大五六
枚

牡蠣澤瀉散方第一百十三

牡蠣 熬

澤瀉

栝蒌根

蜀漆 洗去腥

葶藶 熬

商陸根 熬

海藻

洗去鹹
各等分

右七味爲散白飲和服方寸匕小便利卽止
竹葉石膏湯方第一百十四

竹葉

二把

石膏

一觔

半夏

半升

人參

三兩

甘草

二兩炙

粳米

半升

麥門冬

一升去心

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮
米熟湯成去米溫服一升日三服

麥門冬湯方第一百十五

麥門冬

七升

半夏

一升

人參

二兩

甘草

二兩炙

粳米

三合

大棗

十二枚

右六味以水一斗六升煮取六升溫服一升
日三夜一服

附遺

調氣飲 治赤白痢小腹痛不可忍下重或面

青手足俱變者用黃蠟三錢阿膠三錢同溶

化入黃連末五錢攪勻分三次熱服神妙

猪肚黃連丸 治消渴飲水用雄猪肚一枚入

黃連末五兩枯樓根白梁米各四兩知母三兩麥門冬三兩縫定蒸熟搗丸如梧子大每服三十九米飲下

青木香丸 主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩擣篩糖和丸梧子大每空腹酒下三十九日再其效尤速

治五噎吐逆心膈氣滯煩悶不下用蘆根五兩

到以水三大盞煮取二盞去渣溫服

治小兒羸瘦用甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆
大每溫水下五九日二服

治小兒撮口發噤用生甘草二錢半水一盞煎
六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中

治小兒中蠱欲死者用甘草五錢水二盞煎五
分服當吐出

金匱玉函經卷第八 終