

活

人

書

活人書卷第十二

此一卷說藥證并藥方加減法所謂藥證者藥方前有證也如某方治某病是也傷寒有證異而病同一經藥同而或治兩證類而分之參而伍之審知其證者某經之病某湯者某證之藥然後用之萬全矣又况百問中一證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡湯生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘粮湯桂枝人參湯之類雖均是

少作仔

梨萬發
熟中寒

治下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以對治之則無不中美所謂藥方并加減法者仲景傷寒方一百一十三道病與方相應乃用正方稍有差別即隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳爲名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取効速一服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓

辨作仔木
治燥

利水故腎氣動者去白术小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病湏是隨證加減今於逐方下說病證用藥加減庶幾脩合之際便見治法更古方凡稱㕮咀者直云剉如麻豆大云一升者只用一大白盞以古准今易曉而通用也尋常疾勢輕者只抄龜末五錢七水一盞半入葛葉煮七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古劑法古之三兩即今之一兩也二兩即今之六錢半也古之三升即今之一升也斟酌大者只合三分之一足矣

桂枝湯

太陽中風陽浮陰弱發熱汗出惡寒鼻鳴

乾嘔者宜服之○太陽病頭痛發熱汗出惡風者宜服之○太陽病下之後其氣上衝者宜服之○桂枝本爲解飢若脈浮緊發熱汗不出者不可與之○太陽病服桂枝湯煩不解先刺風池風府却與桂枝湯○服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯若形似瘧一日再發者宜桂枝二麻黃一湯○服桂枝湯大汗出大煩渴不解脉洪大者白虎加人參湯主之○服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白术湯主之○
傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒腳掣急與桂
枝湯得之便厥咽乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之
厥愈更作芍藥甘草湯與之其脚伸若胃氣不和與
調胃承氣湯若重發汗加鍼針者四逆湯主之○太
陽病外證未解脉浮弱者當以汗解宜服○太陽病
外證未解不可下也下之爲逆解外宜服○太陽病
先發汗不解復下之脉浮者不愈汗爲在外而反下
之故今不愈今脉浮故知在外當湏解外則愈宜服

別作情
熱

○病常自汗出者此爲榮氣和。榮氣和者外不諧也。
以衛氣不共榮氣諧和故爾。以榮行脈中。衛行脈外。
復發其汗。榮衛和則愈。宜服○病人藏無他病。時發
熱。自汗出而不愈者。衛氣不和也。先其時發汗。則愈。
宜服○傷寒不大便六七日頭痛有熱。與承氣湯小
便清者知不在裏。當發汗。宜服○傷寒發汗。解半日
許。復熱煩浮數者可更發汗。宜服○傷寒。證下之清
穀。不止身疼痛急當。收裏後。身疼痛清便自調。急當
收表。收裏宜四逆湯。收表宜桂枝湯○太陽病發熱。

浮此上當
有脉字

汗出柴弱衛強故使汗出欲收邪風宜服○傷寒大
下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞先解表裏解
乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大黃黃連瀉心湯
○太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈
其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹
急結者乃可攻之宜桃核承氣湯其解外宜服已上屬少陰
○陽明病脉遲汗出多微惡寒表未解宜服○病
人煩熱汗出鮮如灑狀日晡發熱脉實者宜大承氣
湯脈浮虛者宜服已上屬陽明○太陰病脉浮可發汗宜

服屬太陰○下利腹脹滿身疼痛者先溫裏乃攻表溫

裏宜四逆湯攻表宜服屬厥陰○吐利止身痛不休宜

桂枝湯小和之

屬霍亂

桂枝

芍藥

各三兩

甘草

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生薑五片棗子二枚煮至一盞去滓溫服湏臾微熱稀粥一盞以助藥力溫覆令一時許遍身熱微似有汗者佳○法加減桂枝湯自西北二方居人四時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之自春末

竹葉三
附子十二
砂七升
豉三升服

及夏至已前桂枝證可加黃芩一分調之陽旦湯
夏至後有桂枝證可加知母半兩石膏一兩或加
升麻一分若病人素虛寒者正用古方不在加減
也○戒曰桂枝最難用雖云表不解脈浮可發汗
宜桂枝湯湏是病人常自汗出小便不數手足溫
和或手足指稍作微冷少頃却溫身雖微似煩而
又增寒始可行之若病人身無汗小便數或手足
冷不惡寒或飲酒家不喜甘者慎不可行桂枝也
仍有桂枝證服湯已無桂枝證者尤不可再與

桂枝麻黃各半湯

〔目〕太陽病得之八九日如瘧狀發

熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自利一日二三

度發脈微緩者爲欲愈也脈微而惡寒者有此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必痒宜服

〔溫病太陽〕

桂枝

芍藥

甘草

〔炙各八錢〕

麻黃

〔半兩湯泡焙杵〕

杏仁

〔十二箇湯浸去皮尖兩入不用〕

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

〔又見辨誤〕

桂枝
一兩十六錢
芍藥
一兩十六錢
黃芩
二兩杏仁
四箇生薑
兩根蜜四
枝水半升水
煎

以升八合
版谷據此

考藥其當
用五穀

別服者
病入手太陽

桂枝二麻黃一湯

三

服桂枝湯大汗出脈洪大者與

桂枝湯如前法若形似瘧一日再發者汗出必暯宜

服屬太陽

桂枝

八錢

芍藥

五錢

杏仁

八箇沸湯
浸去皮尖

甘草

二分

麻黃

三錢一字湯泡

去黃汁培乾研

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服以微汗爲度

竟日

桂枝二越婢一湯

四

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈

微弱者此無陽也不可發汗宜服之

屬太陽

生薑一升
再加桂枝
滑石三錢

桂枝二兩
芍藥三兩
甘草二兩
麻黃一兩
水一升
生薑一升
黃肉半斤

升火

生薑一升

六錢半斤

黃柏四錢

三兩半錢

用五錢半

仙桂半錢

桑葉一錢半

八錢有零

四錢麻豆半

八錢生薑

兩三錢葛根

水半升者

據紫石膏

三分服一升

仲景水八升

半升

桂枝

芍藥

甘草

各半兩

石膏

六錢
並碎

麻黃

半兩
湯泡去
黃汁焙乾研

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服又見韓誤

桂枝加桂湯

燒針令其汗針處被寒核起而赤者

必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯與

此藥湯

屬太陽

桂枝

五兩

芍藥

三兩

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半升者

枝水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝湯加桂以桂能泄奔豚氣也

桂枝加附子湯

大

太陽病發汗遂漏不止其人惡風

小便難四支微急難以屈伸者宜服之

屬太陽

桂枝

去皮

芍藥各

兩半

甘草

一兩

附子

炮去皮用半個

右剉好麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枝水一盞半煮至八分太津溫服

桂枝去芍藥湯

七

太陽病下之後脉促脅滿者宜服

之屬太陽

桂枝

一兩半去皮

甘草

一兩

仲景桂枝
三兩甘草

升

桑根三兩
附子一枚
生薑三兩
秦艽十二根
水八升取
三升服一

二兩生薑
三兩桑子

二枚水七升
取三升

一升

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

芍藥味酸厥促胃滿恐成喘嘯

故去芍藥佐則早用
辛甘發微毒氣也

桂枝去芍藥加附子湯

八太陽病下之後脉促脅痛

者桂枝去芍藥湯主之若微寒者宜服之

屬太陽

桂枝

一兩半去皮

甘草

一兩炙

附子

去皮用半箇炮

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服小便利即愈

桂枝去桂加茯苓白朮湯

九

服桂枝湯或下之仍頭

桂枝去桂加茯苓白朮湯

二枚水七升
取三升

服一升

桂枝去桂加茯苓白朮湯

二枚水七升
取三升

服一升

項強痛翕翕發熱無汗心下滿微疼小便不利者此

主之

屬太陽

芍藥

茯苓

白术

各二兩半

甘草

一兩

本付芍藥
三兩
白术三兩
甘草一兩
水八升取
三升服一升

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分本淬溫服小便利即愈

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主傷寒脉浮
醫火劫之亡陽必驚狂卧起不安者此主之

屬太陽

桂枝

蜀漆

各一兩半

甘草

一兩

牡蠣

二兩

龍骨

二兩

仲景桂枝
蜀漆三兩
甘草二兩
牡蠣五兩

葛根四兩

生薑三兩

桑十二枝

水一斗二升

升煮蒸減

二升內取

取三升服

一升

仲景方桂

枝三兩人

參三兩芍

棗四兩甘

草二兩生

薑四兩桑

十二枝桂湯

桂枝湯法

此主之

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一
枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

十二

發汗後身疼痛

脈沉遲者此主之

屬太陽

桂枝

人參

各二兩半

芍藥

二兩

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加芍藥湯

十二

太陽病下之因腹滿痛屬太陰

仲景方生

臺三兩桑

十二枚桂枝湯

法

桂枝三兩

甘草二兩

芍藥六兩下利者先

煎芍藥三四沸

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

桂枝加大黃湯

十三

太陽病反下之因腹滿痛屬太

陰桂枝加芍藥湯主之大實痛者此主之

桂枝六分

去皮芍藥三兩

甘草一兩

大黃二兩

痛甚者加大黃

大實痛者加大黃兩半羸者減之一

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓溫服

又見辨誤

七升取三
十二枚水
黃一兩生
薑三兩
臺三兩桑

十二枚桂枝湯

仲景方生
桂枝湯

桂枝三兩

桑白皮三兩

大黃六兩

草二兩大

黃一兩生

薑三兩

臺三兩桑

升服一升

日三服此

大黃當用

一兩

倍景方桂

桂一兩甘

草牡蠣龍

骨二兩爲

水五升

取二升半

服八合日

三

悸欲得按者此主之

屬太陽

桂枝二兩

去皮

桂枝一兩

去皮

桂枝二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

火逆下之因燒針煩躁

者此主之

屬太陽

桂枝半兩

桂草炙

牡蠣熬

龍骨各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服

桂枝甘草湯

十五

發汗過多其人又手自冒心心下

悸欲得按者此主之

屬太陽

仲景方桂

瓦臼砌生

生升氣水

桂枝附子

湯今後改而

去蓋重固體

之仲景方

桂枝附子

湯附子鹽

三兩桂枝

兩東方桂枝

水火并取五

桂枝附子

桂枝加葛根湯

十八

太陽病項強几几反汗出惡風

者此主之

伊尹湯液論桂枝湯中加
葛根今監本用麻黃誤矣

桂枝

甘草

芍藥

各六錢

葛根

一兩

麻黃

一兩
錢本無

葛根三兩
鹽本無

葛根三兩
鹽本無

便鞭小便自利者去桂加白朮湯主之

屬太陽

桂枝

二兩若大使鞭小便自利者去桂加白朮三兩

附子

一箇半炮去皮

甘草

一兩炙

二枚水八升
先著根減

二升內諸藥
皆升服可

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一
枚水一盞半煮至八分去滓服覆取微汗

桂枝加厚朴杏子湯十九太陽病下之微喘者表未

解散也此主之

屬太陽

桂枝

去皮

芍藥

各一兩

甘草

六錢三字炙

杏仁

去皮尖十七箇

厚朴

去皮薑汁炙六錢三字

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一
枚煮至八分去滓溫服覆取微汗

麻黃湯三十太陽病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘

仲景方於桂枝湯方
加厚朴
二兩杏仁
五十箇餘
以前法

者宜服○太陽陽明合病喘而胃滿不可下宜服○
太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胃
滿者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與服之○太陽
病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在
此當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄
衄乃解所以然者陽氣重故也此主之○傷寒脉浮
緊不發汗因衄此主之已上屬太陽○陽明病脉浮無汗
而喘發汗則愈宜服○脉但浮無餘證者與服若不
溺腹滿加嘔者不治

已上屬太陽

仲景方四
草一两桂

桔梗二两杏仁

仁七十粒

甘草半两

半两

桂枝一两

一两

杏仁三十五粒

三十粒

去皮尖

麻黄一两

去节去黄

汁焙乾研

研末

加沸湯

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服覆取微汗不須歇粥

加減傷寒熱病

藥性湏涼不可太溫夏至後麻黃湯須加知母半

兩石膏一兩黃芩一分益麻黃湯性熱夏月服之

有發黃班出之失惟冬及春與病人素虛寒者乃

用正方不在加減

麻黃杏子甘草石膏湯

三十三

發汗後不可更行桂枝

湯汗出而喘無大熱者可與此服之

屬太陽

甘草

一兩
炙

石膏

四兩
碎
搗爛
水一升半

杏人

二十五個
去皮尖

麻黃

二兩
去黃
汁
焙乾
秤

分去滓溫服

麻黃附子、甘草湯

廿三

少陰病得之二三日可與此

藥微發汗以二三日無證故微發汗也

屬少陰

麻黃

二兩
去黃
汁
焙乾
秤

甘草

二兩

附子

一枚
皮破八片

傷寒方水
七升先煮

麻黃一兩

沸內藥取

升日三
三升服一

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服相次三兩服以身微汗爲度

麻黃細辛附子湯

廿三少陰病始得之反發熱脈沉

者此主之

陰少

麻黃

二兩去節湯泡
去黃汁焙乾秤

細辛

二兩

附子

一枚炮去皮破八片

傷寒方水
一斗先煮
麻黃減二升
內藥取
三升服一升日三

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃連翹赤小豆湯

廿四傷寒瘀熱在裏身必黃此

主之

麻黃湯

麻黃

一兩去節湯泡
去黃片焙乾秤

甘草

一兩
炙

赤小豆

半升

杏仁

二十枚去皮尖

生梓白皮

切二兩

連翹

兩連翹根是

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚
水一盞半煮至八分去滓溫服

麻黃升麻湯

三十五

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲

手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止
麻黃升麻湯

三十五

內藥取三升分三服

半日服盡
通下作丸

者爲難治此主之

葛根

兼方三

作十八

炮一
分作
六錠水一
斗先煮熟
黃一兩沸

炮一分作
六錠水一
斗先煮熟
黃一兩沸

六錠水一
斗先煮熟
黃一兩沸

升分三服
湘去如故
三斗米項

今鹽

麻黃

二兩半去節湯泡
去黃汁焙乾秤

升麻

當歸

各一分

知母

黃芩

萎蕤

各三分

芍藥

麥門冬

去心灸

桂枝

去皮一分

茯苓

甘草

炙一分

乾薑

炮一分

石膏

碎絲

白朮

各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服相次一炊久進一服汗出愈

葛根湯

三十六

太陽病項背強几几無汗惡風又太陽

與陽明合病者必自利此並主之

屬太陽

仲景方草
根四兩桂

板耳草芳
桑子兩麻

資三兩桂
十二枝水

一斗煮葛
根麻黃減

二升內藥
取三升服

一升

仲景方草
根四兩桂
夏半升桂
草桂根草
桑子兩麻
黃三兩桂

者此主之

屬太陽

葛根

四兩或作一兩

半夏

六錢一字

麻黃

三分去節湯泡去黃汁焙乾秤

甘草

炙

桂枝

去皮

芍藥

各半

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

芍藥

各一兩

麻黃

一兩半去節湯泡去黃汁焙乾秤

葛根

二兩

桂枝

去皮

炙

三升水

一斗者麻
葛根二升

肉桂取三

升服一升

葛根芩芩黃連湯三十八 太陽病桂枝證醫及下之利遂不止脈促者表未解也喘而汗出者此主之

葛根

四兩

黃芩

一兩

黃連

六兩或作半

甘草

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服日進二三服

小柴胡湯三十九

外已解設肩滿痛與服脉但浮者與麻黃湯○傷寒

四兩取二升
八升者取三升
六升者取二升
四升者取一升

五六日中風往來寒熱。胃脹苦痛，默不欲食。心煩喜嘔，或胃煩而不嘔，或渴或腹中痛，或脇下痞鞀，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微熱，或欬者，此主之。
○血弱氣虛，腠理開邪氣，因入與正氣相薄，結於脅下，邪正分爭，往來寒熱，休作有時，默默不欲飲食，藏府相連，其痛必下，邪高痛下，故使嘔也。此主之。
○服柴胡湯已渴者，屬陽明以法治之。
○傷寒四五日，身熱惡風，頸項強脹，下滿手足溫而渴者，此主之。
○傷寒陽脉濶陰脉弦法，當腹中急癢，先與小建中湯，不

差者此主之○太陽病過經十餘日發汗吐下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡嘔不止心下急鬱鬱微煩看爲未解也與大柴胡湯下之即愈○婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使如瘧狀此主之○傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿不欲食大便鞭脈細者爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在表也脉雖沉緊不得爲少陰

病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也
可與服此設不了了者得屎而解○傷寒五六日嘔
而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在
者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却
發熱汗出而解若心下滿而轉痛者此爲結膾也大
陷膾湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之
宜半夏瀉心湯已上屬太陽○陽明病發潮熱大便溏小
便自可膾腸滿不去者與服之○陽明病膾下轉滿
不大便而嘔舌上白胎者可與服之上焦得通津液

得下胃氣因和身戢然汗出而解○陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿腸下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時嘯耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者與此藥主之

已上屬陽明

○太陽病不解轉入少陽脇下

鞭滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下或並兼者此

主之若已吐下發汗溫針讞語小柴胡湯證罷此爲壞證知犯何逆以法治之

已上屬少陽

○嘔而發熱者宜

服

屬厥陰

○傷寒差已後更發熱此主之脉浮者以汗

解之脉沉實者以下解之

後勞復病脉證

黃大

一兩半若腹中癟者去黃芩加芍藥一兩半芍藥或作三分若心下悸小便不利宿

去黃芩加
茯苓二兩

人參

一兩半若不渴外有微熱者去人參加桂枝一兩半溫覆微汗愈若欬嗽者去人參

兩
一

子加五味子一
分乾薑一兩

桌子

六枚若腸下病輕去棗子加
牡蠣二兩熬牡蠣成作一兩

半夏

一兩一分湯洗若胃中煩不唱者去半夏人參加括樓實一枚用四分之一若渴者

三
半

夏更加人參
括樓根二兩

此
柴胡

去蘆

右剉如麻豆大每服水七生薑四片棗子三
枚水一盞半煮至八分去滓溫服日三服

活人書卷第十二

活人書卷第十三

大柴胡湯

三十

太陽病過十日發汗吐下之後四

五日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止一云呕止小安

心下急鬱鬱微煩者爲未解也與大柴胡湯下之則愈

○傷寒十餘日熱結在裏往來寒熱者與服○傷寒

發熱汗出不解心中痞鞕嘔吐而下利者此主之上已

屬太陽○陽明病汗多者急下之宜服○少陰病下利

清水心下痛口乾者可下之宜大柴胡大承氣湯○

病腹中滿痛此爲實當下之宜大承氣大柴胡湯○

腰滿不減減不足言當下之宜大柴胡大承氣湯○
傷寒後脉沉者內實也下之解宜服○傷寒六七日
目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者實
地急下之宜大承氣大柴胡湯○太陽病未解脉陰
陽俱停必先振慄汗出而解但陰脉微者下之而解
宜服○病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者可
下之大柴胡湯主之○病人煩熱汗出則解又如瘧
狀日晡所發熱者屬陽明脉實者可下之大柴胡大
承氣湯主之

屬可下病脉證

卷之三

半斤黃芩

芩方藥三

兩半黃芩

升枳實四

於生薑五

兩薑子十

二枚水一

斗二升取

再煎取一

升日三

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

名一
兩半

一兩一
分洗

枳實

二枚去殼

炒千金

雲根

四片

去殼一分

準二枚

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服以利爲度未利

再服本方無大黃欲下者加大黃一兩

柴胡桂枝湯

三十二

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩

疼微嘔心下支結外證未去者此主之

屬太陽

○發汗

多亡陽譏語者不可下與此藥和其榮衛以通津液

後自愈

屬發汗後病肺證

急癉方藥

胡四兩桂

枝黃芩人

參芍藥一

兩半生

二合半生

子六枚水

七升取三

升服一升

日三

柴胡一兩
三錢

桂枝去皮

黃芩

人參

芍藥各半兩

半夏四錢

甘草

三錢

字炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一

枚水一盞半煮至八分去滓溫服

柴胡桂枝乾薑湯

三十二

傷寒五六日已發汗而復下

之脅脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來

寒熱心煩者此爲未解也宜服之

屬太陽

柴胡

四兩

桂枝

去皮

黃芩

各半兩

伊景方藥
四半升桂

桔梗石三
調神藥等

五乾草二

兩苦棲根

四丙水一

斗二升取

六升去滓

再煎取三

升服一升

咀三

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八分去滓溫服食項再服
柴胡加龍骨牡蠣湯三十三傷寒八九日下之胃滿煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此主之後

柴胡

傷寒八九日下之胃滿煩

驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者此主之後

竹葉方茶

胡四所貴

芩龍骨鉢

丹人參桂

桔梗芩一

兩半大黃

牡礪熟

甘草熟

乾姜熟

括樓根二兩

甘草熟

乾姜熟

鉢丹

人參

桂枝

茯苓各三

大黃半兩

半夏半合湯洗

二兩半夏
二合半牡蠣

一兩生薑
一兩牡蠣

一兩水入升取
一兩泰子六枚

一兩黃耆
一兩沸服一升

一兩黃芩
一兩桂枝茯苓
一兩桂枝人參
一兩黃芩
一兩桂枝茯苓
一兩半夏
一兩大黃

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四斤棗子一
枚水一盞半煮至八分去滓溫服又見海賦
柴胡加芒消湯固傷寒十三日不解育腸滿而嘔日
晡所發潮熱已而微利此本柴胡下之以不得利今
反利者知盤以圓藥下之此非其治也潮熱者實也
先宜服小柴胡湯以解外後以柴胡加芒消主之橘

黃芩

人參各半

柴胡

一兩三錢三字

黃芩一兩

甘草炙半兩

四錢一湯洗

二分之一

月一

分

仲景方

小柴胡湯

方內加芒

消六兩餘

飯前服

不鮮更服

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一枚水一盞半煮至八分去滓內芒消更微沸溫服
大青龍湯 三十五 太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛
不可服出而煩躁者此藥主之若脉微弱汗出惡風者
脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者此主之

肩太

湯

桂枝

去皮一兩

甘草

一兩

石膏

如半箇雞子大畔

杏仁

二十枚去皮尖

麻黃

三兩去節湯泡去黃汁焙乾秤

仲景方桂枝

秋葵草二

山石膏加

熟子大杏

活人書

卷六十三

四

八四十箇

辰巳三兩

辰午十二三兩

辰戌九升

辰庚八升

辰卯七升

辰子六升

辰午五升

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑四片棗子一
枚水一盞半煮至八分去滓溫服取汗爲度若汗
周身潤止後服未周身潤可停待相次服盡不欲
汗多恐亡陽故也若汗多不止用溫粉撲之

溫粉方

白术

茱本

川芎

白芷

各半
分

右搗羅爲細末每末一兩入米粉三兩和之粉撲
周身止汗無藥本亦得若汗已出後盡剉服汗多

亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

小青龍湯三十六 傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也此主之○傷寒表不便不利小腹滿或喘者此主之

芍藥

桂枝去皮

乾薑炮

甘草炙

細辛各一兩半

五味子一兩別本或加一分

半夏一兩半

湯洗若渴者去
半夏加括根一兩半

麻黃一兩半

微利者去麻黃加茺花如一彈子
熬令赤色若噎者去麻黃加附子半箇炮

半升麻黃
二兩茺花

桂枝去皮

細辛三

不炮甘草

半升半夏

如雞子大

附子一枚

茯苓四兩

杏人半升

水一斗煮

麻黃二錢

升內裏取

三升服

清

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服杏人半夏二味或各作一兩一分
小建中湯三十七 傷寒陽脉滯陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者小柴胡湯主之○傷寒二三日心中悸而煩者宜服

芍藥

二兩

甘草

一兩

桂枝

一兩半去皮

膠餡

半斤舊有微恙或咽者去膠餡局方加黃耆一兩半爲黃耆建中湯

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

仲景芍藥

桂枝六兩

半斤

杏仁一升

水一斗

生薑四

升

若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓二兩若喘者去麻黃加杏人一兩半去皮尖麻黃湯泡

三兩水七
粉水三升

內服治更
上德丸

靈砂二升
甘草三升

甘草三升

片大棗子一枚煮至八分去滓下膠餈兩匙許再
煎化溫服日三服夜二服尺脉尚遲再作一劑加

黃耆末一錢

煎造膠餈法

糯米

一升
淘淨

大麥蘖末

六兩

右米一如炊飯甑上至氣溜取下傾入一盆子入
蘖末一合并湯一盞來許拌和再上甑至飯熟却
入盆子內都以蘖末拌和入一磁罐子可容五升
許冬月罐子熱春秋夏溫冬月用湯二升許入罐

子內約內面飯上湯三指許卽得布并紙三五重
蓋定更以綿或絮抱定近火春秋夏卽溫和至一
宿見米浮在水面卽以布絞裂取清汁銀石器
內煎至面上有膜卽以水篦不住手攪至稀糊以
磁器收夏月置井中庶不酸

大陷胸湯三十六太陽病脉浮而動數浮則爲風數則
爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反
惡寒表未解也虛反下之動數變遲膈內拒痛胃中
空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊惱陽氣內陷心下

因鞶則爲結膿大陷胃湯主之若不結膿但頭汗出
餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃○傷寒六
七日結膿熱實脉沉而緊心下痛按之石鞶者宜服
○傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡
湯但結膿無大熱者此爲小結在膿腸也但頭微汗
出者此主之○太陽病重發汗而復下之不大便五
六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至小腹
鞶滿而痛不可近者此主之○傷寒五六日嘔而發
熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復

與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞭痛者此爲結脅也此主之

太陽上屬

大黃

一兩半去皮
錦文者爲末

甘遂

一字赤連珠
細羅爲末

芒消

五分

右以水二盞先煮大黃至一盞去滓下消一沸下甘遂末溫服得快利止後服

又大陷腎湯方

桂枝

一兩

甘遂

一兩或作半兩

大棗

一兩或作三枚

仲景方大黃六兩北楚一錢七分消一升水六升煮大黃取二升內消者一兩沸內甘遂末服一升

人參一兩

括樓實

一枚去皮只用四分之一

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞或作二盞煮至八分去滓溫服膏中無堅物勿服之

大陷膏圓

三十九

病發於陽而反下之熱入因作結膏

病發於陰而反下之

一有汗出

因作痞也所以成結膏者

以下之太早故也結膏者項亦強如癥瘕狀下之則和宜此藥主之

屬太陽

大黃

二兩或作四兩

芒消

三分

杏仁

三分去皮尖熬黑

苦葶苈子

三錢熬

大黃丸生黃半升熟消半升生消半升熟

葛半升甘

遂一錢匕

蜜二合水

升取一

升

服

右搗羅二味內杏仁芒消合研如脂圓如彈子大
每服一圓抄甘遂末半錢匕白蜜一合水二盞煮
取一盞頓飯一宿乃下如不下再服

甘遂性猛宣
斟酌量處慎

之服

小陷胸湯四十 小結胸病正在心按之則痛脉浮滑
者此主之

屬太陽

半夏

湯洗秤
二兩半

黃連

一兩

括樓

一枚去皮或作半枚

右剉如麻豆大水二盞先煮括樓至一盞半下諸
藥煎至八分去滓溫服未知再服微利黃連便安

生津方半昇半升括樓實半升
一枚水六升失萍內升取二升

也

大承氣湯

四十二

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身

必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也

手足濶然汗出者此大便已鞕也此藥主之若汗多

微發熱惡寒者外未解也

一法與桂枝湯

其熱不潮未可與

承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣

勿令大泄下○陽明病潮熱大便微鞕者可與此藥

不鞕者不可與之○傷寒若此若下後不解不大便

五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如

別微經林
愚林者何
及微經林

見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微
喘直視脈弦者生濶者死微者但發熱譏語者此主
之若一服利則止後服○陽明病譏語有潮熱反不
能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但輕耳
宜服○陽明病下血譏語者此爲熱入血室但頭汗
出者刺期門隨其實而寫之濶然汗出則愈汗出譏
語者以爲有燥屎在胃中此爲風也湏下者過經乃
可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之
愈宜服○二陽併病太陽證罷但發潮熱手足熱蒸

汗出大便難而讞語者下之則愈宜服○陽明病下之心下懊惱而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭軟後必溏不可攻之若有燥屎者宜服○病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者宜發汗下之與大承氣發汗宜桂枝湯○大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎也所以然者本有宿食故也宜服○傷寒六七日目中不了了瞞不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之宜服○陽明病發熱汗多者

急下之宜服○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安至六日與承氣一升若不大便更六七日小便少者雖不大便但初頭鞭後必溏未定成鞭攻之必溏湏小便利屎定鞭此主之○發汗不解腹滿痛者急下之宜服○腹滿不減減不足言當下之宜服○病人小便不利大便乍難乍易時有微熱喘目不能卧者有燥屎也宜服○陽明少陽合病必下利其脉不負者爲順也負者失也互相剋敗名爲負

也脉滑而數者有宿食也當下之宜服

已上屬陽明

○少

陰病二三日口燥咽乾者急下之宜服○少陰病自

利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之宜服○

少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜服

已上屬太陰

○下利三部脉皆平按之心下軟者急下之宜服○

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之宜服○

寸口脉浮而大按之反濇尺中微而濇故知有宿食

當下之宜服○下利不欲食者以有宿食故也當下

之宜服○下利差至其年月日時復發者以病不盡

故也當下之此主之○下利脈反滑當下所去下乃
愈此主之○脉雙弦而遲者必心下鞭脉大而緊者
陽中有陰也可下之宜服○病腹中瀇痛者此爲實
也當下之宜服此主之已上可
下病脉證

大黃

二兩錦文者
皮生用酒洗
四兩去皮
鹽汁炙

消積實

一、四枚或作三枚去
穰炒淨秤用半兩
二兩或作一合半均
消有麩頭者亦得

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮厚朴
枳實至一盞餘下大黃煮取六分去滓入芒消煎
一二沸放溫服以利爲度未利再與一服

小承氣湯

四十三

陽明病潮熱大便微鞢者可與大承

氣湯不鞢者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞢後必溏不可攻之攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噫其後發熱者必大便復鞢而少也以小承氣湯和之不轉失氣者不可攻也○陽明病脉遲雖汗出不惡寒其氣必重短氣腹滿而喘有潮熱者此爲外欲解可攻裏也手足濶然汗出者此大便已鞢也大

承氣湯主之若腹大滿不通者與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下○陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必鞶鞶則讞語此藥主之若一服讞語止更莫復服○陽明病讞語潮熱脉滑而疾者此藥主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若不轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不可更與承氣湯○太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便鞶者與小承氣湯和之愈○得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心下鞶至四

五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令小安

屬陽

○傷寒下利譏語者有燥屎也此主之

屬厥

陰

明

大黃

四兩去皮

厚朴

二兩去皮
薑汁煎

枳實

四枚或作三枚去
核炒淨秤半兩也

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一大盞半煮至八分去滓溫服以利爲度初服湯更衣者止後服不爾者再服之

調胃承氣湯

四十三

發汗後惡寒虛故也不惡寒但熱

者實也當和胃氣此主之○太陽病未解脉陰陽俱

葛根方枳
葛根散水
四升取一
升二合

停必先振慄汗出而解但陽脉微者先汗之而解但陰脉微者下之而解若欲下之宜服○傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掣急與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厭咽中乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸若胃氣不和譎語者少與調胃承氣湯○傷寒十三日過經譎語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當軟而反下利脉調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反

和者此爲內實也此主之○太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而脅中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與服之若不爾者不可與但欲嘔脅中痛微溏者此非柴胡證以嘔故知極吐下也○陽明病不吐不下心煩者可與服○太陽病三日發汗不解蒸蒸熱者屬胃也此主之○傷寒吐後腹脹滿者與服

已上屬陽明

甘草

一兩

大黃

二兩去皮

芒消

一兩三分或一兩一分

右剉如麻豆大每服炒五錢七以水一大盞煎至

湯分六
四兩酒
淡豆二
沙苦游半

七分去滓下硝更上火二三沸温頓服之

桃核承氣湯

四十四

太陽病不解熱結膀胱其人

之少溫服

七

少
深
刻

血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外
解已但少腹結者乃可攻之宜用此藥屬太陽

大黃四兩

桂枝 去皮二兩

甘草

卷二

芒消二两

桃人 去皮五十

尖燮仁者
猶如碎

11

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水二大盞煮至八分去滓下硝煎化溫服以微利爲度未利移時

再服

水方景升七取升平去溼內消上火微涼尤愈五合日二

九犁去連

七升取二

梔子豉湯

四十五

發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必

反覆顛倒心中懊憹此主之○發汗若下之而煩熱
宵中窒者此主之○仲景云凡用梔子湯病人舊微
溏者不可與服之○傷寒五六日大下之後身熱不
去心中結痛者未欲解也此主之

已上屬

○陽明病

脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反
惡熱身重若發汗則躁心墳墳反讝諝若加溫針必
休揚煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心
中懊憹舌上胎者此主之○陽明病下之外有熱手

足溫不結宵心中懊憹飢不能食但頭汗出者此主之○下利後更煩按之心下滿者爲虛煩也此主之

陰居厭

香豉
二兩

肥杞子

十六枚聲碑
或作十四箇

仲景方香
蠶四兩
桔十四枚
水四升取
杷子湯二
升半內香

洋冰一升

右剉如麻豆大每服抄五錢七水二盞先煮梔子至一盞入豉煎至七分去滓溫服得快吐止後服梔子甘草豉湯四十六發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者

此主之陽屬太

陽
太

小青方於
桔子散湯

內加其量

二兩管

附注

附注

附注

梔子 七枚

甘草

豉各

右分二服以水二盞先煎梔子甘草至一盞內豉同煎取七分去滓溫服得快吐止後服

梔子生薑豉湯

四十七

發汗吐下後虛煩不得眠若劇

者必反覆顛倒心中懊惱梔子豉湯主之若嘔者此

主之

屬太陽

梔子 七枚

生薑 二兩

半

豉 一兩

右分二服以水二盞先煮梔子生薑至一盞內豉同煎至七分去滓溫服得快吐止後服

和長方根
子敗湯內
加生薑五
錢

活人書卷第十三

活人書卷第十四

梔子厚朴湯

四十八治傷寒下後

者屬太陽

梔子

大者七枚擘碎

厚朴

去皮姜半升半兩

枳實

二枚取去殼炒

一分

右剉如麻豆大分作二服以水二盞半煮至八分去滓溫服得吐止後服

梔子乾薑湯

四十九

治傷寒醫以圓藥下之身熱不去

微煩者

屬太陽

梔子

七枚

乾薑

一兩

乾姜二兩
水三升半
取一升半
分二服

右剉如麻豆大分二服以水二大盞煎至七分去
滓溫服得吐止後服凡用梔子湯病人萬
微溏者不可與之

梔子藥皮湯

五十治傷寒身黃發熱屬太陽

梔子八枚

黃蘖一兩

甘草半兩

右剉如麻豆大分服抄五錢匕水一盞半煮至七
分去滓溫服

茯苓桂枝甘草大棗湯

五十

治發汗後其人臍下悸

者欲作奔豚

屬太陽

桂枝二兩

去皮

甘草一兩

茯苓

去皮六兩或作四兩

潤肺方桂
四兩甘草
再服

仙方地
子十五枚
甘草二兩
甘草一兩
水四升取
一升半分

八二兩秋
本半斤裹
平五枚水
斗者花

茶頭二升
多葉取三

百三
半服一升

佛手
茶四兩桂
枝
兩耳

瓦白水二
兩水六分
取三分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕乘二箇用甘爛
一盞半煮至八分去滓溫服作甘爛水法用小斗量大盆中以杓

之上有珠子五六千顆有珠相逐取用之

茯苓桂枝白朮甘草湯

五十

治傷寒若吐若下後心

下氣上衝胃起則頭弦脉沉緊發汗則動經身

爲振搖者

屬太陽

茯苓

一兩

桂枝

一兩

甘草

炙

白朮

各一

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

茯苓甘草湯

五十

傷寒汗出而渴者五苓散主之不

渴者此主之

屬太陽

桂枝

去皮

茯苓

各二兩

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑五
片煮至八分去滓溫服

甘草湯

五十四

少陰病二三日咽痛者可與服不差者

與桔梗湯

甘草

二兩

橘梗水一升取一升分三服

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞煮至六分去滓溫服日二服

甘草乾薑湯

五十五

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微

惡寒脚攣急久與桂枝欲攻其表此誤也得之便厭

咽中乾煩躁吐逆者宜此藥

屬太陽

甘草

四兩

乾薑

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

炙甘草湯

五十六

治傷寒脉結代心動悸

屬太陽

生熟各半
升五合分
再服

仲景方廿

草四兩人

參二兩生

地黃一斤

桂枝三兩

脉人半升

麥門冬半升

薑三兩

麥門冬半升

粟十二枚

水八升酒

七升取三升去滓內

阿膠二兩

桂枝去皮一兩半

桂枝三兩

甘草二兩

炙

人參一兩

生地黃八兩

桂枝一兩半

去皮半兩半

麻人一分

一兩半分

麥門冬一兩半

分去心二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕入薑五片棗一枚水一盞半入酒半盞煮至八分去滓內阿膠一斤

膠烊盡溫服日三服

芍藥甘草湯

五十七

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微

惡寒脚攣急反與桂枝欲攻其表此誤也得之便厥咽乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥愈足溫者更與此藥

屬太陽

陽

甘草

白芍藥

各二兩

熟地三錢
當歸一錢
芍藥三錢
甘草一錢

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

厚朴生薑半夏人參湯

治發汗後腹脹滿者

厚朴

四兩去皮

半夏

一兩

甘草

一兩

人參

半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑五片煮至八分去滓溫服

大黃黃連瀉心湯

五十九

治心下痞按之濡其脉關上

大黃三錢
黃芩一錢
芍藥三錢
甘草一錢

半斤半升

半斤半升

半斤半升

半斤半升

半斤半升

浮者若傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解
也不可攻痞當先解表表解乃可以痞解表宜桂枝
湯攻痞宜服此藥屬太陽

大黃

二兩

黃連

一兩

黃芩

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以百沸湯二大盞
熱漬之一時久絞去滓燒動分二服

附子瀉心湯

六十

治心下痞而復惡寒汗出者屬太陽

大黃

二兩

黃連

黃芩

各一兩

附子

一枚炮去皮
破別取汁

服

右三味剉如麻豆大每服抄五錢七以百沸湯二

大盞熱漬之一時火絞去滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯

六十

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯

證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此

雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若

心下滿而鞭痛者此爲結脅也大陷胸湯主之但滿

而不痛者此爲痞柴胡不中與之宜服此

崩太陽

黃連

半兩

黃芩

甘草

炙各一兩半

乾薑

炮一兩

半夏湯洗七匙

神景方

連一兩

苓

人參

大

葛三兩半
夏半升量

十二枚水

一斗取六升

升去滓再

煎取三升

三
瓜一升

右剉如麻豆大每服抄五錢七大棗二枚水一盞半煮至八分去滓溫服

甘草湯

六十

傷寒中風醫及下之其人下利日

數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡役下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使鞕也宜服此

甘草

二兩

乾薑

炮

黃芩

各一兩半

葛根

各一兩半

人參

一兩

黃連

各半

大棗

六枚

仲尼方甘草四兩乾薑不炮者芩三兩黃芩一兩半

大棗半

水

半夏

一兩

分洗

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分去滓溫服

三兩水
一斗者取
升去滓
再取三升
分去滓
升去滓
分去滓

三兩水
一升去滓
分去滓
升去滓
分去滓
升去滓

生薑湯心湯六十三治傷寒汗出解之後胃中不和心下痞軟乾噫食臭腸下有水氣腹中雷鳴下利者

熱大

黃芩
甘草
兩
不
生薑
兩
連
一
牛
夏
半
糞
十二
生
薑
四
水
一
斗
去
水
再
煎

黃芩

甘草

人參

各半
兩半

乾薑

黃連

各半
兩

半夏

一
兩
分洗

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑七片棗子二枚煮至一盞去滓溫服

白虎湯六十四治傷寒脉浮滑者表裏有熱○又三陽

寒三升服
寒方四三

合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譏語遺尿
發汗則譏語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出
者○傷寒脉滑而厥者裏有熱並主之

知母方知
母六兩甘

知母三兩

甘草一兩

石膏八兩碎

細根

膏二斤柳
膏二兩石
膏一斤柳
膏一斤柳

粳米三合

多

石膏一兩碎

不六合木
一斗未熟
湯成服
分日三

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八
分取米熟爲度去滓溫服

白虎加人參湯

十六十五

服桂枝湯大汗出大煩渴不張

脉洪大者○傷寒若吐若下後七八日不解系結者

裏表裏俱熱時時惡寒大渴舌上乾燥而煩欲飲水

數升者○傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者並

主之

屬太陽

人參

二兩

知母

一兩半

甘草

炙二兩或作半兩

糯米

一合半

石膏

四兩碎綿裹

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至八分取米熟爲度去滓溫服

五苓散

六十六

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不

得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉

葛根方附白虎湯方內加入參三兩歸依自虎湯法

浮小便不利微熱消渴者○發汗已脈浮數煩渴者

○傷寒汗出而渴者

不渴者與茯苓草湯

○中風發熱六七

日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆者○本以下之故心下痞頭鴟心湯痞不解其人

渴而口燥煩小便不利者

屬太陽

○太陽病寸緩關浮

尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但心下痞者此以醫下之也如其不下者病人不惡寒而渴者此轉屬陽明也小便數者大便必軟不更衣十日無所苦也欲飲水少少與之但以法救之或渴者屬陽明○霍亂

頭痛發熱身疼熱多飲水者益主之

屬霍亂

澤瀉

一兩
一分

猪苓

去黑皮
半兩

茯苓

去皮
半兩

白朮

各三分

桂枝

去皮半兩
不見火

右搗篩爲散拌和每服抄三錢匕白湯調下此藥

湏各自事持秤見分兩然後合

猪苓湯

六十七

陽明病脉浮發熱渴欲飲水小便不利

者○少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者
並主之

猪苓

去皮
半兩

茯苓

半兩

阿膠

炙過
半兩

仲景方阿
膠不炙半
兩

四升煮服

二升去滓

下瘀血消

服七合日

三

澤瀉

滑石

各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

分去滓溫服

附子湯

六十八

少陰病得之一二日口中和背惡寒者當灸之○少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者並

宜服之

茯苓

芍藥

各一兩

半

人參

一兩

白朮

二兩

附子

一枚

炮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

煎不燒水

兩附子二

兩人参二

兩白朮四

仲景方

苓桂

三

八升煮取
三升服一

升日三服

仲景方生

半二兩

柴六枚水

三升者散

一升分三

服日三

服別本作

只一服

去滓湯者

分去滓溫服日三服

术附湯

六十九

傷寒八九日風濕相薄身體疼煩不能

自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者桂枝附子湯主之

若其人大便堅小便自利者此主之

屬太陽

白术

二兩

甘草

一兩炙

附子

一枚半炮去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七生薑五片大棗一枚水一盞半煮至七分去滓溫服日三服一服覺身渾半日許再服三服都盡其人如冒狀勿恠也即是附子與术並走皮中逐水氣未得除故使之

耳法當加桂一兩其大便堅小便自利故不加桂也

卷之三

其草附子湯

七十治風

甘草名

卷一

白术
兩各

-

附子

一枝烟

**仲景方其
草白木二
兩附子二
枝桂枝四**

西水谷
意叢三才

服一升口
三錢物服

分去滓温服汙出即解

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至七

得微汗則
解能食汗

出後煩者
服五合恐

一升多者
服六七合

爲致
仲景方水
五升煮取
一升五合

芍藥三兩

甘草三兩
炙

附子一枚炮
去皮

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七
分去滓溫服

分服

便水方水

三升者取
一升頓服

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煮至七分去滓溫服未知再服

理中圓

七十三

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者

五苓散主之寒多不用水者此主之○大病差後喜

嗜火不了了晝中有寒當以圓藥溫之宜服此

屬陰陽差

後勞復病殊證

乾薑

炮

甘草炙

人參

腹痛者倍之

白朮

各兩

出景方各
炮川芎不

右搗篩煉蜜和圓如鷄子黃許大以湯數合和一

圓研碎溫服之日三夜二服腹中未熱益至三四

圓熱粥飲之微自溫覆勿揭衣然不及湯又方

人參

乾薑

甘草

炙

此是方劑
不炮水
八升煮取
三升張一

白术

各三兩

腹痛者加人參一兩半寒者加乾薑一兩半渴欲得水者加白术一兩半脾上築者腎氣動也去术加桂四兩吐多者去术加生薑三兩下多者還用术停者加茯苓二兩或四肢拘急腹滿下利或轉筋者去白术加附子一枚生用

有剎如麻夏天每服抄五錢七水一盞半煮至八

分去滓溫服日三服

四逆湯

七十四

傷寒脉浮自汗出小便數心煩懶惡寒

脚掣急與桂枝湯得之復厥而乾煩躁吐逆作甘草

乾薑湯與之厥愈更作甘草湯與之其脚伸若

胃氣不和與調胃承氣湯若重發汗加燒針者傷寒

醫下之續後下利清者不上身疼痛急當救裏後身

疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜

桂枝湯

病太陽

○自利不渴者以其藏有寒故也當

溫之宜服

屬太陰

或脉浮而遲表熱裏寒下利清穀

者此並主之

○少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲

吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此宵中實不

可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當

溫之或脉沉者急溫之並宜服

屬少陰

○大汗若大下

利而厥冷者或大汗出熱不去內拘急四肢疼又下

利厥逆而惡寒者或下利腹滿身疼痛者先溫裏乃

攻表溫裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯或嘔而脉弱小

便復利身有微熱見厥難治此並主之

並屬厥陰

○吐利

汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者吐利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絕者此主之亂

屬霍

甘草

二兩炙

附子

一箇生用

乾薑

半兩炮

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半煮至七分去滓溫服○強人加附子半箇乾薑加一兩半四逆散七十五少陰病四逆其人或歟或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者此主之

陰屬少

甘草

炙

柴胡

枳實去白皮炒黃

仲景方乾
不炮水
二升煎取一升二合
分再服

芍藥

一兩
上各

右搗節爲細散末飲酒下二錢日三服欬者加五味子乾薑各半兩并主下小憤者加桂半兩小便不利者加茯苓半兩腹中痛者加附子半枚炮梨泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服

四逆加人參湯生人參一錢惡寒脉微而利利止者亡血也此主之屬溫

甘草

二兩
大

人參一派

附子

一枚生
去皮

桂枝
芍藥
甘草
大黃
水煎服

乾薑

一兩
半炮

右剉如麻豆大每服祕五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三服

茯苓四逆湯

治發汗若下之病仍不解煩躁者

七七

人參半兩

附子半兩

生

甘草一兩

桂枝方快

杏仁六兩

赤芍二兩

草薢二兩

甘草一兩

桂枝一兩

水五升取

取三升服

乾薑

七錢
半

附子

半兩
去皮

生

甘草一兩

炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煮至八

分去滓溫服

當歸四逆湯

七十八

治手足厥寒脉細欲絕者

全

當歸

一兩

桂枝一兩

甘草一兩

生

細辛
桂枝

當歸
洗

桂枝

芍藥

細辛三
兩

細辛
各一
兩半

通草

甘草
各二
兩半

細辛
桂枝
草二兩
水八升
蜜三升
二升日三
量

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半棗子一枚煮至八分去滓溫服

細辛
桂枝
草二兩
水八升
蜜三升
二升日三
量

當歸四逆加茱萸生薑湯七十九有當歸四逆湯證若

其人內有火寒者宜服附

當歸
洗

桂枝
去皮

芍藥

細辛
各一
兩半

甘草
各一
兩半

木通
各一
兩半

茱萸
五兩

桂枝
去皮

芍藥

細辛
桂枝
草二兩
水八升
蜜三升
二升日三
量

茱萸
二升

一十五枝
水六升酒
六升煮取
五分去滓

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片大棗一
枚水一盞半煮至八分去滓溫服

活人書卷第十四