

傷

寒

論

直

解

傷寒論直解序

漢張仲景先師上承先聖
之道以開來學爭著傷寒
論一書是本軒岐之精義
而發其未發者也但軒岐

言其常先師言其變孔子
云可與立未可與權者
寔也自漢至今千二百餘
載歷代名賢多有發明而
宋成氏之註世皆宗之先

師之書至今存者成氏之
功也。然而是書乃義理邃微
章句奧折注之意在語言
文字外。成氏順文加釋。渴
無統紀。徒得其跡而不能

會其神以致後學不究其
旨歸粗為斷簡鶻編且以
為宜於冬時之傷寒而不
宜於三時之溫暑宜於外
感而不宜於內傷又以陽

方難會其意遂謂宜於古
而不宜於今先師之書遂
置而不續矣噫有成氏之
註而論至今存乃有成氏
之註而論至今晦矣夫此

序

書之首非特論傷寒也風
寒暑濕燥火六淫之邪無
不悉具豈特六淫之邪而
已內而藏府外而形身以
及棄血之生始經俞之會

通神機之出入陰陽之變
易水氣之循環不運之生
制上下之爻合水火之相
濟實者濡之虛者補之寒
者溫之熱者清之詳患明

備五矣盡矣且其章節井
井前後照應血脉貫通
有遺漏是政藝中諸書之語
益也第後人不思繩自觸
類旁通核泥章句僅以傷

寒視之抑威氏誼之來及
歟先君子大章公常慨然
有濟世之意集岐黃諸書
以而讀之朱墨陸綸悉滿
手澤昔嘗命錫駒曰汝當

善繼吾志余遵先志朝夕
於斯已匪一日復就張卿
子師而清業焉思欲以一
得之見向世恒恐學術淺
陋無當於先師之意而貽

誤否若斯其為戾豈渺小哉甲子秋及門諸子造余而請曰軒岐仲景靈素傷寒之源道統一脉相傳自非才高識妙豈能探其理

致先生何不本靈素之微
言而闡傷寒之精義俾後
之學者讀註而論無不顯
之義讀論而世理不顯之
證不徒託空言期有濟

於實用不亦善乎。余謝曰。
念亦安能發明此書。但期
無忝先子之志。於仲景先
師之旨。稍具管窺斯已矣。
爰撰此編。名曰直解藏之。

蜀中拉今三十年矣究未敢
自信持以問世今壬辰仲
春復與宿學同人并及門
諸子彙集屢書悉心參
訂已無疑義始敢付之梨

棗質諸天下後世醫道得
此或亦有小補焉是為序
時

康熙壬辰立夏錢塘張錫駒

令韶父題於青士居中

傷寒論序

漢長沙太守南陽張機仲景著

余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然嘆其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。岌岌不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。娶非常之疾。患及禍至。而方震懾。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束

手受敗。賣百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身以斃。神明消滅。變爲異物。幽潛重泉。徒爲啼泣。痛火舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知已。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。惄若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘疆徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者三分有二。傷寒半居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博

采衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脉辨證。爲傷寒雜病論。合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝。岐伯伯高雷公少俞。少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶。及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念恩求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。

相對斯須便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知。決診九候。曾無旁兆。明掌闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實爲難矣。孔子云。生而知之者上學。則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。

傷寒論

注解

凡例

一傷寒論舊本以辨脈平脉爲首。先脈而後證。宜矣。至以瘡濕暍列於六經之前。似非作論之本意。今先脈後證。列六經于辨脈平脉之後。而霍亂瘡濕竭併汗吐下。又附于六經之後。以見因傷寒而併及之意也。若夫叔和序例引素問熱論而立言。於仲景傷寒漫無發明。且泥定日期曰未入府者可汗而已。已入於府可下而已。嗚呼。汗與下何足以

盡傷寒哉。况傳經不明，適足以滋後人之惑，故去之。

一傳經乃傷寒之大關鍵。傳經不明，雖熟讀是書，無益也。故予於太陽之首，反覆辨論，彰明較著，庶可以破千載之疑案。

一仲景序云：撰用素問九卷、陰陽大論，是以本文之中，無非闡發五運六氣、陰陽交會之理。故解內亦以經解經，問敢杜撰，以貽天下後世之譏。

一仲景生於東漢之末，去古未遠，故其文義高古，往

往意在文字之外。若不紹繹思維。無由得其意趣。
但本文深矣。奧矣。而解復晦之。則深而益深。奧而
益奧。亦何異涉海問津耶。且其中自有層次轉折。
故予於層次轉折之中。每用一二虛字以疏明之。
不敢妄爲穿鑿。務使經義了然。

一是書自有章節段落。起止照應。非若他書散叙平
鋪而已。今依隱菴集註之分章節。每于章首加一
圈以別之。庶學者便覽焉。

一書難論傷寒。而藏府經絡。榮衛血氣。陰陽水火。寒

熟虛實之理靡不畢備。神而明之。于般疢難。如指諸掌。故古人云。能醫傷寒。即能醫雜證。信非誣也。一醫有正宗。有旁門。旁門者。諸家之方書也。正宗者。神農黃帝仲景之書也。亦猶需書之有六經語孟。而復有諸子百家。讀六經語孟。自可以該諸子百家。讀諸子百家。終不能窺聖人之門墻。夫諸家之書。非不遵仲景。非不引靈素。然所遵所引者。不過得其糟粕而已。豈能得其神理哉。得其糟粕。亦可以愈諸病。及問其所以然。則不知也。得其神理。愈。

則知其所以愈之之故。不愈亦知其所以不愈之由。此致知格物之極功。先知先覺之妙用也。蓋緣世人患于售世。舍本求末。此天下之所以無真醫良可慨也。

一讀是書者。必須屏去嗜慾。洗滌塵囂。從身心性命上打點。毋專攻捷徑。銳志攀援。苟務外而不務內。循名而不循實。不顧根本。忘身徇物。抑知明則可欺。幽則難追耶。若涉獵一二語。操剽一二方。而曰吾讀仲景書也。其誰欺乎。

一經旨渾融解難顯著然辭達卽止不敢干本文之外別有支離恐蹈蛇足也但開卷了然臨證茫然故于緊要疑似之證如呃如狂如譫語如舌胎如頤毒如癰疹皆有寒熱虛實之殊胃氣又爲人身之本不可妄傷俱引經證論畧加愚意及身親試驗確然不易者附於其後庶可以見病知源亦足爲初學之一助也

傷寒論直解目錄

卷之一

辨脉法

計四十節

平脉法

計四十五節

卷之二

辨太陽病脉證

計八十一節

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加厚朴杏仁湯

乾薑附子湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

卷之三

辨太陽病脈證

計九十八節

真武湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡礪湯

桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨收逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡礪湯

抵當湯

抵當丸

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

黃連湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

甘草附子湯

白虎湯

灸甘草湯

卷之四

辨陽明病脉證計八十三節

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

麻仁丸

梔子榮皮湯

麻黃連軻赤小豆湯

辨少陽病脉證

計十節

卷之五

辨太陰病脉證

計八節

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

辨少陰病脉證

計四十五節

麻黃附子湯心湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

吳茱萸湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

通脉四逆湯

四逆散

辨厥陰病脉證

計五十四節

烏梅丸

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

麻黃升麻湯

乾薑黃連黃芩人參湯

白頭翁湯

卷之六

辨霍亂病脉證

計十一節

四逆加人參湯

理中圓

四逆加猪膽汁湯

辨 汗陽易差後勞復計七節

燒乳散

枳實梔子豉湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

辨 痘濕渴脈證計一十六節

辨 不可發汗脈證計六節

辨 可發汗脈證計六節

辨 發汗後病脉證計二節

辨不可吐脉症具太陽篇中

辨可吐脉證計五節

辨不可下脉證計二十三節

辨可下脉證計十一節

通其一百一十二方

傷寒論直解卷一

錢塘張錫駒令韶父註解

門人

王元文燮菴

校

魏士俊子干

校

徐旭升上扶

婿王

津鶴田

王良能聖欽

叅訂

男

漢倬雲爲校

漢位譽皆

辨脉法

○問曰。脉有陰陽。何謂也。答曰。凡脉大浮動數滑。此名陽也。脉沉濇弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者。

生陽病見陰脈者死。

天地之道。總不外乎陰陽二氣。故人身中雖有千般疾難。何曾離得陰陽。所以首節便問脉。有陰陽答以脉之名。不可悉數。大約陽數五。陰數五。足以槩之矣。陽氣剛而有餘。浮大動數滑。具剛之體。而主有餘。故名陽。陰氣柔而不足。沉濶弱弦微。具柔之體。而主不足。故名陰。陰病而見陽脉。得生陽之氣。故生陽病而見陰脉。虛陽在外。純陰在內。有陽消陰長之虞。故死。脉爲氣血之先生始之根。故憑脉以決其死生也。曰凡脉曰凡病。乃槩言之。非專指傷寒也。

問曰。脉有陽結陰結者。何以別之。答曰。其脉浮而數。能食不大便者。此爲實。名曰陽結也。期十七日當劇。其脉沉而遲。不能食。身體重。大便反輕。名曰陰結也。

期十四日當劇。

承上文而言。脉既有陰陽。則陰陽又貴乎和也。其有不和而純陰純陽。卽謂之陽結陰結。蓋脈始于足少陰腎。生于足陽明胃。是少陰陽明爲脈之生始。而陰陽之總司。故必于少陰陽明主氣之期。而決其當劇也。浮而數陽脉也。能食。不大便。陽病也。以陽病而又得陽脉。全無陰氣以和之。故爲實也。一日大陽。二日陽明。至十七日。又當少陰三傳。主氣之期。而不得少陰之陰氣以濟之。是陽氣固結已甚。病當劇也。沉而遲。陰脉也。不能食。身體重。陰病也。陰病當下利。今反較。陰氣固結不通也。至十四日。又當陽明三傳。主氣之期。而不得陽明之陽氣。以濟之。是陰氣固結已甚。病當劇也。此所謂亢則害也。

問曰。病有灑淅惡寒而復發熱者何。答曰。陰脉不足。

陽往從之。陽脈不足。陰往乘之。曰。何謂陽不足。答曰。假令寸口脈微。名曰陽不足。陰氣上入陽中。則灑淅惡寒也。曰。何謂陰不足。答曰。假令尺脈弱。名曰陰不足。陽氣下陷入陰中。則發熱也。

上文言純陰。純陽而爲陽。結陰。結此言陰陽交勝。而彼此相乘也。惡寒者。陰勝也。發熱者。陽勝也。其所以發熱者。乃陰脈不足。陽往從其虛也。其所以惡寒者。乃陽脈不足。陰往乘其虛也。陰陽相乘。故惡寒而復發熱也。夫陽脈陰脈。變化無端。不可執一。不必于尺寸見之。亦無不可于尺寸見之。故曰假令寸口假令尺脉也。此之不足。彼即以有餘乘之。是以陰氣乘陽之不足。而上入。則惡寒。陽氣乘陰之不足。而下陷。則發熱。陰陽之不可以交勝者。如此。

陽脉浮陰脉弱者則血虛血虛則筋急也。

陰在內陽之守也。陽在外陰之使也。陽脉浮于外不內顧其陰則陰脉弱矣。陰脉弱則內守空虛而血少矣。血少則無以榮筋而筋急矣。此以脈而辨血之虛也。

其脉沉者榮氣微也。其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也。

榮行脈中故脉沉爲榮微。衛行脈外故脉浮而汗出爲衛衰。此以脈之浮沉而辨榮衛之衰微也。

榮氣微者加燒針則血流不行更發熱而躁煩也。

此承上節榮衛之氣而復申明榮主血也。榮氣微者血不足也。燒針者針其穴而復以火燒其針尾是針而復加之炎也。血者所以流通經脈者也。針則經脈受傷血之流行者則凝滯而不行矣。陽虛

下脈者則火之陰虛反助其陽因火爲邪。則爲煩逆。故更發熱而躁煩也。

脉藹藹如車蓋者名曰陽結也。

上節言陽結陰結此五節復形容其脉象也。藹藹如車蓋圓大而空。陽浮于外不能內歸于陰也。藹者和藹也。言寬大而緩。如和藹之貌。

脉累累如循長竿者名曰陰結也。

累累如循長竿者細長而堅陰欵于內不能外達于陽也。

脉督督如羨上肥者陽氣微也

督督如羨上脂肥輕虛宕漾而無根此陽氣之微也。督督空浮之貌。

脉繁繁如蜘蛛絲者陽氣衰也。

蒙蒙然如蠻蛛絲之細而不可尋。按此陽氣之衰也。

脉綿綿如鴻漆之絕者亡其血也。

綿綿然柔軟如鴻漆之絕。新漸減少。此亡血之象也。

○脉來緩時一止復來者名曰結。脉來數時一止復來者名曰促。脉陽盛則促。陰盛則結。此皆病脉。

此章凡三節。首節言陰陽兩不相顧。獨盛而爲結促之脉。次節言陰陽兩不相和。搏擊而爲動脈。末節言陰陽兩相合。固等而爲緩脉也。緩者。陰脉也。時一止者。時或一止而不常也。非若代脈之中止而不能自還也。復來者。陰盛獨來。不得陽以續之也。故名曰結。數者。陽脈也。復來者。陽盛獨來。不得陰以續之也。故名曰促。此結促二脉。皆陰陽偏盛之病脉也。

陰陽相搏。名曰動。陽動則汗出。陰動則發熱。形冷惡寒者。此三焦傷也。若數脉見于關上。上下無頭尾。如豆大。厥厥動搖者。名曰動也。

搏者。陰陽不和也。陰陽不和。勢不安龍。故脉動矣。陽動以搏陰。則陰液泄而汗出。陰動以搏陽。則陽氣越而發熱。汗出不已。發熱不止。勢必陰陽俱虛。無熱可發。而形冷惡寒。此三焦不能出氣以溫肌肉。而三焦之氣傷也。大動脉必有動脉之形。若數脉見于關上。圓而如豆。厥厥動搖者。此動脉之形也。

陽脉浮大而濡。陰脉浮大而濡。陰脉與陽脉同等者。名曰緩也。

浮大爲陽。濡爲陰。若陰陽俱浮大而濡。是陽中有陰。陰中有陽。陰陽同等。不疾不徐。胃氣柔和之脉。故名曰緩也。

○脉浮而緊者。名曰弦也。弦者。狀如弓弦。按之不移也。脉緊者。如轉索無常也。

合下兩節。明弦脉之有虛實。浮而緊者爲弦。爲實弦而大者。爲虛爲革也。浮中帶緊。名曰弦弦之狀。有如弓弦。按之勁急而不移轉也。若後如轉索之無常。又爲緊而非弦矣。弦緊之分。在移與不移耳。脉弦而大。弦則爲減。大則爲芤。減則爲寒。芤則爲虛。寒虛相搏。此名爲革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。

減者氣少也。弦爲純陰。陰盛則陽虛。故弦則爲減。
芤者血空也。大爲純陽。陽盛則陰虛。故大則爲芤。
氣少則寒。故減則爲寒。血空則虛。故芤則爲虛。虛
寒相搏。外輕中空。如按鼓革。譬如室內無人。晝守
則所藏之物自然漏失。此所以婦人得此革脉。則半產漏下。男子得此革脉。則下血失精。

○問曰。病有戰而汗出。因得解者。何也。答曰。脉浮而

緊。接之反芤。此爲本虛。故當戰而汗出也。其人本虛。

故當發戰。以脉浮。故當汗出而解也。若脉浮而數。按

之不芤。此人本不虛。若欲自解。但汗出耳。不發戰也。

此章凡七節。皆言自解之病。戰者。寒戰也。脉浮而
緊。氣機欲外出也。按之反芤。此爲根本空虛。不能
外出。故當戰而汗出也。又申明其所以發戰者。以
其人本虛故也。汗出而解者。以脉浮。氣機欲外出

故也。若脉止浮數而不芤其人本不虛。但汗出而解不發戰也。

問曰。病有不戰而汗出解者何也。答曰。脈大而浮數故知不戰汗出而解也。

此節添一大字卽上文浮而數不戰汗出之義也。

問曰。病有不戰不汗出而解者何也。答曰。其脈自微。此以曾經發汗。若吐。若下。若亡血。以內亡津液。此陰陽自和。必自愈。故不戰不汗出而解也。

上節言其人本虛。是不經發汗吐下亡血而自虛也。此節言脉自微。因曾經發汗吐下亡血之後。以致內亡其津液。而脉自微。非關自虛之故。然津液雖亡。陰陽自和。必自然而愈。以非本虛。故不發戰。

以亡津液故不汗出
以陰陽和故解也。

問曰。傷寒三日脉浮數而微。病人身涼和者何也。答曰。此爲欲解也。解以夜半。脉浮而解者。濶然汗出也。脉數而解者必能食也。脉微而解者必大汗出也。

傷寒三日。少陽主氣也。脈浮數。少陽之氣盛也。浮數而微。少陽陽熱將退。而陰氣漸生也。身涼和邪熱去。陰陽和。故爲欲解也。解以夜半者。陽得陰而解也。又申言浮數微之脉。其解不同。若浮而解者。少陽樞轉外出。故濶然汗出也。數而解者。少陽三焦氣盛。三焦和而能食也。陽之汗。以天地之雨名之。微則陰氣和。有油然作雲。沛然下雨之意。故大汗出也。此種汗。皆陽明水穀之汗。故雖大汗而不致亡陽之虞。

問曰。脉病欲知愈未愈者。何以別之。答曰。寸口關上尺中三處。大小浮沉遲數同等。雖有寒熱不解者。此脈陰陽爲和平。雖劇當愈。

此言三部陰陽和平而解也。大小浮沉遲數同等者。言三處之脈。陰陽齊至。無有偏勝也。脈氣調和。雖有外之寒熱不解。此陰陽和平。正氣不傷。雖劇當愈。

師曰。立夏得洪大脈。是其本位。其人病身體苦疼重者。須發其汗。若明日身不疼不重者。不須發汗。若汗濺濺自出者。明日便解矣。何以言之。立夏得洪大脈。是其時脉。故使然也。四時倣此。

此言得時。旺之脉而解也。脉氣得時。正氣已固。雖有外邪。自然解去。故不必發汗而自解。

問曰。凡病欲知何時得。何時愈。答曰。假令夜半得病。明日日中愈。日中得病。夜半愈。何以言之。日中得病。夜半愈者。以陽得陰則解也。夜半得病。明日日中愈者。以陰得陽則解也。

此言陰陽相合。而病邪自解也。觀此則知人之身全賴正氣以主持。正勝邪。自無所容矣。君子道長。則小人道消。

○寸口脉浮爲在表。沉爲在裏。數爲在府。遲爲在藏。假令脉遲。此爲在藏也。

寸口者兩寸口也。一名氣口。五藏別論云氣口亦太陰也。五藏六府之氣皆出于胃。變現于氣口。是內外藏府之氣皆大會于寸口。故以寸口候表裏藏府之氣焉。浮主氣之在表。沉主氣之在裏。數主氣之在府。遲主氣之在藏。夫有形之藏府一定不移。無形之氣機出入無時。故有表裏藏府之在焉。又中言假令脈遲不必定見于寸口。而亦爲在藏。遲脉如是。而浮沉數亦如是矣。自此以下。凡四篇上舉寸口。下舉趺陽。所以明脈之會于太陰。生乎陽明也。

趺陽脉浮而濶。少陰脉如經者。其病在脾。法當下利。何以知之。若脉浮大者。氣實血虛也。今趺陽脉浮而濶。故知脾氣不足。胃氣虛也。以少陰脉弦而浮。纔見此爲調脉。故稱如經也。若反滑而數者。故知當屎。農

也

趺陽少陰爲氣血生始之原故以趺陽少陰合論也。趺陽者足陽明衝陽之動脈也。少陰者足少陰太谿之動脈也。經常也。趺陽脈遲而緩乃胃氣之常脉也。今浮而濶而少陰脉如經者非少陰之氣不與陽明相合而爲病乃脾不能爲胃行其津液而爲病也。病在脾。當津液偏滲于大腸而下利何以知其病在脾也。若脉浮大者陽明之氣實而少陰之血虛也。今趺陽脉不浮大而浮濶故知脾氣轉輸之不足以致胃氣之虛非關少陰也。夫所謂如經者以少陰脉弦而浮。繩見此陰柔之氣上與陽明相合故稱如經之謂脉。若反滑而數得少陰君火之氣熱甚干經非若脾病之下利故知常也。尿膿

寸口脉浮而緊浮則爲風。緊則爲寒。風則傷衛。寒則

傷榮。榮衛俱病。骨節煩疼。當發其汗也。

上節論表裏藏府之病。見于寸口也。浮爲陽脈。風爲陽邪。故浮則爲風。緊爲陰脈。寒爲陰邪。故緊則爲寒。衛爲陽。各從其類。故風則傷。寒則傷。此傷彼亦傷。故榮衛俱病也。衛氣鬱而不舒。榮血滯而不行。則骨節之神氣不能遊行出入。是以煩疼。發其汗則風寒去而榮衛行矣。風必傷衛。非必止傷衛。寒必傷榮。非必止傷榮。傷衛傷榮。不過言其初傷之時也。苟邪旣從榮衛而入。當無所不之。亦何分風與寒。榮與衛哉。

趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。趺陽脉浮而數。浮則傷胃。數則動脾。此非本病。醫特还之所爲也。榮衛內陷

其數先微。脉反但浮。其人必大便軟。氣噫而除。何以言之。本以數脉動脾。其數先微。故知脾氣不治。大便硬。氣噫而除。今脉反浮。其數改微。邪氣獨留。心中則飢。邪熱不殺穀。潮熱發渴。數脉當遲緩。脈因前後度數如法。病者則飢。數脉不時。則生惡瘡也。

此節因醫之下。以明胃氣之由下而上。由內而外之義也。土性柔和。故遲緩爲胃氣如經之調脈。今不緩而反浮。浮爲虛。故傷胃。不道而反數。數爲熱。故動脾。此非脾胃本然之病。必醫妄下之。以致傷胃而動脾也。夫穀入于胃。其清者爲榮。濁者爲衛。若下之。則榮衛之氣不能外達。內陷于中。榮衛內陷。其脈必微。今其數先微。不但不微。而反但浮。故其人未見榮衛內陷之病。而先見大便軟。氣噫而

除之脾胃病也。難也。除去也。經云。厥逆從下上散。復出于胃爲噫。言氣從上散。復上出于胃而除去也。又中言何以知脾氣不治。大便硬氣噫而除本。以數脉動脾。其數先微之故也。今若脈反其浮數。改爲微。是榮衛內陷而邪氣獨留也。脉反浮。不浮也。數改微。不數也。榮衛內陷。故心中則飢。邪氣獨留。故不殺穀。動脾則脾虛而潮熱。傷胃則胃虛而發渴。此脾胃之氣。又因榮衛內陷而爲病者。如此。然前之數脉。後當轉而遲緩。卽胃氣如經之脉。所謂脉之前後度數如法也。若不如法。則榮衛仍內陷于中。故病者則飢也。脉不循度數。卽謂之不時。今數脉不時。留于心之邪。蒸復外出于皮膚之間。則生惡瘡也。總以見榮衛之氣。可從胃氣而外出。亦可從胃氣而內陷也。陷于心。則飢而不殺穀。陷于脾胃。則潮熱而發渴。外出于皮膚。則生惡瘡矣。此以見下之不可妄也。此節當作三段。看自趺陽脉。浮而數。以至氣噫而除。言醫下之。以致趺陽之氣隨榮衛內陷而爲病也。自脉反浮。以至潮熱。

發涓言。趺陽之氣與榮衛共滯于中而爲病也。自病者則飢。以至生惡瘡。言趺陽之氣復隨榮衛外

出于皮膚而爲病也。此

前後出入之皮數也。

○師曰。病人脉微而濶者。此爲醫所病也。大發其汗。又數大下之。其人亡血。病當惡寒。後乃發熱。無休止時。夏月盛熱。欲着複衣。冬月盛寒。欲裸其身。所以然者。陽微則惡寒。陰弱則發熱。此醫發其汗。令陽氣微。又大下之。令陰氣弱。五月之時。陽氣在表。胃中虛冷。以陽氣內微。不能勝冷。故欲着複衣。十六月之時。陽氣在裏。胃中煩熱。以陰氣內弱。不能勝熱。故欲裸其

身又陰脈遲滯故知亡血也。

此論人與天地相參。與日月相應。故人之陰陽上應天之陰陽。而爲寒爲熱也。夫血有淡滲皮毛。充膚熱肉之血。有流行經脈。榮周腸胃之血。陰血虛少。則脉微滯。然非本病。乃醫汗下失宜之病也。汗之。則皮膚之血亡。下之。則腸胃之血亡。亡于外。則惡寒亡于內。則發熱。寒熱相繼。無休止時也。夏月盛熱之時。欲着複衣。寒之極矣。冬月盛寒之時。欲裸其身。熱之極矣。又申言所以惡寒發熱者。乃陰虛陽無所附。陽微陰弱之故也。其所以陽微陰弱者。又醫汗下之故也。五月一陰生。陽在外而陰在內。故欲欲着複衣。十一月一陽生。陰在外而陽在內。故欲裸其身。獨言胃中虛冷。腎中煩熱者。四時以胃氣爲本也。又言六脈微滯。其人亡血。若陰脈遲。其亡血更可知矣。合下二節言。开下之當慎也。人之陰陽不虛。則寒熱隨乎其時。苟陰陽之氣虛。則有不能勝冷勝熱之病矣。

脉浮而大。心下反鞭。有熱屬藏者。攻之不令發汗。屬府者。不令瀨數。瀨數則大便鞭。汗多則熱愈。汗少則便難。脉遲尚未可攻。

脉浮而大。表脈也。心下反鞭裏症也。有熱屬藏者。屬少陰心藏也。少陰之陰木虛少。而少陰之君火盛。故宜攻下之。以救其陰。不可發汗以助其陽。屬府者。有熱屬太陽膀胱之府也。膀胱主藏津液。瀨數則亡其津液。而大便鞭。汗多則熱愈者。言熱屬藏。故不令發汗。屬府者。又當發汗。汗多則水津四布。而熱愈。汗少則津液不能施化。而便難。然又恐人誤以便難爲皆可攻。故又結言脉遲尚未可攻。其可寧致成功矣。此論太陽與少陰爲表裏。太陽之氣由胸而出入。故心下鞭。少陰之君火在上。故有熱屬藏。膀胱爲州都之官。津液裁焉。故不令瀨數。以亡其津液也。

○脉浮而洪。身汗如油。喘而不休。水漿不下。形體不仁。乍靜乍亂。此爲命絕也。又未知何載。先受其災。若汗出髮潤。喘而不休者。此爲肺先絕也。陽反獨留。形體如烟熏。直視搖頭者。此爲心絕也。唇吻反青。四肢熟習者。此爲肝絕也。壞口黎黑。柔汗發黃者。此爲脾絕也。溲便遺失。狂言目反直視者。此爲腎絕也。又未知何藏。陰陽先絕。若陽氣前絕。陰氣後竭者。其人死。身色必青。陰氣前絕。陽氣後竭者。其人死。身色必赤。腋下溫。心下熱也。

此一節論死絕之脉證也。脈浮而洪。脈氣外脫也。
身汗如油。真津外洩也。肺主天。喘而不休。天氣絕
也。脾主地。水漿不下。地氣絕也。形體不有。神去而
形骸獨存也。乍靜乍亂。真氣脫而陰陽離也。精滅
神亡。大命絕矣。肺主皮毛。汗出髮潤。毛竅開發而
陰液洩也。喘而不休。氣不歸元。而真氣上脫也。此
肺先絕也。心爲離火。貴下交坎水。陽反獨留。火勢
炎炎不復下交。故形體如烟熏也。心麻土系于日
目。系絕故直視。搖頭者。火性上騰之象也。此爲心
絶也。唇吻者。脾之裏。青者。肝之色。四肢者。脾之主
榮智者。肝之病。以肝之色。肝之病。而反見干肝之
位。則肝之真氣絕。而反乘其所勝。故爲肝絕也。脾
主四白。環口黎黑。主敗而水侮也。柔汗者。柔軟而
賦。脾之真液。黃者。脾之真色。真液洩而真色現。故
爲脾絕也。腎主二便。溲便遺失。是門戶不堅也。腎
藏志。志爲氣之帥。志絕無主。故正言。目反直視者。
腎氣絕而目系斷。故爲腎絕也。此以未死之前。而
先斷其五藏之絕。而又當以既死之後。驗其色之

青亦以辨其陰陽之先絕後竭其至精至密也如此。

○寸口脈浮大而醫反下之。此爲大逆浮則無血大則爲寒。寒氣相搏。則爲腸鳴。醫乃不知。而反飲冷水。令汗大出。水得寒氣。冷必相搏。其人卽餽。

此論浮大之脉。不可下。復不可汗也。浮大之脉。虛浮于外。似有餘而內實不足。醫反下之。其害不可勝言。故曰。此爲大逆。然浮大之脉。不特不可下。抑且不可汗。蓋血虛于內。則脈空。浮于外。氣寒于中。則脈亦空。大于外。寒氣相搏于中。則爲之腸鳴。醫乃不知。浮大爲裏寒。而反疑爲外熱。反飲冷水。令人卽餽。鶴者。氣噎而無聲也。合下二節。論寸口趺陽虛者。不可汗下也。

趺陽脈浮。浮則爲虛。浮虛相搏。故令氣鈎。言胃氣虛竭也。脉滑則爲噦。此爲醫咎。責虛取實。守空迫血。脉浮鼻中燥者。必衄也。

上節言醫發汗而致鈎。此節言胃氣自虛。不因汗而致鈎也。趺陽者。胃脉也。浮則爲胃虛。以胃之虛脉之浮。兩相搏激。故令氣鈎。言胃氣虛竭而鈎也。無聲爲鈎。有聲爲噦。浮虛相搏之極。卽往來流利而爲滑矣。滑則無聲之鈎。卽變而爲有聲之噦矣。此非自虛。乃醫責虛取實之咎也。虛則宜補。反責之。實則宜瀉。反取之。陰在內。陽之守也。責其虛。故守空于內。而迫血于外矣。未知從何道出。若脉浮鼻燥。此經脈虛不能攝也。

○諸脉浮數當發熱而酒淅惡寒。若有痛處飲食如

常者畜積有膿也。

此論外因之邪。不涉于無形之氣。而涉于有形之經也。諸脉者。槩尺寸。翻而言也。浮則爲風。數則爲熱。風熱相搏。故發熱惡寒也。若有痛處者。痛止于一處也。飲食如常者。邪逆于肉理。而不涉于胃也。經云。榮氣本從。逆于肉理。乃生癰膿。故畜積有膿也。此卽外因之邪。散則涉于無形。而爲傷寒。聚則積于有形。而爲癰膿。

○脈浮而遲。面熱赤而戰惕者。六七日當汗出而觻反發熱者。差遲。遲爲無陽。不能作汗。其身必痒也。

浮爲邪在表。遲爲正氣虛。面熱赤者。陽氣拂鬱于表也。戰惕者。裏氣虛也。六七日經盡之期。當汗出而解。倘不汗出。而反發熱者。所差在于脉遲也。遲爲無陽。則陰無以化。故不能作汗也。無汗邪欲出。

而不得出逆于皮膚故其身必痒也

○寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中于上焦濁邪中于下焦清邪中于上名曰潔也濁邪中于下名曰渾也陰中于邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中于陰也陽中于邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露之氣故曰清邪中于上濁邪中于下陰氣爲慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微惡三焦相潤內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不治胃氣上衝肝氣不轉胃中爲濁榮衛不通血凝

不流。若衛氣前通者，小便赤黃與熱相搏，既無俟使遊于經絡出入載府。熱氣所過則爲癰膿。若陰氣前通者，陽氣厥微，陰無所使，客氣內火熾而出之，聲噏而寒，寒厥相逐，爲熱所壅，血凝自下，狀如豚肝。陰陽俱厥，脾氣孤弱，五液注下，下焦不開，清便下重，令便數難。躋築湫瘤，命將難全。

此一節借清濁之邪以論出入之不可廢。升降之不可息。由陰而陽。由下而上。由內而外。不可少有間斷也。寸口脉陰陽俱緊者。概尺寸浮沉而言也。一陰一陽俱緊法。當清濕之邪。中于上焦。濁濕之邪。中于下焦。清所以爲潔。濁所以爲渾也。三陰主內。若清濁之邪。中于陰。則三陰之氣虛。而內爲之戰栗。

也。慄者畏縮之貌。有不戰而自潰之象。此由三陽之表氣微虛以致三陰之裏氣不守故使邪中于陰也。三陽主表。若清濁之邪中于陽必發熱所謂得陽熱之化也。頭痛項強頸攣清邪之中于上也。腰痛腰酸濁邪之中于下也。夫所謂清邪濁邪者卽霧露之氣在天爲霧露之清邪在地爲水濕之濁邪因上下而分清濁也。故曰膀胱中上濁邪中下此結陽中于邪之急也。若陰中于邪則不發然而寒慄陰氣盛也。三陰之脉俱起于足大小指之端故足膝逆令乘三陰之氣至大小便故便溺妄出也。此三陽之表氣微虛于外以致三陰之裏氣微急于內也。三焦者所以通會元真于肌腠主行榮衛陰陽者也。表裏之氣虛急則三焦相濁而內外不通矣。溷者上中下混亂而不分也。上下不分內外不通是以上焦溷而佛鬱于上經云上焦者受氣而營諸陽者也。今不能宣營諸陽故藏真陽熱之氣反熏于上而口爛食斷也。斷者齒根也食者如日月之食而缺也。中焦溷而不治于中身胃

氣不歸于部而反上衝。脾氣不能轉輸而冒之津液不行。則胃中爲濁。榮出中焦。衛出下焦。三焦淪亂。則榮衛之氣亦不通矣。榮行脈中。衛行脈外。榮衛不通。則血脉凝滯而不流矣。此三焦相潤。榮衛不通之咎也。若止衛氣前通。而陰氣未至。則小便赤黃。衛氣與熱氣相搏。因熱作使。遊行于經絡之間。出入于藏府之内。所過之處。卽爲癰。膿若止。陰氣前通。而陽氣不相交接。便爲瘍。陽在外。陰之使無陽。則陰無所使。衛者。衛外而爲固也。外衛虛微。客氣易于內入。裏氣不納。仍復從而出之。聲溫者。聲混濁而難出之象。猝咽嗚嚙。陰陽不相交通之象也。寒氣厥逆。往來駛逐。又爲熱氣所壅。不得外出。寒爲熱壅。故血凝自下。色如豚肝之狀也。經氣不通。陰陽乖離也。脾爲孤臟。灌溉四旁。則孤而且弱矣。脾氣孤弱。則不能收攝五藏之津液。而五液注下矣。下焦主闔。今洞而不闔。則清便下重矣。清便者。不利清穀也。下重者。裏急後重也。令便數難者。欲便而又

不得便。陰陽之氣逆而不能施化也。晦者，腹之中央。不日腹痛。而日癆痛者。晦爲生氣之原。三陰之所主。今五藏三陰之氣將絕。故築然而發痛也。築者築然動也。湫者，湫然難忍也。神去機息。氣止化絕。故曰命將難全。夫以難全之病。而必欲求其全。與夫可全之病。而竟致于不全。其相去大相逕庭矣。以是知人之藏府血氣榮衛。陰陽外內出入周流貫通。無有止息。如一息不運。則出入廢。升降息矣。其曰三焦相潤。內外不通。上焦拂鬱。中焦不治。榮衛不通。下焦不闔。此皆出入廢。升降息之意也。乃陰陽之大關。出人之樞鈕。學者紬繹熟玩。久自得之。

○脉陰陽俱緊者。口中氣出。唇口乾燥。踰卧足冷。鼻中涕出。舌上苔滑。勿妄治也。到七日以來。其人微發熱。手足溫者。此爲欲解。或到八日以上。反大發熱者。

此爲難治。設使惡寒者必欲嘔也。腹內痛者必欲利也。

合下二節。皆論少陰。貴得生陽之氣而解。脈陰陽俱繫者。少陰陰寒甚也。少陰之脉。循喉嚨。口中。氣出者。少陰虛不能納氣歸元也。唇口乾燥者。君火在上也。蹉卧是冷者。水寒在下也。少陰之脉。入肺中。挾舌本。陰寒射肺。津液不收。故涕出。陽燥陰潤。故苔滑。勿妄治者。以上有君火。下有寒水。或由陰而出陽。或不得陽而仍歸于陰。俱未可知。故曰勿妄治也。到七日以來。一陽當復之期。其人微發熱。手足溫。是寒水之氣得君火之化以濟之。生陽漸回。故曰欲解者。到八日以上。反大發熱者。陰極于下。格陽于上。陽不能復而反暴脫也。故爲難治。設使惡寒者。少陰之神機。欲上出而逆于陽明。故必欲嘔也。腹內痛者。少陰之神機。欲下行而逆于太陰。故必欲利也。

脉陰陽俱緊。至于吐利。其脈獨不解。緊去入安。此爲欲解。若脈遲至六七日不欲食。此爲晚發。水停故也。爲未解。食自可者。爲欲解。病六七日。手足三部脉皆至大煩而口噤不能言。其人躁擾者。必欲解也。若脉和。其人大煩。目重。臉內際黃者。此爲欲解也。

少陰篇云。陰陽俱緊屬少陰。當吐利。脈緊者。少陰之陰寒甚也。故至于吐利。而緊脈獨不解。入內也。若緊脉去。則吐利止。而內安。故爲欲解。解者緊去而寒解也。若緊雖去而復遲。此寒雖去。而中土虛。不能制水。故至六七日不欲食。謂之晚發。晚者後也。以少陰之寒發在先。而少陰之水發在後。水停于中。故也。寒得水氣。兩寒相得。故爲未解。食自可者。陽明土氣勝。少陰水勢衰。故爲欲解。三部脉

皆至陰陽同等之脉也。大寒水之邪必藉火土以制勝。煩出于心。在心主言。君火之氣與寒水之氣相持。故大煩而口噤不能言。其人躁擾者。寒水退君火勝。故爲欲解。脈和者。胃主柔利之脉也。胃絡上通于心。故大煩黃者。土之色也。重瞼內際。土之位也。土氣勝。水氣退。亦爲欲解。濕中因欲解。一寒去而解。一水去而解。一藉若火之氣而解。一寒得中土之氣而解。四者得一則解也。

○脉浮而數浮爲風。數爲虛。風爲熱。虛爲寒。風虛相搏。則灑淅惡寒也。

此論風邪傷表而致氣虛也。風傷表。故浮爲風。邪之所奏。其氣必虛。故數爲虛。風則生熱。虛則生寒。風寒相搏。則外寒束其內熱。故洒淅惡寒也。合下三箇言。風寒熱之邪傷人。有淺深之不同。生死之各異。首節論風。次節論熱。末節論寒。

脉浮而滑。浮爲陽。滑爲實。陽實相搏。其脉數疾。衛氣失度。浮滑之脉數疾。發熱汗出者。此爲不治。

此言熱傷經脈。陰液消亡。有陽無陰也。脉浮而滑。浮爲陽熱在外。滑爲熱實于經。陽實相搏。則脉流薄。表衛氣失其行。陰行陽之常度矣。衛氣失其常度。則不止。浮滑而更加數疾。此陰陽乖錯。表裏不循其常也。發熱者。陽氣盛也。汗出者。陰液亡也。孤陽無陰。故爲不治。夫人之陰陽。平則治。偏則病。有陰無陽者死。無陽者死。繩。

傷寒欬逆上氣。其脉散者死。謂其形損故也。

此言寒傷形也。傷寒欬逆上氣者。形寒傷肺也。脉散者。肺氣上脫。不能統朝百脉。而渙散也。欬逆非死之症。而脉散有死之脉。故死。又申言其所以死者。謂其形損故也。經云。兩神相搏。合而成形。脉爲

諸經之長。外合皮毛而成形。藏真損于內則形氣
損于外矣。卽所謂一損。損于皮毛。皮聚而毛落者
死也。

平脉法

○問曰。脈有三部。陰陽相乘。榮衛血氣在人體躬。呼
吸出入。上下於中。因息遊布。津液流通。隨時動作。效
象形容。春弦秋浮。冬沉夏洪。察色觀脈。大小不同。一
時之間。變無經常。尺寸參差。或短或長。上下乖錯。或
存或亡。病輒改易。進退低昂。心迷意惑。動失紀綱。願
爲具陳。令得分明。師曰。子之所問。道之根源。脈有三

部尺寸及關榮衛流行不失衝銓。腎沉心洪肺浮肝
弦此自經常不失鉤分出入升降漏刻周旋水下百
古本
二刻一周循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰
陽相干風則浮虛寒則牢堅沉濶水畜支飲急弦動
則爲痛數則熱煩設有不應知變所緣三部不同病
各異端太過可怪不及亦然邪不空見中必有奸審
察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度藏府獨
見若神爲子條記傳與醫人。

此一節乃平脉之綱旨夫脉有時脉有平脉有病脉有藏真之脉故特以此問答以得其情形也三部

寸關尺也。陰陽相乘者，陽生於陰而乘陰，陰生於陽而乘陽也。榮主血衛主氣，脈乃氣血之先。而在人體躬之中，隨呼吸出入上下于其間。一呼一吸，脉行六寸。晝夜一萬三千五百息，脉行八百丈爲一周。是因息以遊布，而津液得以流通焉。至于隨時動作，則有春夏秋冬之分。效象形容，則有弦浮沉洪之異。察四時之色，觀四時之脈，而其間更有所大小之不同。經常之更變，尺寸參差，或短而或長。上下乖錯，或存而或亡。病輒改易進退，自有低昂。倘不察色觀脈，則心意迷惑，失其紀綱。此脉之大要，願爲具陳以明之。師曰：子之所問，道之根源，不可不知也。禁行脉中，衛行脈外。營周不休，五十而復大會。如環無端，不失其衡鉉之平。腎脉沉，心脉洪。肺脉浮，肝脉弦。此五藏之常脉，而無銖分之差也。出已而入，入已而出。升已而降，降已而升。一日一夜，漏永下百刻，五十度一周于身。輪復大會于手太陰之寸口，而藏府之虛實，亦因之見焉。此乃經常之脉，不失銖分者也。而其中又有變化。

之相乘。陰陽之相干，反覆變遷，莫可名狀。如傷于風，則浮虛。傷于寒，則牢堅。水畜于下，則沉滯。支于中，則憲弦。陰陽相搏，名曰動。故動則病。病甚于經，則脉數。故數則熱。煩有此風寒濕熱之病，則見此風寒濕熱之脉。所謂效象形容者也。設有不應之處，當知變之所緣。以衡度之。三部有陰陽藏府之不同。病亦有寒熱虛實之各異。太過不可不及，亦然。太過不及，定不空見。中必伏姪，審察表裏，以知其病之所舍。于三部九候之中，消息以診之。料度藏府之病，自有獨見，不與凡同。故曰若神。色脈者，上帝之所貴，先師之所傳。非其人勿授。故曰傳與賢人。按脉之度數，其始從中焦，注手太陰，陽明，手陽明，汙足太陽，明太陰，足太陰，注手少陰，太陽，手太陽，注足太陽，少陰，足少陰，注手厥陰，少陽，手少陽。注足少陽，厥陰，足厥陰，還注手太陰，常以平旦爲紀。漏下百刻，行一周身，終而復始。與天地同度。十二經脉合，蹻脉，督脉，任脉，計十六丈二尺。一息脉行六寸。一日十二時。子午二時。

時。卯十刻。餘俱八刻。共一
一刻人一百三十五息。計脉行八丈一尺。一日一
夜共五十周。所謂五十反而大周于身。計一日一
夜共一萬三千五百息。脉行八百十丈。

日刻以合涌木之下。木下
計脉行八丈一尺。一日一
夜共五十周。謂五十反而大周于身。計一日一
夜共一萬三千五百息。脉行八百十丈。

○師曰。呼吸者。脉之頭也。初持脉來。疾去遲。此出疾
入遲。名曰內虛外實也。初持脉來。遙去疾。此出遲入
疾。名曰內實外虛也。

此節以呼吸爲平脉之準。呼出心與肺。吸入腎與
肝。一呼一吸爲一息。脉隨呼吸而行。故呼吸爲脉
之頭也。去來者。脉之去來也。出入者。呼吸之出入
也。蓋言初持脉之時。其脉之行來疾而去遲。則此
呼吸之氣亦出疾而入遲。其脉之行來遲而去疾。
則此呼吸之氣亦出遲而入疾。脉隨呼吸而行也。
來與出去。去與入。內疾爲有餘。遲爲不足。故名曰內虛外實。內實外虛也。

○問曰。上工望而知之中工問而知之下工脉而知之。願聞其說。師曰。病家人請云。病人苦發熱身體疼。病人自卧。師到診其脈。沉而遲者。知其差也。何以知之。若表有病者。脉當浮大。今脉反沉遲。故知愈也。假令病人云。腹內卒痛。病人自坐。師到脉之。浮而大者。知其差也。何以知之。若裏有病者。脉當沉而細。今脉浮大。故知愈也。

合下三節。以望問切脉而得病之情也。神聖工巧。由望聞問切而得之。故願聞其說。發熱身疼。表病也。沉而遲。裏脉也。以表病而得裏脉。乃熱除身涼之象也。故知當愈。腹內病。裏病也。浮而大。表脉也。

以裏病而得表脉。乃氣機外達之候也。故知當愈。
經云。却一爲工。知二爲上。知三爲神。發熱身疼。腹
痛。問而知之也。自卧自坐。望而知之也。沉遲浮大
脈。而知之也。此雖切脉而知其當愈。然亦必兼望
問而更精切也。魏子十問曰。發熱身疼。脉反沉遲
是陽病而見陰脉。何以說得愈也。答曰。是必望其
有恬然嗜卧之狀。問其有熱除身輕之意。而後合脉以斷其愈也。

師曰。病家人來請云。病人發熱煩極。明日師到病人
向壁卧。此熱已去也。設令脉不和。處言已愈。設令向
壁卧。聞師到。不驚起而盼視。若三言三止。脉之嚙噉
者。此詐病也。設令脉自和。處言汝病大重。當須服吐
下藥。針灸數十百處。

此雖切脉而不以脉爲憑也。發熱煩極之症而向壁安卧知熱煩已去也。脉雖不和處言已愈憑其症不憑其脉也。以發熱煩極之症聞師到當驚起盼視語言無序津液不足今言止有次序而脉之所能愈宜驚嚇之彼自愈也。

師持脉病人欠者無病也。脉之呻者病也。言遲者風也。搖頭言者裏痛也。行遲者表強也。坐而伏者短氣也。坐而下一脚者腰痛也。裏實護腹如懷卵物者心痛也。

此言雖持脉又當聞聲望色而不必拘于脉也。陽引而上陰引而下陰陽相引故欠此陰陽和爲無病也。心系急則氣道約約則不利故太息以呻出之是脉之神者病也。風傷氣氣機不利會厭難發

故言遲也。人之聲音發于丹田。裏痛則丹田之氣不能上達。艱于發聲。故搘頭而言也。太陽主表而主筋行。遲者筋脈惡而表氣強也。上下之氣不相接續。則氣短。坐而伏者。下之氣不能上交。欲俯伏以就之也。腰之筋脈與脾肺相連。腰痛則肺不能皆伸。故坐而止下一脚也。裏氣實。按之則痛。今護瘦如懷卵物。知邪實于裏而心痛也。張均衛問曰。心痛何以不護心而護腹。答曰。痛極之處。不可以按。譬如癰毒腫處。手不可近。欲緩其痛。須于上下左右以撫摩之。同一義也。

○師曰。伏氣之病。以意候之。今月之內。欲有伏氣。假令舊有伏氣。當須脉之。若脉微弱者。當喉中痛似傷。非喉痺也。病人云。實咽中痛。雖爾。今復欲下利。

此節言伏氣之病。由內而出。非若時行卒病。由外而至也。伏氣者。春之風氣。夏之暑氣。秋之濕氣。冬

之寒氣也。伏氣之病。伏藏于內。不卽見于病。亦不見于脉。故當以意候其何氣之伏藏也。伏于今月之內。當發于他月之中。故曰今月之內。欲有伏氣。是謂以意候之也。假令舊有伏氣。今時乃發。既見于病。亦必見于脉。故當須脉之。若脉微弱者。此春傷于風。風木之邪。乘中上而脉微弱也。傷于風者。上先受之。故當喉痛似傷。此伏氣之爲病。非若時行卒至之喉痺也。然不特喉痛而且咽痛。以風氣通于肝。地氣通于咽。肝主地。木克土也。春傷于風。邪氣留連。乃爲洞泄。故雖爾。今復欲下利。益謂留連于上。則咽喉痛。留連于下。則下利。上下之交。通一氣之相感也。此論春之風氣。而三時之暑溫寒氣。亦可類推矣。

○問曰。人恐怖者。其脉何狀。師曰。脉形如循絲累累。然其面白脫色也。

素問論脈必兼色故此三節俱合色脉而言也。腎主恐恐則氣下氣下則腎之精液不能營于脉。脈子色故脉形累累如循絲之網而面白貌色也。

問曰人不飲其脈何類師曰脈自滿唇口乾燥也。

飲入于胃遊溢精氣上輸于脾脾布散于五經。今胃虛不飲肺無以布脾無以輸脉道不利津液不行故脉濡而唇口乾燥也。

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤愧屬心心有所慙愧則神清氣阻中無有主故脉氣外浮白色赤白而無定也。此三節論色脉生始之源而止言心腎胃者以脉始于腎生于胃主于心。又心之合脉其榮色其主腎而胃爲五藏六腑之本五色之所主也。

○問曰。經說脉有三菽六菽重者何謂也。師曰。人以指按之。如三菽之重者。肺氣也。如六菽之重者。心氣也。如九菽之重者。脾氣也。如十二菽之重者。肝氣也。按之至骨者。腎氣也。假令下利。寸口關上尺中。悉不見脈。然尺中時一小見。脉再舉頭者。腎氣也。若見損脈來至爲難治。

此節以脉之輕重。候五藏之氣。菽。豆也。謂以指按脉之輕重。省如菽之多寡也。蓋言五藏有高下之不同。按脉有浮中沉之各異。肺合皮毛。宜浮取之。心合血脈。脾合肌肉。宜中取之。肝合筋。腎合骨。宜沉取之。故有三菽六菽九菽十二菽以及至骨之按法也。然以浮中沉舉按之輕重。而候五藏之氣。

又當以寸關尺之上下而候五藏之氣也。故曰假令下利假令者設言也。借此以明脈之起于腎。由下而上。由陰而陽之義也。夫以下利而至于不見脈。是氣惟下洩而無上達之機也。若尺中時一小見。是腎之生氣未絕。而三部之脉得以再舉。故曰腎氣也。言三部之脉。俱可以藉腎氣而生也。若一息再至。是謂損脈。雖有尺中小見。而生氣衰微。三部不能再舉。故爲難治。論五藏之氣而獨歸結于腎氣者。以脈之根源。俱出于腎也。

○問曰。脉有相乘。有縱有橫。有逆有順。何謂也。師曰。水行乘火。金行乘木。名曰縱。火行乘水。木行乘金。名曰橫。水行乘金。火行乘木。名曰逆。金行乘木。木行乘火。名曰順也。

正藏屬五行。而五行自有一定生剋不易之理。其有當剋而剋。有不當剋而剋。俱謂之相乘。乘者。因其間隙而乘之也。水行乘火。金行乘木。我所勝者。而復乘之。則縱勢而往。無所顧慮。故名曰縱。火行乘水。木行乘金。我所不勝者。而敢乘之。則橫肆妄行。無復忌憚。故名曰橫。水行乘金。火行乘木。生我者。而我反乘之。以下犯上。背逆無道。名曰逆。金行乘水。木行乘火。我生者。而我乘之。以尊臨卑。名正言順。名曰順也。此經脉不和。五藏自相乘勝。而爲病。故論脉而止列縱橫逆順之名。不列縱橫順之脉學者。可以意推矣。合下三節。言脈有縱橫逆順。殘賊炎怪之變遷也。

六者名曰殘賊。能爲諸脉作病也。

殘傷殘也。賊害也。言此六者之脉。足以暗傷人之經脉血氣。如賊之害人而不覺。故曰能爲諸脉

也。作病

問曰。脉有災怪。何謂也。師曰。假令人病。脈得太陽與形證相應。因爲作湯。比還送湯。如食頃。病人乃大吐。若下利腹中痛。師曰。我前來不見此證。今乃變異。是名災怪。又問曰。何緣作此吐利。答曰。或有舊時服藥。今乃發作。故名災怪耳。

此言脈證相應。投湯少頃。而忽變異。乃舊時之藥。不與症合。已過于經。始發作耳。故名災怪。

○問曰。東方肝脉。其形何似。師曰。肝者木也。名厥陰。其脈微弦濡弱而長。是肝脈也。肝病自得濡弱者愈。

也。假令得純弦脈者死。何以知之。以其脈如弦直。此是肝臟傷故知死也。

合下四節以明人之五藏。上合天之四時三陰。下合地之五方五行。而四時又皆以胃氣爲本也。在地爲木。在藏爲肝。故曰肝者木也。在天爲風。厥陰之上。風氣主之。故名厥陰。弦而長者。肝脈也。微弦濡弱而長者。肝之胃脉也。肝病得濡弱之胃氣者愈。純弦無胃氣者死。又申明何以知其死也。以真藏之脉見。知是肝臟傷故死也。○韓乾安問曰。三節止言肝木心火肺金。而不及腎水者。何也。答曰。腎爲諸脉之根源。與胃同體。有胃氣者生。有腎氣者亦生。故前云尺中時一小兒脉再舉頭者。腎氣也可。見三藏之中俱有胃氣。腎氣在焉。故不必復言腎也。若末節止言肺金。則曰他皆倣此矣。

南方心脉。其形何似。師曰。心者火也。名少陰。其脉洪

大而長是心脉也。心病自得洪大者愈也。假令脉來微去大。故名反病在裏也。脉來頭小本大。故名覆病在表也。上微頭小者。則汗出下微本大者。則爲關格不通。不得尿。頭無汗者可治。有汗者死。

洪大而長。心之胃脈也。心病得洪大而愈者。自得其位而起也。來爲陽。去爲陰。心者火也。洪大是其火象。今反來微去大。此爲不及。故名反。此心火內微。病在裏也。頭者。脉之梢也。本者。脉之根也。如樹內之有根梢也。今頭小而本大。此心火不能上達于陽。而反退歸于陰。故名贊。言火性喜升。今爲物所覆。不能上炎。此心火外微。病在表也。上爲寸。寸微頭小。心虛不能攝液。故汗出下爲尺。尺爲陰。尺微者。關陰于內也。大爲陽。本大者。格陽于外也。陰陽關格。心氣不得下通。故不尿。汗與小便皆津液之

化施。須無汗者。津液不上。猶可冀其下通也。有汗者。津液不下。輸而反上。越陰陽。乖隔倒行而逆施。故死此皆不得稟于胃氣者也。

西方肺脈。其形何似。覽曰。肺者金也。名太陰。其脈毛浮也。肺病自得此脉。若得緩遲者皆愈。若得數者則劇。何以知之。數者南方火。火克西方金。法當壅腫。爲難治也。

毛浮者。肺之本脈也。緩遲者。脾胃柔和之脈也。肺病自得其旺。脉固愈。若得遲緩之脉。不特得其胃氣。抑且予病而得母氣之相生。故爲皆愈。數爲心脉。心火魁金。謂之賊邪。經云。諸痛痒癰瘍。皆屬心火。又云。熱勝則腫。火燄金消。故難治也。肝木言其本藏太過而死。心火言其本藏不及而死。肺金言

其爲他藏所尅而死。此火氣之變幻也。非謂用木不可太過。心火不可不及。肺金不可相危。舉一隅而三隅反也。

問曰。二月得毛浮脉。何以處言至秋當死。師曰。二月之時。脉當濡弱。反得毛浮者。故知至秋死。二月肝用事。肝屬木。脉應濡弱。反得毛浮脉者。是肺脉也。肺屬金。金來尅木。故知至秋死。他皆倣此。

此信五藏宜相生而不宜相尅也。舉一肺金肝木。
而他藏倣此矣。二月所旺之時。不能自旺。反爲勝我者而乘之。肝氣憊矣。然不卽死者。以尚有旺氣相扶。所謂自得其位也。至秋而死者。木絕于申。金旺于亥。木空藏絕。孤危全無所倚。故死。

○師曰。脈肥人責浮。瘦人責沉。肥人當沉。今反浮。瘦人當浮。今反沉。故責之。

此節言人之五藏內稟五行而人之形質亦外象五行也。五行之人肥。木行之人瘦。肥人質厚而重。當得沉重之脈。稟土之性也。瘦人質薄而輕。當得輕浮之脈。稟木之質也。今以肥人而得浮脉。木性浮。浮脉。冠矣。以瘦人而得沉脉。金質沉。金氣木矣。故責之。

○師曰。寸脉下不至關爲陽絕。尺脉上不至關爲陰絕。此皆不治。決死也。若計其餘命。死生之期。期以月節。尅之也。

寸爲陽。尺爲陰。關爲陰陽之中。陽至關而下交于陰。陰至關而上交于陽。陰陽互相交合者也。今寸

不能下至關爲陽絕于上。尺不能上至關爲陰絕于下。陰陽乖離。上下脫絕。不治之脉。必死也。若未卽死。不過苟延子旦夕。逢月節。剋之期而死也。陽絕謂陽與陰相絕。陰絕謂陰與陽相絕。上下不相交接。兩相隔絕。非陰陽之真氣絕也。若真氣已絕。立死矣。何待月期也。高士宗曰。寸脈爲陽火也。尺脉爲陰水也。關爲陰陽之中土也。陰陽水火俱交會于中土者也。今上下皆不至關。由土氣孤危。不能交接也。合下二節以天時之月節。王氣而决其死生也。

師曰。脉病人不病。名曰行尸。以無王氣。卒眩仆。不識人者。短命則死。人病脉不病。名曰內虛。以無穀神。雖困無害聲。王去

上章東方肝脉三節。言四時俱以胃氣爲本。此節又明四時當以肝氣爲本。無胃氣曰死。無旺氣亦

曰死脈病人不病者。雖脈損而形體充也。猶散神消。僅存者形骸耳。故名曰行尸。所以然者以無四時之旺氣也。無王氣者謂春不茂。夏不洪。秋不毛。冬不石也。藏真損神氣傷譬如廩溺不可爲期。故卒敗仆不識人。短命則死也。若形體雖病而經脉無傷。此因內虛。中焦水穀之神不能散精滯氣于經也。雖無穀神尚有胃氣。或曰雖困無害。○穀神非卽胃氣。乃水穀之精。所以資養胃氣者也。究竟足外來之木穀。人賴此以資生。故曰穀神。人或內虛食少。穀氣不充。卽無穀神矣。或曰無害。若無本然之胃氣安得謂之無害乎。

○問曰。翁奄汎。名曰滑。何謂也。師曰。汎爲正陽。陰陽和合。故令脉滑。關尺自平。陽明脉微汎。食飲自可。少陰脉微滑。滑者。緊之浮名也。此爲陰實。其

人必股內汗出。陰下濕也。

此節言少陰陽明爲脈生相和合者也。下節遂承繫之翕合也。卷忽也。謂忽焉替乘更而流利之狀也。純少陰與陽明兩相和合。故陽明尺主少陰。陽明脉微少陰脉微滑。陰中有陽火。則食飲自可矣。蓋言食飲癸合而後能食也。此陰陽滑與繫相似。但急切而無滑與繫之象爲滑。故曰滑者繫之浮名也。但繫爲陰。此少陰不與陽明相合。俱屬少陰。陰實則少陰之于陰股。故股內汗出而陰交合者。又如此。

始之源。陰陽之主。宜兩脉而申言之。翕。卽翕如。而翕忽焉而沉。如珠替陰少陰也。正陽陽明也。令脉翕而忽沉也。關主沉陽。中有陰。關自平也。自平也。關尺平。陰陽和。雖屬陽明。然亦必待戊之交合者如此。又申明陽和之氣爲繫。搏浮而有鼓動之象爲滑。故曰滑者繫之浮名也。但繫爲陽。而陰自實也。股內陰下。下濕也。此陰陽逆不相流。

問曰。晉爲人所難。繫脉從何而來。師曰。假令亡汗。若吐以肺裏寒。故令脉繫也。假令飲者坐飲冷水。故令脉繫也。假令下利。以胃中虛冷。故令脉繫也。

上節言繫爲陰實。則繫屬少陰。此復明繫脉之所由來。而曰肺裏寒。坐飲冷水。胃中虛冷者。總以見繫脉之爲寒。非特少陰也。亡汗。陽氣衰也。吐。虧氣傷也。肺主諸氣者也。假令亡汗。若吐。以肺裏寒。不能主持諸氣。故令脉繫。此繫脉之從肺裏寒而來也。假令飲者。飲冷水傷肺。故令脉繫。此繫脉之從坐飲冷水而來也。假令下利者。胃中虛冷。故令脉繫。此繫脉之從胃中虛冷而來也。觀此則諸繫爲寒可不言而喻矣。

○寸口衛氣盛。名曰高。榮氣盛。名曰章。高章相搏。名

曰綱衛氣弱。名曰慄。榮氣弱。名曰卑。慄卑相搏。名曰沉。
損衛氣和。名曰緩。榮氣和。名曰遲。遲緩相搏。名曰汎。
自此節以下。凡十八節。論寸口。趺陽少陰之脉。有
和平。有盛衰。有太過與不及也。此以榮衛陰陽之
氣。皆會于寸口。故首以寸口候榮衛之有餘不足。
以及和平也。高高大也。革。革者也。綱。宜作剛。謂剛
強也。言榮衛之氣有餘。則氣血爲之太剛而強也。
慄。恐怯也。卑。汚下也。損。減少也。言榮衛之氣不足。
則氣血爲之減損而少也。剛也。損也。皆非榮衛和
平之氣也。衛氣和。名曰緩。緩者。舒也。榮氣和。名曰
遲。遲者。徐也。榮衛俱和。名曰沉。沉者。沉實而不虛。
浮也。不剛不柔。中和之氣也。此言榮衛之氣有高
章。慄卑之象。非言脉之形也。故止提寸口。而不提脉。

寸口脉緩而遲緩。則陽氣長。其色鮮。其顏光。其聲商。

毛髮長蓬則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮軟陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得名曰強也

此以寸口之脉論榮衛以榮衛陰陽之氣皆大會于寸口也衛爲陽主氣緩則陽氣長長則其色鮮而明其顏光而澤其聲商而清毛髮盛且長榮爲陰主血運則陰氣盛盛則髓日益生血日益滿肌肉緊薄而鮮軟此榮衛之充滿于內流溢于外也陰陽相抱者彼此相顧而不相背也榮衛俱行者榮衛流行不失衡鉉也剛柔相得者剛以濟柔柔以濟剛也强者健也自强而不息也謂榮衛之氣運行于內外而不息也愚按凡人太肥則肌肉空浮而不緊實柔軟而不堅硬太瘦則肌肉粗厚瘦則肌肉相得自然緊薄鮮軟也

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強

痛還自傷。以手把刃坐作瘡也。

跌陽者。胃脉也。土氣柔和。脈當遲緩。今反滑而緊。
滑爲陽。故滑則胃氣實。緊爲陰。故緊則脾氣強。持
胃氣之實。擊脾氣之強。兩竇相持。兩強相擊。太剛
則折。故痛還自傷。猶自貽其害也。以手把刃坐作
瘡者。猶以操刀而自割也。

寸口浮脈而大。浮爲虛。大爲實。在尺爲關。在寸爲格。
關則不得小便。格則吐逆。

此以寸口論關格也。寸口脉浮而大。浮爲正虛。大
爲邪實。浮大之脉在于尺。則爲關陰。厚大之脉在
于寸。則爲格陽。關陰則陰氣不能施化。故不得小
便。格陽則陽氣不能宣通。故吐逆。此寸口陰陽不
和之爲害也。

趺陽脉伏而濇。伏則吐逆。水穀不化。濇則食不得入。名曰關格。

此又以趺陽論關格也。趺陽者土也。土不宣通。謂之頑土。今伏而不宣。則中焦不運。不能消磨水穀。而吐逆也。濇而不通。則上焦不納。而食不得入也。中上壅塞。而不通。亦名曰關格。○上節論關格。則日不得尿。次節論關格。則日不得小便。而吐逆。此節論關格。則日吐逆。食不得入。可見上中下三焦。有一症。見卽爲關格。不必經其學者。得其意。而治之。其庶幾乎。○吐逆者。食入而復出也。食不得入者。食竟不能入也。

脈浮而大。浮爲風。虛大爲氣強。風氣相搏。必成癰癧。身體爲痒。痒者名泄風。久久爲癩癩。

浮爲風虛者虛邪不正之邪風也。大爲氣弱者邪
風傷氣而氣不柔和也。外之虛邪之風與內之邪
盛之氣相搏。則于于皮膚而成隱癰。隱癰者隱于
皮膚欲出而不岀。故身體爲毒。辨則脈行皮膚而
成泄風。久久不去。則從皮膚肌腠入于經脉而爲
癥癩矣。癥癩者。厲風也。○上節脉浮大爲關格者。
正氣自虛而陰陽不相通也。此節浮大爲泄風。
癥癩者。正氣虛而虛風之邪于于皮膚經脉也。均
之浮大。而見癥癩之不同如此。

寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者榮中寒。榮爲血血
寒則發熱。衛爲氣。氣微者心內飢。飢而虛滿不能食
也。

此言榮衛氣血俱出中焦。脾土化生。若中土虛寒。
則榮衛亦虛寒矣。榮衛虛寒。則中土更虛寒矣。榮

衛中土交相爲資者也。弱爲陽微，故脉弱爲
衛氣微，遲爲陰寒。故寸口脉遲爲榮中寒。失榮爲
血、陰虛者陽必湊之。故血寒則發熱，衛爲氣，氣微
者則上焦空虛。故心內飢也。心虛則飢。脾虛則溼。
心虛于上，脾虛于中。故飢而寐溼不能食也。

趺陽脈大而緊者當卽下利爲難治。

趺陽者，胃脉也。胃脉當遲緩。今反大而緊者，大爲
虛累爲寒，虛寒下陷，當卽下利。陰寒盛而土氣弱，
故爲難治。

寸口脉弱而緩弱者，陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而
吞酸，食卒不下，氣墮于船上也。

此又以寸口之脉候上中二焦不足有餘之氣也。
陽氣者，上焦之陽氣也。胃氣者，中焦之胃氣也。上

焦出胃上口。陽氣不足則厥逆從下上。厥復出乎胃。故爲嘔。不能宣五穀味。故吞酸也。焦亦並胃出。胃氣有餘于中。則無所藉于外。故食卒然不下也。吞酸不食。則屬氣與胃氣俱墮于膈上。而不得下也。

趺陽脈緊而浮。浮爲氣。緊爲寒。浮爲腹滿。緊爲絞痛。浮緊相搏。腸鳴而轉。轉卽氣動。脇氣乃下。少陰脈不出。其陰腫大而虛也。

此言趺陽之氣。下歸于少陰。而少陰之氣不上交于趺陽。而爲病也。趺陽脉緊而浮。乃陰寒氣盛。而出而中土虛滿也。緊爲絞痛者。邪正相攻而陰氣盛也。浮緊之氣兩相搏擊。則氣從脾胃而發于大腸。故腸鳴而轉。轉則動其屬氣。又從膈而下。得于

少陰寒氣與陽氣俱聚于少陰。則少陰之水氣不升。而下聚于陰陽。故少陰麻不出。其陰腫大而虛也。以是如趺陽之氣從屬而上。膈上膈下俱從中土爲之上下。故曰陽鳴而轉腸與胃俱屬土也。

寸口脉微而溝微者。衛氣不行。溝者榮氣不足。榮衛不能相將。三焦無所仰。身體痺不仁。榮氣不足。則煩疼。口難言。衛氣虛。則惡寒。數欠。三焦不歸其部。上焦不歸者。噫而酢呑。中焦不歸者。不能消穀引食。下焦不歸者。則遺尿。

此言榮衛之氣出于中
榮衛也。寸口脉微。則衛

土。而三焦之氣又仰藉于
氣不行。溝則榮氣不足。不

行不足。則榮衛不能相濡。而三焦無所仰。精以遊行出入于內外矣。三焦無所仰。則不能出氣以溫肌肉。而身體渾不仁矣。榮爲血。血不足。則無以養筋骨。而煩疼無以榮口唇。而難言。衛者。衛外而爲固也。衛氣虛。則不能衛外。而惡寒。衛氣行于陰。則寐。今欲下行于陰。故數欠。三焦各有部署。三焦無所仰。則不能歸其部矣。上焦之部。出胃上口。不歸則噫。而酢吞。中焦之部。並胃巾。不歸。則不能消散引食。下焦之部。別廻腸。在膀胱。不歸。則遺尿。以是知三焦之氣。俱藉榮衛之氣。以遊行山川者也。

趺陽脈沉而數。沉爲實。數消穀。緊者病難治。

前言。趺陽脈大而緊。下利爲難治。此趺陽之氣虛而難治也。此言沉而數。緊者病難治。此趺陽之氣實而難治也。脈沉而數。沉則土氣實。數則熱消穀。火土之氣旺。柔火之氣少也。若再加轉索。無常之脉。是數極而火土太過。全無柔和之氣。故爲難治。○此緊從數中而來。即弦數之脉。非緊爲緩之脉。

本論曰。脉浮。
脉緊。名曰弦也。

寸口脉微而濶。微者衛氣衰。濶者榮氣不足。衛氣衰而色黃。榮氣不足而色青。榮爲根。衛爲葉。榮衛俱微則根葉枯槁。而寒慄欬逆。唾腥吐涎沫也。

此言榮衛外合于肺。而充于皮毛也。經云。肺者氣之本。其華在手。其充在皮。今榮衛之氣衰微。不能外合于肺。華于毛。充于皮。故面色青黃也。榮行脈中。故榮爲根。衛行脈外。故衛爲葉。榮衛俱微。則根葉枯槁。而衛不能衛于外。故寒慄而欬逆。榮不能榮于中。故唾腥而吐涎沫也。欬逆者。肺之病。腥者。肺之味。涎沫者。肺之液也。所謂榮衛皆虛。不能合肺。而充皮毛者如此。

趺陽脈浮而芤。浮者衛氣虛。芤者榮氣傷。其身體瘦。

肌肉甲錯浮芤相搏宗氣衰微四屬斷絕

此言趺陽主榮衛之氣而復上循于宗氣外行于四末也。衛者水穀之悍氣。榮者水穀之精氣。榮衛俱稟氣于胃者也。今趺陽脉浮而芤則中上虛微。榮衛無所熏其精悍之氣。故衛氣虛而榮氣陽也。榮衛之氣不充于身體則消瘦。不充于肌肉則甲錯。甲錯者粗燥而不潤澤也。胃之大絡出于左乳下謂之宗氣。今浮芤相搏則胃絡不能出于左乳故宗氣衰微又不能外行于四肢故四屬斷絕此趺陽之氣虛內而榮衛宗氣外而身體四肢俱無所仰也。

寸口脉微而緩微者衛氣踈踈則其膚空緩者胃氣實實則穀消而水化也。穀入于胃脈道乃行水入于經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

此言榮衛宜相將而不宜偏盛也。前節言寸口脉緩而遲。主榮衛皆盛。後節言寸口脉微而滑。主榮衛皆衰。此節言寸口脉微而緩。主衛氣躁而榮血盛也。衛氣躁則不能衛于膚表。故其膚空。緩為胃之本脉。故為胃氣實。實則消穀引食。故穀消而木化也。穀入而消。則濡精于脉。脈道乃行也。水入而化。則水精四布。其血乃成也。夫榮血藉中焦水穀之氣而生。水穀之氣盛。則榮血亦盛矣。榮血獨盛而不與衛諧。則其膚必躁。榮衛不相將。則三焦無所順。不能循行經脈。而與經相絕矣。陽密乃固。陽不密。則不能爲陰之固守。而崩墮矣。故名曰血崩。

趺陽脉微而緊。緊則爲寒。微則爲虛。微緊相搏。則爲短氣。

此言肺主氣。而又藉中土以司呼吸也。趺陽脉微而緊。則中土虛寒矣。微緊相搏。則既虛且寒。肺氣

無所資。上下不相接續而短氣矣。

少陰脉弱而濇弱者微煩濇者厥逆

此言脈之始于少陰也。少陰上火下木而主神機出入。弱者下木不上交于火。火猶盛而微煩濇者上火不下游于木。木僵盛而厥逆者。于是逆冷也。

趺陽脉不出。脾不上下。身冷膚硬

前節言少陰脉不出。此節言趺陽脉不出。以見少陰趺陽相爲上下。可出而不可入也。趺陽者胃也。脾與胃以膜相連耳。趺陽脉不出。則脾不能爲胃行其津液于上下周身膚表之間。故身冷膚硬矣。少陰脉不至。腎氣微。少精血奔氣促迫。上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣退下。熱歸陰股。與陰相動。冷

身不仁。此爲尸厥。當刺期門巨闕。

此言少陰上主陽氣。下主精血。由下而上。由上而下者也。少陰爲氣血生始之源。脉不至。必腎之真氣微。而精血少也。真氣不足。則虛奔之氣。反從近而上。入于胸膈矣。宗氣反聚者。不能貫膈絡肺。出千左乳下。而反聚于胸膈矣。此不當上而上者也。精血少。則血不能流行于經脈。而反結于心下。陽氣不得上行。而反退歸于陰股。陽入于陰。與陰相動。此不當下而下者也。上者自上。下者自下。上下之氣血不相順接。故令身不仁。其形若尸。故曰此爲尸厥。當刺期門。巨闕以通其上下之血氣焉。期門者。肝之募。巨闕者。心之募。刺之以散其退下之陽。遏其奔上之氣。上下通而氣血和矣。

○寸口脉微。尺脉緊。其人虛損多汗。知陰常在。絕不見陽也。

此應辨脈首篇。陰病見陽脉者生。陽病見陰脉者死。二句併結平脉辨脉通篇陰陽之理。以明傷寒以生陽爲主。而獨歸重于生陽之義。夫寸口脉微陽氣衰也。尺脉緊。陰氣盛也。陽衰陰盛。以致其人虛損而多汗也。微與緊。陰脉也。虛損多汗。陰病也。以陰病而見陰脉。則知陰常在。而不見有生陽之氣矣。故曰知陰常在。絕不見陽也。○愚按陰陽離合論云。天覆地載。萬物方生。未出地者。命曰陰。處名曰陰。中之陰。則出地者。名曰陰。中之陽。蓋言萬物由陰而生也。既有生以後。合陰陽而成形。陰勝則陽病。陽勝則陰病。陰陽反作病之逆從。不可偏也。由是觀之。素問所云陰中之陰。言混沌方開。陽生于陰。由陰而陽。論陰陽之理也。仲師所云知陰常在。絕不見陽。謂其人稟陰陽二氣而生。陰陽固不可偏勝。而生陽之氣尤不可獨絕。陽重于陰。論陰陽之病也。

○寸口諸微亡陽。諸濡亡血。諸弱發熱。諸緊爲寒。諸

乘寒者則爲厥。鬱冒不仁。以胃無穀氣脾濇不通。口
齒不能言。戰而慄也。

此總結通篇寸口諸脈之義也。寸口之脉微濡弱
緊爲病。不然大約不外乎氣血寒熱四者而已。
故諸微爲亡陽。諸虛爲亡血。陰虛則熱。故諸弱爲
發熱。陽虛則寒。故諸緊爲寒。諸爲寒邪所乘者則
手足逆冷而厥。厥者氣血爲寒所乘。虛而不通于
四肢也。齧冒者虛而不行于上也。不仁者虛而不
出于外也。夫氣血不自生。必藉胃府穀精之氣而
生。苟胃無穀氣。則不能上輸于脾。而脾濇不通。不
能內歸于心。而口齒不能言。
不能外出乎肺而戰慄也。

○問曰。濡弱何以反適十一頭。師曰。五藏六府相乘。
故令十一。

此論先天之氣必賴後天水穀之氣而生。故不必復言少陰寸口。而獨歸結于胃氣。以結通篇平脈講脈之義也。胃者五藏六府之本也。五藏六府之中俱有胃氣。如前所云。肝脾微甚濡弱而長。心長者用脉也。濡弱者胃氣也。以胃氣而簡于五藏六府之中。則為濡弱。以胃氣而自見其脉。則久遲而緩。故曰。趺陽脉遲而緩。胃氣如經也。由是而知遲緩與濡弱皆胃土之脉也。故問濡弱何以反適才一頭答以十一者。五藏六府也。五藏六府皆稟氣于胃。故胃府之氣皆相乘于五藏六府之中也。適至也。乘往也。言胃氣得乘于五藏六府之中。相合而爲十一也。

問曰。何以知乘府。何以知乘藏。師曰。諸陽浮數爲乘府。諸陰遲濇爲乘藏也。

何以知乘府者。言何以知胃氣之乘六府也。何以知乘藏者。言何以知胃氣之乘五藏也。客以五藏

六府不外陰陽。諸陽浮數而濡弱爲胃氣之本于五氣以是
六腑諸陰遲濇而濡弱爲胃氣之末于五氣以是
知胃爲五藏六府之本。十二經脉之長氣血生始
之根。禁問千言萬語總以胃氣爲本。而傷寒論自
始至終又無不歸重于胃氣。傷寒素問先聖後聖
其揆一也。明漢位問曰浮數遲濇是病脈何以見
得胃氣。且本文不言濡弱解內何以深入濡弱二
字恐仲師之意未必然也。答曰文內雖不言濡弱
而其意寔解濡弱此古人言外之意也。不然何以問濡
弱及遙下一頭也。