

金匱要略方論本義

百合狐惑陰陽毒病證治第三

論一首

方十  
證三條

二首

論曰。百合病者。百脉一宗。悉致其病也。意欲食。復不能食。常默然欲卧。不能卧。欲行不能行。飲食或有美時。或有不用。聞食臭時。如寒無寒。如熱無熱。口苦小便赤。諸藥不能治。得藥則劇吐利。如有神靈者。身形如和。其脈微數。每溺時頭痛者。六十日乃愈。若溺時頭不痛。淋然者。四十日愈。若溺快然。但頭眩者。二十日愈。其證或未病而預見。或病四五日而出。或病二十日。或一月微見者。各隨證治之。

百合病者肺病也。肺主氣。肺病則氣病。氣病則脈病。可以遁言也。百脉一宗。言周身之脉。皆一氣爲之宗。主而已。氣既病。則脉焉有不悉致其病者乎。脉固在營衛間。而氣病非耑在營衛也。衛固是氣。而肺氣與衛氣只可言共貫。不可言同條也。總責之肺氣斯明矣。因爲詳舉其證意。欲食胃無病也。復不能食。肺氣上壅也。常默然。肺氣壅格。胸膈不快。中氣反歎。故默然如有所思也。欲卧。氣鬱則陽鬱于陰分。而倦怠也。復不能卧。陽鬱于陰分。而陰不靜。則卧必不安也。欲行。氣鬱則思舒通也。復不能行。氣鬱則失其轉運之度。而筋骨委頓。周旋不能快捷也。飲食或有美時。肺氣有下行之時。值其時。則胃無病。而以飲食爲美也。或不用飲食。但見食物卽聞臭氣。肺氣有上逆之候。值其候。則膈上格阻。而見食間臭。所以不能用之也。如寒如熱。隨氣之升降。爲虛寒虛熱之象也。不寒不熱。實無客邪。感傷于內外。故不寒不熱。正是氣病之真情也。口苦。氣上升化津。氣病則津不甘。而苦也。小便赤。氣下降化溺。氣病則便不清而赤也。是皆爲氣。

病之見證而知之者鮮矣。於是治其表裏不效也。治其營衛不效也。治其臟腑不效也。以爲寒熱不能辨也。以爲虛實不可測也。汗之不可。吐利之不可。補益之不可。藥百投而無一效。則不知治氣之故也。得藥則劇。則吐利皆庸醫之過也。既不能測識病情。遂驚疑恍惚。望而畏之。如有神靈。豈真有神怪奇幻。有外于耳目日用之前者乎。特以人自無辨晰之智而已。故其身形如和氣病而血未病。形者屬陰血本乎地者也。其脉微數氣病而脉必病。脈者屬陽氣本乎天者也。惟其爲陽氣故脉必挾微熱。所以脉見微數也。惟其無內外他邪相雜。故不見他病脉而數亦不甚也。且脈數而無表熱。則無外感可知。脈數而無裏熱。則無內傷可知。單見微數之脉。單爲氣分有病而已。誰能于脈微數三字。勘破百合病之源乎。再驗之外證。以決其愈期。每溺時頭痛者。溺爲氣化。氣病則溺。不如常。頭爲陽聚氣病則陽鬱而痛。溺時頭痛平時不然。氣病而無他邪。顯然在目矣。決以六十日乃愈者。就陽氣之聚處言之。聚則難散。亦不可以日計也。

快快乃不快  
正與快相反

下此而溺時頭不痛。漸然者就陽氣之散敷處言之也。亦膀胱氣化有碍而太陽皮膚應之也。此較頭痛者量減矣。減則易散。決以四十日愈亦不可以日計之也。亦氣病而心志快快不快。神識乃不了了。頭目應之。此較溺時漸然者又量減也。蒙胃見于頭而不及周身更易散。計二十日愈亦不可以日計也。然總以溺時較滯則氣化之。清渾正陽之歸足俱于溺驗之。又不止爲百合病。度金針也。以六十四。二十日計算者。約清陽之氣昭朗之期爲病愈之候也。其言愈亦未見言治法。則氣病無他邪。亦在善養者知言明理。調其飲食。慎其起居。節其勞役。寡其嗜慾。以無害其氣斯可矣。何必借靈草木乎。人身有大藥。不外于善養。其氣人身正氣之外。別求草木之氣爲資。助猶以砂石摻珠玉。未見其有益也。此又不敢毀傷之君子。朝夕凜凜者也。再者內傷外感之病。病而後可驗。其爲何邪。若夫氣病。則未病而其證預見。及至既病而四五日而出二十日或一月而微見。前後閃爍。

反莫可端倪。終又不能測識其爲何邪也。所以疑爲神鬼靈秘。而妄招世醫之混治也。惟智者方能揭其本原。而爲昭示名之。曰氣病。氣無所屬。屬於肺。所以名之曰。肺病也。然氣病。其大綱也。猶有爲目子氣病之中。而各著其證者。則難于盡言矣。亦惟有隨證治之。而不、出、治、氣、治、氣、不、出、治、肺。而已。此百合病。以百合爲主藥。而且以藥名病也。夫。

### 百合病

百合病。發汗後者。百合知母湯主之。

### 百合知母湯方

百合

七枚

知母

三兩

右先以水洗百合。瀆一宿。當白沫出去。其水更以泉水

二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

嘗百合病用百合蓋古有百合病之名卽因百合一味而瘳此疾因得名也如傷寒論條內云太陽病桂枝證亦病因藥而得名之義也後人見百脉一宗四字及列證麗雜似乎百端奏合之病矣不知一氣爲病而一藥爲治無取乎岐雜之見也本草百合甘平無毒主邪氣氣病則正氣爲邪氣治其氣而邪氣復爲正氣矣他山取石所以攻玉去其瑕而瑜自全矣非二物也又云利大小便補中益氣此百合病中所以爲主藥也氣之爲病無二義非實而不順卽虛而不足今一物而兼順利與補益則有餘之實邪氣可洩而不足之虛正氣可充道一以貫之君子多乎哉若夫於一物之中有增減者則原文所謂隨證治之者也且不必拘執而可爲變通者惟百合一味爲君主乃仲景大經大法之昭垂不可妄爲移易焉其中用

知母佐之者。以清肺經之熱。能助百合洩邪氣。得宣通而補正。氣無膠滯也。故以爲第一方。

百合病下之後者。滑石代赭湯主之。

滑石代赭湯方

百合  
擘七枚

滑石  
三兩碎

代赭石  
如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合。瀆一宿。當白沫出去。其水更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代赭。取一升。去滓後。合和重煎。取一升。五合分溫服。

至下之後。不用知母。而以滑石代赭湯主之者。以重墜之品。隨下藥之勢。使邪氣自下洩也。用代赭石之溫。利大便也。用滑石之滑利小便也。知母清肺治氣化之源。滑石利水治氣化之流也。又以赭石杜塞岐

路不使正氣淺也。無非助百合爲理者也。

百合病吐之後者用後方主之。

百合雞子湯方

百合擘七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合、漬一宿、當白沫出去其水、更以泉水二升煎取一升去滓、內雞子黃攪勻、煎五分溫服。

按其悞吐之後用雞子黃者佐百合以補陰吐則傷陰補之以救悞而百合治氣如故也

百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之。

百合地黃湯方

百合  
肇七枚  
生地黃汁一升

右以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓，內地黃汁，煎取一升五合，分溫再服。中病勿更服。大便常如漆。

大便如漆，熱邪已下洩矣。  
故云中病勿更服。

按其不經吐下，病形如初，用地黃者，助百合滋陰降火，陰陽平補也。蓋氣久鬱，則生熱，氣生熱，則耗陰，故治陽必顧其陰也。

百合病一月不解，變成渴者，百合洗方主之。

百合洗方

右以百合一升，以水一斗，漬之一宿，以洗身。洗已，食煮

餅勿以鹽豉也。

按其一月不解，變成渴者，以百合洗之，不惟補其氣而潤其燥也。皮毛主肺，潤皮毛正所以潤肺耳。百合病渴不差者，括樓牡蠣散主之。

括樓牡蠣散方

括樓根      牡蠣

熬等分

右爲細末，飲服方寸匕，日三服。

按渴不差者，加括樓根苦以清肺，牡蠣潤以利水，清熱除濕。正氣行而渴止矣。以潤燥不對者，卽爲清熱除濕，而渴未有不效者也。

百合病變發熱者。已作寒熱百合滑石散主之。

百合滑石散方

百合一兩 滑石三兩

右爲散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除

移其變發熱者則非脉微數而不見發熱矣必有氣鬱  
內生之熱故熱發于表矣仍以百合理氣佐之滑石  
利水水洩而內熱除內熱除而表熱退也總爲百合  
一物引伸于無盡而殊不出順氣補氣之神理也此  
百合所以以一物治病而卽以一物名病也乎

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之  
見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦  
爲逆

拔然仲景猶恐人之終不能識百合病而悞爲治也。於是又就陰陽以明之。正氣之外無陰陽也。陰陽二氣之外無人物也。明陰陽正所以明氣分之本事也。百合病固爲氣病矣。而氣有陰陽。病則不能無陰陽之偏勝。其偏勝處卽病也。而救其偏。調其正。卽治病之法也。凡病皆然而就氣病言之更顯且著耳。百合病見於陰者。陽不足而陰有餘也。當以陽法救之。使陽之不足與陰相濟。則善矣。見於陽者。陰不足而陽有餘也。當以陰法救之。使陰之不足與陽相濟。則善矣。倘病見於陽。陽有餘可知。而反攻陰。則陰益不足矣。再病見於陰。陰有餘可知。而反攻陽。則陽益不足矣。何謂攻陰。發汗是也。陽有餘而陰不足。復悞發汗。以動擾其陰。此爲逆也。何謂攻陽。下之是也。陰有餘而陽不足。復悞下之。以傷損其陽。此亦爲逆也。仲景明示人以此。正見隨證治之。亦必審酌其陰陽之偏勝。而不失正氣之調勻。方爲順而不爲逆也。其所爲病見於陽者。如溺時頭痛。聞食臭氣口苦。小便赤。發熱作渴。不差是也。其所謂病見於陰者。如不能食。不能

臥不能行。常默然。及溺時。浙然快然。但頭眩是也。是雖一病。而偏見于陰。則陽不足。偏見于陽。則陰不足。俱無可汗。可下之義。而不可吐之禁。又在得藥則利。吐利六字中。也是又治百合病者。不可不知之理也。所以仲景又明之于論證。列方之後。其示人也切矣。

### 狐惑病

狐惑之爲病。狀如傷寒。默默欲眠。目不得閉。卧起不安。餌於喉爲惑。餌於陰爲狐。不欲飲食。惡聞食臭。其面目乍赤。乍黑。乍白。餌於上部。則聲喝。嘔 一作甘草瀉心湯主之。

### 甘草瀉心湯方

甘草

四兩

黃芩

三兩

人參

三兩

乾姜

三兩

黃連

二兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升日三服

(按)狐惑病蟲病也。蟲因熱生。熱因虛生。然則狐惑者。陰虛血熱之病也。狐性多疑。狐惑卽疑惑也。心主血。陰虛則血耗而熱生。血熱則心煩而病作。然則神明之官失于貞靜。滋乎憧擾。所謂執狐疑之心者。此病也。再以蟲喻之所謂來讒賊之口者。此病也。惟其血分有熱而蟲遂隨上下皆生。蟲爲有情識之物。非同氣血爲病。塊然有形而無知也。惟其有情識故能亂有情識之心臟而生。狐疑惟其爲血化之物。故仍歸于心方。以類聚物以羣分也。若有妖妄憑藉而然其實不外本身之氣血爲祟。我固有之。豈外鑠我哉。試爲

申明其外證。蓋狐惑之爲病。狀如傷寒。傷寒如少陰之但欲寐。不發熱。不能飲食。而細辨之。則非少陰經傷寒也。少陰病欲寐即寐。而此則目不得閉。卧起不寢。縮不與此同也。脉細。不與此同也。于此辨之。知非傷寒。少陰病。也是少陰虛血熱。生蟲于臟腑之外。軀殼之裏。擾而亂之。俾令欲寐而目不得閉。卧起俱不相安也。蟲爲生物。必有口。斯能蝕。隨清氣上行。則生于喉而蝕喉。隨濁氣下降。則生于陰而蝕陰。蓋血熱。則氣必熱。氣熱。則所至皆熱也。故蟲雖血化。必隨氣成。與凡蟲無二義也。蟲在上分。自不欲飲食。而惡聞食臭蟲之浮游。不常起伏。無時。故其而目乍赤。乍黑。乍白。不等。俱蟲爲祟于裏之故也。且蟲生于上。蝕于上。爲狐。孤者疑也。就心臟言之也。蟲生于下。蝕于下。爲惑。惑者亂也。就陰分言之也。在心爲疑。在陰分則干犯于心而亂職此故也。請先明其蝕于上部之證。與治法。蟲蝕于上部。所謂蝕喉也。喉者氣之總竅。虛熱上炎。邪害空竅。喉已受病矣。蟲生其間而蝕之。

則氣不足而音不充。聲嗄可必也。主之以甘草瀉心湯。甘草。人參。大棗。補虛也。黃連。黃芩。清熱也。乾姜。半夏。開鬱殺蟲也。虛補熱除。而蟲病之端已清矣。辛苦並下。蟲何以堪。蟲雖百足。必披靡焉。蟲病之何弗應手而收功乎。此治上部蟲病之法也。心之所以孤惑者。蟲也。蟲去。而心臟寧。貼無所擾動矣。故其名曰瀉心其義深哉。

### 蝕於下部則咽乾苦參湯洗之

(按)其有蟲生于陰。蝕于陰。陰卽下部也。下部爲陰分。有蟲必有熱。陰熱未有不津耗。津耗未有不咽乾者。洗之以苦參湯。固是以苦殺蟲矣。而湯由皮毛以入。汗由腠理而出。亦除濕清熱滋乾之治也。自人中以下。俱爲陰分。不必定在二陰也。故用湯洗浴。俾下部便子沾濡。而氣蒸作汗。散熱氣入。挾苦殺蟲一法。而表裏兼治也。

蝕於肛者雄黃熏之

### 雄黃

右一味爲末筒瓦二枚合之燒向肛熏之脉經云病人

或從呼吸止

繡芩散入陰  
分散熱之方  
爲血熱生虫  
者主治也

蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上爲惑。蝕下爲狐。狐惑病者猪苓散主之。

傍再或生于極陰而蝕于下部之肛門亦邪熱之氣必由大便下泄蟲隨生于其間而蝕于其間熏之以雄黃單取殺蟲之義以其蟲近身外可以雄黃之烈氣灼之而斃不足有干於臟腑矣又皆因蟲治蟲之法也然治蟲者治其標也治虛熱者治其本也下部二法一從標治及于清熱而不及于補虛一從標治且連補虛清熱俱不及矣是又在主治者以前治上部之法佐其不逮可也况虛熱之極卽上部之蟲亦有先從本治後從標治者亦在學者于補虛之中寓清熱之理而不可使虛者益虛熱者且寒蟲雖殺而他

變又起。何非善診者所當用心乎。

### 陰陽毒

病者脈數無熱，微煩，默默但欲卧。汗出初得之三四日，目赤如鳩眼七八日，目四眴一本此有黃字黑，若能食者，膿已成也。赤小豆當歸散主之。

### 赤小豆當歸散方

赤小豆

三升浸令芽出曝乾

當歸

七錢

### 右二味杵爲散，漿水服方寸七日三服。

按陰陽毒之爲病，血病也。血何以爲毒？蓄熱而毒生也。毒何以有陰陽之分？就其淺深而言之也。蓄熱之淺

者爲陽蓄熱之深者爲陰。祇在血分論淺深不合氣  
分判陰陽也。血于何蓄于統血者蓄之也。肝臟統血  
血蓄于是肝雖厥陰陽氣乃由之以升達陽鬱不舒  
則肝生熱肝熱血瘀久而成毒亦如肺癰而不如肺  
癰之著于肺但在肝下血分即可蘊釀爲毒有膿有  
血竟同瘡瘍實乃肝經血分之病也。養癰非一日思  
患在預防此所以不待毒成但見病者脈數而身無  
熱心微煩便當察審其故矣數者熱也。見于脉必爲  
內熱乃身無發熱則熱伏而不顯必熱之深也。且心  
作微煩則熱動而有象必熱之久也再諦其證默默  
然但欲卧反似寒證矣又汗出反似寒證之逼陽外  
越矣不知此但欲卧正熱甚于陰而神明失其寧靜  
欲爲休暇以自息也。此汗出正熱逼陰營外洩爲濶  
而非傷寒少陰證之但欲寐反身熱汗出也亦以脉  
之數而不沉細汗出而不畏風惡寒合觀而可辨之  
者也。且更有可畧觀而易得者其人初得此病三四  
日之間卽日赤如鳩眼熱蓄肝經可知矣七八日目  
四皆黑熱盛于肝經更可知矣黑者赤之反而實爲

火極變水之色也。肝之竅開于目，熱之色盛爲赤，極爲黑，何非肝熱之明徵乎。于此猶不清肝除熱，釀變難言矣。目四皆黑，其人若不能食，則熱在肝經，旁移于胃也。其人若能食，則熱在肝經已久，化血爲膿，而熱勢反減，所以胃又能食也。傷寒厥陰證中，傳經熱邪，亦有熱移于胃機而不能食，默默不飲食者，亦有挾熱下利，便膿血者，皆肝經血熱之據，非余之杜撰也。血化爲膿，膿已成矣，仍可不急爲舒散，其血分之熱，以救其陰乎。主之以赤小豆當歸散，赤小豆排膿逐水之藥也。以當歸引入厥陰血分，則血化之膿，可以從大便而出，亦同于抵當湯之下畜血而爲地，不同彼在血海下焦，此在肝臟中焦，膿血去，積熱消而病可除矣。又何有陰陽毒之病乎。陰陽毒者，肝經血熱至深至盛，結聚爲患而不化膿故一發，輒不可爲也。亦如大瘡之起，有膿則生，無膿則死。膿多則易治，膿少則難治。在皮膚之外，與在軀殼之裏，其理一也。今既成膿，則無毒可蓄矣。如不成膿，其毒乃大，蓋邪熱盛而正氣足，則成膿邪，熱盛而正氣不足，則不能。

成。體氣不足而邪。  
盛。豈非危候乎。

陽毒之爲病。面赤班班如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。升麻鱗甲湯主之。

陰毒之爲病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。五日可治。七日不可治。升麻鱗甲湯去雄黃蜀椒主之。

升麻鱗甲湯方

升麻二兩

當歸二兩

蜀椒炒去汗一兩

甘草

二兩

鱗甲

手指大一片炙

雄黃

半兩研

右六味以水四升煮取一升頓服之。老小再服取汗附後

于金方陽毒用升麻湯無鱗甲

有桂陰毒用甘草湯無雄黃

按請爲申明陽毒陰毒之義。陽毒之爲病。厥陰血分蓄熱較淺者也。熱蓄必發。發則面赤斑如錦文。熱之色也。咽喉痛。熱毒之薰灼也。唾膿血。毒雖欲成膿。而不能盡成膿。仍有血以雜之。鬱其邪熱。不能宣洩。此血熱之結于厥陰。而就其可爲升舉者言之也。五日之內及早圖維散。其陰分之熱升。其深鬱之陽。而毒可漸減。七日以上。毒結于肝臟。必移患于心。心臟受邪。難于救矣。仲景主之以升麻鱗甲湯。升麻者。升其陰分之鬱熱也。當歸引入血分也。甘草解毒緩中之品也。鱗甲直入厥陰之藥也。蜀椒治熱于陰中。用之爲開導也。所謂寒因熱用也。用雄黃者。味本甘寒。性却猛烈。入陰分排難解紛也。服後取微汗。以升陽散熱。庶乎不致毒氣內結。侵及君主。爲害莫挽也。至于陰毒之爲病。血分積熱。同于陽毒。而更深更盛者也。面色青而不赤。厥陰臟色隨熱上發。且熱極似寒。故不赤而青也。身痛如被杖。肝主一身之筋骨。肝臟毒

結則一身筋骨拘急而掣痛也。咽喉亦痛而不唾。膿血熱瘀于甚深之分。又正氣弱而不能化膿也。此正如大瘡無膿之危證也。亦期以五日可治。七日不可治。總貴圖維之於早也。法用前方而去蜀椒之熱。雄黃之散。但以當歸。鰲甲。引升麻入陰血中。而濟以甘草之解毒。庶幾血分熱升而厥陰毒解。亦不容不爲一試者也。苟當其人三四日間目赤如雉眼之時。卽爲升熱解毒。何至沉伏結聚若此乎。善治者治之未病之先。救者救之于可救之際。一悞尚延日。再悞促命期。千古之昭鑒也夫。

仲景叙前條于陽毒陰毒之首。正見當辨證知危及早。圖救。豈料後人謬叙之于狐惑病中。彼蓋見陽毒之爲病五字。卽爲斷章分注矣。不知陽毒陰毒。豈一蹴而至者哉。必有前條方可救挽。十之七八何堪。更混入狐惑以悞世乎。試問狐惑病何處可以成膿。而乃云膿已成也。亦可謂不通之甚者矣。

瘧病脉證併治第四

證二條  
方六首

師曰。瘧脈自弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。弦小緊者。下之差。弦遲者可溫之。弦緊者可發汗針灸也。浮大者可吐之。弦數者風發也。以飲食消息止之。

按瘧病者寒熱病也。寒熱兩見而病實一邪。一邪在少陽經。介于半表裏之間。欲出太陽透表不能。則熱。欲入陽明歸裏不能。則寒。淺者邪但在少陽之經。深者則及于足少陽之胆腑。邪淺者病淺而發速。一日一作。邪深者病深而發遲。間日一作甚。則三日一作亦如傷寒厥陰證。厥深熱深。厥微熱微之旨也。其爲病必外感風寒于太陽。以病于表。又必內傷濕熱于陽明。以病于裏。風寒在太陽者。入于少陽之半表。濕熱在陽明者。出于少陽之半裏。風陽邪寒陰邪在表之邪。本二而入于少陽之半表。則成一邪矣。濕陰邪熱

寒路清矣

王病明矣

內經言六府  
多係言胃府  
此處言六府  
係言肝膽俱  
非泛言六府  
也  
此證切矣

陽邪在裏之邪亦二而出于少陽之半裏則亦成一邪矣故傷寒在太陽分風寒二邪在初入陽明亦分風寒二邪之因在少陽則俱合一無可分晰瘧病乃少陽病亦如之也且傷寒之少陽乃自太陽陽明逕傳者而瘧病之少陽乃自太陽陽明兩投者故在表可分言風寒而在裏必分言濕熱又不同于傷寒自陽明傳入之邪辨其風寒來路矣故合言其濕熱二邪而陽明之自內出于少陽者可明矣合言其風寒二邪而太陽之自外入于少陽者可知矣內外俱陰陽兩雜而合一之邪故爲病寒熱並見而祇在一經也凡後人言五臟有瘧者固岐羊之說卽岐伯云其間日者邪氣與衛氣客于六府一語六府亦指膽府而言而非泛言他府也是總在讀古人書者不以文害辭辭害意也不善讀此句則泛言六府之瘧失其一作在胆府則病深間日三日一作之旨矣又如傷寒厥陰病厥淺熱淺者在經厥深熱深者在肝臟也肝膽臟腑相連同爲陰陽升降之道路行于身之兩

少陽之病  
病在于厥陰  
肝膽主游陽  
也故發遠曠  
陰也故發過  
皆一定之理

側如天地之卯酉爲陰陽日月之門戶在厥陰則厥  
熱互見在少陽則寒熱往來少陽之陽又淺于厥陰  
之陰故少陽之寒熱往來又速于厥陰之厥熱互見  
寒熱往來至深不過三日一作厥熱互見至淺乃厥  
三日熱三日二證參觀而寒熱之理躍如矣因此而  
求則瘡爲表證不發于臟其理可知也瘡爲經病重  
瘡其理可推也夏傷于暑長夏傷于濕秋病疚  
理可推也冬傷于寒經春不發夏乃發溫瘡其  
理可推也理明則一了百當理不明則面墻而立矣  
可不慎歟此瘡病寒熱兩作爲一邪在少陽之義也  
至于瘡之爲病又證各不同所以巢氏謬分五臟不知  
證不同而在少陽同也證不同者各有因之不同而爲  
病有不同而主病在于少陽無不同也此又治瘡必  
治少陽之大旨也其在內經論之最詳而仲景似言  
之反異但善讀古人書者叅合而求之引伸而通之詳者固詳畧者亦詳焉余今註金匱明仲景之畧者也而不敢不于仲景之說引伸于無盡則上古聖人

言溫而微亦  
在內

言論風旨堪爲想見矣。仲景論瘧必首言脉。脉爲凡病之主脈，而獨首言及瘧者，瘧之脉純而不雜也。雜者亦不出純中。附見者也。師曰：瘧脉自弦四字乃瘧家主脈之脉也。病在少陽，木氣應之。弦見左關者，其主弦見六部者，其應無不以弦爲宗也。兼見之脉，必列叙于後者，兼見之證，卽各屬於其脉，而附于弦者，如一診也。診不同，則證各異，而法亦各異。乃耑其治于少陽終如一法也。請爲悉舉之，以明其辨。弦數者，內傷于熱者多也。傷于熱，則陰虛，故多熱也。弦遲者，內傷于濕者多也。傷于濕，必陽微，故多寒也。此瘧之內因也。弦而小緊者，卽細緊也。細爲積，緊爲實。不可作內寒論也。下其積，破其實，則內因于積實之邪者除矣。弦而遲，遲亦寒也。緊爲表寒，遲爲裏寒也。宜溫之，溫其寒。則內因于寒邪者除矣。弦不細而但緊者，緊見于弦中，則浮緊也。見于細中，則沉緊也。沉緊爲內傷之邪，浮緊爲外感之邪也。外感于表，可發汗。又除矣。浮大者，浮候表，亦候上，大爲盛，亦爲實。實盛見

于上邪在高分也。可吐之乘其勢而湧出以除其內。  
因實盛之邪也。弦數者，弦爲風，數爲熱。風生熱而陰  
微，熱生風而裏虛。理之以飲食消息益其津液養其  
裏陰，而風熱內因之邪自除矣。此仲景就脈而分言，  
其治法爲瘧家立振綱，攜領之治也。

病瘧以月一日發，當以十五日愈。設不差，當月盡解。如  
其不差，當何如？師曰：此結爲癥瘕，名曰瘧母。急治之。宜  
鱉甲煎圓。

鱉甲煎圓方

|    |     |    |     |    |
|----|-----|----|-----|----|
| 鱉甲 | 十一分 | 馬勃 | 三分  | 燒  |
| 分炙 |     | 白朮 | 卽身干 |    |
| 柴胡 | 六分  | 鼠婦 | 三分  | 黃芩 |
|    |     |    |     | 三分 |
|    |     |    |     | 乾姜 |
|    |     |    |     | 三分 |

大黃三分

芍藥五分

桂枝三分

葶藶一分

石韋三分

厚朴三分

牡丹五分

瞿麥二分

紫威三分

半夏一分

人參一分

麌蟲五分

阿膠三分

蜂窠四分

赤消十二分

蟻六分

桃仁二分

右二十三味爲末、取鎚竈下灰一斗、清酒一斛、五斗浸灰候酒盡、一半着鱉甲於中、煮令泛爛、如膠漆、絞取汁內諸藥煎爲丸、如梧子大、空心服七丸、日三服。子金方  
用鱉甲

十二片。又有海藻三分。大戟一分。廣虫五分。無鼠婦赤硝二味。以鱉甲煎。和諸藥爲丸。

按再仲景之論病也必先明其愈期。在傷寒論中皆然也。蓋病有由來必有由去。知其來去而病情斯可得也。卽或來之迅速去也留連亦可以諦審于遲速順逆之間而商其調劑之法。病瘧于月初得者當于月半可愈。初三哉生明陽盛之候也。月半後哉生魄陰盛而陽濟可愈矣。設不差十八日哉生魄陰盛之候也。月盡後哉復生明陽盛而陰濟無不可愈矣。寒熱之邪不外陰陽。陰陽之氣不外勝復一定之理也。此以人身之氣血配天地之陰陽順大化而審病機也。如其再不差則與化行有逆必有逆之在人之故不可耑求之于瘧病也。仲景設爲問答曰當云何。師曰此結爲癥瘕。寒熱雜合之邪在少陽而上下格阻之氣結厥陰聚于肝下之血分而實爲瘧病之母氣足于生瘧而不已。此所陰陽互盛歷月經年而病不除也。蓋有物以作患于裏。如草樹之有根荄必須急爲拔去方可刈芟其枝葉不然旋伐旋生。有母在焉未

有不滋蔓難圖者矣。宜鱉甲煎丸，緩以治之。治瘧母從緩，治其本之義也。藥品最多，而主以鱉甲。入厥陰血分，作主腦。破癥瘕，瘳久瘧。佐以丹皮、芍藥、阿膠、養肝經之血。柴胡、桂枝、乾姜、升少陽之邪。血足陽升，爲瘧母之滯者，可通矣。桃仁、大黃、赤硝、紫威，以驅熱下洩于大便。葶苈、石翬、瞿麥、黃芩，驅熱分洩于小便。熱去而瘧母之聚者，可開矣。人參、半夏、厚朴，以固氣燥土，使下洩者去邪而不傷正也。鼠婦、塵虫、蜂窠、蟻蜋，以破瘕除癥，兼通利水道。使下洩者不止于熱，且兼除濕之用。是一方而固氣燥土，養血升陽，以興禮樂。破瘕消熱，滲濕消癥，以用征誅。一舉而無義不備矣。誠從緩而治之，神方也。焉有瘧母，可以留中作祟者乎？迨瘧母既除，而其標病可隨證已之，覆巢之餘，無完卵矣。

師曰：陰氣孤絕，陽氣獨發，則熱而少氣，煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘧瘈。若但熱不寒者，邪氣內藏於心，外舍分

# 肉之間令人消鑠肌肉

按仲景更爲列舉其證。定名出治以示人。再設爲問答。以明之。師曰。陰氣孤絕。陽氣獨發。則熱而少氣煩冤。手足熱而欲嘔。名曰瘧瘧。何爲瘧瘧。若瘧病但熱而不寒者是也。瘧者火毒也。小兒熱結之毒。曰瘧。又黃瘧之病。亦此瘧。皆熱盛于裏之義也。熱盛于裏。則陽盛于少陽之半表裏。而陰不勝。斯退伏不見。故但熱不寒。然此熱豈無所根係。而發哉。師又爲明其發熱之原。曰。邪氣內藏于心。外舍分肉之間。令人消鑠肌肉。內則心者。其熱發之原。而分肉者。其存邪之宅乎。心臟也。屬裏分肉軀殼也。屬表瘧爲少陽病。何屬於心而邪又在少陽之經。何云屬軀殼之分肉間。不與前說相悖歟。不知師謂邪氣內藏于心者。言發熱之原。非瘧之原也。瘧爲寒熱兩見之證。今但熱不寒。是心臟有熱。以附乎瘧。而陽增盛。陽氣既盛。則周身分肉之間。皆熱邪瀰漫。反奪瘧病寒熱之勢。使陰甘于退避。而陽獨見橫肆也。故師首明之曰。陰氣孤絕。陽氣

獨發正見瘧之爲病。本寒熱兩停之證。而附于他端。則變矣。陽盛者陽偏。陰盛者陰偏。遂失正瘧之形狀。而另立門戶。不得不別其瘧名以諦之。此瘧病之所。以雖同在少陽。而岐路多端也。其證旣爲陽盛。則少氣煩冤。壯火食氣。而心神不安也。手足熱而欲嘔。心有積熱。而四末蒸灼也。且其邪旣舍于分肉。則必耗分肉之陰。而心臟有熱。又爲耗陰之本。津枯液燥。肉削肌瘦。師定其消爍肌肉。爲陽盛陰衰深慮也。主治者。必當加意以固。矣。瘧之義如此。

溫瘧者。其脈如平。身無寒但熱。骨節疼煩時嘔。白虎加桂枝湯主之。

白虎加桂枝湯方

知母

六兩

甘草

二兩

石膏

一斤

粳米二合

桂枝去皮三兩

右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出愈

按又有所謂溫瘡者何也。溫瘡有三總屬陽盛而淺深之邪不同。仲景所言于金匱要畧中者溫瘡之一也。素問又有溫瘡二證。證不同而所因亦各異。詳注于後。請先爲註仲景之名溫瘡溫瘡者亦熱積于內而陽盛陰伏無寒但熱之證也。然其人不純是內發之熱。惟其外感之風寒鬱于表分故內生熱而發外。所以骨節疼煩時嘔見外寒內熱之因不同于外無覆胃。從內自生之煩爲猛烈實甚也。所以其脉如平人此溫瘡之邪淺者也。然同爲陽盛陰虧之證。不容不救陰以濟陽同用爲熱多寒少之治。仲景以白虎加桂枝湯主之。以秋令之涼肅治內熱之蒸蒸如夏月溽暑方殷而天未涼風惠然其來又何陰不漸滋而熱毒固可除矣。卽如平人脉之溫瘡有骨節疼煩一

證熱由表邪所鬱。加桂枝而表邪亦可解矣。內熱治以辛涼。固爲兩解。表裏而加桂于少陽病中。使熱邪得以升散爲解散。又不同于太陽病熱證之用白虎也。此其義皆業醫家不可不明者也。或問曰。心臟內藏邪氣。何以桂枝爲對答曰。用桂枝少許于白虎湯中。總爲少陽病計也。木氣非桂枝之辛香不能由半表而達于太陽之表。與心臟無涉也。亦與主肌肉之陽明無涉也。加桂枝總爲少陽起見所謂瘧病多端而不離少陽爲治也。知此方可與言治瘧之理也。此仲景所言于金匱要畧中之溫瘧也。若素問所言溫瘧則何如此。蓋喻氏嘉言引之于瘧病法律中。而詮解少失其義者也。敢續明之。並列于仲景書中。以經補仲景。非蛇足也。

內經云。帝曰。先熱而後寒者何也。岐伯曰。此先傷于風。而後傷于寒。故先熱而後寒也。亦以時作。名曰溫瘧。又云。帝曰。夫病溫瘧與寒瘧。而皆安舍。舍于何藏。岐伯曰。瘧者得之冬中于風寒。氣藏于骨髓之中。至

春則陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑。腦髓爛肌內消。腠理發泄。或有所用力。邪氣與汗皆出。此病藏于腎。其氣先從內出之于外也。如是者。陰虛而陽盛。陽盛則熱矣。衰則氣復反入。入則陽虛。陽虛則寒矣。故先熱而後寒。名曰溫。此內經言溫瘡有二。而俞氏引之于瘡病法律中。與仲景互相發明者也。此二證與仲景所言不難辨。仲景所言者二證。但熱不寒之瘡也。一曰瘡瘍。一曰溫瘡。內經所云者二證。先熱後寒之瘡也。俱曰溫瘡。此以寒熱之有無先後爲分晰者也。仲景所名瘡瘍。但熱不寒之熱。熱根生于心。而熱氣舍于分肉。至于溫瘡之但熱不寒之熱。則不過陽鬱于表之熱。故脉如平。此二證其熱大分淺深也。內經所言之第一種溫瘡。其先熱後寒之熱亦如仲景所言之溫瘡。不過陽鬱于表之熱。特寒熱之次序稍變于常瘡耳。發亦以時變。而仍不失其常。亦熱之淺者也。至內經所言第二種之溫瘡。則又似同于仲景所言之瘡瘍矣。然先熱後寒。與瘡瘍之但熱不寒。又不同。蓋寒熱之見于外不同。而積熱生于裏。有

同耳。何以謂之同于癰瘍？以仲景所言癰瘍，有風熱而內經所言溫瘍，亦有夙熱者也。仲景所言夙熱藏于心臟，內經所言夙熱藏于腎臟也。瘍病原非臟邪，以熱在臟爲瘍之根，如瘍母在肝臟爲瘍之母，俱係于臟。而以臟言而瘍，則究非臟病焉。故熱藏于心，即根于心，熱藏于腎，即根于腎，此俱熱之深者也。推之于仲景所言之癰瘍，內經亦謂之屬於肺臟，亦不過係屬於臟之義而已。但內經既謂夏傷于暑，喻氏又補長夏傷于濕，秋必病瘍矣。何以內經又云溫瘍者，得之于冬，至春陽氣大發，而邪氣不能自發，必待夏月腠理開泄，有所用力，邪方隨汗皆出，不幾二說相悖乎？不知內經所云夏傷于暑，長夏傷于濕，爲秋病之先寒後熱之正瘍，及熱多寒少，但熱不寒之雜瘍，言也。內經所云冬傷于風寒，夏乃病瘍，單爲先熱後寒之溫瘍言也。其經春不發，至夏乃病，內經自詮解無遺義。明言此邪藏于骨髓之中，至深之地，故春氣發在骨髓外，則邪不能自發。夏月熱入骨髓，有所勞用其力，力屬於筋骨，邪方隨用力出汗而發，理至當。

也乃喻氏謬註謂爲藏于腎臟。腎火外發爲熱，發而後收爲寒。腎火豈自發而可以自收。同于陽氣乎？氣有卷舒曲伸。腎火一發則不可復收。非曰陽不爲歛藏矣。試觀夫氣氣可往復。火一發則爲灰。卽火盡薪傳，鑽歲改火俱新火也。其仍已發之火乎？卽此可知腎火忽發忽收之說爲妄也。且喻氏自言瘡非臟病，何云腎火又是瘡病？言少陰爲蛇足之故智矣。腎雖主骨髓而骨髓與分肉同爲表裏。非腎臟之裏也。學者須識此。則表裏不致舛混也。再通爲考究。仲景所言及內經所言之證。熱藏于心。舍于分肉者熱也。熱藏于腎。舍于骨髓者亦熱也。俱陽盛而陰退伏之候也。但熱藏于心之確據爲實熱。熱藏于腎之溫瘡。近于虛熱。治熱必用白虎湯。治少陽之熱必加桂枝。然則兼虛必用人參。亦可類推矣。腎爲足少陰也。心亦未嘗非手少陰也。在心未必皆爲之實。在腎又未必盡爲之虛也。又學者不可不細辨之者也。此內經言溫瘡有二。而喻氏引以發明。金匱之未備。俱未嘗言方主治者。余總以仲景之白虎湯主之。治心火于少。

陰與治腎火于少陰似亦相去不遠也氣虛則加人參津亡則加生地血虛則加歸芍熱甚則在心加黃連在腎加黃柏似俱不出陽盛救陰之法也願天下善學仲景者與余言相考訂也則幸甚矣如此則先寒後熱先熱後寒但熱不寒  
熱多寒少之瘡種種可明

瘡多寒者名曰牡瘡蜀漆散主之

蜀漆散方

蜀漆洗去腥

雲母燒二

日夜

龍骨等分

右三味杵爲散未發前以漿水服半錢○溫瘡加蜀漆半分臨發時服一錢七一方雲母作雲實

按更有寒多熱少之一證再爲明其病而立其法如瘡多寒則熱少不須言矣名之曰牡瘡牡者陽物也則

牡瘧者亦陽勝而陰虧之瘧也。陽盛陰虧何不治其陽而以蜀漆散治其濕則其人熱盛于內而素有水飲所謂夏傷于暑者熱也所謂長夏傷于濕者濕也。熱與濕內傷于陽明前言之矣而熱與濕又必較論其偏勝前條所註皆內傷熱盛于濕之義也此則內傷濕盛于熱之義也濕爲水邪必犯心臟心名牡臟以少陰君火爲諸陽之主故以陽名之言水邪挾熱逆而干犯于心名之曰牡瘧言此瘧爲犯心之瘧如京師有寇名之曰京寇所以示人以勤王之宜亟也仲景主之以蜀漆散以蜀漆爲吐藥和漿水以助其吐非益其濕也以雲母龍骨以鎮其心驅其邪爲鎮爲驅俱寓治水之義也後有移治于溫瘧卽仲景所言之但熱不寒之溫瘧也如患溫瘧而熱盛于濕者必用白虎湯其或挾濕爲甚漸有浸淫之勢所謂濕上甚爲熱而上逆于頭目及作嘔逆等證則非蜀漆散加蜀漆不爲功也此仲景于牡瘧之治明溫邪之浸淫將使熱邪得留戀去濕正所以去熱也總之風寒外感于太陽熱濕內傷于陽明合而爲少陽陰陽

之邪發爲寒熱之證。此病之本也。至于病之所因不同。附于所因之病又不同。此病之末也。于其末既詳論之。無遺于其本。不必更爲他說也。但少陽病治。其少陽而已。附外臺秘要三方。柴胡去半夏加括蒌湯。柴胡加桂姜湯二方。尤爲得治。

少陽之法。謹並釋註之于後。

### 附外臺秘要方

### 牡蠣湯治牡瘧

牡蠣

四兩  
葵

麻黃

去節  
四兩

甘草

二兩

蜀漆

三兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

柴胡去半夏加栝樓湯治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩

人參三兩

黃芩三兩

甘草三兩

栝樓根四兩

生姜二兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂姜湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

柴胡半斤

桂枝三兩

乾姜二兩

栝樓根四兩

黃芩三兩

牡蠣熬二兩

甘草二兩  
炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

按柴胡湯治少陽傷寒少陽證言之金匱更取之治瘧在少陽治少陽傷寒病可瘧亦可也凡病皆可也有柴胡而外感之邪合于少陽者由半表而洩裏人參甘草大枣以補中生姜以佐柴胡而透表括蔞根清熱滋乾以治發渴而卽以治消渴及受勞卽發之勞瘧去半夏陽性之苦恐其助陽爲虐用括蔞根陰性之苦以滋陰而濟陽也此爲瘧病發渴者言治亦陰虧陽盛之治耳而凡多熱少寒但熱不寒之瘧皆可用之臻效矣再者柴胡加桂姜一方金匱言用以治瘧之寒多熱微或但寒不熱此濕盛于熱及陰盛于陽之瘧也亦以柴芩爲表裏分治佐以桂枝乾姜之辛

溫以扶助陽氣兼用牡蠣去渴也括蔞根有可以易半夏者。有不可以易半夏者。蓋半夏之苦入心而括蔞根之苦入肺。入肺以肅金而少陽之邪有制入心以生火而少陽之邪反有助矣。此去半夏加括蔞根之義也。傷寒有用有不用者。傷寒之少陽胃不成實者多。熱必不盛于裏。則用半夏爲有益胃宣陽之效。瘧病之少陽陽明有熱者多。熱多盛于裏。則用括蔞根爲有清熱下濕之益。所以傷寒于半夏有用不用而瘧病于半夏必不用也。此一物之微。非體驗之不能知也。其牡蠣治牡瘧一方。吐之不已。必汗之。汗者心之液。汗出而水邪不致侵心臟矣。且濕甚于裏。亦有汗解之法。但爲正氣有餘者言也。不可不審其虛實。而見牡瘧卽混投此方。雖載之金匱中。所當臨時斟酌爲治者也。後人治瘧之方多矣。豈能外金匱前後六方之範圍乎。甚矣岐雜之書滋于後世。而古聖賢之意愈失而愈遠也。可慨也夫。

喻氏論瘧諸條。有可採者。附錄以廣後學之聞見。其方亦酌錄二三。以備參考。非敢雜亂乎仲景也。

所謂闡發貴其多。  
而決擇貴其精也。

厥陰之邪必犯于陽明之胃少陽之邪必犯乎少陰之心傷寒厥陰病其人不能食雜病陰陽毒屬于厥陰其人亦不能食必化膿後方能食傷寒少陽病其人心煩而悸雜病瘧病屬於少陽其人亦有壯瘧之證可見病邪有必由之境氣行有一定之路非人所能爲也人生而具者也業醫者隔垣之照所以貴于能明也此又可以推之凡病而皆當引伸于無盡者也

中風歷節病脈證并治第五

論一首 藥方十  
脉三條 方十一  
論二十一

故為陽病數  
保大象風陽  
那也動象也  
陽邪外犯陰  
易虧火內動  
故數微而數  
言邪氣不固  
而風邪入也  
故曰中風使  
然

夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不遂者。此爲虛微。  
而數。中風使然。○寸口脉浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。  
寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脉空虛。賊邪不瀉。或  
左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。喝僻不遂。邪在  
於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於腑。卽不識  
人。邪入於臟。舌卽難言。口吐涎。

右西北遇壯  
天宗其方神  
矣非其地非

菊花

四十分

白朮

十分

細辛

三分

侯氏黑散。治大風四肢煩重。心中惡寒不足者。外臺治  
風癱

可也。泰之五

桂枝加減爲

桂子後之風

引湯亦云

茯苓 三分

牡蠣 三分

桔梗 八分

防風 十分

人參 三分

砦石 三分

黃芩 五分

當歸 三分

乾姜 三分

芎藭 三分

桂枝 三分

右十四味，杵爲散，酒服方寸匕，日一服，初服二十日，溫酒調服，禁一切魚肉大蒜，常宜冷食，六十日止，卽藥積在腹中不下也，熱食卽下矣，冷食曰能助藥力。

按中風者，風證之一也。內經云：風者百病之長也。凡外感之證，無非風爲之始。而中風其一端耳。風痺瘧厥，四者均有內因、外因、虛實、寒熱，要皆爲軀體之病。然外感者，在臨時；內因者，在平日。善養生者，貴於思患。

而預防善治病者。又貴于見機而早救。豈止四證爲然哉。豈止中風爲然哉。但主治者所原本在內經。而宗主者惟仲景。內經言風證多端于中風苦無耑論。自有仲景而中風始有耑治之法矣。其論中風者曰。夫風之爲病。當半身不遂。此爲風邪在經者。標出總證也。然風淫末疾。風之中人。無不先見于手足者。內經言風證。又云或爲偏枯。風之中人。見于手足必偏于一手一足者。此仲景所以原始經文。而決人病機也。然經又云。風之感人也。上受之上受之。則上必病。而下或有不病者。故仲景又原始經文。而決人病機。言或但臂不遂者。此俱可謂之痺。痺在內經。另有耑論。何以中風。又云爲痺。不知痺之爲義。閉塞也。結聚也。其人未至半身不遂之前。腠理之間。經絡之際。分肉之中。必先有邪氣。閉塞結聚。而正氣正血流行。不獲暢遂。久矣。人身之氣血停滯。則各安其步趨。進止有常度。若有所結聚之處。則必有所踈泄之處矣。有閉塞于裏之邪。必將召乘。伺于外之邪矣。所以痺者。自痺而中風者。自中風痺而不中風者。有之。中風本

寸口脉浮而  
繫爲寒虛相  
搏那在皮膚  
是傷寒中桂  
枝麻黃各半  
湯之症乃  
風與寒相搏  
之病也仲景

有不由於痺者也。然則痺者中風之外媒也。診其脈微而數。微者陽虛也。數者陰虛也。非微而陽虛。則衛氣固護。風何從入。非數而陰虛。則營道充實。風又何從入。而漸深。惟其衛氣虛。故風邪侵疆犯界。而夷其城郭。惟其營血虛。故風邪橫行直突。而掠我積儲。且陽虛必裏寒。而疫易成。更陰虛則內熱。而火易發。謠云。中風爲痰火病。痰火其又爲中風之內媒也乎。河間主火。丹溪主痰。而東垣主氣。氣卽痺也。喻氏所以引經文以證三說云。不能問其虛。安問其餘。即可於論脈微數二字驗之也。更進因微數之脉。歷推之于證。寸口脉浮而緊。上受之耶。必在寸口。上以候上也。浮者在表也。緊者風邪挾寒邪也。在表有邪。邪氣實必正氣虛也。以風挾寒。寒爲實邪。則風邪亦實也。寒與虛相搏者。相遇于皮膚之表分爲患也。此中風之淺病也。然又有深焉者矣。浮者不止衛氣之虛。且爲營血之虛也。衛氣虛。不過風中于皮膚斯已耳。營血復虛。則脈絡空虛矣。賊邪之風。乘脈外衛虛。中皮膚者。今且復乘脉裡營虛。中經絡矣。邪風入經絡。較中

論中風而先  
指出此條猶  
論傷寒而先  
指出中風并  
風寒之相合  
者例也。使人  
手脈浮為風  
脉繫為寒處  
辨認耳。若直  
名之曰中風  
則病不兼寒  
又稱營血素  
虛之人其邪  
氣直中于經  
略須知此病  
非寒傷所

衛氣深一層矣。氣行于脈外有邪易隨氣而散。血行于脈內有邪難隨氣而瀉。此經絡之風所以入而不易出也。子是雖有中左中右之不同。而或病乎左半身不遂。或病乎右半身不遂。皆同爲一中風而已。邪氣既中于經絡矣。在經絡中與正氣相參錯。正氣在兩半身無二行也。此半身有邪則不得不緩。彼半身無邪則不得不急。正氣急者非急也。較緩者行急也。邪氣緩者非邪氣緩也。較急者行緩也。兩半身氣血本同其步趨。今一急一緩。正氣自急于無邪之半身。而口眼手足如常。邪氣自緩于有邪之半身。而口眼手足起變。仲景謂之曰。正氣引邪。喝辟不遂。口喝。眼僻。手足不遂。此中風必有之外證也。何以云正氣引之。蓋一身之氣雖分兩半身。未嘗不相牽掣。維繫以疾行。引緩步必見傾側也。此仲景爲風家明其致證之由然也。此但爲風中于經絡者言之也。然中絡與中經。又有淺深。邪在于絡。較皮膚爲深。較在經爲淺矣。絡乃分肉中氣行之支派也。邪在此不過肌膚不仁而已。若邪在于經。較絡則又深矣。經者支體中氣

謂血虛乃本  
血虛而經絡  
空故邪風直  
中故亦謂之  
雷電風病也

行之道路也。邪在此，則重不勝，而半身不遂矣。不仁者，心所不能周之處，不遂者，心所不能使之體也。心不能周于人，則不仁于人，不能周于物，則不仁于物。不能周于肌膚，則可謂之不仁于肌膚也。心有所使而能給，則心遂。今舉手手不應，舉足足不應，故謂之不遂也。古人名病，豈有絲毫不入扣者乎？夫風至于中，經絡可謂深矣。而不止乎此也，且有邪入于腑者矣。邪入更深矣，更有邪入于臟者矣。邪入至深矣，入腑卽不識人，入臟舌卽難言，口流涎，苟非藩籬盡徹，城府洞開，何致升其堂，造其室，遂來卧榻之畔，與主人共衾枕也？幾何不盜憎主人，鵠巢鳩居也乎？有何奇兵自天而下，能驅其邪于堦階城社之密邇者乎？驅逐不力，則盤踞難除，蕩滌粗盡而社稷已墟矣。此所以神丹之不遇，而壽命之難延，也可不慎歟？可不慎歟？邪既中于腑與臟矣，六腑五臟邪將何居？喻氏以爲中腑必在胃中，臟必在心，乃內經所云風證，五臟俱有，而腑又獨言胃腑者何也？此中風之因也。非中風之病也。臟腑處軀殼之裏，外有正氣爲之護衛。

內有正氣爲之充周。如五都之要區必設重備也。守在四彝者有人居重馭輕者有勢。又何衝襲之爲患乎。惟其嚴城守禦全虛內賊滿布勾通外寇乘隙猝至倉慌之頃已登陴啓關坐視覆陷矣。故內經所言五臟之風及胃風皆平日之內賊也。喻氏發明仲景所言乃臨時之外寇也。此其論列有不同而未始有異旨也。請爲明胃腑心臟之故。胃足陽明也。厥陰有邪必犯之者也。心手少陰也。少陽有邪必犯之者也。在傷寒厥陰病犯足陽明在雜病陰陽毒屬厥陰亦犯足陽明此見足厥陰之犯足陽明爲必致之邪也。在傷寒少陽病犯手少陰在雜病瘧病屬少陽亦犯手少陰此見足少陽之犯手少陰爲必致之邪也。五臟六腑惟足厥陰肝足少陽膽爲風木之在人身者內風既盛必發于肝膽外風相召必及于心胃此俱可徵而可信之理也。况血虛于營脈絡空虛其末也而肝臟所統之血未有不先虛而後脉絡方空虛者此血虛之本也。抑氣虛于衛腠理疎泄亦其末也而胃腑所宗之陽未有不先虛而後護衛方疎泄者此

氣虛之本也。厥陰血虛火動而生風。陽明氣虛痰積而兆風。又中風之本事。因之厥陰肝動而胃土受剋。邪風入而陽實陰虛。不識人卽津亡譏語之甚者耳。識人在目。目者肝之開竅也。因之肝風動而肥風亦動。木火相通。二火同原。胆邪移入于心。神明已亂。廉泉不收。舌強語塞。涎沫常流。舌者心之開竅者也。其有口流涎而未至不識人不能言者。則口喎頤僻所致。非此舌縱難言之口流涎沫也。此皆原證有本而諦病入微者。後學不可不究心者也。然中風至于直中腑臟。則千百中無一二可救者矣。故仲景並不言治法也。不亦深可凜哉。後出侯氏黑散一方。亦爲中經絡者計耳。可見風中腑臟治其未病。治不在已病矣。明

中風病至中腑中臟。難于救治固矣。然中風苟不至子表裏洞如。大約中經絡者居多。原文謂邪在于經。卽重不勝。卽中大風。而四肢煩重之證也。心中惡寒。究是表虛風入。特以中陽亦虛。故護衛疎泄。而心中

亦有歉然不足之意。仲景從表虛惡寒證中已形容出裏虛召風之故矣。出侯氏黑散一方爲風中經絡者言治而方中無非爲內虛招風立法可見外風升內風無能爲之引致人能杜內風之根源自能禦外風之侵暴此恃源而往之理也。內風之根源爲何然亦不外痰也火也氣結之痺也而三者又總不外于裏虛而已虛于氣則痺生于表虛于陽則濕生于脾痰生于胃水飲生于腹脇虛于陰則火生于肝虛于血則熱生于脈道痺者邪聚于表而以疎泄處受風也濕者能生痰飲痰飲復生格滯以凝結處爲氣病而風遂乘其隙而投之也。火者內消津液外啓腠理開門而揖風盜之入也。熱者在脈道則耗營血脈道空虛則虛生風熱生風二義已備故風不期而自至也方中以菊花甘平潤肝燥而散風邪爲君白朮茯苓人參乾姜牡蠣礬石扶陽燥土利水以勝痰飲之凝積細辛防風桔梗桂枝以開鬱行氣固表驅邪黃芩以清裏熱當歸芍藥引入血分營道之中無非爲經絡標邪言治而其實皆從臟腑之本治也溫酒調

服正使藥力入經絡六十日之久令藥積腹中不下則驅風而兼填實之旨喻氏明之詳矣所以爲隨驅風出隨召風入嚴其戒矣復言熱食卽下冷食能助藥力然非其人臟腑之陽氣素有根維于其中者何堪六十日之冷食乎此雖風中經絡尚可治而陽微陰盛尤當加意先從扶陽益氣之本治也明矣是乃仲景言外之可推者也然又有必推而方盡之說焉侯氏黑散從本治之方也風中肌膚風中經絡獨無從標治之方乎何金匱無耑主者乎非仲景無言也言之于傷寒論太陽中風中其法不一而足也卽有兼寒中人者言之于傷寒論風寒兩感其法亦不一而足也此俱從表治治標病之義也言治中風之初外感方始者不可不叅考傷寒論太陽病中風中寒兼中風寒諸方而斟酌其風寒之外因又不可不叅考于傷寒論諸經主方陽虛之表寒裏寒陰虛之內熱表熱而斟酌其陰陽之內因故仲景但出侯氏散一方爲驅風漸出後主治也非爲風甫感入時主治也風甫感入時主方頭緒不一大抵不外桂枝湯一理二而分殊也

郎仲景便棄  
論中諸法移  
于中風皆其  
妙如神可見  
理二而分殊

一方。但加減不同。所以難爲出方也。在傷寒論諸條言證亦多如此。醫非通變鳥足與語仲景哉。請爲就中風病分疏。傷寒論中太陽中風諸方質之天下。

桂枝加減方  
數條原係傷寒中兼中風者主治也。今

桂枝湯者治風之主藥。可以治中風于太陽之衛。即可以治中風于太陽之皮膚。爲痺病。又可以治太陽中絡。爲肌膚不仁病。又可以治太陽中經。爲重不勝之半身不遂病也。

中風中先揚出脈浮緊一

大青龍湯。可以治傷寒太陽之兼中風寒病。即可以治中風病之兼有寒邪者也。

句又申之以繁則爲寒一可已示人風寒兩感者之

小青龍湯。可以治傷寒病風寒感表。痰飲在裏者。即可以治中風病之外感風寒。內積痰飲者也。

桂枝加葛根湯。可以治傷寒太陽陽明並感之邪。即

可以治中風病。皮膚有邪之太陽痺病。肌膚不仁之

桂枝加減各在傷寒論中

桂枝加減各

方主治矣。以下論桂枝數

桂枝加厚朴杏子湯。可以治傷寒有表邪。作喘急。即可以治中風病。有表邪。作喘急也。

方其深知仲  
景之心者乎

桂枝加桂湯。可以治傷寒中風病之陽虛于表者。卽可以治中風病之陽虛于表者也。

桂枝加附子湯。可以治傷寒中風病陽虛于裏者。卽可以治中風病之陽虛于裏者也。新加湯。可以治傷寒中風病之汗後裏虛者。即可以治中風病之汗多裏虛也。

桂枝加芍藥湯。可以治傷寒中風之陰虛內熱。即可以治中風病之陰虛內熱也。

桂枝加大黃湯。可以治傷寒中風之邪實熱甚者。即可以治中風病之邪實熱甚也。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。可以治傷寒中風之內有水濕之邪者。即可以治中風病之內有水濕之邪也。

桂枝甘草牡蠣湯。可以治傷寒中風病之陽微濕盛者。即可以治中風病之陽微濕勝也。茯苓桂枝甘草大棗湯。可以治傷寒中風病陽微陰盛者。即可以治中風病之陽微陰盛也。

苓桂术甘湯可以治傷寒中風病之內陰虛津虧外陽虛邪盛者。即可以治中風病之陰虛津虧陽虛邪盛也。

小建中湯可以治傷寒中風之中氣虛弱無力驅邪者。即可以治中風病之中氣虛弱無力驅邪也。桂枝麻黃各半湯爲傷寒太陽風寒兩感主治則中風病之風寒兼感者亦可用也。

桂枝二麻黃一湯爲傷寒太陽經中風多而傷寒少者。主治也。即可以治中風病之風多寒少初感于表者也。

桂枝二越婢一湯爲傷寒太陽中風病有熱而氣虛者。主治也。即可以治中風病中之有熱而氣虛者也。桂枝人參湯爲傷寒太陽中風病無熱而氣虛者主治。即可以治中風病之無熱而氣虛者也。

以上在神明者。由此類推之。即傷寒論中三陽三陰經各方。及金匱所載雜病諸方。俱可以通變採用矣。

然猶以別病之方治中風也。或者不應也。今以中風病方治中風。病何不應之。有特以仲景旣言于傷寒論中。故不逐條複列于此。後人遂任意以風燥猛烈之劑爲治。此標病之所以不已也。不則無論邪之盛衰。內之寒熱。又不論邪中何所虛在何處。漫爲溫補。使邪閉鬱爲熱。終無出路。本病之所以亦不已也。噫。中風之爲病。所關于生死者。至切矣。內經言風而未尚言證。仲景言證而未條言方。何以爲救瘳之法。守乎。喻氏編次中風病所列諸方。不無可用。然終不如仲景之方治。仲景所言之病也。此又非余之敢爲臆說也。皆于仲景用侯氏黑散一方。引仲之者也。

寸口脈遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。榮緩則爲亡血。衛緩則爲中風。邪氣中經則身痒而癰疹。心氣不足。邪氣入中則胸滿而短氣。

按

此仲景之用侯氏黑散又自爲之詮解其用藥之義也蓋爲內有虛風而外受虛邪表裏兼治也亦必就脈證以明之如其人寸口脉遲而緩風邪上受診于寸口同前條也然前條浮而緊此條遲而緩者風邪直中而無寒可兼之診也故不緊而緩也遲者中有氣虛陽微之故故脉不浮而緊且遲而緩也緩則爲虛內虛生風故召外風之虛邪相投以虛邪乘虛體也緩爲風象而言虛則微而無力可知矣在榮得緩則爲亡血卽絡脉空虛之證也在衛得緩則爲中風卽賊邪不渴之證也惟其衛虛所以風中絡惟其營虛所以風中經俱前條所言之次第也然前條脉微數之中風虛而有熱者也前條脉浮緊之中風風而兼寒者也此條脉遲緩之中風虛而陽微者也虛而有熱當外治風而內補虛清熱虛而陽微當外治風而內補虛扶陽此內外兼治之法也若風寒兼感而內虛未甚者則又先治表而後治裏亦爲兼治之法也

在仲景雖前後鋪叙脈證參錯難于辨明而大義却井井不紊也在人深究而得之可矣其人內虛而井然不紊

諸癰癩痒皆  
屬心火風邪  
中經而心血  
不生故熱所  
以身痒而輕  
浮也下文心  
氣不足邪氣  
入中則胸滿  
而短氣正互  
相發明雖不  
必相兼而實  
有兼至之義

有邪在表則身痒而癰疹亡血所生之熱雜乎風邪  
爲患于皮膚也其人虛而有邪且在裏則心氣不足  
邪氣入中而爲干犯以致胸滿而短氣正氣正陽不  
足于中而邪風邪氣侈張橫肆無所忌憚也就其脉  
之遲緩證之血亡氣虛言之雖有術以驅風得出必  
無方以禦風不入非侯氏黑散以填空塞實爲義何  
以杜邪風出而復入之門戶乎此仲景所以出侯氏  
黑散後復明此一段脈證也然非細爲研究亦不易  
得其旨也

風引湯除熱癰癩

大黃 四兩

桂枝 三兩

乾姜 四兩

甘草 二兩

龍骨 四兩

牡蠣 二兩

寒水石 六兩

耳

滑石 六兩

有兼至之義

赤石脂 六兩

白石脂

六兩

紫石英

六兩

石膏

六兩

右十二味杵麩篩以韋囊盛之。取三指撮井花水三升。煮三沸溫服一升。

治大人風引少小驚癇瘧癰日數十發醫所不療除熱方巢氏云脚氣宜

風引

湯

案後此又出風引湯一方。註云除熱癱瘓似爲中風虛而有熱者主治也。然其中藥品除濕利水者居其半。治熱次之。治風又次之。迨爲熱盛于內。風微于外。從濕邪以治癆。從熱邪以治火。而中風之本病可除也。然非虛不甚虛。有邪在則實者不可與也。若真虛甚自有仲景傷寒論中。太陽中風病之桂枝加黃芩湯

在

防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉

浮

防已 一分

桂枝 三分

防風 三分

甘草 一分

右四味以酒一盃漬之一宿絞取汁生地黃二升咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

按又出防已地黃湯一方註云治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱其脉浮似爲風寒兼中于表而積熱內狂于心者主治也然其中藥品亦不外治風而兼除濕絞以生地黃汁引除風濕之味于血分中亦分從火治風治濕治兩解其在表之風濕中于衛而且中于營者也此亦虛不甚虛有風濕邪在則實者方可

與也。若真虛甚。自有傷寒論中太陽中風病之苓桂  
术甘湯在也。且此二方註一云治癲癇。一云治如狂  
狀。則癲癇驚狂皆有實熱不同。風痺瘧厥皆有虛因。  
又當就仲景原註而明原方不可。但見列于中風病  
中。卽謂爲仲景之大經大法也。在仲景當日或因中  
風病而附及于癲癇驚狂之治亦如內經論風證而  
諸風俱在不可膠柱而與言鼓瑟也。此亦就原註釋原文亦非余敢爲臆說也。

## 頭風摩散方

大附子一枚  
鹽等分

右二味爲散沫了以方寸匕已摩疚上令藥力行

大索闕疑存  
信也或曰沉  
寒重陰束肺  
陽氣于顙項

按觀于又出頭風摩散一方。註云以方寸匕摩疚上。令  
藥力行。疚上卽患處也。中風病頭未必有患處。而此  
方附見者亦猶前二方爲癲癇驚狂附見者也。此又  
以仲景之出方證出方。均非余敢臆說也。後此則另

之上頭爲之震盪益附散主之。已自已也

言歷節風之病。詳其脈證而出治矣。然亦與中風有相通之理也。故仲景附爲一篇。試再爲註明其義。

### 歷節

寸口脉沉而弱。沉卽主骨。弱則主筋。沉則爲腎。弱則爲肝。汗出入水中。如水傷心。歷節黃汗出。故曰歷節。

印云。肝病必乘脾。脾主肉。故出黃汗。也亦脾受制不能勝濕。故脾之色隨汗見也。

按風證中之歷節。又中風證中之一證也。人身有骨。骨必有節。風中骨節。不止一處。此歷節可以風名證。不外于中風而已。仲景亦詳其脈證。以立治法。論云。寸口脉沉而弱。言寸口。亦上受之邪。上以候上也。沉者邪在深分。屬於骨也。弱者虛于經分。屬於筋也。骨者腎之餘也。故沉卽爲腎。筋者肝之餘也。故弱卽爲肝。然則屬腎者陽微于腎。而骨節疎縱也。屬肝者血虛于肝。而脉絡空虛也。此歷節中風之所由來也。但此爲風邪中人。傷于氣分者多。又有歷節病。傷于血分者何邪也。則寒濕之邪也。其人必表虛而汗出。汗出

而身熱。遂入水中。取快一時。不料寒濕之邪。已隨汗出之毛孔。侵入軀殼。而入脉道矣。其邪將不止于傷衛。且傷其營。更不止于傷營也。且傷其心。汗者屬血。而實心液。則汗出而心血亦虛。水濕之邪。入必犯心。故仲景言其如水傷心也。此又歷節病成于血分受風濕之故也。風濕之邪。入于脈絡。則邪氣緩。正氣急。風邪內鬱。變熱通身。汗津外出。濕邪又因而着附于骨節之間。使其留滯不出。卽前條所謂賊邪不瀉是也。故汗自出而邪自存也。風爲陽邪。變熱于骨節之間。則氣血不循常道。而妄爲急疾。濕爲陰邪。挾寒于骨節之間。則氣血不能流行。而過于遲滯。一疾一徐。而牽掣拘碍。疚痛之所以作也。此歷節病致痛之原也。可不慎歟。

跌陽脉浮而過滑則穀氣實浮則汗自出

再論其跌陽。浮而過滑。浮者風也。滑者熱也。跌陽。陽陽。明之脈。本大滑者。大之甚。故曰過滑。滑則穀氣實。穀

甘寒存胃津

也。河間之論

角散救全木

之原以治歷

節之火痛，丹

溪之犀角散

河心胃之熱

以治風火相

搏之疼皆從

胃氣實而引

伸之也。

印云滑者痰

滯也。痰氣實

正痰滯之根

也。經云飲食

入胃散精于

脾。今兼浮脉

而汗出則胃

痛如掣。

氣卽胃氣。胃氣實則火盛而津衰也。兼以浮脈爲風火相煽。胃津之存者寡矣。故歷節之間表證也。風寒濕三邪爲患。固宜以驅風寒除濕邪之藥爲治矣。而跌陽脈浮滑則裏證之火盛津亡猶非風燥辛溫之藥可以竟投也。見治歷節者不可不兼顧其裏勿但舉一而廢百焉。斯可矣。就跌陽論之。而當顧慮者如此。其他又可不知凡幾矣。况胃內津衰火盛而穀氣之實非實也。乃邪熱與夙食相停蓄也。內熱生風。原足爲外風之召。在中風亦由內熱者多矣。況內熱甚。則汗大出。更足開門受盜爲歷節致成之由也。此仲景又必論跌陽。以明所以然也。

(按)寸口脉旣論矣。再爲論其少陰于尺脉浮而弱。風邪上受之。在寸口浮爲風。而尺中之浮似不可槩以風

中津液衰故不能散精于脾或不能盡化或水穀雖或去其氣猶留于胃中爲痰滯之根也故此汗出亦是發氣實于胃而兼蒸成汗者故有清胃熱以治痰滯之治也

言矣然浮見于尺知風之入至深也何以入于至深則尺脈弱故也此尺爲少陰然則風中腎臟乎非也可候之于尺也下以候下而已矣然則仲景何以言少陰則以少陰在尺候就尺言其部位耳不必拘執少陰二字歸病腎臟于歷節之風病無涉令後人起疑也夫以胃腑受風卽不識人腎臟豈可受風乎故知血少脈弱指下焦血分言之也下焦血多之地乃竟少弱見于脉矣其周身內外無處不血少可知也血少于臟腑之內則火能妄行血少于經絡之外則風斯直突風血相搏卽風熱橫肆也筋骨之間爲風所射爲火所灼有不疼痛如掣者乎此又就血虛召風入于筋骨之間爲患明言其由然也見人無時不當以氣血充積爲寶也

盛人脉濶小短氣血汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒

全蜀王言 卷之三

### 汗出當風所致。

按試再就人生軀體之肥瘠而明歷節之證。盛人者肥盛而豐厚之人也。外盛者中必虛。所以肥人多氣虛也。氣虛必短氣。氣虛必多汗。汗出而風入筋骨之間。遂歷節疼痛之證見矣。筋骨有邪。屈伸艱難。此爲飲酒汗出當風所致固矣。然肥人中陽虛微。表衛疏泄。腠理開張。津液外發。風易得乘。汗出而外襲熱。易得因液亡而內生。亦不必定酒可生熱。酒後汗出當風始可得歷節病也。不過就酒客以言其致病之理耳。諸肢節疼痛。身體魁羸。腳腫如脫頭眩。短氣溫溫欲吐。桂枝芍藥知母湯主之。

桂枝 芍藥 知母 湯方

桂枝 四兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

麻黃二兩

生姜五兩

白朮五兩

知母四兩

防風四兩

附子二兩  
炮

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

(按再者亦有瘦人而患肢節疼痛身體慙羸者瘦人血虛內熱是其常也內熱則亦可汗出汗出則亦可召風不必定肥人始多汗也瘦人有熱則好就寒濕之地或其陰虛內熱多飲漿水素有濕邪與熱合爲一家而脚下先腫濕邪自下起必自下先受之也濕熱在體風邪乘之而歷節成矣于是掣痛之勢如脫甚不可奈濕上甚而爲熱熱上甚而引風風上甚而耗氣衝胸頭眩短氣溫溫欲吐皆風邪熱邪濕邪合爲患者也主之以桂枝芍藥知母湯以桂枝防風麻黃生姜之辛燥治風治濕白朮甘草之甘平補中芍藥知母之酸寒苦寒生血清熱是風濕熱三邪並除之法也其間如附子走濕邪于經隧中助麻桂爲驅逐

非以溫經也。況此方乃通治風濕熱三邪之法。非耑爲瘦人出治也。肥人平日陽虛于內者多。非扶助其陽氣。則邪之入筋骨間者難于輕使之出。用附子于肥人尤所宜也。勿嫌其辛溫而云不可治血虛內熱之證也。瘦人陰虛火盛之甚加芍藥減附子。又可臨時善其化裁矣。何非仲景法中所該乎。人慎勿刻舟而求劍也。觀于後條烏頭可用而附子又何疑焉。

味酸則傷筋。筋傷則緩。名曰泄。醣則傷骨。骨傷則痿。名曰枯。枯泄相搏。名曰斷泄。榮氣不通。衛不獨行。榮衛俱微。三焦無所御。四屬斷絕。身體羸瘦。獨足腫大。黃汗出。脛冷。假令發熱。便爲歷節也。

病歷節不可屈伸。疼痛烏頭湯主之。

烏頭湯方 治脚氣疼痛不可屈伸

麻黃

三兩

芍藥

三兩

黃芪

三兩

甘草

炙

川烏

五枚咬咀以蜜二升煎取一升卽出烏頭

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓內蜜煎中更煎之服七合不知盡服之

礬石湯

治脚氣衝心

濕毒故也

礬石

二兩

按藥性礬石善收濕能解毒澄清降濁

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

按歷節風病固爲筋骨間之邪矣然其病又有得之嗜味病從口入于先然後風從之也飲食大欲過嗜則

傷五味皆然而就筋骨言之。則味酸傷筋也。酸能收陰而斂血。血常斂則筋常弛而無力。故緩名之曰泄。泄者血亡也。鹹能更堅而下氣氣常下。則骨常弱而不強。故凌名之曰枯。枯者精敗也。血亡則陰虛而熱生。精敗則陽虛而風入。風與熱相煽。卽枯與泄相搏也。名曰斷泄。陽敗風入則正氣斷。陰亡熱生則正血泄。就其陰陽氣血疎縱柔弱處。形容病情也。再推之于營衛。血既亡。則榮氣必不通。榮不通則衛必不獨行。榮氣澀滯于脈內。衛氣疏散于脈外。則在表之氣兩微矣。三焦在內。更何所藉以爲藩籬。此四屬榮衛之氣斷絕。而股肱手足置若身外之物。此爲歷節風病言也。而中風病之理亦不過榮衛俱虛。三焦無所御。四屬斷絕而已。若或身體羸瘦。獨足腫大。兼汗出。脰冷。再兼發熱。仲景謂其便爲歷節。則耑就筋骨言筋骨之風邪也。其所由來亦與中風病殊途而同歸者也。蓋中風之爲病。肌膚不仁。半身不遂。歷節之爲病。肢節疼痛不能屈伸。其狀亦大同而小異。故仲景編次于中風之後。見證雖分。而可以意爲會通耳。遂

爲出烏頭湯一方。註云。病歷節不可屈伸。疼痛者。主之。又治脚氣。烏頭名方。君主烏頭之治風也。佐以麻黃引風出太陽。且以除濕也。用芍藥以補血治其泄也。用黃芩甘草以補氣治其枯也。濕甚于下而熱衝于上者。與以礮石。外治之法。註云。治脚氣衝心。浸脚除濕于下。而熱自退散也。此二方爲歷節言內治外治之義。而不外于驅風濕補氣血之旨也。况歷節既通其病于中風。即可通其治于中風。治中風者。余引傷寒論中。太陽中風各治法詳矣。要在學者。神明之而已矣。于是更可詳論金匱書中諸附方之義。

### 附方

古今錄驗續命湯 治中風癥。身體不能自收。口不能言。冒昧不知痛處。或拘急不得轉側。姚云。與大續命同。兼治婦人產後去血者及老人小兒。

麻黃三兩

桂枝三兩

當歸三兩

人參三兩

石膏三兩

乾姜三兩

甘草三兩

芎藭

杏仁四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆脊  
憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風併治但伏  
不得卧欬逆上氣面目浮腫

千金三黃湯 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂  
惡寒經日不欲飲食

麻黃五分

獨活四分

細辛二分

黃芪 二分

黃芩 三分

右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服  
大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加人參  
三分慳加牡蠣三分渴加桔梗根三分先有寒加附子  
一枚

近効方术附湯 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌  
補中益精氣

白术 二兩

附子 一枝半

炮去皮

甘草 一兩

炙

右三味剉每五錢七姜五片枣一枚水盞半煎七分去

溼溫服、

崔氏八味丸 治脚氣上入少腹不仁。

乾地黃

八兩

山茱萸

四兩

薯蕷

四兩

澤瀉

三兩

茯苓

三兩

牡丹皮

三兩

桂枝

一兩

附子

炮一兩

右八味末之，煉蜜和丸，梧子大酒下十五丸，日再服。  
千金方越婢加朮湯 治肉極熱，則身體津脫，腠理開，  
汗大泄，屬風氣，下焦脚弱。

麻黃

六兩

石膏

半斤

生姜

二兩

甘草 二兩

白术 四兩

大枣 十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服惡風加附子一枚炮

按古今錄驗續命湯注云治中風瘡身體不能自收口不能言。冒昧不知痛處或拘急不得轉側爲中風正治也。以桂枝治衛風以麻黃治營風兼治挾寒邪者以當歸芎藭補血以人參甘草補氣以乾姜開鬱化痰以杏仁降氣豁痰以石膏清熱生津風寒外因火氣內因一方俱兼理者也。○千金三黃湯注云治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食亦爲中風正治而少爲變通者也。以獨活代桂枝爲風入之深者設也。以細辛代乾姜爲邪入于經者設也。以黃芪補虛以熄風也。以黃芩代石膏清熱爲濕鬱于下熱甚于上者設也。大汗心熱加大黃以洩熱也。腹滿加枳實以開鬱行氣也。氣逆加人參以

或二附子用  
以治陽虛細  
辛寒惡邪溫  
非溫經也。亦  
通。

補中益胃也。憇加牡蠣防水邪也。卽治濕熱也。渴加括萎根以肅肺生津除熱也。大約爲虛而有熱者。言治也。又云先有寒。加附子一枚。先有寒。卽素有寒也。素有寒。則無熱可知。縱有熱。亦內真寒。外假熱而已。云加附子。則凡大黃枳實括萎根俱可不用。原方中之黃芩亦應斟酌矣。此又爲虛而有寒者。言治也。○近効方。术附湯注云。治風虛頭重眩。苦極不知食味。暖肌補中益精氣。方中白术。甘草。補中附子。回陽。俱無從風之表治。則耑從虛寒中風之本治也。○崔氏八味丸。注云。治脚氣上入少腹。不仁。脚氣上入少腹似歷節中證。若不仁。則中風證也。八味滋腎水。益相火。兼壯水之本。益火之原。二義亦無從風之表治。又耑立下虛中風之本治也。○千金方。越婢加术湯。注云。治肉極熱。則身體津脫。腠理開。汗大泄。厲風氣。下焦脚弱。似爲厲風言治。然歷節及中風。有風熱大盛。汗出津亡者。俱可擇用也。主以麻黃散邪于表。則內不致大熱。佐以石膏清內熱之原。所以爲表熱汗出。灶底抽薪也。生姜。甘草。白术。大棗。俱從補中之裏治。

所以維正氣之根。使不致陽隨汗出。陰隨熱耗也。惡風加附子。又爲陽虛多汗者預設一防。故此方凡厲風歷節。中風。身熱。汗泄。表虛。陽微者俱有裨益也。各附方之義亦俱從仲景意中經營而得。然偏駁不純者有之。終不如仲景傷寒論中治太陽中風病諸方之純而不駁也。余旣引而列叙之于前。遵仲景法爲宗主也。後叙各附方于後。取之貴博。擇之貴精。以各附方爲羽翼。仲景者也。學者深造而自得之。應不以余言爲河漢。