

本  
經  
逢  
原

本經逢原小引

醫之有本經也猶匠氏之有繩墨也有繩墨而後有  
規矩有規矩而後能變通變通生乎智巧又必本諸  
繩墨也原夫炎帝本經繩墨之創始也大觀證類規  
矩之成則也瀕湖綱目成則中之集大成未能達乎  
變通也譬諸大匠能與人規矩不能與人智巧能以  
智巧與人達乎變通之道者黃帝靈素之文也能以  
炎黃之道隨機應用不爲繩墨所拘者漢長沙一人  
而已長沙以天縱之能一脈相承炎黃之道信乎皆

墨也未開炎黃而外別有繩墨也嘗思醫林學術  
非不代有名人求其端本澄源宗乎本經主治者玉  
函金匱而外未之聞也長沙已往唐逸士千金方獨  
得其髓其立方之峻有過於長沙者後世未由宗之  
以故集本草者咸以上古逆順反激之用槩置不錄  
專事坦夷以適時宜其間貨貨固無足論卽瀕湖之  
博洽今古者尚爾舍本逐末僅以本經主治冠列諸  
首以爲存羊之意惟仲淳繆子開鑿經義迥出諸方  
而於委宛難明處則旁引別錄等說疏作經言朱紫

之混能無戾乎昔三餘喬子有本經註疏一冊三十  
五年前於念菽先生齋頭曾一寓目惜乎未經刊布  
不可復覩因不自揣聊陳鄙見略疏本經之大義并  
系諸家治法庶使學人左右逢原不逾炎黃繩墨足  
以爲上工也上工十全六不能盡起白骨而生之吾  
願天下醫師慎勿妄恃已長以希苟得之利天下蒼  
生確遵有病不治常得中醫之戒跳出時師圈積何  
繩墨之可限哉

康熙乙亥春玉石碩張璐書於雋永堂時年七十有

九

本經逢原目錄

卷之一

水部

諸水

火部

諸火

上部

諸土

金部

金

赤銅

銅青

自然銅

古文錢

鉛

鉛粉

鉛丹

蜜陀僧

錫

鐵落

鐵砂

鐵精

鐵繡

石部

玉

雲母

白石英

紫石英

丹砂

銀硃

水銀

輕粉

靈砂

雄黃

雌黃

石膏

相理黃石

滑石

石脂

爐甘石

無名異

石鍾乳

附孔公孽

石灰

浮石

陽起石

慈石

代赭石

禹餘糧

空青

曾青

綠青

扁青

石膽

礬石

砒石

礞石

花蕊石

河沙

石燕

石蟹

蛇黃

附蛇合石



霹靂礮

鹵石部

食鹽

戎鹽

卽青鹽

鹵礮

凝水石

玄精石

朴硝

玄明粉

風化硝

硝石

礶砂

蓬砂

石硫黃

礬石

綠礬

山草部

甘草

黃耆

人參

沙參

桔梗

黃精

葳蕤

知母

肉蓯蓉

天麻

白朮

蒼朮

狗脊

貫衆

巴戟天

遠志

淫羊藿

仙茅

玄參

地榆

丹參

紫參

紫草

白頭翁

白及

三七

黃連

胡黃連

黃芩

秦艽

紫胡

銀柴胡

前胡

防風

獨活

羌活

升麻

苦參

白蘚皮

延胡索

貝母

山慈姑

白茅根

草龍膽

細辛

杜衡

白微

白前

卷之二

芳草部

當歸

芎藭

撫芎

蛇牀

藥本

白芷

白芍藥

赤芍藥

牡丹皮

木香

甘松香

山柰

高良薑

草豆蔻

草果

白豆蔻

縮砂蜜

益智子

藜蘆

蒟葉

炒豆蔻

補骨脂

薑黃

鬱金

蓬莖茂

荆三稜

香附

茉莉

排草

藿香

薰香

蘭香

澤蘭

馬蘭

香蒿

爵牀

荊芥

紫蘇

蘇子

水蘇

薄荷

隰草部

菊

艾

茵陳蒿

青蒿

羌蔚

微銜

夏枯草

劉寄奴

旋覆花

青柏子

紅藍花

照脂

大。薊。小。薊。

續。斷。

漏。蘆。

苧。根。黃。麻。

胡。蘆。巴。

惡。實。

蒼。耳。

天。名。精。

鶴。蝨。

稀。莖。

箬。

蘆。根。

甘。蕉。

蓂。荷。

麻。黃。

木。賊。

石。龍。芻。

燈。心。

生。地。黃。

乾。地。黃。

熟。地。黃。

牛。膝。

紫。苑。

麥。門。冬。

萱。草。

淡。竹。葉。

冬。葵。子。

蜀葵花

秋葵子

龍葵

酸漿

敗醬草

欵冬花

鼠麴草

決明子

地膚子

瞿麥

王不留行

葶藶

車前子

馬鞭草

光明草

鱧腸草

連翹

陸英

藍寶大青  
小青

青黛

蓼子

葡萄

白蒺藜

沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

地椒

半邊蓮

地丁

見腫消

毒草部

大黃

商陸

狼毒

狼牙

防葵

商茹

大戟

澤漆

甘遂

續隨子

葇苳子

蓖麻子

常山

蜀漆

蔡蘆

附子

川烏

天雄

側子

草烏

射罔



白附子

天南星

半夏

蚤休

鬼白

射干

玉簪根

鳳仙子

曼陀羅花

羊躑躅

芫花

堇花

莽草

茵芋

鈎吻

蔓草部

兔絲子

五味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

青木香

預知子

牽牛

紫葳

旋花

薔薇 管輅

月季花

栝蒌實

栝蒌根

土瓜根

芍根

天門冬

百部

何首烏

葶藶

土茯苓

白欬

山豆根

黃藥子

白藥子

威靈仙

茜草

防己

木通

通草

釣藤

木蓮

紫葛

葶藶

忍冬

清風藤

藤黃

水草部

澤瀉

羊蹄根

石菖蒲

蒲黃

苦草

水萍

蓴

海藻

昆布

石草部

石斛

骨碎補

石葦

景天

石胡荽

地錦

苔草部

陟釐

石藥

卷栢

馬勃

倒掛草

苔

卷之三

穀部

諸米

諸麥

諸豆

胡麻

亞麻

麻子仁

薏苡仁

嬰粟殼

阿芙蓉

蒸餅

神麴

酒麴  
紅麴

飴糖

醋

酒

菜部

韭

薤

葱

蒜

雲薑

白芥子

蕪菁

萊菔

生薑

乾薑

胡荽

藜香

蘄菜

菠菜

蕪菜

同蒿

芥苳子

苳子

馬齒莧

翻白草根

蒲公英

落葵

葎菜

蕨

黃獨

薯蕷

百合

茄

苦瓠

冬瓜子

越瓜

胡瓜

南瓜

絲瓜

苦瓜

紫菜

石花菜

木耳

桑耳

香蕈

麻姑  
雞巖

土蕈

果部

李根白皮

杏仁

梅

桃仁

栗

棗

梨

木瓜

山楂

柰

林檎

柿蒂

安石榴

橘皮

青皮

橘核

橘葉

柑

橙

柚

柑櫟

金橘

枇杷

楊梅

櫻桃

銀杏

胡桃

長生果

負負葡萄

橡實

檳皮

荔枝

龍眼

橄欖

榲子

松子

檳榔

大腹子

大腹皮

馬檳榔

無花果

枳椇

水果部

西瓜

瓜子仁

甜瓜蒂

甜瓜了

葡萄

甘蔗

沙糖

石蜜

蓮藕

蓮實

石蓮子

蓮鬚

蓮房

荷葉

芡實



芟實

烏芋

慈姑

味部

蜀椒

秦椒

椒目

豬椒根

胡椒

畢澄茄

吳茱萸

食茱萸

茗

香木部

栝子仁

栝葉

節油

松脂

松節

杉

肉桂

桂心

牡桂

筒桂

桂枝

辛荑

沉香

蜜香

丁香 丁皮

旃檀

紫檀

降真香

烏藥

茴香

楓香脂

薰陸香

沒藥

麒麟竭

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

阿魏

蘆薈

喬木部

黃檗 小檗

厚朴

杜仲

椿樗根皮

乾漆

梓白皮

梧葉皮

桐實

海桐皮

川楝子

槐實

槐花

秦皮

合歡皮

皂莢

皂角刺

肥皂莢

無患子

沒石子

訶梨勒

柳華

檉柳

水楊

榆根白皮

蕪荑

蘇方木

樺木皮

樓櫚

烏柏根

巴豆

大楓子

相思子

灌木部

桑根白皮

桑椹

桑葉

桑枝

柘根白皮

楮實

枳殼

枳實

枸橘

梔子

酸棗仁

白棘

薤仁

山茱萸

金櫻子

郁李仁

鼠李子

女貞實

枸骨

衛矛

南燭

五加皮

枸杞

地骨皮

溲疏

石南

牡荊

蔓荊子

紫荊皮

木槿皮

芙蓉

山茶

蜜蒙

木棉

柞木

黃楊

放杖木

接骨木

寓木部

茯苓

茯神

琥珀

豬苓

雷丸

桑寄生

松蘿

苞木部

竹葉

竹茹

竹瀝

笋

竹黃

震燒木

藏器部

錦

褲襠

裹脚布

鑿柄

弓弩弦

敗蒲扇

蒲蓆

漆器

燈盞油

炊單布

敗鼓皮

卷之四

蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蠟螭

蟲白蠟

紫釰

五倍子

桑嫫蚱

雀甕

原蠶蛾

白殭蠶

蠶繭

蠶退

蠶沙

九香蟲

雪蠶

蜻蛉

樗雞

芫青

蟹蚤

葛上亭長

地膽

蜘蛛

壁錢

蚤

水蛭

蛆

狗蠅

疥癩

桑蠶蟲

桃蠹蟲

蚱蟬

蟬蛻

蜣螂

天牛

螻蛄

螢火

衣魚

鼠婦

蠹蟲

蜚蠊 即臭蟲

蟾蜍

蟾酥

螢慕

蛙

蚪蚪

蜈蚣

蚯蚓



蝸牛

龍蛇部

龍骨

龍齒

龍角

鼈甲

鯨鯉甲

石龍子

守宮

蛤蚧

蛇蛻

蚺蛇膽

白花蛇

烏蛇

蝮蛇

魚部

鯉魚

鱒魚

青魚

連魚

濶口魚

鰻魚

白魚

石首魚

白魚

鰾膠

勒魚

鱒魚

嘉魚

鰱魚

鯽魚

石斑魚

鱖魚

海粉

燕窩

鱸魚

鱖魚

鱖魚

鰻鱺

鱖魚

甲魚

鱖魚

鱖魚

黃頰魚

江鱗

河豚

江豚

比目魚

鮫魚

烏賊骨

鮑魚

海馬

蝦

介部

龜版龜汁

玳瑁

鼈甲

龜甲

蟹

鱗

蚌

蚌

真珠

石決明

文蛤

蛤蜊

蟹

魁蛤殼卽瓦楞子

車螯

貝子

石蚶

淡菜

海羸 甲煎

田羸

寄居蟲

郎君子

禽部

鶴頂

鶴骨

鴉鴉

鷓鴣

鴉

雁

鳴

鳧

雞

雉

烏鴉

鵠

鸚鵡

鴉

鴿

鶯

雀卵

伏翼

五靈脂

斑鳩

伯勞

鸚鵡

啄木鳥

鸚鵡

鷹屎白

鸚

鸚

鴟

鴟休

鳩

獸部

豬

狗

羊

羖羊角

牛

馬

驢

駝

貉

酥

阿膠

黃明膠

牛黃

狗寶

獅油

虎骨

象皮

犀角

熊脂

熊膽

麝羊角

山羊血

鹿茸

鹿角膠

鹿胎

麋茸

麋鹿肉

麝

麝香

貓

狸

獐

兔

狐

水獺肝

山獺莖

膾肭臍

鼠

刺蝟皮

人部

髮

頭垢

乳汁

爪甲

人牙

人中黃

金汁

乾糞灰

溺

溺白堊

秋石

紅鉛

天靈蓋

人胞

胞衣水

初生臍帶

胎元

本經逢原卷一

長洲石頑張  
璐路玉父纂述

男

登誕先

叅訂

倬飛疇

水部

諸水 古人服藥必擇水火。故凡湯液多用新汲井  
草水。取天真之氣。浮於水而也。宜文火煎成。候溫緩  
緩服之。金匱云。凡煮藥飲汁。以解毒者。雖云救急不  
可熱飲。諸毒病得熱更甚。宜冷飲之。此言治熱解毒



及辛熱藥味當確遵此例一切調補藥卽宜溫飲苦寒祛火藥則宜熱飲熱因寒用之法也○仲景煎實脾藥作甘瀾水揚之萬遍取其流利不助腎邪也○杓揚百遍名百勞水取其激揚以除陳積也成無己曰仲景治傷寒瘀熱在裏身黃麻黃連軀赤小豆湯煎用潦水取其味薄不助溼熱也○以新汲水煮沸如麻名麻沸湯取其輕浮以散結熱也○以水空煎候熟極煮藥名清漿水取其下趨不至上涌也○服涌吐藥用藜水取其味濁引疾上竄以吐諸痰飲宿

食酸苦涌泄爲陰也。○煎蕩滌邪穢藥用東流水本  
經云東流水爲雲母石所畏。鍊雲母用之。○煎利水  
藥用急流水。取性走也。○煎水逆嘔吐藥用逆流水。  
取其上涌痰涎也。○煎陽盛陰虛。日不得瞑藥。用于  
里流水。取其性之疾瀉也。○煎中暑神昏藥及食椒  
樹菌笑不止。用地漿水。急備地作坎  
置木攪澄者是也取救垂絕  
之陰也。○煎中暑亡汗藥及霍亂泄利不止。用酸漿  
水。糯米釀成點乳餅者或木磨  
作內熬真粉之酸水亦可取收欲脫之陽也。○  
黃露雨水洗瘡疥滅斑痕。○白露雨水洗肌面滅顏

色。秋露質清。止癩除煩。○臘雪氣烈。助陽攝火。治  
天行時氣。瘟疫解丹毒。○雹水性暴。動風發癩。○夏  
冰陰凝。發疔成瘡。○栢葉菖蒲上露。並能明目。○韭  
葉上露。去白癩風。○靈雪花上露。能損人目。○浸藍  
水解毒殺蟲。誤吞水蛭腹而黃者。吸此水蟲下即安。  
○甌中養花水有毒。傷人臘梅者尤甚。○鹵水鹹苦  
大毒。凡蝕蠹疥癬及毒蟲生子入肉者。塗之即化。但  
瘡有血者不可塗之。六畜食一合當時死人亦然。○  
生熟湯入鹽微鹹。霍亂者飲一二升。吐盡痰食即愈。

○方諸水。大蛙水也。向月取之。得至陰之精華。故能明目。止渴除煩。湯火瘡。救之有效。○上池水。竹籬頭上水也。長桑君飲扁鵲能洞鑑藏府。見垣一方人。○東阿井水。煎烏驢皮膠。治逆上之痰血。○青州范公泉。造白丸子。利膈化痰。二者皆濟水之分流也。○至若古塚廢井。澤中停水。山巖泉水。有翳及諸水。經宿面有五色者。皆有毒。非但不可服食。煎藥卽洗滌亦忌之。

火部

諸火

北方炊食都用煤火。以地屬坎。足勝其氣。且  
助命門真火。人食煤火。長氣於陰。所以膂力強壯。南  
人食之多發癰毒。受其毒者。以蓋汁解之。然煤火處  
置大缸水於旁。則毒從水解。○南方炊食都用薪火。  
人食薪火。長氣於陽。氣多輕浮不實。不似北方之稟  
氣剛勁也。○凡煎補藥。文火緩煎。瀉藥。武火急煎。煎  
膏用桑柴火最良。抱朴子云。一切神仙藥。不得桑柴  
不服。然不若煎收並用文火。則不傷藥性。○上古炊  
食都用燧火。是爲陽火。今皆擊石取火。則陰火也用。

以炊食猶之可也。若點艾炷，尤非所宜。灸艾宜取太陽真火，否則真麻油燈，艾草點於炷上，則灸瘡至愈不痛。○神鍼火治寒溼痺附骨陰疽，凡在筋骨隱痛者，鍼之火氣直達病所。○燔鍼卽燒鍼，病在經筋所發諸痺，用之其効最捷。經云：治在燔鍼，劫刺以知爲度，以痛爲愈。○馬矢煨煨風痺藥，取其性緩，通行經絡也。○葦薪火炊瀉陽藥，取其輕揚，不損藥力。二者皆內經法也。○燈火燂小兒諸驚，及頭風腦痛，風痺緩急，以油能解風毒，火能通經絡也。○燈花治小兒

邪熱在心夜啼不止。以二三顆燈心湯調。抹乳吮之。  
○燭燼治疔腫。同胡麻。鍼砂等分爲末。和醋敷之。治  
九漏。與陰乾馬齒莧等分爲末。和臘豬脂敷之。取烏  
柏之餘力。以化反肉也。○至於烟草之火。方書不錄。  
惟朝鮮誌見之。始自閩人吸以祛瘴。向後北人藉以  
辟寒。今則通行寰宇。豈知毒草之氣。熏灼藏府。遊行  
經絡。能無壯火散氣之慮乎。近日目科內障丸中。間  
有用之。獲効者。取其辛溫散冷積之翳也。不可與冰  
片同吸。以火濟火。多發煙毒。不可以藤點吸。恐其有

蛇虺之毒也。吸烟之後，慎不得飲火酒，能引火氣薰灼藏府也。又久受烟毒，而肺胃不清者，以砂糖湯解之。烟筒中脂汚衣上，滌之不去，惟將西瓜仁揉之，卽淨。其滌除痰垢之力，可知。世以瓜子仁生痰，不亦謬乎。

土部

諸土。脾土喜燥，惡溼。故取東壁太陽所照之土，引真火生發之氣，補土而勝溼，則吐瀉自止。用以制藥，皆爲脾胃之引導耳。昔人以東壁土調水，治小兒嗜



食泥土之病。取土入蟲口而祛之。下行也。○道塗中  
熱土。治夏月暈死。取溫以散熱也。若沃以冷水。虛陽  
立斃。死不救矣。○白堊土。苦溫無毒。本經主女子寒  
熱癥瘕。月閉積聚。取土之間氣。以祛婦人間廁之積  
也。千金治婦人帶下等疾者。以上能勝溼。而白則兼  
入氣分也。惟邯鄲者爲勝。○黃土。甘平無毒。乃中央  
正色。不占穢漬。故色不黑。治泄利冷熱赤白。腹內絞  
痛下血。解諸藥毒。閉口椒毒。野蕈毒。○蚯蚓泥。治小  
兒陰囊熱腫。取寒能解毒也。熱病讖語狂亂。無燥結。

可攻者。蚯蚓泥。凉水調服。○蟻螂轉丸。土治反胃吐  
利。霍亂。湯淋絞汁飲之。醋調塗項上瘦瘤。○土蜂窩  
上細土。主頭風腫毒。及蜂蠆傷。醋和傅之。○胡燕窩  
土。主風瘙癢疹。及惡刺瘡。浸淫瘡。並水和傅之。小品  
治溼瘍疥瘡。外臺治蠟螻尿瘡。千金治癩疽丹毒。○  
鼠壤土。通腎氣。解毒邪。取其搜風達竅也。○蟻垤土。  
下胞衣死胎。炒熱搗心下白出。○燒尸場上土。治好  
魔多夢。置枕中。并塗關元及臍。○螺螄泥。主反胃吐  
食。取螺螄一斗。水浸取泥曬乾。每服一錢。火酒調服。

○犬屎泥治妊娠傷寒塗腹保胎○井底泥治妊娠  
熱病塗胸臍丹田護子并治湯火燒瘡○伏龍肝乃  
竈心赤土本經云味辛微溫主婦人崩中吐血千金  
名釜月下土言正對釜臍處也然必日用炊飯者良  
若煮羹者味鹹不堪入藥止欬逆吐血消癰腫毒氣  
蓋以失血過多中氣必損故取微溫調和血脈也消  
癰腫毒氣者辛散稟堅也日華子主催生者取溫中  
而鎮重下墜也其胎漏不止產後下利並宜煮水澄  
清去滓代水煎藥取溫土藏和營血也千金方治中

風口噤狂不識人。並用攪水澄服。又久利不止。橫生  
逆產。胞衣不下。皆醋調塗臍腹。效。小兒重舌。和苦酒  
塗之。發背酒調厚敷。乾卽易。平乃止。杖瘡腫痛。香油  
調塗。灸瘡腫痛。煮木熱淋。皆孫真人法也。外臺治一  
切癰腫。和蒜泥貼。乾再易之。○百草霜燒百草之煤  
也。止血散瘀。上下諸血。悉主之。又陽毒發斑。取溫以  
解毒散火也。○金臍墨治陽毒發狂。黑奴丸中用之。  
千金治卒中惡。卒心痛。舌卒腫大等患。又下胎死方。  
用百草霜二錢。伏龍肝五錢。爲細末。酒調童便服二

錢少頃再服三服卽下○梁上塵一名烏龍尾治奸  
娠胎動橫生逆產及金瘡鼻衄疔腫惡瘡小兒赤丹  
取其輕浮以散久積之氣也○清煙墨灰止吐衄血  
逆上行或生藕汁或萊菔汁或鮮地黃自然汁磨服  
卽止然須燒灰出火毒用之但勿用乾地黃和水搗  
磨栢葉汁甘蔗汁咸非所宜往往止截後有瘀積之  
患飛絲入目及一切塵物入目磨濃墨點之自出或  
燈心醮墨汁頻捲之○砂鍋取年久炊食者研細水  
飛治黃腫積塊酒服五錢潞州者佳○孩兒茶一名

烏參泥性澀收斂止血收溼爲金瘡止痛生肌之要藥○白磁器研細水飛傅癰腫可代鍼砭又點目去翳○糞坑底泥治背瘡疔腫癰毒陰乾爲末新水調敷其痛立止○坑塗同蟬蛻全蠍末作餅香油煎滾溫服以浮傅疔四圍其疔自出

金部

金 生金辛平有毒金箔無毒

發明 金能制木故可療驚癇風熱肝膽之病然須爲箔庶無重墜傷中之患紫雪方用赤金葉子煎水

取制肝降痰逆也。若成鬼錠金及首飾之類，非特無味，且有油膩，良非所宜。○銀箔功用與金不殊，但入氣分不入血分，稍爲不同。肘後方治癰腫，五石湯用之。

赤銅

苦平微毒

發明 賊風反折，以赤銅五觔燒紅，內二斗酒中，百遍服，五合日三服，以効爲度。赤銅落乃打銅落下之屑，與自然銅同類，故亦能接骨。殷赤醋沃七次，同五倍等，則染髮黑潤。藏器曰：赤銅屑能鐸人骨及六畜。

有損。細研酒灌。直入骨損處。六畜死後取骨視之。猶有銲痕可驗。

銅青 酸苦平小毒

發明 銅青藉醋結成。能入肝膽二經。以醋醮搽喉中。則吐風痰。爲散療喉痺牙疳。醋調揩腋下。治胡臭。黃汁調點爛沿風眼。去疔殺蟲。所治皆厥陰之病。

自然銅 辛平小毒。火煨醋淬七次。置地七日出火毒水飛用。銅非煨不可入藥。新煨者火毒燥烈。慎勿用之。



發明 自然銅出銅坑中。性稟堅剛。散火止痛。功專接骨。骨接之後。卽宜理氣活血。庶無悍烈傷中。走散真氣之患。

古文錢 辛平小毒

發明 古錢以生薑汁塗。刮青點目。去障消痰。散赤腫。一點卽愈。但初點熱淚。蔑面。然終無損。惟作瘡者。與肝腎虛而內障生花者。不可用也。婦人逆產五淋。煮汁用之。便毒初起。與胡桃肉同嚼。食二三枚卽消。便毒屬肝。金伐木也。

鉛一名黑錫

甘寒無毒。凡用取未經銀冶新鉛。鏽淨去渣。再鎔成液。同硫黃煅。如焰起。以醋酒之候。成黑灰。研之不黏滯爲度。如煅不透。服之令人頭痛。以陰降太速。陽火無依故也。

發明 鉛稟北方癸水之性。陰極之精。內通於腎。故局方黑錫丹。宣明補真丹。皆用之。得汞交感。卽能治一切陰陽混淆。上盛下虛。氣升不降。噎膈反胃。嘔吐眩暈。諸疾。又槌成薄片。置燒酒中。半月許。結成白霜。取其酒徐徐飲之。降陰火最捷。但性帶陰毒。恐傷心。

腎不可多服。鉛性入肉。故女子以之。絳耳孔。卽自穿。

鉛粉

一名胡粉

辛寒無毒

本經治伏尸毒螫殺三蟲

發明 韶粉與黃丹同類。內有豆粉蛤粉。而無硝鹽。

但入氣分。功專止痛生肌。亦可入膏藥。代黃丹用。本經治伏尸毒螫殺三蟲者。取鉛性之重。以鎮攝其邪。金匱甘草粉蜜湯。治虵病吐涎心痛。專取胡粉殺蟲。甘草安胃。蜜以誘入蟲口也。陶弘景云。療尸蟲。彌良鉛丹

一名黃丹

辛微寒無毒

本經治吐逆胃反驚癇癩疾除熱下氣

發明 鉛丹體重性沉。味兼鹽礬而走血。分能墜痰止瘧。本經言止吐逆胃反治驚癇癩疾除熱下氣。取其性重以鎮逆滿也。仲景柴胡龍骨牡蠣湯用之。取其入膽以祛痰積也。但內無積滯誤服不能無傷胃奪食之患。傅瘡長肉墜痰殺蟲皆鉛之本性耳。目暴赤痛鉛丹蜜調貼太陽穴立効。

蜜陀僧 鹹辛平小毒

發明 此感鉛銀硝石之氣而成。其性重墜直入下

焦故能墜痰截瘡療瘡腫治驚氣入心包絡痞不能  
言語者用蜜陀僧末一七茶清調服卽愈驚則氣亂  
取重以去怯而平肝也但入口則漾漾欲吐以陰毒  
之性能傷胃氣也聖惠方鼻皴赤皴蜜陀僧細研人  
乳調夜則塗之丹方治背瘡初起以醋煨七次桐油  
調圍患處卽消同枯礬治汗癩體氣合五倍子染髮  
鬚同鷹屎白滅癩痕水磨服解砒霜硫黃毒

錫 辛寒微毒

發明 錫爲砒母故新造錫器不可盛酒越宿制瓶

藏藥須舊錫雜鉛乃佳。昔人過飲燒酒，昏迷欲絕，或令以錫器貯沸湯，蓋取氣水飲之，卽甦。此與炊單布治湯氣薰灼無異，同氣相感之力也。

鐵落 辛寒有毒。卽燒鐵赤沸砧上，爆下之屑也。鐵銚內煨赤，醋沃七次用。

本經主風熱惡瘡、瘍疽、疥、疥氣在皮膚中。

發明 素問云有病怒狂者，治以生鐵落爲飲，漬汁煎藥，取其性沉下氣最疾，不可過服。過服令人凜凜惡寒，以其專削陽氣也。本經主風熱惡瘡等疾，皆肝

心火熱所致。辛寒能除二經之熱也。蘇恭以之炒熱投酒中。療賊風癱病。借酒以行皮膚中氣也。

鍼砂 酸辛無毒。作鍼家磨鑿細末也。

發明 鍼砂寒降。善治溼熱脾勞黃病。於鐵銚內煨通紅。醋沃置陰處。待半月結塊。生黃化盡。鐵性用爲消脾胃堅積黃腫之專藥。丹溪溫中丸用之。又以製過鍼砂一兩。入乾漆灰半錢。香附三錢。合平胃散五錢。蒸餅爲丸。湯酒任下。治療與溫中丸不殊。

鐵精 平微溫小毒

本經明目化銅

發明 鐵之精華也。出鍛竈中。紫色輕如塵者佳。取至陰沉重之性。得純陽火鍊。而輕浮上升。故可以療驚悸定風癇。破胃脘積血作痛。本經主明目。取其鎮攝虛火之義。以其得火氣之多也。但胃氣虛寒。人服之。往往有奪食發呃之虞。以純陰鎮攝太過。而傷犯陽和之氣也。

鐵繡

一名鐵衣

辛寒無毒

發明 陶華云鐵繡水和藥服。性沉重。最能墜熱開



結又能平肝消腫治惡瘡疥癬和油塗之婦人產後陰挺不收和冰片研水傅之蠮螋蜈蚣咬和蒜塗之

石部

玉 平淡無毒

發明 玉減癥痕日日磨擦久則自退研細水飛去日翳珊瑚瑪瑙寶石玻璃水晶爲屑水飛皆能磨翳不獨玉屑爲然也

雲母 甘平無毒凡用選白瑩者擘薄片取雨水或流水漬去砂土更以秋露漬數十日同露煮七日夜

磨令極細。撚指無復光明者，乃可用之。或同鹽入重布袋接之，沃令鹽味盡，懸當風處自然成粉。弘景曰：鍊之用礬則柔爛，忌羊血者，以其能解諸藥之性也。與胡蒜尤爲切禁。犯之必腹滿作瀉。黑者有毒，傷人本經。主身皮死肌，中風寒熱，如在車船上，除邪氣，安五藏，益精明目。久服輕身延年。

發明 雲母生泰山山谷，色白者良。本經言雲母甘平，詳其性升，亦應有甘溫助陽之力，故能辟一切陰邪不正之氣，主身皮死肌，以其能辟除陰毒也。其治

中風寒熱如在車船上以其能鎮攝虛陽也。局方雲  
母膏治一切癰毒。仲景方治牝瘡多寒。千金方治久  
利帶下小便淋疾。及一切惡瘡。深師方治痰飲頭痛。  
何德揚治婦人難產。溫酒調服三錢入口卽下。金刃  
傷傳之止血最速。且無腐爛之虞。陰疽腸癰亦多用  
之。皆取助陽之力也。久服能使身輕尸解。孫真人恆  
服之。但石藥性偏助陽。凡陰虛火炎者。慎勿誤與。  
**白石英** 甘溫無毒。出泰山。以六稜瑩白如水晶者  
爲真。林北海先生本草綱目必讀。但收紫而不及白。

世鮮真者可知。

本經治消渴。陰痿不足。欬逆。胸膈間久寒。益氣除風溼痺。

發明 白石英入手太陰足陽明氣分。肺癰潰久。癢痺不起者。宜之。本經主消渴。陰痿不足。諸病。功專溫肺無疑。但石性慄悍。不可久服。仲景金匱風引湯。只令碎如米粒。不欲其滓入胃也。千金五石等方。俱鍛過水飛入丸。而五石丸專以鍾乳爲君。合紫白石。英赤石脂石膏。專溫藏氣。而石膏清胃以解諸石之悍。

且既經煨過水飛不慮其滓之留中蘊熱也。

紫石英 甘溫無毒出泰山以五稜明淨深紫大塊者良。浙產者塊小亦可入藥。經火則毒生。研極細。水飛三次。用時珍云煨赤醋淬七次水飛用非。

本經主心腹欬逆邪氣補不足。女子風寒在子宮絕孕十年無子。

發明 紫石英人手足少陰厥陰血分。上能鎮心定驚悸安魂。鬼攝逆氣重以去怯也。下能益肝填補下焦散陰火止消渴。溫以煖血也。女子經阻色淡不孕。

者宜之。本經治女子風寒在子宮絕孕十年者服之。能孕。非特峻補兼散濁陰留結之驗也。若血熱紫黑者禁。用爲其性溫也。千金云。婦人欲求美色者勿服。紫石英令人色黑。非溫血之謂乎。故婦人絕孕由於陰虛火旺。不能攝精者禁用。

丹砂

一名硃砂

甘微寒無毒。研細水飛用。入火則烈。毒

能殺人。急以生羊血童便金汁等解之。

本經主身體五藏百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神明不老。能化爲汞。

發明 丹砂體陽性陰外顯丹色內含真汞不熱而寒離中有坎也不苦而甘火中有土也嬰兒姤女交會於中鎮心安神是其本性用則水飛以免鎮墜不宜見火恐性飛騰本經治身體五藏百病安定神明則精氣自固火不妄炎則金木得平而魂魄自定五藏皆安精華上發而氣益目明陽明神物故應辟除不詳消散陰惡殺厲之氣仲淳繆子經疏之言也同遠志龍骨則養心氣同當歸丹參則養心血以人參茯苓濃煎調入丹砂治離魂病以丹砂末一錢和生

雞子黃三枚攪勻頓服治妊娠胎動不安胎死卽出  
未死卽安又以丹砂一兩爲末取飛淨三錢於一時  
頃分三次酒服治子死腹中立出慎勿經火若經伏  
火及一切烹煉則毒等於砒礪惟養正丹則同鉛汞  
硫黃煨之以汞善走而火毒不致蘊發也

銀硃 辛溫有毒忌一切血

發明 水銀和硫黃煨煉成硃轉蛇爲嬰故專殺蟲  
治瘡以毒攻毒而已今食品往往用之良非所宜觀  
其同蟹殼燒之則臭蟲絕跡和棗肉薰之則瘡疥頓



枯其性悍烈可知。

水銀

一名汞

辛寒有毒。水銀陰毒重著不可入人腹。

古法治誤食水銀。令其人卧於椒上。則椒內皆含水。銀今有誤食水銀腹中重墜。用豬脂二觔切作小塊。焙熟入生蜜拌食得下。亦一法也。

本經主疥癩痂瘍白禿。殺皮膚中蟲。墮胎除熱。殺金銀銅錫毒。鎔化還復爲丹。

發明 水銀乃至陰之精質。重著而性流利。得鹽礬爲輕粉。加硫黃爲銀硃。煬成罐同硫黃打火升鍊。則

爲靈砂。同硝皂等。則爲升降靈藥。性之飛騰靈變。無  
似之者。此應變之兵。在用者得其肯脊。而執其樞要  
焉。本經主疥瘍白禿。皮膚中蝨。及墮胎。除熱。傅男子  
陰。則陰消無氣。以至陰之精。能消陽氣。故不利男子  
陰器也。和劑局方之靈砂丹。專取硫黃以製汞。養正  
丹兼取伏火丹砂以製鉛。深得交通陰陽。既濟水火  
之妙用。非尋常草木可以例推也。千金治白癩風癢。  
外臺治蟲癬疥癢。梅師治痔瘡作痒。肘後治一切惡  
瘡。藏器有云。水銀入耳。能蝕人腦。令人百節攣縮。但

以金銀著耳邊卽出頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治。

輕粉

一名  
膩粉

辛燥有毒

發明 水銀加鹽礬鍊爲輕粉。化純陰爲燥烈而陰毒之性猶存。故能通大腸。傅小兒疔疽癰癤。殺瘡疥癬蟲。風瘙瘡癢。但以陰性暴悍。善切淫穢。徽瘡食之。竄入筋骨。莫之能出。久久發爲結毒。致成癩人。然必仍用水銀昇鍊入三白丹引拔毒之藥。同氣相求。以搜逐之。癘風醉仙丹通天再造散。用以搜滌毒邪。從

齒縫出。錢氏利驚丸。白餅子皆用之。取痰積從大便  
出。真瞑眩之首推也。

靈砂

甘溫無毒

按胡演丹藥秘訣云。昇靈砂法。用新鍋安逍遙爐上。  
蜜指鍋底。文火下燒。入硫黃二兩。鎔化。投水銀八兩。  
以鐵匙急攪。作青砂頭。如有焰起。噴醋解之。待汞不  
見星。取出細研。盛入水火鼎內。墮泥固濟下。以自然  
火升之。乾水十二盞爲度。取出如束鍼紋者成矣。庚  
辛玉冊云。靈砂有三。以一伏時周天火而成者。謂之

金鼎靈砂。以九度抽添。用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日炒鍊而成者。謂之老火靈砂。並宜桑灰淋醋煮。伏過用之。於硃砂中鍊出者。謂之真汞。尤爲神效。

發明 時珍曰。此以至陽釣至陰。脫陰反陽。故曰靈砂。爲扶危拯急之靈丹。虛陽上逆。痰涎壅盛。頭眩吐逆。喘不得卧。寤不得寐。霍亂反胃。心腹冷痛。允爲鎮墜虛火之專藥。但不可久服。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂。心肺熱鬱。禁用。

雄黃 辛苦溫微毒。武都者良。入香油熬化。或米醋入蘿蔔汁煮乾用。生則有毒傷人。

本經主寒熱鼠瘻。惡瘡疽痔死肌。殺精物惡鬼邪氣。百蟲毒。勝五兵。

發明 雄黃生山之陽。純陽之精。人足陽明經。得陽氣之正。能破陰邪。殺百蟲。辟百邪。故本經所主皆陰邪濁惡之病。勝五兵者。功倍五毒之藥也。其治驚癇痰涎及射工沙蟲毒。與大蒜合搗塗之。同硝石煮服。立吐腹中毒蟲。千金方治疔腫惡瘡。先刺四邊及中。

心以雄黃末傅之。聖惠方治傷寒狐惑以雄黃燒於  
瓶中熏其下部。和劑局方酒癩丸。同蠟尾巴豆治酒  
積痛利。肘後方以雄黃礬石甘草湯。煮治陰腫如斗。  
經驗方以雄黃白芷爲末酒煎。治破傷風腫。家秘方  
以雄黃細研。神麴糊丸。空心酒下四五分。日服無間。  
專消瘡母。急救良方以雄黃五錢麝香二錢爲末。作  
二服酒下。治風狗咬傷。外臺秘要雄黃敷藥。箭毒攝  
生妙用。雄黃硫黃菜豆粉。人乳調傅。酒皸鼻赤。不過  
三五次愈。痘癩證治以雄黃一錢紫草三錢爲末。臘

脂汁調先以銀簪挑破捺痘疔萬氏方治壅瘍漫腫  
色不嫩赤明雄黃細末三分雞子破殼調入飯上蒸  
熟食之重者不過三枚卽消聖濟錄以雄黃豬膽汁  
調敷白禿頭瘡○熏黃治惡瘡疥癬殺蟲蝨和諸藥  
熏嗽千金方有欬嗽熏法

雌黃 辛平有毒

本經主惡瘡頭禿疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒  
發明 雌黃出山之陰故單治瘡殺蟲而不能治驚  
癇疾本經治惡瘡頭禿疥與雄黃之治寒熱鼠



痿迴乎陰陽之分矣。其殺毒蟲蝨身癢較雄黃之殺  
精物惡鬼邪氣解毒辟惡之性則一而功用懸殊。治  
狂癡勝金丹用之。不過借爲搜陰邪之嚮導耳。別錄  
治鼻中瘰肉。不宜久服。令人腦漏。

石膏

辛甘大寒無毒。清胃熱。煨用。治中暍熱生用。

一種微硬有肌理。名理石。主治與粗理黃石相類。

本經主中風寒熱。心下逆氣驚喘。口乾舌焦。不能息。  
腹中堅痛。除邪鬼產乳金瘡。

發明

古人以石膏葛根並爲解利陽明經藥。蓋石

膏性寒。葛根性溫。功用詎可不辯。葛根乃陽明經解肌散寒之藥。石膏爲陽明經辛涼解熱之藥。專治熱病。渴病。大渴引飲。自汗。頭痛。溺澀。便閉。齒浮。面腫。之熱證。仲景白虎湯是也。東垣云。立夏前服白虎。令人小便不禁。降令太過也。今人以此湯治冬月傷寒之陽明證。服之未有得安者。不特石膏之性寒。且有知母引邪入犯少陰。非越脾大青龍小續命。中石膏佐麻黃化熱之比。先哲有云。凡病雖有壯熱而無煩渴者。知不在陽明。切勿誤與白虎。本經治中風寒熱是

熱極生風之象。邪火上衝。則心下有逆氣。及驚喘。陽明之邪熱甚。則口乾舌焦。不能息。邪熱結於腹中。則堅痛。邪熱不散。則神昏譫語。等乎邪鬼。解肌散熱。外泄。則諸證自退矣。卽產乳金瘡。亦是鬱熱蘊毒。赤腫神昏。故可用辛涼以解泄之。非產乳金瘡可泛用也。其金匱越脾湯。治風水惡寒。無大熱。身腫自汗。不渴。以麻黃發越水氣。使之從表而散。石膏化導胃熱。使之從胃而解。如大青龍。小續命等製。又不當以此執泥也。至於三黃石膏湯。又以伊尹三黃。河間解毒加。

入石膏麻黃香豉薑葱。全以麻黃開發伏氣。石膏化導鬱熱。使之從外而解。蓋三黃石膏之有麻黃。越脾青龍續命之有石膏。白虎之加桂枝。加蒼朮。加人參。加竹葉。麥門冬。皆因勢利導之捷法。千金五石丸等方。用以解鍾乳。紫白石英。石脂之熱性耳。別錄治時氣頭痛身熱。三焦大熱。皮膚熱。腸胃中熱。氣解肌發汗。止消渴煩逆。腹脹暴氣。喘息咽熱者。以諸病皆由足陽明胃經邪熱熾盛所致。惟喘息畧兼手太陰病。此藥能散陽明之邪熱。陽明熱邪下降。則太陰肺氣自

寧故悉主之。○粗理黃石破積聚去三蟲千金鍊石散醋煨水飛同白斂鹿角治石癰以火鍼鍼破傳之。

滑石

甘寒無毒色青赤者有毒

本經主身熱洩瀉女子乳難癰閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣。

發明 滑石利竅不獨利小便也。上能散表下利水

道爲蕩熱散溼通利六府九竅之專劑。取甘淡之味以清肺胃之氣下達膀胱也。詳本經諸治皆清熱利竅之義。河間益元散通治表裏上下諸熱解時氣則

以葱豉湯下。催生則以香油漿水調服。暑傷心包則以本方加辰砂末一分。使熱從手足太陽而泄也。惟元氣下陷。小便清利。及精滑者勿服。久病陰精不足。內熱以致小水短少赤澀。雖有泄瀉。皆爲切禁。而本經又言益精氣者。言邪熱去而精氣自復也。

赤石脂 甘酸辛溫無毒。五色石脂並溫無毒。

本經養心氣。明目益精。療腹痛腸澀。下痢赤白。小便利。及癰疽瘡痔。女子崩中漏下。產難胞衣不出。發明 赤石脂功專止血。固下。仲景桃花湯治下利。

便膿血者。取石脂之重。瀉入下焦血分而固脫。乾薑之辛溫。煖下焦氣分而補虛。梗米之甘溫。佐石脂而固腸胃也。火熱暴注。初痢有積熱者。勿用。本經養心氣。明目益精。是指精血脫泄之病而言。用以固斂。其脫則目明精益矣。療腹痛腸澼等疾。以其開泄無度。日久不止。故取瀉以固之也。治產難胞衣不出。乃指日久去血過多無力逆下。故取重以鎮之也。東垣所謂胞衣不出。瀉劑可以下之。設血氣壅滯而胞衣不出。又非石脂所宜也。其白者斂肺氣。澀大腸。金匱風

引湯用之。專取以杜虛風復入之路也。青者入肝。黃者入脾。黑者入腎。總取治崩利水之功。各隨其色而用之。

爐甘石 甘溫無毒

發明 爐甘石得金銀之氣而成。專入陽明經而燥溼熱。目病爲要藥。時珍常用爐甘石煨飛。海螵蛸礬砂等分爲細末。點諸目病皆妙。又煨過水飛。丸如彈圓。多攢簪孔。燒赤。煎黃連汁。淬數次。點眼皮溼爛。及陰囊腫溼。其功最捷。



無名異 甘平無毒

本經主金瘡折傷內損。止痛生肌肉。

發明 無名異本經主折傷內損。今人治打傷腫痛。損傷接骨。又試効方。臨杖預用酒服三五錢。則杖不甚傷。蘇頌醋磨傅腫毒者。亦取活血涼血之功耳。

石鍾乳 甘溫無毒。以甘草紫背天葵同煮。一伏時。杵粉入鉢細研。水飛澄過。再研萬遍。磁器收之。若不經煅煉。服之令人淋。

本經主欬逆。上氣。明目。益精。安五藏。通百節。利九竅。

下乳汁

發明 鍾乳乃山靈陽氣所鍾故瑩白中空純陽通  
達專走陽明氣分若質實色淪必生陰壅不無蛇虺  
之毒誤餌傷人惟產乳源形如鵝鴒管者最勝然性  
偏助陽陰虛之人慎毋輕服內經云石藥之氣悍服  
之令陽氣暴充形體壯盛昧者得此自慶益肆淫泆  
精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之榮衛不從發爲  
淋濁及爲癰疽是果乳石之過歟抑人之自取耶惟  
肺氣虛寒欬逆上氣哮喘痰清下虛脚弱陰痿不起

大腸冷滑精泄不禁等疾。功效無出其右。本經主欬逆上氣者。取其性溫而鎮墜之。則氣得歸元而病自愈。五藏安則精自益。目自明。其通百節利九竅。下乳汁者。皆取甘溫助陽色白利竅之力也。昔人言鍾乳與白朮相反。而千金方每多並用。專取相反之性。激其非常之効。予常親試。未嘗有害。孔公孽。孔竅中通。附垂於石。如木之孽。卽鍾乳之牀。本經利九竅。下乳汁之功。與鍾乳無異。而殷孽卽孔公孽之根。又爲瘡疽癩痔癥瘕溫散結氣之用。惜乎世鮮知者。

石灰 辛温有毒

本經主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌墮肩殺痔蟲去黑子瘰肉。

發明 石灰稟壯火之餘烈故能辟除陰邪溼毒觀本經所主疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌等皆外治之用去黑子者火氣未散性能灼物故能去黑子瘰肉及墮肩也本經雖不言有毒而內服之方從無及此其毒可知寇氏治中風口喎以石灰醋炒調塗左塗右石塗左立便牽正千金治身面疣用苦酒浸石

灰六七日。取汁頻頻滴之。自落。又治溺死之人。用化過細灰裹下部。以滲其水。卽活。又治瘦瘡不合。古塚中石灰厚。傅之。集玄方治面靨疣痣。碱水煮滾。化礦灰。插糯米半入灰中。經宿色變如晶。以鍼微撥動。點少許於上。半日。汁出。剔去藥。不得著水。二日卽愈。便簡方治疥腮腫痛。醋調陳年石灰傅之。肘後方治湯火傷灼。年久石灰油調傅之。又治刀刃金瘡。石灰裹之。卽痛定。血止。但不可著水。著水卽爛肉也。

浮石

一名海石

鹹平無毒。煨過水飛用。

發明 海石乃水沫結成色白體輕故治上焦痰熱止嗽點目翳傳痘癰功效最捷又治諸淋散積塊皆取鹹能軟堅之意消瘦癰結核疝氣然惟實證宜之虛者誤投患亦最速以其性專尅削肺胃之氣也南海有浮水之石沉水之香專取物類之相反以治病氣之阻逆也

陽起石

本經名白石

鹹温無毒色白揉之如綿不脆者

真質堅脆者卽偽煨過燒酒淬七次杵細水飛用

本經主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛

無子陰痿不起補不足。

發明 陽起石乃雲母之根。右腎命門藥。下焦虛寒者宜之。黑錫丹用此。正以補命門陽氣不足也。本經治崩中漏下。陽衰不能統攝陰血也。又言破子藏中血。癥瘕結氣。是指陰邪畜積而言。用陽起石之鹹溫散其所結。則子藏安和。孕自成矣。陰虛火旺者忌用。以其性專助陽也。

慈石

本經名玄石  
俗名煬鐵石

辛。鹹。微寒。無毒。入藥煨過醋淬。

七次研細水飛用。

本經主周痺風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消。除  
大熱。煩滿及耳聾。

發明 慈石爲鐵之母。腎與命門藥也。惟其慈。故能  
引鐵。千金慈石丸。治陰虛龍火上炎。耳鳴嘈嘈。腎虛  
瞳神散大。蓋慈石入腎。鎮養真精。使神水不外移。硃  
砂入心。鎮養心血。使邪火不上侵。耳目皆受陰矣。本  
經主周痺風溼。肢節中痛。洗洗酸消。取辛以通痺。而  
祛散之。重以去怯。而鎮固之。則陰邪退聽。而肢節安  
和。耳目精明。大熱煩滿自除矣。濟生方治腎虛耳聾。



以慈石豆大一塊同煨穿山中末綿裏塞耳中口含  
生鐵一塊覺耳中如風雨聲卽通

代赭石

本經名須丸

苦甘平無毒擊碎有乳形者真火

煨醋淬三次研細水飛用

本經主鬼疰賊風蠱毒腹中毒邪女子赤沃漏下

發明 赭石之重以鎮逆氣入肝與心包絡二經血

分本經治賊風蠱毒赤沃漏下取其能收斂血氣也

仲景治傷寒吐下後心下痞硬噫氣不除旋復代赭

石湯取重以降逆氣滌痰涎也觀本經所治皆屬實

邪卽赤沃漏下。亦是肝心二經瘀滯之患。其治難產胞衣不下。及大人小兒驚氣入腹。取重以鎮之也。陽虛陰痿。下部虛寒。忌之。以其沉降而乏生發之功也。

禹餘糧

本經名曰餘糧。與大乙餘糧功用皆同。

甘平無毒。細研水淘

澄之。勿令有砂土。

本經主欬逆寒熱煩滿。下赤白血閉。癥瘕大熱。鍊飪服之。不饑。輕身延年。

發明 重可以去怯。禹餘糧之重。爲鎮固之劑。手足陽明血分藥。其味甘。故治欬逆寒熱煩滿之病。其性

澀故主赤白帶下前後諸病。仲景治傷寒下利不止。心下痞鞭。利在下焦。赤石脂禹餘糧丸主之。取重以鎮痞逆。瀉以固脫泄也。抱朴子云。禹餘糧丸日再服。三日後令人多氣力。負擔遠行。身輕不饑。卽本經輕身延年之謂。

空青 甘酸大寒無毒

本經主青盲耳聾。明目利九竅。通血脈。養精神。益肝氣。久服輕身延年。

發明 空青感銅之精氣而結。故專入肝。明日本經

主耳目九竅諸病。皆通血脈。養精神。益肝氣之力也。久服輕身延年者。銅性善滌垢穢。垢穢去而氣血清。純母伐天和矣。時珍曰。空青與綠青皆生益州及越。馮山有銅處。東方甲乙是生肝膽。其氣之清者爲肝血。其精英爲膽汁。開竅於目。血者五藏之英。皆因而注之。爲神膽汁。充則目明。減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其氣之清者爲綠。猶肝血也。其精英爲空青之漿。猶膽汁也。其爲治目神藥。蓋亦以類相感耳。但世罕得真醫。亦罕識。以故俗諺有天下有空青人。間無

瞽目之說。不知此雖貴品。銅官始興。涼州高平。饒信等處。一皆有之。出銅坎者。銅質隱隱。內涵空綠。生金穴者。金星粲粲。內涵空青。總取得肝膽之精。靈通空竅之風氣也。予嘗以此驗之。攷之張果玉洞要訣云。空青似楊梅。受赤金之精。甲乙陰靈之氣。近泉而生。故能含潤。然必新從坎中出者。則鑽破中有水。若出曠日久。則乾如珠矣。安有藏久不乾之理。近世必以中空涵漿者爲真。若爾則當名空漿。不當名空青矣。但須驗其中空。內有青綠如珠者。卽真空青。急不可

得綠青可以代用。活法在人可執一乎。

曾青

曾音層其青層層而生故名形如蚯蚓屎者真

酸小寒無毒。

本經主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老。

發明 曾青治目義同空青以其並出銅礦與綠青

同一根源曾青則綠青之祖氣也。古方太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有曾青丸並見古今錄驗方。曾空二青近世絕罕千金云當取崑崙綠代之卽綠青也。

綠青

俗名石綠

微酸小毒

發明 痰在上宜吐之在下宜利之綠青吐風痰眩  
悶取二三錢同龍腦少許調勻以生薄荷汁合酒溫  
服便卧涎自口角流出乃愈不嘔吐而功速故著之

扁青

俗名石青

甘平無毒

本經主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒  
氣利精神

發明

石青走肝磨堅積故本經所主皆肝經積聚

之病時珍用吐風痰研細溫水灌下即吐肝虛易驚

多痰者宜之。形如縮砂者名魚目青。主治與石青無異。

石膽

俗名膽礬

酸辛寒。有毒。產秦州嵩岳及蒲州中條

山。出銅處有之。能化五金。以之制汞則與金無異。

本經主目痛金瘡諸癩瘰。女子陰蝕痛。石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣。

發明 石膽酸辛氣寒。入少陽膽經。性寒收斂。味辛

上行。能涌風熱痰涎。發散風木相火。又能殺蟲。本經

主目痛金瘡癩瘰。取酸辛以散風熱痰垢也。治陰蝕



崩淋寒熱取酸寒以滌溼熱滯火也。又爲咽齒喉痺  
乳蛾諸邪毒氣。要藥涌吐風痰最快。方用米醋煮真  
鴨嘴膽礬末醋調探吐膠痰卽瘥。又治紫白癜風膽  
礬牡蠣粉生研醋調摩之。風犬咬傷膽礬末水服探  
吐蜜調傅之立愈。胃脘蟲痛茶清調膽礬末吐之走  
馬牙疔紅棗去核入膽礬煨赤研末傅之。追出痰涎  
卽愈。百蟲入耳膽礬和醋灌之卽出。千金方也。  
礬石辛熱有毒。久服令人筋攣。煨法以黃泥包炭  
火燒一日一夕乃可用之。惡羊血不入湯液。

本經主寒熱鼠瘻。蝕死肌。風痺。腹中堅癖。邪氣。

發明 時珍云。礞石與砒石相近。性亦相類。但砒石畧帶黃暈。礞石全白。稍有分辨。而古方礞石與礬石常相渾書。二字相似。故誤耳。然礬石性寒無毒。礞石性熱有毒。不可不審。甄權除膈間積氣。冷溼風痺。癢積十年者。仲景云。生用破人心肝。嚴冬以此置水中。則水不冰。其熱毒之性不滅。砒石今藥肆中往往以充礞石。而礞石僅可破積攻痺。不能開痰散結。是以勝金丹截癰丹服之不効者。良由誤用礞石之故。

按王子敬靜息帖言。礬石深是可疑。凡喜服寒食散者。輒發癰毒。故云深可疑也。以其毒烈。乾汞最速。故丹房目爲仙藥。凡山中有礬。則春不生草。冬不積雪。而鼠食則斃。蠶食則肥。物類之宜忌。有不可解者。其特生礬石。有蒼白紫桃花色。金星銀星等類。其毒不異。惟出金穴中者。各握雪礬石。雖溫無毒。與上迥爲不同。

礬石

出信州故  
又名信石

苦辛大熱大毒。色白有黃暈者名

金脚礬。鍊過者曰礬霜。色紅者最劣。不堪入藥。畏棗

豆芽茶冷水入藥醋煮用。或與芽茶同用。或與浸溼生菜豆仁同研以殺其毒。中其毒者以生羊血解之。冷水多灌亦解。若犯火酒必不可救。

發明 砒霜瘡家常用。入口則吐利兼作吐後大瀉。則與菜豆湯飲之。砒性大毒。誤食必死。奈何以必死之藥治必不死之病。豈不殆哉。然狂癡之病。又所必需。勝金丹用之。無不應者。枯痔散與天靈蓋同用。七日痔枯自落。取熱毒之性以枯及肉。天靈蓋以透骨髓。散宿垢長肌肉也。

礞石

辛鹹平無毒色青者入肝力勝色黃者兼脾

次之硝石煨過杵細水飛用

發明 青礞石厥陰之藥其性下行治風木太過來

制脾土氣不運化積滯生痰壅塞膈上變生風熱諸

病故宜此藥重墜以下泄之使木平氣下而痰積通

利諸證自除矣今人以王隱君滾痰丸通治諸痰怪

證不論虛實寒熱槩用殊爲未妥不知痰因脾胃不

能運化積滯而生膠固稠粘者誠爲合劑設因陰虛

火炎煎熬津液凝結成痰如誤投之則陰氣愈虛陽

火彌熾。痰熱未除。而脾胃先爲之敗矣。况乎脾胃虛寒。食少便溏者得之。泄利不止。禍不旋踵。若小兒多變。慢脾風證。每致不救。可不慎歟。

花乳石

一名花藥石

酸辛溫無毒。出陝華諸郡。色黃中

有淡白點。以此得名。又代州山谷中有五色者。制法以花乳石五兩。同硫黃二兩。入煬成罐內。鹽泥固濟。加頂火煨過。研細水飛用。

發明 花乳石產硫黃山中。其性大溫。厥陰血分藥也。葛可久治虛勞吐血。有花藥石散。以其性溫。善散

癥結也。和劑局方治金刃箭傷打撲垂死。外有損處。以煨過細末。搽傷處。血化黃水。再搽卽活。如內有損。血入藏府。煎童子小便入酒少許。調灌一錢七。立効。婦人產後惡血衝心。昏暈不省。或胎死腹中。胞衣不下。致死。但心胸溫暖者。急以童便調灌一錢。取下惡血。卽安。若膈上有血化爲黃水。卽時吐出。或隨小便出。甚效。但陰虛火炎中無癥積者。誤用必殆。

河沙 微寒無毒

發明。河沙得水土之氣。故夏月發癡子。通石淋。主

絞腸沙痛用沙炒熱冷水淬之燈清服效又風溼頑痺不仁筋骨攣縮六月取河沙曝熱伏坐其中冷卽易之取微汗忌風冷勞役不過數次愈其玉田沙夏月發麻疹良

石燕

甘寒無毒

發明 石燕出祈陽西北江畔砂灘上形似蚪而小堅重於石俗云因雷雨則自石穴中出隨雨飛墮者妄也其性寒涼乃利竅行溼熱之物故能療眼目障翳磨水不時點之熱淋煮汁飲之婦人難產兩手各



執一枚卽下。然不若磨汁飲之。僅似有理。

石蟹

鹹寒無毒

發明 石蟹生南海。近海州郡皆有之。體質石也。與蟹相似。或言崖州榆林港內土極細。最寒。蟹入不能運動。片時成石。亦妄言也。其性鹹寒。質堅。能磨翳積。故青盲目。淫膚翳。丁翳。漆瘡。皆水磨點塗。催生下胎。療熱極血暈。熱水磨服。

蛇黃

溫微毒

發明

蛇黃生蛇腹中。如牛黃之類。世人因其難得。

遂以蛇含石醋煨水飛代之取蛇之性竄入肝也蛇含石入手足厥陰血分與代赭之性不甚相遠爲小兒鎮攝驚癇之重劑脾風泄瀉者宜之

霹靂石

卽雷

溫無毒

發明 雷欂稟東南木火之氣治小兒驚癇磨汁服之作枕辟惡夢不祥鎮邪癘刮屑殺瘵蟲下蠱毒置箱簣不生蛙蟲佩之安神治驚邪之疾

鹵石部

食鹽

鹹寒無毒

本經主結熱喘逆胸中痞令人吐。

發明 鹹走腎走血。腎病血病人無多食鹽。以血得鹹則凝也。補腎藥用之。不過借爲引導耳。乾霍亂及臭毒頭疼腹痛。多用鹽水吐之。本經所主結熱喘逆者。以鹹能下氣。過鹹則引涎水聚於膈上而涌之也。好食鹹者人多黑色。耗血之驗也。病水腫忌食。以其走腎助邪水之逆滿也。千金治妊婦橫生逆產。先露手足以鹽摩產婦腹。并塗兒手足。急以爪搔之。卽縮入。而正產。又殺蠱毒。凡水蛭蚯蚓得鹽卽化爲水。毒蟲

螫者以鹽擦之其毒卽解鹽之味鹹性降下氣最速  
治下部躡瘡吐胸中痰瀝止心腹卒痛不可多食傷  
肺喜欬扁鵲云能除一切大風痛炒熟熨之今人救  
朱魚噉雷電暴雨欲死但口微動者速將鹽少許調  
水貯魚於中時時微動其水卽活鱗尾有損處以鹽  
塗之卽生出鹽爲水之精專得涵養之力也今人食  
暴雨潦水腹脹以鹽湯探吐卽安其解水毒可知

戎鹽

名石鹽俗名青鹽與光明鹽同類

鹹寒無毒

本經上明目口痛益氣堅筋骨去毒蠱

發明 戎鹽稟至陰之氣凝結而成不經煎鍊生涯  
淡之陰功專走血入腎治目中瘀赤昏澁金匱茯苓  
戎鹽湯治小便不通取其補腎利膀胱也又能固齒  
明目治目痛益氣堅筋骨一皆補腎之力本經首主  
明目目痛是熱淫於內治以鹹寒又言去毒蠱者鹹  
能與堅蠱毒邪氣不能浮長矣

鹵鹼

石鹼名

苦鹹微寒無毒

本經主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚

發明 鹼味鹹性走故能消痰磨積祛熱煩蠱毒消

渴屬實熱者宜之。肌膚粗者以湯洗之。頑皮漸退。是卽柔肌膚之謂也。○水鹼乃竈灰淋湯沖銀腳脚所造。性能發麩。故麩舖中無不用之。病人食之多發浮腫。故方後每忌溼麩。觀其善滌衣垢。尅削可知。

凝水石

卽寒水石

辛鹹寒無毒。近世真者絕不易得。欲

真偽合之卽化爲真。否卽是偽。石膏亦名寒水石。與此不同。

本經主身熱腹中積聚邪氣。皮中如火燒煩滿。發明寒水石生積鹽之下。得陰凝之氣而成鹽之。

精也。治心腎積熱之上藥。本經治腹中積聚。鹹能軟  
堅也。身熱皮中如火燒。鹹能降火也。金匱風引湯局  
方紫雪皆用以治有餘之邪熱也。如無真者。戎鹽玄  
精石皆可代用。總取鹹寒降泄之用耳。

玄精石 辛鹹寒無毒青白龜背者良

本經除風冷邪氣。溼痺益精氣。

發明 玄精石稟太陰之精。與鹽同性。故其形皆六  
出象老陰之數也。本經言味鹹氣溫。傳寫之誤。其氣  
寒而不溫。其味辛鹹。沉降同。硫黃硝石治上盛下虛。

收陽助陰。有扶危拯逆之功。來復丹用之。專取一陽來復之義。寒因寒用。深得本經諸治之奧。

朴硝。辛苦鹹寒。有毒。黃者傷人。赤者殺人。入藥必取白者。以水煎化。澄去滓。入萊菔自然汁同煮。傾入盆中。經宿結成。如冰。謂之盆硝。齊衛之硝。上生鋒芒。謂之芒硝。川晉之硝。上生六稜。謂之牙硝。取芒硝再三。以萊菔汁煉去鹹味。懸當風處。吹去水氣。輕白如粉。謂之風化硝。以芒硝牙硝同萊菔汁甘草煎過。舂罐昇煨。謂之玄明粉。



本經主五藏積熱。胃脹閉滌。蓄結飲食。推除致新。除

邪氣。

向錯簡在硝石條內。今正之。詳治五藏等證。皆熱邪固積。決非硝石所能。

發明

熱淫於內。治以鹹寒。堅者以鹹。溼者以

寒。消之。不出。本經推陳致新之妙。用仲景大陷胸湯。大承氣湯。調胃承氣湯。皆用芒硝。稟堅去實。且帶微辛。所以走而不守。若熱結不至堅者。不可輕用小兒赤遊風。以硝傾湯中。取布蘸溼拭之。

玄明粉

御藥院方名白龍粉

辛甘微寒無毒

發明

玄明粉用芒硝煨過多。遍佐以甘草。緩其鹹

寒之性。川治膈上熱痰。胃中實熱。腸中宿垢。非若芒硝之力峻傷血也。然脾胃虛寒。及陰虛火動者。慎勿輕用以取虛虛之咎。

風化硝

甘鹹寒無毒

發明 風化硝甘緩輕浮。故治上焦心肺痰熱。而不致於泄利者宜之。并治經絡之痰溼。但重著而非痠痛者用之有效。指迷茯苓丸治痰溼流於肩背之陽位而隱隱作痛。最爲合劑。然惟體肥氣實者爲宜。眼臉赤腫。和人乳點之。

硝石

即硝

辛苦鹹溫有毒溶化投甘草結定取用

本經主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖能

化七十二種石

諸家本草皆錯簡在朴硝條內  
詳化七十二種石豈朴硝能之

發明 煇硝屬火其性上升能破積散堅治諸寒熱

交錯之病升散三焦火鬱調和藏府虛寒除寒熱邪

氣逐六府積熱不出本經主治也別錄言天地至神

之物能化七十二種石抱朴子亦云能消柔五金化

七十二石其錯簡可知與硫黃同用卽配偶二炁均

調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之病蓋硫黃

性煖而利其性下行。硝石性煖而散其性上行。一升。一降。此制方之妙也。

**鹵砂** 鹹苦辛熱有毒。醋煮乾。刮下用。番禺者良。畏酸漿水。忌羊血。中其毒者。生菜豆研汁恣飲解之。發明 鹵砂大熱。乃鹵液所結。乘陰毒之氣。含陽毒之精。破積攻堅。無出其右。故能治噎膈反胃積塊肉癥。其性能柔金銀。故錐藥用之。所言化人心爲血者。甚言其迅利也。外用治惡肉。除疣贅。去鼻中瘰肉。最捷。但不可過用。用過急。以甘草湯洗之。觀金銀有僞。

投礪砂罐中。悉能消去。况人腹中有久積死胎。豈不腐潰。但其性毒烈。苟有生機。慎勿輕試。

蓬砂

一名鵬砂

甘微鹹。無毒。甘草湯煮化。微火炒。鬆用。

發明

蓬砂味甘微鹹。氣溫色白而質輕。能去胸膈

上焦之實熱。素問云。熱淫於內。治以鹹寒。以甘緩之。是也。其性能柔五金而去垢膩。故主痰嗽喉痺。破癥結。治噎膈積聚。骨鯁結核惡肉。取其能柔物也。含化。蒸津。治喉中腫痛。膈上痰熱。取其能散腫也。眼目障翳。口齒諸病。用之。取其能滌垢也。昔人治骨鯁百計。

不下取含燕汁脫然如失此軟堅之徵也

石硫黃 酸鹹大熱有毒以萊菔挖空入硫黃蒸熟用或入豆腐中煮七次用或醋煨用或豬臟中刺用各隨本方硫是礬之液礬是鐵之精磁石是鐵之母故鍼砂磁石銅入硫黃立成些粉硫能乾汞見五金而黑得水銀則赤也

本經主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿

發明 硫黃稟純陽之精賦大熱之性助命門相火不足寒鬱火邪胃脘結痛脚冷痿弱者宜之其性雖

熱而能疎利大腸與燥澀之性不同。但久服傷陰。大腸受傷。多致便血。傷寒陰毒。爪甲純青。火焰散。屢奏神功。陰水腹脹。水道不通。金液丹服之。卽効。本經治陰蝕疽痔。乃熱因熱用。以散陰中蘊積之垢熱。但熱邪亢盛者。禁用。又言堅筋骨者。取以治下部之寒溼。若溼熱痿痺。良非所宜。人身陰常不足。陽常有餘。苟非真病虛寒。胡可服此毒熱類。按有久服硫黃人。漸縮小之例。石頑親見李堯古服此數年。臨終縮小如七八歲童子狀。正內經所謂熱則骨消筋緩是也。

礬石 酸澀微寒無毒。明如鵬砂。起橫櫛者名馬齒。礬石最勝。生用煨用各隨本方。生者多食。破人心肺。本經主寒熱洩利白沃。陰蝕惡瘡。目痛。堅骨齒。發明 白礬專收溼熱。固虛脫。故本經主寒熱泄利。蓋指利久不止。虛脫滑泄。因發寒熱而言。其治白沃。陰蝕惡瘡。專取滌垢之用。用以洗之。則治目痛。漱之。則堅骨齒。弘景曰。經云。堅骨齒。誠爲可疑。以其性專入骨。多用則損齒。少用則堅齒。齒乃骨之餘也。爲末去鼻中瘰肉。其治氣分之痰。溼癰腫。最捷。侯氏黑散。



用之使藥積腹中。以助悠久之功。故蠟礬丸以之爲君。有人遍身生瘡如蛇頭。服此而愈。旣權生。含嚙津。治急喉痺。皆取其去穢之功也。若溼熱方熾。積滯正多。誤用收瀉爲害不一。岐伯言久服傷人骨。凡陰虛咽痛。誤認喉風。陰冷腹痛。誤認臭毒。而用礬石。必殆。

綠礬

一名皂礬

酸寒無毒

發明 皂礬專除垢膩。同蒼木酒麴醋丸。治心腹中滿。或黃腫如土色甚。効蓋礬色綠。味酸。燒之則赤。用以破血分之瘀積。其効最速。金匱治女勞黑瘰。硝石

礬石丸專取皂礬以破瘀積之血緣其未經註明嘗有誤用白礬瀉收殊味此理又婦人白沃經水不利子藏堅癖中有乾血白物用礬紅杏仁蜜丸納陰中日一易之

山草部

甘草

一名國老

甘平無毒反海藻大戟甘遂芫花補土散表灸用瀉火解毒生用中心黑者有毒勿用

本經主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力解金瘡腫毒

發明 甘草氣薄味厚。升降陰陽。大緩諸火。生用則氣平。調脾胃虛熱。大瀉心火。解癰腫。金瘡諸毒。灸之則氣溫。補三焦元氣。治藏府寒熱。而散表邪。去咽痛。緩正氣。養陰血。長肌肉。堅筋骨。能和衝脈之逆。緩帶脈之急。凡心火乘脾。腹中急痛。腹皮急縮者。宜倍用之。其性能緩急。而又協和諸藥。故熱藥用之。緩其熱。寒藥用之。緩其寒。寒熱相兼者。用之。得其平。本經治藏府寒熱邪氣。總不出調和胃氣之義。仲景附子理中用甘草。恐僭上也。調胃承氣用甘草。恐速下也。皆

緩之之意。小柴胡有黃芩之寒。人參半夏之溫。而用甘草則有調和之意。炙甘草湯治傷寒脈結代心動悸。渾是表裏津血不調。故用甘草以和諸藥之性。而復其脈。深得攻補兼該之妙用。惟土實脹滿者禁用。而脾虛脹滿者必用。蓋脾溫則健運也。世俗不辨虛實。一見脹滿便禁甘草。何不思之甚耶。凡中滿嘔吐。諸溼腫滿。酒客之病。不喜其甘。藻戟遂蕤與之相反。亦迂緩不可救。昏昧耳而胡洽治痰癖。以十棗湯加甘草大戟。乃痰在膈上。欲令通泄以拔病根也。古方

有相惡相反並用。非妙達精微者不知此理。其稍去  
莖中痛節解癰疽毒條草。生用解百藥毒。凡毒遇上  
則化。甘草爲九土之精。故能解諸毒也。千金方云。甘  
草解百藥毒。如湯沃雪。有中烏頭巴豆毒。甘草入腹  
卽定。驗如反掌。方稱大豆解百藥毒。予每試之不效。  
加甘草爲甘豆湯。其驗甚捷。嶺南人解蠱。凡飲食時  
先用炙甘草一寸嚼之。若中毒隨卽吐出。

黃耆 甘溫無毒。入益氣藥。灸用。入解表及托裡藥  
生用。肥潤而軟者良。堅細而枯者。食之令人胸滿。

本經主癰疽久敗排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。

發明 黃耆甘溫。氣薄味厚。升少降多。陰中陽也。能補五藏諸虛。入手足太陰手陽明少陽。而治脈弦自汗。瀉陰火去肺熱。無汗則發。有汗則止。入肺而固表。虛自汗。入脾而托已潰癰瘍。本經首言癰疽久敗。排膿止痛。次言大風癩疾。五痔鼠瘻。皆用生者。以疏衛氣之熱性。雖溫補而能通調血脈。流行經絡。可無擬於壅滯也。其治氣虛盜汗自汗。及皮膚痛。是肌表之

藥治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒。尺脈不至。補  
腎藏元氣不足。及嬰兒易感風邪發熱。自汗諸病。皆  
用灸者。以實衛氣之虛。乃上中下內外三焦藥。卽本  
經補虛之謂。如痘疹用保元湯。治脾肺虛熱。當歸補  
血湯。治血虛發熱。皆爲聖藥。黃耆同人參。則益氣同  
當歸。則補血。同白朮防風。則運脾溼。同防己。防風。則  
祛風溼。同桂枝附子。則治衛虛亡陽汗不止。爲腠理  
開闔之總司。又黃耆性專實衛。溫補下元。而當歸補  
血湯。另不用地黃之屬。反用此三倍於歸。其義何居。

蓋陰血之虛而發熱。明係陽從陰亢。自必峻用陰中  
之陽藥爲君。兼當歸引入血分。自然陽生陰長。陰邪  
退聽而亢熱除矣。若用純陰滋膩。徒資膠滯。熱無由  
而散也。是須黃耆固護其營。不使重奪其汗。而陰自  
守熱自除矣。昔人言無汗不得用黃耆。服之令人胸  
滿。此指表實形瘦色蒼。胸中氣盛者而言。若衛氣虛  
衰之人感寒。雖用表藥。多不能作汗。須用黃耆建中  
之屬。始得汗解。不可拘於俗見而廢聖法也。唐許胤  
宗治柳太后病風不能言。脈沉而口噤。乃造黃耆防



風湯數斛置於牀下。氣如烟霧。一夕便得語也。此義惟玉屏風散得之。黃耆性畏防風。然得防風其功愈大。葢相畏而相使者也。

人參

古作  
稜

甘苦微溫無毒。產高麗者良。反藜蘆畏。鹵鹽陰虛火炎欬嗽喘逆者。青鹽製之。

本經補五藏。安精神。定僇。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服輕身延年。

發明

人參甘溫。氣薄味厚。陽中微陰。能補肺中元

氣。肺氣旺。四藏之氣皆旺。精自生。而形自盛。肺主諸

氣故也。古人血脫益氣。蓋血不自生。須得補陽氣之藥。乃生。陽生則陰長。血乃旺耳。若單用補血藥。血無由而生也。素問言無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。故補氣必用人參。補血須兼用之。仲景言病人汗後身熱。亡血脈沉遲。下利身涼。脈微血虛。並加人參。蓋有形之血。未能卽生。希微之氣。所當急固。無形生有形也。丹溪言虛火可補。參耆之屬。實火可瀉。芩連之屬。後世不察。槩謂人參補火。謬矣。夫火與元氣。勢不兩立。正氣勝則邪氣退。人參既補元氣。又補邪火。

是反復之小人矣。又何與甘草茯苓白朮爲四君子耶。凡人面白而黃面青鰲悴者皆脾肺腎氣不足。可用也。面赤面黑者氣壯神強不可用也。脈浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濡弦細微弱結代或右手關部無力皆可用也。若弦強緊實滑數洪盛長大有力或右手獨見脈實皆火鬱內實不可用也。潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也。若腎虛氣短喘促者必用也。仲景謂肺寒而嗽勿用者寒束熱邪壅滯在肺之嗽也。若自汗惡寒而嗽者必用也。東垣謂久病鬱

熱在肺勿用者。乃火鬱於內。宜發不宜補也。若肺虛火旺。氣短自汗者。必用也。丹溪言諸痛不可驟用者。乃邪氣方銳。宜散不宜補也。右裡虛吐利及久病胃弱。虛痛喜按者。必用也。節齋謂陰虛火旺吐血。勿用者。乃血虛火亢。能食脈強。服人參則陽愈旺。陰愈消。未有不引血大脫也。若自汗氣短。肢寒脈虛者。必用也。古今治勞。莫過於葛。可久。其獨參湯。保真湯。未嘗廢人參。而不用。惟麻疹初發。身發熱而斑點未形。傷寒始作。證未定。而熱邪方熾。不可用耳。喻嘉言曰。傷

寒有宜用人參入藥者。發汗時元氣大旺。外邪乘勢而出。若元氣素弱之人。藥雖外行。氣從中餒。輕者半出。不出留連致困。重者隨元氣縮入。發熱無休。所以虛弱之人。必用人參入表藥中。使藥得力。一湧而出。全非補養之意。卽和解藥中有人參之大力。居間外邪遇正。自不爭而退舍。亦非偏補一邊之意。而不知者。謂傷寒無補。邪得補。爛熾斷不敢用。而市井愚夫。乃交口勸病人不宜服參。醫者又避嫌遠謗。一切可生之機。悉置之不理。殊失木經除邪氣之旨矣。古今

諸方表汗用參蘇飲敗毒散和解用小柴胡解熱用  
白虎加人參湯竹葉石膏湯攻下用黃龍湯領人參  
深入驅邪卽熱退神清從仲景至今明賢方書無不  
用人參何爲今日醫家屏絕不用以阿諛求容全失  
一脈相傳宗旨殊不知誤用人參殺人者皆是與黃  
耆白朮乾薑當歸肉桂附子同行溫補之誤所致不  
與羌獨柴前芎半枳桔等同行汗和之法所致也安  
得視人參爲砒鴆刀刃固執不用耶又痘疹不宜輕  
用人參者青乾紫黑陷血熱毒盛也若氣虛頂陷色

白皮薄泄瀉漿清必用也。故博愛心鑑治痘以保元湯爲要藥。人參得升麻補上焦之氣。瀉中州之火。得茯苓補下焦之氣。瀉腎中之火。東垣交泰丸用人參皂莢是惡而不惡也。治月閉用四物加人參五靈脂是畏而不畏也。痰在胸膈以人參藜蘆同用而取涌越。是激其怒性也。惟右手獨見脈實者爲肺經本有火。故不宜用。若右手虛大而嗽者。雖有火邪。此爲虛火上炎。腎水不足。乃刑金之火。非肺金之火。正當以人參救肺。但須多用。方始得力。若少用。必增脹滿。本

經言安五藏定魂鬼止驚悸明目開心益智者以藏氣安和心神寧定當無驚悸昏昧之慮矣其除邪氣者以甘溫之力協諸表藥助胃祛邪譬諸坐有君子則小人無容身之地矣繆子經疏云人參論其功能之廣如本經所說信非虛語第其性亦有所不宜世之錄其長者或遺其短摘其瑕者并棄其瑜是以或當用而後時或非宜而罔投或蒙其利反見其害二者之誤其失則一使良藥不見信於世粗工互騰其口說豈知人參本補五藏真陽之氣者也若夫虛羸



疴怯勞役饑飽所傷。努力失血。以致陽氣短乏。陷入陰分。發熱倦怠。四肢無力。或中暑傷氣。氣無以動。或嘔吐泄瀉。霍亂轉筋。胃弱不食。脾虛不磨。或真陽衰少。腎氣乏絕。陽道不舉。或中風失音。產後氣喘。小兒慢驚。痘後氣虛。潰瘍長肉等證。投之靡不立效。惟不利於肺家。有熱欬吐痰。吐血衄血。骨蒸勞瘵。陰虛火動之候。蓋肺者清肅之藏。真氣無虧。則寧謐清淨。以受生氣之熏蒸。而朝百脈。苟縱恣情欲。虧損真陰。火空則發熱起於下。火燠乎上。則肺先受之火。乃肺

之賊邪邪氣勝則實實則肺熱鬱結爲痰嗽癢而血  
熱妄行溢出上竅。王好古所謂肺熱還傷肺是也。若  
誤投之鮮克免者。此皆實實之誤。於人參何咎哉。○  
產山西太行山者。名上黨人參。雖無甘溫峻補之功。  
却有甘平清肺之力。亦不似沙參之性寒專泄肺氣  
也。○參蘆能耗氣。專入吐劑。涌虛人膈。上清飲宜之。  
鹽哮用參蘆涌吐最妙。參蘆涌吐。參鬚下泄。與當歸  
紫苑之頭止血。身和血。尾破血之意不殊。參鬚價廉。  
貧乏之人往往用之。其治胃虛嘔逆。欬嗽失血等證。

亦能獲效。以其性專下行也。若治久痢滑精崩中下血之證。每致增劇。以其味苦降泄也。其蘆世罕知用。惟江右人稱爲竹節參。近日吾吳亦有。用之者。其治瀉利膿血崩帶精滑等證。俱無妨礙。如氣虛火炎喘嘔嗽血。誤用轉劇。昔人用以涌吐者。取其性升而於補中寓瀉也。此義前人未發。因屢驗而筆之。

**沙參** 甘淡微寒無毒。有南北二種。北者質堅性寒。南者體虛力微。反藜蘆。

本經主血結驚氣除寒熱補中益肺氣。

發明 沙參專泄肺氣之熱。故喘嗽氣壅小便赤澀。不利。金受火尅。陰虛失血。或喘欬寒熱及肺痿等疾。宜之。本經主血結驚氣者。因驚氣入心。心包熱鬱而血結也。除寒熱者。鬱熱解而寒熱除也。補中益肺氣者。用以清理肺胃之虛熱。則津液復而正氣受益矣。潔古言肺寒用人參。肺熱用沙參。好古言沙參性寒。補五臟之陰。總未達輕虛泄熱之義也。衛生方治肺熱欬嗽。沙參一味。水煎服之。肘後方治卒然心痛。自汗欲死。沙參爲末。酒服立瘥。證治要訣治婦人白帶。

沙參爲末米飲服之。蓋沙參專開肺氣。肺氣清則木邪散而疝自除。帶自愈矣。時珍云。人參甘苦而溫。其體重實。專補脾胃元氣。因而益肺與腎。故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒。其體輕虛。專清肺氣。因而益脾與腎。故金受火尅者宜之。此卽本經補中益肺氣之謂。一補陽而生陰。一補陰而制陽。不可不辨。

桔梗

本經名  
薺芫

辛甘苦微溫無毒。甘者爲薺芫。苦者

爲苦梗。咬之腥澆者爲木梗。不堪入藥。

本經主胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐悸氣。

發明 桔梗上升清肺氣利咽喉爲肺部引經又能  
開發皮膚故與羌獨柴胡薄荷蘇輩同爲解表藥與甘  
草同爲舟楫之劑諸藥有此一味不能下沉也傷寒  
邪結胸脇則痛如刀刺邪在中焦則腹滿腸鳴幽幽  
辛甘升發苦淡降泄則邪解而氣和矣其主驚恐悸  
氣者心脾氣鬱不舒用以升散之也朱肱用桔梗治  
胸中痞滿總不出本經主治仲景治寒實結胸同貝  
母巴豆取其溫中消穀破積也治肺癰唾膿血用桔  
梗甘草取排膿而清濁氣也治少陰證二三日咽痛

用甘桔湯取其調寒熱通陰氣也。千金方治喉痺毒氣。桔梗二兩。水煎頓服。加甘草連翹。荆防名如聖湯。通治咽喉諸病。桔梗有甘苦二種。甘者曰薺。芫。千金治強中爲病。莖長與發不交。精出取其能升解熱邪於上也。又乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中。亦宜甘以潤之。痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸。則宜苦以開之。甘升而苦降也。此藥升降諸氣。能入肺使諸氣下降。俗泥爲上升而不能下行。失其用矣。痘疹下部不能起發爲之切忌。以其性升能阻藥力於上。不得下。

達也。惟陰虛久嗽不宜用。以其通陽泄氣也。其蘆吐  
膈上風熱實痰。生研末。白湯調服。二三錢。搽吐之。

黃精

甘平無毒。勿誤用鈎吻。鈎吻卽野葛。葉頭尖

有毛鈎子。又名斷腸草。誤服殺人。黃精則莖紫花黃。  
葉似竹葉也。

發明 黃精爲補黃宮之勝品。寬中益氣。使五藏調  
和。肌肉充盛。骨髓堅強。皆是補陰之功。但陽衰陰盛  
人服之。每致泄瀉。痞滿。不可不知。

葳蕤

本經名女萎  
又名玉竹

甘平無毒。肥白者良。入發散風



熱藥生用入補藥。蜜水拌飯上蒸熟用。

本經主中風暴熱不能動。搖跌筋結肉諸不足。久服去面黑點。好顏色。潤澤輕身不老。

發明 萎蕤甘潤性平。滋肺益腎。補而不壅。善調厥陰。久築之風。故本經治中風暴熱等病。皆取其養正祛邪之力也。別錄主心腹結氣。虛熱腰痛。莖中寒目痛。皆爛淚出。甄權主內補不足。去虛勞客熱。頭痛不安。千金治風溫自汗身重。語言難出。萎蕤湯以之爲君。其源本諸麻黃升麻湯。深得仲景之奧。時珍用治

虛勞寒熱痞瘡不足之證用代參者不寒不燥大有  
殊功不止於去風熱溫毒而已又主小便卒淋發熱  
口乾眼黑頭眩目赤澀痛其性雖潤而無傷犯脾胃  
奪食泄瀉之虞但其性之緩耳

知母 苦甘寒無毒肥白者良鹽酒炒用

本經主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益  
氣

發明 知母沉降入足少陰氣分及足陽明手足太  
陰能瀉有餘相火理消渴煩蒸仲景白虎湯酸棗湯

皆用之下則潤腎燥而滋陰。上則清肺熱而除煩。但外感表證未除。瀉痢燥渴忌之。脾胃虛熱人誤服。令人作瀉減食。故虛損大忌。近世誤爲滋陰。上劑勞瘵神丹。因而天枉者多矣。本經言除邪氣肢體浮腫。是指溼熱水氣而言。故下文云。下水補不足益氣。乃溼熱相火有餘。燦灼精氣之候。故用此清熱養陰。邪熱去則正氣復矣。

肉蓯蓉

甘鹹微溫無毒。酒洗去甲及腐。切片焙用。

本經主五勞七傷。補中除羸。中寒熱。痛養五藏。強陰。

益精氣多子。婦人癥瘕。

發明 肉蓯蓉與瓊陽總是一類。味厚性降。命門相火不足者宜之。峻補精血。驟用反動。大便滑泄。本經主勞傷補中者。是火衰不能生土。非中氣之本虛也。治婦人癥瘕者。鹹能更堅而走血分也。又蓯蓉止洩。精遺瀝。除莖中寒熱痛。以其能下導虛火也。鎖陽治腰膝軟弱。以其能溫補精血也。總皆滋益相火之驗。老人燥結宜煮粥食之。但胃氣虛者服之。令人嘔吐泄瀉。強陽易興而精不固者忌之。

天麻

本經名離母一名定風草莖名赤箭

辛平微溫無毒溼紙裏煨

熟切片用

木經主殺鬼精物。蠱毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。發明。天麻味辛濃厚。性升屬陽。爲肝家氣分藥。故肝虛不足。風從內生者。天麻芎藭以補之。諸風掉眩。眼黑頭旋。風虛內作。非天麻不治。小兒驚痰。風熱服天麻卽消。天麻乃定風草。久服則遍身發出紅斑。是驅風之驗也。按天麻性雖不燥。畢竟風劑。若血虛無風。火炎頭痛。口乾便閉者。不可妄投。本經言殺鬼精。

物蠱毒惡氣者以其能定風鎮八方之邪氣也久服益氣力長陰肥健者其性屬陽陽生則陰長也

白朮

一名山萹

甘溫無毒。雲朮肥大氣壅。台朮條細

力薄。寧國狗頭朮皮赤稍大。然皆栽灌而成。故其氣濁。不若於潛野生者。氣清無壅滯之患。○入諸補氣藥。飯上蒸數次。用入肺胃久嗽藥。蜜水拌蒸入脾胃。痰溼藥。薑汁拌晒入健脾藥。土炒入瀉痢虛脫藥。炒存性用入風痺痰溼利水破血藥。俱生用。然非於潛產者不可生用也。

本經主風寒溼痺死肌癰疽止汗除熱消食作煎餌  
久服輕身延年不饑

發明 白朮甘溫味厚陽中之陰可升可降入脾胃  
二經生用則有除溼益燥消痰利水治風寒溼痺死  
肌癰疽散腰臍間血及衝脈爲病逆氣裡急之功製  
熟則有和中補氣止渴生津止汗除熱進飲食安胎  
之効木經主風寒溼痺死肌癰疽者正以風寒溼三  
者合而成痺痺者拘攣而痛是也經曰地之溼氣感  
則害人皮肉筋骨死肌者溼毒侵肌肉也癰者風寒

乘虛客於肝脾腎經所致也。疸者脾胃虛而溼熱瘀滯也。如上諸證莫不由風寒溼而成。朮有除此三者之功。故能祛其所致之疾也。止汗除溼進食者溼熱盛則自汗溼邪客則發熱溼去則脾胃燥燥則食自消汗自止熱自除矣。又主大風在身而風眩頭痛目淚出消痰水逐皮膚間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津煖胃消穀嗜食得參苓大補中氣得枳橘健運飲食。本經言消食作煎餌留其滓以健運脾氣食自化矣。仲景五苓散祖素問



澤木麋銜湯。並用生者。但彼兼麋銜以統血。則汗自止。此兼桂枝以通津。則渴自除。潔古枳朮丸。祖金匱枳實湯。彼用生者以健胃。則逆滿自愈。此用熟者以助脾。則飲食自強。且以荷葉裹飯爲丸。取清震之氣。以鼓灶運之力也。蓋白朮得中宮沖和之氣。補脾胃藥以之爲君。脾土旺則清氣升而精微上。濁氣降而糟粕輸。仲淳有云。白朮稟純陽之上氣。除邪之功勝。而益陰之效虧。故病屬陰虛血少精不足。內熱骨蒸。口乾唇燥。欬嗽吐痰吐血。鼻衄齒衄。便閉滯下者。法

咸忌之。木燥腎而閉氣。肝腎有動氣者。勿服。劉涓子云。癰疽忌白朮。以其燥腎而閉氣。故反生膿作痛也。凡藏皆屬陰。世人但知白朮能健脾。寧知脾虛而無溼邪者。用之反燥脾家津液。是損脾陰也。何補之有。此最易誤。故特表而出之。

蒼朮

本經名  
山薊

苦辛溫無毒。產茅山者味甘。形瘦多

毛最良。吳郡諸山者次之。楚中大塊辛烈氣燥者爲下。製用糯米泔浸。刮去皮切片。同芝麻炒。或麻油炒。通黃去焦末。或去皮切片。蜜水拌飯上蒸用。又白露

後以泔水淨置屋上晒露一月謂之神木。

本經主風寒溼痺死肌癰疽。

發明 蒼朮辛烈性溫而燥。可升可降。能徑入諸經。疎泄陽明之溼而安太陰。辟時行惡氣。因經泔浸炒。故能除上溼發汗。與白朮止汗則異。腹中窄狹者須之本經治風寒溼痺死肌癰疽等證。總取性專開腠。故能發汗而去風寒溼氣。祛溼而去死肌癰疽。下氣而消痰食飲癖。又能總解諸鬱。佐以香附快氣之藥。下氣最速。一升一降則鬱散而氣平也。脾精不禁淋。

濁不止。腰背痠疼。用以飲脾津。津生於穀氣也。同黃  
蘗爲二妙。治下部溼熱。疼腫。又蒼朮一味。麻油製過。  
爲末。煮大棗肉爲丸。治脇下飲滯。許叔微患飲滯三  
十年。始因少年夜坐寫文。左向伏几。是以飲食多墜  
左邊。飲酒止。從左下有聲。脇痛。食減。嘈雜。飲酒半杯。  
卽止。十數日。必嘔酸水。暑月。左半身絕無汗。服雄附  
礬石。牽牛。遂戟等。皆無効。自揣必有滯囊。如水之有  
窠。曰。不盈科不行。乃悉屏諸藥。以前丸服三月。而疾  
除。暑日。于亦周身。燈下能書細字。皆蒼朮之力也。然

惟素稟肥盛多溼者爲宜。若形瘦多火者禁用。○其神木已經露製轉燥爲清。用以發散上部頭風痰溼諸證。故治時行頭痛有神木湯。此得制度之妙也。

狗脊

本經名百枝

苦平微溫無毒。酒浸炒去毛用。

本經主腰背強。關機緩急。周痺寒溼膝痛。頗利老人。發明。狗脊爲強筋骨要藥。故本經主腰背強。周痺寒溼等疾。頗利老人者。補益腎氣而堅強筋骨也。其性味形類與萆薢相似。而功用亦不甚相遠。四寶丹用金毛狗脊去毛。鹽泥固濟煨紅。蘇木萆薢川烏頭。

生用等分爲末。醋和丸。溫酒鹽湯下二十九。治男婦  
毒風脚軟。腎氣虛弱。又病後足腫。煎湯洗効。

買衆

別錄名  
草鴟頭

苦微寒有毒

本經主腹中邪熱氣諸毒。殺三蟲。

發明 貫衆苦寒而降。辟時行疫癘不正之氣。疫發  
之時。以此藥置水食之。則不傳染。且能解毒。與堅治  
婦人血氣。本經治腹中邪熱氣諸毒。以其性專散結。  
積諸毒。而蟲積皆由溼熱所生。苦寒能除溼熱。故亦  
主之。王海藏治夏月痘出不快。快斑散用之。云貫衆

有毒而能解腹中邪熱殺三蟲病從內發者多効。王  
璆百一選方言食鯉魚羹爲肋骨所鯁百藥不効。或  
令以貫衆煎濃汁連進一咯而出可見軟堅之功。不  
但治瘡治血而已。病人虛寒無實熱者勿服。

**巴戟天** 辛甘微溫無毒酒浸去心焙用。川產者良。  
本經主大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增  
志益氣。

發明 巴戟天嚴冬不凋腎經血分及衝脈藥也。故  
守真地黃飲子用之。卽本經治大風邪氣之謂以其

性補元陽而兼散邪。真元得補。邪安所留。是以可愈。  
大風邪氣也。主陰痿不起。強筋骨。安五藏。補中增志。  
益氣者。脾胃二經得所養。而諸虛自瘳矣。又治脚氣。  
補血海。病人虛寒。加用之。有人嗜酒。患脚氣甚危。或  
教以巴戟半兩。糯米同炒去米。大黃一兩炒爲末。熟  
蜜丸。溫水下。七十九。仍禁酒。遂愈。惟陰虛相火熾盛  
者禁用。

遠志

苗名  
小草

辛苦溫無毒。甘草湯泡去骨。製過不可

陳久。久則油氣。戟人喉。



本經主欬逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘。強志倍力。久服輕身不老。

發明 遠志入足少陰腎經氣分。非心經藥也。專於強志益精。主夢泄。蓋精與志皆腎所藏。腎氣充。九竅利。智慧生。耳目聰明。邪氣不能爲害。腎氣不足。則志氣衰。不能上通於心。故迷惑善忘。不能閉蟄封藏。故精氣不固也。小便赤濁。用遠志。甘草茯苓神益智爲丸。棗湯服効。取其爲陰火之嚮導也。昔人治喉痺失音。作痛。遠志末吹之。涎出爲度。取其通腎氣而開竅也。

又治婦人血噤失音及一切癰疽。搐鼻治腦風殺鳥  
附毒。惟水虧相火旺者禁服。以其善鼓龍雷之性也。  
本經言治欬逆傷中。詳遠志性溫助火。非欬逆所宜。  
當是嘔逆之誤。以其性稟純陽。善通諸竅。竅利則耳  
目聰明。強志不忘。皆益腎氣之驗。別錄云。去心下膈  
氣。非嘔逆之類乎。一切陰虛火旺。便溺遺精。喉痺腫  
痛。慎用。苗名小草。亦能利竅。兼散少陰風氣之結也。

淫羊藿

一名仙靈脾

辛溫無毒。羊脂或酒炒用。

本經主陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。

發明。淫羊霍手足陽明三焦命門藥也。辛以潤腎，溫以助陽。故本經治陰痿絕傷等證。真陽不足者宜之。堅筋骨，消瘰癧。一切冷風勞氣，筋骨掣急，四肢不仁，補腰膝，強氣力。一味仙靈脾酒為偏風不遂之要藥。惟陰虛走精，強陽不痿，禁服。

仙茅 辛溫有毒，忌犯鐵器。酒浸焙乾用。

發明。仙茅性熱，補三焦命門之藥。惟陽衰精冷，下元痿弱，老人失溺無子，男子稟賦素虛者宜之。若體壯相火熾盛者服之，反能動火為害。叵測。按醫說云。

一人中仙茅毒舌脹出口漸大與肩齊以小刀斲之  
隨破隨合斲至百數始有血一點出曰可救矣莫大  
黃芒硝與服以藥摻之應手消縮此皆火盛性淫之  
人過服之害也然川產者少僞充者多不可不辯

玄參

一名黑參

苦微寒無毒反藜蘆

本經主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人  
明目

發明 黑參入足少陰腎經主腎水受傷真陰失守  
孤陽無根亢而僭逆咽喉腫痛之專藥又治傷寒陽

毒汗下不解發斑咽痛心下懊懣煩不得眠心神顛  
倒欲絕者俱用玄參專清上焦氤氳之氣無根之火  
本經治腹中寒熱積聚女子產乳餘疾并可清有形  
熱滯故消瘰癧結核治目赤痛腫本經又云補腎氣  
令人明目不特治暴赤腫痛總皆散結清火之驗也  
但其性寒滑脾虛泄瀉者禁用

地榆 苦瀼微寒無毒去稍酒拌炒黑用

本經主婦人乳產瘕痛七傷帶下五漏止痛止汗除  
惡肉療金瘡

發明 地榆入足厥陰。兼行手足陽明。體沉而降。善入下焦。理血本經。主乳產痙痛。七傷帶下。五漏者。是指去血過多。肝風内生之象。又云止汗止痛除惡肉。療金瘡者。以其能和血也。若氣虛下陷而崩帶。及久痢膿血。瘀晦不鮮者。又爲切禁。性能傷胃。誤服多致口噤不食。又諸瘡痛者。加地榆。癢者加黃芩。以其能散血熱也。燒灰香油調敷。火燙乃借火氣引散血中之火毒耳。稍專行血。不可混用。

丹參 苦平微溫無毒。酒炒用。反藜蘆。

本經主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣。

發明 丹參氣平而降心與包絡血分藥也本經治心腹邪氣腸鳴幽幽如走水等疾皆瘀血內滯而化爲水之候止煩滿益氣者瘀積去而煩滿愈正氣復也按四物湯治婦人病不問胎前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同蓋丹參能破宿血生新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脈之神品然其性長於行血妊娠無故勿服大便不實者

忌之。

紫參

卽牡蒙又名童腸。三四月間遍地生。高三五寸。逐層起臺。開紫花者是也。

苦辛

寒無毒反藜蘆

本經主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便

發明 紫參入足厥陰兼入足太陽陽明血分故治諸血病及寒熱血痢癰腫積塊卽本經治心腹積聚寒熱邪氣之謂瘀血去則九竅利而二便通矣古方治婦人腸單烏喙丸中用牡蒙卽紫參也仲景治下痢肺痛用紫參湯取其散積血也但市人罕識其真



詳痢下肺痛皆胸中氣結之故。每以紫菀代之。雖氣味之寒溫不同。疎利之性則一。

紫草。甘鹹寒。無毒。色深紫而脆者良。淡紫質堅者。曰紫梗。不入藥。

本經主心腹邪氣。五癰。補中益氣。利九竅。

發明。紫草入心胞絡及肝經血分。其功專於涼血活血。利大小腸。故痘疹欲出未出。血熱毒盛大便閉。澀色乾枯而毒不得越者。宜之。已出而紫黑便閉者。亦可用。蓋紫草涼血。血涼則毒出。世俗誤以爲宣發。

之藥非也。若已出而色紅活者不宜。或白陷及大小便利者忌之。本經言治心腹邪氣五癰者。乃活血利竅之義。發痘卽活血利竅之大端也。言補中益氣者。營血和則中氣受益矣。

白頭翁

一名野丈人

苦微寒無毒。產齊魯。苗長葉白者。

力優。生柴胡中。短小者力薄。得酒良。

本經主溫瘧。狂。癘。寒。熱。癥。瘕。積。聚。瘦。氣。逐。血。止。腹。痛。療。金。瘡。

發明 白頭翁味苦微寒。入手足陽明血分。本經言

苦温者傳寫之誤也。其治温瘧狂獐寒熱等症皆少陽陽明熱邪固結之病。結散則積血去而腹痛止矣。別錄止鼻衄。弘景止毒痢亦是熱毒入傷血分之候。仲景治熱痢下重有白頭翁湯蓋腎欲堅急食苦以堅之。痢則下焦虛故以純苦之劑堅之。男子陰疝偏墜小兒頭禿鼻衄及熱毒下痢紫血鮮血用此並効。但胃虛大便完穀不化痢久下稀淡血水者勿服。以其苦寒降泄也。

白及 苦辛平微寒無毒反烏附

本經主癰腫惡瘡。敗疽傷陰死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。痲緩不收。

發明 白及性濇而收。得秋金之氣。故能入肺止血。生肌治瘡。本經主敗疽傷陰死肌。皆熱壅血傷。胃中邪氣亦邪熱也。賊風痲緩。皆血分有熱。溼熱傷陰所致也。其治吐血咯血。爲其性歛也。用此爲末。米飲服之。卽止。試血法。吐水盆內。浮者肺血。沉者肝血。半浮半沉者。心血。各隨所見。以羊肺肝心。煑熟。蘸白及末。每日食之。其治金瘡及癰疽。方多用之。

三七

綱目名山漆一名金不換

甘微苦温無毒

廣產形如人參者是有節者非

發明 時珍云此藥近時始出南人軍中用爲金刃箭瘡要藥止血散血定痛爲末摻之吐血衄血崩中下血血痢產後惡血不下並宜服之凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨卽嚼爛卷之青腫者卽消若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之此陽明厥陰血分之藥故能治一切血病獨用研服尤良取其專力也一種庭砌栽植者以苗擣敷腫毒卽消亦取散血之意

黃連。苦寒無毒。產川中者中空。色正黃。截開分瓣者爲上。雲南水連次之。日本吳楚爲下。治心藏火生。用治肝膽實火。猪膽汁炒。治肝膽虛火。醋炒。褐色。治上焦火。酒炒。中焦火。薑汁炒。下焦火。鹽水炒。氣分鬱結。肝火。煎吳茱萸湯炒。血分塊中。伏火。同乾漆末炒。食積火。黃土拌炒。○解附子。巴豆。輕粉毒。忌豬肉。本經主熱氣。目痛。背傷。泣出。明目。腸澼。腹痛。下痢。婦人陰中腫痛。

發明。黃連性寒。味苦。氣薄。味厚。降多。升少。入手少

醫厥陰若入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之實熱去心竅惡血仲景九種心下痞五等瀉心湯皆用之瀉心者其實瀉脾實則瀉其子也下痢胃口虛熱口噤者黃連人參煎湯時時呷之如吐再飲但得一呷下咽便好諸苦寒藥多瀉惟黃連芩性寒而燥能降火去滯止瀉痢故血痢以之爲君今人但見腸虛滲泄微似有血不顧寒熱多少便用黃連由是多致危殆至於虛冷白痢及先瀉後痢之虛寒證誤用致死者多矣諸痛瘍瘡皆屬心火眼暴赤腫痛不可忍亦屬心火兼挾肝邪俱宜黃連當歸治痢及

目爲要藥。故本經首言治熱氣目痛及腸辟腹疝之患。取苦燥之性。以清頭目。堅腸胃。祛溼熱也。婦人陰中腫痛。亦是溼熱爲患。尤宜以苦燥之。古方治痢香連丸。用黃連木香薑連散。用乾薑黃連。佐金丸。用黃連吳茱萸。治消渴。用酒蒸黃連。治口瘡。用細辛黃連。治下血。用黃連胡蒜。皆是寒因熱用。熱因寒用。而無偏勝之害。然苦寒之劑。中病卽止。豈可使肅殺之令常行。而伐生發沖和之氣乎。醫經有久服黃連苦參反熱之說。此性雖寒。其味至苦。入胃則先歸於心。久



而巳。心火偏勝則熱。乃其理也。近代庸流喜用黃連爲清劑。殊不知黃連瀉實火。若虛火而妄投。反傷中氣。陰火愈逆。上無制矣。故陰虛煩熱。脾虛泄瀉。五更腎泄。婦人產後血虛煩熱。小兒痘疹氣虛作瀉。及行漿後泄瀉。並皆禁用。

**胡黃連** 苦大寒無毒。忌豬肉犯之。令人漏精。

發明 胡黃連苦寒而降。大伐藏府骨髓邪熱。除婦人胎蒸。小兒疳熱積氣之峻藥。同烏梅止小兒血痢。同雞肝治小兒疳眼。同豬胰療楊梅瘡毒。同乾薑治

菓子積皆取伐肝腎熱邪也。小兒腎氣本實故可當此。若脾胃腎藏不足者服之奪人天元爲害不淺。惟微瘡用胡黃連當歸獮藤水酒煎服。二劑輒効。以其直達下焦善搜滯火之毒也。

**黃芩** 苦寒無毒中空者爲枯芩入肺細實者爲子芩入大腸並煑熟酒炒用。

本經主諸熱黃癰腸澼泄利逐水下血閉治惡瘡疽蝕火瘍。

發明 黃芩苦燥而堅腸胃故溼熱黃癰腸澼瀉痢。

爲必用之藥。其枯苓性升入手太陰經。清肌表之熱。條苓性降。瀉肝膽大腸之火。除胃中熱。得酒炒上行。主膈上諸熱。得芍藥甘草治下痢膿血。腹痛後重。身熱。佐黃連治諸瘡痛不可忍。同黑參治喉間腥臭。助白朮安胎。蓋黃苓能清熱涼血。白朮能補脾統血也。此惟胎熱升動不寧者宜之。胎寒下墜及食少便溏者。慎毋混用。丹溪言黃苓治三焦火。仲景治傷寒少陽證。用小柴胡湯。汗下不解。胸滿心煩。用柴胡桂薑湯。溫病用黃苓湯。太陽少陽合病。用葛根黃苓黃連。

湯心下痞滿用瀉心湯寒格吐逆用乾薑黃芩黃連  
人參湯等方皆用黃芩以治表裏諸熱使邪從小腸  
而泄皆本經主諸熱之綱旨其黃癰腸澼瀉痢之治  
取苦寒以去溼熱也逐水下血閉者火鬱血熱之所  
致火降則血行水下而閉自通矣昔人以柴胡去熱  
不及黃芩蓋柴胡專主少陽往來寒熱少陽爲樞非  
柴胡不能宣通中外黃芩專主陽明蒸熱陽明居中  
非黃芩不能開泄蘊隆一主風木客邪一主溼土蘊  
者詎可混論芩雖苦寒畢竟治標之藥惟軀殼熱者

宜之。若陰虛伏熱。虛陽發露。可輕試乎。其條實者兼行衝脈。治血熱妄行。古方有一味子芩丸。治女人血熱。經水暴下不止者。最効。若血虛發熱。腎虛挾寒。及妊娠胎寒下墜。脈遲小弱。皆不可用。以其苦寒而伐生發之氣也。

秦芫 苦平微溫無毒。雷公云左文列爲秦。治溼病。右文列爲芫。發脚氣。今藥肆多右文者。慎勿混用。本經主寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水利小便。發明 秦芫陰中微陽。可升可降。入手足陽明。以其

去溼也。兼入肝膽以其治風也。故手足不遂黃癰酒毒及婦人帶疾須之。陽明有溼則身體痠痛肢節煩疼及攣急不遂有熱則日脯潮熱用以祛風勝溼則愈。凡痛有寒熱或浮腫者多挾客邪用此以祛風利溼方爲合劑。故本經治寒熱邪氣寒溼風痺肢節痛等證。若久痛虛羸血氣不能營養肢體而痛及下體虛寒疼瘦枯瘦等病而小便清利者咸非秦艸所宜。今庸師喜用秦艸且不辨左文右文凡遇痛證動輒用之失其旨矣。

柴胡

卽此胡

苦平無毒入解表藥生用清肝炒熟用

本經主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新明目益精

發明 柴胡能引清陽之氣從左上升足少陽膽經之藥膽爲清淨之府無出無入禁汗吐下惟宜和解以其經居半表半裏本經治心腹腸胃結氣飲食積聚寒熱邪氣使清陽之氣上升而胃中留結宿滯亦得解散矣仲景治傷寒寒熱往來脇痛耳聾婦人熱入血室皆爲必用小兒五疳羸熱諸瘧寒熱咸宜用

之痘疹見點後有寒熱或脇下疼熱於透表藥內用  
之不使熱留少陽經中則將來無咬牙之患虛勞寒  
熱多有可用者勞有五勞病在五藏若勞在肝膽心  
包絡有熱或少陽經寒熱則柴胡爲必用藥勞在脾  
胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱之藥惟  
勞在肺腎者不可用東垣補中益氣用之者乃引肝  
膽清陽之氣上行兼升達參耆之力耳瘡疽用之者  
散諸經血結氣聚也今人以細者名小柴胡不知小  
柴胡乃湯名也若大柴胡湯而用銀州者可乎按柴



胡爲少陽經藥。病在太陽。服之太早。則引寇入門。病在陰經。用之則重傷其表。誤人不可勝數。其性升發。病人虛而氣升者。忌之。嘔吐及陰火炎上者。勿服。若陰虛骨蒸。服之。助其虛陽上逆。勢必耗盡真陰。而後已。奈何操司命之權者。多所未悟也。

銀柴胡 甘微寒。無毒。銀州者良。今延安府五原城所產者。長尺餘。肥白而軟。北地產者。如前胡而軟。今人謂之北柴胡。勿令犯火。犯火則不效。

發明 銀柴胡行足陽明少陰。其性味與石斛不甚

相遠不獨清熱兼能涼血和劑局方治上下諸血龍  
腦難蘇丸中用之凡人虛勞方中惟銀州者爲宜若  
用北柴胡升動虛陽發熱喘嗽愈無寧守可不辯而  
混用乎按柴胡條下本經推陳致新明目益精皆指  
銀夏者而言非北柴所能也

前胡 苦微寒無毒甄權曰甘辛平無毒白色者良  
去尾用

發明 前胡入手足太陰陽明少陽其功長於下氣  
故能治痰熱喘嗽痞膈諸疾氣下則火降痰亦降矣

爲痰氣之要味。治傷寒寒熱及時氣內外俱熱。按二胡通爲風藥。但柴胡主升。前胡主降。有不同耳。又按前胡治氣實風痰。凡陰虛火動之痰。及不因外感而有痰者。禁用。

防風 甘辛溫無毒。又頭者令人煩喘。又尾者發人痼疾。

本經主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛。

發明 防風浮而升陽也。入手太陽陽明少陽厥陰。

兼通足太陽治風去溼之仙藥。以風能勝溼也。其治大風頭眩痛惡風風邪等病。其性上行。故治上盛風邪。瀉肺實喘滿。及周身痺痛。四肢攣急。目盲無所見。風眼冷淚。總不出本經主治也。防風治一身盡痛。乃卒伍卑賤之職。隨所引而至。風藥中潤劑也。若補脾胃。非此引用不能行。蓋於土中瀉木也。凡脊痛項強。不可回顧。腰似折。項似拔者。乃手足太陽證。正當用之。凡瘡在胸脇已上者。雖無手足太陽證。亦當用防風。爲能散結。去上部風熱也。經驗方治婦人風入胞。

門崩中不止。獨聖散用一味。防風麩糊酒調丸服。然  
惟血色清稀。而脈浮弦者爲宜。如血色濃赤。脈來數  
者。又屬一味子芩丸證。不可混也。惟肺虛有汗喘乏  
及氣升作嘔。火升發嗽。陰虛盜汗。陽虛自汗者。勿服。  
婦人產後血虛發瘕。嬰兒瀉後脾虛發搐。咸爲切禁。  
獨活 辛苦微溫。無毒。香而紫黑者真。

本經主風寒所擊。金瘡止痛。奔豚癰瘕。女子疝瘕。  
發明 獨活不摧風而治風。浮萍不沉水而治水。因  
其所勝而爲製也。本經治金瘡爲風寒所擊而痛。及

黃豚癩瘰。女子疝瘕。皆邪風內賊之候。獨活生益州。較羌活其氣稍細。升中有降。能通達周身而散風勝溼。與細辛同用。治厥陰頭痛目眩。又足少陰經伏風頭痛。兩足溼痺不能動止者。非此不治。甄權以獨活治諸風溼冷。奔喘逆氣。皮膚苦癢。手足攣痛。勞損風毒。齒痛。皆風溼相搏之病也。但氣血虛而遍身痛。及陰虛下體痿弱者。禁用。南方無剛猛之風。一切虛風類中。咸非獨活所宜。

羌活 苦辛溫無毒香而色紫者良

發明 羌活生於羌胡。雍州隴西西川皆有之。治足  
太陽風溼相搏。一身盡痛。頭痛。肢節痛。目赤。膚癢。乃  
却亂反正之主帥。督脈爲病。脊強而厥者。非此不能  
除。甄權以羌活治賊風失音。不語。多癢。手足不遂。口  
面喎斜。癱痺。血癩。皆風中血脈之病也。蘇恭曰。療風  
宜用獨活。兼水宜用羌活。風能勝溼。故羌活能治水。  
溼與芎藭同用。治太陽厥陰頭痛。發汗散表。透關節。  
節非時感冒之仙藥也。但內傷元氣。血虛頭痛。及遍  
身肢節痛。皆非所宜。昔人治勞力感寒。於補中名藥。

湯中用之深得補中寓瀉之意

升麻 甘苦平無毒忌見火解其苦毒

本經辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛  
將氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

發明 升麻能引清氣右升足陽明本藥也本經治  
疫瘴蠱毒取性升上行也治中惡腹痛取開發胃氣  
也治喉痛口瘡者取升散少陽陽明火熱也同葛根  
則發散陽明風邪同柴胡則升提胃中清氣引甘溫  
之藥上升故元氣下陷者用此於陰中升陽以緩帶



脈之縮急。凡胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾土。宜升麻葛根以升散其火鬱。故補脾胃藥非此引用不効。脾痺非此不除。升麻葛根湯乃陽明發散藥。若初病太陽便服之。發動其邪。必傳陽明。反成其害也。又升麻葛根能發痘。惟初發熱時可用。見點後忌服。爲其氣升發動熱毒於上。爲害莫測。而麻疹尤爲切禁。誤投喘滿立至。按升麻屬陽性。升力能扶助陽氣。捍禦陰邪。故於淋帶瀉痢脫肛方用之。取其升舉清陽於上也。古方治噤口痢用醋炒升麻。引人參蓮肉扶胃進食。

大有神效。凡上盛下虛吐血衄血欬嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡癲狂諸證皆在所禁。

苦參

苦寒無毒反藜蘆

本經主心腹結氣癥瘕積聚黃癰溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚。

發明 苦參黃檗之苦寒下降皆能益腎蓋取其苦燥淫寒除熱也。熱生風溼生蟲故又能治風殺蟲。惟腎水燥而相火勝者宜之。若脾胃虛而飲食減少肝腎虛而火衰精冷及年高之人不可用也。久服苦參。

多致腰重。因其性降而不升也。觀本經主治皆溼熱。爲患之病。詳補中當是補陰之誤。以其能除溼熱。溼熱去而陰自復。目自明矣。然惟溼熱者宜之。沈存中苦腰重。久坐不能行。此因病齒痛數年。用苦參揩齒。其氣味入齒。傷腎所致也。後施昭先亦用苦參揩齒。歲久亦病腰重。自後悉不用之。腰疾皆愈。或云苦參既能補陰明目。何久服反病腰重乎。殊不知苦寒之性直入心腎。內有溼熱者。是以當之。始得之。則有輔陰祛邪之力。清熱明目之功。溼熱既去。而又服之。必

致苦寒傷腎。腰垂脚弱。在所不免。理固然也。何疑之有。

白蘚皮

一名白羊鮮

苦鹹寒無毒

本經主頭風黃癩。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。溼痺死肌。不可屈伸。起止行步。

發明 白蘚皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經。去風溼熱藥也。兼入手太陰陽明。爲諸黃風痺要藥。本經所主皆風溼熱邪。蘊釀經中之病。千金治嬰兒風癩。熱則生風。胸中有痰。白羊鮮湯取其善祛風熱。

也。世醫祇施之於瘡科淺矣。下部虛寒之人雖有溼證勿用。

延胡索

卽玄胡索

苦辛溫無毒。上部酒炒。中部醋炒。下

部鹽水炒。

發明

延胡索色黃入脾胃能活血止痛。治小便溺

血得五靈脂同入肝經散血破滯。炮灸論曰心痛欲死。急覓延胡以其能散胃腕氣血滯痛也。蓋當歸芍藥調腹中血虛痛。延胡五靈治胸腹血滯痛。又延胡善行血中氣滯。氣中血滯。與當歸桂心治一身上下

諸痛及經癸不調。產後血病。往往獨行。多功。雜他藥中。便緩。按延胡。走而不守。惟有痰滯者。宜之。若經事先期。虛而崩漏。產後血虛而暈。咸非所宜。

貝母

甘苦平微寒無毒。反烏頭。川者味甘最佳。西

者味薄。次之。象山者微苦。又次之。一種大而苦者。僅能解毒。並去心屑。凡肺經藥。皆當去心。不獨貝母也。其獨類無辨者。名丹龍睛。誤服令人筋不收持。

本經主傷寒煩熱。淋瀝邪氣。疝瘕喉痺。乳難。金瘡風痺。

發明 貝母乃手太陰肺經氣分藥。兼入手少陰心經一名蠹。鄘風言采其蠹善解心胸鬱結之氣。故詩人以此寓焉。肺受心包火乘因而生痰。或爲邪熱所干。喘嗽煩悶。非此莫治。詳本經主傷寒煩熱者。甘寒能解煩熱也。淋瀝者熱結二腸也。清心肺鬱熱而淋瀝通矣。疝瘦者足厥陰之邪干手厥陰也。經曰診得心脈搏滑急爲心疝。少腹當有形也。喉痺者熱鬱結於上也。經云一陰一陽結謂之喉痺。心主三焦之脈皆絡於喉也。乳難者鬱熱結於手足厥陰也。風痺者。

金瘡熱鬱生風而成瘕。總取解散鬱結之邪也。仲景  
治傷寒寒實結胸外無熱證者小陷胸湯。主之。白散  
亦可。二方一主熱痰內結。一主寒實內積。雖同一例。  
治不可混也。俗以半夏性燥。用貝母代之。不知貝母  
寒潤。治肺家燥痰。因鬱結者宜之。半夏性燥。治脾  
胃溼痰。痰因溼滯者宜之。二者天淵。何可代用。若虛  
勞欬嗽吐血咯血。肺痿肺癰癰疽。及諸鬱火證。半夏  
乃禁忌。皆貝母爲嚮導也。至於脾胃濕熱。涎化爲痰。  
久則生火。生痰上攻。昏憤僵仆。蹇澹諸證。生死旦夕。



豈貝母可治乎。浙產者治。疔痕喉痺。乳難。金瘡。風癩。一切癰瘍。又同苦參。當歸。治妊娠小便難。同青黛。治人面惡瘡。同連翹。治項上結核。皆取其開鬱散結。化痰解毒之功也。

山慈姑

全燈花根也。九月開花。朱色。與葉不相見。故又名無義草。

甘微辛小毒

發明 山慈姑攻堅解毒。治癰腫瘡癩。癰癥結核等證。紫金錠用之。亦是解諸毒耳。丹方治面上癍痕。用山慈姑末。和輕粉。礬砂末。各少許。先用鹼水筆塗患處。次摻上藥。太乙膏蓋。日易一次。俟疔瘡消盡。後以

鷹屎白密陀僧末密水調護數日勿見風日效惟眼胞上者不可治以其眨動不轍也

白茅根

一名地筋

甘寒無毒與百脈根相類百脈根出

巴西他處罕得

本經主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便

發明 甘寒能降除伏熱利小便止渴治傷寒呃逆喘噦主吐衄便溺諸血治黃痺水腫胃反上氣五淋疼熱及痘瘡乾紫不起但嘔逆吐衄亦有因於寒者

卽非所宜。本經主治勞傷虛羸者。以甘寒能滋虛熱。而無傷犯胃氣之虞也。言補中益氣。胃熱去而中氣復。是指客邪入傷中州。漸成虛羸而言。非勞傷本病所宜。昔人攷本草功用。言白茅根與百脈根相類。今肅州不行歲貢。百脈根無從可得。而止渴去熱之用。白茅根裕如也。其茅花甘溫。色白。輕虛。力能上升。入肺散熱。止衄。屋上敗茅。研傅斑瘡。溼爛。取其收溼之力也。

草龍膽

苦澆大寒。小毒。去蘆或酒炒。或甘草湯浸。

一宿用凡用勿空腹服令人小便不禁

本經主骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五藏殺蠱毒  
發明 草龍膽苦寒沉降主肝經邪熱下焦溼熱酒  
癰黃腫目病赤腫瘀肉小兒肝氣去腸中小蟲益肝  
膽溼熱取苦寒以瀉之時珍曰相火寄在肝膽有瀉  
無補故瀉肝膽之熱正益肝膽之氣但大苦大寒過  
傷胃中生發之氣反助火邪亦如久服黃連反從火  
化之義本經主骨間寒熱是指熱傷腎水而言熱極  
生風則發驚搐重則變爲癇病溼熱邪氣之中下

二焦者。非此不除。以其專伐肝膽之邪也。肝膽之邪去。而五藏安和。經脈之絕傷續矣。殺蟲毒者。去溼熱之患也。凡胃氣虛人服之。必嘔。脾虛人服之。必瀉。雖有溼熱。慎勿輕用。

細辛 辛溫無毒。產華陰及遼東者良。反藜蘆。

本經主欬逆頭痛腦痛。百節拘攣。風溼痺痛。死肌。明目利九竅。

發明 細辛辛溫。上升入手足厥陰少陰血分。治督脈爲病。脊強而厥。本經治欬逆頭痛腦痛。善搜厥陰。

伏匿之邪也。獨活爲使。治少陰頭痛如神。亦主諸陽頭痛。諸風藥用之。治風溼痺痛。百節拘攣。去死肌。明目者。取辛以散結。而開經脈。竅隊之邪也。味辛而熱。溫少陰之經。故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯。辛溫能散。故凡風寒風溼頭痛口瘡喉痺齩齒諸病用之。取其能散浮熱亦火鬱發之之義也。辛能泄肺。故風寒欬嗽上氣者宜之。辛能補肝。故膽氣不足則肝氣有餘。驚癇眼目諸病宜之。辛能潤燥。故通少陰諸經及耳竅閉塞者宜之。又主痰結溼火鼻塞不利。凡

口舌生瘡者用細辛黃連末摻之凡血虛內熱火鬱頭痛發熱欬嗽者戒用以其辛烈耗散真氣也細辛辛之極者用不過五分

杜衡

俗名馬蹄香  
又名杜葵

辛溫無毒

發明 杜衡香竄與細辛相似故藥肆以之代充細辛亦能散頭目風寒下氣消痰行水破血但其氣濁不能搜滌少陰經中之寒稍遜細辛一籌耳

白薇

苦鹹平無毒

本經主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒

熱痲疼溫瘧洗洗發作有時

發明 白微鹹平降泄抑陽扶陰爲足陽明經本藥兼行足少陰手太陰本經主暴中風身熱肢滿是熱鬱生風痰隨火湧故令忽忽不知人狂惑邪氣寒熱痲疼皆熱邪所致溫瘧乃冬時伏邪至春而發繆氏經疏言暑邪所傷秋必發爲溫瘧恐非經旨別錄療傷中淋露者女子傷犯陰中營血而成淋露之疾用以除熱益陰則前證瘳矣下水氣利陰氣者總取益陰之功真陰益而邪水下性善降泄故久服利人金



實治婦人產中虛煩嘔逆安中益氣竹皮丸中用之  
千金治風溫發汗後身灼熱自汗身重多眠鼻息必  
鼾語言難出萎蕤湯中用之又治婦人遺尿不拘胎  
前產後有白微芍藥湯取其有補陰之功而兼行手  
太陰以清膀胱之上原殊非虛寒不禁之比也古方  
多用治婦人者以別錄有療傷中淋露之功也凡胃  
虛少食泄瀉及喘欬多汗陽氣外泄者禁用

白前

甘辛微溫無毒

發明

時珍曰白前入手太陰長於降氣肺氣壅實

而有痰者宜之。金匱治欬嗽而脈沉者用澤漆湯。以中有白前也。深師治久嗽上氣體腫短氣倚息不得卧。常作水雞聲者用白前湯。外臺治久嗽吐血用白前桔梗桑白皮甘草皆取其下氣耳。若虛嗽常哽氣者不可用也。白前較白微稍溫較細辛稍平專搜肺竅中風水非若白微之鹹寒專泄肺胃之燥熱亦不似細辛之辛竅能治腎肝之沉寒也。

本經逢原卷之一終