

理

瀚

駢

文

理淪駢文

原名外治醫說

錢塘吳師機尙死學

原名

外治無專書先賢洞達元奧不必以是爲說也
世日降則道日微論日卑亦自然之勢耳篇中
歷陳外治之善方隨症列法在其中繁而不節
取便覽也俚而不文取易曉也自知於道無得
以其搜羅彙萃閱十數寒暑而後成此亦旣耗
其心力姑存此說以聽用者之消息焉語云拙
工療病不如不療或不療之療而可進一說歟
醫者意也藥者療也醫不能活人雖熟讀金匱石室之
書無益也藥不能中病雖廣搜橘井杏林之品無當也

在昔集驗之論傷寒則曰傷寒症候難辨慎勿輕聽人言妄投湯藥濟衆之論瘟疫則曰瘟疫不拘於胗古方

今多不驗弗藥無妨

節庵語卽張元素古方今病不相能之意

又如養葵所

著嵩崖所輯謂夫咳嗽吐衄未必成瘵也服四物知柏

之類不已則瘵成矣

所謂非癆而治成癆是也

胸腹痞滿未必成脹

也服山查神麴之類不已則脹成矣面浮肘腫未必成

水也服泄氣滲利之類不已則水成矣氣滯痞塞未必

成噎也服青皮枳殼之類不已則噎成矣不獨此也干

金云

孫真人著

消渴三忌

酒色鹽

使不服藥亦可漢卿云

寶漢卿著

瘡瘍

痘疹諸症

傷寒痘疹瘰癧廣瘡

以不服藥爲上

廣瘡服輕粉尤害事 診

曰服藥於未病

亦即聖人不治病治未病之意

此攝生之旨甚言病

之可以不藥也

按攝生要言謂髮宜多梳面宜多擦目宜常運耳宜常彈舌宜抵腭齒宜數叩

津宜數咽濁宜常呵背宜常煖胸宜常護腹宜常摩穀道宜常撮足心宜常擦皮膚宜常乾沐浴大小便宜閉

口勿言數事人人可能止行之有效實治未病之良方為外治之首務也○又有四要一慎風寒汗浴當風衝

犯雪霜輕為感冒重則中傷二節飲食酒毒上攻熏灼肺金厚味膏粱變生大疔三惜精神多言耗氣喜事煩

心名利熱中房勞喪精四戒嗔怒肝木乘脾必生殮泄男忿嘔血女鬱不月此非是養生空言實病之外感內

傷悉因于此四要乃不又曰不治得中醫按漢書藝文藥之真詮外治之原也

草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平及失

其宜者以熱益熱以寒增寒精氣內傷不見於外是所獨失也故諺曰有病不治常得中醫又唐書裴濟傳載

孫思邈云凡人無故不宜服藥藥氣偏有所助令人臟氣不平二說合觀知古人惟恐人之好服藥而不藥為

中醫之說亦非僅傷寒然也余此謹疾之道亦謂醫之

之外治實申古不治得中之意

多非其治也以上應引古語之不服藥者爲證可見自傷寒以及瘡瘍無不然也

蓋誠有

鑒於良工之難得而特戒夫毒物之是嘗思其患以防

其危其心苦而其詞切雖似激焉豈非愛歟至於情欲

之感非藥能愈

七情之病當以情治恐可治喜以遠迫死心之言怖之悲可治怒以愴悴苦楚

之言感之喜可治憂以謔浪褻狎之言娛之怒可治思以污辱欺罔之言觸之思可治恐以慮彼忘此之言奪

之○欲遂

則病自已卒暴之遭有醫莫及

凡壓縊溺凍斃五絕及卒中暴死醫緩不濟急

救法兩人以竹管吹其耳或生半夏末吹鼻并吹耳心頭溫者一日猶可活醪灌生薑湯解毒再論治或用皂

角細辛吹○

詳觀洗冤錄凡爲衆所知者不煩言而解已然有勢不

能靜待者亦有情不能漠視者將聽其因噎而廢食乎

抑任其飲醕以止渴乎欲籌畫乎萬全聊調停於兩可

夫藥熨本同乎飲汁而膏摩何減於燔鍼皆見內經○

椒乾薑桂心漬酒中浸以棉絮布巾用生桑炭炙巾熨
寒痺所刺處是也膏摩如風中血脉而用馬脂以摩其
急以潤其痺以通其血脉更用白酒和桂以塗其緩以
和其營衛以通其經絡是也此用膏之始也○燔鍼焮
鍼見素問仲景謂之燒針今之太乙雷火等鍼卽是○
按太乙針樊觀察所刻范氏者爲最著治風氣及一切
內外百病寒者正治熱者從治用艾絨三兩硫磺二錢
麝五分冰片七分乳香沒藥丁香松香桂枝杜仲枳殼
皂角細辛白芷川芎獨活雄黃山甲一錢火紙捲藥末
糊桑皮紙六七層如爆竹式長五寸徑圍一寸五分雞
蛋清刷之陰乾密收臨用燭火上燒紅放紅布上按穴
針之正人穴二十一會神庭上星臨泣客主人天突
肩髃期門上臑中臑下臑曲池手三里天樞氣海中極
關元風市內庭大敦行間也伏人穴十一翳風大頰肺
俞身柱膏肓脾俞命門腎俞環跳會陽足三里也如
不知穴卽針患處○內府雷火針只用艾三錢丁香五

分麝二分捲紙點燒吹滅乘熱墊紙捺于患處此法較便○內府陽燧錠治風氣并腫毒硫磺一兩五錢銅勺化開照次序入川烏草烏蟾蜍硃砂一錢僵蠶一條冰片麝香二分攪勻傾鉢磁盆內盪轉成片收藏臨用取瓜子式一片先以紅棗擦患處粘藥於上燈草蘸油燒三五壯畢飲醋半盞候起小泡挑破出黃水貼萬應膏愈原云用鐵烙駭人故變而爲此然則今之火針亦可變也○觀音救苦丹治小疔等卽陽燧錠硫磺硃砂麝香三味等分盪片燒後連灰卷于肉上不痛亦不潰膿亦治風寒濕氣流注作痛手足蹇攣小兒偏搖口眼喎邪婦人心腹痛塊攻疼之症○百發神針治偏正風漏肩鶴膝寒濕氣半身不遂手足癱瘓痞塊腰疼小腸疝氣癰疽發背對口痰核初起不破爛者並妙用生附子川烏草烏大貝母乳香沒藥血結檀香梛香麝香三錢母丁香四十九粒艾綿作針○治癩神火針蜈蚣一條木鼈仁靈脂雄黃乳香沒藥阿魏三棱蓬朮甘草皮硝三錢開揚花硫磺山甲牙皂二錢甘遂五錢麝三錢艾絨二兩作針○陰症散毒針用羌活獨活川烏草烏白芷細辛牙皂靈脂肉桂山甲雄黃大貝乳香沒藥硫磺蟾酥麝等分艾絨作針○熏藥法治風氣痛用川烏草

烏千年健梛香開楊花鑽地風陳艾購捲紙筒糊紫烏
金紙包然熏病處痛則病出○藥紙熏法硫黃五兩化
開入銀硃硃砂明雄三錢川烏草烏二錢半生大黃黃
柏一錢麝一分攪勻傾紙上再蓋一紙壓匾每紙一寸
裁取十塊點着放粗草紙上移熨治風氣閃挫熱透自
愈○有用桑枝扎把燒熏者名桑枝針補陽氣虛弱散
腫潰堅妙或川桃枝削針全○神火照法硃砂雄黃沒
藥血結三錢麝五分捲紙撚蘸麻油點燒自外而內周
圍照之可以散毒氣治痘并一切腫毒亦針法之變○
凡寒痺陰疽疔塊閃挫用針甚效如嫌製針費事或點
穴難準可貼膏藥隨意捲針矧印金丹而佩癘蒸雞醴
藥爲筒或捲紙撚熏於膏上

而敷鼓思神聖之所傳識今古之異製

古方時行疫癘佩紫金錠洗冤

錄以蘇合丸印成香佩今蘇州同仁堂刊送辟瘟散佩
方皆岐伯咽金丹解毒法也蓋改咽而爲佩矣集驗良
方治一切癘瘕水腫氣腫四肢腫用大麥拌硃砂喂雄
雞取其矢澄清熬膏貼乃岐伯及裴眉僧飲雞矢醴法
也蓋改飲而爲敷矣此變膏
之證古今人固有不同治者又若金匱之鹽附堪摩礬

漿可浸則未嘗不外治也

金匱方頭風以炮附子爲散加鹽摩疾上脚氣沖心礬石

二兩以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良後有加琉黃

仲景所製亦外治方之祖也

寶鑑之茶調且貼葱豉還敷則何必其

內服也

寶鑑方治傷風頭風川芎茶調散用川芎白芷羌活防風荆芥薄荷細辛生甘草研茶調服濟

衆新編云以葱涎調貼太陽穴甚妙或照方加菊花蟬

蛻僵蠶或照方加生地白芍歸身或照方去細辛易香

附痰加半夏熱加石膏又方肺熱鼻塞加黃芩梔子巔

頂痛加藜本蔓荊子俱可按此方亦可油熬黃丹收

貼○寶鑑鬚葱白生薑淡豆豉白鹽作餅烘熱掩臍上

散風寒理積滯兼治二便不通氣通卽愈此卽葱豉湯

加味又本草附方爲推十法之相傳李士材傷寒篇摘
小兒便秘葱豉敷陶氏十法外治居
七其餘亦只是薑韭雞子清食物之特采千方而備覽
類此篇卽本陶氏之法而推廣之耳

間之風首六淫而寒兼四時初客於皮毛肺首受於勝

膀胱太陽六經未傳三日以內邪方在表散固爲先傳傷寒

由表入裏初起在太陽膀胱經則頭痛惡寒發熱腰脊

強繼傳陽明胃經則目痛鼻乾唇焦不臥皆爲在表宜

汗再傳少陽胆經則目眩耳聾胸滿脇痛口苦寒熱往

來屬半表半裏宜和解失治則傳入三陰矣傳太陰脾

經則腹滿痛咽乾自利傳少陰腎經則口燥舌乾痛利

清木日不明傳厥陰肝經則小腹滿舌卷囊縮厥逆皆

屬裏宜下亦有不便傳三陰而傳入太陽膀胱腑者則

口渴溺赤宜利小便傳入陽明胃腑者則譫語狂亂燥

渴便閉轉失氣自汗不眠宜下凡三陽三陰之脈皆

環繞乎胃府處處可入一入胃府則無復傳故陽明爲

裏中裏以上爲傳經傷寒因寒化火也熱症也其有

初起直中三陰者寒症也其症腹冷痛吐清沫利清穀

跪臥支冷囊縮吐蚘舌黑而潤宜溫○又寒之傷人必

先皮毛外則寒慄鼻塞內則咳嗽短氣是傳肺也舌胎

昏亂是傳胞絡也洩瀉便閉是傳大腸也癰閉是傳小

腸也痞滿上下不通是傳三焦也經云藏腑俱病而傳

變不及手經者省文也○傷寒傳經前三日在陽分後

三日在陰分一日一經七日傳徧病自轉此常序也壯

實人不藥亦自愈故古有不藥爲中醫之說其有越經傳表裏傳首尾傳巡經得度傳併病合病兩感等名乃屬變症俱詳傷寒書○治病必先辨症外內雖殊醫理無二必知內治之法然後可用外治之法古書充棟欲知醫者自能尋究茲篇只於註試觀頭痛者與神芎傷中略爲提要閱者幸勿嗤其陋

頭痛爲邪在經三陽皆頭痛三陰惟厥陰有頭痛少陰間有頭痛邪在經三陽皆頭痛三陰惟厥陰有頭痛少陰惡寒頭項痛腰脊強身足痠疼晝夜不歇而無汗○傷風感寒頭目不清川芎藿香胡索丹皮二錢雄黃白芷皂角四錢硃砂一錢研吹鼻凡感從鼻入者多是宜改鼻不獨頭病爲然也頭痛吹鼻取其近也外治見患治患捷於服藥均如此○重傷風鷓不食草研吹鼻涕淚出卽清爽冬月可代亦藥如塞鼻塞耳貼目可治眼翳并星卽移星草也一加川芎青黛冰片亦治頭風再加辛夷細辛兼治鼻中諸病○按治病須分陰陽表裏虛實寒熱之異古方外治亦然今卽頭痛一症以明內外合一之理他症皆可例推矣 古法治風寒頭痛川芎爲君太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太陰蒼朮少陰細辛厥陰吳黃嶺頂藥本爲引經藥若雜症頭痛血虛

四物氣虛四君濕痰二陳宿食平胃其法不一眞頭痛
爲腦空不治而外治則亦有外感內傷諸法如風寒頭
痛有麻黃去節研同杏仁搗泥貼太陽法或加白附子
川烏南星乾薑全蝎珠砂麝香入酒調貼全又有川芎
南星葱白搗貼太陽法加辰砂酒調并治夾腦風小兒
貼額門三陽頭痛不敢見日光有置水頂上宜汗吐下
法受暑頭痛有嗅皂角取嚏法并治卒頭痛有蒜泥塞
鼻出淚法風熱頭痛有薄荷鬱金白芷石膏芒硝塞鼻
法或加川芎細辛青黛曼荆子全如太陽症加羌活防
風赤豆外寒內熱者有草烏梔子葱汁調貼太陽法此
方并治疝諺云頭疼當疝醫非無因也大熱者有大黃
芒硝并泥調貼太陽法有朴硝塗頂法有葶藶子煎湯
沐頭法腦痛有硝石搐鼻法大寒犯腦者有蒸吳萸作
枕法煎吳萸浴頭法寒濕頭痛有紫蘇川芎花椒葱白
細茶煎熏法亦治風寒痛寒濕逢陰雨卽發者有桂心
酒調塗額角及頂上法久不除者有皂角麝香紙包放
頂上炒鹽熨法濕氣頭痛有瓜蒂末松蘿茶嗜鼻取黃
水法有川芎半夏白朮甘草末搐鼻法并治挾痰者亦
有用羌活勝濕湯藥料研末搐鼻法宿食不消飽則濁
氣熏蒸致頭脹痛者有平胃散搐鼻法熱痰痛有牛蒡

子搗汁加鹽酒熬膏頻擦太陽使透法血虛頭痛有當
歸川芎連翹熟地煎湯置壺中吸其氣法氣虛頭痛有
川烏南星加氣藥貼太陽法有煎補中益氣加羌活防
風熏法肝風有霜桑葉煎熏法有石決明草決明塗太
陽法并預防壞眼亦有作枕法腎厥頭痛有附子艾葉
揉嗅法頭痛目眩者川芎芎芎薄荷雄黃蒼耳子黎蘆
陳胆星瓦楞子研搗鼻清熱化痰頭痛兼眉棱骨痛壯
熱不止大黃木香解毒子地漿水調貼太陽時病初愈
後毒氣攻注頭腦脹痛紫金錠葱汁酒磨塗太陽頭痛
連眼者穀精草末調糊塗腦頂頭痛連眼珠者韭菜子
薑汁調塗太陽或用麻黃灰盆硝冰片麝吹鼻頭痛有
用醬薑貼太陽燒艾一炷法有用川芎枳殼和艾火酒
噴曬乾加麝爲條燒嗅法或用乾蜩糞乳香麝捲筒燒
吸烟法此卽火治也有冷水熨法此卽水治也有草麻
仁同大棗搗泥塞鼻貼太陽法有斑蝥去頭足翅蛻蜋
殼內罨酸痛處過夜起泡挑破法此拔毒法也草仁或
用麻油熬炒黃丹收加麝貼斑毛或用猪油熬松香黃
蜡收貼均可并拔一切毒西醫斑毛硬膏卽此貼患處
能引病外出貼腿足能引病下行也然是峻藥須量用
○頭痛膏用青黛黃連決明子黃芩桑葉歸身紅花生

地防風蘇葉貝母各等分小磨麻油熬黃丹十分之七
硃砂十分之一同青黛收臨用糝黃菊花末左痛貼右
太陽右痛貼左太陽雙痛雙貼效○鹽附等方已見餘
不盡載○頭痛年久爲頭風方見後治全可參用頭痛
必兼暈治亦同頭痛○彙觀諸方可悟隨症用藥之道
如有兼症或寒熱虛實互見者可分用亦可並用雖爲
頭痛說法而諸症要亦不外乎是擴而充之足應萬項
變外治無用藥凡例卽此可以爲例幸無厭其煩也
強者枕荆芥二項強太陽受風也○或蒸黑豆枕○肝腎

藥桂枝浸搨

卽桂枝湯法○又煎

杏仁搨塗

楊寒頭痛

又方同麻黃用見前

麻黃甘草眼點

抄傷寒無汗麻黃

○風熱面腫并塗面

加冰片點兩眼角暖蓋靜臥避風自汗不汗熱湯催之

此卽仲景麻黃湯之意暖蓋熱催卽服麻黃湯欲溫覆

之意加冰片者卽外治加藥引法也○傷寒時疫感冒
通治點眼取汗麻黃去節二錢零四釐甘草二錢五分
琥珀一錢零五釐牛黃一錢冰片六分又方雄黃四分
辰砂二錢牙硝四分麝一分金箔五分頭疼發熱口渴

身痛男左女右點大眼角名發汗散二方併用亦妙○
 傷寒時疫感冒通治麻黃膏黃連膏兩膏各用一錢和
 勻入胆礬牛黃冰片五分青魚胆一錢拌蘸點眼內此
 方內外通治合麻黃發表黃連清裏而為一乃雙解法
 也曾試點過麻辣流淚渾身毛骨悚然是即膜理開之
 也○又呂真人治瘟疫用麻黃犀角山茨姑朴硝血
 結一兩薑汁拌濕烏金紙包十八分紅棗肉搗泥和丸
 砂盆煨成黑炭去紙取藥加冰片十分之一銀簪蘸香
 油點兩眼男左女右取汗如瘟疫日久不汗先吹鼻後
 點眼汗後食米湯稀粥此方兼解毒法○眼主五藏流
 通甚捷莫謂點蒼朮羌活掌攤風寒發汗蒼朮羌活明
 之為無驗也 蒼朮羌活掌攤風寒發汗蒼朮羌活明
 腿間側臥暖蓋取汗不汗熱湯催之 按古有熱湯澡
 浴法有熱水浸腳擁被安睡法有熱水抹身法皆汗○
 又方并治頭瘟蒼朮枯礬良薑葱白炒熱塗手心掩臍
 靜臥手須窩起勿使藥着臍一手掩住外腎前陰女子
 亦如之服菉豆湯催汗○此即神術散羌活湯意○揉
 心主汗掌屬心故發汗○一手掩臍一掩腎丹訣也揉
 以香附 傷寒無汗醋炒香附擦背加治 熏以紫蘇 傷寒
 風襲經絡疼痛即擦患處均效

紫蘇煎濃湯熏頭面及腿灣前頭痛註
有方可參用○二方卽香蘇飲之意
薑葱之用維多

七寶特擅其勝

傷寒感冒生薑葱白核桃細茶黑豆煎湯沖熏頭面名五虎茶得汗解○生薑

搗爛棉裹擦天庭并治中風痰厥
又令兩人各持薑渣一團擦兩手足心兩臂灣前胸後背得汗解并治夏

月霍亂寒中三陰麻腳步等俱效○腹痛葱白炒覆臍

上砂壺盛熱湯熨之○或切葱白如碗粗一束高寸許

放臍上熨斗熨之葱爛再易先放胡椒末或麝香丁香

末於臍內再熨更妙并治陰症○傷寒結胸中氣虛弱

者薑葱蘿蔔子炒熨自然滯行邪散胸卽開豁冷加酒

烹○風寒結痛薑葱橘皮炒熨○食結生薑水菖蒲根

陳酒糟鹽炒熨或作餅貼胸○熱結生薑勿炒和蚓泥

薄荷汁蜜水并水調揉心口或加冰片○痰結生薑茶

葉煎湯調銀硃明礬塗胸口或搗薑渣和竹瀝擦胸口

○風痛薑葱紫蘇陳皮搗爛加飛麩用菜油煎餅貼或

薑葱糯米飯加鹽搗敷若兩足痛如刀割不紅腫者生

薑蘸香油擦隨用生薑燒熱搗爛敷之○風襲經絡筋

擊骨痛或虛怯人肢體生腫塊或痛或不痛用炒葱白

布包熨腫痛自止爲散血消腫定痛之良法卽刀械殺

傷氣悶絕者炒葱徧敷自醒又腫毒用茶油煎葱敷自
消乳癰炒葱白敷炭火盛瓦罈偏之汗愈皆良法也○
生薑葱白各一斤麻油熬黃丹收貼風寒癰痲皆妙亦
可隨症調藥末用如古湯頭之用薑葱爲引也○七寶
膏用生薑蒜頭槐枝各一斤葱白入兩花椒二兩麻油
熬黃丹收可貼百病癰疽發背消腫定痛潰膿生肌皆
効又方加韭白八兩白鳳仙一株花莖子葉全用亦名
七寶膏或再加柳枝桑枝各一斤桃枝半斤名十寶膏
亦可
調藥
椒芥之力甚大五子亦同其功
傷寒不汗胡椒天
麻銀硃棗肉丸握
掌心或胡椒丁香葱白搗塗兩掌心夾腿內側取汗治
陰寒症皆宜○凡聞病人汗氣入鼻透腦卽散布經絡
初覺頭疼卽用芥菜子末溫水調稠填臍內隔衣以壺
盛熱湯熨之汗解傷寒時疫俱妙亦治急肚痛及小腹
痛西醫有白芥敷法用麩粉淡水攪和貼腹可隨症
參○風濕腫痛生芥子末調熱酒或熱醋包患處有濕
翳拔出卽愈○五子白芥子同蘇子香附子蘿蔔子山
查子也風寒發散并痰食結胸氣膈噎塞鼓脹俱治共
炒研細末調入覆蕎餅於額上風寒頭痛醋炒蕎爲
七寶膏用甚妙

以收風毒或用黃蠟爲膏
敷式覆額上亦全
納草霜於臍中
胡椒葱白百草

取汗 草霜和中
或圍爐塗丹以坐向
傷寒日久不汗

溫散并治寒腹痛
身或硃砂亦可向火坐
自汗或炭盆置床下烘之
夏日

勿用○按瘧疾發汗有黃丹
拿法用生黃丹五錢生薑

三錢研胡椒一分五釐
麝五釐臨發對日坐定
醋調藥

男左女右敷手心藥行汗
出無日用火烘脚年老身弱

怕服藥者或煨坑一名鋪砂
以臥蒸傷寒中風癱瘓發

最妙可參或煨坑燒地鋪砂
以臥蒸傷寒中風癱瘓發

暴凸尤宜 搗地坑如人長
以桑柴火燒透掃灰噴酒

酌鋪蠶砂或桃葉松柏枝
菊花稻草之類布席蓋臥取

汗再以溫粉撲之自愈
溫粉卽川芎白芷藥本一兩米

粉三兩棉包撲于身上
煨坑法最古漢蘇武用之南

史徐文伯治范雲傷寒
宋史王克明治安道風禁用之

然是却法○又按頭項強
硬燒坑布桃葉臥以頂着坑

上蒸汗愈 天行餘毒手足
腫痛煨坑着屐居坑上以

衣率之勿洩氣 治痔瘻
煨坑沃酒納吳萸坐 治附

骨疽煨坑沃小便坐坑中
熏使膝理開氣血通暢而愈

治刑傷煨坑醉飲麻油
熱酒臥一夜如故昔有被毆

者醫用此法遂不成訟此數法可參酌用又癱瘓酒
妙蠶砂鋪床上臥間日一作或醋蒸黑豆鋪床上臥
取微汗豆冷令人于被皆能解肌而發汗可以宣正而
內挽引孿急處俱可參

逐邪第勿爲火逆致慮於表虛以上汗以下若夫胸中有

食則以物探喉凡痰壅上膈火氣上衝食停上腕並常

本得吐卽止壯實人停食此法最妙其效甚速老人產

婦及吐血家忌○按吐法今人不講久矣子和云余著

汗下吐三法常兼衆法有按有齧有瀉有導有減增有

續止如引涎澀澀取嚏追淚凡上行者皆吐法也薰蒸

潔洗髮烙針刺硬射導引按摩凡解表者皆汗法也催

生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也據此
則邪在上焦宜吐者膈上多痰則以藥嗜鼻如瓜蒂吸
可用取嚏追淚之法如瓜蒂吸
子之類○如自欲吐者可使湧凡病人自欲而不當下
擦法見前凡病人自欲

者無妄攻

傷寒表證罷方可下不爾邪乘虛入不爲結
胸卽爲熱病○傷寒忌汗下證詳見傷寒書

似瘧往來

少陽寒熱往來如瘧

擦柴胡以和之

搗柴胡擦背及周身取微汗所以治

也如痞滿悶

凡邪傳裏必先胸以至心腹入胃胸在半表裏間邪將入裏而未入裏故胸滿而腹

未滿是氣而非物也○已下者爲痞氣未下者爲少陽

○腹痛者結胸鞭而不痛痞氣○此熱邪宜苦瀉若雜

症則薄黃連而豁之煎黃連水搗胸所以治裏也○少

然可參

在表裏之交可從中而治

和太陽要有經有

腑 陽明亦有經有腑

陽明經病傳腑蒸熱自汗口渴渴飲冷宜石膏等清之腑症潮熱

諸語腹滿便秘宜大黃枳實等攻之

祕熨枳實麥皮

便祕枳實麥皮鹽炒熨即承氣法也服

熏蘿蔔竹葉

大便實結不下將烈火煮竹葉一鍋乘熱傾桶內撒綠礬一把坐熏之或用蘿蔔葉

或用青菜全○前有薑蔥蘿蔔熨法治諸結可參用

臍硬痛

此燥屎症必轉失氣尿不利

則桔梗蘸油潤其燥屎

塞肛門或蒜

油或麻仁
油灌肛內
少腹滿急
此蓄血症必噉
水不噉尿利
則蘇葉煎湯摩其

蓄血
之○或麻根搗貼連陰際
內果已堅下何可緩然

寒熱須辨而陰陽貴分傳者熱而中者寒陽宜下而陰

宜溫勿執是傳是中只決為下為溫
傷寒傳經在表者為寒在裏者為熱

又有陰陽二症傳經者為熱直中者為寒詳見
前六經未傳註○直中者或從鼻入或從足入何以涼

膈確浸布揉
傷寒熱邪傳裏皮確化水新青布浸搗胸
口或用雞子清白蜜調敷熱甚加大黃○

按大陷胸大承氣調胃承氣皆用確涼膈散即調胃承
氣加味防風通聖散即涼膈散加味如以浸確揉法推

之俱可酌用又小柴胡加硝湯及六一順氣湯並用何
確當參○翹梔芩薄荷黃草涼膈散也或同四物用何

以暖臍黃蒸絹熨
傷寒直中三陰經初無頭疼發熱面
青肢冷小腹絞痛者亦治男女由房

事後飲食生冷致成陰症腹痛者并霍亂吐瀉腹痛者
吳黃入三陰脾腎肝用一升即二兩五錢也酒拌蒸絹

包熨臍下足心一加葱白麥麩食鹽炒熨全○又冷極
唇青厥逆無脈陰囊縮者亦用此熨并灸臍中及氣
海關元各三五十壯而手足不溫者死又囊縮者吳
黃同硫黃大蒜調塗臍下蛇床子炒布包熨之○按寒
中于表宜汗用麻黃桂枝柴胡葛根溫散寒中於裏宜
溫用乾薑附子肉桂吳黃之辛熱人參白朮甘草之甘
溫以復其元陽此藥例也諸傷寒濕者皆視此○又按
吳黃湯三味參黃湯四逆加吳黃湯皆治陰症如以蒸
黃熨法推之亦可酌用○又按回陽救急湯治中寒并
傷寒陰症陰毒等用黨參白朮茯苓甘草附子肉桂陳
皮半夏五味子乾薑生薑各一兩此方麻油熬黃丹收
備貼甚妙又方只用附子白朮甘草末生薑汁調蘇合
丸和用者其用蘇合丸法可加入貼受寒腹痛立愈○
大凡膏藥用溫暖及香料者其奏效甚捷若貼膏後加
以熱熨尤效如或不對症上手卽穴甚則鏡按胸前或
拒可以速於更換便作試法亦妙

以凝雪逐其水

治天行煩亂熱極者并傷寒水結胸飲
停心下不散者用芫花一味浸水拍胸

前熱除爲度名凝雪湯芫花逐裏水二甘遂大棗卽十
棗湯法也○水漬法乃治陽毒大熱用并水或棗豆湯

青新布浸

塌胸口者冷極則丹合膝上

黃丹胡椒薑蔥敷

或以健

陽回其春

健陽丹亦名回春丹治傷寒陰症用胡椒枯

被蓋取汗忌吃茶水一方無火硝用四味填臍蓋理中

膏并治房勞○中寒附子川椒薑汁飛麩和鹽填臍或

川乾薑附子川烏良薑吳萸官桂醋丸納臍此方并可

用麻油熬黃丹收臨用參川椒末貼○按治落頭疽骨

槽風耳後銳毒陰對口陰發背乳岩惡核石疽失榮鶴

膝風魚口便毒瘰癧流注諸陰疽即前健陽丹去丁香

易麝香用胡椒一兩明礬火硝黃丹各三錢麝一錢蜜

調作兩丸病在左握左手在右握右手在中分男左女

右若病在腰以下縛腳心亦分左右中布扎不鬆不緊

不可移動六時一換不論如何腫痛潰爛數丸總能收

口生肌用過丸埋土中忌口并房事一年此蒙古名

醫祕方貴重無價其實亦即陰症之方而推之耳乃知

治病能通陰陽之理則諸方無不可移借者不必薑薄

拘於某症某方某經絡某部位也善悟者其叅之薑薄

蠟泥以寬胸

見薑

自夏麝香以通竅

臍內上蓋薑片以

蠟泥以寬胸

見薑

自夏麝香以通竅

臍內上蓋薑片以

熱物熨之名溫臍法○按三味填臍外用山螺葱白搗餅蓋之可治小便不通一方而涼熱療治隨用可推

潑醋炭而制狂熨鹹息譖狂胃大熱也非下不除○炭

硃砂元明粉塗胸烙葱餅而定絞燒艾伸踞陽躁者先

口○譖語熬鹽熨

而後躁者屬陽不膻中即兩乳中間穴有塊冰之置寒厥者

由熱而漸厥者屬熱所謂熱深厥委中即腿灣中間穴有盆湯

亦深也不由熱而驟厥者屬寒

之拍熱湯拍後如見紫黑泡乃毒也刺蠟收熱毒傷寒

癩團破腹覆胸凡熱雞解陰邪傷寒陰毒剖雞覆胸口

毒可通用并可護心

腹痛甚刺且夫寒熱有虛有實陰陽有假有真假陽症水極似

熱雞皮貼

火也不可誤作陽症治假陰症清虛熱則胆導殊妙即

火極似水也不可誤作陰症治

也凡邪熱盛而氣血虛難堪攻下者猪胆汁和蜜熬成錠蘸皂角末塞肛門名胆導法○按導法有虛實寒熱

之別如津液枯者蜜加鹽熬名蜜導濕熱痰飲固結者薑汁麻油浸瓜萸根導陰結便閉者蜜煎中加薑汁生附子末或陳醬薑或草烏導餘與大便不通註參看○此分別用藥法也他症亦可例推○凡下部之病用導法最捷或做雄黃兌法或做猪脬擠汁法熏法西醫水節亦是退真陰則蛋熨至神傷不能分陰陽目定口呆身熱無汗便祕不省人事煮雞蛋砌臍四旁或用老油松節七兩胡椒照病人年紀每歲七粒煮蛋乘熱切頂殼三分覆臍眼麩作圈護住冷易視蛋墨為驗收盡陰氣自愈一用煮雞蛋去殼乘熱滾擦亦能變陰為陽名蛋熨法○發斑用銅錢於胸背四肢刮透仰於傷處用蛋滾擦此苗人祕法也寒熱俱實者白散用巴豆等陷胸大陷胸用硝黃等易為麩調而葱搗寒結巴豆飛麩研調餅敷○熱結大黃芒硝葱白搗敷○又傷寒食積冷熱不調者一云肺熱藏寒者用巴豆大黃唾和餅貼臍艾燒數炷熱氣入肚即住拭去藥毒如畏艾灸用熨斗盛炭火熨結胸本有熨法○按食停腸胃冷熱不調腹脹氣急痛滿欲死及中惡客忤卒暴諸病用大黃巴豆乾薑名備急丸可參

又方巴豆同黃連如前法先滴薑汁於臍內再灸關格霍亂皆宜○陰陽二毒結胸症古方陽用地龍陰用破

結丹辰砂附子黑丑醋熬膏入礞石葶苈肉蔻陰陽或

巴豆桂心木香麝等分丸輕粉金箔衣可參敷

假者假陰症厥冷昏迷然口渴便閉身不欲衣指甲紅

假陽症煩躁而赤或渴然不飲冷便利身欲衣指

甲青黑三黃膏八味代以水撲而煎敷凡內真熱外假

足冷黃石膏湯以井水撲其胸除熱如覺心快則內火息而

外之戰慄頓失矣若下真寒上假熱症不敢用八味丸

先用力擦其足心令熱以吳萸附子飛麩麝香調敷湧

泉穴引熱下行則下一身熱而上部之火自息矣○凡

虛火上炎症及偏陽于上之假其本病自有從化之殊

症與一切疑症皆當做此推用

其變症多由失誤而致失汗誤下聊舉其要以識其凡

衄血傷寒衄血須辨表裏○汗爲心液熱則變紅越出

上寢傷寒失汗成鼻衄爲衄汗不可止衄久宜止

磨芩芩而塗鼻血塗或紙浸白芩水貼眉心或切白芩

鼻血塗或紙浸白芩水貼眉心或切白芩

鼻血塗或紙浸白芩水貼眉心或切白芩

片或茶調決明貼於胸清肺熱延胡塞耳左胡塞右右胡塞左活血利氣

青苔搭頗或井泥或濕紙搭頓門三棱敷五醋和黃

囊或黃酒浸足○刺久吐血傷寒失汗熱煎芷梔而熨

牛膠盪軟貼山根髮際

白芷黑山梔煎熨胸口或醋調大黃掩其臍抽薪鬱金

清胃熱○治刺吹鼻內

擦背非汁童便凉水噴面治吐刺并九竅血○少陰誤

竭危蒜泥裹足引熱下行散之以紫菀香附刺血并水磨

蘸塞鼻血見陳墨自散非獨黑能止紅也驗暈吐血用

藕汁或用雞蛋清磨墨塗胸口韭菜汁亦可磨肝血尤

宜數方清之以地黃犀角一切失血眩暈者生地塞耳

皆穩效嗽血便血蓄血如狂嗽水不欲嘔及陽毒發斑等用大

生地二兩白芍黃芩黃柏黑山梔生甘草一兩丹皮犀

角五錢麻油一斤熬黃丹七兩石膏四兩收即涼血地

黃湯法也刺血貼眉心吐血貼胸口蓄血貼臍下隨症

酌用便祕可加桃仁大黃○西醫法衄血將頭高枕冷水灑面或冷鐵熨背脊吐血將頭平枕冷水灑面或冰塊按胃上大小腸子宮出血用水節射冷水入肛門陰道或冰塊塞之又吐血失血太多病危者用無病人之血以竹筩灌入有病人迴血管中

舌有胎而黃赤者拭

以井水

傷寒初起邪在表無胎半表半裏白滑胎入裏則粗白厚膩不滑而澁熱傷津液也若熱聚于

胃則黃或生芒刺或黑色則熱甚也多凶○陽症舌黑乾燥無津液宜硝黃下之陰症舌黑而潤宜附桂溫之又冷滑如淡黑者無根虛火宜化痰降火或淡黑一二點補腎降火○舌胎黃赤乾澀井水浸青布拭之生薑擦一切舌胎用薄荷水浸青布拭之生

薑擦自退

如生芒刺刮不去熱毒深也危

塗以竹瀝

紅粟竹瀝調紫

須觀芒刺之形

見上○附方舌上厚苔退而舌底紅色者火灼

雪丹塗之効

水虧也生地切片貼○無舌胎而紅絳者磨犀角塗胸

○舌瘡殊砂雄黃黃柏薄荷礪砂冰片○舌爛黃連

塗○舌出珍珠冰片敷○舌身有斑而紫赤者傷寒汗

脹出口外雄雞冠血浸自縮

身有斑而紫赤者

傷寒汗下不解

耳聾足冷煩悶欬嘔卽是發斑之候

熱邪傳裏熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如疹子重如

錦紋紫黑者熱極胃爛多掃以猪胆

死不可發汗重令開洩

見寶鑑輕者先噴淡薑敷以燕巢

汁再用青黛水掃之

同雞蛋煎成一餅敷數次可愈

○附方天行發斑升麻水掃之

胸背手足稀少如蚊蚤迹乃無

根虛火上熏於肺非斑宜溫腎

目黃而明薑茵擦之亦

訓烏雞覆之

傷寒表未解寒邪挾濕身目發黃濕盛於

明爲陽用生薑汁和茵陳汁點眼偏身黃者并擦胸前

四肢周身汗解或用蝦薑絞汁和香油點眼全

濕熱發黃昏沉不省雄雞破背帶毛血合胸

黃赤小豆瓜蒂黃米研吹鼻或棉裏寒鼻各竅出黃水

愈但勿深入

○太陰肺爲標脾爲本發黃掘新鮮百步

根洗淨搗爛覆臍上以糯米飯一升拌水酒各半合揉

軟蓋藥上包扎一二日口內作酒氣水從小咽乾而渴

便出腫自消

○陰黃丁香和茵陳擦如上法

蜜連潤之亦搗蝸牛圍之

熱邪傳少陰經腎汁傷咽乾而渴宜急下若寒中於下焦

偏其無根失守之火發揚於上而痛者則乾燥不渴必

有下利清穀四肢厥冷等症可辨○黃連水和蜜敷頸

蝸牛飛心煩不眠少陰當安其眠黃連煎湯入廣膠化開

麩塗頸雞子黃攪即黃氣衝不食勿強與食 田螺硝石合

連雞子黃法也傷寒熱帶小便不通田螺朴硝麝香搗

麝香以敷閉癰敷臍下無麝亦可○與後小便不通註

參看海蛤川烏加山甲以湔搗搗傷寒汗出不均腹背手

山甲各一兩酒丸彈大置足心別劈葱白蓋藥帛纏熱

水浸胸至膝取汗并治中風手足不隨及風濕腳氣等

症○須避風腫發腮頤南星黎洞傷寒發散未透餘毒

○搗搗風也積於經絡其症耳後

紅腫頭重體倦名發頤在腮曰穿腮在地閣曰穿喉皆

痰熱之毒也南星熬膏敷○又方治疔腮發頤黎洞膏

用紫花地丁蒲公英豨薟草加苦參三兩象貝赤苓川

草薺生甘草一兩五錢陳橋核五錢山甲片炮用二兩

里翁并心

三

五錢麻油熬黃丹收并治一切風毒及癰癩核○按
腮內酸痛者曰疔腮不酸痛者曰發頤輕者靛花磨鹿
角搽赤豆側柏葉雞清搗塗或絲瓜燒存雞清數重者
皂角南星糯米薑汁敷或大黃五倍白芨雞清塗醋
調壁毒攻手足黃柏沖和遺毒黃柏蜜塗或山螺同鹽
土敷馬屎煮汁漬之○按傷寒表未盡遺毒於四肢爲
羊屎注醅濕紙貼炒鹽熨之自消若表散太過遺毒於
熱流或踈或密爲冷流注宜沖和膏敷卽紫荆皮五兩
獨活三兩石菖蒲赤芍炒二兩白芷一兩也葱酒熱敷
凡病在緊要處此能驅其寒濕提移他處出毒如流注
以沖和膏厚敷卽單用獨活酒調熱塗一路其盡處以
玉龍膏燒酒敷誘之卽移法也此方并治偏正頭風及
半陽半陰冷熱不明症皆效陽症加洪寶膏陰症加玉
龍膏敷痛加乳香沒藥筋不伸加乳香若救過用冷藥
者加肉桂當歸可喚死血退黑暈○玉龍膏治陰症皮
色不變不痛者白芷晒赤芍炒一兩草烏炒三兩南星
炒軍薑煨肉桂各五錢也一無芍 洪寶膏治陽症紅
腫熱痛者卽花粉三兩赤芍二兩薑黃白芷各一兩少
林截血丹定痛消瘀卽洪寶膏也頭面傷塗頸手傷塗

腎脚傷塗腿截佳其血不來潮作傷口肉硬風襲加獨活酒敷又不消加紫荆皮末敷立愈舌欲斷者雜白皮代之塗洪寶膏止其血數日舌接去雞皮再塗數次愈○冲和性平玉龍性熱洪寶性涼臨症加減用之最妙此爲陽爲熱爲實也 柿蒂丁香點呃逆 卽呃試與亦

有乳硫

傷寒失下胃火上冲而逆者爲陽呃便不閉者

而呃者爲陰呃宜理中合丁香柿蒂散溫之扁鵲有丁香柿蒂點眼法又寒呃不止乳香硫黃或乳香雄黃酒

煎嗅 雜

病呃見後 麻黃牡蠣撲亾陽并加朮藁

傷寒下後衛虛

黨參白朮炮薑炙甘草加當歸酒芍黃耆熟地茯苓陳

皮附子肉桂生薑大棗麻油熬黃丹收備用并治傷寒

大汗後頭眩振振如倒地或肉瞤筋惕及下後利不止

凡諸大虛宜溫補者亦可加藥○撲汗法麻黃根牡蠣

龍骨糯米粉白朮藁本研撲如治亾陽症亦漏底下利

可調入前膏內貼按汗多傷血則肉瞤筋惕傷寒下利腸垢是熱下利清穀是寒若下利清水亦是熱水從結糞中走出也又熱迫血而下行便膿血者是

理論辨文

▲

卅

熱若下焦虛寒腸胃不固便膿血者是寒○方見上奔豚上冲腎積曰奔豚氣從少腹上冲心而痛

乃下焦陰如痢如疝或桂或黃痢有桂未填臍吳萸敷臍法疝氣有吳萸熨小

腹桂末糝貼臍法可通用○古治奔豚用薑附桂萸茯苓以橘核川練小茛佐之忌白朮此爲陰爲

寒爲虛也 虬上於膈揉之以椒梅此多屬寒而鮮屬

熱也傷寒吐虬屬胃虛寒者多花椒烏梅肉搗餅擦胸口虬開酸辣自安蟲悅其心或作蟲蝕

其 熏之以雄艾此或在陽而或在陰也傷寒蟲蝕肛曰狐下唇有瘡咽

乾蟲蝕肺曰或上唇有瘡聲啞亦名疔在陽在陰故有

卧起不安等此症由於失汗痘後產後內熱生蟲亦有

之○雄黃艾葉熏下部或用雄黃苦參桃仁青箱子黃

雞骨燒存裏塞○有傷寒而不必治者邪正相爭戰而

汗者解膀胱熱結血自下者愈俱詳見傷寒書惡風者避於室

見風則惡者密室中則無所惡也 此慎起居法

食復者損其穀

新瘥恣食而復者輕者損

其穀自愈 此節飲食法

有傷寒而難爲治者百不

合者若神祟治以其名

行住坐卧如有鬼神名百台病後失調有此百合煎湯浴取

和合百脈此病宜清心安神

兩相易者如女勞治從其本

病初起入

於女文移病於男名陰陽易病危症也古用燒視法或用爪甲灰皆從男女互治○桑木灰牡蠣胡椒良薑草

烏白芍藥香男以女唾調塗腎上女以男唾調塗乳上汗解○按女勞症二便不通牡蠣陳粉炮薑一兩如上

法掌上先擦熱再塗此男女之根蒂坎離之分屬也二方一理

有均爲傷寒而各治者

大頭

傷寒名瘰也冬寒反熱人受其毒至春發之因成此症先腫鼻頰次腫目次耳從耳至頭上絡後

腦結塊則止不散則成膿矣此皆風火鬱結所致頭上漫腫無頭名日時毒頭面盡腫是大頭瘰亦名抱頭

火丹俗呼狸頭瘰從耳前後腫起名蝦蟆瘰從頤頰腫起名龜龜瘰又捻頭瘰喉痺失音項大腹脹如蝦蟆亦

名蝦蟇瘟○大頭瘟初起男左女右刺少商穴大頭蝦蟇皆刺十宣穴宜夜刺但得醒鬆即可亦不必盡刺

則蚓泥

白糖或井水調掃

燕泥

醋調掃○崩裂

胡索噎膿

時毒

喉腫

喉痛者延胡錢半川芎一錢藜蘆五分躑躅花二分半紙撚蘸藥推入鼻內嚏出膿血痰涎爲度自鬆卽在上

用吐三黃解其毒

治頭面耳目鼻腫痛大黃黃連黃柏黃白芷白芨白斂白蜜調塗此方通治熱毒○又方生

地黃蒲黃牛黃米片研側柏葉和蜜敷若氣凝血滯挾

陰症者生薑蔥汁敷

夾色

傷寒名卽男女陰症於房後感寒食冷而得者則鴿

尿肚痛面青者滾水沖

鼠屎

雄鼠屎兩頭尖者醋露房

起痠

陰縮者露蜂房一個燒存研末葱丸包於陰口○按訓俗遺規云真陰症小便舉硬者是軟縮者非

二烏通其陽

便祕者川烏草烏末葱蘸寒穀道內喉管此方亦治冷祕大便不通名毒惡箭

傷寒名喉中作癢

有薄荷之吹

研末

黃耳

傷寒名寒熱

者切忌茶酒不救

有薄荷之吹

研末

黃耳

傷寒名寒熱

策不有苦參之滴水磨苦參滴耳或用猴薑按耳鳴通

安者氣散用猴薑生地汁生薑汁可參

棧針以刺赤膈赤膈傷寒胸膈赤腫疼痛頭疼身痛發熱惡寒用三棧針刺胸出血古方用

刑防敗毒散加元參升麻瓜蒌紫荊連芩芍芷可參坑砂以敷脫脚脫脚傷寒溺

陳小粉醋調敷熟伏氣咽痛腎傷寒也夏桂主之暴寒

痛處有奪命功伏於少陰經旬日始發為咽痛者俗名腎傷寒用牛夏

桂枝甘草薑汁調塗頸上及臍內再用附子片貼足心症詳前咽串氣背痛腎中寒也附椒主之薑汁調附

乾而渴椒白鹽飛麩酒涼熱雜投關格身僵者熨乾塊凡人感

和餅貼背心心腹疼痛醫家辨症不清涼熱雜投致成關格甚或僵

硬不省人事者以陳乾土磚炒熱布包輪熨氣通即愈

洗窵錄治跌壓遂寒溫不節吐利腹冷者坐深湯四時

生編治虛寒疹全痾四肢厥冷坐深湯中浸至膝上生陽之道極速然

輕症自妙若大吐瀉元氣不接者與脫陽同宜炮薑附

子敷臍腹炒葱鹽熨

之參看後霍亂註煎酒椒而散襲膚暴寒襲入肌膚

用川椒燒酒滴米醋而舒入骨風寒入骨滴醋濕青布

煎布蘸熨之

子酒燉熱久痼有攤紙而溫痛冷症寒邪久伏藏腑或

熨布上

腹冷痛附子馬蘭子蛇床子吳萸木香肉桂末加飛麩

葛汁調成膏攤紙上圍三寸許貼臍下關元氣海穴自

晚至曉可代灸百壯○虛人或用暴亾有燒薪而熱有

人參附子肉桂炮薑末納臍膏蓋

積寒復觸新寒故時痧抽吊非石硫之升頂不可起生

暴亾煨坑見前

傷寒陰毒鑑云卽痧○治陰症時痧手足抽吊者卽今

之麻脚痧等是也用硫黃肉桂丁香川附麝香糝暖臍

膏貼卽張氏所傳雷公救疫散也如症輕者用燒酒薑

汁擦手足或調川椒末官桂末再塗臍足若氣漸散當

鋪艾於臍上熨斗熨之如回陽後當救陰一法用硫

黃肉桂二錢半炮薑硃砂二錢黑附子五錢艾絨二兩

和勻布包放臍上熨斗熨之今有合麻脚痧膏施送

者亦卽硫黃桂麝等味也極驗暖臍膏方俱見下

鬼疰

一為寒疰

纏綿非巴豆之斬關焉能救絕

傷寒陰毒七八日不愈者

與鬼疰卒暴惡忤諸症同治雄黃硃砂二兩川椒桂心
羌花醋炒五錢巴仁藜蘆二錢半附子野葛七錢半共

研末頭痛嗜鼻取嚏或汗或衄即解腸脹
數胸腹痛塗臍取吐利功同太乙紫金錠

有雖為傷

寒而異治者外感常挾內傷

風寒暑濕燥火感於外者為外感七情飲食勞役傷

於內者為內傷外感宜汗宜吐宜下內傷宜溫宜補宜
和外感重者發散為先內傷重者補養為急此其大略

也東垣有內傷外感辨詳見醫書今人煎說燈油餅貼
外感挾內傷者多然挾內傷者最難治

凡內傷飲食發熱胸膈脹悶或便閉或泄瀉用亂髮酒
麴老薑胡椒雞蛋攪勻以隔夜燈油煎成一餅貼胸口

胃脘鬆即去之○治老人傷冷及難化之物生薑或紫
蘇煎湯揉擦心胃肚腹氣通即食化矣或煎湯傾浴盆

中坐揉或艾灸胃脘并肚臍氣從口鼻出立愈此穆仲
氏方二方治飽滯者若傷飢失飽胃氣空虛宜補○

凡食傷白朮二兩枳實一兩油熬丹收備用胸滿加麴
麥痰加橘夏火加黃連氣加木香虛加參芍甘薑若酒

傷平胃 勞感調榮養胃 凡內傷氣血外感風寒頭痛身

加乾葛 不可發汗宜用陶氏法黨參生地黃蒼朮歸川芎

柴胡陳皮羌活白朮防風各等分細辛甘草減十之三

加生薑葱白大棗元氣不足下陷加升麻一無生地細

辛川芎有黃柏熱甚加黃芩乃服方也然外感投補甚

難誤補之患亦同於誤表嘗用此方藥料油熬丹收貼

于胸口亦頗有驗雖見笑於名醫却不致有輕投之悔

○按古方如補中益氣六味地黃皆可熬膏貼會經試

過大約陽虛者貼補中益氣往能食陰虛者貼六味

往往能睡此其驗也膏藥力薄固不能如湯丸之補益

然眠食安而精神自生病便戒退古云先寢食而後針

藥卽是此理且與湯丸亦並不 情感要貴於達權以情

相得也如臨症加減用之尤妙 情感要貴於達權相治

見前註○此症婦人爲多一婦悲夫成病其兄畫其夫

與所私照鏡狀示之婦恚而訴悲遂減病旋愈又一婦

思慮過傷三年不寐醫云此膽虛不能制脾之思慮而

不寐與其夫議以怒激之婦汗出困睡蓋怒則膽旺而

制脾故能寐也又一婦善怒而不食醫令伶人塗朱粉

與爲角觚之戲誘其笑又令健婦啖食美味以誘其嘗

數日怒喊食進蓋肝木平而脾氣自復矣又一婦遇盜而驚自後聞聲卽倒醫作心病治不效載人曰驚者爲陽從外入恐者爲陰從內出驚則胆傷矣乃執兩手按于交倚上當前置一几謂之曰娘子當視此几猛擊之婦大驚連擊而心定矣戴人曰驚者平之平者常也常見必無驚矣夫驚者神上越從下擊几使之下視所以收神也 按此中醫理甚微且確有據非只如看花解悶聽曲消愁之常談也精於醫者應推之 陰經

反形表證

三陰表法與三陽異○傷寒傳入三陰尙有

屬陰發熱屬表仲景用附子溫經麻黃發表細辛爲導

邪出而眞陽不出是少陰不可汗之表法一云此卽表

裏傳也心悟謂此直中兼外感非傳經仲景是表裏兩

解又太陰用桂枝芍藥厥陰用當歸四逆可議陰經用

表藥例 前有麻黃附子等方後有細辛土蒸熬參薑

法宜參合用之 又冬不藏精溫症宜照此推熬參薑

汁膏敷 厥陰冷結膀胱小腹滿痛者吳黃以生薑汁陳

酒之意可推 越經導赤瀉心 傷寒邪入心經心火上偏

者用黨參生地麥冬知母黃連黃芩黑山梔茯苓甘草
犀角滑石生薑竹葉麻油熬炒黃丹收加硃砂貼心口
凡心病宜用膏黃丹能鎮心也○按邪入心經俱屬陰
症醫家習用犀角地黃而挽回者少且往往有引邪之
患膏藥大涼者與大熱者同貼於心口並能速效兩經
若當生者亦儘足以起如難下藥時此法却甚穩兩經
且存乎增變兩感症一日傳兩經仲景無**無陽者宜蒸**
無陽謂陽虛不能作汗也○按節庵治傷寒陽虛不能
作汗者用人參黃耆桂枝甘草附子細辛羌活防風川
芎煨薑大棗加炒白芍蓋補陽發表兼滋調營衛與東
垣丹溪治虛人感冒用補中益氣加表藥同意然非有
實據卓見不可輕投景岳又有麻桂大溫中等方竊謂
當遵古語無陽者宜蒸為穩如虛中風之用黃耆防風
蒸是也又陰虛人不能**臟結者宜灸**下後邪氣入裏
作汗者用柴胡常歸亦全**結者宜灸**與陽相結為結
胸與陰相結為臟結狀如結胸飲食如故時時下利舌
上白胎脇肋臍腹引入陰筋俱痛者丹用有熱胸中有
寒難治宜灸關元**刺大椎以除併病**併病刺大椎以瀉
回陽解陰結危故

太陽少陽刺肺俞以瀉太陽刺肝臟三里而杜再經

景仲

俞以瀉少陽膏藥亦可做此貼

法傷寒七日熱甚不衰恐再傳陽明鍼足三里穴○柴

二症皆不可汗下故出此治法餘詳傷寒鍼灸門

胡當歸以調血室婦人傷寒與男子同治惟熱入血室

室無犯胃氣及上二焦用柴胡生地丹皮紅花等可參

亦有謂熱入血室不宜用涼如男人陰症而用涼藥者

須時近斟酌○熱入血室月水到來用柴胡四物搗餅

貼臍亦可加藥若寒氣客於血室血凝不行作痛者宜

桂枝桃仁又血結胸血爲邪迫上人肝經聚於臍中

非湯劑可及當刺期門或蛤粉滑石敷取利痛用延胡

歸芍并泥竈土以護胎元妊娠傷寒忌汗吐下宜和解

乳沒保胎法用井底泥和入灶

心土數於臍下或加青黛又方用大黃寒之一症變

茵硝藍根浮萍蛤粉敷臍宜用前方爲穩

有萬端莫測其名孰窺其奧窮之以百問而猶未析其

疑凜之以十勸而尙恐糾其謬

李子建撰十若乃陰陽

勸不可不察

合邪營衛同病

寒傷營風傷衛

當衡緩急更量重輕傷中文會

通用

古文傷中通用仲景所謂中風卽是傷風

風寒種亦渾言

寶鑑謂傷寒有五種傷寒

中風濕溫及熱病溫病也

第傷寒見風其病猶恒而中風兼寒其患

斯劇既識傷寒須知中風風自内生亦由外致

中風有內生外

中二因內生則因胃濁生痰志極動火外中則因形氣不固感召風邪所以內生者病必痰迷不語火發神昏

外中者病必筋骨不用口眼

始兆於指旋見於身

中風之來

必有先兆如大指次指麻木不仁或手足無力或肌肉

微掣此營衛受邪外中之先兆也如上盛下虛頭眩脚

軟神短忽忽言語失常此痰火將發內生之先兆也預

防外中有羌活愈風湯卽十全大補加羌獨防芷麻細

柴前芫蔓菊薄蒼朴枳夏苓地知杞杜膏地骨防己也

預防內生有清熱化痰湯卽六君加星香苓蓮麥枳菖

薑竹茹也會治如前兆者二人因其人不耐服藥令

其以二方藥料熬膏常貼皆得無恙夫人非甚病誰甘

原苦水况奔走勞役亦無暇計及於此及一發而不收悔之晚矣貧者姑無論焉有力者豈不惜乎膏藥

而無損以之防蓋嘗察其經絡藏府之所屬口眼喎

微杜漸誠善術也蓋嘗察其經絡藏府之所屬口眼喎

不仁絡也左右不遂筋骨不用經也昏不識人便溺阻

隔府也神昏不語唇緩涎出藏也經絡淺腑藏深腑

必歸胃藏要不外乎表裏虛實之所宜凡中風牙關緊

必歸心是閉症若口開心絕手撒脾絕眼合肝絕遺尿管

如射肺絕更有吐沫肉脫髮直搖頭上竄面赤如妝汗

出如珠者皆是脫症多不救治法有解表攻裏外感重先祛

道三法內外證俱有者先解表而後攻裏外感重先祛

外邪內傷重先補中氣風症皆痰為患首宜開關化

痰急則祛風緩則順氣久則活血氣順則痰消宜烏藥
血行風自滅宜歸芍諸香散真氣羗獨烏附防涸營
耗衛牛黃水麝恐引邪入內凡中風中痰中寒中惡
將兩手中指對合縛定艾丸灸兩指中間五壯重
者并灸頭頂百會穴中腕臍下氣海穴三處神驗先通
其關中風閉症先通關川南星薄荷皂角半夏細辛喘
鼻有嚏可治無嚏肺絕不治小兒驚風亦用此試

次開其噤

用口噤用開關散烏梅肉生南星冰片擦牙其噤自開此即鑑本

治小兒口噤神方也

如口不開筋絕不治

言乎汗寒傷

蒸細辛傷寒誤服補

虛不可表者用大藥店整包細辛

而風熏者防

口中噤不

能下藥者用黃耆防風煎盆湯置床下取氣如烟亦有

霞熏之自醒又有脚踏熱水葫蘆取汗法可奈亦有

檀香之水也

棗精中風口開涎出後如有偏枯等症用

參桂枝牛膝二兩紅花五錢葱白六兩切炒預備

吐寒傷

措瓜蒂

輕劑無汗表實防風藜蘆瓜蒂吐之有

汁表虛瓜蒂赤豆加全蝎吐之或搐鼻或擦而風搐參

牙風症之吐與傷寒不同風痰非吐不可而風搐參

吹鼻取嚏參藜蘆細辛川芎生甘草一錢石膏五錢

亦有礞石之丸也

同生丹真青礞石一

此吐之重劑

亦有礞石之丸也

蘆汁中數次加豬膽汁熬冰片收臨用可
取一塊水磨滴鼻或浸紙塞鼻抵痰九
涎治一切風痰喉痺巴豆肉燒烟熏鼻妙○又巴豆壓

聖烟筒吐惡涎及血卽醒或巴豆仁搗爛棉裏兼有宜

塞鼻或巴豆明礬熬去豆取礬吹鼻非點喉蛾

滯之效卽下也○中風閉症便祕屬寒者巴豆納臍○

樸枳實者有用巴豆白芷半夏南星葶藶草乳塗頰牽

者中藏不可輕下中經絡宜宣散尤忌下

正口眼喎邪草麻仁同乳香加麝搗塗左喎塗右右喎

或塗紙上捲塞鼻如拔疔出竹木刺取療惡核皆塗

患處又口喎用葶藶仁和水片搗塗冬加乾薑附子如

用時先皂角煎以逐外風再乳香熏以順血脈或炒香

附擦亦可○牽正散治中風口眼喎邪酒調用以療內
生之風虛熱之痰者卽白附子蝎梢五錢僵蠶一兩也
此方加薄荷三兩荆芥穗防風天麻炙甘草一兩羌活
川芎烏頭藿香五錢煉密丸茶酒調塗喎處退風散熱
甚妙風而挾寒痰氣窒閉者可擦胸背與後控涎丸

用並有拔毒之能風毒攻注骨節痛用革仁乳香川烏

用麻仁桃柳桑槐椿枝加茄根煎洗效如發熱逆冷大戟

苦參酢洗南星烏頭蠟裹中風發熱大戟苦參三兩白

心煩者用防風通聖加羌活獨活天麻細辛白附黃連

烏同黃蜡融化攤手足心并治驚悸此方加附偏枯暴

子木香末即治中藏四肢厥冷三生飲法也

瘡宗氣不周於經絡則偏枯不周於五藏則瘡又偏

肺絡麻黃白芥酒敷偏枯表邪固結者麻黃或白芥子

得汗即去之按閉症發表用麻黃杏仁甘草肉桂又

治偏枯者左癱用四物右換用六君俱加薑汁竹瀝白

芥子如以麻黃白芥敷法推之亦可酌用○中風手足

香沒藥末三兩乾地龍一兩陳酒調敷痛處或用薑蔥

菲一斤白芥子蘿蔔子二兩油熬黃丹石灰收調前藥

薄荷硼砂蜜搽

舌不能言心經蘊熱薄荷硼砂青黛二錢牛黃冰片三分先用生薑蘸蜜擦舌

再以前藥塗舌

本非薑汁調塗胸附方舌本強難轉

語不正屬痰涎壅塞者

茯苓一兩蝎梢十四個研酒調

擦舌

舌本縮者醋煮白芥子數頸一周利氣豁痰最

捷

舌強龜尿管點舌下滋陰通竅效○按古轉舌膏卽

涼膈散加味心加

菖蒲遠志黃連犀角硃砂之屬肝加

青黛之類可塗胸

又舌瘡不能言足廢不能行屬腎

虛氣厥不至名風痺

當溫之用熟地巴戟黃肉菴蓉附

子宮桂石斛茯苓

苜蓿遠志麥冬五味等分加薄荷如

煎膏貼

丹田妙風而雜合寒濕者爲痺痺亦中風之一痺者閉

三氣雜合而成病

風勝爲行痺古稱走注今名流火寒

勝爲病痺卽痛風

白虎歷節風濕勝爲着痺卽麻木亦

有在皮在脉與肉

筋骨之殊忌收斂宜辛散行氣

者筋脉緩縱足不

任地也由血虛火盛肺焦傳之五藏

又陽明虛宗筋弛

縱帶脉不引故痿忌風藥及香燥溫

補痺外感痿內傷

痺多痛病久入深或不痛痿軟而

不痛痺多寒痿多

熱痺實痿虛程子痺異痿躄統言

日醫家以手足痿

痺爲不仁蓋統言也

不仁

馬華藝炒

回本膏

法擬三痺

痛風除濕固本膏

歸續斷牛膝五加皮附子肉桂三錢杏仁白芷去梢一

錢半麻油熬黃丹收貼此武本驗方○按痛風有寒有

濕有熱有血有痰之不同丹溪製上中下通用方蒼朮

黃柏龍胆草防己治濕熱南星桃仁紅花川芎治痰血

恙活桂枝白芷靈仙治風兼治寒加神麵以消中州陳

積之氣凡膏藥多通用此方可以取法三痺湯治氣

血凝滯手足拘攣者即人參黃耆茯苓甘草當歸白芍

生地杜仲牛膝桂心細辛秦艽獨活防風薑棗也原云

凡三氣襲虛而成痺患者準此固本膏即擬此方又五

痺湯用八珍去熟地加五味細辛隨五藏加藥亦可

固本加之以藥酒之擦風痛用廣東馮了性藥酒擦或

法蒸草白茄根當歸防風秦艽酒煎或木瓜麻黃海風藤

稀荻草白茄根當歸防風秦艽酒煎或木瓜麻黃海風藤

陳皮薑葱香油煎擦或用蒼朮蒼耳海風藤黃魚骨團

魚煎湯去魚洗或用金毛狗脊川牛膝海風藤木瓜熟

地歸身杜仲續斷秦朮桂枝桑枝松節酒水煎擦通治

氣血兩虛疼痛麻木加牛膠并可塗○附方前胡白芷

細辛官桂白木川芎三兩炮附子泡吳萸當歸川椒二

兩茶酒拌勻以煉猪油熬膏摩治諸風痛癢癥瘕瘡癩
折傷○白虎風水牛肉脯一兩炙伏龍肝燕窠土飛麩

各二兩硫黃一麥麩之熨走注痛芫花桑皮川椒桂心
錢水丸摩痛處柳蛙屑麥麩醋炒熨或薑蔥

鹽麩酒醋炒熨非攤席上卧能和榮衛通經絡或芫花
黑豆生薑醋拌炒熨或炭灰劫糞紅花和醋炒熨養血

安息海犀之塗生附子川椒芸臺子等分研末熱則矜
牛膠酒化調加安息香塗痛處

升熱痺用升麻爲君同羌活防風痰洗鳳槐白鳳仙槐
桂枝羚羊角犀角薑汁竹瀝調敷

花銀花水紅花蘿蔔英蒼木甘草船石灰煎洗痰塊
銀硃雄黃宮粉麝香以槐白皮刺孔盛藥覆核上火焙

二炷香或銀花酒糟濃熱敷又寒痰草烏南星白果薑
敷熱痰大黃五倍牡蠣醋敷流注大薑黃身上小釘

子研末裝紅棗內塞瘦壁東垣養陰東垣治諸痿黃柏
鼻醉汗赤漬者內消

丹溪治痿補陰丸白朮二兩生地兩半酒芍免絲子瓊
陽通板當歸陳皮牛膝各一兩乾薑黃柏炒虎骨炙茯苓

苓各五錢五味甘草炙各二錢猪骨髓腦全具又濕
熱甚者健步丸方已一兩羌活柴胡滑石瓜蒌根甘草

神論辨文
善

名五錢酒糊和丸葱白荆芥湯調用如前方用油丹熬貼後
 方外敷極妙。又泰山石刻治風疾方羌活枳殼各三
 兩北細辛香附吉梗麻黃去節防風白芍知母半夏當
 歸甘草薄荷茴香石膏各二兩天麻黨參木香兔絲子
 白朮稿本獨活各一兩全蝎僵蠶菊花川芎杜仲白茯苓
 柴胡黃芩陳皮熟地蔓荊子地骨皮官
 桂生地黃連各一兩如油丹熬貼并治痿**不僅誇金丹**
 一粒凡風痰走注腰膝痛手足癱瘓麻木不仁白虎風
 加陳墨炭乳香沒藥糯米粉丸酒調敷名捉虎丸脚氣
 貼脚心亦治流注乳岩癩癧失榮惡核一切陰疽陸本
 加熊膽一錢敷一切陽毒。治風寒濕痺疼痛麻木偏
 頭漏肩鶴膝歷節并跌打傷川烏草烏大黃靈仙寄奴
 小兒孕婦勿貼名見睨膏川烏草烏大黃靈仙寄奴
 各八錢南星半夏羌活獨活紅花當歸桃仁蒼朮白芥
 子蛇床子甘松三奈花椒皂角炮甲蕁乳香沒藥白
 芷各五錢雄鼠屎障米各一兩短髮二兩焙俱研末先
 將生薑葱白蒜白烟菜商陸鬧楊花白鳳仙艾葉每搗
 汁半斤各用松香三兩收大蒜汁二兩用松香二兩收

另用麻油二斤四兩先熬髮再熬藥勿枯去渣下松香
再下陀僧硫黃各四兩收或少加黃丹臨用慘肉桂細
辛末風而重感寒濕者爲瘰癧瘰癧類瘰癧瘰癧通稱破傷

布瘰癧身熱足寒項強頭搖口噤背反張者太陽無汗宜

汗有汗宜止通治羌活湯料分治神木白木湯料若頭

低視下手足牽引肘膝相搏者陽明宜下若一目或左

右視并一手一足搖擗者少陽宜和如傳入三陰腹滿

白利口燥咽乾舌卷卵縮難治內因傷寒雜症汗吐

後及濕家過汗或產後失血多所致宜入珍陳皮葶加

滅或用芎歸地黃防風之屬若痰火症宜枳實瓜蒌外

因潰瘍跌損狗咬貫風有之各破傷風鑑云瘰癧與瘰癧通

稱破保安力勝獨瘰癧瘰癧活獨活防風地榆各一錢

傷風杏仁泥飛麩水調塗即退保七粒塗瘡瘡初起發熱紅

腫杏仁泥飛麩水調塗即退保七粒塗瘡瘡初起發熱紅

提發汗及破傷角弓反張并敷蛇犬金刃傷出血川烏
草烏蒼朮羌活各四兩釵斛川芎當歸白芷麻黃防風
細辛荆芥首烏全蝎天麻稿本生甘草薄荷各一兩雄
黃硃砂兩頭尖各五錢末葱搗敷破傷口噤蜈蚣炙
全蝎炒加草烏天麻白芷末熱用茶調寒用酒調塞鼻

參之以椒氣之射

破傷風川椒麩裏煨俟熱透刺孔覆

中出水愈內因用

此法覆取汗并治腹痛又破傷

燒酒熱瓶拔黑水

又狗咬傷核桃殼裏人糞灑槐皮

上灸葱餅之卷

破傷為餅揭起瘡甲卷之汗愈左龍江鱧

之納破傷風入裏發

龍江魚鱧白蠟各五錢雄黃

一錢蜈蚣二條天麻

錢末加巴霜半錢防風湯丸納

下陰則附防

子防風桂枝獨活川芎五味白朮之類水

數蠮草破傷濕甘草

水調牡蠣散○瘰癧河間通聖熱

風搏用此微獨重玉真九分

破傷初腫起白痲南星防

表裏兩鮮

風等分敷一加僵蠶白芷

又白附子十二兩南星

防風天麻羌活白芷各二兩皆

生曬研敷亦治刀箭傷

馬踢物打傷未破口者醋敷有

血疤者黃連水洗酒調敷

湯火麻油敷立刻止痛止血

生肌俱名玉真散即跌破陰囊

腎干者亦劫日久濕爛

加黃丹石膏甚者加龍骨兒茶各二錢敷○三黃寶蜡
丸治跌打損傷破傷風並傷力成癆女人產後惡露不
淨致生怪症瘀血奔心痰迷心竅危在旦夕并治烏槍
打傷鉛子在內以香油燉熱化開雞毛掃患處忌生冷
涼水燒酒三日否則無効亦可內服藤黃四兩糞窖浸
四十九日用陳胆星劉寄奴紅芽大戟眞血結各三兩
雄黃二兩歸尾一兩五錢朴硝兒茶瓦楞子煨一兩琥
珀鉛粉三錢水銀三錢同鉛粉研製乳香沒藥麝香三
錢共末川好黃蜡二十四兩煉淨滾湯坐定入藥攪勻
爲丸每重五分金箔衣○九分散麻黃木鱉仁乳香沒
藥各二兩末敷治跌在上分偏正雷頭入腦則烈偏風
打損傷可配玉眞用在下辨乾濕酒脚冲心則危脚
透猪頭風之類○雷頭在下辨乾濕酒脚冲心則危脚
風頭上起塊者卽時毒在乾濕酒脚冲心則危脚
名緩風初起類傷寒表症乾脚氣不腫筋縮枯痛宜潤
血清燥行氣濕脚氣腫痛筋脈弛長宜除濕祛風酒脚
風因酒而得者脚氣冲心乃風三聖六聖喘首風三聖
之自下而上挾腎水剋心火也三聖六聖喘首風散治
頭風久不愈防風黎蘆瓜蒂喘鼻六聖散治頭風雄
黃盆硝川芎白芷乳香沒藥喘鼻亦治腫毒蟲傷按雄

黃盆硝加水磨點眼大背治白蛇纏及蜈蚣瘋犬等傷
痛一茶時卽消腫定疼三日愈名劈毒丹此方加水磨
亦可天麻硫磺作餅頭風餅子治頭風天麻川烏草烏細
松防風白芷甘草各五錢寒食麩打糊爲小餅名天麻
餅葱涎調貼太陽如火熱痰痛茶調并治婦人頭風眉
棱骨痛牙齒腫痛痰迷惡心○川椒硫
磺餅餅塞鼻或硫磺硝石硫磺鉛粉全華發薄荷爲丸
頭風熱痛猪胆汁拌薯蕷肉末晒研吹鼻或加川芎白
芷延胡青黛丸水化滴鼻咬錢出涎或用地龍人中白
羊胆汁丸全○又方冬桑葉一兩黃菊花五錢黑山梔
三錢獨活天麻二錢秦艸一錢半薄荷湯丸熱水化洗
並宜白附白附子二兩川烏防風川芎荆芥殭蠶石膏
錢草烏乳香沒藥雄黃三錢麻油熬松香黃蜡收雷頭
加黃丹少許治偏正頭風肝風血風破傷風

菜豆醋塗又沖和膏葱二妙三妙敷緩風脚氣紅腫者
者寒濕通用薑葱白芥子等敷蠶砂等熨又蒼朮黃柏
鹽酒炒爲二妙加牛膝爲三妙同何首烏黑小豆蒸熱

敷佳并 樟烏蘇合爲團 寒濕烏頭樟腦醋丸貼足心微

治痿症 言煮入瓊 金石金黃作散 甘草滑石研以馬蘭頭汁調

片收乾貼 敷治濕熱脚氣并鶴膝風等 兼用木瓜 乾

金黃散酒敷 加蒼術大黃薑汁調敷亦全 瓜四兩蒼術二兩天麻南星羌活防風黃耆肉桂杜仲

牛膝附子續斷當歸薏仁草薜石楠葉檳榔欵石斛各 一兩加熟地川芎赤芍陳皮烏藥杏仁等分 酒脚風 松

油熬黃丹收治腎虛腰膝痛并乾濕脚氣等 毛糟熨 松毛酒糟 入腦者敷鷓鴣而吹遠志 鷓鴣腦 芎

白附烏貼或遠志研末吹鼻 凡治 沖心者罨田螺而 頭風連腦者用禽獸腦同藥熬貼良 候溺出或敷股上

踏川椒 覺冷氣趨足而安亦引熱下行也 礬石方見前

○川椒盛囊踏足下或附子貼 肝風掉眩獨活定其搖

足心○脚氣從足心入宜按摩 醫書有顛振門○暈者痰因火動也亦有七情四氣心

等因 獨活爲定風草○失血眩暈龍骨或吳灰嗜心 理淪駢文 天

風癡迷菖蒲開其慧

癡者癡呆之狀此志願太高而欲不遂者多得之狂則痰火結聚所

致癩猪羊頭風也小兒爲多○丹參麥冬薄荷二兩茯

神天麻貝母半夏陳胆星橘紅一兩鬱金兩半明礬入

錢遠志七錢全蝎僵蠶甘草牙皂五錢硃砂三錢琥珀

犀角雄黃二錢石菖蒲三兩研末薑汁竹瀝爲丸如彈

大臨用薑汁化開擦胸治癩

亦治癩狂與後挂涎丸參十指風若雞爪名類從卽

用雞屎而洗線雞屎花椒枯礬煎冷兩股風如鶴膝下

洗○凡治風方可通用

達應加牛膝而敷鶴膝風症膝頭大脛細痛而無膿者

獨活元參生地熟地葶藶天麻當歸杜仲防風肉桂牛

膝之類可參入後敷藥麻油熬黃丹收貼○治鶴膝白

芷酒熬膏塗良或用甘遂大戟蜜敷或用地骨皮無名

異車前子乳香沒藥數或首烏側柏葉敷或鱉魚酒糟

同麝搗數六七日作熱効或用靈仙一兩生薑

汁葱汁熬入牛膠化開黃丹收貼并治諸風

打箭風俗名鬼箭癩風天刑大麻風俗名天刑疾乃中

打益中暗風也

惡風也此症初起必有一

處麻木針之不痛漸而白屑雲頭紫黑疙瘩破流膿水甚則眉落毛脫鼻崩肉陷唇翻眼錠全身潰爛此五藏皆壞危矣初起宜節欲斷鹽以大黃黑丑醋擦以亂髮金苦參皂刺檳榔輕粉甘遂生薑麻黃熬擦

桃葉痛拍青色即平治鬼箭風忌針以桃葉亂髮為團

熨斗熨痛薰燒洗以苧桑皮日煎洗効盡加鴿糞爛

酒拍得青色愈前胡吳萸一升芎藭二升蜀

用琥珀或爛摩黑膏可斂白膏治麻木不知白芷白朮

椒細辛三兩當歸桂心二兩醋浸藥猪油十斤熬膏塗

若徧體生瘡膿血潰壞用黑膏烏頭川芎雄黃胡粉木

防己升麻黃連雌黃黎蘆明礬五錢杏仁去皮尖巴豆

仁各四十枚黃柏錢八分松脂亂髮各一團為末猪油

熬膏鹽湯洗塗○附方槐柳桃桑楮蒼耳子地膚子煎

坐沒頭湯如油効或坐麻油中或露仙甘草或地骨皮

苦參荆芥細辛防風蒼耳子等俱可煎浴○眉毛脫落

作痒者雄黃硫黃雞殼內白皮燒存五錢炮甲十片滑

石末一兩油核桃半斤搗猪胆汁調絹包擦○面生紫

塊疙瘡山甲燒存性川椒炒二兩末搗生薑大黃汁調

里膏并之

擦○頭禿羊屎燒灰油塗○大鬪偏身者杜仲蛇床子
明礬寒水石硫黃二兩朴硝五錢豬油塗○眼努白丁
香貝母點○癩風赤游鷺掌風當歸生地一兩麻黃大
楓子仁元參防風木鼈仁五錢黃蜡熬塗○清熱解毒
用黃連五倍塗其動也無端其走也不定攻於頭面則虛而浮

客於腸胃則祕而洩行於肢節為腫為攣發於皮膚為

熱為癢要血而養血庶消風而散風

篇中皆有方用治臨症可酌用

○治風熱蘊結氣血凝滯頭目昏眩或痛鼻塞聲重牙
疼口乾咽喉不利胸膈痞悶咳嗽痰涎腸胃燥澀小便
赤黃或胃水陰虧心火熾甚瘡瘍腫毒丹疔癰疹並治
用羌活獨活防風荆穗川芎薄荷連翹細辛天麻吉更
當歸黃連梔子黃芩白芷全蝎甘草苈硝大黃元參生
地白芍知母黃柏花粉各一兩槐柳桑枝各三斤麻油
熬黃丹鉛粉收滑石石膏各四兩硃砂五錢和勻或加
雄黃青黛各一兩全此靈砂丹加味治一切風熱並効
統觀風不一風亦猶寒非一寒顯俱易明微盡難析矧

有真有正

真中風正傷寒

亦有類有同

類中風者初起皆卒倒不語也類傷寒者初起

皆有太陽表症也同傷寒者與傷寒同也類中風八中虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡也類傷寒五停痰傷食虛煩脚氣內癱也同傷寒十二冬疽寒疫瘧疫溫病熱病風溫濕溫溫毒中暈溫瘧風濕痲病也詳見

鑑本

茲合兩症與決所疑虛補其虛

景岳云凡老人跌倒多陰陽脫離宜補

煩解其煩食塞吐食

食出脉現

痰停出痰暴如惡忤

中惡蘇合丸擦

紫金錠塗

令兒尿其面

鬼擊雄雞血塗

痛若內癱

面并胸再以血滴鼻并破雞搗胸雞冷棄之

酒痺須瀉

酒濕作痺須瀉濕毒

脚氣喜通各有治法俱見本門風

於氣厥最近而痰火其著

前見

寒以時行為多

世人傷寒病少時氣

病而溫熱其變

冬寒不即發至春變為溫病至夏變為熱病又有風溫濕溫等治法詳見醫書

篇中均有方

可增減易借牛黃蘇合分涼熱之阻擦胸口以醒迷

凡中

藏閉症熱阻關竅牛黃丸擦胸寒五仙萬靈合表裏之

阻關竅蘇合丸擦胸并治氣厥者

消貼背心以達靜冬疫多寒春疫多熱○治春疫五仙膏用薑蔥蒜各一斤大黃八兩皂角

四兩麻油熬黃丹收滑石六兩攪勻貼○治冬疫五仙膏乾薑二兩大黃四兩麻黃白芷細辛甘草三兩麻油

熬黃丹收滑石六兩攪勻加紫豆皆表裏分消之方○萬靈膏元參苦參生地黃連黃芩山梔大黃當歸川芎

白芷赤芍羌活獨活防風連翹花粉吉更五倍皂角白芨白斂山茨姑紅大戟官桂草麻仁木鼈仁巴仁山甲

杏仁髮團各一兩槐柳桃枝馬齒莧各八兩麻油熬黃丹鉛粉等分松香黃蜡二兩收百草霜兩半輕粉兒茶

乳香沒藥五錢麝一錢攪勻治四時傷寒及溫熱症貼背心胸口可代羌活湯通聖散敗毒散用凡一切內外

熱病皆可貼一方無百草霜有兩頭尖五錢○又方照此加黨參熟地草烏白芍沈香丁香木香去羌獨防翹

芩梔粉吉倍芨嫩慈戟槐柳桃枝馬莧輕粉等治四時傷寒貼背心并治外症亦名萬靈膏較前方為溫顧

元虛則風走其空竅

言論而陽衰則寒泛於水藏

論而陽衰則寒泛於水藏

沈金

沈金

沈金

必明其素有而識其本來自仲景肇論諸家相承

劉李朱家

此爲大症不惜臚陳

傷寒中風爲大症故此篇首特詳之使學者知外治非苟且從事也

其他諸症則略焉篇中不能具載舉一可知其三者也

亦足見治風寒之兩門而非

僅守感冒之三法

三法一避風二靜臥三耐餓感冒輕症不可輕服藥發汗恐不得其宜則

惟泄其氣而虛變生他症故夏至陰生金爲火燦內寒

外熱心旺腎衰其氣多虛其毒彌烈

詳見醫書。夏月病熱爲暑暑者相

火行令也寒傷形故無汗暑傷氣故有汗外症頭痛口

乾面垢自汗嘔逆泄瀉少氣倦怠其大較也有餘症者

後有傳變也元氣虛人每有一時不救者與傷寒陰毒

害人實同不可不慎。暑邪傷在分內爲傷暑傷及臟

府爲中暑尋常嘔吐泄瀉爲冒暑夏月受暑爲風寒所

固至秋冬始發爲瘧痢霍亂者或由曝衣曝書未盡之

食爲熱傷元氣卒倒搐搦者爲暑風暑風中臟多不救

口噤者爲暑閉用藥不開者亦難救傷暑者因寒而中無汗卽是傷寒

高堂陰寒所偏暑不得越反中入內致頭痛惡寒中暈發熱無汗者爲傷暑陰症也與傷寒同治宜溫散

者由熱而傷大渴斯爲中熱跌倒致頭疼煩躁肌膚大

熱大渴爲中暈陽症也審其暑先嗽齒而入直傷心包

絡經故受暑急嗽口凡且澆臍中熱倒者忌飲涼水

中暑發昏非水滴兩乳或嗅皂角末通竅或大蒜搗泥裏

塞鼻再取途中熱塵土或田中泥漿積心口及臍上作

一窩使人尿昏暈絕則熏蘇白檀中暑挾虛暈絕者沈

其中心白醒蘇合丸際之并用香薷黃連煎水搨胸煩悶甚則塗

調黃土中熱口渴面赤煩躁欲死掘地深尺餘取淨黃

湯者用天水散滑石甘草煎水熨并敷臍腹麩可涼敷黃龍之

丸盡試

暑症身熱頭疼狀如傷寒煩渴嘔吐昏悶不食

井水調敷腹即黃龍丸也。田螺三枚搗爛入青鹽水

三分攤膏貼臍下一寸三分治受暑二便不通者

能溫熨中喝熱湯熨氣海固元氣

白虎之湯宜行

見上虛加

煎熨症以蒜

擦脊骨三關悉開

凡人遇春末夏初頭痛脚弱食少身熱為疰夏病屬陰虛元氣不足宜於

午日午時用漂硃砂明雄黃舶硫黃各一錢研末燒酒和勻用大蒜去蒂蘸藥從尾間脊骨起徐徐逐節擦上

此藥能開背後三重關竅令人神清氣爽經絡流通大有益處癆症不論新久皆能除根擦時有腫痛乃蟲所

在切勿

放鬆 痧以油刮背心五臟咸解

陰痧腹痛手足冷燈火爆身上紅點陽痧

腹痛手足暖以針刺十指尖臂上腿灣紫筋出血或用鹽擦手足心莫妙以磁調羹蘸香油刮背蓋五臟之系

咸在於背刮之則邪

霍亂浸陰陽之水

傷飲食外感風

氣隨降病自鬆解 寒陽不升陰不降乘隔而成濕土為風木所克心火上炎則吐者喝也脾濕下注則瀉風急甚則轉筋轉筋

入腹則斃。又身熱口渴，渴氣粗，暑也。體重骨痛，濕也。唇

青，肢冷，氣少，寒也。無此數症，是傷食。又煩渴者，熱也。初起不渴，損傷津液，則渴。此症寒熱倉卒，莫辨，不可

偏重。粥湯薑湯熱湯下喉，卽斃。古有大盆陰陽水浸足。法或入胡椒、菜豆、黃半夏兼填。填臍內吐瀉，點日月之

連乾薑皆寒熱並用。半夏兼填，通陰陽。吐瀉者爲霍丹。邪在上焦，吐下焦瀉。中焦吐瀉，交作。吐瀉者爲霍

氣痛絞腸痧，霍亂吐瀉，轉筋，點眼并淹，跌絀，尙未絕者。麻辣淚流過腮，卽愈。立秋前一日，晒用雄黃、礞砂、朴硝

冰片、麝元明粉各等分，研此方去元明粉，加枯礬、乳香。沒藥、硃砂卽人馬平安散。按乾霍亂宜薑擦燒鹽湯

探。藿香并塞鼻。治霍亂吐瀉腹痛，蒼朮、藿香、陳皮、半

晚蠶砂二兩，生薑、葱白各三錢，炒熱布包熨妙。按陳

脩園論藿香正氣散云：凡四時不正之氣都從口鼻入，與邪傷經絡者不同，故只用芳香利竅之品，使邪從口

鼻入者，仍從口鼻出也。若夏月吐瀉多屬伏陰在內，宜

理中法。此雖外絞腸芥子填臍炒鹽頓其胸，凡腹痛多

治亦不可不知。

使秘者熱腹痛腸縮則絞。先用白芥子或鬱金烏藥
細辛木香降香沉香砂仁丸納臍炒鹽包頓胸或鼈臍
以碗覆之如身冷汗出者加吳萸炒熨胸背兼治轉筋
○脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胸痰塞用丁香
七粒苜蒲根五錢炙草一兩生薑三大片鹽一合炒熨
○附西醫治霍亂法云此症服藥緩不濟急用熱手搓
擦周身外皮令熱濃芥末略用麪粉滾水攪和貼臍
或布包裹熱磚足踏之以傳溫熱蓋熱則血通行可救
或令二少男前後抱住病
轉筋大蒜塗足煮醋抹其腹

轉筋因津液傷宗筋不潤所致古用轉筋飲卽木瓜吳

萸食鹽也。按寒則筋攣轉筋者繫其腿脛勿令入腹

或用熱醋煮青布抹胸腹或蒜鹽敷臍或蒜泥或加黃

蜡塗足心南星醋塗足心或木瓜或香櫟煎湯揉或蘇

合丸擦如轉筋已死心下尚溫者用殊砂二錢和黃蜡

三兩燒烟熏口鼻并臍更貼手足取汗。夏月霍亂最

多傷人甚速服藥殊不易外治穩而效。錄前賢辨症

并附列各方以備擇用焉下如痢瘡等症詳註亦以此

鑽心嗜雷火之方
是挑胸背紅點再用半夏製木香三

錢細辛牙皂三錢五分明礬二錢五分藿香吉更薄荷
貫仲白芷防風甘草二錢枯礬五分研搗鼻并治諸疔

○挑法詳 吊脚糝雷公之散 見前時疔生 瘡吹靈寶 疔

熱病即暑濕所蒸山嵐之氣也靈寶如意丹吹鼻用茅

山木六兩真藿梗三兩真蟾酥沈香檀香丁香木香麝

香明雄硃砂各六錢治一切感冒風寒暑瘴九種氣疼

痰迷心竅各種疔氣小兒急驚并一切疑難雜症俱効

此方一種扁堂去藿梗沈檀加山茨姑一兩石菖蒲炒五

錢又一方只去藿梗檀香 卧龍丹寶花散黑疔藥白

疔藥等 茲 穢塗玉樞 暑穢之氣也夏月出門 清泄利 瀉

脾濕不能滲泄致傷關門元氣不能分別水穀併入大

腸而成瀉瀉雖風寒暑火痰食不同未有不由於濕者也

治以滲濕利小便為主 凡水瀉腹響不痛者濕也痛
甚而瀉瀉而痛減者食積也瀉時小腹痛腸鳴痛一陣
瀉一陣者火或瀉或不瀉或多或少者痰完穀不化者
氣虛也又痛而便帶清血者風也悠悠腹痛瀉無休止
面色青者寒也煩渴 冰赤自汗暴注無度暑也○痢由
暑濕痰食積滯而 肚腹疼痛大便裏急後重小

便短赤不長治法先治暑六一散至妙初起踈通積滯

久則清熱解毒兼理脾胃忌升瀉赤屬血分根心白

屬氣分根肺或帶黃色則病因酒食痰涎而根於胃

腹痛者肺氣鬱在大腸實者下之虛者吉梗發之忌參

著裏急後重者火熱清之氣滯調之積滯去之氣虛

升之噤口者胃氣下陷而不食不冷熱毒上冲不食

宜解毒若寒氣逆上作吐者宜溫如白蔻之類膿血

痢與赤痢不同前是濕此是火五色痢屬五藏熱多

寒少宜通利休息痢屢止屢發或補澁太早滯未清

或失調養氣血不斂瀉病在中焦痢病在下焦由肝

腎而遞于大腸宜調理真陰助理氣化爲主痢久傷

腎宜峻補元陽瘥後痢痢後瘥均以虛論瘥痢並

作先治瘥下痢身涼能食小便通易愈身熱多汗渴

甚小便不利手足冷兼氣微喘不食者危○小兒刮腸

痢及滑腸痢皆惡候○而熨平胃散於腹蒼木厚朴陳

痢症繆倪二家論最精○而熨平胃散於腹蒼木厚朴陳

皮甘草炙各一兩布包放臍上熱熨斗熨之偏藥氣入

腹更放枕邊嗅其氣卽開胃思食良法也如治瀉加猪

苓茯苓白木澤瀉官桂如治痢加羌活草烏黃連吳萸
大黃枳殼當歸白芍黃芩木香檳榔尤妙○又平胃散

去甘草加山查炭車前子末治水瀉。平胃散加減治

血痢用白朮厚朴陳皮甘草一兩木香檳榔三錢桃仁

黃連茯苓黨參當歸生薑髮團各五錢煎以牛膠入黃

丹收貼如實者加大黃。平胃散治甚多如加黃芩烏

梅卽分以車苓水瀉車前子水調敷臍寒瀉車前子肉

治瘧桂末或白芥子末或胡椒末或薑汁調

官桂厚朴末或丁香枯礬末或胡椒大蒜葉吳萸灶

心土均納臍熱瀉車前子搗汁調甘草滑石末敷臍或

猪苓地龍針砂末葱汁調敷臍針砂消積平肝或滑石

一兩丹皮汁浸煮收乾加酒芍五錢炙草二錢炮薑五

分水調敷臍。氣虛暴瀉硫黃枯礬砂通以巴黃

丸納臍瀉不止艾一斤坐身下火烘脚痢

巴霜胡椒靈脂乳香沒藥麝糯米飯丸珠衣納臍或巴

霜黃蠟丸納臍瀉中有瀉也上用暖臍膏蓋再加木香

丁香百草霜杏霜肉蔻霜丸卽治冷積瀉痢方雖用巴

豆不瀉可悟用藥之法。熱痢大黃末水丸納臍

方大黃蒼朮生香附熟香附生靈脂熟靈脂各四兩羌

活二兩川烏黃柏延胡黃芩枳殼檳榔青皮陳皮當歸

酒白芍皂角菖蒲車前子各一兩黑土煨黃連吳萸木香

薑黃僵蠶蟬蛻各五錢滑石四兩生薑蘿蔔子各一兩巴仁

七錢麻油熬丹收貼此方行氣而不泄或加水煎山甲

○附方痢紫黑者熱茜草梧葉煎湯浸足痢後裏急

後重黃耆防風枳殼煎熏并洗氣虛者最宜又西醫治

裏急痛苦者鴉片水及麥漿溫水裝水節射入肛門或

用鴉片丸塞坐熱水中熏洗虛寒痢胡椒鯽魚搗散

臍或官桂針砂枯礬研凉水調敷臍白痢吳萸六一

散敷紅白痢吳萸黃連木香敷噤口痢菖蒲擦胸

或黃瓜藤燒存香油調貼臍清熱或用炭盆噴醋開胃

或川芎莢附子末醋調敷足心引熱下行或用白芥末

貼小腹并臍如熱不可當放下口中不辣再敷取效止

或用癩團一個破腹加麝搗敷臍或田螺薑葱豆豉搗

數或田螺同細辛肥皂三錢葱三根酒藥半個搗敷俟

乾搗去熱毒既解自思飲食○滑腸痢葱椒搗塞肛門

○大孔痛者麻油炙枳實熨或用黃蜡艾葉詞子肉燒

熏瀉毒以木鼈水瀉木鼈仁丁香口水調納臍洩氣愈

痢木鼈仁一兩山甲五錢香油熬黃丹收或加大黃牙

皂僵蠶一用木鼈仁杏仁挑柳枝麻油熬黃丹收乳
香沒藥調槐枝攪麝香和
灰松香樟腦雄黃硃砂并治跌打
一用蠶葱蒜熬膏入猪毛
一用靈仙草仁木

髓仁乳香沒藥薑蔥麻油熬丹收松香
黃蜡攪數方可併用或加黃連阿膠
烏梅塞肛門通大便亦能止瀉痢
盆湯坐熏清熱解毒亦可同蠟牛麩
痲寒宜附子○按
痲有似痲非痲者裏急後重或胃氣
泄或下多亾血所致宜升提補瀆者
邪氣墜下圓後不減虛
坐努責圖後卽減爲異膏用回春
煨龍骨二兩乳香沒藥五錢熬膏貼
蔻仁末○按瀉痢聖餅子用黃丹定
麩和搗貼臍甚妙如加和痰瘧暑
入瀉痢膏中作收亦良和痰瘧暑
由中氣不足脾胃虛弱暑邪與風寒
痰不成瘧無食亦不成瘧治宜清暑
胃爲主初當汗解無汗要有汗祛邪
輔正爲先○瘧者少陽也出與陽爭
爭陽勝則熱雖純熱無寒爲痺瘧純
皆自少陽而造其極偏補偏救弊亦
陰陽和而瘧自己矣○三陽氣分受
受病自臟達腑傷重○三發後可截
截早邪閉截遲人

虛○勞瘧寒熱微微寒中有熱熱中有寒最難愈○
久瘧腹有痞塊名瘧母○瘧變痢為重痢變瘧為輕○而

東常以飲於臍老年患瘧畏服藥者常山草果陳皮甘
草炒嗅不必煎食亦愈卽常山飲也此

方加蒼朮檳榔半夏川芎當歸荆芥防風知母杜仲一

錢烏梅五錢先一二時炒熱捆縛臍上并以三分填臍

眼其發必輕再發再捆愈良法也一用草果常山丁香

全則截法也此與治痢平胃製法皆名醫所傳以代

內服者用古湯頭而外治實疏以柴青治瘧發汗法柴
胡一握搗爛絹

開無限法門諸症可做此用柴胡當歸知母山甲煎

包擦周身得睡有微汗解或用柴胡當歸知母山甲煎

湯新棉花或布蘸髮背○脇痛青皮炒熨○瘧者肝積

柴青疏肝調以貝夏薑汁貝母半夏為滋陰以鼈甲首烏全

臺治時氣瘴氣黃病核瘧赤白痢用鼈甲茵陳梔子苾

硝各二兩大黃五兩常山杏仁炒各三兩巴豆一兩豆

豉一兩二錢人嫌其峻不用油熬丹收貼佳○勞瘧表

裏俱虛少勞復來鼈甲醋炙四兩川芎當歸青皮陳皮

白芍半夏茯苓烏梅生薑一兩油丹熬寒多加草果熱

多加柴胡○瘧母鼈全個青皮蓬朮皆醋炒當歸三兩

山甲土炒一兩油熬久以白椒截之久瘧用白胡椒末

丹收或加莧并治癰效或加草果巴豆未貼背後第三

第三骨節并貼臍上效或加草果巴豆未貼背後第三

骨節或加靈仙吳茱萸丁香官桂貼并貼臍兼治感寒水

泄○附截瘡方一蠶汁化牛膠攤細布一長條從衣領

起至尻骨止先將皂角水洗過再貼并敷兩膝蓋效一

用川椒雄黃桂心麝納臍膏蓋之一用巴霜飛麩貼額

上塞耳先用胡椒硫黃糝膏貼命門穴一用蜘蛛人言黑豆

敷臂上內關穴或用桃仁十四粒全一用大蒜胡椒百

草霜凡縛於曲澤穴內關穴在腕上積三個中指長卽

是曲澤穴在臂膊灣上三寸是一門馬齒莧或旱蓮草

頭搗數寸口古錢壓定起泡挑破愈名天灸○陰瘡用

春雷九巴豆東桂枝南明礬西青黛北雄黃中各五錢

麝香東硃砂南白芷西黑附子北硫黃中各一錢配五

方之神午日取五家粽子爲丸男左女右棉裹面東塞

鼻發過除出如法塞三次永不發醋洗收藏可治三

人○久瘧經年寒熱連綿體壯實者生薑汁燒酒麥麩

搗勻作餅七枚塗天柱頸骨及背心胸坎臂鷲腿灣七

處再用斑毛巴豆霜蟾蜍硃砂雄黃麝肉丸棗豆末

貼眉心神庭穴名眉心膏周時揭去投河中。久瘧人
虛嗅甜肉桂或塞鼻則寒自退熱白輕神爽氣清思食
而愈。脾寒虛瘧附子末溫酒調塗背或塞鼻塞後
勿食湯水過時即愈一加雄黃樟腦。黃丹拿法見前
○按截瘧只用白胡椒一味已効茲備錄多方者以
見貼穴之不同而用法之無窮所以啟人之悟也膏

資林屋林屋山人陽和膏新鮮大力子根葉梗三斤白

草烏附子肉桂官桂枝末當歸地龍殭蠶赤芍白芷

白芨白欽二兩川芎四兩續斷防風荆芥靈脂木香香

櫟陳皮一兩入油熬要老下乳香沒藥末二兩蘇合油

因兩攪臨用加麝香貼此方治三陰瘧効并治一切陰

疰惡毒濕由弱積而為水則濡其脾內因生冷酒麪

凍瘡宜實中淡味滲泄利小便外因陰雨濕地宜汗散久則

疎通滲泄之。凡濕皆神病在經發熱在關節痛在蔽

府脹。凡濕以尿赤口渴為濕熱尿清不渴身體冷痛
為寒濕。古方燥濕蒼朮黃柏參濕車前滑石又上用
平胃下用五燥屈金寒復而為火則槁其肺外因燥台
苓皆藥例
且前并之

乾燥令人狂惑內因七情或吐利凶津或金石炙燔酒漿耗液或房勞竭精皆宜清熱潤燥此症雖有風燥火燥熱燥氣虛燥之殊要皆由血少火多所致按丹溪曰病皆由外感內傷生濕生火濕而生熱火而生痰四者而已少壯新病則燥其濕清其熱瀉其火豁其痰無餘蘊矣老衰久病攻半補半焉又曰肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火生燥是濕與燥相為對待也故合論之又龔氏曰寒濕屬陰燥熱屬陽人病不過二者而已燥熱以通聖散泄其陽寒一則收濕以五積散散其陰膏亦可合○又燥屬金寒一則收之以瀝青赤豆瀝青膏治濕第一生薑葱白韭白大蒜燒酒米醋童便各一碗按次第製松香一過再用水熬川烏草烏蒼朮白芥子草麻仁官桂乾薑髮團各一兩廣膠四兩樟腦一兩和勻以前製松香收布攤貼○此製松香法甚佳可多製備用○通治濕熱除濕膏羌活草烏蒼朮防風黃柏靈仙甘遂大戟葶藶半夏川芎厚朴檳榔澤瀉白芥子赤苓各二兩黑丑煨白木草麻仁赤芍乳香沒藥黃芩陳皮皂角梔子生薑各一兩油熬黃丹收滑石四兩松香六兩攪內症貼臍外症貼患處

或加黃連大黃。各種濕熱羌活獨活大黃當歸赤芍
白芨白朮商陸馬前子草麻仁男髮麻油熬黃丹收亦
治腫毒未成消已成愈。濕熱凝結川烏草烏五加皮
官桂文蛤白斂花粉一兩陳小粉炒黑一斤醋熬膏貼
并治跌打腫毒。頭面帶重者赤豆啗鼻出水一則滋
肚腹腫脹者赤豆敷臍行水。寒濕見風痺門一則滋
之以地黃元參精血內燥熟地當歸山藥杞子黃柏知
母莢肉白芍生地元參從蓉麥冬花粉

大冬黃芩一兩五味紅花生甘草五錢麻油熬黃丹鉛

粉各半收石膏四兩攪勻攤貼胸口可以止渴生津貼

丹田亦潤腎燥。老人頸燥血虛也地黃汁塗。鼻燥

肺火也元參浸塞或用生地黃連黃柏薑黃當歸尾香

膏塗首蒙肢倦欲升陽濕在上則首如物蒙脾胃有濕
則肢倦。陰濕挾痰頭重麻黃

根苦丁香羌活連翹赤口渴洩多思減水渴而多飲為
上消肺熱消

豆末啗鼻。脾用平胃渴而多飲為
上消肺熱消

穀善飢為中消胃熱渴而尿數有膏油為下消腎熱。

黨參苦參黃耆生地熟地天冬麥冬五味枳殼花粉黃

連知母茯苓澤瀉山藥牡蠣烏梅乾葛浮萍各一兩雄
猪肚擦淨裝藥油熬丹收益元散攪。消病傳為脹滿

發為癰疽

強中難治

同蕎麩水和餅飯

上蒸熟掩臍上

茵硝甘草五錢煎湯摩腹或

熬膏貼

著皆中

濕之病

皴揭也

香升麻香油

熬黃蜡收塗

○陽氣有餘即是火

怒肝火動悲哀肺火動房勞腎火動心火能自焚

火心為君火

者駭於心

亦皆以平心火為主

亦為元氣之賊

熬真陰陰虛則病

遂丑之餅只可掩臍

治濕氣腫脹并脚氣等

歸硝之湯亦宜摩腹

甘遂白丑黑丑頭末煨

大腸燥結當歸

二兩大黃一兩

此類方宜於外治

如其身體重者

面色浮澤

及身體重

糟納其脚

中濕以糟坊中酒糟蒸熨

即納脚於酒糟中汗愈

若使皮膚

皴揭也

蠟潤其肌

當歸紫草奶酥油麻油熬黃蠟收塗

或麻黃羌活防風當歸白芨白檀

火生於氣

火陽氣也與水對待陰陽和平

少火生氣陽盛陰虛旺火食氣

有君

五志過極皆為火

凡見喜怒悲思恐之

至於勞者傷於動動便屬陽驚

者駭於心

心為君火

五志過極皆為火

凡見喜怒悲思恐之

者駭於心

心便屬火

五志過極皆為火

凡見喜怒悲思恐之

者駭於心

龍雷之火

即陰火也

五藏起相為煽

者駭於心

五藏皆有火相火動五火隨之**火盛者**如頭目赤腫口渴引火湧泉

穴**津塗**凡火盛不能驟用寒涼又不可純用寒涼附子未津調塗足心引熱下行至妙虛火假火亦可

用○通治實火大黃當歸生地各二兩黃柏黃芩黃連

犀角柴胡乾葛薄荷連翹赤芍梔子知母黑丑各一兩

收石膏滑石各四兩攪一有生甘草**兼滋其腎**風火熾盛當用

元參生地滋水陰火上**火衰者**凡命門火衰真陽補火

沖宜用黃柏末塗臍下**湧泉膏**用海龍或海馬一對附子一兩零陵香

求龍馬山甲瑣陽各三錢油熬黃丹收槐枝攪下陽起

石冬蟲夏草末高麗參川椒丁香攪勻貼足心少年勿

用徒起泡無益也一用海馬鹿茸人參大茴菴蓉熟

地地龍麻油熬黃丹**熱**因於火半表裏氣血虛實之分

收沈香肉桂糝貼全**熱**因於火半表裏氣血虛實之分

○凡輕按熱者在皮毛血脈主心肺日中日西尤甚重
按熱者在筋骨主肝腎寅卯時亥子時尤甚不輕不重
中按熱者在肌肉主脾夜尤重○五藏陰也陰足而熱
反勝之爲實熱陰不足而有熱爲虛熱○能食口渴便

秘爲實不能食自汗短氣爲虛。發熱惡寒者發於陽。無熱惡寒者發於陰。惡寒非寒明是熱症惡熱非熱。明是虛症。○久病非寒暴病非熱。○均宜詳辨。○表熱宜柴胡裏熱宜黃芩氣實熱石膏知母甘草血實熱大黃當歸白芍甘草氣虛熱當升陽以散之。著木升柴之類。血虛熱當滋陰以降之。二地二冬知柏之類。外治方少故略引藥例以備用。○治心肺胃肝胆腎熱及上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等症薄荷八兩生地六兩麥冬四兩當歸柴胡蒲黃木通各二兩黃蓍黨參黃連生甘草酒白芍各一兩麻油熬黃丹收阿膠一兩。有晝熱夜熱子午之熱。晝及晝屬陽在氣分日夜攪貼。有晝熱夜熱子午之熱。晝及晝屬陽在氣分日夜發熱日重夜輕口中無味屬胃虛。午後發熱夜半則止。口中有味屬腎虛。潮熱無時爲外感爲實潮熱有時爲內傷。四肢鬱常不伸。○凡五心熱者心火陷於脾也。爲虛。○四肢鬱常不伸。○火鬱症屬內熱外寒四肢主脾肌筋骨熱如燎者由血虛而熱伏脾土或過食生冷抑遏陽氣於脾土中也。○火鬱發之柴胡防風升麻葛根白芍甘草。虛熱者退熱膏育露點。五蒸皆嗜欲勞傷水。草葱炒熨。枯火炎從腎起故曰。

腎蒸八月一日收取百草頭上露水點膏盲穴名天灸
以愈爲度膏藥亦可貼○婦人骨蒸勞用黨參生地熟

地二兩酒芍柴胡炒防風秦艽赤苓地骨皮丹皮麥冬
當歸貝母知母胡黃連一兩薄荷甘草五錢加鹽肉四

兩猪胆一個猪脊筋一大條麻油熬黃丹收貼前後心
或加烏梅三個○治骨蒸雄黃一兩入童便一碗研汁

用炭火燒過方圓一尺黃理石一塊將汁淋上墊薄毡
片病人脫衣圍被坐勿洩氣 此類方雖古傳有效却

不如膏藥爲便然因是而知外治之并清其心 熱出於
法焉則亦變化之所由生也故存之

熱只在清心用燈草麥冬煎湯入蜜調黃連末敷胸
口若心火亢極宜敷稍黃折之相火熾甚則用歸地實

熱者瀉熱取犀羚 犀角屑羚羊角屑黃芩蒲黃牛黃雄黃
硃砂水麝爲丸金箔衣臨用糝膏貼或以一丸

研雞子清和密調塗心口亦治諸外症熱毒佳 雜四時

有感而六淫以名 六淫謂風寒暑濕燥火也自前風首
人身也本寶鑑內景外形雜症而小變之○五行之氣

合於四時若有淫迫能爲臟腑之病淫有餘也迫不足

里育作之

也又運氣司天在泉六淫
夫人身一小天地
人身之氣通於天地

為病均詳內經茲不備載
如經言天氣通肺地氣通
通脾兩氣通腎六經為川
腸胃為海九竅為水注之
皆是○又人之呼吸即天
地闔闢之機也故曰小地

○脩養家有小周天法
閉目靜坐鼻吸清氣降至
丹田轉過尾間隨即提起
如忍大便狀自夾脊雙關
透上

道至泥丸轉下鵲橋汨然
嚙下仍歸丹田患在何處
收

氣即存想其處放氣則歸
於丹田患在偏身當分經
絡

法合用
吾心乃大君主焉
心者君主之官神明出
胞絡代

行其事
膻中特重其官
膻中者臣使之官喜樂出焉

膻中即心胞絡臣使對君
主言又胞絡者命門之系
經

云七節之旁中有小心代
心行事故曰小心吾人一日
動作云為皆此命門之相
火也心堅不受邪凡心病
皆

胞絡病若邪中於心立死
○少陰經神門穴在掌後
銳
骨端又治手少陰者即治
心胞絡經大陵
係心胞經穴在掌後兩筋
間橫紋陷中
暉
清淨

之理

此以下一切使心地清淨藥未入口病已愈矣又素問

恬澹虛無真氣從之精神內守病安從來定觀經云無

所望凝迴脫塵病訓俗篇云病人但寫一死字着心頭

卽易愈皆是清淨之理。按人在病中百念灰冷雖有

富貴欲享不能反美貧賤而健者此卽悟境也及病小

愈旋復忘之此所岐伯傳摩浴之文內經摩之浴之摩

以終無清淨時也。取內取外取以球其過能勝毒

者厚藥不能勝毒者薄藥上取頭面咽喉也下取少腹

脛足也內取切脉虛實也外取形色也一日按摩針灸

也一日漬形爲汗也。又病上取下通也病下取上升

也病中傍取謂病在中而經絡行於左右針灸髮藥旁

取之如病腰取膈也。經又云風寒客於人毫毛畢直

皮膚閉而爲熱當是時可汗而發也或痺不仁腫痛當

是時可湯熨及火灸刺而去之弗治病入舍於肺名曰

肺痺發欬上氣弗治肺傳之肝名曰肝痺一日厥脇痛

出食可按若刺耳弗治肝傳之脾名曰脾風發癰腹中

熱煩心出黃可按可藥可浴弗治脾傳之腎名曰疝瘕

少腹宛熱而痛出白一日蠱可按可藥弗治腎傳之心

少腹宛熱而痛出白一日蠱可按可藥弗治腎傳之心

病筋脈相引而急名曰瘈可灸可藥弗治滿十日法當
死腎因傳之心心卽復反傳而行之肺發寒熱法當三
歲死 其卒發者不必治於傳或其傳化有不以次者
憂恐悲喜怒令不得以其次故有大病因而喜大虛則
腎氣乘矣怒則肝氣乘悲則肺氣乘恐則脾氣乘憂則
心氣乘矣 按風寒爲外感故傳之緩曰三歲者亦大
略言之也憂恐悲喜怒爲內傷此五志之火觸發無常
故病加重喜爲心志腎氣乘虛克之水克火也餘倣此
又急傳者是大氣入臟如心病先心痛傳肺咳傳肝
脇肢滿傳脾閉塞不通身痛體重傳不已不滿十日死
肺病先咳肝病先脇滿脾病先閉塞皆倣此推。經又
云病始可刺其盛可待衰而已其有邪者漬形以爲汗
其在皮者汗而發之其慄悍者按而收之其實者散而
瀉之血實宜決之氣虛宜掣引之 漬形如布桃枝煎
湯液以蒸浴也按收按摩收引也決當是決刺掣引疑
亦卽導引之謂。此經言外治也曰上取下取內取外
取曰按摩曰蒸浴曰湯熨曰火灸曰針刺統外感內傷
之症汗下補瀉先後緩急虛實寒熱之治無不畢備其
中是誠萬古不易之常道與湯藥相輔而行者也引而
伸之足盡醫學之變今人專主湯藥實爲闕典茲特詳

錄經文於註內以俟後之能闡發者。又按史記扁鵲對桓侯問云疾居腠理湯熨之所及也。在血脉鍼石之所及也。其治號太子死令弟子子陽厲鍼砭石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹爲五分之熨以入滅之劑和煮之以更熨兩脇下太子起坐是熨法不獨治腠理也。扁鵲非虛試史公非妄載也。今人用鍼而不用熨何也。至太子起坐後更適陰陽服湯二旬而如故則病後調攝之法也。外治之足以起病亦明矣。至云越人非能生死人當生者能使之起耳。此直扶醫之真諦見醫無可矜之功。卽諺藥醫不死病之說也。然則人果當生外治亦能取效。人不當生雖日服藥何濟乎。毋自我而死可矣。按摩補五臟法。熱摩手心熨兩眼。每二七遍使人眼目自然無障翳。明目去風。頻拭額上謂之脩天庭。連髮際二七遍。面上自然光澤。又以中指於鼻樑兩邊措二三十遍。令表裏俱熱。所謂灌漑中州以潤於肺。以手摩耳輪不拘遍數。所謂脩其城郭以補腎氣。以防聾聵。亦治不睡。按氣血流通卽是補。非必以參苓爲補也。導引去五臟風邪積聚法。肺臟正坐兩手據地縮身曲脊向上五舉亦去心肝邪。或反拳旋脊脊部也。心藏正坐握拳用力左右互相等。或一手

脾臟大坐伸一脚屈一脚以兩手放後反掣或跪坐兩
手拒地回顧用力虎視○肝藏兩手抱項左右宛轉或
兩手相重按左膝左捩身按右膝右捩身又瞻胸平坐
合兩腳掌以兩手挽腳腕起搖動爲之○腎藏握拳挂
兩肋擺撼兩肩或以足前後踰○又導引諸法一以
兩手掩耳將第二指壓中指彈腦後骨去頭腦疾一
兩手握拳以鼻收氣運至泥丸卽向天託起隨按頂上
或左右膝上一閉一口氣將左手伸直右手作攀弓
式以兩眼看右手左右各三次去臂腋疾并瀉三焦火
一平坐伸足以兩手低頭攀足却鉤所伸足屈在膝
上按摩之○一以一手託腎囊一手摩臍下煖腎固精
并擦背後腎堂及命門穴一摩來脊穴此穴在背脊
下大便之下統會一身氣血并療痔一兩肩扭轉運
動膏肓穴除一身疾一合掌並兩足蹲身虛坐起三
躍○凡肩臂病兩手交捩或左足前踏左手羅向前右
手擺向後右亦如之○凡腿膝疾一足立定一足灑之
或兩足相紐而行前進後退各十數步或高坐伸足兩
足紐向內復紐向外○又方如風寒發汗盤脚而坐又
手攀腦後風門向前叩首幾至於地或縛軟竹片爲弓

平身正立作開弓式口中徐徐念一二三四五至汗出
止。氣逆呃忒兩手據地伸頸張口作虎形卽止或據
案亦可驗過。吞酸於肝經肺經二穴拍之九九擦亦
九凡病皆可擦。痞塊左手向前上伸右手向後下
伸閉氣一口扭身轉項各十七回俟後內微覺响聲身
熱乃止。霍亂轉筋用腳踏實地或男挽其陰女牽其
乳近兩旁。腰痛曲腰合掌左右搖擺或起立據床拔
身左右視背或病人正東坐收手抱心一人於前據躡
其膝一人後捧其頭牽令偃卧到地三起三卧愈。轉
脬蒲黃一斤縛腰間以頭數向地取通數方皆是導
引之法可參。按莊子呼吸吐納熊經鳥伸入字卽導
法也此外有老子四十二勢婆羅門十二勢赤松子十
八勢鍾離八勢胡見素五藏十二勢大概不出前諸法
中又唐六典有按摩生以消息導引除人入病日風寒
暑濕飢飽勞逸凡支節藏府積而疾生導而宣之使內
疾不留外邪不入是導引按摩實爲醫之一科古方中
如發汗呃逆痞塊轉筋等法皆從此出用之實能有效
倘識其臟腑部位補瀉之用隨處皆有神解今人不講
摩浴故不知耳。易筋經有舉何知內景道家有黃庭
提推拉按抱抓墜八法亦可參

借言在握靈樞即靈樞經樞在必明陰陽內經陰陽

道也治病必求其本註云必先明於陰陽凡人之臟腑

氣血氣之風寒暑濕病之表裏上下脈之遲數浮沈藥

之温平寒熱皆不外陰陽二義汪云醫理以陰陽

為本全經皆闡陰陽之奧外治亦當先明陰陽為雲

為雨經云清陽為天濁陰為地地氣上為雲天氣下為

而後能化生萬物人當識臟腑句本有父有母經曰高

之上下相輪應亦然寶鑑有父有母育之上

中有父母又云三陽為父三陰為母按醫當識五臟

六腑外治不由臟腑却直達臟腑尤貴能識臟腑茲於

醫書中摘其要者以便初學觀覽如入學者先認字出

門者先問路耳至於自得之後則此固所棄也五臟

肝心脾肺腎皆屬陰六腑膽胃大腸小腸膀胱三焦皆

屬陽五臟藏精神氣血魂魄六腑化水穀而行津液

○形藏四者頭角耳目口齒胸中也奇恒之腑六者腦

髓骨脈膽女子胞也肺氣通鼻肺和則鼻能知香臭

心氣通舌心和則舌能知五味肝氣通目肝和則目能

脾五色脾氣通口脾和則口能知五穀腎氣通耳腎和

則耳能聞五音五臟不和則九竅不通六腑不和則留
結爲癰。五臟不平六腑閉塞之所生也。頭痛耳鳴九
竅不利腸胃之所生也。肺合大腸心合小腸肝合膽
脾合胃腎合膀胱少陰屬腎腎上連肺故將兩臟三焦
者屬膀胱是孤之腑也是六腑之所與合者也。心與
膽通肝與大腸通脾與小腸通肺與膀胱通腎與三焦
通如心病怔忡宜溫膽膽病戰慄癲狂宜補心肝病宜
疎通大腸大腸病宜平肝脾病宜瀉小腸火小腸病宜
潤脾肺病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺腎病宜調和
三焦三焦病宜補腎。百病之始生也必先於皮毛邪
中之則腠理開開則入客於絡脈絡脈滿則注於經脈
經脈滿則入舍於臟腑也。善治者治皮毛次肌膚次
筋脈次六腑次五臟治五臟者半死半生也。臟病者
止而不移其病不離其處腑病者彷彿貫響上下行流
居處無常。欲得寒而欲得見人者腑病欲得溫而不
欲得見人者臟病。臟病難治逆傳其所勝也如肺傳
肝病傳脾脾傳腎腎傳心一臟不再傳故言次傳者死
肝病易治順傳其所生也如心傳脾脾傳肺肺傳腎腎
傳肝病土當傳脾乃不傳脾而傳心則問其所勝之
如肝病土當傳脾乃不傳脾而傳心則問其所勝之

臟而傳於所生之臟矣。脈反四時及不間臟者難已。間
臟者生緩傳急傳見前。勞症男自腎傳心而肺而
肝而脾女自心傳肺而肝而脾而腎傳盡則死。凡病男
自下而上女自上而下皆逆反是可治。病有五臟相
如肝移邪於肺則右脇痛肺位在於右也。有五臟相
移者腎移寒於脾脾移寒於肝乘其所勝也。肺移寒於
心傳於所生也。脾移熱於肝乘其所勝也。肺移寒於
亦傳於所生也。脾移熱於肝乘其所勝也。肺移寒於
肺移熱於腎腎移熱於脾做此有六腑相移者胞移
熱於膀胱膀胱移熱於小腸小腸移熱於大腸大腸移
熱於胃胃移熱於膽膽移熱於腦也。症皆詳見內經。
凡人病真臟不病則五行相生相制以適於平。雖不
服藥亦愈如火極傷金則五行相生相制以適於平。雖不
也。臟病分虛邪實邪賊邪微邪正邪如心病中風得
之爲虛邪傷暑得之爲正邪飲食勞倦得之爲實邪傷
寒得之爲微邪中濕得之爲賊邪餘做此推詳見難經
○犯賊風虛邪者陽受之食飲不節起居不時者陰受
之陽受之則入六腑陰受之則入五臟。入六腑則身熱
不時卧上爲喘呼入五臟則腹滿閉塞下爲飧泄久爲
腸辟。陽外感陰內傷。五藏正經自病憂愁思慮則

傷心形寒飲冷則傷肺悲怒氣逆上而不下則傷肝飲
食勞倦則傷脾久坐濕地強力入房則傷腎○水火分
治歌肝膽由來從火治三焦胞絡都無異脾胃相將濕
處求肺與大腸同濕類腎與膀胱心小腸寒熱臨時旋
商議詳張子和書○損其肺者益其氣損其心者調其
榮損其脾者調其飲食損其肝者緩其中損其腎者益
其精○五臟有陰陽之性可因其類而取之如心實生
熱者當益其腎腎水滋則熱將自除矣腎虛生寒者當
補其心心火降則寒將自除矣○又如肺實而瀉腎實
則瀉子也肺虛而補脾虛則補母也又母病必及其子
也又子虛必盜母氣也○又如肝實而肺虛者瀉其火
并補其水令火勢衰微金得不其木也○又如見肝之
病將傳於脾者當先實其脾補肝用酸助心用焦苦益
脾以甘俾土旺則水弱水弱則火盛火盛則金不行肝
木自愈此治肝補脾之要妙也○又如膀胱病而治膀
胱是正治也因金不能生水而膀胱病而治肺是隔二
也○更因土不能生金而肺病而膀胱病而治脾是隔三
也○又八虛候五藏者肺心有邪其氣留於兩肘肝有
邪其氣流於兩腋脾留於兩髀股腎留於兩脛○又
五藏各有合病久而不已則內舍於其合如肝合筋筋

痺不已內舍於肝也餘臟倣此。頭病取足陽病取陰也足病取上陰病取陽也中病旁取中者脾胃旁者甲膽如胃中濕勝而成泄瀉宜助甲膽風勝以克之也。凡五臟皆類推。夫胸腹者臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也腎者胃之關也脾為胃行其津液於四肢者也腰脊者身之大關節也。肝惡風心惡熱肺惡寒脾惡濕腎惡燥。肝欲散心欲熈脾欲緩肺欲收腎逆脾苦濕腎苦燥。肝欲散心欲熈脾欲緩肺欲收腎欲堅。五臟要穴肺太淵心太陵肝太衝脾太白腎太谿六腑要穴胃三里大腸巨虛上廉小腸巨虛下廉膀胱委中三焦委陽膽陽陵泉詳寶鑑針灸門。右臟腑之要也用膏藥者先識其何臟何腑或通或合或傳或移孰為分治先治隔治孰為上治下治旁治胸腹脇腋腰脊髀股四肢兩膈各有界畔而貼法始當其位矣至於所惡所欲乃臟腑天地萬物之所以屬。以下四句申性情膏中加藥本此。天地萬物之所以屬。言臟腑即為外治醫說之總義須合四句看。肝心脾肺腎在天為風熱燥濕寒在地為木火土金水在體為筋脉肉皮毛骨在色為蒼赤黃白黑在音為角徵宮商羽在聲為呼笑歌哭呻在變動為握憂噦咳慄在竅為目舌口鼻耳

在味爲酸苦甘辛鹹在志爲怒喜思憂恐在液爲淚汗
涎涕唾在榮爲爪面唇毛髮在臭爲臊焦香腥腐在卦
爲震離坤兌坎在脉肝爲足厥陰心爲手少陰脾爲足
太陰肺爲手太陰腎爲足少陰。諸風掉眩皆屬肝木
諸痛痒瘡瘍皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣膈鬱
病痿皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水。諸暴強直支痛
緩戾裏急筋縮皆屬於風厥陰風木乃肝膽之氣也
纏縮也反乖戾也謂筋縮裏急乖戾失常而病也。諸
病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如
鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂脅膈腫脹鼻塞歎衄
血溢血淋洩閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄膿血
汗皆屬於熱少陰君火乃真心小腸之氣也。暴注卒
暴注洩也昏昏也鬱拂鬱也歎鼻出清涕也衄鼻血也
血溢血上也洩也洩大小便血也閉大便澀滯也衄膿血
汗血出也汗者濁也。諸瘕強直積飲痞隔中滿霍亂
吐下體重胛腫肉如泥按之不起皆屬於濕太陽濕土
乃脾胃之氣也。諸瘕強直者濕過極則反兼風化制
之然兼化者虛象而實非風也。諸熱脅痠暴痞冒昧
躁擾狂越罵詈驚駭胛腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神
守隄嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明

暴注疇瘕暴病暴死皆屬於火少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣也。瘕動也。惕踈動瘕火之體也。嘔與噎同。諸澀枯涸乾勁欬揭皆屬於燥陽明燥金乃肺與大腸之氣也。諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癩疝堅痞腹痛急痛下利清白食己不饑吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒足太陽寒水乃腎與膀胱之氣也。按經文病機十九條河間本之著爲原病式分五運六氣剖析精微宜研究之。五志所傷喜傷心者不可疾行不可久立怒傷肝者上氣不可忍熱氣蕩胸短氣欲絕不可息憂傷肺者心系急上焦閉榮衛不通夜臥不安思傷脾者氣留不行精聚中腕不得飲食腹脹滿四肢怠惰恐傷腎者上焦氣閉不行下焦回還不散猶豫不決嘔逆惡心也。又心爲喜喜發於心而成於肺脾爲思思發於脾而成於心過節則兩臟俱傷肺爲憂又爲悲又心虛則悲又肝虛而肺氣併之則悲腎爲恐又肝虛則恐又心虛而腎氣併之則恐又胃熱則腎氣微弱故恐肝爲怒怒則肝木克脾脾傷而四臟俱傷矣。又悲傷心胞者喜忘不識人置物在處還取不得筋變四肢浮腫驚傷膽者神無所歸慮無所定說物不意而迫。按五臟不可見然有諸內者皆五諸外

不獨筋肉皮骨也凡色聲味脈之類實望聞問切之原也至於風熱燥濕寒爲外感喜怒憂思恐爲內傷莫不各有所形之症症既見於外矣又奚不可由外治者但病情萬變而不知其要流散無窮經文總論乃握要之法膏藥通治之四時月日之所以主少陽主春足厥陰所本故詳載之

乙心主夏手少陰太陽主治其日丙丁足厥陰少陽肝膽也手少陰太陽心小腸也餘倣此推脾主長夏四季長夏六月也四季中土各旺十八日。足太陽少陽陽明應正月九月五月足太陰少陰厥陰應十一月十月三月也。五臟積各以月日得者如肺病傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受則留結爲積故肝積得以季夏。痿作於午未申月。邪之客身以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚。甚至其所生而持自得其位而起如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘倣此。人一日分爲四時朝爲春日中爲夏日入爲秋夜半爲冬朝則人氣生病氣衰故旦慧日中人氣長則勝邪故安夕則人氣始衰邪氣始生故加夜半人氣入臟邪氣獨居於身故甚有相反者一臟獨主其病必以臟氣所不勝時甚如脾病不能

肝巨之木肺病不能勝畫之火也以所勝時起如肺氣
能勝旦之木腎氣能勝畫之火也是不能應一日分四
時之氣者也。肝病平朝慧下晡甚夜半靜心病日中
慧夜半甚平旦靜脾病日晡慧日出甚下晡靜肺病下
晡慧日中甚夜半靜腎病夜半慧四季甚下晡靜按日
晷曰晷未土旺也因慧靜甚而知其爲何臟之病亦
可辨症。五臟受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於
其所生死於其所不勝如肝受病氣於心傳於脾舍於
腎至肺而死此言氣之逆行也一日一夜五分之所以
占死生之早暮也五分謂朝甲乙寅卯晝丙丁巳午
晡庚辛申酉夜壬癸亥子四季戊己壬戌丑未。凡人
身之氣流行每子時自左腳心湧泉穴起陽循左手腹脇
脇手而上至頭頂顛門而止午時自頂門循右手腹脇
足而下至右腳心而止是坎離爲陰陽消息也。又腎
至靜惟子時濁氣一動而已。按治遺精者多在子時
及五更腎氣開時可推。手太陰肺本藏經絡每朝寅
時從華蓋旁胸乳上中府穴起循臂下行至手大指外
側少商穴止傳手陽明大腸。手陽明大腸卯時自少
商穴起循臂上行至鼻孔旁迎香穴止。足陽明胃辰
時自迎香穴交與眼下承泣穴上行至額角頭維穴對

人迎循胸腹下至足次指厲兌穴止足太陰脾已
時在足附上衝陽過交與足大指隱白穴循腿腹上行
至腋腋下大包穴止手少陰心午時大包交與腋下極
泉穴循臂下行至手小指內側少衝穴止手太陽小
腸未時自少衝交與手小指外側少澤穴循肘上行至
耳前聽宮穴止足太陽膀胱經申時自聽宮交與目
內眥外一分睛明穴循頭頸下背腰臀腿至足小指至
陰穴止足少陰腎酉時自至陰與足心湧泉穴循膝
上行至胸膺府穴止手厥陰心包戌時自膺府交與
腋下乳後一寸天池穴循臂下行至手中指端中衝穴
止手少陽三焦經亥時自中衝交與小次指外側關
衝穴循臂上行至耳門穴止足少陽膽子時自耳門
交與目銳眥瞳子髎循頭耳側脇下行至足少指次指
端外側竅陰穴止足厥陰肝丑時自竅陰交與足大
指外側大敦穴循膝股上行至乳旁一寸半直下一寸
半期門穴止此每日氣血所注詳靈樞經。傷寒胃
熱潮熱多在日晡陽明旺於未也若寅卯時者少陽已
午時者太陽。陰虛元氣不足春夏劇秋冬瘥又陰虛
火動多在午後交陰分起至夜半而止肺熱日西甚脾
熱夜間甚腎熱亥子時甚。瘧分三陽三陰又子至巳

為陽午至亥為陰亂者為陰陽不分又卯至午為邪在
外午至酉為邪在內酉至子為邪在血分。脇痛在午
後發者知其為肝家瘀血也。黃家日晡當發熱反惡
寒知其為陰黃女勞也。木生於亥旺於卯絕於申至
酉戌衰甚及寅卯乃復旺故患肝病雀目者暮暗而曉
復明也。又木絕在申水土即長生於申故雀目多變黃
脹也。五藏類推。肺病早問咯血者寅卯為木旺生
火時也。又內經有四氣調神法又鍼灸合藥須檢時
日。又殺肺蟲者須在初四初五蟲頭向上日。按傷寒
有六經欲解時。又按史記日者傳孝武帝時聚諸家
占娶婦日五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉
叢辰家曰大凶天人家曰小吉太一家曰大吉辨訟不
決今之醫家亦然。又按王充論衡云沐書謂子日沐令
人愛使醜如媼母能得愛乎卯日沐令人白頭若十五
女子能白髮乎今之醫家不信時日亦然。然四時晝夜
之道病人實潛與為感通綱目云凡病以五臟時日占
病愈甚極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉。是時日
固有不可不講者。愚謂外治者尤必於氣血所注及諸
病所加甚之候深加詳審則先時而制易於取效不獨
斯截瘡膏者須定陰陽且要瘡未發時也。此臟腑四時

晝夜之說亦外
治者之一要也
上下左右前後之各其位
五藏皆通於心而心亦通

五藏心系上系於肺其別者自肺葉中曲折向後貫脊
髓通於腎與膀胱並行而之洩尿處乃下極部分也

肺有二系一系上通喉嚨一系曲折向後脾爲中州
上心下腎脾與胃以膜相連肝之系者自膈下着左

脇肋上貫膈入肺中與膈膜相連也兩腎二系相通
下行其上則與心系通而爲一所謂坎北離南水火相

感者也命門之系卽心胞絡見前按腎應兩腰介
其間者命門與膀胱相對象坎中一畫所謂水中之火也

胃中蒸化穀食全賴此火火衰則胃氣衰膽主腋兩
腋缺盆皆膽之絡胃號太倉咽門至胃長一尺六寸

胃居心蔽骨與臍之中小腸當臍右大腸當臍左
膀胱在小腹之內按心肺居胸背故心熱則胸熱

肺熱則背熱肝膽居膈膽附於肝腎居腰胃居臍上腸
居臍下其熱亦然他症卽此可推凡膏藥均分此上中

下貼心在肺下肝上巨闕心募也又期門肝穴在兩
乳旁各開一寸半直下一寸半期門下五分卽臍穴中

府肺穴也在乳直上三肋間脾居中脘中脘一穴胃募
也季脇章門脾募也在臍上二寸旁各六寸帶脉所定

也命門即腎穴也關元小腸穴在臍下三寸天樞大腸
二穴在臍旁各開三寸中極膀胱穴在臍下四寸膻
中爲上焦中脘爲中焦臍下一寸陰交穴爲下焦○背
後自大椎起至尾骶骨止共二十一節平肩爲大椎卽
百勞穴也二風門三椎肺俞四卽膏肓也五心俞九肝
俞十胆俞十一脾俞十二胃俞十三三焦俞十四腎俞
十六大腸俞十八小腸俞十九膀胱俞皆在椎下兩旁
各開一寸五分 腹陰背陽募在陰俞在陽陰病行陽
治俞陽病 內外虛實生絕之殊其證善潔面青善怒內
行陰治募 證臍左有動氣按之牢若痛其病胸脇滿悶淋漓便難
轉筋有是者肝也無是者非也素問兩脇下痛引小腹
令人善怒虛則目眩暈無所見耳無所聞善恐如人將
捕之氣逆則頭痛耳聾不聰頰腫又肝病皆青肝熱者
色蒼而爪枯靈樞足厥陰肝絕則筋急筋者聚陰器而
絡舌本筋急則引舌與卵縮庚日薦辛
日死○按面青者肝色臍左者肝位巔頂耳目頰舌胸
脇小腹陰器均肝脈所至筋爪肝所主恐與怒肝之
志也此不特可以辨症而一切敷貼之法皆具於中亦
外治者之一要也下倣此推之心病外證面赤口乾善

笑內證臍下有動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中
熱而吮又胸中痛脇肢滿脇下痛膺背肩甲間痛兩臂
內痛虛則悲胸腹大脇下腰背相引而痛又心病舌捲
短額赤心熱者色赤而脈絡溢又手少陰心絕則脈不
通血不流色不澤仲景形體如烟煤直視搖頭者爲心
絕 按心小腸脈皆循臂小腸脈循臂繞肩胛交肩上
○脾病外證面黃善噫善思善味內證當臍有動氣按
之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜臥四
肢不收又身重肌肉痿足不收行善慙脚下痛溼瘦不
利虛則腹滿腸鳴飢泄又脾病唇黃脾熱者色黃而肉
蠕動又足太陰脾絕則肌肉軟舌痿人中滿脈經口冷
足腫腹熱臙脹泄利不覺出時無度○肺病外證面白
善噫悲愁不樂欲哭內證臍右有動氣按之牢若痛其
病咳喘洒淅寒熱又喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝
髀臑脘足皆痛虛則少氣不能報息耳聾啞乾又肺病
鼻張肺熱者色白而毛敗又手太陰肺絕則皮毛焦爪
枯毛折又汗出髮潤喘不休○按肺主皮毛氣逆於上
則痛連肩背而汗出肺爲腎之母病則子亦受邪氣逆
於下故下部皆痛肺絡會耳中腎脈入肺中循喉嚨虛
則腎氣不能上潤故耳聾益乾喘音善足肚也見註○

腎病外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若
痛其病逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆又腹大
脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛
清厥意不樂又腎病顛與顏黑耳焦枯腎熱者色黑而
齒枯又足少陰腎絕則骨枯齒長而垢髮無澤仲景洩
便遺失狂言目反直視者腎絕脈浮而洪身汗如油喘
不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者命門絕也。膽
病者善太息口苦嘔有苦沫心中澹澹恐如人將捕之
噓中吟吟然善唾又膽虛不勇敢亦不睡實則勇敢而
多睡。胃病者腹脹胃脘當心而痛上支兩脇膈噎
不通飲食不下又胃實則能食不傷過時不飢或脹虛
則泄。小腸病者小腹痛腰痛脊控舉而痛當耳前熱若
寒若獨肩熱。大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬月
重感於寒則泄當臍而痛不能久立。膀胱病者小腹
偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩背熱者脈陷
及足小指外廉脛腓後皆熱又熱結下焦小腹苦滿胞
轉小便不利令人發狂冷則濕痰上溢而為多唾小便
淋瀝或遺尿。三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便
窘急溢則水留為脹又上焦不散則喘滿中焦不利則
留飲久為中滿下焦不利則腫滿。按臟腑各有井榮

胸經合主病并水主心下滿榮火主身熱胸土主體重
節痛經金主喘咳寒熱合水主逆氣而泄其穴與治法
詳見難經。病證各有本門茲但錄其臟腑之總綱亦
外治握要法也。青藥多治外症鮮治內症此篇之治
內症亦憑臆造耳然亦實有下手之處

篇中論臟腑一段卽示初學下手處也

臟奚爲而言象

素問九篇 臟象第一 腑奚爲而言器

六腑者倉廩之本營之居也
名曰器能化糟粕轉味而入

也 出者 象則可觀器則可量

不假漢筴

王莽令太醫與
巧屠剗剗罪人

以竹筴導其脈云可治病而其時醫
無傳書者亦以此非仁者之所爲也

自懸秦鏡

能見
臟腑卽

如觀水影之浮沉而知肺肝之吐分於其部也

吐血者
吐於水

中看浮者肺沈者肝半沈半
浮者心 此以部位推測法

察鹽色之紫黑而知氣血

之鼓徵於其化也

鼓脹者炒鹽布包放臍上水鼓鹽化
水食鼓鹽紅色血鼓鹽紫色氣鼓鹽

黑色氣虛中滿
鹽本色不變

一火二火而判內癰肖形也

肺腸癰皆
吐臭痰棉

花捲竹葉燈上薰油燒之令病人看兩個火頭者左顧肺癰一個火頭者腸癰以肺有兩葉腸只一條也

右顧而別胎孕就勢也遺孕婦南行急呼之左顧男右顧女蓋男左女右勢有偏重迴

顧時就其所偏重也此法試過頗驗又摸腹如覆盆者男如肘頸參差者女又左乳有核男右乳有核女

以上數法皆是測內景者不由診脈而得乃外治以物之內取法也如能推廣可不必憂脈理之幽渺矣

熨之寒熱以辨喜涼者熱喜溫者寒諸症皆以此辨又齊書載一僧父冷病積年重茵累褥牀下設爐火猶

不差徐嗣於盛冬月令其裸身坐石上以百瓶水從頭

自灌須臾體出氣如雲蒸嗣曰此乃大熱病也此事參觀並議真假

喜按者虛拒按者實內經言風雨之傷人也實實者外堅充滿不可按按之則痛寒濕之中人也虛虛則氣

不足按之則氣足以溫之故快然誰其窺臟卽此見癥而不痛此是測法亦卽是治法

古云窺見五臟未必真有是事復叅東醫之鑒

也能測內景卽可洞見癥結

寶鑑卽東醫

更采西醫之略

西國有西醫論略等書其腦氣筋之說甚新涂所論醫理亦與中國有異詳

見本書

觀其大同著其行得

謂相師而不相襲也

心藏神

藏者藏也經曰血

氣精神奉生而周性命是四者人之本臟腑之主也痰

者氣之所結汗者血之所變也經所謂津液與精氣血

脈逆行者也凡百病皆不外此六者而膏藥通治百病

須要扼此六者寶鎰精氣神乃道家言非醫理也○心

藏神統攝七情酬酢萬變又五臟藏七神心藏神肺藏

魄魄者肺之神也肝藏魂脾藏意腎藏志又脾藏意與

智腎藏精與志是為七神又神者精氣之化成也

之心有所憶謂之意意之所存謂之志因慮而處物謂

之智也○心怵惕思慮則傷神恐懼自失又恐懼流淫

而不止脾憂恚不解則傷意恍惚四肢不舉又氣閉

塞而不行肝悲哀動中則傷魂狂忘不精不精則不

正當人陰縮而筋攣兩脇骨不舉又竭絕而失生肺

喜樂無極則傷魄傷魄則狂狂者意不存人又神蕩散

而不藏腎盛怒而不止則傷志喜忘其前言腰脊不

可免仰屈伸又迷惑而不治恐懼而不解則傷精骨痿

痠厥精時自下又神蕩散而不收○驚悸大概屬血虛

與痰有

心跳亦是血虛時作時止者痰

火動蓋心

胆經病

忬者心中躁動揚揚如人將捕

一曰悸卽怔

忬心虛而停水則胸中滲漉虛氣動流水既上升心火

惡之故不安也怔忬久則健忘由心脾血少亦有痰者

○癩癩屬痰火驚丹溪曰五志之火鬱而成痰爲癩狂

癩屬陰狂屬陽一日癩宜吐狂宜下癩則宜乎養血安

神兼降痰火。先貴後賤曰脫營先富後貧曰失精雖

不中邪病從內生血爲憂煎氣隨悲滅令人飲食不

神倦肌瘦。按神病最難治古云惟賢者能之神兼七

情病亦匪一如挽亂四肢不舉氣閉塞不行及筋攣骨

痠等症往往與雜病相類苟不求其致此之故百藥

不效拙者或誤下藥遂致危殆姑存此膏以待賢者之

正◎養神膏牛心原個麻油先熬去渣入黨參熟地茯

苓黃耆白朮當歸遠志棗仁柏子仁益智仁麥冬木鱉

仁半夏各一兩酒芍五味子陳皮甘草各五錢黃連四

錢肉桂二錢陳胆星八錢麻油熬黃丹收味砂七錢生

龍齒鬱金蒿蒲各五錢攪此方治一切神病古云七情

總隸於一心七氣統歸於一氣故可以一膏治之如老

人心虛不眠者用之甚妙無牛心用龜板石蓮肉龍眼

肉三味代之。又方心虛而有痰火者用參朮苓甘地

芍歸芎加黃連瓜萋牛夏沈香硃砂梔子油丹熬。按
寶鑑治脫營失精症內用香附茯神甘草外用香附川
椒故紙各二錢萼葵一錢研末入炒鹽二錢擦牙此方
補火可以進食雖未悟其何以外治之故然卽此見七
情亦有外治之肺藏氣者精神之根蒂也元氣與血循
法當推而廣之肺藏氣者精神之根蒂也元氣與血循
環按精神氣血四者之中又以氣爲貫通之主。天
地之道氣化則生變則易盛則旺弱則衰正則和亂卽
病絕則死也肺主氣又肺藏氣膻中爲氣海宗氣之
所積也膻中肺室也又腎生氣一曰腎納氣膻下丹田
實爲生氣之原五臟六腑之本十二經脈之根呼吸之
門三焦之原謂腎間動氣也凡人病劇候臍下動氣未
絕者猶可生按治氣須肺與腎兼治貼膏在膻中臍
下二處。諸病諸痛皆因於氣。五氣風傷氣爲疼痛
寒傷氣爲戰慄暑傷氣爲熱悶濕傷氣爲腫滿燥傷氣
爲祕結。七氣喜怒憂思悲恐驚屬心腎膽
過則耗散真氣怔忡健忘失志不足之症作怒憂思屬
肝脾過則鬱遏邪氣顛狂膈噎腫脹疼痛有餘之症
作。又九氣者怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣
下寒則氣收笑則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結

○氣鬱者多因名利失志公私失情○氣滯上焦心胸痞痛氣滯中焦腹脇刺痛氣滯下焦腰痛疝瘕氣滯於外周身走痛○上氣者肺有餘則喘欬上氣○逆氣者氣自腹中時時上衝也病人自覺冷氣自下而上者非冷也上升之氣無寒乃火極似水也○氣逆而亂者清氣在陰濁氣在陽榮氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胸中是為太惋故氣亂於心則煩心密然俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝接手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脛則為四厥亂於頭則為厥逆頭重眩仆○少氣者氣不足則息微也又腎虛則少氣力言吸吸骨痠懈惰不能動○短氣者氣急而短促也有結胸停水風濕氣虛之分大抵心腹脹滿者為實為邪在裏心腹濡滿者為虛為邪在表○下氣者心脈不及下為氣泄也又腸胃鬱結穀氣內發而不能宣通於腸胃之外故善噫而或下氣也但傷食下氣臭穢清氣下陷不臭穢○大凡邪之所在皆為不足上氣不足腦為之不滿耳為之鳴頭為之傾中氣不足洩便為之變腸鳴下氣不足痿厥心悶○凡五虛之症在上則吐痰不止在下則泄瀉不止皆死以氣脫無所管攝也氣脫者目盲○東垣云凡治雜病先調其氣若血受病亦先調氣入門云散火

之法必先破氣氣降則火降矣 丹溪曰氣無補法世
俗之言也氣怯不補氣何由行 又曰肺受火邪氣得

炎上之化有升無降熏蒸清道則生諸疾若用辛香燥

烈是以火濟火也 直指曰氣結則生痰痰盛則氣愈

結故調氣必先豁痰 凡噎氣惡心等症皆胃病而總

由肝氣沖逆阻胃之降而然古人胃病治肝以此。六

字氣訣肝虛心呵脾呼肺咽腎吹三焦噎其法以口吐

鼻取能去疾延壽又肝若噎時目爭睛肺知咽氣手雙

擊心呵頂上能叉手腎吹抱取膝頭平脾病呼時須爆

口三焦客熱臥噎行 分四時行切忌出聲。治氣藥

虛宜四君實宜小烏沈火多合黃連解毒痰合二陳積

合平胃之類 又氣病用氣藥不效者宜故紙茴香乳

香納氣歸腎。餘不備錄。理氣膏通治氣鬱氣逆氣

脹氣痛等症黨參黃耆蒼朮白朮蓬朮香附柴胡青皮

陳皮枳實南星半夏厚樸檳榔山查草果羌活防風前

胡蘇子杏仁烏藥鬱金川芎當歸白芍黃芩黃連黃柏

梔子葶藶吉梗桑皮吳萸瓜蒌白芷麥芽木通澤瀉赤

苓延胡靈脂大黃黑丑官桂草烏紅花菖蒲皂角木鼈

仁僵蠶全蝎山甲白芥子薤蒲子川棟子川椒細辛木

香藿香茴香靈仙乳香沒藥巴仁甘草各一兩油熬丹

收牛膠二兩蘇合丸三錢攪另用薑葱菲蒜槐柳桃
 桑枝各半斤鳳仙全株油丹熬薄荷油二錢和兩膏合
 併攤貼。專益元氣膏牛肚一個麻油先熬去渣入黃
 著八兩黨參生白朮當歸各六兩熟地半夏香附麥冬
 四兩茯苓五味白芍益智仁破故紙胡桃肉陳皮官桂
 甘草各二兩砂仁廣木香各七錢乾薑五錢大棗十個
 麻油熬丹收加黃柏知母及龜鹿膠各二兩神氣運於
 尤妙。氣虛有痰滯者香砂六君熬膏貼
 無形也動也天之象也腎藏精精者身之本體者骨之
 則神旺內則五藏敷榮外則肌膚潤澤容顏光悅耳目
 總明若真精耗散疾病即生如肝精不足目眩無光腎
 精不足腰痛脛痠是也精傷則陰虛精脫者耳聾
 六極一曰精極五臟皆有精並無停泊於其所腎
 主水受五臟六腑之精而藏之凡人未交感精涵於血
 中慾火動甚而周身流行之血至命門變精以泄也宜
 祕密。保精膏龍甲一個先熬去渣入熟地八兩免絲
 子酒製肉苁蓉酒洗各四兩天冬麥冬生地山藥續斷
 杜仲炒巴戟車子杞子萸肉茯苓五味子黨參栢子仁
 各二兩黃連當歸白芍遠志棗仁覆盆子金櫻子地骨

皮益智仁苧香苜蒲川椒甘草澤瀉黃柏知母龍骨牡
蠣蝦骨碎補各一兩麻油熬成膏黃丹收加赤石脂四
兩攪勻貼如精寒及精如**肝藏血**凡人動則血運於
水者陽衰也糝附桂末貼**肝藏血**諸經靜則歸於肝
臟以肝爲血海主藏血故也。人身經絡氣响之而不
閉血濡之而不枯故得周流不息邪由外入先氣而後
血血隨氣爲升降氣病傳血血亦因之病焉。血生於
心統於脾藏於肝宣布於肺踈泄於腎灌漑於一身以
入於脈人非節欲以謹養之必至陽火盛熾眞陰內損
吐餌妄行於上便溺滲洩於下而百病生矣凡目能
視耳能聽掌能握足能步臟能液貯能傳皆賴於血血
盛則形盛血衰則形衰凡熱皆出於心熱甚則傷血
諸見血皆熱症又血見熱則行其色鮮見寒則凝其
色瘀凡口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣
上法當補陰抑陽氣降則血歸於經也七情皆能動
血暴喜傷心不能生血暴怒傷肝不能藏血積憂傷肺
過思傷脾失志傷腎亦然內傷亦能失血卒然多飲
食則脹滿起居不節用力過度則陽絡受傷血外溢而
衄陰絡脈傷血內溢而下。衄血者勞傷元氣陰虛火
動氣歸於肺或陽明熱鬱咳血者火乘金位肺絡受傷

也先血後痰陰虛火動痰不下降宜滋陰降火先痰後
血是積痰生熱宜急降痰火痰涎帶血者是脾家蓄熱
有紅點尤甚唾血者鮮血隨唾而出屬腎有帶紅絲者
是肺痿不嗽而咯血者出於心或血疔瘡或咯不出
或帶紅絲此精血枯竭。嘔血出肝大怒及傷力爲多
重者從夾脊而下如潮之湧此皆瘀血雖止之亦不歸
經須聽其出。吐血無聲出胃又心肝火旺偏血上行
亦好吐血。吐血分三因風寒暑濕燥火外因也過食生
冷好啖炙博醉飽無度外之內也喜怒憂思悲恐驚內
因也勞心好色亦內也跌撲閃胸傷重蓄血者不內外
因也凡吐血宜降氣不宜降火氣降火自降矣宜行
血不宜止血行血則自循經絡止則凝而作痛矣宜養肝
不宜伐肝肝生血氣亦主藏血也。凡吐血色紫黑者
皆瘀也以出爲妙未盡以大黃桃仁紅花生地丹皮行
之轉逆爲順若過用涼藥氣血傷而脾敗矣。按吐血
有氣虛挾寒陰陽不相爲守血亦妄行蓋陽虛陰必走
也然必有虛冷之狀方是勿誤。胞移熱膀胱痛者爲
淋血出尿竅心移熱小腸不痛者爲溺血出精竅一曰
溺血不痛下元虛冷也。腸風由腸胃濕熱鬱積甚至
脹滿而下血也便血者陰氣內結不得外行血無所稟

滲入腸間也與腸風不同。又便血內因濕熱酒色七情外感六淫氣血逆亂。又腸風由邪氣外得色鮮在糞前近血屬大腸氣臟毒由熱毒內積色黯在糞後遠血屬小腸血腸澀由長夏濕熱血與水穀齊出沈金鰲云腸風藏毒便血腸澀四者相似而各有辨。下血紫黑不痛者濕毒宜黃連鮮紅痛者熱毒宜白芍下血不痛者寒宜乾薑桂枝。蓄血有上中下三部喜忘發狂身黃尿黑爲重但小腹滿小便不利爲輕治以去瘀爲先。○通治諸血症脾肺之血係氣虛以補氣益脾爲主肝血係勞傷以滋陰降火爲主。吐血首宜清瘀然後止之以歸其經補之以還其元此正治也。凡血逆行難治順行易治吐嘔變而下行爲惡痢順也邪欲去也。○陽盛則身熱多渴陰盛則身涼不渴然血陰也身涼易愈諸見血潮熱脈大者難治邪勝也。○理血膏通治衄吐溺便一切血變血積諸症黨參丹參黃耆生地熟地當歸川芎白芍赤苓白朮天冬麥冬栝子仁棗仁遠志五味丹皮地骨皮龜板鼈甲柏葉知母貝母半夏橘紅膽星羌活防風連翹荆穗炒白芷吉椶柴胡蒼朮香附鬱金延胡靈脂蒲黃蘇朮桃仁紅花艾葉茜根官桂大黃元明粉厚朴枳實花粉續斷梔子炒黃栢黃芩黃連

木通車前子地榆炭薑炭降香乳香沒藥蘇子甘草髮
灰百草霜各一兩油熬丹收牛膠二兩攪勻 又方另
用薑蔥菲蒜槐柳桃桑枝鳳仙全株約各半斤油熬丹
收薄荷油二錢攪兩膏合併攤貼。虛勞咳血補肺膏
。專行瘀膏大黃四兩苾硝二兩柴胡瓜蒌根桃仁當
歸生地紅花山甲蓬朮三棱川芎各一兩乳香沒藥官
桂各七錢川烏三錢油熬丹收花蕊石一兩血結五錢
另研攪。涼血膏見前。按血爲氣配古言男調氣以
養血女調血以耗氣又補血以養榮非順氣則血凝補
氣以助衛非活血則氣滯可悟陰陽補瀉之道理氣理
血二膏本此川藥。又繆仲醕治吐血白灸草制肝麥
冬薄荷橘紅貝母枇杷葉清肺苡仁山藥養脾菲菜降
香蘇子下氣青蒿鼈甲丹皮地骨皮銀柴胡補陰清熱
棗仁茯神養心山萸杞子牛膝補腎可以爲法又曰陰
無驟補之法病家欲速其功醫士張皇精血凝而有質
失主百藥雜試往往殞命此語亦可佩
精血重濁在下陰也靜也地之象也魂隨神而知覺生
合上神氣運於無形是亦小天地也
隨神往來者謂之魂魄並精而運動作並精出入者
屬陽肝藏魂主知覺

陰肺藏魄 神走斯臟氣絕 軌讀念食則夢穀神出矣溺
主運動 色則夢 二女沒於腰矣 二女

腎神也 又眼欲瞎 精亾斯白血出 勞損所生吐如雞 則
者亦見童子走也 蛋白者名白血

有戴砂以安 神。心神不安絳囊盛靈砂戴於頂上又
啼殊砂水磨塗心口手足心或殊砂寫于午二字貼臍

上皆法也 殊砂同遠志龍骨養心氣同當歸丹參養
心血可酌加又殊砂安 熨椒以舒 氣。凡氣病可用花

神九磁珠丸並可推用 椒包置患處湯壺熨
之或花椒末調餅貼燒艾一炷并治痞 塗倍以祕 精。

氣或花椒橘皮青鹽烏梅炒布包熨之 塗倍以祕 精。
主宰在心藏制在腎夢而遺者相火盛而強迫之也不

夢而遺者心腎虛弱不固也又夢泄屬鬱屬經絡熱屬
濕痰滲者宜辨。通用瀉精五倍末津調塗臍。附方

夢遺屬相火盛者甘遂甘草末猪脊筋搗丸納臍膏
掩七日一換能清相火 屬濕熱者川棟子肉加龍骨

牡蠣糝灸瘡膏貼臍下一寸三分灸瘡膏即川芎當歸
赤芍白芷各二兩細辛髮團各一兩麻油熬鉛粉收者

屬鬱者古用猪苓半夏以半頁有利性而猪苓能導

三

水即腎閉導氣使通之意前有猪苓方見瀉註可借用
○治陰虛火動夢遺者用地白芍川芎當歸麥冬黃
栢酒炒知母密炒黃連薑汁炒梔子炮薑肉牡蠣煨
等分麻油熬黃丹收隨症酌加丸末貼○治陽虛精脫
不禁者用兔絲子白茯苓薤子龍骨等分熬貼如前加
末用○濁由敗精流注者多由濕熱滲入膀胱者少
葱白和鹽炒熏陰處或童便製牡蠣同大蒜搗敷臍
治赤白濁椿根白皮三兩乾薑白芍黃柏一兩油熬丹
收貼在浴室中出一小便毋
令人知可愈淋濁亦一奇也
燒茅以清血○吐衄者
於上聞之免血暈○按神有邪擾殊砂鎮之氣欲降花
椒達之精苦洩五倍斂之血脫者益氣故用茅根此醫
理也亦治法也舉一味而
先天之本在腎滋陰者曠津
其餘用藥之道均可推矣
探三一腎氣之源承上申言五臟即由氣血而遞及痰
丸名之源汗也○陰虛不能制火火炎於上則
為潮熱咯血火動於下則為遺精泄瀉凡治陰虛火
炎咳嗽者二六時中常以舌抵上腭令華池之水充滿
以意目力送至丹田口復一口此真水補真陰法可代
腎氣丸如夜間不寐或口乾津液不上升用此亦妙○

滋腎膏生地熟地山藥黃內四兩丹皮澤瀉白茯苓瑣
陽龜板各三兩牛膝杞子黨參麥冬各二兩天冬知母
黃柏鹽水炒五味官桂各一兩麻油熬黃丹收貼心口
丹田卽三腎氣丸方也原云古方如腎氣丸固本
丸補陰丸俱是滋陰補血之劑然固本丸胸滿有痰者
忌之補陰丸脾虛有濕者忌之惟腎氣丸專於補腎滋
陰而兼理痰濕最爲切當但只數味不足以盡其變今
以三方合而爲一補瀉兼施庶乎可也此法實爲集古
方成膏之所本故附錄之又小兒腎疳有用此方加川
楝子使君子者亦可爲加藥之法又此膏加猪腎一對
猪骨髓一兩熬卽丹溪治痿補益法也並可參○又接
腎屬水水不足則陰虛宜六味滋陰命門屬火火不足
則陽虛宜六味加附桂或再加五味子補水兼補火老
年水火俱虧腎氣虛乏下元冷憊腰痛脚軟夜多漩尿
面黑口乾耳焦枯者宜兼補
此膏糝附桂末貼或鹿茸貼後天之本在脾調中者摩

腹寓大和

健脾丸名

之理

脾腎合論

○脾在胃下主消磨五

穀脾胃陽氣有餘陰氣不足則

熱中善飢陰氣有餘陽氣不足則寒中腸鳴腹痛飲
食自倍脾胃乃傷薄滋味所以養血氣也○內傷調補

之法沙食并摩腹。健脾胃用白朮四兩茯苓白芍六
神麩麥芽香附當歸枳實半夏各二兩陳皮黃連吳萸
山查白蔻仁益智黃芪山藥甘草七錢黨參廣木香五
錢麻油熬黃丹收貼心口臍上卽太和丸法也加蒼朮
大黃各二兩黃芩厚樸檳榔各一兩以雄猪肚石上擦
淨裘藥熬尤良。脾腎雙補膏蒼朮熟地各一斤五味
茯苓各半斤乾薑一兩川椒五錢或用砂仁
末亦可麻油熬黃丹收糯米炒熨腹助脾運。射酒好色

以傷肺氣漫憶山人之雲母

宜戒酒色。雲母能補肺

通治內外症。凡熱在上焦咳而有渴唾涎沫爲肺痿

若口中辟辟燥咳咳則胸中隱隱痛爲肺癰。雲母膏

治肺癰用雲母煇硝甘草各四兩槐枝柳枝桑白皮側

柏葉橘皮各二兩川椒白芷沒藥赤芍官桂當歸黃蘗

血結芎藭白芩川芎白斂木香防風厚樸苦梗柴胡黨

參蒼朮黃芩草龍膽合歡乳香茯苓各五錢清油熬黃

丹收松香二兩攪勻攤。另用水銀二兩彈於膏上臨

用刮去水銀貼竇鑑方有附子良薑各五錢同熬并治

腸癰及癰毒瘰癧骨疽內疽乳癰五發發背折傷等以

散蒲煎水洗貼。凡酒色過度虛勞少血津液內耗心

火自焚遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮須用六味
地黃藥料加橘紅貝母黃柏知母又肺虛氣促氣喘或
吐唾血將成肺痿證紫苑黃耆白芍甘草人參麥冬當
歸五味子二方可併熬○清肺膏治肺病并失音者黨
參陳皮貝母半夏夏吉梗茯苓桑白皮知母枳殼杏仁欬
冬麥冬地骨皮黃芩生地各一兩黃連炒木通五味蘇
子訶子肉苳蒘甘草生薑各五錢批杷葉百合各四兩
油熬丹收阿膠入錢攪貼胸若腎虛失音者宜黨參
川芎當歸熟地白芍茯苓兔絲子五味子杜仲巴戟天
橘紅半夏麩各一兩牛膝白朮破故紙胡蘆巴益智仁
甘草各五錢菖蒲三錢加薑棗油熬貼臍下蓋納氣歸
腎則咳嗽滅而氣以增其聲自出矣按心爲聲音之
主肺爲聲音之門腎爲聲音之根凡治失音以清肺膏
貼胸口此膏貼臍下最妙卽貼法也凡諸病之宜兼治
者照此推○補肺膏治肺虛或痰或血或痿并一切滋
陰降火皆宜實虛癆通用方也釐甲全個先熬去渣入
黨參元參黃耆紫苑天冬麥冬熟地生地骨皮山藥
貝母知母百合各二兩柏子仁黃柏白芍橘紅丹皮吉
梗赤苓杏仁香附當歸五味秦艽花粉黃芩炒黑山梔
杞子各一兩柴胡炒鬱金白朮川芎蒲黃炒桑皮炙黃

連牛夏膽星甘草各五錢蘇子三錢薄荷二錢牡蠣八錢烏梅七個油熬丹收牛膠白芨二兩調清熱降氣
瀉正是補若**負重鬥力以傷肝血莫希王者之寄奴**宜
專補則助火**負重鬥力**寄奴能合金瘡○補肝膏治肝虛氣血為
病者或有隱痛並宜亦虛損通用方也鼈甲全箇先熬
去渣入黨參生地熟地杞子五味子當歸茵肉各二兩
黃菁白朮白芍川芎醋香附山藥棗仁靈脂各一兩柴
胡丹皮黑山梔龍胆草瓜蒌黃芩茯苓木通羌活防風
澤瀉生甘草各七錢黃連續斷吳萸陳皮半夏紅花五
錢薄荷官桂各二錢烏梅五個油丹熬牛膠三兩攪○
按肝實火旺者有柴胡黃連香附青黛甘草方肝虛
陰血耗竭面色黧黑耳聾目暗脚弱腰痛小便白濁有
當歸鹿茸烏梅肉荳蔻肉麝香方肝傷有瘀積有柴胡
大黃瓜萸根當歸桃仁紅花炮
山甲方俱可臨症酌量加用**苟調以胎之呼吸**即胎
○任脈通肺以繫臍帶故兒在胎中隨母臍為呼吸也
學胎息者須想其氣出從臍出氣入從臍入調得極細
然後不用口鼻但以臍呼吸數至八十一或一百二十
乃以口吐氣出之能胎息可入水又眼視鼻鼻對口

口對臍想其出入可降心火入而氣自納於臍氣歸臍

丹田亦名胎息此法甚簡而效為息神

入氣餅臨臥擦左脚心不必擦脚之餅也縮腸祕法水蛭預取九條陰乾

降心火此回春方能導其脈之流行而血自歸於經矣為胎

庸塗項之膏也按治咳紅導引法坐定兀子上以雙手

放之放而又閉日行五次兼用運功法長念數日繚胸

前推開次運湧泉水洗心或封固臍凝守此方推胸

洗心固臍之法須以意會。血用前洪寶膏塗項能

截血路少林推之在手塗臂在足塗腿名截血膏能者

亦可或衝而攻減萬春以平其逆可代三和之散焉萬

更推膏治肝胃氣痞塊瘕痕鶴膝疝氣脾虛泄瀉一切內症

疼痛跌撲閃挫風氣桑槐柳枝各四斤麻油四斤熬紅

粉收桃枝攪另用生大黃兩半白芷當歸紅花防風煎

活獨活生香附南星木瓜佛手乳香沒藥沈香丁香木

香入錢白芥子二錢肉桂五錢麝一錢研末和入膏內

忌火如火衰泄瀉加硫磺痞加米炒斑毛去頭足膠貼

原方有黃耆川烏牛膝麻黃茜草無香附木瓜佛手

此從張刻減本然原方力大。三和散治諸氣鬱滯脹

痛用羌活木瓜沈香木香紫蘇川芎厚樸甘草陳皮檳

榔白朮之屬。又熱結血閉有三和湯用生地白芍當

歸川芎連翹大黃芩硝薄荷黃芩梔子甘草乃合四物

調胃承氣涼膈爲一方者如治氣鬱血閉可併用熬貼

兼表裏寒熱升降補瀉之妙此又從前人集或溢而洩

方之法而更推之者也凡膏方皆可倣此推

增十灰以止其狂可抵七生之飲焉

血十灰散大薊小薊柏葉荷葉茅根茜根丹皮櫻皮大

黃梔子黃等分燒灰加藕汁萊菔汁金墨汁調用。治

血崩及一切失血十灰散黃絹馬尾藕節艾葉蒲黃蓮

蓬油頭髮陳棕赤松皮新棉皆燒灰以醋煮糯米取湯

爲丸用。竹林崩漏散用藕節柏葉艾葉陳棕大小薊

丹皮山梔胎髮瓜萸燒灰全。三方臨症酌量十灰亦

不必全皆以生地當歸川芎白芍蒲黃白芷荆穗地榆

甘草皆炒過煎湯入醋少許下廣膠化開加炒黃丹收

調十灰貼心口臍下。附治諸血方以備用。古刺心

火也木賊草煎水嗽立止。一用黃連連翹竹心煎嗽或

烏賊骨蒲黃炒研塗舌或用黃柏槐花糝或用茅根車
前子髮灰吹擦舌出血如泉五倍牡蠣粉白膠香塗。
齒齩胃火也齩屬胃齒屬腎一經相併血出於縫用緣
袍散黃柏青黛薄荷苾硝水片摻胃熱口臭者大黃生
地片貼腎虛者青鹽香附草烏皂角炒研擦或絲瓜藤
或絲瓜絡燒灰擦旱蓮草研末擦地骨皮杞子麥冬湯
嗽竹葉白蘆煎嗽有眼輕粉而齒齩者另治。耳血
生地汁滴或蛇蛻灰吹并治乾痛亦有加海螵蛸乾脰
脂燒灰吹者或陳皮炒黑加燈草灰吹或龍骨煨研加
枯礬吹并治膿耳一切。鼻血蒲黃炒或血結末或油
髮灰末或人中白末吹鼻或枯礬龍骨麝香以濕紙包
藥塞鼻餘見前傷寒。九竅出血小薊百草霜香附蒲
黃炒擦牙并摻出血處。肌皴砂寒水石麝香研撲
或煮酒埃紙揉碎如楊花雕之立止此症血從毛孔出
亦名脉溢乃虛極有火也。指經出血多年糞桶箍燒
灰吹。腦中出血虛也髮灰摻凡血皆可用。孔竅出
血山甲末摻此物最能補漏。金瘡出血麻黃細辛敷
破傷經絡出血靈脂末摻。臟毒榆皮冷茶敷。腸
風馬兜鈴藤穀精草三棱烏頭煎洗。血崩燒漆器令
聞或舊毡條或棉花胎坐身下或黑驢糞燒熏危急者

黃丹鉛粉絹包塞以線帶住止卽去之又有燒大敦穴
法再發仍於原處燒之自止大敦肝穴也。凡止血以
藕汁調金墨用及吹髮灰百草雷草紙灰皆驗麻油浸
胭脂或生地塞鬱金塗三七塗韭菜炒熨皆妙下部
宜槐花地榆煎洗。痔瘻出血血結未摻。治血七生
飲者卽生地生荷葉生韭菜生茅根生藕節各一兩生
薑五錢取汁加薑汁用者乃四生飲加味生血者氣氣結成痰幻增百怪擦
控涎丸而運之痰者津液之異名潤養肢體者也肺曰
客於肺水升火降脾胃調和痰何從生痰原於腎動於脾
濁爲痰清稀爲飲痰由肺虛火炎熏灼而成故稠濁飲
由脾虛水停不散而成故清稀痰宜降氣清熱益陰
滋水飲宜燥濕利水行氣健脾肺喜涼潤惡溫燥以
二母二冬地黃吉更爲要藥脾喜溫燥惡寒潤以二木
星夏爲要藥。痰有十風痰寒痰濕痰熱痰鬱痰氣痰
食痰酒痰驚痰也寒痰清濕痰白火痰黑熱痰黃老痰
膠風痰青而光陰虛多黏痰。飲惟清水或青黃黑綠
酸辣腥臊鹹苦皆是飲有五流於肺爲支飲肝爲懸飲
心爲伏飲經絡爲溢飲腸胃爲痰飲也懸飲亦謂流飲

又有留飲癖飲總由飲食水漿乖時失度所致令人咳
逆倚息短氣不得卧形如腫脇間動搖漉漉有聲咳
引痛膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒腰背痛自淚出或身傷
喘體重背冷四肢慙節痛。凡痰症初起頭痛發熱類
外感表症久則潮咳夜重類內傷陰火痰飲流注肢節
疼痛又類風症但痰症胸滿食減肌色如故脉滑不
不定爲異凡有痰者眼皮及眼下必有烟灰黑色
痰症與火症別處痰有形火無形腫而痛者痰痛而
腫者火也。古云十病九痰又曰暴病多屬火怪病多
屬痰王隱君滾痰丸用大黃黃芩礞石焰硝煨加硃砂
沈香丹溪加陳皮半夏白朮茯苓人參甘草薑汁竹瀝
爲達痰丸又丹溪有控涎丹用大戟甘遂白芥子行水
健脾治痰之本或加大黃芫花黃柏南星半夏蒼朮白
朮枳實陳皮紅花杏仁桃仁神麩薑汁竹瀝皂角明礬
或加芫花芩蘼巴豆黑豆王全生用控涎丹敷附骨疽
鶴膝風或酒或蜜或醋調用又汪本消痰消核膏用甘
遂南星半夏各一兩麻油熬下麻黃大戟僵蠶四錢白
芥子五錢藤黃六錢撲硝七錢黃丹收貼則皆用控涎
法而變通者也。控涎丸治風痰熱痰濕痰食積痰及
痰飲流注痰毒等症惟陰虛之痰與冷痰勿用。蒼朮

生南星生半夏甘遂各二兩白朮芫花大戟大黃葶
 黃柏黃芩黃連梔子枳實陳皮青皮香附靈脂各一兩
 連翹吉更薄荷白芷赤苓川芎當歸前胡鬱金瓜蒌
 椰靈仙羌活防風蘇子皂角明礬白芥子蘿蔔子
 全蠍木鼈仁延胡細辛葶蒲雄黃各七錢白附子草烏
 木香官桂黑丑吳萸巴仁紅花乾薑厚樸輕粉炮甲各
 四錢研薑汁竹瀝各一碗牛膠一兩水煎和丸殊衣臨
 用薑汁化開擦胸背手足心痰白下或加黨參犀角
 此方用生薑半斤槐柳桑枝各二斤鳳仙花莖子葉全
 一株麻油先熬入前藥熬黃丹收加石膏滑石各四兩
 攪貼亦治百病。附方 凡痰塞者皂角一斤生甘草
 一兩黨參五錢百草霜三錢陳酒熬膏臨用加薑汁調
 塗頸名黑龍膏 又治中風驚風乳蛾等症延胡煨二
 錢牙皂十四枚青黛六分麝一分清水為錠名青金錠
 臨用水磨滴鼻凡痰熱水泛則制其水 脾虛不能剋制
 皆可塗心口 餘見前 腎水水泛為痰
 唾而不咳者宜入味丸藥料熬配氣者血血流變汗危
 膏貼臍下 或川滋腎膏加藥配氣者血血流變汗危
 見諸虛塗鎮液丹而斂之 水穀之清氣依脾而上升於
 肺其至清而至精者由肺而

灌漑乎四體而爲汗液津唾助血脈益氣力生生不已
其清中之濁者下入膀胱而化爲水也。腎主五液入
心爲汗又汗爲心液心動則汗出陸云諸汗心腎兩虧
病也然有風寒暑濕之邪有五臟之虛宜辨。汗卽血
也故古云奪血者無汗奪汗者無血。風傷衛故有汗
表氣虛亦多汗風濕多自汗暑病多自汗濕與熱合邪
汗出不休而身軟又火氣上蒸胃中之濕亦能作汗。
寤而汗出口自汗屬胃陽虛宜補陽固衛寢而汗出口
盜汗屬腎虛有火宜滋陰降火。凡熱邪乘陰虛出者
汗熱寒邪從陽虛出者汗冷又痰症冷汗自出津津決
背。又有頭汗分部位看額心鼻脾額腎左額肝右額
肺若齊頸而還血證手足汗屬胃熱心口獨有汗
屬心勞過度。柔汗絕汗也。治外感風邪自汗羌活
防風川芎白芷白朮黃耆桂枝白芍甘草柴胡黃芩牛
夏各五錢油熬丹收貼心口卽實表法也。按去黃耆
白朮桂枝加蔥薑各一斤麻黃蒼朮杏仁各一兩熬卽
發表。治自盜諸汗生黃耆二兩白朮棗仁熟地當歸
白芍柏子仁麻黃根各一兩五味子防風龍骨各五錢
牡蠣粉一兩五錢赤石脂一兩二錢共研末用紅棗肉
黑小豆浮小麥各一兩煎汁化牛膠五錢和丸名鎮液

丹隨斤酌以開水磨塗心口亦可用麻油熬膏黃丹收
貼按陳脩園曰衛外之陽不固而自汗則用善附脾
中之陽遏鬱而自汗則用木附腎中之陽浮游而自汗
則用參附若陰虛火擾之汗則倍用黃耆加當歸生地
熟地黃連黃柏黃芩如熬膏糝藥可以此爲法又痰加
半夏濕加羌活臨症斟酌總期愈病不徒好爲高論
附方陰汗腎虛陽衰者蛇床子酒炒白礬陳醬煎洗
血汗髮灰撲或郁李仁研生梨汁調敷按郁李仁破血
或用其敷法而酌易以他藥亦可篇中存方以
備法往往有取其法而不取其藥者識者察之津脫則
益以津之經曰津脫者膝理開汗大泄故用津調藥以補
用鬱金末臨睡津調塗兩乳上盜汗或用黃柏末
通治自汗盜汗五倍末津調塗臍或加枯礬附方
治一切虛汗盜汗自汗及漏風等汗泄不止諸藥不效
者麻黃根白朮棗木牡蠣龍骨五錢糯米粉二兩水片
五分撲可參用誤用麻黃汗出不止將病人頭髮浸
水并用撲法按腎主五液分化五臟入心爲汗入肝
爲淚入脾爲涎入肺爲痰奚由生汗不再泄榮中而
涕自入爲唾症詳醫書

衛外爲榮。榮者水穀精氣上注於肺者也。衛者其悍氣也。血喪生之本也。○榮氣之行自太陰肺始，徧行臟腑，其行也以息往來一周於身，無晝夜陰陽之殊也。衛氣寤則行陽，寐則行陰，皆從足少陰腎始至平旦，與榮會於手太陰，故少陰病但欲寐。○邪氣客於五臟六腑，則衛氣獨衛其外，行於陽不得入於陰，則陽盛陰虛，故目閉。半夏能和又留於陰，不得行於陽，則陰盛陽虛，故目閉。半夏能和胃而通陰陽。○又氣行脈外，血行脈中，相並周流，寒濕搏之則滯凝而行遲，爲不及；火熱搏之則沸騰而行速，爲太過。氣鬱邪入血中，爲陰滯於陽，血鬱邪入氣中，爲陽滯於陰。致生百病，癱生六腑，疽生五臟，亦由陰陽相滯而成也。川芎當歸能和血行氣而通陰陽。○仲景桂枝湯爲風寒調和營衛之方，又養榮湯爲大補氣血之方，均可爲法。○按十全大補藥料加陳皮等火降而水分遠志減半，油熬丹收，貼可治內外諸虛症。○火降而水升，二句總上。○凡陰陽損傷皆因水火不濟，故但以調和心腎爲主，兼理脾胃使水升火降，則飲食進而精神氣血自生。○治勞損心腎虛而有熱者，生地熟地山藥茯苓神三兩當歸澤瀉黃柏兩半，山黃肉杞子牛膝丹

皮黃連生甘草龜板鹿角各一兩麻油熬黃丹收硃砂
一兩攪勻攤貼心口丹田卽古庵心腎丸方也若虛
而有寒者兔絲子三兩牛膝熟地肉苁蓉附子鹿茸黨
參遠志茯神黃耆山藥當歸龍骨五味各一兩如前熬
貼卽究原心腎丸法也又黃連肉桂同用能
凌心腎於頃刻或用蜜丸填臍膏蓋或糝膏貼胃主水
穀而納臍腑皆稟氣於胃五味各走其所喜酸先走肝
苦先走心甘先走脾辛先走肺鹽先走腎穀氣精液已
行榮衛大通乃化糟粕以次傳下大腸主津小腸主
液胃氣不足二腸無所稟受則津液涸焉飲食入胃
則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛更虛更實故氣得
上下而何惡心嘔噦噫醋熱吞酸寒食少是慮胃傷之
無病

飲食胸腹脹痛嘔噦惡心噫氣吞酸面黃肌瘦怠惰嗜
臥常多自利。前有健脾胃膏。禦寒暖胃膏生薑汁熬
入牛膠化開以乳香沒藥收糝花椒貼并治腰背冷痛
但須入黃丹方黏此方加蒼朮厚樸陳皮甘草卽平胃
散也治脾胃不和惡心嘔噦噫醋吞酸等症再加白朮
神麩麥芽卽養胃進食方也再加黃連吳萸香附良薑

官桂白芍當歸油丹熬膠攪名和胃膏。按胃氣者清
純沖和之氣惟與穀食茶果爲宜藥各有偏性雖參著
之性亦偏東垣云胃病調其飲食適其寒溫澄心息慮
以待真氣之自復至言也故凡胃病或病後調理胃氣
當遵東垣之說但調其飲食或以和胃膏貼胸庶
不得乎清純沖和之氣而元可復也胃痛方見下腸小

泌清濁而出

胃中腐熟水穀滓穢傳入小腸上口自
腸下口泌別清濁水液入膀胱上口滓穢

入大腸上口

小腸有氣則小腹痛有血則小便澀有

熱則莖中痛

大腸寒則腸鳴飧泄熱則出黃如麋

膀胱或云有上口

而無下口一云上下俱有口上系小

腸下聯前陰中有胞藏水氣化而爲尿膀胱熱結小腹

苦滿胞轉小便不利又膀胱冷則濕詎殮泄黃麋大

痰上溢而爲多唾小便淋瀝或遺尿詎殮泄黃麋大

淋不利膀胱詳見前但水短爲憂老人小水短爲病進又尿

淋大抵不外腎虛膀胱熱冷淋千百之一也初則爲熱

爲血久則煎熬津液爲膏砂石也宜戒鹽熱淋血淋散

血利小便煎洗小腹沙石淋地榆煎浴腰腹治法熱

淋瓦松煎洗小腹沙石淋地榆煎浴腰腹治法熱

淋瓦松煎洗小腹沙石淋地榆煎浴腰腹治法熱

根髮灰車前子地骨皮煎洗。通淋膏通治膀胱積熱。淋祕尿血等症。元參麥冬當歸赤芍知母黃栢生地黃連黃芩梔子瞿麥穗扁蓄赤苓猪苓木通澤瀉車前甘草木香鬱金丹藜亂髮各一兩油熬黃丹收滑石八兩攪勻貼臍下。沙石淋及一切淋屬虛者並治冷閉小便不通。初起熱者勿用。久則雖熱亦虛。非此不治。用白蘞砂仁胡椒川椒各末一錢入小布袋內以好燒酒熬極滾熱沖入布袋內卽套上陽頭熏之。冷淋寒戰後搜用胡椒煎湯浴腰腹。治膀胱虛小便不禁。附子乾薑赤石脂塗臍或糝膏貼并治殮泄不化又遺尿龍骨煨末醋夜卧蚤起無厭於日。見內經四氣調神法此二調數臍。夜卧蚤起無厭於日。見內經四氣調神法此二長生厭也。按古訓凡人皆宜早起故節取此。陰平陽祕我體常春。見丹溪氣色慾箴。氣

血既和精神自旺祇如平人卽爲無病。平人吃得下疴

無病若程子言我能吃飯睡覺乃然百體固稟令於心

而諸臟皆取決於膽。補言膽以心陪說者心膽全一治膽敢也

也又膽與肝亦全一治膽敢也

將軍之官清淨之府養心裁紅布抹其胸

今人以紅布抹胸云可養

心既衰以養心之藥

如以丹參龍齒遠志茯神柏子仁棗仁紅花薑蒲砂之類

入抹胸

溫膽炙青布熨其目

兩眼青布代青黛用肝竅

在目膽脉又起目銳眥也

或黑豆蒸熱盛囊枕之黑

豆補肝又膽脉循頸也

此類方不必盡驗

亦浸以溫膽之前

用溫

然可識古人用藥并施治之意

藥料煎浸青枕虎頭而除麗夢寐無驚

心虛多麗枕虎頭或帶犀角或

佩麝香蘇合丸

之屬貼補心膏着蛛絲而療忘謀慮自定

七夕以蛛絲着衣領中巧

能療忘又丁酉日遠志着巾角中全

此類方今醫所

笑爲兒戲者然遠志交通心腎藥也何以不用

眠而用

着又何以用丁酉日此中當自有妙理

憫勞法天王之

丹 ○血虛而煩熱口乾者生地二兩黃連一兩黨參元
參丹參歸身天冬麥冬遠志柏仁棗仁茯神吉更五

聖命詳文

矣

味各五錢油熬丹收硃砂一兩攪勻貼一加熱地杜仲
各一兩菖蒲甘草各五錢卽天王補心丹法也肝加膽
南解煩效地仙之散心虛則煩肝腎肺虛而邪攻之亦
星解煩效地仙之散煩地骨皮與逍遙二散皆肝家得
力之劑地骨皮二斤麻油熬丹收貼或加人參麥冬防
風甘草各一兩烏梅三個同熬或地骨皮同丹皮四物
蒸皆地仙自上至下而總括三部卽三焦也三焦指腔
散法也

是也。心肺無上焦何以宗主榮衛脾胃無中焦何以
腐熟水穀肝腎無下焦何以疏泄津液無形而有用主
持諸氣。原者三焦之尊號藏腑病皆取原穴如肺太
淵心太陵肝太衝脾太白腎太谿詳難經。三焦約用
松陳木由內及外而兼列雜篇上言內景以下乃舍外
檳牽牛

形統於首治周其身

下文自首以次遞論

頭面諸疾皆失升降之

故凡頭面諸疾皆百邪上攻胸膈間病皆百邪上衝腸
胃問病皆百邪下流而傳入不然則血氣失升降之
常陽當升而不升陰當降而不降識病機括盡於此矣
○按六陽皆會於頭面者手太陽小腸脈從缺盆貫

上頰至目發音手少陽三焦脈從缺盆上頸貫頰入人中上
下頰至頰手陽明大腸脈起於目內眦上額交頰上足
挾鼻孔也足太陽膀胱脈起於目內眦上抵頭角也又足陽明胃脈
少陽膽脈起於目銳眦上抵頭角也又足陽明胃脈
起於鼻交頰中入齒挾口環唇循頰車上耳前過客主
人維絡於面故而病專屬胃。六陰脈皆至頰而還惟
厥陰與督脈會於巔。中庭各部隱藏凶吉之分自鼻
古有升降散可倣用藥。中庭各部隱藏凶吉之分自鼻
髮際曰天中天下曰天庭即額也天庭下曰司空司
空下曰印堂在兩眉間亦曰闕兩額角曰方廣皆命門
部位占病吉凶如黑色出天庭主凶後有一枝梅貼法
。自額而下鬪上屬首咽喉之部分也自關中循鼻而
下鼻端屬肺心肝脾胃大小腸膀胱六腑之部分也自
下至承漿屬膽胃大小腸膀胱六腑之部分也自關中循鼻而
下頰則屬肩臂手之部分也自牙車而斜下頤屬股膝
脛足之部分也。額屬心鼻屬脾左額肝右額肺頤腎
。兩眉心候肺兩眼中為明堂候肝鼻尖候脾鼻兩
旁候胃肝位兩旁候胆肝位下鼻之兩旁候小腸兩
頰之下候腎腎下候大腸心旁候膻中胞絡人中候膀
眈三焦無部位上焦寄於肺中焦寄於脾下焦寄於膀

眊也。五色獨決於明堂黃為濕赤為火青為風黑為痛白為寒相生則吉相克則凶沉濁為內為裏浮澤為外為表察浮沈以知淺深察澤天以觀成敗。生克者如脾病黃為正色見紅為火生土吉見青為木克土凶天者枯也。凡色實有神謂黃明而有光彩隱於皮膚之內如脉之有胃氣也。餘詳見鑑本。腦為髓

海靈之所存空則胸而冷則遺亥筋益其髓。腦為上丹

為中丹田藏神臍下三寸為下丹田藏精之府也。背

後有三關腦後曰玉枕關夾脊曰轆轤關水火之際曰

尾閭關人諸髓皆屬腦故上自腦下至尾龍骨皆精氣

升降往來之道路也。元宮者元神之室靈性之所存

也即泥丸宮。腦有餘則輕勁多力不足則腦轉耳鳴

脛痠眩冒目無所見。風邪中項乘虛隨眼系入腦則

腦轉而目眩。腦冷髓不固多遺精。按人以腦為主

而奇恒之府腦為首外治貼法百會穴至要又千金方

膏盲三里湧泉三處百病皆治膏藥亦全。腦病鼻曰

猪脊筋晒乾炙研嗜。腦痛桃葉作枕盡自鼻出。鼻曰
神廬息之所運流則動而凝則靜辛苞和其神
黃庭經
名鼻曰

神虛言鼻爲神氣出入之門也。五氣入鼻藏於心肺。心肺有病則鼻不和。鼻流清涕曰鼾。屬肺寒。辛夷去毛皮。細辛、川椒、乾薑、川芎、吳萸、附子、七錢、半皂角屑、五錢、桂心、一兩、猪油、十兩、熬膏以苦酒浸前八味。取入猪油膏內。熬附子黃色。止棉裏塞鼻。効若鼻流濁涕。曰淵。卽腦漏。乃胆移熱於腦。亦外寒內束。熱之症。用辛夷、五錢、蒼耳子、二錢、半、白芷、一兩、薄荷、葉、五、分、研、搗、鼻、或、單、用、蒼、耳、子、或、薺、香、嗅、或、山、鴿、翎、毛、灰、三、錢、指、漆、布、一、口、燒、灰、加、冰、片、吹。鼻、鼈、風、寒、客、於、頭、腦、而、氣、窒、不、通、也。黃、連、瓜、蒂、赤、豆、冰、片、末、吹。并、治、瘧、疾。按、呂、氏、春、秋、氣、鬱、則、爲、鼾。爲、窒。○附、方。○鼻、窒、痛、杏、仁、白、芷、細、辛、一、錢、全、蠋、二、個、焙、末、麻、油、調、敷。○鼻、息、鼻、痔、相、類、皆、肺、熱、也。窒、塞、疼、痛、辛、夷、二、兩、木、通、木、香、杏、仁、白、芷、細、辛、五、錢、以、羊、髓、猪、油、二、兩、和、藥、熬、膏、入、冰、片、麝、香、爲、丸、棉、裏、塞、鼻。中、消、或、瓜、蒂、四、錢、甘、遂、一、錢、草、烏、尖、柘、礬、白、螺、螵、殼、灰。五、分、麻、油、調、勻、納、鼻、化、水、或、搗、芫、荽、塞。○鼻、疳、兒、茶、雞、肫、皮、乳、香、沒、藥、焙、研、末、搽、如、爛、通、鼻、孔、者、煨、鹿、角、枯、礬。一、兩、髮、灰、五、錢、花、椒、水、洗、後、搽、瓦、松、末、收、口。○鼻、瘡、杏、仁、油、和、鹽、塗、之。○按、老、人、清、涕、有、大、蒜、搗、貼、足、心、法、濁、涕、有、香、附、華、蕤、大、蒜、搗、餅、貼、額、門、鬩、斗、鬩、法、皆、可、以、法。

推用 又鼻流清濁涕鍼灸多取百會上星風眼司乎

府風池風門大頤等穴膏藥貼法亦與鍼灸通

視 其障也 臟腑精華皆稟於脾注於目 心合脈諸

腎水。白馬肺黑屬肝上 下險屬脾內外皆屬心瞳神

屬腎白輪赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光

破翳火乘肝腎也赤脈貫目心火自甚也眼無火不病

治法清心涼肝調血順氣。凡眼暴赤腫痛畏日羞明

名外障風熱傷血則赤作實則腫攻注則痛實症也表

症也久病昏花細小沈陷名內障由血少所致虛症也表

裏症也實宜散風瀉火虛則滋水養陰然散風之中必

繼以養血以目得血而能視也養陰之中更加補氣以

氣旺則能生血也 河間謂目盲耳聾鼻不聞臭口不

知味手足不能運動皆由元府閉塞而神氣出入升降

之道路不通利也故先賢治目昏花用羊肝丸以解肝

鬱肝鬱解則目之元府通利而明矣黃連之數解熱鬱

也椒日之類解濕鬱也茺蔚解氣鬱芎歸解血鬱木賊

解積鬱羌活解經鬱磁石墜邪下降蔓菁下氣通中皆

治氣血鬱結目昏之法也東垣丹溪用參耆四物等以

助氣血運行而元府更無不通利矣。又眼無寒症但

初起宜發散忌酸寒之藥點切忌冷水洗又眼不點不
瞎亦忌水磨金石之藥頻點生火積熱為害傷寒熱病
後尤忌點恐熱聚於目未有不脩其六事晉范甯苦目
疾張湛書六
瞎者故此篇所錄不專尚點
事戲之曰損讀書減思慮專內觀簡外事早起晚夜眠
早非但明目乃亦延年許學上評之曰審如是而行之
真明目之奇方也。按點服論云內疾既發非服不除
外疾既成非點不退內外夾攻方盡其妙此方足代內
服若不脩六事卽內服藥亦何益乎。又按晉書宣王
童時有目疾華陀出其眼瞳去其疾而納之敷以藥此
法妙極今人亦有能出眼瞳而洗者惜不能啗硝蛻暴
如陀之去疾耳然自是一種外治奇法存參啗硝蛻發
眼痛火疳四錢黃丹乳香沒藥各二錢雄黃一錢研含
水吹鼻。又赤腫昏暗羞澀痛癢及翳膜努肉眵淚拳
毛等症并傷風熱腦鼻痠疼皆治用羌活防風荆芥川
芎白芷細辛曼荆子薄荷躑躅花各一錢熟石膏風化
硝黃連青黛各三錢鷲不食草五錢研含水吹鼻。又
內外障瞤藥麻黃根一兩當歸一錢為粗末炒黑入乳
香麝香各少許含水吹之三方可併用發散去盡濁涕
淚出爲度前傷寒頭痛註有鷲不食草方可參。遠年

琴睛翳障五蛇散指甲一分炮山甲蟬蛻各五釐蛇蛻
分半情退雞蛋殼白皮二分人乳炒研每用三釐含水
吹不患一邊鼻一方吹後再以錫作眼鏡合之三次血
絲翳障皆落或加鷲不食草猬皮炒各三分吉更四分
麝三釐。又川芎白芷防風荆芥羌活細辛稿本白菊
花石菖蒲天麻蔓荆子瓜蒂赤小豆漢防己兔絲子穀
精草常歸川鬱金熟石膏乳香沒藥雄黃連心硫蛇
蛻炒焦蟬蛻炒焦山甲炮補退雞殼煨腦荷各五分冰
片麝香各五洗連緣凡時氣赤眼自外而入非臟腑病
釐如前吹鼻洗連緣者不必服藥熏洗足矣黃連川芎
荆穗各一錢半曼荆子去膜一錢五倍三錢分三服絹
包煎入瓶內紙糊口挖孔眼對之俟溫并洗風火眼
神方當歸防風杏仁各一錢銅綠枯礬各五分煎露一
宿棉團蘸洗一加荆芥樸硝各一錢一加荆芥赤芍川
連各一錢飲食傷或便秘加大黃風火爛弦眼荆穗
防風各五錢苦參四錢黃連五倍川芎當歸各一錢銅
綠五分薄荷湯丸熱水化洗可以預合施濟又赤眼
黃連皮硝膽礬歸尾桃仁紅花各一錢煎黑帕罩洗
凡眼病皆血脈凝滯為患黃連當歸赤芍煎洗血得熱
則行也雪水煎丸妙。眼癢蟬蛻菊花煎洗治努肉菌

毒一切目疾川連杏仁各一錢歸尾赤芍地膚子菖蒲
各二錢羌活五分白礬三分煎洗按諸方藥料併爲
一方用黃連爲君八錢薄荷七錢皮硝六錢芎歸荆防
五倍子各五錢餘則三二錢膠水爲丸熱湯化洗治風
火眼甚驗。綠丸子卽神仙碧霞丹治內障當歸沒藥
各二錢血竭白丁香礪砂各一錢牙硝乳香各五分研
黃連三錢熬膏和前藥爲丸銅絲二兩衣新汲水浸一
丸可洗數日丸如芡實大或加水磨各少許又方通
治內外障用蘆甘石製黃丹炒各一兩銅絲入錢海螵
蛸五錢歸尾沒藥血竭白丁香礪砂牙硝乳香青鹽輕
粉雄黃元明粉礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬礬
三分麝一分共研細末用黃連一兩同川芎當歸赤芍
生地柴胡龍膽草蕤仁杏仁蟬蛻菊花黃柏五倍羌活
防風木賊草各三錢熬膏槐柳桑枝各五錢攪令條盡
爲度去渣入蜜和前藥爲丸蜜不足加阿膠五錢煎湯
和藥臨用熱水化洗甚妙亦名碧霞丹此方兼紫金膏
陰陽丹諸法無煎以羊膽或膽星一錢代用。老
眼桑皮皮硝煎洗或加黑豆紅棗菊花妙紅棗納銅綠
明礬煨塗丹硃赤眼腫痛黃丹白蜜塗太陽或用土硃
用亦妙

理淪駢文

丰

風荆芥煎湯沃之以山漆磨汁調塗四畔或用生薑汁
調枯礬末抹紙上閉目合眼胞一時如紅赤爛弦用川
椒入猪油熬枯以銅綠五錢研如膏敷眼胞均可參
○附方○摩風膏黃連細辛當歸杏仁防風白芷松香
黃蜡小磨麻油熬塗太陽○軟腫膏膩粉少許黃蜡代
赭石研各五錢細磁末黃栢末各一兩麻油熬塗腫處
○清涼散血膏治赤腫不能開睛痛熱淚如雨紫荆皮
大黃黃連黃栢薑黃當歸赤芍白芷羌活防風細辛南
星薄荷五倍蓉葉赤豆花粉菖蒲各五錢共研末以生
地二兩浸水絞汁調藥敷眼胞四圍并治撞打眼腫及
外症一切熱毒一方加土硃石膏各五錢水片三分無
土硃用黃丹按諸藥研末加牛膠化水和生地汁爲
錠臨用或井水或雞蛋清磨用尤便○眼暗肝虛也柴
胡決明子研末人乳調敷目上久久目視五色○眼見
黑花或黃白不定肝腎虛風上攻也附子炮廣木香末
各一兩青鹽兩半牛酥二兩鷓鴣油四兩硃砂二錢水片
一分熬膏塗頂上○按赤絲亂脈有鯁膽一枚黃連五
分調飯上蒸透入蜜塗數目昔者凡肝膽昔治目此方
可以通用如羊膽入蜜青魚膽和蜜亦佳○虛眼黃連
五錢穀精草一兩羊肝去筋膜二兩蒸同搗丸陰乾磨

或加夜明砂蟬蛻木賊各一錢當粉搓針煮玉餅

歸二錢末搗丸東垣有圓明膏八分搓丸麻子大

海螵蛸蛤粉各一分冰片五釐黃蠟亦名照水丸一方

帶匾式臨臥納眼昔次日照水自落除久昏白菊花

去蛤粉加硃砂用同○七錢丹眼藥能除久昏白菊花

川花柳各三錢膽礬三錢五分青礬銅綠各二錢五分

烏梅一個去核新綉花鍼七枚將藥研細末水調同鍼

入磁瓶內封浸七日隔水煮六個時辰鍼化爲度去渣

取水點此方奇效眼方甚多二方錄其新別者○按

點藥黃連爲主火眼同雞蛋清攪如香煎注尤得苦降

辛散養陰之妙陽症去丁香加樸硝血虛加當歸氣虛
加黨參皆可火眼熱脹痛以人乳調黃連末塗碗底
點艾於地覆碗熏之以焦黑爲度飯上蒸過清水調隔
紙透出黃水取點又黃連人乳同熬仁熬點少加炮
薑炭名乳汁煎治冷淚者其用炮薑炭甚妙可佐黃連
之寒眼翳指甲磨人乳點或象牙磨人乳點小兒
用胡黃連人乳敷足心又雀目白犬乳點或鷹眼或臘
月鷓鴣眼灸研人乳調點並良○老眼點仁同蜜熬點
女貞子熬點龍膽草熬點亦可加藥用○明眸膏蒼朮

柴胡龍膽草苦參元參生地赤芍歸尾川芎荆芥防風

麻黃白芷細辛薄荷大黃芩硝黃連黃芩黃栢黑山梔

羌蔚子五倍子決明子草麻子羌活連翹蓉葉陳膽星

木鼈仁杏仁桃仁蛇蛻蟬蛻木賊草山甲片菖蒲紅花

乳香沒藥各一兩羚羊角入錢犀角片二錢丁香一錢

先用槐柳桃桑枝枸杞根竹葉菊葉各半斤生薑一兩

麻油熬去渣入藥再熬成膏黃丹收石膏黃蠟松香各

四兩羊膽二個攪勻糝冰片貼太陽并通治風熱症○

附方○暑月行路眼昏薄荷葉揉汁滴赤腫童便洗

雞蛋煮熟合眼胞豆腐亦可或生薑片貼四圍加瓦松

搗敷亦可○眼起星胡椒菜薺菜根橘葉菊葉鷺不

食草不拘一味塞鼻皆可又方丁香黑棗塞不患一邊

鼻星斗上時去之○爛眼蠶砂麻油浸塗黃連煎汁以

甘石收敷海螵蛸入冰片和敷○血灌瞳神熊膽點真

珠水晶琥珀牙硝各五錢硃砂一兩米片一分研點○

迎風流淚甘石海螵蛸水片點如冷淚香附蒼木椒目

麝吹鼻或用前連乳蕤薑方○拳毛倒睫懸膽點或木

鼈仁研棉裹塞不患邊鼻或五倍末蜜調敷眼胞自起

或薑黃土硃麝香烏金紙灰吹鼻或卓烏南星乾薑桂

枝塗足心皆忌摘摘之復起更硬此症有服補中益氣

者亦有乾蒼蠅研嗅蝨子血燕點者醫法無窮學者
須擴其眼界每謂外治中多奇方可悟格致之理通人
當以爲然。蟹睛鱈魚血曬乾蘸點。眼漏流膿閉目
熱牛糞敷胞上或柿餅搗塗。努肉杏仁去皮尖自己
生嚼點雄麻雀屎男孩乳調點努肉赤白膜蛇蛻麻油
炒勿焦人乳調點努肉急起遮眼鐵綉磨水滴努自開
切忌割。偷針生地南星搗貼蛇蛻皮貼猪肉貼白
芡磨水點。痰核生於眼胞推之移動皮色如常硬腫
不痛醋磨南星敷或指甲擠出白粉卽愈。珠菌堅凝
核。眼蘇銅綠膽礬塗或加明雄塗碗上以牙皂荆芥
薄荷艾葉捲紙燃點熏升黃色搽。打傷眼睛用前散
血膏敷四圍眼突出者猪肉摻當歸赤石脂末貼。損
目破睛牛口涎日點黑睛破者亦効。飛絲入目磨濃
墨塗泥沙入目嚼牛膝搓丸塞之淚裏砂出左眼右嚼
右眼左嚼石灰入目生梔子煎濃汁頻洗烟矢入目亂
髮揉箭頭入目米糖點入待其發癢一拔卽出。小兒
跌損瞳神不正石楠葉一兩甜瓜蒂七個藜蘆三分末
吹鼻日三。按人之五官最要耳聾眼瞎卽不可以成
人至唇齒喉舌尤爲飲食所關生之本也雖曰外形而

內心存焉矣其症最多而其治最難故文耳司乎聽

中舉其要註中更詳載之以備臨症擇用耳司乎聽

其閉也耳腎竅腎和則聞五音肺貫耳亦聽聲若勞傷

虛有火耳聾新聾多熱散風熱開痰鬱舊聾多虛滋

補兼通竅左聾忿怒動肝火多婦人宜當歸龍蒼丸

藥料右聾色慾動相火多男子宜六味地黃丸藥料左

右聾醇酒厚味動胃火宜防風通聖散藥料凡耳病用

膏做此傷寒耳聾及因病耳聾非尋常可比經摩其

日精脫又仲景曰陽氣虛又或將發斑不可不審

兩輪此脩養法亦燻艾麝暴聾屬氣閉艾末一兩加磁

少許黃蜡融離紙上卷筒燒熏氣通後仍艾塞避風

又蒼木削下尖上平式插耳內艾燒之耳有熱氣爲度

或用檳榔削尖挖孔納麝少許插耳內納杏水通耳錠

艾燒全按耳聾屬風熱者用風熱膏納杏水巴豆不

去油一個斑蝥三個麝少許葱涎和捏爲錠如麥形棉

裏塞耳中响如雷勿懼二十七日日有膿水出去錠此

方太峻毒宜用下方治耳卒聾蒲黃細辛神麩各五錢

研杏仁七錢搗膏和捏爲錠塞或加椒目水片亦可

耳鳴而聾屬肝火者全蝎末酒調滴聞水聲效或同葱
涎搗塞痰火膽星研酒調裏塞腎虛削生烏頭塞或同
苜蒲棉裏塞或煨生地或搗熟地塞○久聾草麻仁二
十一個皂角肉半個地龍一條全蝎一個遠志肉磁石
末各三錢黃蜡溶棉裏塞一加雄黃白礬半生牛蝎
各五分麝二分葱白三個同搗塞面壁坐或熊膽滴抽
椒蠟腎虛耳聾巴仁川椒菖蒲等分研末加全蝎松香
黃蜡爲條抽之或用葱大蒜巴仁松香細辛黃
蜡爲條如鹽蒸鐵磨凡耳中熱痛蒸鹽令熱布包枕
上法亦可鹽蒸鐵磨之或磨刀鐵漿滴之又金絲荷
葉草汁滴鯉魚腦蒸熟滴鯉魚膽滴皆可又乾痛蛇蛻
燒灰麻油塗○附方耳出青黃白黑膿俱由胃濕與肝
火相兼而成惟紅膿屬風偏於肝經血熱○耳疔膿血
腫痛萘菜自然汁滴入又石榴皮加水片吹卽結痂龍
骨亦可或用海螵蛸水龍骨黃連枯礬雞哺退殼焙研
吹或雞子黃炒出油塗或用麥小粉陳醋熬如膏塗耳
外或胭脂明礬鐵銹糝○耳疔形如櫻桃或如羊奶耳
聾如初生蘑菇頭大蒂小耳疔形如棗核細條而長努
出耳外俱由肝腎胃三經火結微腫悶痛色紅皮皺觸
之痛引頭頂雄黃輕粉礬砂各三錢冰片五釐研水調

理淪駢文

三

點凡耳病用塞法滴法不如塗耳外。耳內生粒即

耳定人指甲焙加冰片吹止痛再用老鼠刺葉尖煨研

加冰片吹愈。耳中結塊泥鍋底煤和猪油生研葱

涎調棉裹塞。耳子即耳疔痛加推刺牽引腮脂破流

血水蟾酥丸水調濃汁滴耳內并塗耳外或荔枝煨麻

油調塗耳外內疔自消或用拔法荔枝肉蝦蟆肝黃

丹同搗塗或用荔枝肉蝸牛爛雞矢黃丹同搗塗。諸

蟲入耳醋及菲蔥薑汁香油雞冠血猪油牛乳隨灌

耳有物不出弓弦或麻繩打散塗膠唇齒相依喉舌是

入耳粘之。水銀入耳枕金器自出唇齒相依喉舌是

司唇者肉之本靈吻之外緣也實紅而虛白唇主脾

驗五臟之寒熱熱則紅甚寒則淡紅實則紅活虛則紅

白又紅赤內熱黃白氣血虛紫黑胃不足又風則瞶

動寒則掀縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則瘡腫凡

唇口俱腫赤者熱極也唇口俱青黑者寒極也六腑

之華在唇潤以松毛橄仁敷橄欖磨搽仁敷如燥裂

唇有病治脾潤以松毛橄仁敷橄欖磨搽仁敷如燥裂

胭脂燥之粉綠連琴唇腫破爛流水黃連二兩錫綠玉

膏敷錢枯琴錢半宮粉三錢熬膏加水

麝敷。○附方人中腫大生蒲黃二錢黃連米片各一
錢麻油調塗口唇腫黑痛癢銅錢石上磨猪油搽之
荷瓣而止血出。唇開裂出血者以白荷花瓣貼之即止
唇繭唇瀟唇黃栢二兩用五倍子蜜陀僧各二錢甘草
二分研末水調勻塗黃栢上烘乾再敷再烘藥盡爲度
俟黃栢冷透切片貼此製黃栢貼法佳加青黛并治口
瘡一切又繭唇白布作燈炷如指大安斧上燃燒令刃
上汗出拭取數唇上日數次或青布灰和猪油敷更便
又方五倍子訶子肉等分香油敷又方亂髮蜂房蛇蛻
六畜毛蟻蟻燒灰猪油調搽又緊唇及重齶重齶蛇蛻
灰敷。○嘴唇翻轉形如猪嘴名唇菌此心脾熱毒也針
刺少商穴出血洩毒再用澆雞糞敷或破癩團敷或地
龍搗爛加炭黃灰熱醋調敷足心。唇疔刺委中穴餘
照疔治。○唇瘡藍靛葉汁塗唇破生瘡瓦松生薑汁搗
融入鹽少許敷唇瘡四圍如黃蜡旋覆花椒麻油塗葵
花根焙研蘇油塗口角生瘡燕子窩研蘇油塗砂仁殼
焙研敷。○缺唇先上麻藥將雨邊皮微割破絲線縫好
以生蟹黃塗靜坐勿言笑七日收口亦不必割者一
用龍骨白蠟塗或用活蟹炙乾爲末每取二錢加乳香

沒藥敷并可接舌。麻藥卽齒者骨之終餘也。牙之內

川烏草烏末涼水調難貼。齒者骨之終髓之所養腎實主之故

床也盛堅而衰豁。曰腎標。內床曰齒外板曰牙。上

齧屬胃喜寒惡熱下齧屬大腸喜熱惡寒。壅則浮虛

則宜露又虛者搖動不痛痛是風火蟲然腎虛相火上

炎亦痛又火有虛實虛火痛緩日輕夜重實火痛不可

忍風痛者痛而且腫甚至頭面皆腫呵風亦痛蟲痛發

時必在一處叫號不已亦有虛火只在一處者又寒痛

不腫不吐喜熱飲熱痛齒齧腫爛喜吸涼風又熱痛怕

冷水激冷痛怕熱水激風痛不怕冷熱。齒痛胃有濕

熱上出牙齧爲風寒飲冷所鬱作痛寒是標宜辛溫熱

是本宜辛涼有用涼更痛者宜從治。上牙痛腎經

虛熱宜細辛等

下牙痛大腸虛熱有風宜白芷等補

以羊脰鼠脊

固齒之法用羊脰骨燒灰同食鹽擦寒加

石膏之類或單加骨碎補炒黑擦或再加牛牙煨擦均

可如齒落不生者加雄鼠脊骨煨作末搗折處自生此

古方也。腎經犯風寒齒痛連腦者麻黃去節草薹皮

各一錢黃蒼桂枝各二錢吳萸白芷各四分羌活八分

稿本三分當歸熟地各五分升麻一錢為末先用溫水
嗽以藥擦之一加蝎梢少許全又風寒濕犯腦痛牙齒
顛動搖欲脫柴胡五錢麻黃防風各三錢羊脛骨灰二
錢羌活一錢半草薹皮一錢當歸六分蒼朮升麻各五
分稿本白芷桂枝各三分細辛少許研擦此即前方
以脛灰代著地等也如合兩方油熬丹收貼頂上及痛
頰佳虛人發散風寒亦宜○附方○預免齒痛法白鹽
四兩青鹽二兩花椒一錢煎汁炒鹽每早擦牙以溫水
嗽後吐出洗眼可免牙疼眼痛一用槐柳桑枝汁煎鹽
全○牙宣珍珠散龍骨煨二錢海螵蛸一錢珍珠三釐
兒茶硃砂象皮乳香沒藥冰片各五分血虛齷齪加散
白芷棉團蘆水蘸藥以指抵實之并治牙落血不止散
之防辛椒芷通治風火蟲牙防風細辛川椒白芷各等
分擦勿嚥入口或加雞肫皮青鹽樟腦雄
黃礞砂牙硝冰片數類○附方○虛火牙痛冬桑葉黑
山梔煎嗽或仙靈脾煎嗽或核桃殼花椒鹽煎嗽或荔
枝肉連殼燒灰研擦或元參桂元肉貼又方無論虛
實火蟲蛙黃連細辛生石膏一錢兒茶五分冰片一分
虛加黨參蟲加樟腦擦按此方治胃有火者若胃寒者
宜川椒丁香冰片○牙疼吹鼻散雄黃胡椒萆薢良薑

細辛乳香麝香等分男左女右吹鼻如牙痛臉腫用紙
捲藥香油點燎又是一法如治骨槽風陰症者用此甚
妙○牙疼塞耳丸川烏底草烏尖蜈蚣頭全蝎梢雄黃
川椒卷紙蘸醋炙乾塞兩耳又方雄黃一錢樸硝細辛
各三錢牙皂四錢大蒜二枚搗爛丸如豆大塞痛一邊
耳一丸可治數人如耳聾亦可用又方壁錢包胡椒末
塞痛一邊耳手掩枕之額微汗愈此方發汗法甚奇又
方冷痛大蒜巴豆棉裹塞耳○蟲痛雄黃蘇油煎嗽或
五倍冷水敷頰外或菲根川椒搗塗病頰蟲自出又方
靈胎五錢蟾蜍一錢黃丹三錢松香黃蜡爲丸塞蛀孔
內又蟲痛有菲菜剪蠟紙而固齧搖治牙齒動搖不牢
子熏法有取蟲法剪蠟紙而固齧搖治牙齒動搖不牢
溶化入定粉龍骨末各五錢加麝香五分和勻候冷取
出髮斗燒熱鋪紙用藥攤之勻薄每剪紙條臨臥貼齒
斷間至早取出半月效按牙疼玉帶膏卽照此方加
黃芩黃栢各五錢桃仁三錢熬刷連四紙剪貼一夜黑
色驗此與上柏片方皆取其貼法倣此可以用膏○
治牙痛及骨槽風口噤覺腮內熱者陽症也貼頰上亦
治一切風熱羞活防風麻黃荊芥穗薄荷升麻甘草等
夏黃芩連翹丹皮射干殭蠶茵陳大黃生地獨活川芎

白芷當歸赤芍乾葛黃連草薏仁各五錢細辛一兩黑
丑二兩麻油熬黃丹收石膏四兩攪。又骨槽風齒痛
不已齧內浮腫紫黑色而出血久則腐爛屬腎虛胃火
口疳藥加牛黃珍珠兒茶頻吹。又骨槽風有由風蟲
牙痛潰爛變成者地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當
歸槐花藁本甘草各一錢生薑三片黑豆百粒煎熱嗽
冷吐并治各種牙疼此玉池散也。又方天麻防風草烏
畢發川芎細辛乳香礞砂薄荷麝香共末口含溫水嗽
鼻內吹之此乳香畢發散也。較上方爲溫寒症宜之
又骨槽風牙骨及腮內疼痛不腫不紅痛連臉骨者卽
陰寒症宜溫散忌用涼爛者犀黃麝香乳香沒藥吹并
用蟻螂研末加乾薑末擦可出骨。透骨穿腮者南星
挖空入明雄麩裏煨加麝香掃。按骨槽風多口噤者
風也。穿牙疔先二日牙痛寒熱後痛更甚齧上發一
紫塊齧上肉皆紫黑者是用金子吹消腫出痰卽鎗確
入分生蒲黃四分殭蠶一錢牙皂錢半冰片一分也。
疳齧牙齧臭爛出膿水枯礬青黛胡黃連蘆薈梧桐淚
各二錢半蝦蟆灰五分麝二分半敷。凡牙痛大蒜泥
敷經渠穴週夜起一小泡挑破出黃水愈。口舌以辨味
穴在大指二指手背微窩處用蜆殼蓋扎。

心脾旺而舌病生

心脾脈繫舌而主口唇諸經皆會於

食則酸煩躁則溢虛則淡疸則甘勞鬱則苦寒勝則鹹宿

生瘡。心之本脈繫舌根脾脈連舌本散舌下主舌強

肝脈絡舌本腎脈挾舌本主舌乾腎之精液出於舌端

分布五藏心實主之三經爲四氣所中則舌卷不能言

七情氣鬱則舌腫不能語至于心熱則舌破生瘡肝壅

則出血如湧脾閉則舌胎如雪。臟腑積熱口舌生瘡

赤屬心白屬肺又口舌狀如無皮曰瘡口舌糜爛曰糜

不痛者難治無血出者不治。又大人小兒熱病後火

毒留胃致牙根黑爛甚則穿腮破唇名口疳有走馬疳

延爛至連鼻梁上發紅點及龍門牙落不治。凡心火

舌上生瘡或舌上燥裂或舌尖出血或舌硬宜用黃連

梔子生地麥冬當歸赤芍各五錢犀角薄荷生甘草減

半再加元參連翹吉梗各五錢升麻乾葛減半并治咽

喉牙齒耳面腫痛如用麻油熬黃丹鉛粉收加牛黃清

心丸一粒攪勻攤乃有剛子即巴敷頤砂搗攤紙上

貼心口及患處佳。凡舌病皆治如足泡溫水洗去更以

蒲水拭之巴豆性毒宜酌小兒嘴爛不能吮乳亦用此

或用巴豆入黃
丹飯丸貼眉心
陀僧貼眉
舌病南星陀僧
連辛納臍連黃

細辛也一寒一熱功成而無偏勝此配藥之法也按

口舌糜爛心脾蘊熱黃連乾薑末糝名水或散加黃栢

黃芩梔子細辛末名赴筵散或用黃栢細辛或用黃連

細辛俱名赴筵散然皆忌入喉綱目載納臍之法甚善

推之可以貼膏○附方凡口破俱禁水嗽用辰砂滑石

冰片數或五倍一兩黃栢炙滑石飛各五錢數又凡

口舌瘡色紅而渴者屬熱用黃連一錢炮薑五分青黛

兒茶各八分加雞肫皮一錢糝若色淡白斑細點不渴

者乃思慮多醒少睡血傷火動也不宜太涼以黃栢青

黛各五錢柱心一兩末糝或黃連柱心末等分糝按

普濟方云舌病糝藥後須以小膏蓋
之方能久留可以悟舌上貼膏之法
蚬莫丁黃塗足之

法凡舌病用涼藥不効者中氣不足虛火上炎也宜理

中膏貼胸附子塗足又舌腐爛者生蚬莫黃醃和

飛麩塗足心并治咽痛又治大人小兒爛嘴凶極者大

黃三錢丁香十粒菜豆粉二錢用開水或醋調塗足心

亦治牙疳此即下治亦湯熏旋覆
法也見毛本驗方亦是一法或用草麻

燒熏。附方。舌腫硬名木舌心脾壅熱也。茵陳百草
霜滑石酒調塗。舌突腫大名痿舌。樸硝研綠礬煨敷。
○重舌卽小舌舌根下生形如舌而小口不能聲飲食
不通心脾熱盛也。着上膠者名重膠。着齦上者名重齦。
蒲黃摻之。或用青黛散黃連黃栢各三錢青黛牙硝硃
砂各六分雄黃礪砂蒲黃各三分冰片一分共末先用
薄荷湯拭口再摻并治咽喉腫痛佳。或牙硝點之。或黃
栢末竹瀝點之。舌腫舌脹蒲黃乾薑敷并治虛熱重
舌。舌長毒熱馬前子四兩黃連四錢煎浸再用硃砂
冰片豬膽汁塗。舌縮生艾搗敷。按舌者心之外候
心主血故熱毒甚而腫脹重舌木舌等皆以針刺出血
而愈然不可輕試。舌菌初起如豆漸大如菌痛甚紅
爛無皮朝輕暮重心脾熱毒也。塘雞矢和冰片點蒲黃
末蓋或蛛絲纏忍痛自落血出用蒲黃或百草霜或五
倍烏梅銅綠摻皆可止如不止危。舌瘡羊骨髓和鉛
粉熬貼。按通用治心脾熱毒宜冰硼散卽硼砂元明
粉各五錢漂硃砂六分冰片五分也。又收口入寶散
卽珍珠牛黃冰片象牙枯礬銅綠銀硃輕粉枯鹽雞金
金箔也。泔水洗淨敷或勿先紫藥之吹口疔藥卽兼長
用哺雞殼煨功同入寶。

分配兒茶一分五釐製黃栢釐許醋煨龍骨二釐白芷
二釐半如腫痛白芷用三四釐甘草五釐珍珠五釐研
加水片三釐再研收治口碎口疳皆妙
初起腫熱多
加薄荷久病長肉多加兒茶珍珠龍骨
喉症腐爛亦
用此長肉名紫藥如治走馬疳穿牙疔重舌口疳小
兒胎毒口疳本方加牛黃倍珍珠各五釐多加更妙痘後疳
去黃栢龍骨加牛黃倍珍珠各五釐多加更妙痘後疳
非此不治按拔萃萬應喉中散卽此方加味用薄荷
七錢兒茶滴乳石五錢犀牛黃辰砂水片珍珠各一錢治
栢三錢香白芷二錢犀牛黃辰砂水片珍珠各一錢治
喉痺纏喉風雙單乳蛾喉癰喉疔陰虛咽痛效○
附方○口疳砂仁殼煨吹或紅毡灰甘蔗皮灰紅棗肉
灰狗屎內骨煨灰米泔甘草水洗後敷或白螺殼煨
同兒茶水片吹諸疳皆妙○走馬疳紅礬如豆大納紅
藥內煨枯加水片敷一加黃栢佳又東垣治牙疳用
信砒青黛輕粉各一錢麝香五分爲末香油攤紙上用
木槌槌實收起臨臥以漿水嗽淨藥紙剪封瘡口至曉
去之仍淨嗽勿嚥三次效按走馬疳非砒不可二方
一加黃栢一加青黛皆濟其烈其咽喉以發聲肺胃鬱
木槌槌紙法尤妙卽用膏之法也

而喉患作

咽以嚥物通胃喉以納氣通肺隘者咽之低處會厭管於咽喉上司開闔四者缺一不可

○咽喉症皆火病也君相二火經脈並繫咽喉君火勢緩熱結爲痰爲腫相火勢速腫則爲痺痺者痛也閉也

痺甚則痰塞以死雖有數症之名輕重之異乃火之微甚故也○又風寒包火者多古方起手只甘荊芥開

發升散及其火勢既盛則清劑方施熱結下焦而攻法始用非得己也按清如芩子貝母薄荷及重再加元

參前胡銀花花粉僵蠶之屬陰虛火炎必用元參攻如大黃芩硝之屬○又火有虛實實火因過食煎炒蘊毒

積熱所致其症煩渴便閉將發喉痺先三日必胸膈不利脈弦而數宜先用重劑潤下去其積熱再用去風痰

解熱毒之藥清其上焦元氣虛者用蜜導法○虛火由飲酒忿怒房事過度動胃肝腎火動痰上壅於咽喉

唇舌乾燥便流心脈虛數腎脈微弱此水不勝火宜滋陰降火○又有寒症如非時暴寒潛伏於少陰經越旬

日而始發名曰伏氣咽痛卽腎傷寒也法當辛散更

有少陰中寒之重症寒客下焦偏其無根失守之火發揚於上遂致咽痛宜理中四逆湯藥料景岳所謂火虛

於下而格陽於上者宜熟地牛膝炙草澤瀉肉桂熟附

子治之是也。按經云：驟起非熱，緩起非寒。大抵喉症，頃刻而起，毫無別恙者，卽是虛火陰寒之症。又寒症，或赤而色黯，大便或瀉或澇，小便清，白口不碎，不渴，身涼，或畏寒，或手足微厥，火症反是。又寒症，痛雖甚，至早少輕，喉雖腫，舌必不乾，痰雖多，必不黃，而成塊可辨。○喉症有數名：喉蛾亦名喉痺，屬風火紅腫，而有膿頭起尖，似乳生喉間，一邊爲單蛾，兩邊爲雙蛾，左肺病右胃病，關上者輕，關下者重。雙蛾輕單蛾重，又有連珠蛾、白星、上下相連，乃酒色過度所致。朝發暮重，虛症也。難治。○纏喉風如咽，腫痛脹塞，發寒發熱，外有紅絲纏繞，且癢且麻，愈腫愈大者，此外纏喉風也。屬風火如惡寒惡熱，內外無形，出氣短促，胸前紅腫，兩足畏寒，乃腎經有熱，水枯不能上潤，名內纏喉風。無論內外纏喉，前有紅絲挑去爲要，以皂角桐油攪喉，出涎無桐油以燈蓋油代如纏喉風驟然而起，舌白不腫，外無紅絲纏繞，喉內痛不可忍，亦無形狀者，更兼口不渴，大便溏，卽是陰毒。切忌用涼。○鎖喉者，一云喉間無蛾，微有紫紅色纏繞，一云喉旁兩塊大如雞卵，二說不同。大約亦卽乳蛾纏喉二症之輕者耳。用杜牛膝汁和醋數喉，外再

攪喉中出涎如兩三日前氣急短促手足厥冷忽然痰壅氣閉命懸頃刻此名急鎖喉風亦名喉閉宜用蘇子前胡等化痰降氣切忌牛黃吹藥入口不效。喉風有硬舌根而爛兩旁者名纏舌喉風甘吉湯吹冰片散吹風等症化痰解毒若移為心痛而後移於喉者名脚跟轉腫轉丸名飛鴉亦名走馬喉痺急以太乙紫金錠等塗頸甚毒者熱出血鹽湯洗冰片散吹又有喉間作痛爛不收口者名爛喉痧土茯苓煎嗽紫蘇薄荷煎敷上爛喉痧藥詳見後。又喉痺日久類服清降藥致痰壅塞聲如與錐名肺絕喉痺宜四君藥料救之。凡喉症先寒熱後見形者重先見形後寒熱者輕寒熱多者其症必重若一發寒熱夜間便起者凶。喉症多日輕夜重喉症耳聾耳痛頭痛微發寒熱者輕若傳變於手臂肩背痛者吉如頭重難舉不知痛痒或胸膈痛寒熱大作無休歇者凶若傳為心痛者不治。又喉症聲如雷鳴或如搜鋸或喜坐低處或痰多不能吐出或全無痰者或痰吐升斗者皆難治。喉症忌發汗以砭刺出血為汗無論風火時邪喉蛾喉癭及生珠小瘤皆用三棱針刺少商穴出血并刺委中穴以洩毒氣喉閉刺十

盲穴皆是火鬱發之義又急症并刺患處出血惟陰
虛之火及腎傷寒帝鍾風不可刺內傷虛損咽痛失音
者誤鍼不救又關上血泡可鍼關下不見者令病人
含水一口以蘆管尖刺鼻孔出血或磁鋒刺鼻準尖出
血又男從鼻樑尋至頂女從腦後尋至頂小兒看虎口
有血泡挑破之單蛾單點雙蛾雙點忌見火均可參○
喉症宜吐痰然虛寒亦能作痰此痰乃精液不可去宜
以法通喉○喉症便閉者宜通大便然四五日後不飲
食人虛者亦慎下○凡時行喉症惡寒者寒閉於外熱
鬱於內也不可輕用膽礬酸物點者恐陽鬱不得伸也
不可驟用硝黃下者恐陽陷入裏也凡喉症初起忌
寒涼卽陰虛用滋陰藥亦忌純涼蓋上熱未除中寒復
生致毒乘胸高腫上喘下泄爲難救也○喉症殺人最
速故詳註之然猶未備是有專書宜究又喉症以吹藥
爲主然亦易誤故文中所載皆外
治而吹藥只作帶筆識者察之
乃有商陸掩頂胸膈
有風熱則咽喉腫痛商陸沈陰下行用酒煎塗於頂上
或用商陸根炙熱熨頂并頸或用生薑將頭頂髮擦紅
卽巴麝窠鼻開關破蛾巴霜麝香爲丸棉裹塞鼻○又
陸方喉痺乳蛾巴霜薄荷細干冰片等分

裏塞鼻一時頭頂水涼喉卽開并治喉痺生瘡潰爛水
漿不入者愈後鼻瘡並無害。巴仁人蒜同搗塞耳
鼻并治牙痛。孫真人紅棗丹治喉風喉痺雙單乳蛾
等症用巴豆霜杜蟾酥當門麝冰片各一錢山荳根五
分硼砂老薑粉各三分以紅棗去蒂裝藥塞鼻卽閉口
目避風噫出膿血後銀花甘草煎濃湯漱之治喉蛾塞
蛾一邊喉風男女左右周時方可拔出早皂蒜封項喉
則誤事虛火症及陰毒皆忌慎勿冒味
喉風皂角細辛米片取噫乳蛾白破再用皂角末醋調
封項下腫消蛾破或加膽礬蠶并可吐痰或用牙皂
草烏尖蟾蜍點蛾亦破。大蒜搗擦頸蛾自破或用前
牙痛大蒜數經渠穴方亦佳。爛喉症生細辛二錢生
附尖生南星生半夏各一錢末蒜泥一命將藥十分之
九拌勻布攤貼於喉外面左右換貼以痛爲度餘藥捲
紙爲筒鼻嗅之見杭州張氏刻送本。附治喉症方。
實火症大黃芒硝雄黃末以溫紙裏塞鼻。凡杜牛膝
山荳根黃栢末牡蠣粉菜豆粉均可用雞子清和蜜調
塗項。又喉症開關生津薄荷五錢硼砂一錢半雄黃
三錢兒茶二錢冰片五分以井水或蜜調。壅頸上如口
舌瘡牙疳亦可治。按喉症清火消痰用荷藥卽薄荷

六錢研青黛六分燈草灰七分百草霜三分冰片四分
甘草末一錢也喉症開關破腫用黃藥印牙硝六錢蒲
黃四錢雄黃三錢硼砂二錢牙皂灰二條僵蠶炙二條
生礬一錢硃砂少許也破爛者勿川又喉風痰壅口禁
者用金鎖匙即硼砂五錢牙硝錢半雄黃二錢僵蠶一
錢水片五分也加枯礬劈砂印紅藥方破爛者勿用
凡喉蛾纏喉鎖喉喉閉喉癰以青藥爲主黃藥爲使輕
症青多黃少重症黃多青少喉症凶極以黃藥爲主腐
爛者以紫藥爲主再加清熱解毒便祕者用大黃石膏
釜底抽薪法如風寒閉者勿用明礬虛寒症勿用青黛
牙硝此其大略也古方多用吹然可以塗頸法代之便
祕者用敷胸及導法亦効。凡喉蛾壅塞雄黃燒酒和
燕窩泥臨臥塗頸上自破。喉風開關蜈蚣焙全蝎僵
蠶膽礬蟬蛻山甲蟾蜍川烏尖草烏尖乳香末葱韭汁
調敷喉外或元明粉荳蔻汁調敷喉外破者勿用。實火
喉痺紫金錠塗頸梅花點舌丹塗頸并治喉爛者。虛
火喉痺遠志肉末或白芥子末醋塗頸或烏星附子扎
用醋化牛膠黃丹收攤貼頸上亦可加藥。烏星附子扎
脚之法。古云喉藥忌全寒宜炮薑附子從治或用黨參
赤芍荊芥防風薄荷赤苓吉梗甘草炮薑

無不愈者。一、去薄荷加元參升麻附子同。又虛火上升，喉痛喉閉，喉瘖有用元參、白芍、熟地、當歸、川芎、黃柏、知母、天花粉、吉梗、荆芥、甘草、加竹瀝者。二、方俱以外塗爲穩。再用生草烏、生南星、末醋敷足心。妙。又如喉痺喉風，勺水不下，生附子、吳萸、醋敷足心。微火烘，卽寬。更烟吸蛇床附子一個，故紙五錢，煎足心。微火烘，卽寬。更烟吸蛇床冬月喉痺腫痛，不能下藥。蛇床子燒烟，置壺中，口鼻吸之，出涎爲吉。又腎傷寒及帝鍾風腫者，亦用此熏。忌針刺。○附方：喉痺欲死，乾漆燒烟熏吸，或僵豎乳香燒烟熏鼻。○喉蛾家麻皮七節燒烟吸。○尸咽症喉中痛痒，語聲不出，乃尸蟲蝕喉也。麻黃以青布裹燒烟於筒熏之。○喉症有油胭脂水磨研，擦耳背法。存參、母、祇、白散之糝。白散一名尿白散，卽人中白也。○喉症爛者，各五錢，蒲黃炒，甘草炙，三錢，元明粉，黃柏炙，黃連炒，明雄青黛各二錢，雞肫皮，蝦冰片各一錢，吹治咽痛臭爛。牙疳口瘡等毒，加牛黃、熊胆、珍珠各一錢，兒茶八分，麝一分，尤妙。又方：人中白、蝦青、果核、蝦雞、哺退殼、蝦兒茶、水片各等分，研吹通治喉痺喉癰喉癬。雙單蛾口疳等見陸方。○附方：喉閉喉癰，七寶散、山豆根、牙硝、膽礬。

白礬雞肫皮辰砂水片等分吹亦治懸癰下垂又七寶散雄黃礪砂殭蠶全蠍明礬膽礬牙皂各一錢治全按二方併用力尤大。統治三十六般喉症青果核灰薄荷各二錢明雄錢八分水片三分二釐青黛四分加兒茶礪砂亦可。喉症急切無藥白麩和醋敷喉外喉蛾指甲灰吹小舌落下燒鹽枯礬以筋頭點之可消皆簡便方也。喉癰體虛多鬱所致狀如秋海棠喉中不閉不腫氣出如常微微疼癢飲食不遂者是此係虛火淹纏難愈忌刺畏補久則失音成癆矣用橄欖核灰兒茶哺退小雞殼煨各三錢加水片吹能定痛此即前陸方去人中白。咽喉生瘡胃腕實熱熏灸上焦發爲白頭赤根或屬虛火上行無制則痛或楊梅天泡瘡多服輕粉毒氣流注所致當分別治凡咽喉瘡忌生薑辛辣喉瘡并聲啞礪砂二錢兒茶青黛滑石寒水石各一錢蒲黃枯礬各六分黃連黃栢製各五分加冰片吹或用蜜調敷喉外同醫鑑加牙硝六分方外人傳按喉啞有肺熱者有寒包火者宜酌治。敬信錄載爛喉症急救驗方牛黃指甲灰男女互用各五釐青黛六分壁喜窠二十個要墻頭上者焙黃水片二釐藥珠三分象牙屑三分焙黃共研末吹又醫鑑方壁錢燒存枯礬髮灰

分煨枯礬二分犀黃麝香冰片各一分吹。又方白茄
子梗煨一兩明礬三錢冰片五分吹。婦人經水不調
壅塞經絡亦令喉腫宜通經。又有梅核氣喉中如有
物吞不人吐不出氣鬱痰結也。婦人爲多紫蘇厚樸半
夏赤苓蒼朮枳實陳皮南星香附砂仁神麴青皮梔子
檳榔益智仁黃連生薑各一錢杏仁搗丸擦。西醫肺
病證論喉痛用熱茶一壺口含壺口呼吸之令熱氣蒸
騰於喉使喉溫潤外用布巾浸熱絞按喉上或用熱油
或華葵油醋水搓擦貼白芥子末或貼斑毛黃蜡猪油
膏引病外出。又肺病炎症蟻蟻置竹筒內按患處吮
血更用斑毛膏貼腿肚或用白芥子末敷腿肚引病下
行。此皆法也。臨症可酌用中國體氣情性與。審陽經
外國迥不相同有宜彼而不宜此者須知。於頸項
於頸項前日頸後曰項屬太陽膀胱經。缺盆之中任
皆奇經脉也。名天突項中央督脉名風府。任脉督脉
身急活鼠去臟貼。規秋氣於肩背。經曰西風生於秋病
氣者病在肩背。肩背痛多作勞所致。方見後

中府之地

中府肺文

華蓋自懸上接喉

下覆

呼逆則咳喘

有痰無聲曰嗽屬脾濕有聲無痰曰喘

顛名短氣不接

咳嗽者

有外感有內傷總由火剋肺金

最重秋是濕熱傳肺冬是風寒外束

肺不傷不咳脾新嗽肺有實邪

久病屬虛屬鬱

傷風以有嗽為輕邪在皮毛未及臟腑也

十三經 春夏多虛秋冬多實

又早

冷吸欬冬之花

凡久咳冬咳風入肺竅者宜熏用欬冬花末燒烟以筒

吸之或置瓶中吸。不論新久晝夜無時欬冬花同佛

耳草熟地燒吸名三奇散 用熟地是一法一無熟地

有雄黃鷲管石 佛耳草即杭之棉細頭作烏飯糕者
或用鬱金。又欬冬木鱉仁或欬冬雄黃艾葉各一兩
共研末黃蜡融難紙上卷筒燒烟吸并治水腫喘促者
又熏黃同蠟難紙如上燒吸取吐或難清刷紙全熱
食白粥七日後以羊肉羹補之 吐亦是治嗽一法熱

塗燈籠之草

燈籠草一名酸漿治熱咳水調塗喉外如咽痛用醋調塗凡嗽藥皆可以此法推

擦髮油宮粉於胸

治咳嗽不止并脹滿痰喘者亂髮香

火嗽久嗽乾嗽食積嗽酒嗽用青黛瓜蒌貝母研末和白蜜為丸擦甚佳。乾咳嗽火鬱也薑汁和蜜擦背佳

即用道遙散繼

燥癢更吹礪石

肺燥喉癢者用款冬花礪砂甘草石膏煨共末

吹喉內或用蜜

調藥塗於喉外

止咳臍填粟殼或五倍末糝膏貼

咳

用骨脂

咳從臍下起者宜用破故紙末糝膏貼納氣歸腎自止。附方。風寒發散并治諸般喘嗽麻

黃去根節杏仁去皮尖桂枝蘇葉陳皮薄荷桑白皮大腹皮甘草桔梗欬冬荆芥炒百部炒白前炒半夏貝母

知母南星各一兩柴胡黃芩枳殼葶藶均炒天冬麥冬旋覆花馬兜鈴各五錢五味子烏梅木香皂角乾薑各

四錢川椒輕粉各三錢麻油熬黃丹收牛膠一兩攪勻攤貼此方亦可加入七寶五子膏用熱油在缺盆穴搓

肺部滋陰膏貼。西法肺病輕者用熱油在缺盆穴搓擦亦能止癢免咳又久咳者常令身暖則取胸前用布

巾蘸熱水洗按避冷風吹襲。凡治咳嗽哮喘者

穴取天突肺俞膻中氣海等膏藥貼法照此哮喘者

哮喘有食哮水哮風痰哮年久哮之別古上專痰後謂寒

包熱治須表散以行氣化痰為主忌寒藥閉邪熱藥升

火喘有氣喘痰喘火喘水氣逆行乘肺喘肺脹喘食

喘忌斂濇升補燥濕酸鹹之品宜散邪清火祛痰潤肺

若短氣温以麻黃白果哮喘用白果麻黃搗塞鼻按

宜補氣菀三錢南星半夏桔梗川貝細辛杏仁甘草各五

錢生薑一兩如以麻油熬黃丹收阿膠一錢攪良涼以

蕎麥雞清治哮喘痰稠便艱屬實摩芥芷輕粉於背治
喘咳嗽及痰結胸白鳳仙花根葉熬濃汁擦背上極熱
再用白芥子三兩白芷輕粉三錢蜜調作餅貼背心第
三骨節雖熱痛勿揭正是拔動病根不論寒熱虛實鹽
醬哮喘並治數餅除根又痰實氣喘者用紫蘇子白芥
子蘿蔔子寒熱且薄桃羌花煎湯擦胸口數刻即止并
炒熨亦良治花氣乘肺而喘者。又痛如定喘鼻塞巴霜
打羌花黃菊薔薇花布包蒸熨定喘鼻塞巴霜汁為丸

橘皮裏塞 又痰喘上氣者生 哮須紅信 冷哮宜用紅

南星或白芥子薑汁調敷足心 按古方治遠年近日哮喘入

阿膠膏貼或哮喘膏亦可 痰嗽有用蟬蛻去足輕粉馬兜鈴各一兩生薑脂生雄

黃杏仁生砒各五錢淡豆豉四十九粒以生薑葶藶自

然汁丸如黃豆大亦可以薑汁化一丸臨臥擦胸 西

法喘者用紙入硝水中浸濕晒乾置盆內燃點乘烟燄

熏騰時吸其養氣入肺或用醉仙桃葉晒乾置烟筒中

吸之又法用熱油搓擦胸膈 嘔吐辨有物有聲 嘔屬陽

此與前治嗽之法相參 嘔吐辨有物有聲 嘔屬陽

俱病聲物俱出生薑主之吐屬太陽血病有物無聲橘

紅主之嗽屬少陽氣病有聲無物半夏主之三者皆脾

虛病或寒客胃或傷食或有痰嘔重吐輕 食久乃吐

手足冷胃寒宜丁香砂仁食已即吐手足心熱胃熱宜

黃連梔子又渴而吐黃水者熱不渴而吐清水者寒又

脇痛者停飲腹脹者食積 惡心無聲物由痰凝胃脘

或濕熱鬱過膈中 乾嘔只有聲或厥冷吐 或絞竹茹

涎乃胃家氣血虛乾嘔聲輕噦逆之聲濁惡 或絞竹茹

薑汁 治嘔吐面赤手足心熱者以 或槌酒藥葱椒 凡嘔

竹茹生薑絞汁棉浸擦胸口 或槌酒藥葱椒 吐噎

腸反胃各方可以通用。酒藥胡椒葱白。從融有熱茶。炒無熱酒炒貼心窩。又有分經治法。見物即吐屬。胃經米炒加酒藥貼。嘔吐清水屬胆經。樹根瓦上霜路。艾葉茶炒貼。嘔吐清二味以胆經藥代之。欲嘔。茅草皂角灰茶炒貼。無前二味。以胆經藥代之。欲嘔。而不嘔屬小腸經。燕子窩樟樹皮。搗有熱茶炒無熱酒。炒貼如小便不利。楓樹漿熬膏。糝皂角末貼臍眼。再用燈火燒喉下三次。口吐白沫欲嘔而不出者屬膀胱。經刺藜胡椒艾葉皂角灰研清油炒貼。欲嘔而不嘔。而發紅眼流淚屬三焦經。桑根皮茶葉四季葱搗炒貼。如二便不通加皂角灰黃糖水調貼臍。不嘔不瀉如乾霍亂者二酒糟皂角灰同炒貼。并刺中指出血。凡病皆須分經用藥。利之以楓皂。上見鎮以金石土硃。金沸錄此以爲規例。氣消痰代。豬石重鎮。虛逆加土硃等分。醋調末塗胸口。治嘔吐并治噎氣痞氣及哮喘有聲者。附方。陰症乾嘔冷涎作吐。用吳萸生薑大棗噎膈分無水無火。煎髮。胃寒吐水者用前和胃膏。噎膈分無水無火。食不能入。是無水也。食入反出。是無火也。治宜以安胃爲本。按噎塞脾虛病反胃。胃虛病皆在膈間受病。故

統名膈。上焦吐者氣食則暴吐口渴噎塞是也中焦

吐者積食下良久吐或朝食暮吐暮食朝吐尿清便閉即反

者寒酸臭不化或朝食暮吐暮食朝吐又有翻胃病食入即

胃病皆氣血虛胃冷胃槁而成反胃朝暮有定候也

翻而或痰或熱阻塞膈問非如反胃朝暮有定候也

通云反胃是腎虛非胃寒翻胃亦是腎虛非胃熱亦

人膈難治又糞如羊屎者不治大腸無血故也口吐白

沫者亦不治氣血俱憊故也血虛宜潤火或煮附子

衰宜補有肝旺脾弱似膈非膈者平肝補脾而搓開膈神方用牛口涎狗涎童便煮大附子一個先

能開膈塗膈於掌俟附子膈發時取弄嗅之并嗅其湯亦

有涎吊狗一脚亦有涎出或烹雄雞而吸大碗內糊紙

飯上蒸熟戮孔以筆管插入含吸之俟熱氣沖入喉自

開按附子補火雞溫中皆治胃冷○開膈膏黨參白

木蒼朮黃耆茯苓甘草生地熟地當歸白芍川芎天冬
麥冬黃連同吳萸炒黃栢知母貝母青皮陳皮半夏
星烏藥香附厚樸枳實吉梗瓜萸連翹紅花神麩麥芽
山杏檳榔木通蘇子草蔻仁砂仁木香丁香藿香乳香

大黃巴豆黑丑莪木三棱草烏官桂雄黃明礬鬱金丹
皂各五錢生薑二兩烏梅七個鳳仙子一錢油丹熬貼
○開關丹膽星一個瓦楞子錢半生礬枯礬雄黃牛黃
琥珀乳香沒藥珍珠白降丹各五分白矾用人糞黃泥
固煨取五分麝香一分以青魚膽丸如芥導之以油糞
子大糝膏貼○此症非善調攝難免復發
膈症便閉者可通大便如大黃等可暫用以治標鑑方
用瓜萋根浸麻油導更穩○按經曰三陽結謂之膈註
云小腸熱結則血脈燥大腸熱結則不能便膀胱熱結
則津液涸三陽熱結脈必洪數有力前後閉塞下既不
通必反而上行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行
而不下降也據此則瓜萋導法甚妙非只穩也○附通
大便秘方大黃元明粉生地當歸枳實各一兩厚樸陳皮
木香檳榔桃仁紅花各五錢麻油熬黃丹收貼臍氣虛
加黨參潤以牛羊人乳按胃槁津枯者宜用此潤之或
五錢
亦治標不治本之藥如以此哕非咳逆之謂也哕卽哕忒
蒸阿膠調人養血膏貼亦可
火鬱痰阻食滯血瘀水氣之分皆屬實有中氣大虧者
又有胃虛陰火上沖者皆屬虛哕在中焦穀氣不運

其聲短小得食即發呃在下焦真氣不足其聲長大不
 食亦然凡呃半時一聲者虛又脾敗而發連聲不止
 收氣不回者危○虛寒呃麻黃酒煎嗅或燒麻黃烟嗅
 或羌活附子茴香木香乾薑鹽布包烘熱熨之如陰火
 上沖者用龜板熟地各四兩黃栢知母各二兩汕丹熬
 貼臍下即介以潛陽法也尋常氣逆取噫即止久病
 薑汁白嘈豈虛煩是云火宜清火化痰由思慮傷心者
 蜜擦背嘈豈虛煩是云火宜清火化痰由思慮傷心者
 宜清火養血與鬱為積聚之本五鬱者木達之火發之
 虛煩症不同鬱為積聚之本土奪之金泄之水折之
 是也古方如小柴胡達木升葛發火三承氣奪土景嵩
 崖有辨宜詳看○六鬱相因以氣為主氣鬱胸滿脇痛
 濕鬱周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發熱鬱
 目蒙口乾舌燥小便赤濁痰鬱胸滿動則喘急起臥忘
 情血鬱四肢無力能食小便淋大便紅食鬱噫酸惡食
 黃疸鼓脹痞塊不言風寒者鬱則為熱故也○鬱為積
 聚疝癖癥瘕之本積屬五藏陰也有形發痛有常處
 肝積在左脇名肥氣脇痛痲心積起臍上名伏梁心
 煩脾積在右脇名息賁咳喘肺癰腎積起小腹上至心名
 肺積在右脇名息賁咳喘肺癰腎積起小腹上至心名

奔豚喘逆骨痠最難治請積禁吐下徒損真氣聚厥

六腑陽也無形發痛無常處痞與癖胸膈間病疝積

聚肚腹內疾多見男子瘕癥獨見臍下婦人常有皆因

痰飲食積死血而成其實一也在右食積左血積中痰

飲○凡婦人有塊多屬死血○大概治鬱忌酸斂泥滯

以開發志意調氣散結和中健脾為主積未成宜解

鬱積初起屬寒宜辛溫消導久則為熱宜辛寒推盪又

壯人無積積皆因脾胃虛弱氣血兩衰四時有感而然

宜加補益於攻伐中使氣血旺而積自除○解鬱香附

又有腸單石瘕血蠱及息積等病詳見醫書解鬱香附

任摩升偕蒼朮蒼朮香附總解諸鬱或燒蒼朮聞或

氣吞酸惡心嘈雜等症平肝順氣和中甚妙蒼朮香附

二兩陳皮川芎梔子神麩枳實青皮半夏麥冬吳萸黃

連赤苓砂仁木香山查乾薑甘草蘇子蘿蔔子白芥子

各一兩丹油熬即越鞠加味○又七情鬱結榮衛凝滯

周身牽引作痛木鱉仁白芥子沒治積

藥木香官桂共末酒和飛麩調擦攻積巴霜堪握聚及

老人虛寒便秘巴霜乾薑良薑白芥子硫磺甘遂檳榔

等分飯丸清早花椒湯洗手麻油塗掌心握藥一九少

時卽瀉欲止瀉冷水洗手 攻積丸用川烏吳萸官桂

乾薑各一兩黃連橘紅檳榔茯苓枳實菖蒲吉梗延胡

半夏各入錢巴仁皂角各利等大黃凡積聚癥瘕諸症

五錢炒入二方均可熬膏貼利等大黃凡積聚癥瘕諸症

石灰炒入兩先分炒後合炒入桂心末五錢米醋熬量

虛實貼治積聚脹滿血熱大黃一兩煨兩三錢大蘇

一劑加麝貼并治瘡母消卽去之治諸積香附入兩

半生半製靈脂八兩半生半炒黑丑白丑各一兩半生

半煨麻油熬黃丹收廣木香末一兩攪一加川芎大黃

當歸各二兩皂角木鱉僵蠶炮甲各一兩治積聚痞

塊并一切外症川烏草烏羌活靈仙防己生南星半夏

元參生地首烏川芎當歸白芷赤芍黃耆防風丹皮連

翹銀花梔子秦艽鬱金烏藥枳殼青皮紅花木香木通

官桂蘆薈薺蜂房全蝎山甲各五錢頭髮一團烏梢蛇用

蛇蛻代癩團用乾蟾皮代各四錢大黃一兩油熬炒黃

丹收下蟾蜍三錢製乳香製沒藥各七錢血結兒茶各

五錢樟腦二兩麝一錢貼附方諸積及氣血食三鼓

白馬糞同大蒜搗敷治積塊龜髓癥白馬尿同白蠟

數方皆効痞與鼓脹不同痞在心下脹在腹中痞但覺

輕脹重治痞須分虛實不宜專用利氣藥致變成鼓脹
○鼓脹單腹大外堅中空如鼓也氣虛不能制水故脹
其形與膚脹相似惟腹有青筋爲異膚脹病根在肺鼓
脹病根在脾○有寒脹熱脹穀脹水脹氣脹血脹蠱脹
之分寒脹腹滿濡時減吐利厥冷宜溫之熱脹者以陽
并陰則陽實陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱陰虛不能
宣導飲食如故腹中脹滿穀脹者失饑傷飽痞悶停酸
朝則陰消陽長穀氣易行故能食暮則陰長陽消穀氣
難化故不能食水脹者脾上受濕水積於腸胃而溢於
皮膚漉漉有聲怔忡喘息氣脹者七情鬱結氣道壅塞
上不得降下不得升身體腫大四肢瘦削血脹者煩躁
澀水迷忘驚狂痛悶嘔逆小便赤大便黑婦人多有之
一云因其中有血或蟲故名蠱鼓脈必浮蠱脈必實賈
則按之隨手凸起虛則有凹不起○單腹脹俗名蜘蛛
鼓多傷風與食不治○尋常傷食或氣滯腹脹消導行
氣○久病氣虛腹脹宜補○凡鼓脹病多由怒氣傷肝
漸蝕其脾脾虛之極真臟見也脈喜浮大忌虛小若臍
突出肚見青筋四肢黑身熱如火或寒熱如瘧大便滑
泄皆難治凡腫脹朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛

朝暮俱急氣血兩虛又腫脹從腹達於四肢者吉反是

因又鼓症不比水腫多土敗木賊宜調和氣血而兼利

肝爲痞熨吳萸一作能化吳萸酒炒布包走逐熨之

黃甘遂甘草阿魏各五錢急性子炮山甲各二錢獨蒜

二兩硫磺一錢麝香三分用猪脂燒酒入藥在內布包

熨痞自消留末少許灑膏上貼再用紙卷筒藥如爆竹

或點火隔紙五六層熨之此楊氏驗方也阿魏爲治

痞要藥○神仙化痞膏用大黃黃栢常歸秦艽三棱醋

莪朮各三錢全蝎梢炮甲片各十四木鼈仁七個蜈蚣

五條用麻油二斤四兩浸熬炒黃丹收入乳香沒藥各

五錢風化硝三錢攤貼先用薑擦過貼貼後炒鹽布包

熨於膏上或烘兒鞋或熱手熨皆可一方無黃栢有

黃連巴豆蘆薈阿魏各三錢冰片一錢治積痞氣塊身

熱口疳三日熱止七日腹痛十日便膿血愈加琥珀麝

香并治馬刀瘰癧○又方大黃黃栢川烏梔子蘇木各

一兩草烏生地紅花巴仁肉桂各五錢黃連黃芩當歸

赤芍川芎各一錢蛇蛻二條蜈蚣六條山甲二十片桃

柳棗枝各三尺香油二斤熬黃丹鉛粉各七兩收松香

陀僧黃蜡各二兩攪再入黃連末三錢製乳香製沒藥

各一兩血結五錢輕粉陳膽星蚰子殼各三錢麝一錢

和勻狗皮膏攤先以酒煮硝擦洗貼後以火烤之或烘

兒鞋丸點硃砂治痞癖蟻酥黃蜡各二錢巴霜一錢矜

製之各一分九如菜子大粘在化痞膏貼一周時痞化膿血

愈○按本事硃砂丸治一切積聚痰飲心脇引痛硃砂

巴霜三棱乾薑白芷各五錢木香青皮胡椒各二錢半

乾漆炒大黃各一兩檳榔肉蔻仁各一個醋熬入硃砂

成膏細藥攪如上粘貼又隔噎膨脹久積鼓敷甘遂還

驚痰大黃牙皂當歸巴仁硃砂丸並可參鼓敷甘遂還

消大戟甘遂芫花海藻醋熬膏敷實鼓甘遂巴霜木

麝香再用甘遂雄黃各一錢田螺一個搗敷○附方○

鼓滿蒼朮白朮香附當歸蘇梗黃連梔子枳實山查木

香檳榔赤苓木通澤瀉生薑油丹熬備貼○按舟車丸

治腫脹形氣俱實者上下表裏分消其水黑丑四兩大

黃二兩甘遂大戟煨芫花醋炒青皮炒橘紅各一兩木

香檳榔各五錢輕粉一錢或照上用醋熬敷或用油熬

丹收貼并加敷藥雖虛弱人亦可試乃通變之法也○

十鼓取水法大戟勝腫水甘遂肝水麻黃膚水烏梅腹
水葫蘆巴胃水葶藶心水芫花通身水黑丑腎兼循身
水細辛氣水漢防己胃水檳榔血水海蛤肺水陳皮牙
水桑皮腸水加生薑土狗視症倍用君藥油丹熬貼外
加敷藥亦散研琥珀治五鼓琥珀散大黃二兩巴豆五
通變之法散研琥珀錢牙皂一兩五錢枳殼羅蔔子炒
各四兩琥珀一兩沈香五錢薑皮搗汁丸臨用研末糝
膏貼。附方。水鼓杜蒺藜煎洗蓋屋稻草煎洗地骨
皮煎洗水氣自下。氣鼓而黑脇痛者炒大麥芽熨。
血鼓脇滿小腹脹有血絲酒煎荷葉洗。食鼓噉氣作
酸飽脹炒蘿蔔子熨。婦人血蠱劉寄奴或馬鞭草煎
洗。水鼓灸法水分穴在臍上一寸中腕穴在臍上二
寸神闕穴在臍之中央以鹽填滿再灸忌刺刺之水盡
則死即當時不死後亦復發不救此親見者。凡治脹
皆取三里穴在膝下獨聖用則水蓼鳳仙臭椿皆治
三寸外旁膏藥照貼獨聖用則水蓼鳳仙臭椿皆治
商陸治腫脹行水。水蓼治疰癖積氣連花莖子葉熬
膏良一方水蓼花子和飛麩敷或同大蒜搗貼鑑
本加當歸赤芍各一錢沒藥五錢阿魏血結麝香各三
錢貼又水紅花子二錢大黃樸硝山梔石灰各一錢酒

醉一塊同鳥貼湯壺髮手帕勒之三日揭起肉黑如墨

是其驗也。治痞大紅鳳仙花雄黃獨蒜搗敷或鳳仙

子白芥子馬蘭頭根麝香同搗敷或臭椿樹根熬膏貼

○商陸治腫脹赤者傷人只堪貼臍入臍三分搗貼小

便利自消又方赤商陸根搗碎蒸熟髮再加葱白搗貼

并治水腫喘促者按疏鑿飲子用商陸羌活秦艽檳榔

腹皮茯苓皮椒目木通雙奇川則牛糞猪肚猪肚丸

澤瀉赤豆薑皮可參雙奇川則牛糞猪肚猪肚丸

合蝦蟆鯽魚按鼓脹症皆川雄猪肚衰甘遂大戟芫花

方蝦蟆鯽魚紫背浮萍絲瓜絡為主藥氣鼓加蝦蟆敗

鼓皮烏藥檳榔砂仁沈香之屬血鼓加馬蝗乾漆血結
紅花之屬水鼓加土狗雞屎牛糞之屬可參又十鼓
雞猪肚雞肺皮陳香圓砂仁沈香生薑大蒜同搗餅貼
亦可加藥。蝦蟆膏乾蟾皮油熬黃丹鉛粉收槐枝攪
治食積痞塊疔疾腿腫濕氣瘡毒又魚膏鯽魚一個
三兩皮硝五分杏仁木鼈仁甘遂甘草各一錢加葱蜜
同搗臨用糝麝貼功同甲莧腫鋪藥餅而行腫謂水腫
頭面為水腫在腹為水鼓視人之目窠上微壅如蠶
新臥起之狀其頸脈動時咳按其手足上窠而不起者

風水膚脹也鼻頭色微黑者有水氣

皮薄而光手按成窟舉手即消者是也

多外因涉水水冒雨或感風寒暑濕其證先腫上體肩背

手臂熱渴而二便祕陰水即石水多內因飲水及茶酒

飢飽勞役房勞其症先腫下體腰腹脛跗身冷大便利

陽水多實陰水多虛陽水在上多喘陰水在下多滿陽

水宜散宜攻陰水宜溫宜補然陽中有陰陰中有陽宜

辨水腫多因腎水不能攝心火心火不能養脾土脾

虛不能運化水穀停於三焦注於肌肉滲於皮膚而發

腫也加喘者肺為心火剋也久則肌肉潰爛陰囊足脛

水出唇黑缺盆平臍口肉硬足背手掌俱平五藏敗矣

○治腫以健脾行濕為主一云以辛散之以苦泄之以

淡滲利之使上下分消其濕忌鹽醬○治水腫及黃胖

九鼓等名鋪臍藥餅巴霜四錢輕粉二錢生硫磺一錢

研調作餅鋪棉花於臍上貼之俟行三五度去餅以溫

粥補之久病隔日一取○治水腫消河餅大田螺四個

大蒜五枚車前子二錢作餅敷臍取利或地龍甘遂猪

苓鍼砂蔥涎醋調全○又治男婦頭面浮腫肚腹脹滿

上氣喘急者用黑丑白芷煨牙皂煨各二錢半木香沈

香乳香沒藥各三錢琥珀一錢亦可以砂糖飛麪調貼

兼煮赤豆漬滕

水腫從脚起入腹能殺人赤必實其脾

陰水宜實脾溫腎用白朮厚樸木瓜大腹皮草果赤苓

附子各一兩木香炮薑甘草各五錢再加獨活川椒苟

香吳萸官桂肉蔻仁紫蘇陳皮疔黃燻藥筒而取黃疸

澤瀉各七錢麻油熬黃丹收貼疔黃燻藥筒而取始於

目珠黃漸及皮膚爪甲身體皆黃也然不痛若色黃身

痛者濕病非疸一曰腹脹滿面萎黃躁不得睡屬黃

家又尿黃赤安臥蠱動食已善飢又身黃臥時身體青

赤憎寒壯熱者真黃疸也色亮口渴身熱尿赤名陽

黃屬濕熱色黯體重背寒肢冷自汗名陰黃屬寒濕

傷食名穀疸傷酒名酒疸黃汗染衣者名黃汗皆陽黃

類也酒疸變為黑疸難治女勞疸亦名黑疸額黑微汗

手足心熱膀胱急尿利過房寒熱脾腎俱病陰黃類也

難治亦有腹脹如水大便黑者○膽汁黃因驚傷膽得

之諸黃皆尿不利惟瘀血黃尿利蓋血結下焦熱但

耗血而不耗精液也脫力黃者傷力所致瘧黃殺

人最速○凡時行感冒及伏暑未解宿食未消皆能發

黃○黃汗者身腫發熱汗出而渴汗出染衣如黃柏汁

以汗出時入水浴得之○黃腫非黃疸黃疸眼黃不腫

理論駢文

李

凡色帶白眼如故黃疸有濕熱黃腫濕熱未甚多蟲
 與食積。治疸與濕熱相似然宜滲利中佐以甘溫勿
 純寒再傷脾成鼓。脫力黃等宜兼補。取黃法先用
 瓜蒂散搐鼻再用濕麩為餅穿孔放臍上以黃蠟卷紙
 為筒長六寸插孔內以煤頭點燒至根剪斷另換取盡
 黃水為度効亦治水腫。附方。黃腫燒酒調白芥子
 末二錢攤貼小腹上并搗青鯽填臍。治疸青背鯽魚一
 起泡為度忌吃糖鹽并搗青鯽填臍。尾全用加砂仁一
 兩洋糖一撮搗爛入蚌殼內覆臍上一夜見効。或用
 鯽魚背肉二塊加胡椒麝香全。附方南星搗置盃內
 扣臍上起泡挑去洩水如濕熱甚者田。更平其胃。用平
 螺數臍引下。毛脚芹搗塗臂大肉上。更平其胃。用平
 胃散四兩醋調敷臍。睡須臾戰汗或瀉黃水愈。一方
 平胃散加香附青礬青皮蓬朮黃連苦參白朮并治黃
 胖黃腫。鍼砂與青礬同鑊砂須忌鹽青礬可忌也
 又如熱壅便秘者用平胃加醋大黃二兩黃連黃芩
 甘草茵陳各五錢薑汁調末敷腹。寒濕者用平胃加
 茵陳附子乾薑各一兩白朮枳實半夏橘紅茯苓澤瀉
 草薢仁赤小豆吳萸當歸木通各五錢薑汁調敷。附
 方酒疸大黃山梔枳實乾葛豆豉等敷。黑疸明礬滑

石大麥芽研敷。○河白用梔子黃雞子清飛麩調餅貼。
○疝癖愛喫土炭生米茶葉者用麥芽使君子檳榔南
星等各加木物治胸痛橫連於脇。○咽下膈上爲胸胸痛
之。○前傷寒有方。胸痛橫連於脇。古云屬心景云多屬
肝。餘經能令胸滿短氣而不痛。肝膽脉布脇脇之骨
爲肋。火上沖則胃脘痛橫行則脇助痛。○脇痛有風寒
又左痛屬瘀血或怒氣所傷或跌閃所致右痛屬氣滯
痰食瘀痛無時不膨或夜痛或午後發氣痛時止而膨
嘔卽寬旋復痛痰流肝經咳嗽氣急走注有聲食積右
脇有一條扛起又虛甚成損脇下悠悠常一點痛不止
古治痛多用通法通則不痛也。然調和氣血上逆者
下行中結者旁達虛者補寒者溫皆是通法必以下洩
爲通者。利脇先以琥珀之膏。脇痛先貼琥珀膏卽大黃
非也。歸草龍膽梔子黃連川芎青皮木香蘆薈香薷汁調
敷膏外。○此膏或用油丹熬貼。又白芥子水調敷或
吳黃醋調敷或青皮醋炒熨或菲菜連根醋炒熨或枳
殼小茴鹽炒熨。○疏肝法柴胡陳皮青皮各一兩川芎
當歸白芍枳殼香附瓜蒌丹皮各五錢同麩皮醋炒熨
氣加烏藥延胡索血加官桂紅花虛加杜仲黃肉跌打

傷瘀血加大黃炮山甲各五錢 按此方藥 脘痛下挾
料全用另加生地靈脂各一兩油丹熬亦佳
其臍 臍胃脘痛當臍痛李曰屬腎景云亦屬胃○凡心痛
膈上胸內寒痛手足反溫火痛手足反冷胃痛在膈下
兩岐中一云傷於七情作心痛食積痰飲瘀血作胃脘
痛○胃痛有寒有熱實熱易治虛寒難治雖愈必發虛
寒者口多清涎得熱飲痛稍緩實熱者口渴咽乾或多
痰喘急虛寒者肢冷面白實熱者肢雖冷面必赤○大
抵胃脘下大腹痛者多屬食積外邪繞臍痛者屬痰火
積熱臍下痛者屬寒屬痰及痰與尿澁按腹痛挾熱者
緩挾寒者急寒痛無增減或兼吐利熱痛時痛時止
腹滿堅結實痛痛甚脹滿手不可近虛痛按之則止食
痛者痛後卽利後卽減死血痛者痛有常處濕痰痛
者脈滑痰氣阻礙不得升降腹中引釣脇下有水聲小
便澁飽則暫止蟲痛五更心嘈聞食而痛惡心吐清水
上下攻刺而白屑紅時作時止或面色青白赤不定木
賊者痛而瀉瀉而痛不止者是也○又腹痛欲嘔吐者
上熱下寒也陽不降故上熱而 溫臍必以附子之散
嘔陰不升故下寒而腹痛也

磨濕附子一個挖空入甘遂末錢半蛇床子一錢火酒
煮烘乾研加麝香納臍名附子填臍散此方去蛇床加
甘草名接命丹養丹田助兩腎添精補髓如前法製單
取附子同麝爲丸納臍 甘遂甘草並用妙。溫胃法
治脾胃虛寒心腹疼痛或冷汗出者非治霍亂等痛附
子巴戟炮薑茴香炒各一兩官桂七錢黨參白朮當歸
吳萸白芍炒白茯苓良薑甘草炙各五錢木香丁香各
四錢沈香三錢研生薑汁調加麝散或用油丹熬貼。
附方 治胃熱痛大黃元明粉梔子香附鬱金各一兩
滑石二兩甘草黃芩各五錢末薑汁調敷。九種心胃
痛并嘔吐噎膈久痢疝氣等症雄黃硃砂木香沈香丁
香麝香桂皮鴉片灰各等分人乳和丸納臍用暖臍膏
蓋 暖臍膏有用生附子五錢甘遂甘草各三錢葱汁
熬膏和藥加蟾蜍麝香鴉片丁香末攤者有用栝子尖
松毛心五斤附子八兩麻油熬黃丹鉛粉收加肉桂雞
者。又方受寒腹痛炒鹽炒薑葱及熟灰滾水皆可熨
熱腹痛痧藥喘鼻 小腹痛俗名陰寒葱白連鬚七
個胡椒照病人年紀每歲一粒加枯礬少許男孩乳丸
納臍一炷香愈。蟲腹痛川棟肉酒浸棉裏塞肛門
小兒用煨大蒜塞。腹臍冷痛每旦以猩紅枯礬作紙

煎油點燒熏臍或貼煖

後宮之病

腎為列女

熨脊腎

臍膏後再熏亦是一法

凡背脊痛皆腎水衰耗不能上潤於腦則河車之路

乾澁難行故痛也

老人背脊僵僕腎虛髓空也

尖痛者陰虛而膀胱有火也

○按脊惡寒屬陽虛者生

薑汁化牛膠入附子肉桂花椒乳香沒藥收貼烘鞋底

熨之脊痛由風寒濕者用川烏頭附子羌活細辛川

芎官桂川椒各一兩醋拌濕布包烘熨

又方草烏白

附子南星肉桂川芎白芷乾薑共末酒同麪糊調敷脊

上以熱碗覆之或作餅貼熱物熨之○陰虛者

用四物同黃栢知母龜板研作餅貼熱物熨之

摩腰云

太陽所至為腰痛又腰為腎府大陽腰痛外感六氣腎

經腰痛內傷色慾○諸經皆貫腎而絡於腰腰痛有九

腎虛是本風寒濕熱痰飲氣滯血瘀閃挫是標○常痛

者虛有定者瘀或左或右者風或痛或止者濕熱往來

走痛者痰積遇寒發者寒濕久坐者氣滯○治老人腰

痛婦人白帶附子尖烏頭尖南星珠砂各二錢五分雄

黃丁香各錢五分乾薑一錢樟腦冰片麝香各三分蜜

丸彈大薊汁化開熱摩腰上并貼一加吳萸肉桂○附

方 腰痛無力天麻半夏細辛蒸熨或黑豆和鹽炒熨

腰脊脹痛白芥子酒調敷。養元固本暖腰方川椒

木香故紙大茴升麻川棟肉桂各一兩附子丁香各五

錢艾絨一兩和勻縫暖腰貼肉着。通治腰痛羌活防

風靈仙天麻川芎當歸延胡牛膝官桂杜仲續斷從蓉

故紙南星黃柏蒼朮草薢秦艽小茴烏藥紅花知母香

附胡桃肉骨碎補木鼈仁全蝎龜板木香乳香沒藥白

然銅草烏川棟子生地白芍五倍子靈脂各五錢生薑

一兩麻油熬黃丹收。西醫治腎病有粟殼野菊沸湯

沖布巾絞按患處法有鴉片酒或樟腦油麻油擦痛處

法有鴉片丸納固之以芙蓉即阿芙蓉膏能止瀉

狂門法亦可參固之以芙蓉芙蓉膏能止瀉

煖腎補腰膝去寒濕一切腹痛痞疾夢遺五淋滑淋白

濁婦人赤白帶下經水不調久貼能煖子宮又治色慾

過度陽痿黨參黃耆當歸各五錢甘草五錢子遠志蒼

木白芷白芨紅花紫梢花三錢肉桂二錢附子一錢麻

油二斤熬黃丹收鹿角膠一兩乳香丁香各二錢麝香一

錢加芙蓉膏二錢攪勻陽痿加陽起石二錢和之貼臍

上及丹田。金鎖固陽膏慈子韭子附子肉桂絲瓜仁

各三兩麻油熬松香收龍骨煨二錢麝香一分攪狗皮攤

理淪駢文

毒

韭子龍骨治遺要藥。按金鎖正元丹治真氣不足

吸吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一

切虛損之症用五倍二兩故紙菴蓉巴戟葫蘆巴胡桃

茯苓各一兩龍骨煨入錢硃砂一錢亦有有用木香茴香

羊腎者又鎖精丸用山藥杞子五味萸肉瑣陽黃栢知

母黨參黃耆石蓮海蛤粉各一兩白朮二兩亦有有用兔

絲子四兩牡蠣煨金櫻子蒸茯苓酒蒸各一兩者遺症

多由思想或傷陰或傷陽或兩傷可酌熬膏餘見前腎

藏精散燒鯨鯉之甲凡肩背腰痛手臂腿膝環跳貼骨

關香山甲末瘦核桃殼覆患處飛麩作圈護住上用荷

葉遮蓋以防火落燒艾一二炷覺熱氣入內即散免舛

延生下元之衰也陽虛肚兜治疝積遺精白濁婦人經脉

變症角各一兩沈香零陵香白芷馬兜鈴木鼈仁甘松升麻

血結丁皮各五錢加麝香和艾絨作兜肚着又方大

附子大茴香小茴香公丁香母丁香木香升

麻五味甘遂沈香麝香揉艾縫兜肚縛丹田膝蔽治元

痛等生草烏川烏黃耆杜仲仙茅金毛狗脊瑣陽川芎

當歸白芷蒼朮防己牛膝甘松五加皮木香松香細辛

肉桂各二錢艾二兩作蔽膝縛全。一用菊花陳艾一用
草烏防風細辛陳艾作蔽膝縛全。凡虛寒體服風燥
熱藥多防涸陰如作媛之以硫磺玉抱硫磺補火。治
兜肚蔽膝用最善。媛之以硫磺玉抱男子精寒痿弱
白濁遺精女子子宮虛冷赤白帶下治寒瀉便硫磺
六錢母丁香五錢麝一錢獨蒜九如豆大硃砂衣每用
一丸納臍眼上貼紅緞膏。紅緞膏川椒三兩菲子蛇
床子附子肉桂各一兩獨蒜一斤真香油二斤浸藥熬
黃丹收或硫磺丁香胡椒杏仁麝肉丸或用胡椒硫
磺黃蜡丸納臍上貼紅緞膏全。玉抱肚法治積冷腹
痛用鍼砂四兩炒出烟入白礬五錢硫磺粉霜各五分
新水拌勻微濕裏以皮紙貼安懷中候熱發置臍內或
放氣海關元穴大補元氣置於他冷處亦汗出立瘥此
藥燥則不熱再以新水拌再熱可用十餘次如藥力盡
晒乾再入礬即如舊或只用鍼補穆麋鹿之茸舊有參
砂明礬二味亦効亦見治痢補穆麋鹿之茸舊有參
按香茸丸滋補精血治下焦陽竭腹臍疴痛目盲夢遺
食少肌瘦鹿茸麋茸各二兩浸搗菴蓉五味茯苓山藥
龍骨沈香各一兩熟地三兩大便之結氣祕欲下不下
加麋丸每用一丸研穆膏貼雖努力不暢名

腸結不能食以調氣為主結屬糞結血不足腸燥肛裂名

陰結不能食以活血為主亦有似秘非秘者年高血少

病後血氣未復或脫血津涸皆宜大補氣血大約此病

只宜生津潤燥忌破氣損液大便秘結不通皆腎病

然秘結不過艱於下利而不通蜜導為最前大黃皂角

或胸腹脹滿氣悶欲絕危症也

掩其臍取通加黑丑生樸硝熱熱秘皮硝二錢水化開皂

猪膽內用竹管插入扎緊附子寒冷秘附子苦丁香五

搗汁入肛門亦可加藥錢炮川烏香白芷牙

皂各三錢胡椒一錢麝少許同大蒜搗敷臍再以蒼歸

桑葉竹管中吹入肛門即通前有二烏通陽方蒼歸

補氣虛加蒼血虛加蟾粉大實大滿如結胸者用蟾蜍

或用水菹荳蔻妙蟾粉巴霜輕粉醋丸納臍膏掩

鼠屎白可消息小便之閉肺氣為

源氣行則水行又腎氣足則化以吐法通小便如化

數開而下斃利有有餘者膀胱有水熱結氣閉有不

足者五內枯燥膀胱無水當分氣血以渴不渴辨之渴

而不通上焦氣分熱宜清肺不渴者下焦血分熱宜滋

腎 凡嘔吐腫脹
症小便不通危

葱熨爲先

試法冷秘葱熨卽通熱秘
旋通旋秘萬苜菜搗敷臍

草前滑石圍其腹

見前

肉桂寒

見前同車前用○附方
良薑蘇葉葱鳳仙煎洗

梔子熱

熱閉大蒜

一顆梔子二十一枚加鹽搗敷臍并
敷陰囊一用桃枝柳枝木通花椒明礬一兩葱

白燈心各一把煎湯圍

被熏洗再炒鹽熨其臍下亦可
附方猪胆籠陰首婦人以胆汁滴陰中

加梔子等味○

又氣閉臭梧桐子皂角四五兩煎沸加麝沖入磁瓶
附方猪胆籠陰首婦人以胆汁滴陰中

內將陽頭插入熏之

血閉韭白濃煎洗臍下或桃仁

或麻根搗攤絹上貼小腹連

柴麻提氣陷宜提老人產

柴胡升麻熬螺冰

田螺冰片敷臍或用田螺葱白輕粉
田螺冰片敷臍或用田螺葱白輕粉

膏貼臍門

或田螺葱白作餅蓋扎下用皂角燒烟熏

或半夏填臍加田螺葱白

作餅蓋扎下用皂角燒烟熏

并用田螺十餘個放水

中澄清取泥入膩粉塗臍立通

熱淋鯽魚全個搗敷

或加蜜麝香敷碗覆當變通

話藥不效葱熨麝插

關格者吐逆熱在上有冷熱之

髮葱白一斤切細入麝五分拌勻分二包先以一包置

爲度不應老薑木通煎湯飲探吐或身無汗葱湯入浴

盆坐沒臍被圍汗出欲尿卽尿于湯內○大小便不通

亦謂陰陽關格瓜蒂芥子令吐瀉垂死者但治下焦以

硝黃枳樸通之煨蒜塞肌或蜜導忌淡滲利小便藥

中通先皂麝之填關格乃痰格中焦上下皆病也先用

火若頭汗出則陽絕不治如脈沈細手足厥冷者用人

參附子麝香納臍中虛者用黃蒼白木升麻柴胡木香

檳榔末布包放臍上熨斗熨之卽升降更聞臍轉皆忍

法也前傷寒有寒熱不調灸法可參更聞臍轉小便

所致○涼藥踈利小腸熱仍通泄大腸大便天下臍自

歸正小便自順○甘遂末敷口含甘草○又寒水石二

兩滑石髮灰車前子木通冬葵子各壹兩葱白五錢搗

汁調藥敷於臍下○女子轉胎用猪尿脬吹脹囊竹管

扎緊擗氣入戶大尿而愈孕婦胎壓脬亦有腸交卽

不尿吊起一脚睡卽尿蒲黃縛腰見前亦有腸交卽

陽症方控罌罌卽腎救萸茱橘荔疝者罌丸連小腹急

俟補丸也痛是也或無形無聲

或有形如瓜有聲如蛙俗名小腸氣又名腎與膀胱氣
一云均屬肝病人身白兩肋小腹至陰囊舉丸皆肝位
與小腸膀胱無涉子母相關病所出致則有之如丸升
上入腹者難治○七疝者寒疝囊冷硬如石氣疝由熱
哭忿怒所致氣鬱而脹血疝俗名便難水疝囊如水晶
陰汗或癢搔出黃水筋疝莖脹筋縮出白得之房術狐
疝夜消晝大癩疝卽大卵得之胎中○治法初起鬱熱
在經鬱久後感寒氣外束不得踈散因而作痛勿專執
寒治亦忌補○七疝及瘕聚帶下屬寒者吳萸小茴橘
核荔子枝川棟子地膚子青皮元胡靈脂香附黑丑沒
藥丁香木香全蝎蒼木各一錢研酒敷○附方○疝初
起薑蔥蒜搗敷麩皮炒熱烘於藥外○寒濕痛者艾葉
川椒紫蘇炒熱袋盛夾囊下勿洩氣○又葫蘆巴一兩
鐵鍋炒黑研酒調敷○治氣胞木腎水胞偏墜用灶心
土炒熱加川椒茴香艾葉未拌勻放盆內隔磚坐之令
冷血冷氣冷水化爲汗出愈○又偏墜肥薑切片鋪板
上堆艾一尖燒之將完乘熱帶火連薑艾搗爛菜葉
上向囊下託之初時其冷如水少頃滾熱寒濕從汗出
愈○簡便方水疝連鬚葱白同灶心土敷可收水○血
疝馬鞭草洗并搗塗亦治木腎不痛者又胡椒菜葉搗

採可散血。○狐疝。煨牡蠣乾薑末水敷。○瘰疬。薤仁一兩陳壁土五錢炒黃水煮研膏敷。按十香丸治氣滯寒滯及癩疔之屬。烏藥香附小茴荔枝核煨陳皮澤瀉木香丁香沈香各等分皂角減半煨酒丸彈大可磨敷。○外腎着驚縮上者。草麻敷足心止。即去之又高。莖子一中潮腦三錢磨一分同高。莖菜搗膏貼臍下。○穿心疔以手招大敦穴一炷香即止。不止灸之。○按志和曰。凡遺尿癰閉陰痿胞痺精滑白淫皆男子之疔也。血涸不月足臂咽乾。癰閉小腹有塊前陰突出後陰痔核皆女子之疔也。但女子不名疔而名瘕。知此則治諸病皆可以治疔矣。○鬱宜。梔子古方同烏附用小便澀者川棟合法通之矣。○或塗以芙蓉黃柏偏陰用。尚香。荔子。核不效者熱症也。醋磨木髓。○梔末酒調敷。○或以蛙皮治疔開元固氣丸用此。附方。○葉黃柏塗。○鮮地骨皮生薑各四兩搗爛包囊上。○脫肛。搽膽乳茶冰瘰卽消。○陰腫如斗。雄礬甘草煎洗。○肺熱脫肛。豬膽汁同兒茶人乳水片搽熱汁白下。而肛收也。○附方。生地龍樸硝清油調塗。先以荆芥蔥白

煎洗或冷水調黃連末敷

溫用蛇床蛇床子溫陰之藥同甘草研末

兔絲子和如泥塗日五并治陽衰不起再

或糝以熟地

烏梅

陰虛脫肛熟地枯礬烏梅炭糝膏貼。附方兔絲

加枯礬赤石脂訶子肉

升之以蟬蛻

氣墜者用蟬蛻焙黃爲末研菜油調

數自收或用升麻防風

既傳附子靈脂補氣蒸臍之祕

末摻氣虛加參耆末太乙真人熏臍法通治勞傷失血及陰虛遺精白濁陽

痿精神倦怠痰火婦人赤白帶子宮冷諸症麝香龍骨

虎骨蛇骨附子木香丁香乳香沒藥雄黃硃砂靈脂夜

明砂胡椒小茴青鹽兩頭尖等分以麝填臍眼蒿麩圈

臍外填藥蓋槐皮艾灸之汗出病已慎風寒戒油膩生

冷酒色等如畏灸者可加艾和藥袋鋪腹上熨斗熨

之偏藥氣入肚但令溫暖卽止亦効下全。原評曰麝

香引透諸藥丁香堅守其胃啟飲食之進青鹽入腎以

實其子使肺無漏洩夜明砂以補其血散內傷之有餘

乳香沒藥木香小茴升降其氣不致咳嗽龍骨虎骨蛇

骨珠砂雄黃以削病根兩頭尖巡視絡有推前拽後之功附子胡椒補元氣使血行血室氣歸氣宅痰散爲金波靈脂連操其肺削有餘補不足用槐皮之藥閉押諸藥之性使無走竄之患艾灸有拔毒起死回生之功凡諸藥不効可用此法。濟衆熏臍法川烏乳香沒藥雄鼠屎續斷二錢麝一分食飽後灸如前法勿令痛反泄眞氣每年中秋行一次隔兩日一灸灸至臍內作聲大便下涎物爲止只服米湯食白粥黃酒助力溫臍即子方靈脂白芷青鹽二錢麝一分灸如前法溫臍即止過則生熱婦人尤宜。氣虛體倦肚腹畏寒用五靈脂夜明砂枯礬麝香灸全每于二分二至前一日溫水洗臍眼納麝少許用麪團臍填藥灸之灸後以蕎麥爲餅蓋藥俟冷取下忌茶。按太乙鑑名延壽復著鳳丹有人參白附無兩頭尖婦人無子冰片代麝復著鳳仙鶴糞殺癆蟲灸脊之奇治癆蟲鳳仙根蘸潮腦擦背或加薑桂同搗擦。治癆病人未全虛者水灸法用白鴿糞淨靈脂白芥末各五錢生甘草二錢末加大蒜五錢同搗入醋化麝一分離脊上皮紙蓋一炷香七日一灸。浙杭有沈姓醫治癆用白鳳仙猪脊筋同藥末攤貼脊背者其用脊筋法可取

○又方白鴿糞三五合炒焦布包從尾間起擦上至大
椎又從大椎起擦下至尾間如此數十遍日夜數十次
蟲盡死先用濕紙搭脊樑看一點先乾處是蟲所在
力擦之有乳香熏手背除蟲有無法不甚驗故不鮮
○傳屍癆熱商陸根囊盛熨或佩麝香安息香再用甘
松元參炭屑加白蜜和丸常燒可以辟蟲免傳染○凡
蟲證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上有幾條血絲如蟹
爪分明或面上白斑唇紅能食心嘈時痛時止痛則咬
心口吐涎沫清水夢中嚼齒腹中或有塊凡辨察蟲
頭赤食人肉可治蟲頭白或嘴白或肚白食人髓皆難
治黑者已入腎臟亦難治○殺蟲膏桃枝李枝梅枝桑
枝石榴皮並取東向者各七莖青蒿一小握苦楝根七
寸生藍葉七片葱白連根洗七個黑丑頭末半生半炒
一兩大黃五錢檳榔入錢醋炒三棱煨蓬朮雷丸蕪荑
使君子木香甘遂皂角靈脂雄黃各三錢明礬輕粉硃
砂各一錢麻油熬黃丹收麝香臈一加貫仲厚樸乾漆
炒白礬各三錢紫金錠二錢尤佳○婦科解鬱爲先
凡療疾皆盡食肺系吹血聲嘶最難治
女屬陰遇
氣多鬱
通經是主
婦人經血有常期愆乎常則病矣
方書以遺前爲熱退後爲寒亦未

盡然要之以色紅爲正其變爲紫黑者熱也黃如米泔者濕也淺淡紅白者虛也或成塊而紫黑色熱者寒凝也成塊而紫黑色明者熱結也將行而腹痛拒按者氣滯血凝也既行而腹痛喜按者氣虛血少也經前發熱者爲血熱經後發熱者爲血虛腹脹者爲氣滯腹痛者爲血滯泄瀉者是脾虛瀉瀉者是寒濕凡逆行上溢而吐衄錯行下流而暴崩皆屬血熱矣行而亦有絡脈傷損瘀積肝旺所致若經水過多色淡爲虛色深爲熱或兼赤白帶而下者臭者爲濕熱腥者爲寒濕治法不外四物逍遙散及五苓散藥料加減。帶下是濕熱爲病赤屬血白屬氣主治燥濕爲先又肥人白帶是濕痰瘦人是熱久帶下陽氣虛極下流白滑多悲不樂宜溫。崩漏者非時血下淋瀝不止爲漏下忽然暴下爲崩中又悲哀太甚則胞絡絕而陽氣內鼓動發則心下崩而數淩血也。經閉有三上焦心火中焦胃弱津枯下焦胞脈熱結血海乾枯閉久則血滲脾經發爲水腫。室女憂思過度則傷心而血逆竭故月水先閉且氣滯熨心病不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽。又木香以木香 烏藥香附枳殼青皮陳皮川芎厚樸蒼朮三錢

官桂甘草一錢生薑酒炒布包烘熨血瘀浴以益母通經益母草煎洗小腹○調經膏鮮益母

草四兩兩黨參當歸香附製丹參熟地白朮靈脂炒生地

各二兩兩陳皮青皮烏藥柴胡丹皮地骨皮川芎酒芍半

夏麥冬黃芩杜仲續斷延胡紅花川練蒼朮各一兩沒

藥遠志肉枳殼炒吳黃黃連厚樸茴香木通木香官桂

甘草各五錢炮薑三錢雄烏骨雞一隻竹刀破腹去毛

雜或用全付骨亦可麻油熬黃丹收牛膠二兩蒸化攪

勻貼臍下○經閉蠶砂酒炒熨種玉有丁公仙枕之喪

○崩帶蠶砂灶心土牛膠酒敷

丁公仙枕用槐木爲枕如天蓋地式鑽孔一百二十衰

川椒吉梗荆實子柏子仁薑黃吳萸白朮薄荷官桂川

芎益智仁枳實當歸川烏千年健五加皮藜蘆羌活防

風辛夷白芷附子白芍稿本菴蓉細辛牙皂蕪荑甘草

荆芥菊花杜仲烏藥半夏等分各一兩咀片研末絹袋

盛度枕睡能除百病壽高多子寶鑑有仙枕方稍異

調月有濟陰蜜丸之納濟陰綱目云凡下焦虛冷腹痛崩漏淋瀝帶下用吳萸杜仲蛇

床子五味丁皮各一兩木香丁香五錢絹包煎湯熏洗

後再用藥納下部帶下延胡五錢厚樸三錢當歸茴

香防己肉桂赤豆龍骨川烏丁香木香良薑木通全蝎
枯礬各一錢蜜丸棉裏納之。又方爲上藥力小再加
三錢內加行性熱藥羌活柴胡二錢大蒜一錢破故紙
與蒜同焙一錢三奈子川烏頭大椒五分甘松三分升
麻枯白礬二分全蝎三個麝香少許爲末如上納法
一用枯礬蛇床子一用吳萸川椒一用遠志乾薑
吳萸蛇床子一用五味皆如前納法兼暖子宮。
凡下部有病藥難達到此法甚捷而不傷臟氣此卽濟
陰綱目中論也乃知今人專講內服亦非古人所取
又壽世編云古方勿妄用有產病用外臺祕要坐導方
其後反得惡露之疾此非法之不慎佩雄精而宜子
善乃藥之不當也然亦不可不慎佩雄精而宜子
精於左臂宜子取陽精全於地產東大布以安胎
也此類古方雖未必驗當知其理胎之
所居曰子宮亦曰胞門亦曰丹田在臍下三寸。任脈
衝脈皆起於胞中上循腹裏爲經絡之海又衝爲血海
任主胞胎女子二七天癸至任脈通太衝脈盛月事以
時下故有子胞亦名血室血澁不行則成痼作痛胞
寒則無子。凡胎動多在當臍。孕婦以潤布束腰免
胎墮臨產解之兒易轉身良法也。安胎主膏黨參

當歸各二兩熟地三兩酒條芩淮藥白木各兩半酒川
芎酒芍陳皮蘇梗香附杜仲續斷貝母各五錢麻油熬
黃丹收一加黃蓄生地各一兩下血者加桑寄生阿膠
各五錢又加子腫加薑皮茯苓皮火腹皮陳皮梔子
末調子喘加馬兜鈴吉梗貝母子疝加防風獨活羚羊
屑又止嘔定痛加砂仁少許又肝脾血熱小便帶
血加柴胡黑山梔又胎動不安古保兒預貼丹田
方一月用烏雌雞十月用猪腰入藥保兒預貼丹田
乃血氣虛損不能榮養而自墮有因勞怒傷情內火便
動亦能墮胎又婦人有孕則碍脾運化遲而生濕濕生
熱也又婦人受胎經三月而墮者雖氣血不足乃中衝
脈有傷中衝即陽明胃脈供養胎孕至此時必須謹節
飲食絕色慾戒惱怒方免。專保小產方生地八兩當
歸炒黃芩益母草各一兩白朮續斷各六錢酒芍黃蓄
各五錢甘草三錢麻油二斤熬白蠟一兩黃丹十四兩
收龍骨煨一兩攪勻紅緞攤貼丹田十四日一換將產
一月一換一方無白朮加菝蓉。又方保小產先一月
貼腰眼七日一換過三月半月一換十月滿為止如治
淋帶血枯經閉貼丹田如治腎虛腰痛貼命門及痛處
諸瘡入爛貼之亦可收口用黨參當歸生地杜仲續斷

理論駢文

桑寄生 生地 地榆 砂仁 阿膠 各一兩 熟地 二兩 薑砂 炒

一兩 半麻油 斤半 黃丹 十二兩 黃蜡 二兩 收下 紫石英

煨赤石脂 煨龍骨 煨各七錢 攪勻 一方無 救母姑塗右

足孕婦有病其胎已傷不能保者留之則害其母用附

用臨產遵六字真言 餘詳達生編胎產全書 催生滋四

物大劑 生不必催 催生更不可亂服藥 瀝漿生用熟

以滋益之 此方洗冤錄以治跌壓死者 一方用黃耆

當歸煎熏全 一用麻油和蜜摩臍皆穩而效 附方

乳香搗餅納陰中 又產後子宮不收陰門突出四物

湯煎熱入龍骨少許以麻油和湯熏洗 此皆內府方

也即四物推之凡四君八味十全大補無不可外治矣

龜殼散能開交骨 五錢也加蟬蛻七個蛇蛻一條燒灰

以蒸汁麻油調敷腹閉目靜卧一時即生蓋開日烏雞

則氣行陽開日則氣行陰也或加車前子一兩數

湯足出死胎

胎死母舌必黑又指甲青黑腹脹悶口臭

死○死胎不下烏骨雞去尾煎湯摩臍下妙○治難產

及死胎用龜殼散敷最妙或用立聖丹寒水石四兩以

二兩生用二兩煨赤同研末加硃砂五錢再研如桃紅

色每用三分井水調如薄糊攤紙貼臍心死胎平胃

散加撲硝五錢桂心三錢麝一分敷此方雖較內服有

差然產後人虛硝麝尚嫌其峻須審視明白再用又

死胎方黃牛牯屎不胞衣不下豆醋濃摩黑豆四五合

拘多少塗母腹立出胞衣不下豆醋濃摩醋三大碗煎

數滾布蘸溫熨臍腹并厚敷胞自下蓋豆滑而醋斂也

驗○又方用石灰一大塊置淨盆中以沸湯潑之扶產

婦蹲其上熏之卽下此方太峻有葱白濃煎湯熏洗法

至穩或川芎當歸煎洗或黑豆二兩熟地赤芍當歸

甘草炮薑肉桂一兩附子五錢酒煎洗危者附子五錢

丹皮乾漆大黃一兩醋熬貼如誤用濟坤丹等下胞衣

必致產後子腸不收者水温浸盤腸生臨產小腸先出

百病皆作子腸不收者水温浸盤腸生臨產小腸先出

則神散宜先以產婦髮梢或紙撚入鼻取嚏再放腸漆

器中黃耆煎湯温浸之自收急抹桐油以防風襲或藥

魚焙塗或用參者苓木歸陳柴升倍升麻濃煎溫浸亦
佳凡產婦脫肛及下茄帕等症俱是氣虛下陷宜用此
法又治脫肛用參者苓木歸升加熟地黃肉芫絲餅肉
桂附子黑豆煨薑可參或熬膏備用又子腸不收葱湯
或枳殼湯浸或煉暈塞半夏臨產時忽暈絕者乃氣悶
麻油傾盆中坐浸暈塞半夏亂不清所致以生半夏飯
丸裹寒鼻卽醒此扁鵲法若產後血暈有去血過多
者宜補血有惡血上沖而暈者宜破血行血爲妙又先
用炭盆潑醋使聞其氣則精神斂而不散且酸能益血
也或用秤錘燒紅置醋盆中全如血上沖用醋煎韭菜
熏鼻熨胸肝風動發厥亦悶蒸紅花一婦血悶而死醫
用葱或韭菜熏髮并合臍悶蒸紅花用紅花煎盆湯熏
自醒或紅花扎緋線以止衄產婦口鼻黑色起鼻衄爲
同醋煎熏鼻扎緋線以止衄產婦口鼻黑色起鼻衄爲
紅線三根本婦髮三根扎中指中一節乃手少陰心位
也。附方產後熱入血室發熱煩躁晝輕夜重譫語
如見鬼神或往來寒熱小柴胡加靈脂佐以黃連少許
赤苓等清心涼血。產後血崩如色紫脹痛者是敗血
勿以崩論若鮮紅者是心肝脾受傷當以崩論治產
後血崩不止如塊如片宜大補脾胃升氣血用當歸

二兩黑荆穗黨參白朮熟地黃蒼川芎白芷蒲黃炒靈
脂炒各一兩柴胡升麻陳皮各五錢烏梅炮薑各三錢
麻油熬黃丹收或加麥冬五味羌活防風黃連用吳萸
水炒黃柏炒黑各二錢再加伏龍肝鷺砂炒阿膠香附
艾葉各一兩兼白帶者加蒼朮半夏各一兩熬貼心口
臍下凡老少血崩皆可用與前血症門十灰散參
小腹滿痛是肝藏已壞難治。白帶熱鹽炒艾熨臍
又醋炙雞冠花酒炒紅花荷葉灰白朮茯苓陳壁土車
前子各一錢末酒或米 點硃燈而鎮謔 產後胡言亂語
湯調敷臍可利濕熱 硃點四燈照之。按產婦謔
不定也四根燈草加硃砂點四燈照之。按產婦謔
語怔忡驚悸宜川芎當歸黃耆黨參白朮熟地茯神棗
仁栝子仁各一兩半夏陳皮麥冬甘草各五錢油熬丹
收糝硃砂末歸心口可安神惡露未淨加桃仁紅花炮
薑各二錢熬貼以免敗血沖心尤穩勿悞作邪祟治反
擾其神 又如有塊痛者另用藥治塊處此膏即用著
參朮地補藥貼亦無碍 風驚煮其髮鼻嗅荆防 產後驚
膏藥異於湯藥以此 風驚煮其髮鼻嗅荆防 產後驚
四兩生薑二兩河水燒 滾將產婦髮煮至白沫起汗愈
此又是一種汗法奇妙 前有蠶葱膏可貼。凡產後

髮灰一錢炮薑五分黑豆一撮葱白三個煎熏口鼻如
用麻油熬黃丹收牛膠攪貼心口背脊肚臍亦可。產
後中風黑荆穗童便煎熏口鼻。產戶受風葱白紫蘇
煎熏羌活防風煎熏。烏金膏紅花二兩熟地赤芍莪
朮煨全當歸蒲黃炒陳黑豆乾薑官桂各一兩麻油熬
黃丹收治產後敗血爲患諸症。又方當歸二兩川芎
一兩桃仁薑炭甘草紅花延胡官桂靈脂香附各五錢
麻油熬黃丹收治產後諸病消積行瘀甚妙較回生丹
穩。○寶金膏當歸四兩黨參香附川芎延胡索蘇木白
朮蒲黃桃仁糯米黃紅花熟地茯苓烏藥川烏各一兩
牛膝地榆炭山萸肉金毛狗脊蒼朮何首烏酒芍靈脂
炒醋三棱羌活橘紅木香良薑青皮木瓜乳香沒藥草
烏大荷血結桔梗防風天麻黑荆穗香白芷細辛各五
錢黑豆艾葉牛膠各一兩五錢麻油熬丹收或加厚樸
枳殼黃耆半夏炮薑炭吳萸各五錢髮團八錢生薑葱
白韭白各二兩同熬槐枝攪通治產後一切諸症或貼
心口或貼臍下寒症糝肉桂未貼。○凡產後百病以此
膏爲主隨症加藥。按千金不易方治產後百病用當
歸三錢川芎生地澤蘭益母草醋香附醋延胡各錢半

風加防風天麻血崩加靈脂炒荆穗炒三四朝發熟
 加炮薑著參咳加杏仁桑皮桔梗脹加蒼白木茯苓厚
 棧陳皮砂仁枳殼即藥例寒痛護其心肢揉薑附產以
 此方治十三症茲不備載傷脾足冷逆而厥氣上行宜用
 棉護心○又產婦勞倦傷脾足冷逆而厥氣上行宜用
 炮薑附子布包烘熱熨四肢冷處○按胎產全書有加
 味理中方治胃痛用淡附子三錢白朮炒茯苓二錢炮
 薑肉桂各一錢醋炒延胡製乳香各一錢五分甘草七
 分荳蔻五分黨參七錢或一兩如氣痛加丁香廣木香
 鬱金炒良薑炒各等分血痛加靈脂醋炒錢半炮薑蒲
 黃炒各七分歸身炒二錢寒痛加吳茱萸一錢小荷鹽
 水炒錢半胡蘆巴鹽水炒二錢桂附倍用食痛加焦神
 麩錢半山查用糖水炒雞肫皮焙各二錢廣皮一錢母
 丁香七分蟲痛加川椒四十粒烏梅三個吳茱萸用黃
 連水炒八分樞子肉三錢痰痛加製半夏牡蠣粉各二
 錢肉苁仁煨橘紅沈香各一錢積痞痛加母丁香八分
 陳香圓佛手柑各一錢冷積重者加巴霜虛痛分陰陽
 陰虛加熟地用薑汁益智仁砂仁炒五錢杞子酒炒阿
 膠用蒲黃炒山萸肉酒炒各二錢炮薑五分陽虛原方
 加附子實痛去參朮加枳殼草蔻仁各一錢桂枝醋炒

入分甚者大黃用菲汁製三錢去肉桂產後宜溫而
溫中進食尤急此方可熬膏貼其加法卽可爲糝藥之
例通之可治百病丹溪治產瀉虛鬱冒喘倉公之散後
脫用參木苓附加五味枯礬可推鬱冒喘倉公之散後
血昏迷不醒名鬱冒卽血厥瓜蒂藜
蘆雄黃明礬末噉鼻取嚏此倉公散也逆亂塗二氣之
丹按產後嘔逆者古云用香砂六君藥料治之加製吳
萸柿蒂爲引不效加黃連肉桂再不效用二氣丹水
銀硫黃各三錢結成砂同研米糊爲丸以柿蒂丁香湯
調用水銀得硫自化呃逆霍亂俱治如敷胸甚妙。附
方產婦咳逆官桂末以薑汁調塗脊卽肺俞也塗脊一
條并治瘧。敗血入肺面黑咳嗽喘急蘇木煎湯熨胸
背如氣短發喘者醋煎生化湯熏鼻若聞食卽吐胃氣
絕者難治又方用續氣養榮湯料當歸四錢川芎黨參
各二錢黃耆熟地棗仁炒山藥各一錢炙草炮薑各五
分陳皮三分此方補氣血而兼能消痰導滯安神清熱
如熬膏備用甚宜足冷加附子三分汗多加麻黃根一
錢渴加麥冬五味便閉加麻仁茯苓卽是藥例又痰加
製半夏傷食加山查砂仁煨加肉桂紅花咳
加杏仁可癖症時酌用茲不具載能者自知芎歸任熏

凡產後怪症皆是敗血爲患通以川芎當歸治之最穩
如乳懸症用芎歸煎湯熏口鼻并患乳久之血散自愈
可以爲證 又芎歸加天麻羌活熟地治中風
又芎歸加赤芍三棱莪朮治血痞皆醋調敷 草香擇
貼產後下物如茄如鉢如怕如肉線有用草麻肉同乳
香一半研膏貼頂心收卽去之者非萬不得已勿用
肉線有生薑一斤麻油二斤炒乾盤 三消調醋之丸治
起肉線絹盛乘熱熏法甚佳可推 吳萸益智仁蘿蔔
人死血食結痰結三等塊痛黃連用三棱莪朮山查香
子拌炒加川芎桃仁黑山梔六神麩三棱莪朮山查香
附白朮當歸陳皮 五香鋪蒜之餅 產後流注及陰毒腫
薑汁九醋調敷 沉香肉桂各等分麝香減半加白芷蘇葉薑黃血結
研末以米湯調作餅先鋪蒜泥再放餅灸或熨斗熨腸
分內外 產婦患難疽皆由氣衰血阻外腸癰難治內腸
癰腫痛當臍必硬宜用灸法兼用補託外腸癰治後其
壽內消往往有寒毒如雞腸者從臍出半不可斷如肚
腹脹痛者內腸癰也潰後必從大腸內瀉膿血 灸法
用生附子一片放患處以葱薑蒜搗糊放附片上塘雞

矢亦好艾灸之能散更妙如爛用山上白色陳牛糞研
麻油調搽切忌涼藥敷致毒內攻禍不旋踵按灸法
亦宜乳辨壯衰產後乳病或虛或痰須分別治按婦
慎用乳辨壯衰人乳病與男子異女損肝胃男損肝腎
此症過四十外經斷者難治兒吹氣而得者名乳吹
在胎中者名內吹既產者名外吹如紅腫青白者
疽○先核漸漫腫如盤未潰先腐微斑紫黑失治則串
及胸肋腦下流臭水敗漿成損名乳勞○又由憂思抑
鬱脾氣消阻肝氣橫逆所致不痛不癢如碁子大一核
數年後方破者名乳岩滴盡氣血而死難治○乳初作
痛生半夏葱白塞不患一邊鼻并治乳核或加巴豆細
辛橫扎鼻上嗅之或巴豆米片飯丸雄黃衣貼眉心並
效○乳癰初起葱白炒敷再用砂罐盛炭火偏汗見前
註一用牛膠醋化塗或用柴胡連翹當歸枳殼皂角
煎汁入醋化牛膠塗或用常歸瓜蒌甘草澤爾青皮乳
香沒藥白芷貝母醋水熬入牛膠成膏塗并治乳勞乳
核陸方加白芨可束根一段用香肥皂紅糖搗敷
鯽魚一個山藥如魚長一段加糖搗敷單山藥亦可敷
消即去之恐肉腐○乳核初起可散久則成岩矣用葱
和蜜同遠志末敷忌入口或烏頭桂心甘草酒調敷

或煨蚶子殼醋塗

鑑方治乳核用南星半夏僵蠶

白芷草烏皂角末葱和蜜搗敷忌入口又治乳核用

木香生地搗餅敷熨斗熨之前有五香餅可參心悟

治乳核用香附麝香末蒲公英煎酒調塗○乳癰結核

刺痛及潰後不斂丹參炒白芷赤芍各五錢猪油熬黃

蜡收塗○乳癰衆療不愈但堅紫色青者柳根刮去皮

搗爛煨熱盛練囊中熨乳上一宿卽愈此毛養生方也

○乳癰田雞皮入半夏三錢麝五釐搗餅敷帛縛約三

時解去○乳勞爛見心者取猫腹下毛燒存入輕粉少

許清油調塗○乳頭破裂或小兒吹乳血乾自裂破多

痛丁香末敷如燥津唾調敷○乳頭生瘡汁出痛不可

忍生鹿角三分甘草一分共末以雞蛋黃入藥攪勻置

銅器中炙溫敷日二次愈○乳不通麥芽煎洗木梳梳

乳干編○治乳吹膏藥川烏草烏南星白芷各一兩生

地當歸白芍各二兩麻油熬鉛粉收此方去腐生新拔

毒長肉無不效○乳疽敷藥初起可消已潰可束住不

致日開日大黨參黃耆熟地川芎當歸青皮各二兩白

木蒼木蘇葉柴胡白芍白芷香附靈脂烏藥遠志陳皮

木香半夏僵蠶草烏南星官桂木鼈仁五倍白芨白斂

乳香沒藥神麩各一兩羌活防風厚樸枳殼桔梗甘草

名五錢共末牛膠五兩醋加生薑汁化開和鏡人乳磨
敷或油丹熬貼 陽和湯料作餅敷犀黃丸塗。凡乳
症須早治傳盡乳房再傳次乳則患深矣 灸法用碗
一個以燈草四根十字排碗內頭各露寸許再用紙條
一寸五分潤用水濕了蓋碗內燈草上其紙碗口齊
碗覆患上留燈草頭在外艾一大團放碗底灸之艾盡
再添俟碗內流水氣內痛覺止 曰逆曰橫曰側俱是產
方住不應次日再灸一次自消 曰逆曰橫曰側俱是產
難手足出為逆忌針刺將真灶心土搽臍中如足出
難者用中指點鍋底煤於兒足心畫一叉如手出者放
鹽於兒手心即順俗名討鹽生或用蛇蛻灰少加麝香
酒調勻塗兒手足心全橫側生者輕手扶正之切勿驚
慌亂用蠻法。附方坐產太早下部受凍血冷凝滯產
戶不開者紫蘇煎湯熏之或胞破已久水竭血乾者葱
湯濃煎 有熱有嗽有汗 謂發熱咳嗽 悉為蓐勞 按產後蓐
洗自下 有熱有嗽有汗 謂發熱咳嗽 悉為蓐勞 按產後蓐
生內熱所致熱鬱積久變成虛怯宜清熱止嗽潤肺瀉
火滋補真陰但過用清熱瀉火藥亦恐重傷脾胃故前
人有宜參助真陽以生真陰引 瘋癱 卽產癱也過六十
火歸原之法 前有滋陰膏 瘋癱 卽產癱也過六十

忌用風 非虎骨鹿茸可瘰用膠亦可或同參歸著地等

燥藥 露不淨發熱煩躁或大小腹有塊痛者貼寶金膏後再

州當歸川芎肉桂炙草各五錢蒲黃沒藥乳香靈脂各

二錢半赤芍一錢血結五分另研熱酒調敷膏外或

用炒吳萸熨。產後脫肛等症皆氣血虛。脫肛用荆

芥末熬頭灰蜜調塗肛上以陳年草鞋一隻烘熱緩託

上數次可愈或五倍末摻或黑豆菘豆赤豆末少加枯

馨蜜調塗并治痔。子宮脫者五味子泡洗。陰戶不

閉或真陰大虛致脫者大驚甲一個破去腸雜連頭煮

爛細帕蘸汁滴之其頭連骨煨研摻傷冷者用硫磺四

兩吳萸兔絲子各一兩半蛇床子一兩研每用五錢煎
湯溫洗無硫磺用川椒或煎香油坐其中皂角末取噓
自收或油紙擦點火吹滅熏鼻。陰脫如脫肛者硫磺
烏賊骨各五錢五倍二錢半敷。升補法見子腸不收
註。婦人淋症填鹽於臍切葱一把扎好放鹽上熨斗
熨之。淋血者照血淋治。陰翻澤蘭煎洗。陰突蛇
床子烏梅熏或鯽魚生煎油塗。陰挺雄黃輕粉各一
錢冰片二分葱管黎蘆二錢煨研先用川芎當歸白芷
甘草龍膽草五錢煎洗再上藥。陰癢濕熱下注生蟲

里會作之

事

明礬納之又蛇床子一兩苦參五錢川椒艾葉各三錢

葱白五個煎熏并洗猪肝香油炙香貼雞亦可皆引蟲

或用塘棲疔藥能殺蟲甚效陰旁腫痛手足不能屈

伸四季葱入乳香末搗餅置於陰兩旁自愈陰門生

瘡生甘草銀花元參土茯苓蒼朮白芷茶葉桑葉苦參

葱白蒜梗槐花元參土茯苓蒼朮白芷茶葉桑葉苦參

連大黃無名異各一錢象貝蘆甘石黃栢各二錢輕粉

升過樟腦各五分猪膽汁麻油調搽○子宮大痛不可

忍五倍明礬煎洗并敷○婦人隱疾乾癆則成乾癆即

每多諱言錄此令識字者可自治也乾癆則成乾癆即

癆也豈扁蓄胡椒能愈乾血癆扁蓄二錢地黃一錢半

用線帶住納陰內三寸許病淺者臭穢盡出見鮮血即

下深者五六日亦下忌房事麩食魚腥此方見幾希

錄或先將藥作餅貼兒病胎毒居多凡兒病大半胎毒

仲景海葭均有納法兒病胎毒居多凡兒病大半胎毒

寒十之一大率脾虛肝盛腎水弱心火旺肺金受制

○治胎毒雄黃黃丹乳香沒藥白芷正不留行木猪膽

汁塗小兒胎毒胎瘡頭上紅赤痛癢遍身無皮白附

子蛇床子黃丹各五錢羌活獨活白鮮皮滑石雄黃枯

養脂脂灰各三錢五分麻油調搽凡癢瘡皆治小兒
生三日身上紅腫謂之油風爛草鞋灰菜油敷胎瘡
生槐枝六兩麻油二兩熬銷粉收輕粉一錢熟石膏三
錢和勻塗治胎毒重舌馬牙牙根腫脹并治臍風驚
口及口舌生瘡桑樹日出時用刀斫二三下少頃其漿
自出和蜜塗之立愈金墨亦妙又重舌鷺口白芨磨
乳塗足心重舌木舌竹瀝調髮灰塗舌上小兒頭面
肥瘡禿瘡黃水瘡一切惡瘡松香用葱汁煮過一兩川
椒輕粉各二錢飛黃丹枯礬各六錢香油調塗甚佳
小兒一切熱瘡雞黃五個髮一團同熬少頃液出取塗
或入苦參末塗之一方單用髮熬液亦佳口角爛瘡
髮灰猪油塗竹衣垂并無皮膚膿血淋漓赤剝楊梅
一切胎毒蘆甘石用黃連水童便製過一兩黃栢用膽
汁塗炙甘蔗皮燒兒茶赤石脂各五錢菜豆粉炒七分
冰片五分麻油煎雞蛋取油調塗并治婦人陰蝕爲丈
夫梅毒所過者毒重加犀黃珍珠塗胎赤生地甘草
連翹花粉水抹浮萍搗爛取汁調赭石撲硝敷小兒
丹毒亦胎毒也然大人亦有之其症紅腫痛癢偏身皆
有游走無定或初起白斑漸透黃亮搔破出水濕爛者
爲水丹又名風丹多生腿膝屬脾肺有熱而夾濕也又

色赤而乾發熱作癢形如雲片者爲赤游丹屬血分有
火而受風也又偏起白泡無熱無痛爲冷瘻卽冷丹由
火毒未發肌膚外受寒鬱而致也又有腰間紅腫一道
名纏腰丹亦名纏蛇瘡又有雞冠菜莢等名甚多總由
心火三焦風邪蘊結而成自胸腹起於四肢者順反是
逆 治宜涼血清肝消風養血爲主。火丹大黃黃柏
栢葉蚰糞各五錢赤豆輕粉各三錢雞清和水調敷
如雄黃青黛石膏滑石龍膽草黑山梔木鱉仁枯礬水
龍骨鐵銹馬蘭頭汁青苔松毛瓦花雲臺菜馬齒莧南
瓜水皮消任用。按飛灶丹從頭頂腫起漸發紅腫頭
頂俱浮眼睛紅色用葱搗汁塗須令病者倒卧將汁自
下潤至巔頂其毒從頂上百會穴出否則毒侵喉矣凡
丹毒宜用砭者亦如此 鬼臉火丹滿面類出膿血發
癢難禁者爐甘石煨入黃連汁淬三次陳膽星輕粉各
一錢熟石膏二錢官粉七分冰片二分摻 丹從臍起
檳榔末醋塗蚰糞用白糖搗敷或用墨汁塗 纏腰丹
偏身起泡如蛇纏有赤白纏白芨雄黃水龍骨研無根
水或麻油敷先用燈火向兩頭燒五次 兜糞杓上竹
篚燒灰研香油或麻油調敷糞桶箍亦可卽血泡皆治
或蛇蛻燒灰以童使和毛廁板浮泥調敷或蠶砂雄黃

麻油塗或蠶豆殼燒存麻油塗并治天泡白蛇纏枯
漆水敷四圍硃筆點之或杉木皮一塊燒存入水片敷
或白螺螄殼七個杏仁七枚輕粉三分研敷此方加松
黃并治下疳。丹毒入裏腹脹欲死於毒魚所走處
去惡血以伏龍乳傷尤甚。乳食過飽生冷不節脾虛則
肝雞子清塗。乳傷尤甚。瀉胃虛則吐久則成爲慢驚

與須識陰虛之體并知嬌膩之情 嘔呼初以通秘

生二便不通用嘔吸法大人嗽口嘔呼兒前後心兩足
心手心臍下紅赤爲度。附方小便不通遍身腫滿蘇
葉煎燻囊腫光亮疼痛蟬蛻洗蘇葉敷或蘇葉香油敷
雖皮破子出亦效又陰縮入腹者寒也硫磺吳萸末研
大蒜塗於臍下蛇床子炒布包裏 擦捏並可鬆肌 無論
大便不通用葱豉薑鹽敷臍法 大人以指蘸溫水擦兒兩鼻孔
外感及痘疹皆可用 大人以指蘸溫水擦兒兩鼻孔

上推二十四下印堂分開二十四下食指中指下擦各

三十六下擦上十二下掌上運入卦周旋擦一百二十

下於虎口及手足接骨處其穴有窩於各穴窩用力各
捏一下臍下丹田背後兩飯匙骨下及背脊骨節間各
捏一下任其啼叫汗出肌鬆白愈避風爲要。此亦推

拿之一端但得臍風燒其臍輪臍風臍內入風也最爲

其意勿用重力臍風燒其臍輪惡候其狀啼哭不乳眉

青筋以燈心於青筋頭上燒之筋縮爲度又方燈火

燒臍門一下人中一下承漿在下唇垂下處正中一下

兩手大姆指外側少商穴各一下臍輪繞臍燒六下如

式臍帶未落於帶口燒一焦既落於落處燒一焦共

十三下効又臍風生地生葱蘿蔔子田螺肉等分搗

爛搭臍四圍一指厚抱住一時泄屁愈○附方臍腫

荆芥洗蔥葉貼肚臍突腫神方赤豆淡豆豉南星白

斂以芭蕉根汁調或雞子清或醋調敷臍傍四旁尿利

愈又臍中出汗赤腫者用赤石脂煨敷或艾灰敷

口撮抹其口角口撮症大便必熱宜大黃○撮口者初

看齒齦有小泡以指蘸溫水擦破之一用白僵蠶炒研

蜜調敷唇口或用南星水片研薑汁調擦牙齦口自開

或用蟬蛻僵蠶薑汁炒研砂麝各五分蜜敷唇上并

抹口角○附方小兒口病雞蛋白生香附生半夏作餅

貼足心前口塗雞矢以止夜啼有四症寒則腹痛面青

舌門可參看

熱則心躁面赤口瘡

面青

面青

舌則不能吮乳犯客忤或觸生人氣皆啼。熱者男用
雄雞糞女用雌雞糞塗臍并治兩腮腫硬名疳腮亦名

螳螂子硃砂方見前。小兒鎖心解熱退驚安神除煩
躁止啼用羌活防風天麻薄荷黃連甘草全蝎僵蠶陳

胆星各三錢犀角片乙錢油熬丹收以硃砂一錢牛黃
五分水麝少許攪勻攤貼胸臍。受寒曲腰而啼者腹

痛也葱鹽炒布包熨。按心主驚肝主風脾主困 洗蛇
肺主喘腎主虛小兒五臟虛實所主宜觀醫書

蛇以去胎垢身如蛇皮鱗甲名胎垢蛇脫煎洗蠶亦
黃栢末 葱汁麻油疏表月內傷風鼻塞發搐蠶細

膽汁敷 葱汁麻油疏表大人掌上搓熱貼額門又兒發

熱用葱白搗汁加麻油和勻指蘸擦兒心口頭項脊背
諸處疎通腠理不傷正氣名疏表法 按小兒貪睡口

中氣熱呵欠煩悶者傷風頭目 雄黃雞白清裏若風寒

痛畏人畏寒者傷寒山根必青 雄黃雞白清裏邪已入

裏或有停滯鬱熱口渴胸滿便秘為內熱以雞清入麻
油加雄黃末調勻用婦人髮團蘸擦兒之胃口寒天烘

暖用能滋陰退熱板毒涼肌倘身無熱惟啼哭焦躁者
去雞子清專以麻油亂髮拍之仍敷胃口即時安臥名

清裏 菖蒲開閉 風痰閉塞昏沈不醒用生菖蒲生艾葉

法 頭項胸背四肢處乘熱往下熨之 薄荷同之 小兒風熱

痰自豁然凡閉症皆效名開閉法 薄荷一兩大黃當歸赤芍甘草五錢僵蠶炒一錢麻油

熬黃丹加六一散收通治小兒五藏蓄熱數胸赤口渴五

疹 菉豆解煩芙蓉共之 心煩熱用水粉雞清調塗胃口

及兩手心更以酒麴研爛熱酒和為二餅貼兩足心名

解煩法 水粉印鉛粉或用官粉敷如喉閉敷頸上吐烟

熱症皆可用雞子清調菉豆粉敷如喉閉敷頸上吐烟

敷臍上瀉血敷臍下吐者塗兩足心瀉者塗額門皆法

也。雞蛋煮熟取芙蓉葉搗爛包蛋再煎為餅喉症一

貼頂門一貼肚臍急驚貼臍亦治馬牙重舌蛇舌吐舌

諸 搓煨薑而通脉 厥冷者用煨薑搗汁和麻油塗兒手

封酒萸而納氣 虛脫症吳萸五分酒和餅封 痰喘醋礬

包於脚心

痰喘症生礬米粉醋和餅包足心一錢白蜜調

下或咳嗽發喘鼻扇肺脹明礬一錢白蜜調

擦胸○按痰乃風苗火靜伏脾火動則壅肺痰火交

作則咳嗽喘急宜瀉肺又治小兒肺脹胸滿喘粗氣

急兩脇扇動兩鼻竅張痰涎壅塞悶亂喘噁死在朝夕

白丑黑丑各半生半炒各取頭末五錢大黃一兩檳榔

二錢半木香一錢半末入輕粉一字和勻蜜水調餅貼

膈內微利爲度卽一捻金也又治寒邪入肺寒鬱爲

熱痰喘上氣肺脹胸膈若不速治卽不救殊砂二錢半

甘遂一錢半輕粉五分爲末每取一字以溫漿水少許

上滴香油一點抄藥在油花上待藥沈到底痰結薑附

去漿水取藥用名馬脾風散亦如上法敷臍痰結薑附

貼於胃口胸有寒痰濃厚青色不時昏絕者生薑一兩

芥同糲子附子一個炒熨胸背更捏作餅貼痰結胸白

鳩貼胸口疔瘰羊脬掛於胸熱久生蟲大都脾胃傷津

液也腎疔卽走馬疔腎虛受邪疔奔上焦初作口臭次

傳齒黑齩爛出血甚則齒脫最險外有蛔疔脊疔腦疔

乾疔疔渴疔瀉疔痢疔腫脹疔無辜疔丁奚疔疔露疔皆

危其證頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口淡唇白兩眼

昏爛揉目脊聳體重鬪甲咬牙焦渴自汗漩白瀉

酸吐腥膈鳴結癖潮熱或身多瘡疥酷嗜瓜果酸鹹炭
米泥土多飲水者是也詳見醫書○治疔積羊疔吹起
陰乾入汾酒二兩掛兒胸口問消即去之○凡小兒肚
大青筋身熱肉瘦牙疳口臭腹痛蟲積黨參白朮當歸
生地胡連枳實青黛蘆薈青皮陳皮三棱莪朮胆星大
黃巴豆黑丑白丑苦楝根木香檳榔木鱉全蝎胆草山
查神麩靈脂僵蠶明雄炮甲蟾皮皂角柴胡地骨皮黑
山梔輕粉元參羚羊各一兩麻油熬黃丹收硃砂二錢
石膏滑石各四兩攪○腦疔頭皮光急頭髮作穗或有
頭瘡腫至顛顛腫則多損眼頭軟倒肥而不瘦附子生
南星末薑汁調貼患處又腦疔滿頭餅瘡腦熱如火
顛腫頤高偏身多汗者宜龍膽草薄荷髮灰猪胆汁敷
或鯽魚胆滴鼻○諸般疔瘡乾蟾皮灰三錢黃連二錢
青黛一錢加麝數名玉蟾散須先洗洗疔瘡藥甘草
黃柏馬鞭草連根葱荊芥穗煎湯洗訶子燒灰入輕粉
麝少許摻之○走馬疔見前○治小兒面耳疔瘡下疔
諸般惡症牛糞尖經霜者佳瓦上炒灰加水片一分礪
砂二錢人中白煨皮硝雄黃各一錢明礬五分吹如牙
疔只用牛糞灰冰片摻即愈○小兒口患不能吮乳及
乳草牙疳等白蠶蠶去絲嘴全人中白冰片擦又日

疔甘蔗皮灰吹。小兒患疔有大柱骨倒者，或煨蟾與一可用五加皮末酒調敷項骨上，乾易效。

研蠶見。瘡癖皆塗莧甲。甲在中腕癖在兩脇皆積也。鼈甲四兩莧菜八兩烏敷前有鼈

膏驚勻蜂蜜擦於背。急驚有入候兩手伸縮十指開合勢如相撲頭偏不正身仰向後臂

如開弓目直似怒睛露不活此實熱症宜清涼忌辛燥攻擊風藥助心火。又有欲出痘疹而驚搖身熱者勿

誤用藥致毒內攻。治急驚用蜂蜜放掌上開水和勻擦兒背心鉗出黑毛愈。附方以布襯兒懷抱烏毛雞

手上蹲吸或以雞尾對兒臍無風雞必遠去有風雞必貼緊慢驚亦可用。又治急驚代赭石一兩研末醋敷

足心小腿上有紅斑效。老蜆當中切斷跳一段治急驚不跳一段治慢驚同虜搗敷臍然治急驚為效。按

急驚由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搖肝風心火二臟交爭血亂氣併痰涎寒壅所

以百脈凝滯關竅不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也。治法通關截風定喘去痰其熱尚作則下之洩後急須

和胃鎮心。開關用皂角半夏嗜鼻名嚏驚散。噤口用南星皂角。廬蠶蜈蚣麝香研末生薑蘸擦牙。利痰。理禽辨文。

用前青金錠入木香汁和蜜擦胸。○定驚膏治肝風驚
 搐并胎風兼清心法。羌活防風川芎當歸龍胆草梔子
 蠟梢生甘草薄荷竹葉加黃連麥冬膽南星赤苓硃砂
 雄黃木通生地丸。臨用生薑汁化開擦胸。此方治熱。○
 小兒急驚風錠子麻黃四兩甘草二兩蟬蛻蠶全蠍
 各二十一。一個陳瞻星一兩白附子防風川烏天麻川芎
 白芷黨參南薄荷白朮木香各五錢。乾薑四錢煎膏。蜂
 蜜二兩牛黃冰片輕粉各三錢。麝一錢硃砂雄黃各八
 錢。和捏為錠。臨用淡薑湯同白蜜磨擦胸背。麻黃麝香
 同用發散。而不引邪。妙并治風癇。破傷風。諸風皆良。○
 又急驚秘方。治咳嗽驚癇。發搐發熱。胸喘痰涎。上壅痰
 厥。跌倒。膽星全蠍各一兩。牛子五錢。硃砂四錢。巴仁三
 錢。糝薄荷膏貼心口。加大黃一兩。五錢。黑丑七錢。五分
 膽星半夏枳實各五錢。牙皂三錢。油丹熬貼。亦良。薄荷
 可用二兩入膏同熬。此方合用。或抱雞與截蚓。上吊癇
 行而不泄。按小兒急驚險症。或抱雞與截蚓。上吊癇
 並嗜飛龍。天吊與癇病皆驚風症。但天吊頭目仰視。癇
 則仆地作聲。醒時吐涎沫。驚風皆無。此治天
 吊有九龍控涎散。治癇有三癇丹。皆用蜈蚣。或加全蠍
 等味。○治小兒天吊。目久不下。眼見白睛。及角弓反張。

不出者大蜈蚣一條去頭足酥炙用竹刀剖開記定
左右各入麝半分研末包定每用左邊者塞左鼻右邊
者塞右鼻以眼下爲度。附方雄黃五錢砂仁六分梔
子五枚炒冰片五釐雞子清調敷肚之四圍如碗口大
留出臍眼入麝少許棉紙蓋軟帛扎一周時洗去治急
驚等症。烏紗驚風偏身皆烏者用黃土一碗搗末入
酒醋一盃炒熱布包引下至足刺破之。又生人驚
亦能抽搐勿作風治難子清調灶心土數頂門及心口
硝棗皮硝軟堅於攻加補治疳積傷食生蟲用皮硝三
苦杏仁生梔子各七個酒糟一兩白灰麩三體瘦甚則
錢搗勻貼臍眼命門三日後肉見青黑卽效
著苓當倣肥兒疳病虛中有積腫脹泄瀉及疹後將成
草製厚樸檳榔山查麥芽神麩陳皮益智仁木香砂仁
山藥茯苓木使君子川練肉胡黃連蕪荑各五錢麻油熬
丹收硃砂一錢攪胡椒梔子以熱佐寒治驚風杏
貼古有肥兒丸椒梔並能達下
米胡椒梔子各七個搗爛雞蛋清和飛麩敷臍板心男
女夜脚板黑愈或用胡椒梔子慈白各七飛麩

除下有青黑布上貼心窩周時脾虛極則木附宜從福幼
莊在田著福幼編治慢驚風。慢驚多因吐瀉或久病
得之其症身冷面青或白不甚搖擗目微微上視口鼻
中氣塞大小便清白昏睡露睛筋脉拘攣由脾虛中氣
不足故寒痰壅盛而風動筋急也此陰症也宜辛溫藥
溫中補脾或可衝開諸症自除蓋治本卽以治標也忌
蜈蚣全蝎硃砂之屬宜用參朮薑草或胡椒肉桂炮薑
丁香炒心土治之又理中地黃加味法用熟地五錢當
歸枸杞子熟棗仁故紙炙黃耆黨參二錢白朮三錢炮
薑黃肉炙甘草各一錢加生薑三片紅棗三枝胡桃三
個炒心土二兩附子五分如咳嗽不止加菴殼金櫻子
各一錢大熱不退加白芍一錢泄瀉不止加丁香六分
此在田方也又溫中補脾法用製眞白朮錢二分人參
炙黃耆八分製半夏七分白蔻仁炒茯苓乾薑炒砂仁
炒各五分陳皮肉桂酒芍炙草各四分虛寒甚者加熟
附子五分老薑一片大棗一枝此聶清江方也治慢驚
之法大略可見矣。○下痘症中有人參等納臍及附子
等數臍之法皆照慢驚治者可以推用。○按慢驚瀉青
者乃夾驚木克土見木質也搐搦者非風胃氣欲絕也

煩渴者津液內竭也眼合者脾困氣乏神迷也虛痰上
攻呼吸相大陰盛強陽覆燈將絕也○治慢脾風黃膏

炙黨參附子炮各一兩白朮二兩肉蔻仁煨白芍酒炒
甘草炙各五錢丁香三錢炮薑炭二錢油熬丹收糝肉

桂末貼臍上再以黃米枕以蟬蛻小兒胎瘕席以雞窩
煎湯調灶心土敷膏外

驚啼一切以雞點之以蠟膽舌下龍言蒸也以蠟膽點
窩草襯於席下

舌不能言南星浴之以蜂房發熱手搯蜂房煎浴擺以
末猪膽汁調點

鯽魚內熱以小鯽魚尾置坐以螺螄肺熱脫肛鋪活雀
兒口中頻擺動之

血能塗雀目即雞眼詳龜尿足擦龜胸如龜背用龜尿
見眼門

解頤有封頤散小兒頤縫不合名解頤屬腎虛不生髓
用栢子仁防風南星四兩末每用一錢

猪胆汁調絹攤大小看頤剪貼此方涼○又方乾薑四
兩細辛二分肉桂五分末薑汁調敷頤門小兒面赤即

愈此方溫又方南星白斂醋敷或蟹灰白芨敷○瀉
痢日久脾氣虛寒頤空髓陷附子川烏五錢雄黃二錢

里翁詳文

里翁詳文

慈根葉同熬膏每早以少許空心貼陷處○斷乳有書

頤門腫大黃栢末敷足心陷用半夏塗足心

眉丹小兒斷乳用山梔一個雄黃雌黃辰砂麝香二分

三分勿令兒知且忌生人若夏月勿用此方奇驗莫測

其理外治方多有如此者內科則未聞有斷乳之法也

痘出於命痘為胎毒藏於命門感天地邪陽之氣而發

皮膚初熱三日類傷寒初證自初熱至收靨謂之常證

經證六日以後謂之雜證報痘次至收靨謂之常證

麻出於肺麻為肺病麻疹痧瘡南陰陽攸分痘為陰毒

前後彌慎麻前恐其不出是有專科姑明我法麻為陽毒

及會通諸書茲但痘後慮其不斂痘為第一關痘為小兒第一關頭

錄其外治之法痘為第一關痘以氣為形以血為色

其形尖圓起發瘡皮厚硬者吉平塌伏陷者凶其色光

明潤澤根窠紅活者吉慘暗昏黑者凶自唇四圍人

中上下起發次及頤顴眼眶太陽太陰正額及於胸背

四肢者吉例從下起者逆起脹灌漿結靨亦然所謂序

也頂額陽位耳後腎位及前後心手足心均宜稀少凡發熱出痘頭面有一片色如胭脂者胸背有成塊紅者皆逆遍身如蠶種摸不碍手者凶。痘發於肌肉陽明胃氣主之故始終以能食爲寶。痘症有聲音咽喉痛腰腹痛驚搐嘔吐泄瀉痰喘煩渴腹脹自汗痒痛斑爛寒戰咬牙失血尿澀便秘倒靨黑陷護眼滅瘢凡二十一條及痘後雜症計十二日。以報點日算起三日點出症俱詳寶鑑。痘至三日後毒尚在內若熱不退多噴嚏者猶防增出。痘至三日後毒浮於表當潮起脹頭面腮頰俱腫點皆紅綻以一約圍紅緊附痘根者吉平鋪散漫地界不分及熱不退而乾枯紫黑者險。痘至七八日貫漿根之紅者漸提於頂爲白毒己化膿也身帶微熱蒸漿最佳漿不滿足氣血虛也諸痘有漿而天庭地角不起者逆自頭至足各有一二類黑陷者爲九焦痘不治凡空漿漏漿疔瘡疔瘡灰白塌陷血靨倒靨諸症均於此時見之。痘至十日後血化毒解白者變黃眼開腫消是爲收靨之候險症不能辨色摸其皮面高處微有硬意重按之內甚軟卽是收靨正期從上靨至下爲順若從陰囊腳下起者逆通身靨而有一二顆不靨又似靨非靨熱不退或有雜症者

猶防有變。○治法一二三日宜解表表疎則痘易出或
用紫蘇荊芥防風牛子薄荷連翹山查甘草之類陽明
實熱邪盛者宜升葛虛者宜柴歸忌寒涼冰伏其出亦
忌參耆閉其腠理并助熱令胸飽氣悶四五六日以涼
血解毒爲主免致毒盛不能盡出反內入臟腑然四日
五日已熱退者不必藥至第六日上午大熱不退便祕
可川大黃釜底抽薪之法次用芩連紫草紅花繼之勿
雜入煖藥只須留三分餘火爲灌漿起勢地步若火盡
退去恐開灰白下陷之門如虛寒體切勿用大黃妄下
痘無裏症始終皆忌下七八九日溫補氣血氣血流行
而成漿自易忌雜入寒涼藥致成泄瀉并茯苓等滲利
藥致漿不足十與十一二日以收斂爲主大和氣血補
脾利水自然結靨海藏云痘疹膿而不焦此失清涼之
氣也如五穀得陽氣而成熟非涼風一至則不能實也
須察證候而清涼之則痲矣董氏亦云收結時解毒爲
主勿幫熱助漿痘回至頸黃蒼內託大忌虛者人參黃
連同用所謂引以清涼助以結痲是也又攝生編謂痘
全賴毒火以見苗出齊長漿足漿此毒不可解遂生編
謂痘始終當以補氣血扶陽氣爲第一義用藥以溫補
少加發散爲首務然編中亦有用大黃石膏治實火之

方竊謂不必先執一見當視小兒體氣強弱受毒輕重
隨其時日審症用藥爲得其宜 古云虛寒用異功散

實熱用涼膈散起 未發觀耳筋 耳後筋紋水紅色爲上
死回生可以爲法 杏紅次之大紅者多火

紫筋重兼青帶黑屬腎尤重又條條直上者輕分枝纏
繞多而向下者雖紅亦重橫過髮際者不治 又耳上

屬心熱者輕涼者重耳下屬腎涼者輕熱者重 腎經
痘忌下苗又小兒面薄耳綿聲音澇滯係脾經痘不宜

下將發辨指梢 小兒五指梢及中指冷是痘疹中指熱
苗將發於言笑是其候也又看心胸有細點如粟起則真

水癩於言笑是其候也又看心胸有細點如粟起則真
將發痘也 又小兒痘症熱動五臟阿欠煩悶肝也時

發驚悸心也或嘔吐翻胃惡心或瀉手足時涼脾也面
頰腮赤嗽壅肺也或腰痛喜寐腎也但顯一二症者痘

稀五藏症盡顯爲險 凡痘之險症初出圓暈乾紅少
潤也將長光澤頂陷不起也繼出雖起慘色不明也漿

行色灰不榮也漿足光潤不消也漿老濕爛不斂也結
痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰毒也

或潰而 畫八卦之宮 痘看卦宮於印堂下頰兩顴
數遲也 兩額兩腮見本色相生者吉 點三

才之穴

風起或肺熱喘噎喉咬牙浮萍敷足湧泉

尿多紫草

燒爐香以辟穢

犯房事經水生產穢氣者以

敷頂百會

亦免黑陷作癩一用茶葉紅棗乳香蕎麩四味和勻燒

更良凡犯穢不起及痘癢一切皆宜

蒼朮恐燥血起

張時忌酒與

燃油紙以照影

神燈照法見前。後亦有

燕麻油點燒如欲觀其右燈移於左欲觀其左燈移於

右麻疹則浮於外而肉內無根如紅雲一般謂之朶痘

瘡則肉內有根而極深謂之粒麻宜成朶痘宜成粒反

是逆。又看痘法凡痘形色雖險若燈光影與痘根圓

暈相為周旋根窠紅活漿影深厚則皆可活若根窠不

紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故白目亦宜照

之手或偏身巧在此

又初熱時用燈照

心經之痘桃蒸

燈草搭其顛

心經發痘忽然抽掣與急驚同用桃皮葱

足心合骨處燈火燒一下以散風痰或用手足心又於手

可勿輕用驚風藥古云有錢難買痘前驚蓋驚則心經

之痘可出也。按桃慈發散燈心清熱痘前用藥之法

做此其敷頤門及肚臍手足心法乃外治之部位也痘

科古無用膏藥者惟觀音膏腎經之痘椒薑豆豉罨其

治疹痘閉症貼胸即出宜推腎經之痘椒薑豆豉罨其

胸痘出胸腰痛者豆豉三兩胡椒一錢搗爛將生薑四

兩共搗敷胸腰二處亦是發散法。附方腎經出痘

尾脊骨痛者芙蓉根馬鞭草搗爛炒敷。又腎經痘偏

身痛者黑豆一升煮爛搗敷腰上即止。黑豆能解腎毒

也。命門出痘鎖眉刺心煩悶不安大熱不退生艾葉

一兩黑豆一撮白芥子一錢醋熬一滾搗爛作餅敷心

前數換心安熱退。按痘以四經俱有而腎經獨無為

上若一出即變黑者腎症也保元加紫草紅花救之如

偏身俱陷而尾脊骨一團飽滿潤澤實熱者舌黑口臭

者腎精足也。以法託之則偏身可起。實熱者舌黑口臭

而祕結虛熱者不臭。敷以蝎防必用大黃石黛。太陽症

口氣臭大小便閉痘色紅紫者用防風全蝎大黃石黛

青黛敷臍。附莊在田白虎地黃湯治小兒出痘發熱

不退口渴喜冷痘瘡黑陷小便赤燥大便祕結口鼻氣

熱等症用石膏當歸各三錢生地木通各二錢枳殼澤

瀉丸

瀉甘草各一錢。大黃一錢半。以行爲度。燈心作引。熱退身涼。卽宜平補。用荆防地黃湯調理之。卽熟地四錢。山藥二錢。荆芥丹皮防風雲苓山萸生甘草各一錢。加生薑二錢。黃酒一盃也。補血散毒。血虛者。初出時卽用之。痘易灌漿。氣虛頂陷者。與補中益氣相間用。按痘症小便不通。細茶嚼爛紙包敷臍。或棹樹皮葱薑艾共搗炒熱數小腹上。女子放陰上。卽通。虛寒者。眼白肢冷而一元散亦妙。大便不通。膽蜜導之。吐瀉糞黃臭穢。小便赤澀者。爲熱泄。毒氣奔越也。痘必必淡白。宜木香砂仁肉蔻訶子龍覆以雞酒尤須附子骨枯。髻赤脂等藥料。不可不審。薑香小兒體性怯弱。或吐瀉後元氣愈虧。不能勝毒汗。薑各四錢。丁香陳淡。各三錢。小雄雞一隻。共搗爛。再用燒酒略炒溫敷臍上。及兩足心數次。如泄瀉加灶心土三錢。痘自出。附方上。身痘已起。脹下。身痘尙未出。或出而下陷不起。用熱燒酒細帕蘸熨之。自出。或再用燒酒噴雄雞敷臍眼一炷。香再換數換白起。又腎經痘初起。腰痛身如被杖。背不能伸。或連尾脊骨痛者。

亦用燒酒噴雞敷腰上。限一炷香。雞青臭再換。痘自出。又後生輩或失陽之症。方發。痘欲出不出。狂言亂語。此痘毒不出。鬱火攻心。既不敢用清涼之藥。以解毒。又恐驟用補劑。以助火。最難措手。用燒酒噴雞敷於臍上。痘自出。語亦止。此從外託內神方也。貧家尤宜。又厥陰痘。出一半。忽然厥冷。目閉。面青唇白者。用燒酒噴雞敷臍。如不噴。燒酒或塗雄黃麻油於雞內。亦妙。雄黃肝經藥也。此又是一活法。可類推。凡熱症。方形虛症。又起元虧。毒重。及欲補而不敢補者。均用此雞酒方。或加以藥尤妙。○按痘身涼不溫。色白不紅。及根無紅盤頂。含黑水者。乃陽虛也。宜大補元煎。莊在田大補元煎。治痘症。悞服涼藥。嘔吐泄瀉。痘不起。發危在旦夕。用熟地五錢。黨參白朮各三錢。山藥杜仲。棗仁杞子。故紙炙草。肉桂各二錢。英肉附子各一錢。加生薑三大片。好核桃仁三個。如泄瀉不止。酌加附子。更加龍骨。栗殼各一錢。倘泄瀉全止。減去附子。若附子太多。則小便恐閉。若痘後調理。此方須減去附子。只用肉桂數分。計日可以復元。又六味回陽飲。治小兒氣血本虛。痘瘡白塌。或悞服涼藥。嘔吐泄瀉。危似慢驚者。速用此方。如有轉頭。卽加入大補元煎。內名返魂丹。用黨參當歸各三錢。肉桂

二錢附子炮薑炙草各一錢加胡椒細末三分灶心土

三錢或減去附子二方可參。按痘症不外虛寒實

熱四字觀廣編所載外治方與莊在田遂生編相較則

知內外用藥一理而外治為尤穩疑難之症可免失手

或則鬱甘寒水杏胡瓜萇痘出脾經本順症也若穢沖

亞氣急者用甘草一兩寒水石鬱金各五錢煮乾為末

入麝香蜂蜜調敷胸前按痘科小無比散治焦黑潮

熱煩躁用石膏寒水石鬱金甘草加滑石六兩亦有再

加紫草紅花生地磨犀角用者可參。肝家痘使血眼

紅丹砂滿面紫黑不起白頭老蚧七條焙瓜萇仁三十

粒去油杏仁十五粒去皮尖共末陳茶調勻作餅貼臍

敷換諸症悉退按熱毒盛極有用生大黃麻黃升麻

川芎烏藥神麩白頭蚧者黑陷發搐目直喘急有用地

龍一兩蟬蛻五錢乳香湯調者皆可參。胃經痘喉閉

失聲不思飲食上吐蛔蟲下瀉惡血卽用前菜豆粉雞

子清敷法喉閉敷頸吐蛔敷臍上瀉血敷臍下良方也

按焦乾黑陷身熱如火者可用犀角羚羊角井水磨塗

心或則乳没人參芍歸生地腎經出痘腰腹絞痛吐瀉

乳香沒藥各一錢研末水丸納臍艾葉炒熱鋪於丸上
源出東垣慢驚土旺木衰之義用人參炙黃耆各二錢
炙甘草一錢生薑三大片名保元湯氣虛及陷者主之
與莊在田用補中益氣同如氣虛而血弱漿不滿者加
川芎一錢官桂五分糯米一團如血盛者去川芎加白
芍此方用精米解毒助漿甚效可搗餅貼保元有加
連翹荆芥防風牛子紅花黃芩赤芍用者補氣活血散
火解毒亦可取法痘科皆以保元爲主湯其加減方
甚多茲不備載又莊氏大溫中飲用保元湯藥料黨參
三錢黃耆甘草各二錢生薑三片加熟地五錢白朮三
錢山藥柴胡各二錢麻黃肉桂炮薑各一錢杜心土煎
水入黃酒和補氣血散寒邪提痘漿散痘毒凡嘔吐泄
瀉頂陷空殼痘色不紅將塌陷者與大補元煎間用汗
多去麻黃。彙精十二味異功散治元氣虛寒痘疹色
日寒戰咬牙泄瀉喘嗽等症黨參丁香木香肉蔻仁陳
皮厚樸各二錢半白木茯苓官桂各二錢當歸三錢半
製附子製半夏各錢半薑一片棗二枝陳氏云陽明主
肌肉胃氣充足則肌肉溫暖光澤起脹而無癢塌之患
此方主之數方均可敷貼亦從用參而推廣者。又

時值瘧疾而復出痘口吐白沫咳嗽失聲生薑切片包
大附子煨再取生薑汁和當歸芍藥生地共搗爛敷臍
白沫自止按痘疹氣血不足者可以此方加減用之
如九味異功煎用參歸芍甘草熟地或生地是也
煎用參芍芎歸甘草熟地或生地是也
二方亦有加減法可俟用茲不備載
初發熱未曾見點可以表汗以蔥白煎湯熏之并治麻
疹又發熱三日末見形跡宜以生酒塗身上時看之狀
如蚤痕者是癩也按表汗有加味敗毒散用柴胡前
胡羌活獨活防風荆芥薄荷枳殼桔梗川芎天麻地骨
皮各五分加紫草蟬蛻紫蘇麻黃同葱白煎者可以參
熏○痘症發熱胡言亂語以冷水拍其手足心更用吳
萸末熱醋調敷兩足心引熱下行如點稠蜜者以水調
吳萸末敷足心一時許小兒覺足心熱即去之又痘毒
狂熱由脚麻至小腹而死或由頭麻至心口而死一日
死幾次者亦用醋調吳萸敷足心又發熱不退者生
羅蔔搗和鉛粉敷足心熱極者燕窩泥搗
以雞子清調敷臍熱退去之不可過分標內須透其
標董氏標內擦法用芝麻油每夜臥時以手中三指法
油擦兒頭額頂背腰兩手腕兩足腕然後睡即可候

輕此亦暢達流通升脫凝滯之義也。附方痘出不快煩渴悶亂臥睡不安咳嗽者艾葉一碗胡椒三十顆搗爛調水取汁熬膏敷臍諸症。隱浴水楊蟬蛻之煎陸精悉退凡透標之藥做此數。

不出隱於皮膚肌肉爲出不快非風寒擁遏卽是氣血

不振日久變爲紫黑矣。○通治風寒氣血楊柳五斤春

冬用枝夏秋用葉長流水煎濃汁乘熱浴洗良久以油

紙燃照之纍纍然有起勢陷處有圓暈紅絲此漿影也

漿必滿足如不滿又如前浴弱者只浴頭面手足勿浴

背如照無起勢則必添湯久浴使透徹肌肉疎通內外

令毒氣隨煖氣而發此藥能升提開豁萬竅有起死回

生之功凡當出不出當脹不脹當貫不貫當磨不磨均

爲陷伏倒靨並用水楊煎浴亦治痒。附方水楊柳卽

水黃荆子也根葉子皆可煎湯以細怕蘸其熱氣頭面

上輕輕按摩數次使皮面鬆爽痘易出。又黑痘用忍

冬藤湯煎浴亦名水楊湯。又有用水楊柳槐桃枝桃枝

紫背浮萍煎浴者有用銀花紅花紫草煎洗者。○痘疹

出不透或腹痛用蟬蛻甘草煎湯浴。按痘出不快或

陷伏倒靨一切惡候用黨參黃耆川芎甘草紫草茸木

方痘不起脹或陷伏宜用黍稷煮湯或芸臺煎湯或
兔皮毛煎湯或臘豬肉煮湯或馬肉煮湯皆可浴

煙荔支猫爪之烟閉者風寒內閉眞痘不出也或如麻
子一片癢甚者乃風毒非眞痘猫爪

荔支燒烟熏之則眞瘡出而癢自止矣夾而出也塗麻黃於胸背瘡有從
斑出者

不可作斑治貫臙時雖斑亦化眞斑症只在六日中

凡夾斑夾疹夾丹而出者此血太過也麻黃雄黃塗於

青布上貼胸背二處一用土硃紫草敷見上紫草化斑

之要藥也如紅斑變黑必死○附方小腸經出痘偏身

發斑片紅片紫如雲如霞無眞痘出不省人事者用美

蓉花川椒胡椒共末紙捲爲條蘸麻油用燈蓋盛之照

於被內覆蓋一時其斑自退而痘出矣○按紅斑紫斑

稠蜜者宜用生地黃連黃芩防風荆芥連翹梔子紅花
赤芍等以化其毒重者加元參茜草石膏犀角○又夾
濕瘡而出濃水流注者滑石末敷之以防洩氣或菘豆
粉敷如有夾水瘡及頭上腊梨者皆濕瘡類也腊
梨可以棉紙糊之痘落痂而此亦落最妙法

薄也措硃砂於首尾雜痘一齊湧出用硃砂一兩同油
白蠟生薑汁雄黃熬從頭至尾

身一搭雜痘盡出正痘即現○或用柳葉艾葉及前揚
枝等浴法○按解毒奇方未出者不出已見苗者出亦
稀若陷沒者立時即起用川芎當歸升麻生甘草各六
兩先熬去渣將硃砂一兩絹袋裹之懸空入藥水收乾
聽用此製硃砂法甚良可參又化毒黃蠟丸用硃砂
五兩爲君加生地當歸各一兩人參犀角各五錢川連
黃栢荆穗葛根生甘草各四錢白朮八錢牛蒡子連翹
各七錢升麻二錢牛黃一錢五分右切片將硃砂打如
菜豆大絹袋裝縫以水十碗酒二碗同藥入砂鍋內文
武火煮之只剩一碗汁爲度搥淨拌硃砂曬乾爲末以
豬心血調糊爲丸每丸乾重五分凡痘初出即用薄荷
湯調一丸用痘即減少輕快神效原云此方用硃砂
仍用補氣和血解毒快功甚大加紫草茸一兩尤妙
心安神解週身之毒其功甚大加紫草茸一兩尤妙
并治痘癰痘疔倒屬倒發始終痘痛毒甚危急之症
一用硃砂牛黃加冰片麝香用豬尾血丸亦可參

白鴿覆其胸斯粒自起
無白鴿用前雄雞方全皆補
正拔毒之法治痲亦用白鴿包

老蟆對其口斯漿自生
痘不起漿癩團包其身爪以
口對兒口離三寸許吸其毒大

而虛軟盜氣之賊血泡銀硃同木鼈子摩

賊痘顆粒獨大按之虛軟

根脚不腫先起先灌盜正痘之氣血者也

過三日或變

成水泡血泡甚則紫泡黑泡宜銀針挑破塗油胭脂

賊痘微有漿色水泡則全是水亦宜挑破或塗油胭脂

或以芫荽酒調宮粉塗之遲則潰塌又有血泡乃血

熱毒熾不能運化成漿也熱甚則紫微熱則赤宜涼血

解毒用生地赤芍丹皮黃芩白芷紅花牛子紫草之類

凡白泡血泡木鼈子磨銀硃塗之自消。按發泡者

肺火發而皮毛受傷并其膚間津液遂發而為泡也白

而空者氣虛清水者肺實紅紫者血熱也皆內毒未出

而賊邪先為之病宜內託以行血氣則正痘自長泡隨

發隨收皮脫見肉不治。莊在田曰徧身血泡者非血

熱乃氣少不能統血故血妄行宜大補元煎使陽氣充

滿血泡變白而成功矣勿誤用寒涼致成血陷此亦不可不察

脹而乾硬閉毒之苗舌

疔銅綠和人中白擦疔中有紫黑乾硬暴脹獨大脚無

之爛苗也能閉諸毒未齊有疔則痘不出既齊有疔則

不起膿行漿有疔則必倒陷宜銀針挑破吸盡惡血以

拔疔散敷之卽明雄黃二錢棉胭脂五錢浸汁也一如
紫草又京城油胭脂甚妙如挑不動捏之有核則疔
已成須割開四邊鉗出其疔否則深陷穿筋透髓而爛
見骨可畏也又外無疔而內有核作痛者亦疔疔發
燒之凡疔以銅錢眼合疔上再燒則準又有似瘰癧發
無定處者以手撮起紅線縛定艾燒○治疔四聖膏珍
珠豌豆髮灰冰片等分油胭脂和膏挑後填之卽紅活
會通加雄黃紫草茸去胭脂亦治黑痘又脚心痘爲注
疔痘亦剔破塗四聖膏又拔疔丹珍珠一錢牛黃巴
霜鉄將軍各五分蟾酥三分麝二分油調塗○凡天庭
有黑點心窩舌上必有疔地角有黑點陰處必有疔兩
頰有黑點兩腋必有疔準頭有黑點四肢必有疔卽顯
可以知隱舌有疔銅綠人中白加雄黃銀硃砂
研擦油胭脂亦妙○按入門云頭面上忽生三五個或
止一個高大紫黑儼似疔痘者名曰飛痘此癢則點以
最輕或只此一痘再不生痘此亦不可不知癢則點以
荆芥其後必成灰白癢塌如見有數點卽挑去急補氣
血○痘宜痛不宜癢○癢用荆芥穗末捲紙燃燒之擦
去灰快手指定癢痘一點卽止或用荆芥茶葉捲紙燃

燒照亦止否則防塌矣。附方用川椒艾葉紅棗肉芫

萎茵陳乳香白芷梢陳香鬪安息香末作紙懸熏照雖

癢塌之痘火到癢除無安息亦可此神燈照法也。或

用鹽和百草霜炒燒烟熏或蜜水拭或滑石敷抓破者

松毛陷則拭以升麻白而變灰血不足也黑陷者由紫

而變黑血太過也血陷者由血泡無漿而變為陷也。

化毒宜用升麻紫草甘草糯米。黑陷不起升麻煎濃

湯入胭脂十餘張浸揉取紅汁加明雄末錢許即用烟

脂棉蘸湯拭瘡上活血散毒甚妙。附方珍珠琥珀明

雄漂硃砂香附川山甲雄鼠糞各一錢蟻蝮三分人乳

浸研共為丸如毒盛者用一丸入前湯拭。又黑陷心

煩氣喘安語見鬼者用不落水猪心血和冰片。空倉

悶痘水安息貼。河陷乾收柴歸標杯葱酒煎蒸。空倉

合填紫草破用麻油膏加紫草末填之自成膿可結癩

漏孔且塞松花也。漏孔者漿成而漏元氣虧而肌肉不固

松花研末塞之外治聖藥。有小孔宜補氣健脾固表

名漏漿散用人參兔絲子查肉黃耆歸身桑皮川芎白

芷之類 煎漿時成片作爛濃水不乾者宜用敗
草散卽壇頭上陳稻草燒灰敷之此漏漿痘也 醫未

結而勢爛牛糞之散收之 痘破爛不屬陳乾牛糞燒存
取白色者敷名白籠散或鋪

床上令兒臥之。附方川連黃柏地骨皮五倍子甘草
共末搽之此方會通名生肌散 又痘破爛身無完膚

茶葉去梗滾水一燂卽撈起濕鋪牀上蓋草紙令兒臥
之一夜膿乾或芭蕉葉亦可 痘瘡斑爛煩痛或臭爛

深坑不收口用苾硝爲末調猪胆汁塗之 多年墻屋
上敗稻草燒灰摻 新瓦搗粉摻如乾痂堆積內有瘡

膿用鴨蛋清調敷 痘後翻疤腫爛象牙末珍珠末各
三錢炒殭蠶兒茶各二錢調胭脂膏敷 又痘疤橫痃

并治下疳一切墻上白螺殼煨研一兩橄欖核煨研石
膏各二錢每藥二錢加水片一分麻油調塗。按痘毒

出盛表虛難鑿以致肌肉壞爛名曰斑爛如偏身
臭爛如餅搭目中無神者死 醫落白無血者死 痂已

落而痕乾蜂蜜之油潤之 如痂落乾燥用白蜜半中入
之乾硬而痛者猪油潤之或用麩店灼油釀子油 咳

亦可。滅癍散羊骨髓輕粉煉塗 蜆水洗陀僧搽 咳

嗽

亦

方見嘔噦之兆也嘔吐瀉無妨出後忌。嘔噦者毒內攻
前註心熱去之脚心有痘勿用此方并治痘出色不紅
濁毒盛壅塞者。附方黃騰時欬逆胃氣上越也真淨
黃土鼻邊嗅之。白汗多則難貫膿收靨。血吐便溺未
黃連貝母牡蠣各五錢糯米粉一升撲之。或葦菜汁滴之
出齊鼻血無害但不宜甚耳髮灰吹之。或桑寄生同
凡血症皆可用。又痘時單用黑山梔亦可或酌用他
黑山梔搗敷臍如無寄生單用黑山梔亦可或酌用他
血藥代之。起脹時便血既下漏安能起脹用地榆
生大黃紅花根調勻敷尾脊骨三炷香一換換三次即
止如夾斑疹用前斑疹方。尿血不治膀胱根於腎此
經見血腎水被火耗絕且血與尿不同血凍眼應早護
而尿不凍也。凡血見黑不治眼耳血不治眼應早護
免痘入眼牛蒡子搗爛數頤門痘不入眼出痘眼目紅
腫雞蛋清塗黃紙貼之。或銀花膏敷。或黃豆嚼敷。或黃
柏浸濕鋪眼胞。或胭脂汁。人乳點。眼中出痘象牙磨
水點痘自退。可免瞎。或加雄黃明礬。或用麥冬貼足心
痘自散。屢試如神。喉中有痘亦可用。眼有膿血。鬼子

糞油調搽 護眼膏黃栢紅花菜豆甘草爲末臍脂水

調敷眼之左右痘不入眼 初起發熱風火透於皮膚

眼閉不開內結痘瘡者用益母草白菊花夏枯草防風

荆芥穗白芷甘草七味煎湯燻洗口三次更用鱈魚血

點之不生蘿蔔花痘後餘毒鬱結 鼻亦兼吹 舌與鼻孔

赤腫努翳亦用此洗切忌點藥

老土磚共爲末吹或青布燒灰吹或礪砂檀香燒枯研

吹或皂角末吹再用黃蠟塞鼻○附舌痘方人中白焙

兒茶礪砂末糝或金塗塗或黃栢黃連元參苦參末游

蜜調塗或鴨糞燒研鴨毛糝 凡糝須先茶洗之

之以涎 喉中有痘用前藥蚰蚘方○喉痛壁蟾蜍窠鹽炒吹

恐毒結於喉宜用山豆根元參桔梗甘草生地川芎 嘔

歸尾木通潤之前喉症又有咽脂擦耳背法可以參 嘔

之以鴨 腎嘴有痘公鴨嘔氣即消○附方出痘腎腫桑

薰敷之如風腫者槐花葉同鹽炒敷○女子若腎紅腫青

陰內有痘雄黃末清油調勻以鴨毛蘸擦之 納棟根而

蚰下 吐蚰者以苦棟根納肛門或鋪柳葉而蛆化 痘爛

鋪柳葉卧 莊云此陽氣不足之故大補氣血則膿乾

而蛆自化矣亦是一理 或用鹽醋湯噴之○痘後毒

蝕疔瘡膿水不絕出蛾蠶繭填生 喉啞者抹以油 痘後

礬末燒令汁盡成灰為末摻之 喉啞者抹以油 痘後

葱薑清油炒熱徧身抹之再用燈火 腹脹者敷以餅後

喉下一點胸膈一點兩乳下一點 腹脹者敷以餅後

肚腹腫脹燈花數十朵入鹽炒過加鉛粉調餅貼臍上

一用黃栢苦參為末清油熬膏貼之 一方桐子葉

泡軟用清油雄黃塗葉上貼之○又感濕足腫者以水

洗之更腫用蒼木檀香燒熏以被蒙蓋令出濕氣其腫

自退 腫屬虛弱而氣不行 雜症盡退 詳痘餘毒更清

者以肉桂燒酒磨搽即愈 雜症盡退 詳痘餘毒更清

疎則無毒密則有毒宜涼解免害眼痘毒攻脾則泄瀉

浮腫攻肝則眼生翳膜攻腎則耳痛膿出攻肺則咳嗽

痰盛○痘後餘毒用桔梗一兩連翹元參各六錢生地

赤苓牛子炒各五錢煨硝犀角甘草各一錢雄黃青黛

二錢末薄荷湯丸蜜調餅敷胸○痘後餘毒乃起脹時
暗藏骨節間藥所不到一交收醫則毒見矣兩膝及手
足骨節不宜見恐是對毒熱甚作渴者重不熱不渴者
輕 董氏三豆漿敷痘毒聖藥赤豆黑豆綠豆研爛加

醋入鍋炒熱作餅貼半日冷換如口內生嚼貼不加醋
更妙棗通去黑豆加碗豆黃豆各等分蜜水數可內消
或川公雞屎貼即愈 混池如金散雞蛋一個打破分
蛋白蛋黃爲二處以篩淨細黃上先將蛋黃和作一團
再將蛋白攤作一餅仍包成蛋式入灶內煨候烟盡爲
度勿焦共研細末如毒初起以雞清或醋和數即消潰
者乾糝虛人亦妙 痘毒硬腫馬齒莧白蜜和猪油熬
入赤豆菜豆調敷如痘後亦用馬齒莧搗爛敷不數
日拔出如十螺殼切勿挖割慢事 又解痘毒生疥癩
和飛麩搗敷 餘毒不收蠶繭與白礬煨灰加象皮敷
驅毒散即移毒散見下 痘後齒癢乃餘毒流於胃
經不治防成牙疳以連翹牛子慈菇生地銀花甘草紅
花石膏煎水頻嗽又痘後牙齦口舌破爛出血或成走
馬疳者人中白一錢銅綠一分半麝一分末濃茶洗後
敷或雄黃牛糞尖燒存加水片吹立愈餘見前 痘風
遠逢春卽發黃芩黃柏大黃黃丹輕粉共末猪油調敷
痘毒仙方大蚌一隻取肉黃泥封蝦至紅色取肉研
末油敷立愈 又獨羊糞象麻油調敷神 痘後回毒
膏麻油四兩木髓仁一個卽消并治一切熱毒 痲與痘
化黃丹二兩收貼一個卽消并治一切熱毒 痲與痘
車論詳文

同亦與痘異

候噴熱傳染而成先動於陽復歸於陰靚

其將出未出之際必咳嗽噴嚏鼻涕故曰肺病始以發

散出盡爲貴終以寒涼清火爲事雖標已三日而下身

無麻氣喘煩躁發悶不安者尚宜重加發散用麻黃升

麻羌活川芎之類麻出而氣自平矣大抵欲出已出之

際雖寒勿用桂枝雖虛勿用參朮雖嘔而有痰勿用半

夏南星此症多泄瀉陽明之毒亦從下解切忌止瀉但

用升麻黃連甘草葛根自止麻後痢亦全麻始終惟用

清涼多以芩連地芍收功古云麻疹無補法。發熱三

日始出一日出三偏三日出九偏至六日出盡及出至

足頭面將收熱亦漸退至八九日收齊熱乃退盡大熱

未退不可與食始終避風爲要麻重者偏身繃脹眼亦

封閉其色赤白微黃不同仍要紅活最怕黑陷麻不出

而喘破其筋療悶沙挑破頭開其毛竅麻疹宜常以葱

者死破其筋療上紅筋紅療開其毛竅白湯抹之使毛

竅中常微汗圓莖是透疹聖藥水酒各

潤澤則易透同莖之酒試噴半煎噴身上勿噴頭面亦

忌夜噴以疹日出而夜敏發疹者用西

也非治痘惟起脹後勿用河柳之湯足浴河柳煎浴小

兒不任升葛發散者尤妙或用紫蘇同。按初發熱可用西河柳同連翹乾葛防風薄荷前胡桔梗牛子蟬蛻甘草淡竹葉麻隨出隨沒可用西河柳同麻黃荆芥防風牛子薄荷連翹甘草淡竹葉角刺麻已出復回頭面稀少發熱神昏至五六日不可再大表須解毒內消可用西河柳陳者更妙同荆芥防風桑皮牛子黃芩黃連浙貝地骨皮甘草麻子已退音啞發瘡肺火未清可用西河柳同麻黃天花粉桔梗杏仁瓜萸桑皮黃芩百部麻後胃火不清可用西河柳同元參桔梗石斛熟石膏黃連黃栢牛子荆芥生地花粉甘草連翹等

熏仰天之皮塗護火之草

陸方痲症用仰天皮卽陰濕地下苦蘚嫩柳皮各半斤星

星草四兩蟬蛻二百個水十碗煎三沸去滓乘熱氣熏洗遍體黑疹變爲鮮色十有九生之妙。穢觸不出用沈香檀香木香燒烟熏之。治癩疹久不瘥或先心腹痛痰噦麻痺及筋脈不仁用護花草鹽生薑連皮研塗甚處餘處自消無護火草亦可按癩疹者疹出多癢色紅赤隱於皮膚乃心火灼肺外受風濕而成。附方瘡垂用桃葉浸鹽櫛擦。○疹後患痘者豆也。見醫書又痘牙疳及痢疾癆症者隨症施治。

故治之以豆

三豆方見前 聖藥

凡皮肉紅腫而痘不腫者用三豆

按赤豆黑豆菜豆為疫痘

疹如粟米

麻者麻也 疹如麻子

故治之

醋調掃神效

又痘毒等

卽用豆渣掃思慮亦良

附方羊毛疹眼目黃色指甲多

以麻頭面起死回生

紫色用燒酒搏黃

皆大人之常有

土慢揉擦心口

孕婦出痘腹痛胎動用益母草蓮蓬殼俱燒

抹周身

存性艾葉共末醋調敷臍連換三次胎自安或胎欲下

及死胎不下蟻螂連所推泥一并焙末加靈仙研酒調

數臍下并治經閉不通

川芎條芩防風陳皮荆芥生甘草紫草茸赤芍柴胡白

芷乾葛砂仁糯米阿膠熬此方可敷臍大熱加鬱金荷

芾野麻根甜瓜蒂一

枝○後生出痘見前

非小兒之獨然

附治痘神方不論

用之黨參二兩白芍一兩元參白朮各八錢茯苓五錢

陳皮生甘草神麩各三錢柴胡查肉各三錢蟬蛻一錢

黃連五分水丸用

又治疹方不論初出及已出透皆

可用熟石膏二兩乾葛歸身桑皮各一兩地骨皮荆穗

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

又治疹方不論初出及已出透皆

各八錢枳殼炒六錢牛子炒陳皮川貝赤芍薄荷各五錢生甘草四錢紅花三錢桔梗一錢水丸用一方去桑皮加前胡一兩黃芩防風各八錢連翹五錢全二方可以預合備濟故存之或煎浴或調敷俱可臨症斟酌

當作傷寒並視勿與諸瘡其論

按古云痘疹傳變與傷寒同大症也亦險症也

自有種痘之法而險者悉化為平然當疫痘盛行不能預種往往有不免者且有一家數日而死數兒者是可憫也余既輯傷寒外治方故於此症亦博采之并與內治諸方相證明以爲痘科之一助而卽爲傷寒篇之終云

至於潰癰拔疔續筋接骨亦見全文姑從省筆

按心肝肺

脾腎胃大小腸三焦皆有生癰之症名爲內癰初起嚼黃豆試之不醒者是用五神膏卽杏仁一兩元參五錢蛇蛻蜂房亂髮各二錢牛油丹熬者或加大黃皂刺貼臍取瀉腸癰六一散敷縮脚腸癰梅花點舌丹敷臍癰平胃散加黃連敷胃癰吐盡膿血自愈不必治肝癰照腸癰治○癰疽名詳見外科書凡毒小而頭者疔也疔大而無頭者癰也欲驗頭以濕紙覆之先乾處是死或疔皮貼之卽有頭出癰與疽別陰滯於陽發癰大而

高起屬六腑陽也易治陽滯於陰發疽平而內發屬五
藏陰也難治癰則紅腫熱痛疽皆皮色不變然亦有
腫痛堅柔之分如其初起疼痛者可消若重按不痛而
堅者毒根深固不易消也陰疽詳王全生○諸癰初起
以疎託解毒爲主忌熱藥既潰以補託元氣爲主忌冷
藥諸疽初起毒陷陰分宜陽和開其腠理既潰陰血乾
枯宜溫補厚其膿漿然通腠與滋補當兼用之若半陰
半陽症宜託裏以轉陽用藥清不傷胃溫不助邪可也
沖和清涼陽和諸膏已見○凡外症試腫法以手按之
腫而痛者爲實邪漫腫不痛者爲虛邪又腫而赤者爲
熱腫而不赤爲留氣停痰又實痛者熱若虛而癢者寒
也試膿法手掩腫熱軟而卽復者有膿不熱強而不
復者無膿按之堅硬者未膿半軟半硬者已膿也小按
節痛膿淺重按方痛膿深又深按之而速起者內是稀
黃水深按之而緩起者內是壞汚膿按之實而痛甚者
內必是血按之虛而不痛者內必是氣薄皮剝起者膿
淺皮色不變不高阜者其膿必稠大抵癰疽瘡瘍先宜
出黃白稠膿次宜出桃花膿再宜流淡紅水詳人宜膿
多瘦人宜膿少若胖人膿少是肉不腐瘦人膿多是肉
敗壞皆非吉也又氣實者多稠黃膿氣虛者多稀白膿

半虛半實者多稠白膿又有膿出如粉漿如污水者謂
之敗漿難治膿出而身猶大熱者亦難治。附載諸法
以備用。○護心法雄黃明礬硃砂琥珀遠志乳香甘草
象豆粉同癩團搗敷胸。○止痛法槐白皮煎膏敷或加
當歸乳香對口痛不可忍百藥不效吳萸雄黃油熬
塗止痛札藥如魚肚癩等草麻肉搗敷布扎止卽去
之遲恐有後患。○收爛法發背潰爛不堪只隔一膜者
鯽魚破腹去雜以山羊屎入魚腹炙研加麝一錢乾糝
效并治諸爛及反花瘡名山蓮散又雞肫皮同棉花
焙末搽。脇疔見藏者山荳根水調塗入麻根末尤佳
○脫腐法凡腐肉黑暗死肌堅硬臭穢難聞者生枯白
礬各三錢雄黃一錢乳香沒藥各二錢糝腐肉自脫離
如恐痛先以黃丹二兩石膏八兩共研團護好肉再糝
作擦亦可去管。○化管法三仙丹加硃砂三錢礬砂一
錢紙撚打入管名五虎丹或加蟾酥卽金蟾化管丸之
意。凡鷲毛管鹿角屑或蓑衣蟲或大蒜便煨灰糝皆
能化管。鷲甲末炒麻油敷功稍遲。京城礬砂膏亦可貼
如止久漏用蜂房山甲龍骨麝香。取多骨法凡瘡口
日久不斂內有多骨也陀僧末日搽能推骨出。蟻
同乾薑炙研吹治骨槽風及多骨疽能推骨出。按無

蟻蠅或用蠟蛻亦可出 又烏雞骨人言鹽泥固濟煨

研納之或去人言加砧板鍋蓋上垢屑燒灰搽 又蝦

蟄髮團猪油熬膏先用桑根皮黑豆煎洗龍骨末擦瘡

四畔令易收斂然後貼之。軟肛法凡毒開刀後翻花

起肛用癩剛破腹刺孔覆之可軟牛蒡子草紫花地丁

搗爛塗肛內亦軟。收努法因擠膿太過努肉不收者

枯熱地一兩烏梅炭三錢參貼自收 癰疽努肉生附

子濃醋煎洗丁香敷。拔毒根法烏梅一錢輕粉五分

加津唾研膏貼或單用烏梅燒灰敷根落止 疔根用

銀簪刺破將水中鐵釘上鏽或加青鹽牡蠣研塗孔內

膏益并收紅絲人心腹。塞漏孔法漂黃丹枯礬赤脂

冰片末塞或搽紙捻插入又搽藥插竅用童便煨蘆甘

石牡蠣龍骨陀僧二方亦可併用。搜膿法麝木香末

真輕粉各二錢飛丹枯礬各五錢雄猪膽汁拌勻曬乾

研未磁瓶收存聽用解毒去腐正為生肌之本若驟用

龍骨血結恐增腐爛也。疔是火毒凡有瘡起泡或痛

或癢或麻木或寒熱或先癢後痛或先寒後熱熱定則

寒或始末只癢皆是疔之候也有朝發夕死有隨發隨

死有遲久終死者其症至惡宜留心照看 凡瘡腫以

針刺之不痛無血者是疔如形長者名刀鍊疔不可針

又嚼生黃豆無腥者是疔又明疔易見暗疔難防取甌
中氣垢少許含口中覺一處痛甚卽知疔所在疔有
五色分屬五臟項以下者三陰受毒宜灸忌風藥散紅
絲宜割斷○內疔與外疔同寒熱頭痛體痛但瘡形不
見過數日胸背腹脇頭面手足間有一處甚腫卽內疔
所發處又腹痛甚者亦是內疔○困疔法初起水泡不
知弄破其毒牽引經絡隨脉腫去增寒壯熱久則惡心
不治殺人槐子炒黃平對陳石灰末雞子清調圈至破
處令毒仍從舊口出○點疔法土炒山甲一錢銀珠五
分麝三釐點疔化水毒不入心又珠砂雄黃火硝礞砂
青鹽礪砂膽礬等分點全名七聖散或加蟾肝丸○起
疔法疔瘡危急欲死蟬蛻蠶末酸醋塗四畔留口根
出稍長拔之塗藥○急救走黃法白梅乾肉醃荔枝肉
加銀珠少許共搗爛糖難矢拌勻留頭敷效無白梅用
烏梅肉此味能拔疔根○簡便方用巴豆或葶麻飯丸
或香肥皂銀珠白蜡搗丸納之膏蓋○瘰癧等俱見篇
中○接骨
續筋見下

凡若此者觀症識名觀方悟法傷寒雜病自

昔爲昭

仲景

帶下小兒隨俗而變

扁鵲

有膏有藥或貼或敷

外治均通內治古人不欺今人是堪悉數豈曰無稽上以
徵引古方首舉傷寒者傷寒外治別於諸醫家書一篇
所重在此遞及中風以至六淫爲一段臟腑醫之本特
爲一段身體承臟腑合爲一段痘疹承兒科列之末段以
於內也婦科兒科各爲一段痘疹承兒科列之末段以
與傷寒首尾相應傷傷不別爲段落者二科向皆外治
於此篇意非所重且傷寒痘症均載遺毒風氣亦兼破
傷筋骨後文更有諸方故此作省筆焉共分六段每段
各錄數症每症各采數方數方各具一法虛實寒熱分
別敘次稍加論斷并於裁對中寓伸縮變化以爲一段
之小結構合六段則爲一大結構字句皆令承接先後
詳略均有意在彼此要可以互相參證雖曰六段不過
一段也此非鈔方乃論外治用藥之道不能悉虛掉筆
特借古方以爲鑒使人知此說之確有依據而可行耳
引方以實吾說故不覺其汗漫也至于擇不精而語不
詳則限於天資才力無如何也方之佳者不論內外症
雜取數條補於註內以備參考症項碎者亦如之不入
於文者以行文亦宜有律也此以上徵引古方之大意
也以下則言今推之以爲膏而有製藥施治之法也

夫說醉梅而涎出想懸崖而足酸情之造於虛者其境

不能窮也

壽世新編引釋家語云情想所結自無之有故病境無窮盡也

而用雞頭

以己瘻取斲木以愈齩理之徵於實者其類有可推也

淮南子狸頭愈鼠雞頭已瘻瘋散積血斲木愈齩此類之推者也

爰廣醫不著書之例

別開藥能療病之端一變湯頭以爲膏子匪醫而醫不

藥之藥以膏爲主以藥爲輔

膏與藥是一是二向只外科加藥內科未明對症發

藥之理呆膏活病宜乎其不應也今特分而析之以熬而攤貼者爲膏膏一成不易研而糝於膏中敷於膏外者爲藥藥隨時消息示人以呆方活用之法也諸科皆然工拙仍在乎人功力之淺深耳考神農本

草之經究雷公炮炙之論造化無言而精英自獻古今

未道而祕要堪搜

補外臺祕要字

天取其氣如春風散之吹喉

閉也

春風散治癰喉風喉閉及乳蛾重舌木舌等神方

黃連薄荷蠶明礬火硝各五錢用猪膽五六個

一尺以竹紙橫懸此膽在內蓋以木板用土填實至立

春日氣至取出風乾去膽皮青紙研細密收加水片吹

即葭灰候氣之法也名春風散者以得春風溫和之氣

也此法古人亦常用不獨喉症爲然博覽者自知○

按日曬夜露亦是取氣之法又有用朝陽東壁土者亦

取其得氣之早且有生氣也最奇者太陽太陰二丸用

水和麩於日月蝕時對日月搓丸以丸之中心亦闕爲

驗此非通於天地萬物之理者烏能知之○西醫有收

電氣法治風痛者亦外治也足知精於外治可奪造化

地取其理如急流沙之數催生也食物本草催生用急

腹上先下墊葱白再敷按用急流沙者取其速也又

如順流水順而下流取治下焦腰膝通利二便逆流水

逆而倒上取治痰飲發吐頭風咽喉之人取其神如雄

類亦有用地漿龜心土竈脚泥敷者

黃珠砂之縛於童女也古方治虛勞咳嗽吐血蒸熱者

但脈息有神無不效驗用雄黃

珠砂各一兩綿紙包固或單用珠砂亦可縛於鄉村壯
實童女臍上周時取下縛於自己臍上渴飲人乳渴止
去藥此亦以人補人之法然神存於無形與邪術迥別

又有以珠砂令壯實婦人懷之然後合藥者又有以

藥丸佩於身上時時摩之云得人神氣者物取其性如草麻乳香之通乎內

外也膏藥第一欲其能達忠處耳古言草麻能拔病

氣出外乳香能引藥氣入內木髓仁能追病源金鳳草
能透骨節皆膏藥中必須之藥此即內科之用引也舉

此亦可以配五神於午日以擇吉也見前截瘡方又
知餘矣如合蟾蜍丸造六

神龜之類皆是獻北斗於先夜以鎮邪也亦見前
截瘡方采於四時而

芳香之氣始備十葉散用荅葉荷葉蕉葉菊葉銀花葉
蘇葉柳葉槐葉冬桑葉天名精葉風乾

所吹治喉症亦敷一切火毒分四時采取○又百草膏
隨時取田野白問不拘何草芳香者為佳麻油熬黃丹

收可貼百病又水鼓腫脹者取山野百草辛香者煎
濃湯二三鍋大盆盛之單被遮蓋避風熏洗亦可熬膏

理瀾駢文

卷

貼合以五行而中和之體乃成又沖和膏配五行見前○

疾可熬膏貼甲巳年甘草爲君屬土乙庚年黃芩爲君屬金丙辛年黃柏爲君屬水丁壬年梔子爲君屬木戌癸年黃連爲君屬火每用二兩值年倍之加大黃三兩麻油熬黃丹收入雄黃硃砂各五錢和勻臨用糝藥末貼一方加紫蘇香附各一兩○五行湯治赤眼用黃柏末濕紙包泥裏火煨棉包浸水盞內飯鍋上蒸熟熱洗此合五行又是一法○按醫雖小道其本出於聖帝賢臣之所爲漢唐以來闢述者皆當代之名儒碩學固不得僅目爲賤工之事也繼其所製外治之方往往視內治尤奇而闢凡造化盈虧之理男女感應之情與夫格物致知之功俱見於是蓋治在外則無所窒碍故得以肆其才也外治爲能盡醫之變者此也自後人視此道爲營生之具但取常用之湯頭以爲酬應而外治一法遂廢而不講矣或用之不得其道概以爲無驗而置之矣此段爲上智者說法陳義稍高亦以古今人未必不相及也然而以藥物既具療治斯起以上製藥於下施治於是稽

爲迂遠者多矣

六經之屬

傷寒中風雜症皆有六經見症外科亦然古

傷寒中風分經見前 痧症指微云 痧症各有十二

經所屬不可不知 腰背頸項連及風府 脹痛難忍屬足

太陽膀胱經 兩目紅赤如桃唇乾鼻燥腹中絞痛屬足

陽明胃經 脅助腫脹痛連兩耳屬足 少陽膽經 腹脹板

痛四肢無力不能屈伸泄瀉不已屬足 太陰脾經 痛連

腰以及外腎小腹脹硬屬足 少陰腎經 心腹吊痛身重

難移作腫作脹屬足 厥陰肝經 半身疼痛麻木不仁左

足不能屈伸屬手 太陽小腸經 半身腫痛俯仰俱廢右

足不能屈伸屬手 陽明大腸經 咳嗽聲啞氣逆發噎屬

手 太陰肺經 病重昏沈或狂言亂語不省人事屬手 少

陰心經 或醒或昧或獨語一二句屬手 厥陰心包絡經

胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極屬手 少陽三焦經 痧

症分經醫書鮮見 故特詳之 餘不備載 外科須觀

鑑本 治癰疽法 陽明多氣多血 太陽厥陰多血 少氣

少陽少陰 太陰多氣少血 多者破之 行之少者託之 滋

之宜視氣血多少 以爲消補而已 辟瘟囊方用羌活

太陽大黃 陽明柴胡 少陽蒼朮 太陰細辛 少陰吳黃 厥

陰共研細末 絳囊盛之 佩於胸前 卽羌活湯治四時傷

里音片之二

寒藥備六經法也又治衄火在胃水紙搭鼻衝陽明脈
俠鼻也火在膀胱涼水拊頸後太陽脈經頭項也火在
包絡色線扎中指中按經用藥之道做此推又按四
方一合一分凡外治按經用藥之道做此推又按四
時傷寒麻黃去節四兩太陽柴胡一兩少陽升麻一兩
陽明加黨參當歸各一兩赤芍甘草各四兩殊砂雄黃
各一兩五錢春夏加石膏枳實秋冬加桂枝細辛各五
錢石膏或重用亦可此方油熬丹收貼亦能發汗傷寒
汗後變為雜症亦可用徵五氣之應鼻五藏蘊其精氣
乾霍亂並妙亦以汗解徵五氣之應鼻五藏蘊其精氣
面形五色五氣即風寒暑濕燥也詳鑑本又五藏
之氣見前當議臟腑註并與中庭各部註參看○此句
言相其面以下分苗竅舌齒審其苗竅五藏病不可見
周身相之即四脰中之望也審其苗竅驗之苗竅見前
臟腑註○又夏禹鑄有審小兒苗竅法舌爲心苗紅
紫心熱也腫痛心火盛淡白虛也鼻準與牙牀乃脾之
竅鼻紅燥脾熱也慘黃脾敗也牙牀紅腫熱也破爛胃
火也唇乃脾之竅紅紫熱也淡白虛也黑者脾將絕也
口右扯肝風也左扯脾之疾也鼻爲肺竅乾燥熱也流
涕涕寒也耳與齒乃腎之竅耳鳴氣不和也耳流膿腎

熱也齒如黃豆腎氣絕也目乃肝之竅勇視而睛轉者
風也直視而睛不轉者肝氣將絕也以目分言之又屬
五藏之竅黑珠屬肝純見黃色凶證也白珠屬肺色青
肝風傷肺也淡黃色脾有積滯也老黃色乃脾受濕也
瞳神屬腎無光彩又兼髮黃腎氣虛也目外角屬大腸
破爛肺有風也目內角屬小腸破爛心有熱也上胞屬
脾腫則脾傷也下胞屬胃青色胃有風也睡而露睛者
脾虛極也唇紅而吐胃熱也唇慘白而吐胃虛也唇色
平常而吐作傷胃論小便短黃澁痛心熱也清長而利
心虛也大腸祕結肺有火也肺無熱而便祕血枯也不
可攻下脫肛肺虛也口苦膽火也聞聲作驚肝虛也又
面有五色紅爲心熱青屬肝多腹痛黃爲傷脾白爲肺
病中寒也黑而無潤色腎氣敗也○按此不獨小兒爲
然○祕錄看小兒山根上有青筋直現者肝熱橫現者
亦肝熱但直者風上行橫者風下行有紅筋直現者心
熱斜現者亦心熱有黃筋現於山根或皮色黃不論橫
直皆屬脾胃吐瀉諸症○又在鼻上眼之中間中正精
明穴辨之色紫心肺俱熱也白者肺有痰也黑者風甚
或腎寒也 覘其舌齒 凡舌鮮紅滑濕爲吉燥澁爲凶青黑而
紫者爲陰寒赤而紫者爲陽熱純黑有

二症火極似水者熱極水來乘火者寒極。初起表症雖發熱津液如常口不燥渴若舌苔粗白漸厚而膩是寒邪入胃挾濁飲而欲化火也此時已不辨滋味矣宜半夏霍香迨厚膩而轉黃色邪已化火也用半夏黃芩若熱甚失治則變黑胃火甚也用半夏石膏若黑而燥裂則去半夏用石膏知母花粉之屬以潤之至厚苔漸退而舌底紅色者火灼水虧也用生地沙參麥冬以養之此表邪之傳裏者也其有脾胃虛寒者則舌白無苔而潤甚者連唇口面色俱萎白此或泄瀉或受濕脾無火力速宜黨參焦朮木香茯苓炙甘草乾薑大棗以振之虛甚欲脫者加附子肉桂若脾熱者舌中胎黃而薄宜黃芩心熱者舌尖必赤甚者起芒刺宜黃連麥冬竹心肝熱者舌邊赤或芒刺宜柴胡黑山梔其舌中苔厚而黃者胃微熱也用石膏知母花粉麥冬之屬若舌中苔厚而黑燥者胃大熱也必用石膏知母如連牙牀唇口俱黑則胃將蒸爛矣非石膏大黃生地二冬人中黃之屬不救此傷寒及時疫發斑疔中多有之再有舌黑而潤澤者腎虛也宜熟地山更川皮澤瀉之類若滿舌紅紫色而無苔者此名絳舌亦是腎虛宜二地二冬等更有病後絳舌如鏡發亮而光或舌底隘乾而不飲冷此

腎水虧極宜大熱地重藥等救其津液方不枯涸。葉
天士溫熱症有相舌相齒法今錄相齒齒為腎餘
為胃絡熱邪不燥胃津必耗腎液且二經之血必走其
地病深動血結於上陽血者色必紫紫如乾漆陰血
者色必黃黃如醬發陽血宜安胃陰血宜救腎齒光燥
如石胃熱甚枯骨色腎液枯若上半截潤水不上承心
火炎也咬牙者胃熱氣走其絡也若脈症衰胃虛無穀
以養榮也齒縫流清血痛者胃火衝激不痛者龍火內
燔齒垢如灰糕者胃津已涸濕用事也多死齒焦相其
無垢者亦死有垢腎熱胃劫也當清胃救腎為要相其
形者清明之府頭傾視深精神將奪矣背者胸之府背
曲肩隨府將壞矣股者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝
者筋之府屈伸不能行則樓俯筋將憊矣骨者髓之府
不能久立行則展掉骨將憊矣凡病人身輕自能動者
易治身重不能轉側者難治又凡病觀其形肉脫知脾
敗於內聆其聲五音按五臟見前天地萬物之所以屬
必死聆其聲註○經曰視喘息聽音聲而知所苦○
病人語聲啾啾然細而長者頭中病暗暗然不徹者心
暗間病寂寂然善驚呼者骨節間病○出言壯厲先輕

後重者外感邪實也。語言懶惰，先重後輕者，內傷元虛也。肺邪入心，爲譫言妄語。又或自言平生常事，或開目言人所未見事，或獨語或睡中喃喃，或呻吟不已，甚則狂言罵詈，皆胃熱乘心也。鄭聲者，語不接，積虛也。心下汨汨有聲，先渴後嘔，停水也。喉中漉漉有聲，痰也。腸如雷鳴，氣不和濕也。喜與笑，皆心火也。鴉聲氣將絕，直聲氣將散也。雜病發喘，癆瘵聲啞，久病發肥，危邪入於陰搏，則爲瘡，有喉有舌聲嘶者，喉破也。大驚不語者，敗血頑痰塞心。究其受病之何因，凡也。小兒驚風，口不能言，心熱也。病家問其病起何日，少爲新病，實症居多，日多爲久病。虛症寒症居多也。又問曾食何物傷何物，卽以何物治。又飲水水者多陰寒，食燒炙者多熱毒也。曾有怒勞房欲等事，怒則傷肝，勞則內傷，元氣房勞則傷腎也。又問初起何症，如初起頭疼發熱，是外感初起心腹疼痛，瀉痢等症，是內傷也。又問後變何病，如痢變瀉，變瘧，爲輕瘧，變痢，變瀉，爲重。先喘後脹者，病在肺，先瀉後喘者，病在脾。先渴後嘔者，爲停水，婦人先經水斷，而後浮腫者，先治血，先浮腫而後經水斷者，先治水也。又問今日口渴思飲，否口渴喜飲，爲熱不渴無熱，或

濕也。口難渴，不思飲。老人主津液少，若嗽水而不欲嚥。主蓄血，主陰極發躁也。又問喜熱喜冷，否喜熱內寒也。喜冷內熱也。又問口中有味，否口苦熱也。鹹寒也。甘脾熱也，淡胃熱也。陰虛有味，陽虛無味。又問胸寬，否不寬，有痰食積滯氣不行也。又問腹中有無痛處，否無痛病不在內，主虛有痛處，主食積痰血之類。有病處而手按之則減者，虛也。又問大小便如常，否凡病小便赤澀，大便祕結為熱，小便清白大便滑泄為寒。又大便秘者為實，若內外無熱症，則為陰結便閉，通者為虛。若內外無寒症，則為陽實熱利，小便紅者為熱，若平素淺紅淡黃屬陰虛，白者為寒。若平素白渾，加米泔者，則為濕熱所化也。又問足冷，暖否，足暖陽症，足冷陰症。乍冷乍煖，便結者，陽症大便如常者，虛也。又問平日勞逸，喜怒憂思，并喜食何物，勞則氣散，逸則氣滯，喜傷心，怒傷肝，憂傷肺，思傷脾，恐傷腎，喜饒厚味，則生痰，醉酒則發熱也。此問法也，猶未也。如咳嗽發熱瀉痢，諸病之總名也。一症中各有火有寒，有痰有氣，有虛有實，致病之原不同。如治咳嗽，問得有火症，即作火治。有寒有痰有氣，即作寒作痰作氣治。舍病名而究病原，良工之道也。○又摘要問法。一問寒熱，以察表裏。凡

病身熱脈緊頭疼體痛拘急無汗而且得於暫者必外
感也若無表證而身熱不解多屬內傷二問汗表邪
盛者必無汗有汗而身涼熱退者邪已去也有邪在經
而汗在皮毛者非眞汗也汗後邪雖少減未盡也不可
因汗而遂謂其無表邪也三問頭身問其頭可察上
下問其身可察表裏頭痛者邪居陽分身痛者邪在諸
經前後左右陰陽可辨有熱無熱內外可分但屬表邪
可散之而愈也四問便者前陰通膀胱之道可察氣
化之強弱凡患傷寒而小水利者以太陽之邪未劇卽
吉兆也後陰開大腸之門可察陽明之虛實凡大便熱
結而腹中堅滿者方屬有餘通之可也若新近得解而
不甚乾結或旬日不解而全無脹意者便非陽明實熱
不可攻下五問飲食者一可察胃口之清濁一可察
臟腑之陰陽病由外感而食不斷者知其邪未及臟而
惡食不惡食者可知病因內傷而食飲變常者辨其味
有喜惡而愛冷愛暖者可辨素欲溫熱者知陰臟之宜
煖素好寒冷者知陽臟之可清或口腹失節以致悞傷
而一時之權宜亦因以辨用藥卽由此可推○六問胸
中者欲辨其有邪無邪及宜補宜瀉也凡胸腹脹滿不
平可補而不脹不滿則不可攻此大法也然病與滿不

同當分輕重者脹塞中滿此實邪也不得不攻輕者
但欲食不知飢飽似脹非脹中空無物乃痞氣耳非
眞滿也此或邪陷胸中者有之或脾虛不運者有之病
者不知其辨但見胃氣不聞飲食不進問之亦曰飽悶
而實非眞有脹滿此在疑虛疑實之間非細察眞確不
可也七問耳聾耳爲腎竅宗脈所繫非惟可辨虛實抑
且可知死生尋常氣閉耳聾無足怪若因病而聾不可
不審○八問渴者察裏之寒熱而虛實亦因以辨凡大
渴喜冷而腹堅便秘結脈實氣壯者陽症口雖渴而喜熱
不喜冷非火證中寒可知何以渴水虧故耳又口無津
液則口乾勿作渴治又凡陽邪盛而眞陰又虛者不可
因其火盛喜冷便云實熱蓋其內水不足欲得外水以
濟之○九問精虧眞陰枯也可兼脈症察之○八條問中有
細小兒尤非問不可○按四診中問爲最確如不知
色脈大半可以此作準外治能問之詳細亦儘有把握
矣故全錄焉其中有未備者當於各症本門求之
者諸證治寡婦尼姑異於妻妾是脈理幽微○唐許氏語
達其性懷所致也兒爲啞科亦然

脈者先天之靈非心清氣定者不能察識醫者平時對
先天圖靜坐調息觀氣往來庶可默會據此則診脈
談何敢高談夫七診七診浮中沉上下左右也浮者輕
容易敢高談夫七診下指於皮毛之間探其腑脈表也
中者略重指於肌肉之間候其胃氣半表半裏也沈者
重指於筋骨之間察其藏脈裏也上者即上胸喉中是
也於寸內前一分取之左者即下少腹腰股膝脛中是
也於尺內後一分取之右者即左手也九候者每
部有浮中沈合爲九也○診法掌後高骨爲關關前曰
寸關後曰尺兩寸之脈主候上焦關中兩關之脈主候
中焦關中兩尺之脈主候下焦腹中空寸浮候胞絡沈
候心左關浮候膽沈候肝左尺浮候膀胱小腸沈候腎
右寸浮候胸中沈候肺右關浮候胃沈候脾右尺浮候
大腸沈候腎男女皆以尺脈爲根本關前一分左
爲人迎右爲氣口○六脈者浮沈遲數滑濇也浮者如
水漂木在肉上行也主表屬外感爲風虛動之候心肺
在上俱浮浮而散大者心浮而短濇者肺浮遲表寒浮
數表熱有力表實無力表虛沈者如石墜水底在肉下
行也主裏屬內傷爲濕爲實重濁在下之象陰逆陽鬱
之候肝腎俱沈半長者肝按之濡舉指來實者腎

痼冷沈數內熱有力裏實無力裏虛脈一息四五至爲
平和遲者一息三至也主寒爲陰盛陽虧之候或脾虛
或腎冷也浮遲表寒沈遲裏寒寸遲氣寒而縮尺遲血
寒而凝數者一息六至也主熱陽數君火陰數相火皆
數表熱沈數裏熱有力實火無力虛火滑者如珠走盤
往來流利也主吐爲血實氣壅之候血不勝於氣也滑
而收斂脈形清者血有餘滑而三五不調脈濁者痰滯
者如刀刮竹如雨沾沙遲細而短也主少血爲氣多血
少爲精血不足之候男子多傷精女子多傷血也濇而
堅大爲有實熱濇而虛軟虛火炎灼○六脈加細大爲
八要細者沈細而直且軟壘壘紫紫如線如蛛絲然主
氣少細尚有形可見微則模糊不可見 洪脈來盛去
衰如洪濤之鼓卽大脈鈎脈也爲脹爲血氣燔灼表裏
皆熱之候 按鑑云脈大者火也病得於內傷者陰虛
爲陽所乘當作陰虛治之○秘錄八要加虛實爲十脈虛脈
亦大當作邪勝治之○秘錄八要加虛實爲十脈虛脈
浮大遲軟無力虛者有表無裏也主氣血兩虧之候亦
爲暑若虛熱則生驚實脈悞悞長大而堅主熱三部皆
壯邪氣盛也○二十七脈者浮芤滑實弦緊洪爲七表
微沈緩瀉遲伏濡弱爲八裏長短虛促結代牢動細爲

九道又有數脈大脈散脈合爲二十七脈脈理須觀
鑑本及李瀕湖脈訣方能詳細景嵩厓四字訣於浮沈
遲數中觀其有力無力以別虛實最爲捷要學者先從
事於此再參以視錄十脈外兼任督二脈果能將十脈
辨得分明然後再講二十七脈可矣○四時平脈春弦
應肝木夏洪應心火秋毛一日浮曰瀦應肺金冬石一
曰沈應腎水四季月和緩而大應中央脾土凡脈以兼
和緩爲有胃氣所謂有神也只見弦洪毛石無胃氣者
爲眞臟脈凶○又代脈遲而中止不能自還且止有定
數主氣耗如十動而一代卽主一藏無氣惟婦人妊娠
見此非病又婦人腎脈微瀦與浮或肝脈沈急或尺脈
滑而瀦絕不勻者主經閉若滑而冲和主孕又三部浮
沈正等無他病而經停者孕經曰陰搏陽別謂之有子
搏伏而鼓也寸陽尺陰言尺陰搏指而動與寸陽迥別
主有子又心脈動甚胎已結滑數不散者胎三月但疾
不散者五月左疾爲男右疾爲女又妊娠七八月脈實
牢○兒未五歲看食指內側關紋男左女右第一節寅
位爲風關脈見易治第二節卯位爲氣關脈見爲病
第三節辰位爲命關脈見爲病危紋紫內熱紅爲傷寒

黃為傷脾青為驚白為疳積紅黃隱隱為平黑凶紋入
掌向中指者為內鈎順向大指者為外鈎逆透關射指
射甲者主脾氣大敗凶。推法以我左手握兒食指用
右手大姆指側面推之其紋愈推愈出察其三關形色
可辨表裏虛實寒熱最確紋浮病在表紋沈病在裏紅
而鮮艷者初傷於寒深紅則化熱矣淡紅者脾胃虛寒
先天不足也但須從命關推上風關切勿倒從風關推
上命關反透其關亦忌覆指而推以螺紋剋制肺金紋
必變色也慎之。牛歲以下小兒於額前眉端髮際之
間以名中食三指候之食指近髮為上名指近眉為下
中指為中三指皆熱外感於風鼻塞咳嗽三指皆冷外
感於寒內傷飲食發熱吐瀉食中二指熱主上熱下冷
名中二指熱主夾驚食指熱主食滯。五歲以上一指
取寸關尺三部六至為和平七八至為熱五至為寒
祕錄云凡小兒先看氣色後看脈脈亦只看數與不數
數甚則熱不數則寒數之中浮為風沈為寒遲者濕滯
者邪滑者痰有止歇者痛也如此而已若小兒脈亂身
熱汗出不食食即吐多為變蒸非病醫書有變蒸考亦
見彙精。婦人病多諱言而於孕尤甚一誤則兩命俱
傷小兒之病亦難測度古人著脈法於此等處却不可
里庸并之

玉清馬三
不講故外治不盡

形症昭著務細覈其六變

六變者表裏寒熱虛

實也凡人之病不外乎陰陽而陰陽之分總不離乎表裏寒熱虛實盡之察脈察此審症亦審此也醫書有六

變論平易方中亦載之○前有別部分之陰陽而知一當議臟腑註又本門均有見症

十二經循行之要

詳見鑑本十二經循行部分歌并註○手三陰從藏走手三陽從手走頭

足三陽從頭走足三陰從足走腹○請陽行外諸陰行裏四肢腹背皆如此○人之經絡三陽三陰分布一身

太陽少陰在身之後陽明太陰在身之前少陽厥陰在身之側○前四時日月註載十二經每日氣血所注已

見大略

定穴道之正伏而通八十一數主治之原

正伏正人伏人

也鍼法起於黃鐘九九八十一數膏藥卽鍼灸之變其正伏穴貼法相通詳見鑑本鍼灸門○前有身俞

及五藏要穴大

母犯所忌忌受其頭而偏於喉忌熏其

身而入於腹忌濯其足而驅於目

醫之道未求有功先求無過故先以所忌

所說為說按忌有醫忌藥忌日月人物之忌俱見醫書
○治頭等敷涼藥者防偏熱毒於喉治眼腫敷消藥
者防從四肢入腹丹毒產癰見前又東坡手錄目赤不
可與湯浴并忌用湯泡足湯驅體中熱併集於目喪明
必矣此三者皆外治之所忌三句統括三部可以例
推○按治頭風者忌用熱藥傷眼治湯火者須漸從
外圍入留中出氣又如治熱死者忌卧涼地凍死者忌
浴熱湯溺人不可倒提出水及火烘并勿令見火光見
則大笑不治縊人忌刀剪斷繩麗人無燈忌燈照有燈
忌吹息燈治服砒人不可令睡倒恐毒流四肢小兒驚
風抽搦勿抱緊恐筋攣成廢此種陰陽水火冷熱明暗
聚散動靜相反相恃之理倉卒最易疎忽苟不知而誤
犯之在醫者病家只以為命盡不復究其所由而其枉
多矣又如疔毒忌見火麻花則殺人瘋狗咬忌問鑼鼓
爆聲忌見蠶蛹茄子赤豆胡羊之類見則復發不救此
種尤理之不可曉者前人垂之以為戒非無故耳天下
之病萬變其所忌焉能盡悉略舉數端以見醫之難即
外治亦不可不慎不必藥物入口始候事也安得一博
物者而盡推之以為醫者之益乎能推外
治之所以害必能推外治之所以利矣
母蹈所誤誤

下火針則洩真氣誤燒艾炷則耗陰血誤習推拿則傷

筋骨

傷寒有誤汗誤下之文外治亦然○火針

禮拜者

誣醫書有

呪禁者僻

祝由之類

此種皆

得其正乾坤體其生

意

醫書有乾坤生意○乾坤一氣膏治諸風癱瘓濕痰

流注各樣惡瘡百般怪症男子夜夢婦人赤白帶下

男女精寒血冷不育並貼之當歸赤芍白芍白附子白

芷生地熟地炮甲木龍仁巴仁草麻仁三稜莪朮續斷

靈脂肉桂元參各一兩乳香沒藥各一兩二錢麝三錢

阿魏二兩香油熬黃丹收貼腎俞穴如遺精白帶貼丹

田水火占其既濟

水火既濟膏用麻油二十兩象皮三錢紅花三錢五分草麻仁二十粒五

錢錢二個蟾蛛六個頭髮一把紅丹八兩同入錫內用

槐枝搗熬一滾取起連錫放水缸內頓一時再熬如此

數十次成膏下乳香沒藥兒茶麝香各四分攪勻攤貼

治風氣跌打損傷夾棍腰痛爛瘡俱可○合下二句爲

用膏之義○此二句取乾坤水火四字以概諸膏

乾坤言其理水火言其法卽醫通於易之說也

十劑

發以宣通

腎藥以宣通爲首務

七方收於偶複

七方大小緩急奇偶複也膏藥取之

偶方複方爲多。此二句言選用古方爲膏之道古方精者俱在鑑本名醫方論及初庵集解諸書中豈

惟吹氣灸影憑虛而造奇

豆塞兒鼻不出令兒緊閉目一人以兩手掩兒兩耳一人

以一手掩兒無豆鼻孔對兒口用力一吹豆自落下

奇妙

小兒初生陰囊腫大名胎疝日久恐成木疝在一歲內可治午日以脚盆盛熱水安於中堂隨抱小兒

將陰囊放水內一浸再將小兒在於中間門檻上一擲

其陰囊之水印痕於檻將艾火在檻上濕印處灸二次

囊漸收毛養生云奇驗今人於端午日灸門檻以辟疫

氣亦全又千金灸癩法午日立日光下人影有癩處着

艾灸之口中念癩中蟲毛或我若欲治待日中三徧火

過添火再灸如此念三徧燒三次亦有効數方奇妙

苟能通之則何病之不可治哉灸檻灸影之法與前乳

癩灸碗之法皆灸之變者也凡灸能以此推可不慮其

傷陰血矣。附方。治晚令細想忘記事或作寃盜狀

驟驚嚇之立止此靈樞法也又昔人有臨試場患眼者

醫云眼易愈但恐患脫脚傷寒耳令以脚置大斗中并

理論駢文

專

點一燈於脚後視之患者心注於脚數日而眼愈乃悟
醫以此降其火言脫脚者僞也此亦憑虛造奇之法也

亦或蚊嚼蜚鍼假物以行巧昔名醫夏月治一痘不發
用兒空室中使蚊嚼其血

一夜毒解又治腫毒者用螞蝗置筆管中吸其毒名蜚
針法如血出不止以藕節上泥塗之即止如不見頭以

并泥搗之先乾者是頭○按此亦即仲景蠱蟲水蛭之
法推出故奇而不失其正即此可以開發心思○附方

○兒初生不啼勿斷臍帶捧貓置兒耳邊口咬貓耳令
大叫一聲兒即醒貓頭瓜須布包○病人尸厥不醒用

白雄雞置病人枕邊俟雞一啼病人眼自開可治○治
疔及蜈蚣咬用大蜘蛛放毒次吸之蜘蛛一見自奔赴

有二友驗過一云不痛一云須驟然一痛然皆愈○痛
風取黃丹與雄雞食之停取熱糞敷○此皆假物之法

也餘如蠅蚰蝮誘之以所欲如脾欲燥肺欲潤又治積
蠱等已見前者以所喜者誘之所惡者

攻之治假熱症以膽而蟲且騙通蟲聞甘則起聞酸則
止聞苦則定聞辣則

伏○治瘀血在胸不能飲食者炙肉令香置口邊引蟲
竇瘰而上胸自開名騙通法○又如髮瘰用香油煎香

澤置病人頭邊令氣入口鼻誘蟲出 又如蜈蚣入耳

又姓伺之蟲入耳偽寢勿動點燈引之 又胃口不開

葱椒醬等烹鰾魚令病人制之以所畏 詳見本草而鬼

嗅之可以開胃亦騙法也

還哀告 鬼崇灸膝眼四穴名鬼哭穴必四處着火鬼目

世服其通靈可以相參。附方治應聲蟲者讀醫書至

雷九則不應又白馬尿化血髓貝母治人面瘡又蛇畏

白芷故蛇咬用白芷塗亦畏蜈蚣故用蜈蚣焙末油糖

調塗蜈蚣畏雞故蜈蚣可用雞冠血雞矢塗全蝎畏蠅

牛故蝎咬用蝸牛塗魚畏鷹鷂故魚骨咬用鷓鴣屎塗

鷓鴣字搔癩爪捺鴨涎亦然又貓食鼠故貓涎治偷糞鼠

鼠咬猫毛治鼠癢又貓毛油塗猫屎井泥塗治偷糞鼠

症此從猫食鼠而推者也山甲治脚底蟻漏此從山甲

食蟻而推者也馬咬潰爛以打馬鞭或籠頭索燒灰搽

即愈毒入心者二方亦効又鬼忤塗雄黃雞血於面狐

媚佩麝香於身并抹桐油於陰處自絕皆是制之以所

畏舉此見例不獨可悟醫意并可識格致之理。按憑

虛造奇假物行巧誘以所欲制以所畏四句明用藥之

義吹氣灸影云云特引一方以爲外治之證耳故句中

用豈惟亦或且還等字以見講於未然如治哮喘者於

法非一端須推廣勿泥着也七八月間先以藥下之使冬時無熱可包妙辟瘟塗太

法也膏藥可以倣用○預防中風等見前

乙紫金之錠祛邪佩眞君七寶之丹太乙紫金錠治百病亦爲時疫神丹

喉症尤效卽山茨姑續隨子五倍子各二兩紅大戟一兩麝香三錢也加雄黃珠砂各五錢名玉樞丹再加麻

黃紫蘇香附蒼朮半夏木香山豆根丹參鬼箭細辛川烏滑石名赤金錠再加升麻吉梗廣藿香廣陳皮銀花

大黃名太乙救苦辟瘟丹可佩可塗按內府紺珠膏治癰疽腫毒流注頑癩風寒濕痺癩癧乳癰痰核血風

等瘡及頭痛牙疼腰腿痛等症悉驗麻油一斤用當歸木髓仁知母細辛白芷巴仁五倍子山茨姑紅芽大戟

續斷續隨子各一兩槐柳枝各二十八寸浸熬去渣另用松香十斤以槐柳桃桑枝芙蓉葉各五斤煎濃汁入

松香文火溶化下乳香沒藥血結各五錢雄黃四錢輕粉一錢麝香阿魏酌用和入膏內方巾用紫金錠藥

料是一法可推用○許眞君七寶如意丹絳囊盛之佩於胸前能辟邪如用油熬丹收貼治瘧疾心痛如神用

於胸前能辟邪如用油熬丹收貼治瘧疾心痛如神用

黨參川烏生附子紫苑當歸柴胡薑製厚樸苦桔梗吳
萸官桂木香檳榔赤芍皂角黃連川椒乾薑石薑蒲各
一兩巴仁五錢硃砂三錢此卽溫白丸加木香當歸續
榔生附子也亦治積聚癥瘕鼓脹痞塞腹痛痢疾等皆
妙可預合又溫白丸加羌活獨活防風卽萬病紫苑丸
又去劉法加三棱甘遂杏仁靈仙卽萬病感應丸也
按右方藥料全用加大黃各等分油丹熬入麝香一錢
攪勻貼亦妙○附方○凡疫時以赤豆菜豆置井中買
仲置水缸中常燒大黃蒼朮再煎蘇合丸於中庭加入
病家先塗雄黃或紫金錠於鼻與病人談男勿向其面
女勿坐其脚跟以避穢氣旣出紙撚取嚏家有病者以
蓋屋栢草勤熏病屋病愈後卽將汗衣入甑蒸過以免
再發并絕傳染○疫時預合藥施送如同仁堂辟瘟方
川大黃一兩二錢蒼朮檀香三奈雄黃硃砂甘松各一
兩川椒貫仲枳殼香龍骨虎骨各八錢苧蒲白芷各六錢
官桂五錢細辛丁香吳萸沈香各四錢其末絹包盛佩
辟邪解毒甚効○辟瘟線香蒼朮桃枝各十二斤香芷
三奈各八斤甘松大茴桂皮香附檀香枳殼各二斤烏
頭二斤白茯苓貫仲鬼箭各一斤雄黃雌黃各八兩榆
麩鼠用原云閉戶焚之令烟氣隨鼻息出入可以起沈

疴絕傳九卷瓜客乞丐獄囚皆可施濟凡蛇蟲毒氣
瘴氣六畜瘟疫皆可熏治○夏日大人小兒恐失其夜
間蓋被受寒瀉瀉高用薑蔥蒜各二兩木鼈仁五錢山甲
三錢油熬丹收六乳香沒藥各二錢半丁香五分攪攤
一張益臍睡卽元○預免瘧疾三伏日生薑半斤煎湯
熏洗腿灣兩脚○預免凍瘡午日薑蔥蒜洗擦脚手○
小兒初生三日內以手指蘸雞蛋清白腦後風門骨節
卽頸窩處卽按背脊骨逐節輕揉周而復始不可由下
擦上有黑毛出如髮愈揉愈出務令揉盡可以稀痘且
免驚風六七日再揉并揉前心手足心肩頭有窩處以
手平抬窩卽見按稀痘方甚多驗者甚少且恐因此以
爲不出誤事故不錄試於當然古方瘟疫初起以葛根
此方預免驚風却妙試於當然古方瘟疫初起以川芎試之
驗其腹中動否之類古人不諱言試慎之也今人自信
太深以試爲恥此所以不及古人也舉傷寒雜症二法
以概之而百病可推矣然擦生野芋以識傷寒真假貼
外治試法較內治尤穩

一枝梅以探諸病死生

試傷寒法以野芋頭擦背脊第
三骨節不覺痛癢者是卽以手

擦周身得汗解。探男婦刺久諸病生死名一枝梅用
硃砂靈脂雄黃各三錢銀珠一錢五分巴仁葶麻仁各
五錢麝香三分加油胭脂為膏捏小餅貼印堂一炷香
去之貼處紅腫飛散者生皮色不變者危遠客可以早
送回鄉亦一陰德此方蜜丸放眉心紙蓋可治瘰癧
疾。附方。小兒急驚諸藥不效以此探其生死雄黃
沒藥各一錢乳香五分麝香二分五釐吹少許入鼻淚出
可治或用皂角生半夏吹亦可有嚏則治無嚏不治
此以藥為試即治也。救於已然。前有誤用麻黃汗不止
與前測內景法異。救於已然。以病人頭髮浸水中方
○又用稍黃下利不止者用參朮薑草加炒糯米烏梅
肉陳壁土搗爛敷腹上。舉汗下二法以見例餘不備
載。循石室不應改用之文。石室祕錄云寒涼不應改用
溫熱攻發不應改用滋益此
補過之方抑亦立功之道也。按河間云如傷寒誤用
巴豆等熱藥下之而熱勢轉甚者更宜調胃承氣湯寒
藥下之又醫貫云凡外感皆作鬱看以逍遙散加減出
入無不獲效倘一服即愈少頃復發或類發而愈甚此
必下寒上熱之假症此湯不可復投當改用溫補之劑
陽虛四君加溫熱藥陰虛六味加溫熱藥據此二條知

古人用藥或寒或熱亦未能盡保其應手而無悞然病勢有遲速而藥以先入為主至改用他藥解救其先入之藥要不能去安危卽難自必令人人才力萬不及古人能無悞乎能如古人之解救乎膏藥異於湯藥差可改換防於復然如勞復食甲華陀病痊皆斷之戒華陀云

日內酒肉五辛油麪生冷醋滑房室皆斷之蓋防其復發也。按鼓腫宜嚴禁鹽醬醋一百二十日曾有忌至百日開鹽而復發不救者不可不慎吐血噎膈黃疸淋症亦宜忌鹽。有以巴豆治病者愈後謂病者曰巴豆性熱非得硝黃後遇熱必復發乃大泄之而愈用膏藥者亦宜知之。凡病根不除者均須防其復發。四句統用膏藥術日以精懷日以虛名日以高行日以謹惟之始終言

痛癢之相關匪趨營之是務以上言障症之用膏藥以下言膏之名義與膏之貼

法并以藥輔膏爲用之法法合內外症而皆備焉膏有名可采亦有義可尋大都

內不出太乙觀音霏雲金絲天竺五養萬全之素而外

不越清涼陽和神異石室奇效百應

一作五蹄

十香之常

乙太

膏原方大黃四兩元參生地當歸赤芍白芷官桂各二兩小磨麻油二斤熬黃丹十四兩收治婦月不行結塊作痛癰毒不論膿已成未成皆可太乙方加土木鼈仁二兩輕粉四錢槐柳枝各百寸血餘一兩乳香沒藥各五錢阿魏二錢名加味太乙膏治筋骨并心背胸腹腰脚諸痛及跌撲湯火癰毒瘡癩等皆可太乙原方七味加升麻陳皮各一兩名生石膏治勞傷內症加沈香少許糝貼心睛治陰瘡加胡椒七粒糝貼頸後第三骨節治外患奇瘍初起加冰片貼立消已潰加花粉可拔老膿將愈加貝母或棉著未可生肌此絳囊方○回春萬病無憂膏照太乙膏去元參生地加苦參皂角川烏草烏連翹白芨白斂木鼈仁烏藥各等桑槐桃柳棗五枝各四兩油熬丹收入乳香沒藥蘇合油攪治風寒濕氣及一切癰毒跌打諸症消腫定痛生肌○太乙保安膏羌活草烏川烏蠶蠶獨活麻黃桂枝當歸烏藥防風荆芥良薑海風藤鬧揚花油熬丹收治五勞七傷風寒濕氣筋骨疼痛痰喘咳嗽心疼腰痛瘧疾脚氣痛氣及跌打損傷瘰癧陰毒瘰瘡○又方治風寒暑濕百病

川烏草烏羌活獨活南星半夏麻黃桂枝蒼朮大黃細辛當歸白芷希敏海風藤各一兩薑蔥蒜槐枝各一斤油丹熬松香二兩收加木香乳香沒藥輕粉川椒未各五錢○觀音救苦膏藥店有賣者并有人新刻加增煎藥方故此不載○雲祖師膏見集驗良方及幾希錄○金絲萬應膏治風寒濕熱脾胃虛弱面色萎黃胸膈飽悶泄痢瘧疾痞積血痕并心腹諸痛大黃生地元參歸尾赤芍白芷官桂川烏草烏羌活獨活南星半夏麻黃杏仁川芎荊芥防風連翹細辛苦參蒼朮山梔烏藥青皮藿香黃芩枳殼藥木靈仙牛膝續斷貝母忍冬藤甘節蘇木紅花桃仁木香丁香艾葉五加皮青風藤秦艸白蘚皮白芨白斂牙皂僵蠶蟬蛻蛇蛻全蝎蜈蚣蜂房龜甲木鼈仁萆麻仁五倍子黃栢降香骨碎補良薑炮山甲乳香沒藥各一兩蒼耳草槐柳榆桃桑棟楮各四兩麻油熬黃丹收松香一斤攪勻加薑蔥韭蒜尤良此方亦從太乙膏出藥味甚多舊云治內症效錄之以爲準繩○敬信錄有天竺膏○五養膏生地熟地天冬麥冬附子肉桂遠志牛膝菴蓉肉蔻仁杏仁木鼈仁兔絲子蛇床子鹿膠虎膠各二錢麻油熬黃丹收松香調勻槐柳枝攪下雄黃硫黃赤石脂龍骨硃砂沈香木

香各三錢麝一錢黃蜡三錢一加紫梢花陽起石阿芙蓉紅緞攤貼臍兩月一換此即暖臍膏也加杜仲元參當歸防風白芍黃耆白芷續斷甘草山甲地龍丁香乳香沒藥厚撲血結桑槐柳枝各四十九寸熬名五養膏壯陽助氣并治風痿惟多溫補不可誤貼腫毒瘡癩心悟有萬全膏○以上治內症兼治外症古方治內症者甚少舉此爲例然金絲五養兩方治脾胃已見大概增減用之其法亦無窮矣餘見前○清涼膏治內外熱症大黃元參當歸赤芍白芷苦參黃耆杏仁木鼈仁蠶蠶山甲蜂房蛇蛻忍冬藤黃芩荆芥黃栢桃仁防風槐子羌活獨活黃連連翹南星生地甘草髮團各一兩槐柳枝各一斤油熬丹收麝香攪勻外症初起貼卽消○又清涼膏大黃元參苦參生地當歸白芷黃芩黃栢甘草各一兩五錢白芍一兩紅花八錢油熬黃丹鉛粉合收○陽和膏見前癰疽註○神異膏照太乙膏大黃二兩元參當歸赤芍白芷生地官桂各一兩加川芎羌活防風黃栢首烏牛子桃仁杏仁生黃耆木鼈仁山甲蛇蛻蜂房髮團各一兩槐柳枝各半斤油熬丹收入乳香沒藥栢香各一兩血結五錢麝香一錢攪治外症不拘已成未成已潰未潰皆可用潰後不長肌肉不合口者

神效。○又神異膏用杏仁一兩生黃耆元參各五錢蛇
蛻蜂房各二錢半治內癰效去黃耆加木鼈仁一兩草
麻仁五倍各二錢半鉛粉收卽會通靈應膏也治癰毒
疔瘡皆可。○又神授膏治無名腫毒癰疔瘡癩均妙黃
栢赤芍紅花乳香沒藥各五錢生地當歸白芷各四錢
草麻仁二錢馬前子七個蟬蛻三錢蜈蚣十一條蛇蛻
一大條全蝎十五個男髮一團麻油熬鉛粉收卽此
方共研末入鉛粉炒二兩和勻糝膏貼亦妙。○石室神
効膏治外症潰後者用黨參三兩元參五兩生地八兩
生黃耆當歸麥冬各三兩川芎二兩丹皮牛膝荆芥生
甘草各一兩銀花一斤防風茜草各五錢油熬丹收下
廣木香乳香沒藥血結各一兩象皮末五錢麝一錢臨
用再加川楝五倍兒茶血結藤黃炒乳香貝母冰片末
糝貼此方可爲外症清補之法。○奇效膏治疔毒瘰
癧皆妙草麻仁四兩石上搥爛入松香三兩再搥至膠
粘扯長不斷滾入銀珠扯至光如明鏡紅如鮮血收存
臨用呵軟捏團貼或加樟腦冰片麝香乳香沒藥尤妙
或加黃丹輕粉油熬如治疔加蟾酥內府不用銀珠加
巴仁杏仁木鼈仁乳香沒藥銅綠各一兩全一無巴仁
加輕粉血結全。○又方松香草麻仁銀珠加大黃牡蠣

栢油白蠟起入麝收全。○又方用松香華仁各一兩。枝全用七個。蓮子連心七個。土木髓生甘草各二錢。如
上捷法貼瘰癧腫毒俱妙。○百應膏治一切瘡毒。隨貼
隨愈。亦治風氣川烏草烏羌活獨活大黃當歸兩星半。
夏桃仁紅花髮團各一兩。麻油熬松香陀僧硫磺收集。
驗薑蔥汁先製松香亦可。如汁再加商陸鳳仙崗楊花。
大蒜烟葉希斂草等製松香。用藥再加乳香沒藥血結。
胡椒樟腦細辛牙皂各一兩。同熬卽治痺集寶膏。再加
藥卽前見。現膏也。錄此以見增減之法。瘡用硫磺最効。
○普濟五疳膏專治外科疑難險症。一切無名腫毒。未
成消已成。卽拔毒收功。神効無比。惟耳後眉心忌貼。用
巴豆肉一兩。胡椒連川黃連黑丑白丑沙參元參柴胡。
連翹香附三棱莪朮木香地骨皮各一錢。半天花粉白
芥子各一錢。神麴山查麥芽各六分。麻油二斤。四兩先
將猪羊牛馬驢蹄殼各稱五兩。熬爛。次入前藥。一同熬
柿去渣。下黃丹一斤。三兩收其渣。收存。遇牛馬驢驢銀
鞍斷梁破損。先以花椒湯洗破處。敷末填滿。七日愈。
○十香膏。沈香丁香白檀甘松鬱金各五錢。麻油浸七日。
慢火養五日。後以文武火煎三二十沸。去渣。入黃丹收
以乳香木香白膠香龍齒蘇合油末五錢。麝一錢。攪勻。

玉清思之
候凝作片攤紅絹上貼
按膏藥須加香料此方可以
意加減臨用攪和甚妙
以上皆治外症。諸方不同

爾迺撮其要
撮古膏數味亦廣其略參其異從其宜浸
可熬與湯頭同

之以清油熬之以烈火燥入之而潤毒化之而芳
湯劑

毒藥膏
則不然順天時而老嫩體物情以後先濾必淨攪必勻

漬以水去火蒸以湯盛於甌展於布如漆之明似鵝鳥粘

之軟合之擬海月之拾
海月兩片合形海舟開之疑元

璧之獻
以上言膏之用油熬者以下則言用松香石灰

膏之不
牛膠蟲脂豕脂雞黃糯團麥粉棗肉桑皮等作
顧能學古而有獲亦自出奇於無窮 如鍾松

香膏有用松香未收者亦有搗松香貼者皆法也。按

治痺血結膏槐柳枝各二七寸香油十兩當歸白

芷細辛知母木鼈仁五倍子各五錢熬松香十兩收乳

香沒藥各五錢明雄四錢眞血結三錢輕粉二錢膽一

錢攪勻難貼 臂痛貼 臂腿痛貼 腿 如貼 腿痛貼 後

用熱湯露脚指在外從痛處淋洗至下自用布蘸熱湯

奄於膏上薰之令熱則其痛漸移下骨節間然後如法

貼之逐節趕下至脚腕再貼足心發一泡出黃水愈亦

治癰疽等生能散熱能穿遂敗生肌首尾皆可 古方

以松香收膏甚不便用此方蒸法極佳錄以待推 又

松香白水煮搥洗九次入銀硃一錢輕粉三錢麻油煉

蜜少許搗為餅貼治膿瘡大毒周時再用水搥洗翻轉

再貼醫過三人其效尤速 治癰久患諸藥不效者松

香同猪骨髓搗貼 治膿松香同猪油搗作夾紙膏貼

○餘已見 此皆用松香之法也 不必外科為然苟得

其意則內外一理蓋藥不止治一症變而通之是在能

者因內科方少姑錄其法之善者以為例意不在方也

故文中不列焉識者鑒之 有嫌方太參漫無頭緒者

不知正於無頭緒中悟法之變方為 如調石灰有用石

有得鄙意固不欲人之依樣而書也 如調石灰有用石

者亦有用作石灰作膏者 石灰能治痰積瘀血 奇効

膏大黃六兩香油一斤熬黃丹收以炒陳石灰五錢製

乳香沒藥各四錢攪勻紙攤貼治瘰癧未破消已破合

亦治破傷等如加槐枝艾葉花椒全 按石灰同小老

鼠鴉陰乾研收更妙。瘰癧用石灰同大黃五倍銅綠
枯礬黃丹牛黃麝香加葱白馬齒蝸牛爲錢磨數甚
妙。瘡不收口整石灰一斤放缸內以清水八斤燒滾
傾入攪勻澄清傾在另盆濾渣聽用如要收口剪新白
布浸入一刻取起貼患處此西藥法也或以象皮浸
灰水內用亦可。瘡癰膏大黃海藻昆布芫花各二兩
以青炭灰水加醋熬入半夏五倍南星末各一兩石灰
炒紅研二兩收初起可消已成箍過百日可不再大。
杖瘡用如意金黃散一兩加棹腦末三錢石灰水一中
對香油一中調稠如膏貼患處湯洗換又是一法。按賺
瘡用水龍骨卽脩船油石灰也煨灰收水甚良可參。
治積等方見前。瘰癧不破頭草烏木鼈仁靈仙鳳仙
子石灰水碱水熬膏點之或加蟾酥名蠟靈膏可代刀
針。附鉛灰方瘰癧用黑鉛炒成灰四兩醋敷不痛不
破一月內消而愈。如化犀膠謂以牛膠化攤亦法也。
銀黝亦佳俱可參。海犀膏五月午日以水膠
一兩乳香一兩煎水攤紙上陰乾剪即能治諸痛或入
明雄飛礬等分硃砂三分刷紙全。一用端午艾四兩
煎湯去渣先下紅花次象皮次乳香。一用藥各四兩煎去
渣下牛膠二兩煎至汁黏刷桑皮。或木紅紙數遍陰

乳臨用以唾沫調軟貼可治狗咬蟲蝮蛇傷并跌打破

傷一切爛癩瘡疔等能活血生肌如金瘡或跌傷

藥後以此封之甚妙○痰注牛膠三錢醋煎化下鳳仙

子末人中白煨研攪勻貼○牛膠十二兩醋二斤熬下

黃丹鉛粉各三兩收治發背對口乳癰魚口便毒瘰癧

爛腿俱妙孕婦用此最穩亦可臨症調藥用○凡瘡不

斂用牛膠醋化塗紙上貼瘡口再用熱醋浸布罨如融

於瘡上以蠟難膏又是一法○治癩風等方見前○一

蟲蠟切寒涼腰痛筋骨流痰及諸病新髮用麻油熬黃

丹收入黃蠟白蠟和勻攤貼或加乳香沒藥明礬全

此方加當歸二兩生地一兩生甘草五錢熬即當歸膏

治癰毒湯火一切疔腫請般爛瘡生肌止痛補血積筋
即再加寄奴合歡皮熟地各一兩龍骨象皮血結各
五錢治金瘡杖瘡夾棍傷○蚌灰可代珍珠蟹黃可代
牛黃收口入之亦妙○貝葉膏髮團油熬白蠟收棉紙
蘸油貼磁器鞏上陰乾用能定痛去腐生肌以紙蘸油
是一法○硃砂膏松香兩半黃蜡樟腦各一兩硃砂五
錢凡瘡癩不收口及金木蛇蝎犬傷皮破血流者皆可
貼攤時宜薄厚則不效○腫毒一切白龍膏香油熬宮

粉黃蜡收。綠蜡膏麻油熬黃蜡白蜡收。如煉豕脂之。
加松香或黃丹陀僧皆可銅綠末攪勻。地猪油熬膏聽擦。
豕膏卽猪脂也。內症如血燥用生地猪油傷死血鬱結。
○治金瘡杖瘡止痛止血不作膿法并杖傷死血鬱結。
晚逆不食內爛者皂役合之可以積德煉淨猪油一斤。
半熬膏入製乳香製沒藥各一錢牛血結三錢兒茶二。
錢冰片三分樟腦二錢四分麝香一分松香黃蜡各一。
兩面粉四錢收。猪油一斤黃栢大黃麻黃檳榔等分。
水熬調瘡藥用甚妙。又方膿窠疥瘡用斑毛三個同。
雄猪油四兩煎數滾去斑毛入麻黃五錢煎黑去渣將。
草仁大楓子肉各五十粒搗勻搽一。去草仁用杏仁桃。
仁同猪油能解斑毛毒。白玉膏蘆甘石同猪油搗貼。
治臙。大鯽魚亂髮猪油熬膏塗治手足諸瘡亦可加。
藥。猪油先熬去渣入蘇合油八兩再熬以人指甲末。
血餘各二錢陀僧松香各四兩收。治疔毒諸瘡可調藥。
末貼。有用猪肝貼腰毒者有用猪腰搽藥貼大毒者。
藥卽鉛粉一兩輕粉銀硃雄黃製乳香製沒藥各二分。
半也。治對口發背癰疽疔毒減痛定瘡口出膿穢俱妙。
可參猪網油包松香燈火上燒着滴下油來以蚌殼如。
芙蓉承之貼秃瘡及陰陽頑癬油紙攤貼此又一法如。

炙雞黃

古有以雞蛋收膏者。頭髮二兩麻油熬入者。熟雞子黃十個。瀝渣以硃砂、銀硃、黃蠟收名雞

黃膏

亦名外科膏子。如加赤芍、黃栢、大黃、白芷、當歸各

一兩

紅花五錢、川連四錢、再熬枯去渣。下製乳香、沒藥

各一兩

六錢、血結一兩、兒茶八錢、琥珀五錢、輕粉四錢

燕石膏

黃蜡各二兩、冰片一錢、麝五分、收去腐生新。極

妙。

按原方雞黃膏調入煨蘆、甘石、赤石脂、兒茶、黃栢

末、紫粉、紫蔗皮、灰、即治胎乘、梅瘡、陰爛、等敷藥也。如

調入苦參末、可治熱瘡、調入鹿角屑、甘草末、可治乳癰

調入醋、煨牛牙末、可治禿瘡、及脚了破爛、調入黃丹、石

膏、硫黃末、可治膿窠、調入川椒、花、椒、枯、礬、硫黃末、可擦

肥、關、膿、疥、濕、風、坐、板、諸、瘡、調入川椒、花、椒、枯、礬、硫黃末、可治肥瘡、白

頭、黃、水、瘡、赤、游、丹、調入乳香、沒藥、兒茶、甘草末、可治禿

藤、一、切、瘡、調入海、螵、蛸、龍、齒、象、皮、輕、粉、松、香、乳、香、末、可

斂、瘡、口、調入大黃末、治湯、泡、火、傷、調入白、蜡、冰、片、末、治

杖、瘡、調入防、風、白、芷、末、治濕、熱、諸、毒、調入斑、毛、生、半、夏

末、可擦、癰、單、用、亦、治、癰、如、杵、糯、團、糯、米、膏、用、川、烏、草、烏

風、隨、症、量、加、不、能、盡、述、如、杵、糯、團、糯、米、膏、用、川、烏、草、烏

米、飯、搗、膏、貼、治、風、痛、又、糯、米、一、斤、皂、角、切、碎、半、斤、銅

錢、一、百、個、同、炒、至、焦、黑、去、銅、錢、共、研、末、酒、調、如、膏、塗、治

理瀹駢文

真

筋斷骨折效。小金丹用糯米丸痘科用糯米餅如熬

均見前。腰痛用熟糯米飯作大餅貼布拴之。一切熱毒

麥粉。陳小粉四兩炒黑醋熬膏名烏龍膏治一切熱毒

一。加生白芨五錢白飯三錢百合百部乳香沒藥百草

霜糯米炒各一兩麝一分敷治筋斷骨折腫硬青紫者

又是一法。又方陳小粉炒黑醋熬入大黃黃連黃柏

樸硝南星半夏白芷白芨白飯牙皂草麻仁榆皮五倍

龜板各等分末臨用加猪膽汁白蜜和勻留頂敷治一

切熱毒未成即散已成出膿定痛解毒真靈藥也。散疔膏

膽蜜如搗棗梅。大戟棗肉搗如膏貼臍取瀉。散疔膏

亦效。專敷疔毒紅絲蛇頭及諸惡毒效蟾蜍

象皮焙人言淨青黛乳香沒藥血結兒茶各一錢麝六

分水片四分同棗肉丸硃衣臨用以白蜜調成膏貼毒

頂。有用白梅烏梅肉搗膏貼者。外如刷桑竹皮

荔支肉治疔肥皂肉治毒皆可搗貼見前。如刷桑竹皮

見上。有用葱涎刷桑皮貼金瘡者。金玉珠寶之貴黑

。竹卽竹紙。帛紙木紅紙亦全。皆膏之名。紫金膏治風寒濕氣漏肩

黃青白之奇。膝疔積中氣跌打夾棍棒卷松香十斤用

薑蔥各六斤取汁再以麻黃白芷川烏草烏關楊花各
六兩胡椒四兩吳萸附子各三兩煎汁和一處收松香
另附麻油三十六兩熬入松香成膏以煨綠礬一斤乳
香沒藥靈脂肉桂木香各二兩攪勻貼此方藥性溫熱
○又白玉膏紺珠膏入寶膏黑膏白膏綠膏藥
黃明膏皆見篇中其餘膏名甚多茲不備載 崇之曰
比天 趙府比天膏○金鎖比天膏治外症諸瘡不論已
未破並用葱椒湯洗淨貼初起毒盛將膏剪去中
心留頭出氣不必揭起膏可愈一毒用紫花地丁劉
寄奴淨野麻根蒼耳草連根葉子稀莪草各一斤山甲
一斤蟾皮一百張麻油十二斤內分四斤煎山甲餘藥
入八斤油內加老酒蔥汁各二碗熬膏炒黃丹收下牙
皂五靈脂大黃末各四兩白膠香三兩攪勻 神之曰亞
此藥精驗方 此方所用皆是外科要藥
聖內府亞聖膏治破爛諸瘡楊梅結毒用槐柳桑榆艾
各二十一寸象皮一兩驢甲一塊木鼈仁七個炮甲
六錢蟬蛻四錢蛇蛻二錢雞子清三個血餘三錢麻油
三斤熬黃丹收黃蜡一兩五錢和入靈脂血結蝦牡蠣
五錢乳香沒藥末三錢攪勻貼○此類方不過借其名
義以言其用之神耳勿泥定方藥看然方藥亦未嘗不

佳其造之也非一式膏式其用之也非一端如下文所云是也

膏藥有因十二經五藏六腑所在而貼者有因患處而貼者如病在頂而貼頂病在額而貼額此患處也有病不在頂而貼頂病不在額而貼額此取穴之法也內外症皆然膏藥貼法與鍼灸通但不必如鍼灸之點穴不差毫釐在得其大意與取或摩於巔足太陽之脈上其要穴而已觀下文可知額交巔直入絡腦別下項其病衝頭痛目似脫項似拔即正頭痛也項爲百會穴○蒼耳葉本並能通巔項凡各部皆有專藥舉此爲例又而分督任按督脈起於溺孔繞前有方者皆不贅腎貫脊應命門穴在十四椎至大椎卽百勞穴在第一椎循風府在髮下一寸上頭至腦戶在百會穴後四寸百會穴在前髮上五寸下鼻至人中之水溝穴而終其病脊強反折又任脈起於臍下四寸中極穴之下卽少腹胞宮之所由兩陰間會陰穴上毛際循腹裏之中央歷關元在臍下三寸至氣海在臍下半寸越陰交在臍下一寸臍之中央曰神闕臍上二寸爲下腕四寸爲中腕五寸爲上腕鳩尾在蔽骨下五分臍中在兩乳之間循是至咽喉上頤入口

其病男子內結七疝女子帶下癥聚或因寒熱或因虛
勞而犯陰傷筋一也。督脉上顛在脉不上顛至下唇
稜下陷中而止。與或覆於額而合巽坤。額中印堂主
前部位脉絡參看。雖火左額角巽小腸也。右額角坤命門也。左額震木肝
右額兌金肺也。左腮艮土胃右腮乾大腸。下頰坎水腎
也。鼻爲中央脾也。○又膽筋脉皆上頭角。柴胡治頭角
痛。手陽明大腸筋上額左角。手少陽三焦筋結額
上角。足太陽膀胱筋下額。足或眉之左稜右稜。眉
陽明胃脉至額顛。方見篇中。肝眉又應膀胱。眉心屬肺。眉心上應咽喉。或目之
眉稜骨痛屬風熱與痰。眉心膏畫眉丹已見。或目之
內眥外眥。目眥外決於面者爲窠眥。太陽程所起也在
陽下稱陽明熱則筋縱目不開。○兩眥皆屬心。○按心
痛用雄黃火硝等分未加麝少許新汲水調點內眥卽
精明穴也。男左女右扶行數步立愈。腰痛用西瓜皮陰
乾末點全眥見蔣氏說約。○凡病點眼者多膏仿照水
丸法爲小餅。或在側而附於郭。脉膽脉三焦脉俱入耳
納於眥內。里禽許文。

中三經合病俱令耳痛 胃筋脉膽脉三焦筋脉俱到

耳前 小腸筋膀胱筋脉胃脉之支膽脉三焦筋脉俱到

耳後 耳輪焦枯受壓垢者病在骨 耳間青脉起者

掣痛 凡耳聾虛鳴脫頰口噤頰腫牙疼用前樊氏大

乙鍼法鍼耳後陷中翳風穴按 或居中而橫於梁 衄血

之引兩耳內 膏有夾耳貼法 或居手陽明大腸經 以濕

紙搭鼻衝即貼法也 按鼻旁下屬手陽明大腸經 而

鼻青者腹中痛微黑者有水氣黃者小便難白者氣虛

鮮紅者有留飲鼻燥如烟燥屬陽毒熱極鼻孔冷滑而

黑屬陰毒冷極 膏視症貼 腦漏膏貼鼻樑眉心頰

後頂 或列於頰并成其頰 輔骨曰頰頰下曰頰頰旁屬

上 或列於頰并成其頰 手太陽小腸經 頰又為骨

本陰火上乘兩頰俱深紅赤又赤色出兩頰大如拇指

主卒死 有疔名頰疔 頰腮頰也 喉症醋熬杜牛

膝敷兩頰 腮腫細辛草烏未入蚌粉猪脂調敷口含

白梅置腮邊良久吐涎腫自消 疔腮見前 腮邊穿

一小孔名漏腮夜合花敷 胃頰車痛 口噤者瀉頰車

其能載物也 陽明經受風熱頰車痛 口噤者瀉頰車

穴最效 或承於頰更觀其頰 頰即下頰頰下曰頰

膏皆照貼 或承於頰更觀其頰 頰脫有由大笑者有山

病後元虛者令與者平身正坐一人以兩手託住下頰
向腦後送上關竅用南星末薑汁塗兩頰布焚之膏照
貼○五發腦鬚頤或夾乎脰胃腎二脈循喉心脾二脈
肩背而頤尤險或夾乎脰胃腎二脈循喉心脾二脈
令隘痛肝脈循喉後令咽乾三焦脈由喉令咽腫膏
皆貼於頸上○附方山梔黃栢各五錢煎汁去渣杭
粉五錢麝五分龍骨一錢入山梔黃栢汁內煮乾研黃
蜡和藥溶化攤絹上貼牙一夜取下黑處是毒此貼牙
法○舌上起核飲食難進食鹽以竹篾春干搥則粘膩
紙攤作膏貼提出瘡頭易愈篾染毒勿入口此舌上貼
膏法二方均可仿用○按喘嗽貼天突穴在結喉下
三寸或曰一寸以華蓋穴在天突下三寸三分○喉癰
中間者名結喉或貫乎膜頸前有缺盆空屬胃在橫骨
兩旁者名夾喉或貫乎膜上左右各一為十二經道路
缺盆下曰胸膈下曰膈肝蔽心之背心位在此心下有
膈膜與背脊胸腹周圍相着遮隔濁氣不使上熏心肺
十二經脈惟膀胱脈不貫膈或上貫而下幽膈為吸門
餘皆能令膈痛○膏貼膈上或上貫而下幽膈為吸門
上口曰賁門屬上焦胃下口曰幽門屬中焦或直衝而
大小腸下口曰關門屬下焦胃分此貼

橫帶

衝脈與督脈任脈皆始於氣衝氣衝起於胃脈一

氣衝源而分三歧督行背任行腹衝脈起於腎下出於

足滲三陰灌諸絡爲十二經之海主血帶脈橫圍於

腰如束帶總約諸脈○治衝脈爲病者貼臍下治帶脈

爲病者貼腰間○按臍下發痛者腎經也非熟地不除

又腰痛脈大者腎虛也久痛必用官桂以開

之瘦脇痛亦然婦人帶病宜用白朮可參

所聚此言前陰○宗筋謂陰毛中橫骨上下之豎筋也

筋所以主束骨而利機關也陽明爲水穀之海主潤宗

筋凡痿症由陽明虛宗筋縱帶脈不引所致轉筋症亦

由津液傷宗筋不潤所致○前陰者宗筋之所聚太陰

陽明之所合也謂脾胃二脈皆輔近宗筋故曰合○宦

者去其宗筋傷其衝血故無鬚○陰囊垂者寒在內熱

在外結者寒在外熱在內傷寒及熱病入厥陰則囊

卵縮者熱傷筋筋急故

也○膏有熱前後陰者或廣腸之所容此言後陰○後

廣腸又有直腸○按臍下發痛者

○小腸熱痔大腸熱便血枯痔散熊膽膏田

螺膏痔藥膏子又有猪膽汁同蘇合油相用者皆效。

凡五痔腸澼兩脅尖痛泄瀉久痢陰濕汗痒腸風脫肛。

用太乙針法針會陽兩穴在尻骨兩旁各開一寸五分。

凡火衰泄瀉及裏急者用太乙針法針命門又頭疼。

如破腰腹痛瘦瘵皆針命門下血或披之於肩臂。

不止灸命門左右腎膏照貼。

手之安否○肩下曰腋對腋為臑腋下曰脇脇下曰季。

脇在肝下臑之位治同肋助者脇骨也○手膊臂外面。

屬手三陽裏面屬手三陰○東垣云臂痛有六道經絡。

當以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而。

定之則其臂臑之前廉痛屬陽明大腸後廉屬太陽小。

腸外廉屬少陽三焦內廉痛屬厥陰心包絡內前廉屬。

太陰肺內後廉屬少陰心視其何經而用鍼藥治之。

按內者即裏面也此即鑑本上行中行下行之謂○凡。

臂病經絡倣此○凡肩痛取手三里穴背痛牽引肩。

者乃膏盲穴為患宜灸此及肩井即肩髃穴在肩端兩。

骨間陷中○臂痛麻痺鍼曲池屈手按胸肘灣橫紋尖。

蓋處陷中手三里在曲池下二寸兌肉端○肩井曲池。

手三里皆手陽明或握之於指掌三陽皆起於手指。

大腸穴膏多貼此。

或握之於指掌。

大指屬脾外側屬肺。

食指屬大腸中指屬胞絡無名指屬三焦小指屬心外

側屬小腸一云大指脾二指肝中指心四指肺小指

腎掌心屬心胞絡掌心熱則腹中熱掌心寒則腹中

寒傷寒手背熱者邪在表手心熱者邪在裏也小

兒驚搖以男左手女右手男大指在外女大指在內爲

順反是逆○附方指頭疔有雞蛋猪膽套法掌中生瘡

爲拳疽亦曰託盤有雞矢塗法脫骨疽生手足各指或

第四指或指頭及指節指縫白色或黃泡久則潰爛節

節脫落古有截指法不可爲訓宜用大甘草末麻油厚

敷在脚趾者不治則腿亦能脫以土蜂房煨末醋調敷

卽効膏或繫之於股脛膝上曰髀髀骨與髓骨接處

亦可膝膏或繫之於股脛膝上曰髀髀骨與髓骨接處

至膝長一尺九寸膝下曰脛脛之後魚腹曰腓卽腿

也足之腕骨曰踝○按膝眼下三寸外側足三里穴

是穴三里下三寸爲上廉屬大腸再下三寸爲下廉

屬小腸均爲陽明胃脈凡五勞七傷翻胃氣膈腸鳴腹

痛癖疾膨脹胸膈畜血咳嗽調痰膝痿足痿失履

皆用樊氏太乙針針之或貼膏後熏之○足膝外面屬

足三陽前行屬陽明胃中行屬少陽膽後行屬大陽膀胱

足三陰內面屬足三陰足大指外側前行股內之土行

屬厥陰肝內側中行厥內之前行屬太陰脾足心繞踝
之後行屬少陰腎。水性潤下氣不能煦注於足脛則
腫痛。西醫有或綴之於腕踝三陰皆起於足指
貼腿肚引下法

或綴之於腕踝

三陰皆起於足指

脾中指屬胃四指屬膽小指指下屬腎外側屬膀胱
膀胱病脰似結脰似裂足小指不用。小兒痘症觀脾

心部位即知寒熱虛實日前誤服何藥脚跟向後爲水
屬坎湧泉穴爲中屬土大拇指爲裏屬震小指爲外屬

兌脚中指爲離屬火脚無名指爲前屬火又觀人面

部五色與脚掌相應否可知誤服何藥心離宮正色紅
脚上亦相同若帶赤紫誤服熱藥腎坎宮正色青色脚上

亦相貫若帶黃色誤服散藥肝震宮正色青色下面亦相
應若赤帶白誤服參著肺兌宮正色白下面亦相得若

帶慘暗誤服涼藥中央正色黃湧泉亦相當若見青色
誤服大黃此邵公言也其法絕奇可爲誤服藥之一

證亦見病無有不形於外者既知其誤則必有法治之
矣錄之以或前或後頭後頭項分七行中屬督脉惟兩

待善推者或前或後頭後頭項分七行中屬督脉惟兩
第四行五行皆屬膽經頸前中行屬膀胱經其餘第三行
行屬大腸經四行屬小腸經五行屬膽經六行屬三焦

經七行屬膀胱經項後中央屬督脈經也○胸腹之中

行屬任脈兩旁第二行屬腎經第三行屬胃經第四行

屬脾經乳下脇上第五行屬肝經第六行屬膽經

脊外兩旁二行三行俱屬膀胱經脊之中行屬督脈經

膏前後或左或右男左旋女右旋○左心肝膽腎小

貼照此胃右脾胃皆土俱從田字胃中故田字亦中脾

央脾居胃右脾胃皆土俱從田字胃中故田字亦中脾

右故田字亦右雖俗字亦有意西法脾在胃左肝居膈

肉右方右靠腎而左或當或對如前後心相當膈眼或

枕胃與中國不同或當或對如前後心相當膈眼或

交或互如左病治右右病治左之類又如鼻衄白糯米

兩耳若耳聾塞兩鼻亦或上因下引即下治法○如治

互法也膏藥貼法全赤眼用生太黃生

南星醋熬膏塗足心或熟地生地草烏南星乾薑桂枝

末醋調如膏敷足心却用牛膝煎湯洗眼引下之按加

牛膝之法甚妙凡貼足心者可倣此用口瘡方見前

又有生硫黃硝石水麩調貼足心之法又有黃連黃芩

黃柏水敷足心之法○大吐不止附子煎湯抹足○小

使不通黃酒浸脚○百會疔亦用敷足法○餘見前不

腎或下以上取印上治法。凡升提之法皆是。如腰

又有香附生薑青鹽擦牙之法。又小便不通有探吐提

氣法。又脫肛有醬塗頂灸之法。膏做此用。餘見

前或相同而相感如耳聾用棉裏鐵屑塞耳口含磁石

磁石類頻吸之。吞針用磁石棉或相反而相應。反八

裏納下部自出。膏中調末做此。或相反而相應。反八

反膏治痞塊一切用葱蜜醃甲莧菜甘遂甘草杏仁木

龍仁熬貼之類。又通頂散用人參藜蘆之類。耳聾朝

用生地甘草臙脂包三分塞耳夜用甘遂葱白草烏棉

裹包三分塞耳數日効。治癰甘草煎濃湯在癰外圍

三次後另用醋調大戟芫花甘遂末炙其中勿近甘草

次日縮小再如前。瘻自然焦落。此分用者也。葱蜜

膏治腦破骨折効。陰毒用附子肉桂川烏草烏甘遂

大戟芫花甘草乾薑各等分熬膏貼。福本集靈接骨

膏川烏草烏大黃當歸生地紅花大戟芫花甘遂甘草

劉寄奴紫荆皮靈脂地龍蟲雄鼠糞上肉桂山甲髮團

野麻根麻油二斤半桐油二十四兩熬加乳香沒藥血

結阿魏各一兩又桃柳槐桑枝各四十九寸另用地鱉

玉清膏之類
蠱鬧楊花收膏。此合用者也。觀音膏。或始終單行

之飲甘草湯則內外用也。餘見篇中。

一膏。或彼此兩借。其意觸處皆通。不必執定一症也。說

獨用。或新舊兼收。如治臍用貼過。或翻覆迭換。如白信

見篇中。背。面之類。又如治臍用樟腦三錢。銅綠一錢。猪油和勻

搗爛。油紙夾貼。一。二。日。翻轉貼。亦是。松香膏見前。

物以槩而得全功。以協而成和。黃丹。協。製以秘而能彰

脩合。雖秘。法以周而益專。形附麗而不離。故親氣閉藏

其用則彰。而弗洩。故聚脉之流者。竅亦通焉。臭之入者。味亦滋焉。

膏分門而類。應藥審因而特加。有搥錠以和。紫金

錠搥碎入膏之類。按紫金錠亦有五倍牙皂乳香

沒藥四味者。五毒錠雄黃硃砂膽礬麝香和捏

為錠治一切腫毒蟲蝎傷甚效。此方或加巴豆輕粉

湖腦乳香沒藥或加蜈蚣白丁香或加藤黃人中白自

及白敏牛皮膠化開和錠全。或用蟾蜍麝香皂角明
琴四味或用雄黃硃砂京墨熊膽牛黃麝香六味爲錠
全。又鹽水錠用火硝黃川皂礬雄黃硃砂風化硝後
投四味全。坎宮錠治熱毒并治痔京墨一兩熊膽三
錢胡連兒茶各二錢冰片七分麝五分牛黃三分猪膽
汁生薑汁醋和捏爲錠全。白芨錠治瘰癧効生南星
生半夏各三兩海藻昆布各一兩冰片麝香各二錢紅
花牡蠣各二兩青鹽六錢共生研末以白芨半斤切片
熬膏和藥爲錠聽用。凡錠皆可用牛。有研末以糝
膠水白芨水和如醋磨圍膏外亦妙。

有剖丸而調

如蘇合丸抱龍丸黎洞丸蟾蜍丸
活絡丸梅花丹之類無不可入膏

有煎油

而攪

如丁香油蘇合
油薄荷油之類

有束素以厚其氣

布纏

有箍金以

固其力

如赤豆或白芨或白敏末水調敷內外症皆宜
流注貼膏後必用數圍藥方不走。鐵箍散治

離毒并疔卽蒼耳草灰芙蓉葉赤小豆末醋圍者亦有
金箍鐵井闌諸名。內府鐵桶膏治發背將潰已潰時
繩根五倍一兩炒白芨五錢膽礬三錢銅綠五錢明礬
四錢鬱金輕粉各二錢陳醋熬如膏調藥塗紙蓋上瘡

根自生纒紋收緊矣。○絳囊方治腫毒圍之卽消已成
毒氣不走無膿長膿已潰膿卽追出蓉葉四兩大黃一
兩黃栢或薑黃亦可白芨白飯五倍陳小粉
妙蠶殼焙各五錢醋敷
三方皆效隨用
有若罐拔
如黃疸取黃用藥筒
及風痛用火罐之類
有若瓶吸
如風寒用熱燒酒空瓶
擦破傷瘀血○乳腫用瓦瓶裏煨火以葱白
蓋面布扎倒執熨患處此法甚妙可倣用
有若筆取
如一筆消鐵筆圈之類○大黃藤黃明礬酥膏香沒
藥乳香蝸牛搗爛爲條遇毒醋磨以筆圈之日口小
并以筆畫引到別處消散或用蠶蝮香蝸牛搗爛爲
丸珠衣水磨用全
二方取蝸牛之性甚妙○又治疔
走黃用倒回蟲亦妙此皆物理
有若繩引
燃置竹筒中
宜推今人有以筆收腮毒者
有若繩引
燃置竹筒中
燃火炷瘡口類類熏之引毒外出名布撚熏法如布捲
藥末治風氣腫毒亦妙
二方皆引法一斜引一直引
也○按輔膏之法甚多此
有若帶繫
寒腹痛鋪蔥艾熨
特取其新別者以待類推
有若帶繫
之再用帛三摺縫
葱艾繫於
有若線扎
鼻蠟方見前○又如治紅絲疔用
腹上甚良
有若線扎
油染線或油扎根扎住則不走

紅絲如由臂走至心由腿走入腹則難治矣又荒有
花壁錢煮線繫壓痛亦是并治尻骨生尾等異症
苦丸搗以鐵丸手搗有若筒袞如破傷筋掣者用竹筒
之可去瘀

踏袞之有若礬之傾一兩銅鈎化開傾於圈內頃刻礬
一月效

化為水其毒即解甚妙一兩銅鈎化開傾於圈內頃刻礬
只用礬一塊燈上燒化滴於患處即解

即外科黃蜡灸法以蜡置患處麩圍護住火烘之蜡化
毒解治疔用白蜡全連根拔出此法甚佳然人怕痛故

無用者錄有瓜合蒜鋪治背發冬瓜切頂合背上瓜爛
以爲法

此又雞矢一升瓦罐煎以瓊帽一項棉胎一塊覆罐上
熏之輪流取覆患上亦妙○有鋪蒜艾灸法有貼蒜代

灸有鐵熨銅刮王全生治陰疽用鐵鏡二塊石上敲熱
法有鐵熨銅刮輪流順熨干徧自消又西法吐血有冷

鐵熨背法一涼一熱用法迥殊可悟物理篇中采方多
如此亦欲人之隨症而變不拘於一也○銅錢刮頸治

喉症刮背治有煖之以火如日曬爐烘熨斗有温之以
疔症俱見前

疔症俱見前

理滯身交

六

湯如熱湯浸洗之類

有行之以酒

如以酒擦風氣之類。湯火傷冷燒酒澆之雞子清調墨

塗免起泡如渾身火燒者坐酒缸中此皆得酒之性者也。西醫有鴉片酒斑毛椒樟酒有走之以

鹽能走血或開竅有香如冰麝沉檀破結有辛胡椒白芥乾薑

官桂之類有先而導有後而收有膏所不足者補之

有膏所未及者助之以上言用藥輔膏之法。按外科

所以輔膏者也然能者亦可不用故不備載主則護心客則驅外膚則清肺

骨則堅腎肉則豐脾筋則榮肝橫者以折之病萎者以

振不足鬱者以宣九氣乖者以協七情泛者以歸吐血

停者以逐痰飲滿者以洩腫脹牢者以破疔積滑者以

留精濁阻者以行之類逆上者陰逆為之降陷下者陽

也為之提

即升也。靈樞陷下者，則灸之。此是一法。

格於中者為之通

三越

於外者為之斂

元神

險者移而居

內科有移深居淺法。由臟而出於腑是也。○外

科有移毒法

○按移山過海散用雄黃小麥麩蚘糞醋

調塗患處白能移過不致命。○又移險膏用草烏南

星黃柏白芨各二兩

五倍一兩醋塗全

又瘧症移毒

散用白芨一兩

六錢紫花地丁入錢大黃五倍子炒各

二錢雄黃硃砂輕粉烏雞骨煨各一錢牙皂八分醋塗

上牛截即移至下半截

而散凡毒生於骨節間者移之

免發疾

按古方有用地龍麥在經霜絲瓜內煨焦連

瓜為末者

每用瓜末三錢乳香沒藥各五分雄黃一錢

麝香二分

蟾蜍一分共研黃蠟丸如在上部要處用麻

黃桂枝甘草酒調

三分服可移在手上面散在背用羌

活防風薑汁調

可移臂在下部用木瓜牛膝靈仙陳皮

獨活薑汁調

可移足其用地龍之法與前全可悟內外

用藥一理錄

以備參觀此數方嘆古人用藥真

有挽回造化之妙

如能推之則天下無險症矣

隔而取

內科有隔二隔三之治○外科有隔皮取膿法

用驢子脚底剔下皮用砂炒一兩草烏四錢蕎

麥

麥麩一兩末加鹽五錢糊餅炙研醋調攤貼臍從毛孔
出或從瘡旁出奇妙又腫瘍將潰塗之膿從毛孔吸
出腐不盡者塗之立化木龍仁十四個斑毛八十一個
柳枝四十七寸驢甲片三錢草烏一錢麻油三兩熬入
巴仁三個煎黑研泥加麝一分和勻收此方太峻存其
法以待增減按舊有巴霜雄黃冰麝加乳沒法可參
當生者能回內症如回生丹回陽膏之類見上○陽毒
末酒調餅蓋瘡上熨之微熱勿燙○起陰疽法丁香雄
黃艾茸煎乾搗敷如病而色轉紅活者可治○又陰疽
頭四沈點不痛不熱內補不發者宜用人牙同麻黃川
烏當歸木龍仁山甲末以生薑汁和麩敷無人牙亦可
○疔有與回欲絕者可接內症如接命丹接命索之類
丹用鐵銹數見前○耳鼻脫蘇木末敷安上
四圍將老薑嚼融厚敷紮縛自接○斷指蘇木末敷絲
棉裹或接香末參登爾裏縛白接○自刎者食藥在左
屬骨易接氣喉在右屬肉難接水膠頰化塗粘敷藥○
傷腹腸出麻油潤瘡口以通關散取嚏其腸自收以桑
皮線將腹皮縫合用封口散塗傷處外用藥敷貼封
口散卽乳香沒藥兒茶當歸杉木皮葛根葉各一錢麝

香五釐水片一釐也一切割喉斷耳缺唇傷破肚皮跌
破陰囊皆用此糝手足折者用生地一斤生薑四兩
搗爛入酒糟一斤炒熱布包熨傷科詳見內府正骨書
茲不備載○內府萬靈膏治跌打損傷消瘀散毒舒筋
活血止痛接骨如神兼去麻木風痰寒濕疼痛三日一
換白鳳仙紫丁香根酒當歸醋煨白然銅瓜兒血竭沒
藥各一兩川芎八錢赤芍二兩醋淬半兩錢一枚紅花
一兩川牛膝五加皮石菖蒲蒼朮各五錢木香秦艽蛇
床子川附子肉桂半夏石斛蕁麻鹿角各三錢虎骨一
對或用虎骨膠代之麝一錢香油十斤熬丹收細藥後
罌如腫痛者先用紫丁香根川芎當歸白芍官桂紅
花并麻防風三奈麝香葱頭搗敷醋浸濕紙蓋上熨斗
熨之再貼膏換時有瘀血用番木鱉紅花猴薑半夏
甘草蔥頭醋煎洗後換膏貼○接骨神異膏用薑蔥韭
蒜椶樹皮各四兩麻油二斤豬油一斤大黃當歸桃仁
紅花川烏草烏羌活獨活赤芍蘇木骨碎補五加皮甘
松三奈浸熬另用油二斤煎亂髮一斤勿洗俟枯合前
藥為一鍋再熬下丹一斤收徐徐下提淨松香五斤末
收再下土鱉蠶炒黑四兩龍骨煨三兩血結一兩自然
銅醋煨淬乳香沒藥虎骨炙肉桂各二兩血結末另研

一兩攪勻。附方碎骨在皮內作膿者田螺搗爛加酒糟同敷四圍留孔骨自出再用藥接

而忽賤藥不以穢而棄如狗屎治膈貓屎治童癆之類。人咬先用童便洗再用

澹難矢塗之立刻止痛不作膿此症最難治故錄此以救急又如鼻衄不止用溺壺烘熱熏鼻牙疼不止用

溺壺烘熱熏耳又溺坑瓦糞坑磚起其痼而作其新皆可治傷瘍古方甚多舉此例推

培其虛而還其元以上合論內外膏藥功用以下則發明膏藥與湯藥殊途同歸之理

而實日見其可用者此說之所由立乃維膏與藥猶君

若臣一能精神之所聚也於文則為大結經曰方制君臣何謂也岐伯曰主病之謂君佐君

為君而藥各分而理膏與藥各相得益彰膏得敷藥又為臣也自為川其得益彰

為體用因之闔闢變動不居廣大悉備因所感而悟從

入之機病先從皮毛入藥即可由此推心所劫水火皆自外劫而信能應之故

切於皮膚也

切近

徹於肉理

醫書云凡藥入胃由胃分布經脈在肉理之中藥之精粕

焉能得到所到者氣味

耳然則膏藥亦可到也

攝於吸氣膏藥隨人氣融於滲

液經曰五穀之津液相合而爲膏內滲入於骨空補益

一矣○凡膏中用透骨草少許即能深入骨髓

導達匪由脾胃膏藥不經脾胃故不致傷脾胃

既無傷水穀之精攻伐不連臟腑

醫書治表必連裏

亦免迫陰

陽之變

虛則生變

直而能致何虛乎氣之格

格者病氣與藥氣相拒也如藥

入即吐者是也輕而可任

借用禮經輕任併字

何憂乎形之羸

醫書形羸不能服藥

治其量度在當胸譬仲景之納餅

抱撲子仲景穿胸以納赤餅其操

縱只舉手擬梁公之抽針

狄梁公善於針藥每治病抽針即愈

方寸有定

詎空洞之懸揣分明共觀奚隱曲之可欺

取諸已成

不勞以深文淺經於歷試毋煩避重就輕泥古者淺病好為深論起

時者重症但用輕藥皆醫之過疑可用之謀也險可用候

之衝當以心之所生為主是求其原病未有不由心生者心亦通五臟也

○經云治病必求其本註云謂但治其所生之本原則後生諸病不治自愈惟中滿及大小便不通當治標耳

膏藥無論何病既隨其所見以治之皆當以一膏貼臍中所以治其裏亦所以治其原也如七情總隸於一心

五志等以平心火為主諸痛癢瘡瘍皆屬心火亦可以見矣以身之所患為歸即適

其所經云適其至所謂適其病至之所而不可過也其

所不能至者膏自虛入者此外叩從來於天牝經云天

復得其性氣出於腦即不邪干註云天牝鼻也氣自空虛而亦欲其自空虛而去氣出於鼻為嚏或張鼻泄

之則邪從鼻出也觀音救苦膏有塞鼻法凡以膏塞鼻本此自內得者此內保根本

於丹田

經云十二經脈皆係於生氣之原卽下丹田也此藏府經脈之根本三焦之原內症俱宜貼此

又腦爲上丹田心

衛中州之營運有干城之象焉

牌

爲中丹田皆做此中州經絡之氣皆交歸於中以營運真靈之氣者也人以胃氣爲本膏藥補法在借胃氣故無論何病總以膏先顧脾胃使脾能健運則飲食增而精氣自足雖有外侮亦可禦矣此干城之義也

司關門之

輸泄有掌管之思焉

腎者胃之關腎不能司胃之關時其輸泄而病於下凡欲補火以生

上而下水者皆當以一膏治其命門俾輪泄以時則諸病皆安矣腎位在北故用掌北門之管語八句分上下

前見微則預絕渾乎先調後調

經云從內之外而盛於外者先調其內而後治

其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內中外不相及則治主病主重也膏藥見病則治無所隔礙可以防微杜漸預爲消弭而渾乎先後之迹也得熱則皆行統乎正治從治

經云

熱者寒之寒者熱之是正治也又云治熱以寒溫而行之治寒以熱涼而行之是借熱以行寒借寒以行熱卽

從治也膏藥貼後無論寒熱皆可以熱手摩之則氣易透寒症則以熨斗熨之偏藥氣入內如前治瘡病用平胃散敷法最妙蓋得熱則行也艾火能透諸經而治百病外科以火攻火毒隨火化其意如此敷藥忌寒涼亦全

岐之弗乖

可並用雖兩歧而無所乖戾也類磁珀之

並引

磁石引針琥珀拾芥

併之無犯

併合併也經曰補

其留布上部也補下治下制以急欲其直達下焦也又云治上不犯下治下不犯上治中則上下無犯誅伐無過是爲大惑膏藥則上下緩急可各用雖合併而無所侵犯也按上熱下寒及丹田有熱胸中有寒者又上虛則眩下虛則厥者又上實下虛

同韋弦之各佩

緩弦

性

急氣以開提而外泄非啟之反入於深

膏藥能拔病氣外出

心病者用心經藥往往引邪入深膏藥不然

勢以拘伏而內平非壅之還決

於後

膏藥能抑邪氣內銷○經云必伏其所主而先其所因此伏字所本○今人治血病者用藥過之兩

終必致橫決膏藥不
過之而偏使內潰也
中截以斷其路分殺祛以散其部

攻實者易為力不妨用全以克之
有用加倍重藥劫之者有一身則數膏者

有膏外再加敷藥
者所謂全力也
補虛者難為功亦可加厚以護之
上全

勿竊遺篇而貌虎賁勿據專門而局轅下始於一而終

於九流散之數操以總
經曰天地之數始於一而終於九數之可十推之可百千萬然

其要一也知其要者一言而終不知其要
者流散無窮膏藥能治百病揀陰陽之總
木似金而火

似水變遷之道寓乎通
物極則反原病式序云木火水

原生我以逮我生相及者母子之義
此子病相及故膏宜該貫

勝已而兼已勝合同者甲乙之源
古方甲已乙庚日單合化膏亦仿此

日引仿此是一是二損益皆能共信雖事怪
症因舊藥發作變異

之而心可安用舍并任自爲膏藥雖貼後去取病家亦可以自主卽情失

而責亦薄變古實承夫古千金外臺皆是我師古方之峻厲者

人多不敢用矣爲增減則失古人之意而用之亦多不效今本以合膏藥適得其平而古方之妙益顯是非變

古正是師古也遲時不忤乎時渤海咸陽各行其道渤海謂扁鵲咸陽謂

秦太醫李謚蓋忌扁鵲之技者膏藥高醫不屑爲時醫亦不肯爲可以免遺物忌飲者苦而彈

者痛見韓非子其孰能堪癩爲劇見藝文志而壽爲殤呂氏春秋病變而藥

不變向之壽民今爲殤子矣又何以解茲則義取小心孫真人云膽欲大而心欲

小習欲圓而行欲方二術歸無弊顏洪都之兄奚傷

顏含字洪都兄畿得病先引喪者顛仆稱畿曰吾未當死乃服藥多而傷五臟也今人鮮悟此理者特引爲鑒

邵康節之妹焉恨邵康節先生之母李夫人病瘦醫下藥夫人如期生康節同墮死胎女後

李夫人夢一女子拜泣曰母不察庸醫以藥毒兒稚齒可恨此事亦今所常有膏藥先註孕忌人皆察之

固妙衰齡愈宜小兒老人不喜服藥者多又臟腑嬌嫩精血耗竭皆不堪攻伐癆人產婦用藥

更難古人所以出外治一方也今人自矜湯藥遇此等症每有失手者何如參用外治與雖非良工

之所貴而儻為吾黨之所許自來文人每好言醫以其泛覽所及多明於內經之

亦外治一陰一陽之為道豈師陰而無陽莊子內取外取

求其過胡務內而遺外加以飲食自調詳見食物本草

驗良方等書蓋病家必須忌口又喜補益者多以此治

病兼以養生置兩得之術也。按經曰毒藥攻病五穀

為養五果為助五畜為益五菜為充又云穀肉菜果食

養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法謂病之有

餘未盡者則當以穀肉等盡之亦不可過也起居復慎

此可為飲食自調之法。飲食方另有編也起居復慎

縱無參苓之預蓄不虞沈痼之久嬰

以上總結膏藥

干戈未靖

鄉村尙淹瞻望北斗懷想西湖愁聞庾子哀賦怕覽陶

公歸辭案有醫書庭多藥草幸晨夕之閒暇借方技以

銷磨地去一二百里人來五六十船

余曾於一月中治二萬餘人遂得心

疾力却不矜者數月今但日限以百人而已

未挹上池之水

扁鵲

空懸先天

之圖

見前脈理幽微註

笑孟浪而酬塞

簡文勸醫文理疾者衆必孟浪酬塞誤人者衆

愛人者鮮

愧不良而有名

物理論醫有名而不良者有無名而良者

徒以肺

腑無言

古諺肺腑而能語醫師色如土

且託毫毛是視

扁鵲云仲兄視毫毛

浮沈

遲數之不明

余不切脈

汗吐下和之弗問

余不處劑

或運以手

趙

意傳或點其背

見華佗別傳

膏既分傳藥還數表愛我者見而

訝之忌我者問而議之然而非蕭敵魯之明醫詎能知

病遠史蕭敵魯明於醫望形色而知病所在比羊叔子之饋藥要不敵人羊晉

祜寄諸遠道偶同段翳之緘封後漢段翳治易有學生辭歸翳合藥并簡書封

於筒中告曰有急當視之到葭萌與津吏爭舟槳從者頭破發取膏藥敷之而愈平以數旬非

必陳珪之縫合魏志陳珪精於方藥有疾結於內針藥所不及者先令以酒服麻沸散既醉無

所覺因割破腹背抽割積聚若在腸胃則斷截瀦洗除去疾穢既而縫合傳以神膏四五日瘡愈一月之間皆

平復按今之傷科尚有遺法特內科不能耳一作華陀時無上工十全聊作窮

鄉一劑卽或我術非誣人言各異謂臣意之未精云扁

鵲之最下皆見本傳恐受季長之給唐書方士孫季長給李抱真鍊金丹曰當昇仙

慮遭申受之謬邵伯溫聞見錄趙諫議病申受舉郝老治之藥劑苦大趙不能禁乃呼申受責

之曰君謬舉郝老者由是死生所寄疑信相叅占易而誠知有喜

觀書而又懼弗瘳乍馳想於九轉之丹倏迴思乎五分之熨斯膏也既並行不悖斯藥也亦相與有成况當豎人膏盲姬避靈府許智藏傳秦孝王病夢亡姬曰智藏將至當爲所苦既而曰妾得計矣入靈府以避之智藏至曰疾已入心卽當發癘不可爲也

醫皆束手藥難下喉宵長兮爐冷人靜兮燈昏犬嗚咽於庭中烏啁噓於屋上共

憐待斃之形莫冀返生之路季梁之子環而泣陽里之

妻析而請註皆見下則是膏與是藥不能造命猶可盡人一

息尙存其機竟轉此非獨儒門之所求事親張從正著儒門事親

而亦太上之所云濟人者也以上治驗○一層膏藥可代湯藥二層膏藥可與湯

藥並用三層湯藥不能用尙可以用膏藥也膏施數載說成一篇援古方以

爲證述用法之不同論症則重於內言治則專於外屏

耳目之剽襲憑胸臆而結撰文約其大

文中所列方不
過約其大意或

撮其要藥一二味以爲

註覈其詳

傷寒大症應博觀諸
家書故不具載其餘

題以明虛實寒熱而已

除藥味外有辨症者有與內治方相比附者有彙集諸
家而刪節補綴之者有較其始末而自爲一論者皆以

補文中之

精者載於文

凡方之經驗者及法之至善者
又素鮮外治方者又有舉一而

未詳也

精者

載於文

又素鮮外治方者又有舉一而

可概其餘者

彙者存於註

凡症類多者及外科方皆列
於註學識淺陋不能決擇多

皆載之文中

取以備高手之選用其中未免龐雜俟他日刪繁就簡

再行重刊其自製膏方亦皆列於註內者不敢自信而

待折衷於

根柢往訓

醫理皆
本先賢標揭來例每症各有數語

君子也

根柢往訓

本先賢

標揭來例每症各有數語
法以待例推語

惟羞同

不爲湯頭歌
訣避雷同也

字不忌複

如虛實寒熱及熏洗敷
貼等字各症皆然猶之

語助不

羅散佚而使聚

傷寒諸方皆散見於
諸書從前未有集者

挾幽奧而

能改也

羅散佚而使聚

諸書從前未有集者

挾幽奧而

理淪駢文

理淪駢文

令顯

春風散諸方亦未

詞空理實論常慮別

四診爲醫之常談外

治則別有心思如窺其性懷及十二經八十數

句是也○自稽六經之屬起至出奇於無窮止擬議以

博其類

如搗松香起至培其元止

推闡以昭其義

維膏與藥起至不虞沈痼之久嬰止

截割雕刻以爲偶銜接聯貫而成章變叔庠采藥之篇

吳均有采藥篇

學簡文勸醫之作

簡文有勸醫文是駢體大旨謂人之所重莫過於命拯斯

之要實在良方本不素習卒難改變思不出位事局輟下欲求反死者於元都揚己名於綠籍其可得乎○此

篇爲駢體者亦欲與文人商其事耳不必醫者之知其說也與簡文之勸醫異

私心有所未盡

太史公

下筆不能自休

魏文帝典論論文

醫不拘法觀法而明

其意則無法有法自可忘筌

會其意則觸處皆通古人望雲知畫觀舞知書良有

以也醫家亦何獨不然

藥豈執方得方而善於療則有方無方奚

庸膠柱

卽圓而神之旨

自慚拾燕石之遺詎比探龍宮之祕

其

人有龍宮

警之製錦以章身而非適口如彼爲爾欲美已

而恐傷人

美已二字本河間語

固知違道從新或乖聖法亦謂去

疾就安卽爲良方

語本內經註

視急救之編均足應於倉卒

擬元詮之刻

醫書有勿藥元詮明養生之理又云有人素不服藥者不爲無見

不更涉

於虛無其體略近於醫方考藥性賦其功實抵於行軍

散救苦丹雖張園而冀偶遇究勝於終朝之不獲也

唐書

此中稍有分別在縱緣木而惜空求亦未至後日之有

災也是可以廣金匱之鈔

葛洪有金匱方鈔

而不必效青囊之

焚者已

非陀以青囊書與獄吏曰此可以活人吏畏法不敢受陀索火焚之○以上刊方以下乃自述

其事坤學醫爲人治病傳家示世與辨所以醫治之意亦古人篇終序志之義也

嗟乎金液徒

聞玉版空在

素問有玉版篇

三醫之謂誰是神手

列子季梁得疾其子環而

泣季梁令揚朱歌以曉之其子勿曉終謁三醫○一藥三醫者鳩氏衆醫也俞氏良醫也盧氏神醫也

之悞每欲噬臍

孟堅語

夙披古籍仰企前脩李元忠研習

積年

北齊書李元忠以母老多疾乃專心醫藥研習積年見有疾者亦不問貴賤皆爲治療

高若

訥兼通諸部

宋史高若訥因母病遂兼通醫

慨此事之難知覺而方之

非是

而汝也史記慶謂意曰蓋去而方書非是也

昌陽豨苓欲反韓公之論

韓文嘗醫師以昌陽引年欲進其豨苓也

楮實薑豆恨乏廷紹之才

南唐吳廷紹以

楮實治烈祖喉癢薑豆治馮公腦痛羣醫誌其方他尸效之多不駮廷紹曰烈祖饋金不吝以沐之焉勝之沐

旺則金絕矣馮公好食山雞鷓鴣二鳥皆食烏頭半夏
吾以薑豆解其毒耳羣醫大服此不獨得醫理亦徵博
物因思合歡蠲忿萱草忘憂見博物志博物者詎必應病投

藥艾炷灸額瓜蒂散鼻

隋書麥鐵杖對醫吳景賢語

知名者何曾診

脈處湯

四字見周書

是以慕元化之術

華元化有神膏

傳神膏於漢

季不復避韓臬之諱嫌膏硬於天寒

韓臬有疾令醫治之醫曰天寒膏硬

寒膏與韓臬同音嫌名也

今夫懾於勢者必不能盡其意狃於習者

亦無以得於心是以郭玉治病多在賤貧

郭玉治病於貧賤廩養必

盡其心而醫療貴人時或不愈云有四難

元素處方自爲家法

張元素字潔古試進士下

第乃去學醫其治病不用古方自爲家法云

老幼各塞門而來庭前擬列竈

之煮

侯麟錄王彥伯醫名既著列竈於庭者藥老幼子塞門而來請効者負錢而償不來者亦不責之

孫當濟世以術壺中想鏡經之傳

南史張融傳秦望山道士以一葫蘆與徐

熙曰君子孫當以道術濟世熙開之得扁鵲鏡經一卷遂精心學之至子秋夫彌工其術按徐熙錢塘人

且夫大賢任運常闔戶而集方隱士逃名罔入市而賣

藥是以宣公之五十篇樂示於鄉人

陸宣公有集驗良方五十篇示鄉人

伯休之不二價羞呼於女子

漢逸民傳韓康賣藥於長安市口不二價有女子從

康買藥曰君是韓伯休耶乃不二價乎康曰女子亦知我名遂入山

然則非纂鴻烈之解

何用赴淮南之招不懸君平之簾奚事居成都之肆

時居

泰州東鄉

厯稽往事可證今情聊假述懷匪矜數典大抵優

絀無憑成敗有據斗火盤冰同歸於是

方勺泊宅編蜀人石藏用偏於

熱餘杭人陳承偏於寒而皆有名於時時人語曰藏用膽頭三斗火陳承篋裏一盤冰此言醫不必存南北之

見鍼石藉藉所救維鈞淮南子病者寢席醫之鍼石巫

不信醫者有之此言醫之之精藉所救鈞也病家信巫

外治與巫之不服藥同也知我者當更教以精審之用

志孫真人初爲千金方後三十年復作千金翼用志精

所審不苟如此茲篇迫於時事倉卒付刻自知粗略多

於諸君子所改而正之者也而勿第強爲寂寞之解

嘲揚子或謂審言以詩名之孫曾許身稷契安仁有母

惟稱壽家園見安仁開居賦何弗出而軫乎黎元杜窮年入而

聯乎斑白安仁賦兄弟斑白兒童稚齒稱萬壽以獻觴

十餘故序曰知命之年賦曰兄弟按安仁作閒居賦時年五

斑白也余與仲弟今亦皆斑白矣顧甘賤役自擾閒居

豈欲附於名姓物理論古用醫必選名姓之後而妄冀於神仙乎葉夢

脩道養生者必有陰功協濟而後可得成仙思不知幼

邈之書天下以爲司命也其爲神仙固無可疑

艾保延

宋王微
茯苓贊

亦關民事井里親睦彌悅慈顏思構大

厦者

杜詩方今廊廟具構厦豈云
缺葵藿傾太陽物性固莫奪

語以張里之擊鐘

漢書

張里以馬
醫而擊鐘

奚必曰羞與爲伍也幸御板輿者

安仁賦太
夫人乃御

板輿示以銅川之述方

文中子銅川夫人
好藥子始述方

豈得曰未暇斯

務也矧猶有論病以及國者焉

藝文志論病以及
國原脰以知政

且亦

有因藥以養親者焉茲乃傳非三世搗只一人

龔慶宣
鬼遺方

序云劉涓子於丹陽射一物尋其踪跡至山下聞搗藥
聲遙見三人一人卧一人閱書一人搗藥見客皆走道

一癰疽方與一
自藥收之而歸

重不逾乎半兩

錢名○膏藥
重不過數錢

惠比散金

小僅限於寸紙義均焚券

朱清居善藥人不持錢者亦
與之歲終度不能償焚其積

券

竊欲以杼難之懷救患之誼并屬望於儒之聖

倉公
傳其

人學

財之雄矣

李杲以則
雄鄉里

或又謂靈素之書久

為河

漢張孫之學多視同鑿柄胡不以家之名士作古之功

臣推簡尋篇別著明解懸衡立矩獨表正傳而乃自執

偏見好爲新語欲使萬金之品但付手揮九折之功惟

從膚治

見石室
秘錄

則是糜蕪藁本不必盡辨其真

淮南子
夫亂人

者芎藭之與藁本也蛇床

之與麋蕪也此皆相似也
漆葉青麩無庸更求其益

陀求方可服食益於人者陀授

以漆葉青麩散服之壽百歲
何能折彼探丸徒爾貽

其覆瓿不知曩所未達

仲景書爲撰次
論証者失其真

今豈可加心本

無解口奚能宣沛公之性知不免謾罵

高祖疾甚呂后
欲迎醫高相罵

曰命自在天羅網
鶴鹿能爲不使治

張湛之筆任目爲游戲

見前眼
病註

亦惟

是期潤色於桑氏

張子和書為儒
生桑氏所潤色

要未敢效竊撰於高

陽矣

高陽生竊撰脈訣託名
叔和反掩叔和之真云

懿夫掌醫師而各供其事

功全於可療難療之間

內外治
咸備

此盛世之所以同登

於仁壽也至於舍藥石而默化其心神運在有意無意

之際

并無
外治

殆魯生之所以莫知其施為乎

應首意療
列子華子中

年病忘魯儒生自媒能治其妻願析產而請其方儒生
曰此非藥石之所攻吾試化其心屏左右獨與居室七
日莫知其所施為也而積年之疾以除○按仙經曰古
神聖之醫能療人之心預使不致於有疾今醫惟知療
人之疾而不知療人之心是猶捨本逐末不通其源而
攻其流欲求疾愈不亦難乎此可與魯儒事相參皆上
一層之說也○又列子魯公扈齊趙嬰二人有疾同請
扁鵲求治扁鵲謂公扈曰汝志彊而氣弱齊嬰志弱而
氣彊若換汝之心則均善矣遂醉以酒剖胸探心易而
置之此雖寓言可悟醫因人而治而使各歸於善之理

○附施濟驗方○清陽膏治風熱第一凡頭面腮頰咽喉耳目鼻舌齒牙諸火及三焦實火口渴便秘者又時行感冒傷寒瘟疫熱毒結胸症中風熱症鶴膝風等一切內癰外癰丹毒腫毒凍瘡發熱濕熱流注腸痔並畜血症胸腹脹痛者婦人熱結血閉小兒驚風痰熱痘後餘毒爲患皆可貼孕婦忌如不得胎處亦可貼下全老生薑葱白連鬚韭白大蒜頭各四兩槐枝柳枝桑枝各連葉二斤桃枝連葉半斤馬齒莧全用一斤白鳳仙花莖子葉根全用半斤蒼耳草芙蓉葉各半斤小蘇油五斤先熬炒黃丹炒鉛粉收聽用元參苦參生地常歸川芎赤芍羌活獨活天麻防風荆穗葛根連翹白芷紫蘊柴胡黃芩黑梔仁黃柏知母桔梗丹皮骨皮黃連花粉鬱金赤苓枳實麥冬銀花甘草龍膽草牛子杏仁桃仁木通車前子五倍子山茨姑用山豆根代紅大戟芫花甘遂生半夏大貝母橘紅陳膽星升麻白菊花石菖蒲赤小豆皂角木鼈仁草麻仁山甲鼈甲蟬蛻僵蠶全蝎石決明細辛羚羊羊大青膽皮香附白芨白斂各一兩草烏官桂紅花蒼朮厚朴木香各五錢薄荷四兩大黃芒硝各二兩犀角片三錢髮團一兩二錢小磨麻油十斤熬炒黃丹六十兩收加生石膏八兩飛滑石

四兩廣膠二兩乳香次藥雄黃青黛各一兩輕粉五錢
冰片油或薄荷油二三錢攪兩膏合併捏如雞蛋大者
數十團浸水出火毒每用以一團隔水化開量大小難
○散陰膏一名陽烏膏治寒濕第一凡風寒濕痺筋骨
疼痛及一切氣血痰凝滯陰酸漫腫疼瀉腎虛腰背痛
受寒腹痛與跌撲悶挫諸痛又瘧疾火衰泄瀉脾虛久
痢疝氣凍瘡陰疽等皆可貼孕婦酌 老生薑葱白韭
白蒜頭白鳳仙花莖子葉根全株桑枝槐枝柳枝各一
斤桃枝八兩乾柏葉艾葉各四兩小磨麻油五斤熬炒
黃丹收白芥子川椒末各二兩乾薑炮薑末各一兩攪
聽用 生白附子四兩生附子生川芎生草烏生大黃
各三兩蒼朮甘遂生南星生半夏川芎當歸麻黃各二
兩天麻荆穗防風紫蘇細辛甘草羌活獨活獨尾陳皮
赤芍白芷紫荊皮石菖蒲靈仙葶麻仁木鼈仁乳香沒
藥骨碎補續斷官桂廣木香延胡靈脂白芨白斂殭蠶
皂角炮甲桃仁紅花自然銅煨蛇蛻露蜂房乾地龍杜
仲香附木瓜五加皮雄黃明礬蕪木遠志烏藥牛膝蛇
床子秦艽各一兩薑厚朴五錢蠶砂一兩六錢髮團二
兩四錢小麻油十斤熬炒黃丹六十兩收加提淨松香
入兩赤石脂煨二兩陀僧陳石灰炒鹿角膠或用廣膠

代各口兩蘇合油樟腦各一兩攪與前膏合併難
方治風氣痛貼膏後可用太乙鍼藥末卷紙擦點火熏
之或桑枝扎把燒薰亦可或炒蠶砂或炒花椒熨之
治三陰癱膏上慘靈仙肉桂吳萸丁香白胡椒末貼背
後第三骨節下火衰泄瀉慘肉蔻仁末貼命門穴痛氣
慘川棟荷香末貼臍下治濕痰流注等貼膏後外用
白芨磨生薑汁圍之則不走陰疽全舉此三法例推
○金仙膏本古開鬱消積和中諸方而推廣之能祛風
寒化濕熱並行氣血痰食凡咳嗽哮喘惡心嘈雜噁氣
吞酸嘔吐噎膈痞塊積聚腫脹黃疸瘧疾水瀉痢疾淋
症疝氣脚氣一切利肺平肝調胃健脾皆妙并治心腹
脇肋諸痛周身走注氣痛乳塊腹癰腫毒初起皆可消
散尋常飲食不甘以此寬胸進餐勝服神曲檳榔之屬
治症甚多不能盡述衰年小兒俱可貼婦人兼有解鬱
調經之功跌打損傷行瘀止痛亦効此方具理氣理
血升降之用孕婦忌貼前有安胎諸膏最穩生薑葱
白韭白蒜白各一斤白鳳仙花莖子葉根全株槐枝柳
枝桑枝桃枝側柏枝各半斤蘿藦子白芥子山查子蘓
子艾葉花椒菖蒲各二兩陳香圓一兩小磨麻油五斤
熬黃丹炒三十兩收白朮四兩大黃蒼朮二兩生香

附醋香附生靈脂醋靈脂生延胡醋延胡川芎白芍當歸柴胡薄荷羌活獨活防風白芷杏仁神麩麥牙陳皮半夏大貝母膽南星前胡鬱金烏藥蒲黃炒赤苓澤瀉條芩黑山梔川烏草烏桔梗甘草枳殼枳實薏仁大戟皂角官桂檳榔黃柏青皮木香靈仙砂仁川棟赤芍桃仁紅花沒藥乳香三棱莪朮煨廣藿梗良薑小茴草果仁連翹僵蠶全蝎木鼈防己山甲木通車前子明雄明礬香益智仁吳黃黃連細辛茵陳草麻仁厚樸葛根生巴仁甘遂芫花黑白丑陳壁土輕粉葶藶各一兩小磨麻油十斤熬炒黃丹收飛滑石六兩牛膠四兩攪與前膏合併以油少酌加寒症可加肉桂丁香隨症用○雲台膏一名夔膏言一已足也通治發背搭手對口髮疽頸癰乳癰吐癰腰癰一切無名腫毒爛腿膝瘡等症初起消腫已成潰膿已潰斂口不假刀針升降爛藥始終只用此膏極爲簡便神速且能減痛可以張食放元氣不傷虛人卽不託補亦愈爛腿有水者用燥藥收水再貼陰疽勿用孕婦酌用此膏拔毒氣於無形而又攻補並進故能消能潰能斂潰後雖眼小如豆不必燃藥線入管而膿自出有腐肉者亦自然割離消化無須鉗割有骨者亦能推出與舊傳外科治法迥然不匹

大約疔愈重則愈見力量雖久潰無不收口又如狗咬
者貼之則爛爛而仍自收口並無得餘可見矣至敷藥
參藥乃與此膏相補 蘇葱蒜槐柳桑蒼耳鳳仙各四
兩生大黃五兩木鼈仁三兩元參生地忍冬藤生甘草
南薄荷土貝母朴硝各二兩生黃耆當歸冬一兩五錢
赤芍川芎白芷苦杏仁生草烏生南星生半夏生黃柏
殭蠶生山甲蜈蚣全蝎露蜂房有子者蛇蛻蟬蛻漂銅
綠銀珠枯礬製乳香沒藥明雄牡蠣草麻仁生饅蟾皮
各一兩五倍輕粉各五錢丁香四錢髮團二兩小磨麻
油八斤熬炒黃丹四十八兩炒鉛粉一斤松香提白入
兩黃蠟陳石灰炒陀僧谷四兩樟腦蕪合油各一兩大
蜘蛛十个焙燥研未攪或加羌活防風連翹蒼朮香附
陳皮花粉各一兩黃連細辛紅花官桂各五錢 敷藥
大黃八兩五倍礬灰花粉白芨香附蓉葉木鼈仁各四
兩草烏南星各二兩共末以醋六七斤入皂角四兩同
熬去皂角下陳小粉炒黑一斤再熬一時和前藥爲錠
聽用如加蒼耳草灰四兩更妙熱痛甚者用豬胆汁或
雞清和醋磨敷餘用葱汁和醋磨敷須留頂潰後亦可
用此圍并圍痰毒跌打傷均效如欲移毒滿敷可偏入
下截出頭全 又腫毒勢甚者膏內參龍虎散貼未潰

可破頭已潰可拔毒毒盡自收口其藥用蜈蚣十條焙
蟾酥三錢全蝎七個大山甲炮七片土貝母雄黃各二
錢公母丁香製乳香製沒藥硃砂樟腦輕粉冰片各一
錢麝香五分鳳仙子十四粒共研細末磁瓶裝好聽用
如倍冰麝加殭蠶蜘蛛焙各七磁石一錢犀黃五分全
淨松香四兩草麻仁二兩石上同搥干編入銀珠明雄
各二錢漂黃丹五錢輕粉一錢蜈蚣焙一條共末扯拔
十編用蝸牛或蟾肝丸聽用亦可合龍虎散同用貼後
身化為膿有長條硬膿出卽疔根也疔出後只用龍虎
散糝膏貼收功如紅絲疔以磁鋒割斷絲路再貼膏
○催生膏治交骨不開及各種難產大龜全個初死
者佳頭足血肉俱用約十兩外者無用生龜板一斤代
以小麻油二斤熬去渣炒黃丹十二兩炒鉛粉四兩收
每用四五錢皮紙攤貼臍上外用車前子四錢川芎當
歸各三錢冬葵子二錢枳殼白芷半夏白斂各一錢研
末麻油葱汁各一大鍾調藥敷於膏外紙蓋布扎合產
婦平身安睡睡醒卽生蓋脾則陰氣復母子皆有方也
○按前四膏皆日日施濟用者症候雖多大約虛症外
以此四膏治者十有七八催生亦驗十七人故特錄之