

新刊王氏脉經

新刊王氏脉經卷第四

朝散大夫光祿卿真秘閣判醫聞檢院上護軍臣林億等類次

辨三部九候脉證第一

平雜病脉第二

診五藏六腑氣絕證候第三

診四時相反脉第四

診損至脉第五

診脈動止投數疎數死期年月第六

診百病死生決第七

診三部虛實決死生第八

辨二部九候脉證第一

經言所謂二部者寸關尺也九候者每部中有天地人也上部主候從腎以上至頭中部主候從膚以下至氣街下部主候從氣街以下至足浮沈牢結遲疾滑濶各自異名分理察之勿忘觀變所以別三部九候知病之所起審而明之針灸亦然也故先候脈寸中寸中一作寸於九牢在皮膚沈細在裏昭昭夫道可得長久上部之候牢結沈滑有積氣在膀胱微細而弱自引裏急頭痛欬嗽逆氣上下心膈上有熱者口乾渴燥病從寸口邪入上者名曰解脈來至狀如琴絃苦少腹痛女子經月不利孔竅生瘡男子病瘡左右脇下有瘡上部不通者苦少腹痛腸鳴寸口中虛弱者傷氣氣不足大如桃李實苦痺也寸口直上者逆虛也如浮虛者泄利也中部脈結者腹中積聚若在膀胱兩脅下有熱脉浮而大風從胃管入水脹乾澀心下澹澹如有桃李核

胃中有寒時苦煩痛不食食即心痛胃脹支鬲上積脅下有
熱時寒熱淋露脉橫出上者督氣在膀胱病即著右橫關入寸
口中者膈中不通喉中咽難刺關元入少陰下部脈者其脈來
至浮大者脾也與風集合時上頭痛引腰背小滑者厥也足下
熱煩滿逆上擔心上至喉中狀如惡肉脾傷也病少腹下在膝
諸骨節間寒清不可屈伸脉急如絃者筋急足壅結者四脈重
從尺邪入陽明者寒熱也大風邪入少陰女子漏白下赤男子
溺血陰萎不起引少腹痛

人有三百六十脉法三百六十日二部者寸關尺也尺脉爲陰
陰脉常沈而逢寸關爲陽陽脉俱浮而速氣出爲動入爲息故
陽脉六息七息十二投陰脉八息十息十五投此其常也二十
八脉相逐上下二脉不來知疾所苦火勝治水水勝治火火

俱平治中央臍以上陽也決於天臍以下陰也決於地臍爲甲
關頭爲天足爲地有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺
爲表關爲裏兩頭有脉關中絕不至也尺脉上不至關爲陰絕
寸脉下不至關爲陽絕陰絕而陽微死不治三部脉或至或不
至冷氣在胃中故令脈不通也上部有脉下部無脉其人當吐
不吐者死上部無脉下部有脉雖困無所苦所以然者疊嘉人
之有尺樹之有根雖枝葉枯槁根本將自生未有根本即自有
氣故知不死也寸口脉平而死者何也然諸十二經脉者皆察
於生氣之原所謂生氣之原者非謂十二經之根本也謂腎間
動氣也此五藏六府之本十二經之根呼吸之門三焦之原一
名守邪之神也故氣者人根本也根絕則莖枯矣寸口脉平而
死者生氣獨絕於內脉間動氣謂左為腎右為命門者
精神之源舍元氣之所係也一名守邪者

之神以命門之神因乎而氣不相安入而死矣此
有氣先絕於內其人便死其脉不復反得動病也。岐伯曰形

盛脈細少氣不足以息者死形瘦脈大皆中多氣者死形氣相
得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死上下左右之脉
相應如參春者病甚上下左右相失不可數者死中部之候雖
獨調與衆藏相失者死中部之候相減者死目內陷者死黃帝
曰冬陰夏陽柰何岐伯曰九候之脉皆沈細懸絕者爲陰主冬
故以夜半死盛躁喘數者爲陽主夏故以日中死是故寒熱者
平旦死熱中及熱病者日中死病風者以日夕死病水者以夜
半死其脉乍數乍躁乍遲乍疾者以日乘四季死形肉以脫九
候雖調猶死七診雖見九候皆順者不死所言不死者風氣之
病及經月之病似七診之病而非也故言不死若有七診之病
其脉候亦敗者死矣必發噦噫必審問其所始病與今之所方

病而右各切循其脉視其經絡浮沈以上下逆順循之其脈疾者不病其脈遲者病脈不往來者死皮膚著者死

兩手脉結上部者濡結中部者緩結三里者豆起弱反在關濡反在顛微在其上濇反在下微即陽氣不足沾熱汗出濇即無血厥而且寒黃帝問曰余每欲視色持脉獨調其尺以言其病之外知內爲之柰何歧伯對曰審其尺之緩急小大滑澀肉之晬而病形變死矣調之何如對曰脉急者尺之皮膚亦急脉急者尺之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚減而少脉大者尺之皮亦大脉滑者尺之皮膚亦滑脉滿者尺之皮膚亦濇凡此六畜有微有甚故善調尺者不待于寸善調脉者不待于色能參管行之可爲上工尺膚滑以淖澤者風也尺內弱解㑊安卧脫肉者寒熱也尺膚濇者風痺也尺膚龜如枯魚之鱗者水淡飲

也尺膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者汗且出尺膚寒甚脉小一作急

急

者泄少氣尺膚烜然

然甲乙作人手

先熟後寒者寒

熱也尺膚先寒久持之而熱者亦寒熱也尺烜然熟人迎大者

嘗奪血尺緊人迎脈小甚則少氣色白有加者立死肘所獨熱

者腰以上熱肘前獨熱者膺前熟肘後獨熱有肩背熱肘後龕

以下三四寸腸中有蟲手所獨熱者腰以上熱臂中獨熱者腰

腹熱掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒魚上白肉有青血脉

者胃中有寒

諸浮諸沈諸滑諸濶諸弦諸緊若在寸口膚以上病若在關

上膚以下病若在尺中腎以下病

寸口脉滑而遲不沈不浮不長不短爲無病左右同法

寸口太過與不及寸口之脈中手短者曰頭痛中手長者曰

足脛痛中手促上繫者曰有督痛

寸口脉浮而盛者病在外

寸口脉沈而堅者病在中

寸口脉沈而弱者曰寒熱

一作氣
又作中
及疝瘕少腹痛

寸口脉沈而弱必墮落

寸口脉沈而堅者心下有寒時痛有積聚

寸口脉沈晉中短氣

寸口脉沈而喘者寒熱

寸口脉但實者心勞

寸口脉緊或浮肺上有寒肺下有水氣

脈緊而長過寸口者注病

脈緊上寸口者中風頭痛亦如之

千金翼云亦為傷寒頭痛

脈弦上寸口者宿食降者頭痛

脉來過寸入魚際者遺尿

脉出魚際逆氣喘息

寸口脉濶滿如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰

寸口脉偏絕則臂偏不遂其人兩手俱絕者不可治兩手前

部陽絕者苦心下寒毒喙中熱

關上脉浮而大風在胃中張口有息心下澹澹食欲嘔

關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蛇蟲心健忘

關上脉滑而大小不匀千金二法是爲病方欲進不出一二日

復發發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死

關上脉緊而滑者蛇動

關上脉澀而堅大而實按之不減有力爲中焦實有伏結在

脾肺氣塞實在胃中

脈張急有力反令益言者浮之
大急之虛實故言有力也

關上脉澹大而尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕結聚欲復發發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止熱飲食關上脉時來時去乍大乍小乍踈乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘧狀

尺脉浮者客陽在下焦

尺脉細微溏泄下冷利

尺脉弱寸彊胃絡脉傷

尺脉虛小者足脰寒痠癱脚疼

尺脉澀下血不利多汗

素問又云尺澀脉滑謂之多汗

尺脉滑而疾爲血虛

尺脉沈而滑者寸白蟲

尺脉細而急者筋攣痺不能行

尺脉滯常熱者謂之熱中腰脅疼小便亦熱

尺脉偏滑疾面赤如醉外熱則病

平雜病脉第二

滑爲實爲下又爲陽氣失數爲虛爲熱浮爲風爲虛動爲痛爲驚

沈爲水爲實又爲陰氣失弱爲虛爲悸

遲則爲寒濇則少血緩則爲虛洪則爲氣一作熱緊則爲寒弦

數爲瘧

瘡脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則爲虛散則死

弦爲痛痺一作浮偏弦爲飲雙弦則脅下拘急而痛其人濇

濇惡寒

濇脉大寒熱在中

伏者霍亂

安卧脉盛謂之脫血

凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虛冷此等其脈並緊浮而大者風

浮大者中風頭重鼻塞

浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉

滑而浮散者攤緩風

滑者鬼疰

澀而緊癱病

浮洪大長者風眩癱疾

大堅疾者癱病

弦而鈎脇下如刀刺狀如蠶戶至困不死

緊而急者道戶

洪大者傷寒熱病

浮洪大者傷寒秋吉春成病

浮而滑者宿食

浮滑而疾者食不消脾不磨

短疾而消酒病

浮而細滑傷飲

遲而滑中寒有癥結

馳而緊積聚有擊痛

弦急痛痕小腹痛又爲癥病作脾病

遲而滑者脹

盛而緊曰脹

弦小者寒病

沈而弦者懸飲內痛

弦數有寒飲冬夏難治

緊而滑者吐逆

小弱而濡胃反

遲而緩者有寒

微而緊者有寒

沈而遲腹藏有冷病

微弱者有寒少氣

實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治

一作時時脹
指留難治

滑數心下結熱盛

滑疾胃中有熱

緩而滑曰熱中

沈淳一作停而急病傷寒暴發虛熱

浮而絕者氣

辟大而滑中有短氣

浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也

沈而數中水冬不治自愈

短而數心痛心煩

弦而緊腸痛藏傷有瘀血

一作寒血

沈而滑爲重亦爲脊督痛

脉來細而滑按之能虛因急持直著僵仆從高墮下病在內

微浮秋吉冬成病

微數雖不成病不可勞

浮滑疾緊者以合首病久易愈

陽邪來見浮洪

陰邪來見沈細

水穀來見堅實

脈來乍大乍小乍長乍短者爲稟

脉來洪大媚二者社稟

脉來沈三澤二四支不仁而重主稟

脉與肌肉相得久持之至者可下之

弦小緊者可下之

季門數寒熱俱發必下乃愈

弦逢者宜溫藥

累數者可發其汗

診五藏六腑氣絕證候第三

病人肝絕八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人

汗泣一作目二出如水不止自死

病人膽絕七日死何以知之眉爲之傾

病人筋絕九日死何以知之手足爪甲青吟罵不休一日死

病人心絕一日死何以知之有息回視立死

一日死

病人腸二云小腸絕六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白

汗不止

病人脾絕十二日死何以知之口冷足腫腹熱膚張泄利不

覺出無時度一日死

病人胃絕五日死何以知之脊痛晝中重不可反覆

一日死

病人肉絕六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤

一日死

足死體九

病人肺絕三日死何以知之口張但氣出而不還

一日鼻口虛張短氣

病人大腸絕不治何以知之泄利無度利絕則死

病人腎絕四日死何以知之齒爲暴枯面爲正黑目中黃色

署中欲折白汗出如流水

一日人中平七日死

病人骨絕齒黃落十日死

諸浮脉無根者皆死已上五藏六腑爲根也

診四時相反脉證第四

春三月木王肝脉治當先至心脉次之肺脉次之腎脉次之此爲四時王相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此爲腎反脾也七十日死謂腎反脾夏火王心脉當先至肺脉次之而反得腎脉謂腎反脾期五月六月忌丙丁

脾反肝三十日死何爲脾反肝春肝脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月壬申乙

腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝也期七月八月忌庚辛

腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心也期六月忌戊己忌值等按千金二云此巾不論肺金之氣躁畧未諭指南又推五行亦猶類倒待求別錄也

論損至脉第五

脉有損至何謂也然至之脉一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此至之脉也何謂損一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此損之脉也至脈從下上損脉從上下也損脉之爲病柰何然一

損損於皮毛皮聚而毛落一損損於血脉血脉虛少不能榮於五藏六府也三損損於肌肉肌肉膚瘦食飲不為肌膚四損三於筋筋緩不能自收持五損三於骨二痿不能起於牀反此者至於收病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下上者皮聚而毛落者死治損之法柰何然損其肺者益其氣損其心者益其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精氣此治損之法也

脉有一呼再至一吸再至一呼三至一吸三至一呼四至一吸四至一呼五至一吸五至一呼六至一吸六至一呼一至一吸一至再呼一至再吸一至呼吸再至脉來如此何以別知其病也然脈來一呼再至一吸再至不大不小曰平一呼三至一吸三至爲過得兩至之後小即頭痛目眩前小後大即嘯滿短氣

一呼四至一吸四至病適欲甚脈洪大者苦煩滿沈細者腹中
痛滑者傷熱澀者中霧露一呼五至一吸五至其人當困沈細
即夜加浮大卽晝加不大小雖困可治其有大小者爲難治一
呼六至一吸六至爲十死脉也沈細夜死浮大晝死一呼一至
一吸一至名曰損人雖能行猶當一吸未半牀所以然者血氣皆
不足故也再呼一至再吸一至名曰无竄无竄者當死也人雖
能行名曰行尸

扁鵲曰脉一出一入曰平再出一入少陰三出一入太陰四出
一入厥陰再入一出少陽三入一出陽明四入一出太陽脉出
者爲陽入者爲陰故人一呼而脉再動氣行三寸一吸而脉再
動氣行三寸呼吸定息脉五動一呼一吸爲一息氣行六寸人
十息脉五十動氣行六尺二十息脉百動爲一備之氣以應四

時天有三百六十日人有三百六十五節晝夜漏下水百刻
一備之氣脈行丈二尺一日一夜行於十二辰氣行盡則周遍
於身與天道相合故曰平平者无病也陰陽是也肺再動
爲二至再至而緊則奪氣一刻百三十五息十刻千三百五十
息百刻萬三千五百息二刻爲一度一度氣行一周身晝夜五
十六度脉三至者離經一呼而脉三動氣行四寸半人一息脉七
動氣行九寸十息脉七十動氣行九尺一備之氣脈百四十動
氣行一丈八尺一周於身氣過百八十度故曰離經離經者病
一陰一陽是也三至而緊則奪血脉四至則奪精一呼而脉四
動氣行六寸人一息脉九動氣行尺二寸人十息脉九十動氣
行一丈二尺二備之氣脈百八十動氣行二丈四尺一周於身
氣過三百六十度再遍於身不及五節一時之氣而重至諸脉

浮濶者五藏无精難治一陰二陽是也四至而緊則奪形脉五至者死一呼而脉五動氣行六寸半當行七寸半人一息脉十一動

氣行尺三寸當行五寸人十息脉百

十動氣行十二寸

當行三寸

周於身三百

當行五尺

周於身三百

一備之氣脉二百二十動氣行二丈六尺當行二丈

周於身三百

當行三寸

周於身三百

六十五節氣行過五百四十度再周於身過百七十度一節之

氣而至此氣浮濶經行血氣竭尽不守於中五藏痿瘠精神散

亡脉五至而緊則死三陰一作二陽是也雖五猶未如之何也

脉一損一乘者人一呼而脉一動人一息而脉再動氣行二寸

十息脉二十動氣行三尺一備之氣脉四十動氣行六尺不及

周身百八十節氣短不能周遍於身苦少氣身躊躇墮委脉再

損者人一息而脉一動氣行一寸五分人十息脉十動氣行六

五寸一備之氣脉二十動氣行三尺不及周身二百節漸氣血

盡經中不能及故曰離經血去不在其處小大便皆血也脉三分一備之氣脉十四動氣行三尺一寸當行二尺不及周身二百

九十七節故曰爭氣行血流不能相與俱微氣閉實則膏滿藏枯而爭於中其氣不朝血凝於中死矣脉四損者再息而脉

動人十息脉五動氣行七寸半一備之氣脉十動氣行尺五寸

不及周身三百一十五節故曰亡血亡血者忘失其度身羸皮

皮裏骨故血氣俱尽五藏失神其死神矣脉五損者人再息復

一呼而脉一動人十息脉四動氣行六寸一備之氣脉八動氣

行尺二寸不及周身三百二十四節故曰絕絕者氣急不下牀

口氣寒脉俱絕死矣岐伯曰脉失四時者爲至啓至啓者爲損

至之脉也損之爲言少陰主腎爲重此志損也飲食衰減肌肉

消者是慧損也身安卧卧不便利耳目不明是魂損也呼吸不
相通五色不華是魄損也四肢皆見脉爲亂是神損也大損三十
歲中損二十歲下損十歲損各以春夏秋冬平人人長脉短
者是大損三十歲人短脉長者是中損二十歲手足皆細是下
損十歲失精氣者一歲而損男子左脉短右脉長是爲陽損半
歲女子右脉短左脉長是爲陰損半歲春脉當得肝脉反得脾
肺之脉損夏脉當得心脉反得肾脉之脉損秋脉當得肺脉反
得肝心之脉損冬脉當得肾脉反得心脾之脉損當審切寸口
之脉知絕不絕前後去爲絕掌上相擊堅如彈石爲上脉虛盡
下脉尚有是爲有胃氣上脉盡下脉堅如彈石爲有胃氣上下
脉皆盡者死不絕不死者皆生是損脉也至之爲言語音潔
遠視儻儻是志之至也身體粗大飲食暴多是意之至也語

妄見手足相引是魂之至也。龍怒華色是魄之至也。脉微小不
相應呼吸自大是神之至也是至脉之法也。死生相應病各得
其氣者生半得其半也。黃帝曰善。

診脉動止投數疎數死期年月第六

脉一動一止二日死

一經云死

二動一止三日死三動一止四日

死或五日死四動一止六日死五動一止五日死或七日死六

動一止八日死七動一止九日死八動一止十日死九動一止

九日死又云十一日死

一經云死

十動一止立夏死

春十一動一止夏至死

一經云死

十二十三動一止立秋死

一經云死立冬死

一經云死

十四十五動一止立冬死

立夏死三十動一止二歲死

一經云死

三十五動一止三歲死

或二歲死三十動一止二歲若三歲死

一經云死

三十五動一止三歲死

四十動一止四歲死五十動一止五歲死不滿五十動一止五

歲死

脈來五十投而不止者五藏皆受氣即無病

千金方二云五行氣畢陰陽數同

榮衛出入經脉逆流
晝夜百刻五德相生

脈來四十投而一止者一藏無氣却後四歲春草生而死

脈來三十投而一止者二藏無氣却後三歲麥熟而死

脈來二十投而一止者三藏無氣却後二歲桑椹赤而死

脈來十投而一止者四藏無氣歲中死得節不動出清明日

死遠不出穀雨死矣

脈來五動而一止者五藏無氣却後五日而死

脈一來而久住者宿病在心主中治

脈二來而久住者病在肝枝中治

脉三來而久住者病在脾下中治

脉四來而久住者病在腎間中治

脉五來而久住者病在肺枝中治

五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

診百病死生決第七

診傷寒熱盛脈浮大者生沈小者死
傷寒已得汗脈沈小者生浮大者死

溫病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小難得者死不治

溫病穰穰大熱其脈細小者死千金穰穰作時行

溫病下利腹中痛甚者死不治

溫病汗不出出不至足者死厥逆汗出脈堅彊急者主虛緩

者死

溫病二三日身體熱，腹滿頭痛，食飲如故，脈直而疾者八日死。四五日頭痛，腹痛而吐，脈來細彊十二日死。八九日頭不疼，身不痛，目不赤，色不變，而反利，脈來牒牒，按之不彈，手時大心下堅十七日死。

熱病七八日，脈不軟一作不散數者，當發瘧一作瘧後三日溫汗不出者死。

熱病七八日，其脈微細小便不利，加暴口燥，脈代舌焦乾黑者死。

熱病未得汗，脈盛躁，得汗者生，不得汗者難差。
熱病已得汗，脈靜安者生，脉躁者難治。

熱病已得汗，常大熱不去者亦死。大作專

熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治

熱病發熱熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利

診人被風不仁痿躰其脉虛者生堅急疾者死

診癲病虛則可治實則死

癲疾脉實堅者生脉沈細小者死

癲疾脉搏大滑者久久自己其脉沈小急實不可治小堅急亦不可療

診頭痛目痛久視無所見者死以視一
作視

診人心腹積聚其脉堅彊急者生虛弱者死又實彊者生沈者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便血脉大時絕極下血脉小疾者死

心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死

腸澼便血身熱則死寒則生

腸澼下白沫脈沈則生浮則死

腸澼下膿血脈懸絕則死滑大則生

腸澼之屬身熱脈不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之
腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死

腸澼筋攀其脉小細安静者生浮大緊者死

洞洩食不化不得留下膿血脉微小連者生緊急者死

洩注脉緩時小結者生浮大數者死

匱蝕陰症其脉虛小者生緊急者死

欬嗽脉沈緊者死浮直者生浮軟者生小沈伏匿者死

欬嗽羸瘦脉形堅大者死

欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下一本云本脫形熱不去者死

歟而嘔腹脹且洩其脈弦急欲絕者死

吐血衄血脉滑小弱者生實大者死

汗出若衄其脉小滑者生大躁者死

唾血脉緊彊者死滑者生

吐血而歟上氣其脉數有熱不得卧者死

上氣脈數者死謂其形損故也

上氣喘息低昂其脉滑手足溫者生脈涩四肢寒者死

上氣面浮腫有息其脉大不可治加利必死一作又甚

上氣注液其脉虛盜寧伏匿者生堅彊者死

寒氣上攻脈實而順滑者生實而逆涩者死

太素云寒氣暴
曰實而滑則生實而逆則死其脉虛滿何如曰卒形盡滿
者脉急大堅尺滿而不應如是者順則生逆則死何謂順則
生逆則死曰所謂順者手足溫也謂逆者手足寒也

瘡癰脉實大病久可治脈懸小堅急病久不可治

消渴脉數大者生細小浮短者死

消渴脉沈小者生實堅大者死

水病脉洪大者可治微細者不可治

水病脈閉其脉浮大軟者生沈細虛小者死

水病腹大如鼓脉實者生虛者死

卒中惡吐血數升脉沈數細者死浮大疾快者生

卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮者死緊細而
微者亦生

病瘡脹脊彊急痺澀者皆不可治

寒熱更癲其脉代絕者死

金瘡血出太多其脉虛細者生數實大者死

金瘡出血脉沈小者生浮大者死

斫瘡出血一二石脉來大二十日死

斫刺俱有病多少血出不自止斷者其脉止脉來大者七日

死滑細者生

從高傾仆內有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死

人爲百藥所中傷脈浮澀而疾者生微細者死洪大而遲者

三平金遲

人病甚而脉不調者難差

人病甚而脉洪者易差

人內外俱虛身體冷而汗出微懶而煩擾手足厥逆體不得

安靜者死

脉實滿手足寒頭熱者死坐立更死

老人脉微陽羸陰彊者生脈發大加息一作急者死陰弱陽彊
脉至而代奇一作寄月而死

尺脉潛而堅爲血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此爲婦人胞中絕傷有懶血久成結瘕得病以冬時寒禁亦而死尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不充病得節輒動乘葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏勁乍大乍小不齊從寸口至關關至尺二部之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而死桃花一

右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時時復來者

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止

不動止歇

連連相因不與息數相應其人雖食穀猶不愈繁草生而死

左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循

張弓弦絇短然如兩人共引一索至立冬死

子金作至立春而死

診三部脉虛實決死生第八

三部脈調而和者生

三部脈廢者死

三部脉虛其人長病得之死虛而濶長病亦死虛而滑亦死虛而緩亦死虛而弦急癲病亦死

三部脉實而大長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲癩可治

三部脉彊非稱其人病便死

二部脉羸非其人脉一作得之死

二部脉龐長病得之死卒病得之生

二部脉細而軟長病得之生細而數亦生微而緊亦生

二部脉大而數長病得之生卒病得之死

二部脉微而伏長病得之死

二部脉軟濡一作長病得之不治自愈治之死卒病得之生

二部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死浮而數長病

風得之生卒病得之死

三部脉芤長病得之生卒病得之死

二部脉弦而數長病得之生卒病得之死

三部脉革長病得之死卒病得之生

三部脉堅而數如銀錢股鹽毒病必死數而軟鹽毒病得之生

二部脉漱漱如羹上肥長病得之死卒病得之生

二部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生

三部脉如癱瘓長病得之死三十日死

三部脉如弓弦長病得之死

三部脉累累如貫珠長病得之死

二部脉如水淹然流長病不治自愈治之反死一二不治水淹者長病四十日死

自死如水不流者
長病不治自愈

二部脉如屋漏長病十日死四十金云十日死

三部脉如雀啄長病七日死

三部脉如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死

三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下差

新刊王氏脉經卷第五

朝散太李光豫鄉嘉
嘉閣判醫院檢院上護軍臣林億等類次

張仲景論脉第一

扁鵲陰陽脉法第二

扁鵲脉法第三

扁鵲華佗察聲色要訣第四

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

張仲景論脉第一

○脉有二部陰陽相乘榮衛氣血在人體躬千金作行人躬而呼吸出

入上下於中因息遊布津液流通隨時動作微象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脉大小不同一時之間變無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易准良氏歸

心迷意惑動失紀綱願爲縷陳令得分明

師曰子之所問道之根源脉有三部尺寸及關榮衛流行不失衡鉉腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失鍊分出入昇降漏刻周旋水下二刻白憲等著水下一刻氣接舊本如此脉一周身旋復寸口虛實見焉變化相衆陰陽相干風則浮虛寒則緊弦沈潛水瀆支飲急弦動弦爲痛數洪熱煩設有不應知變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空見終必有奸審審表裏三焦別分知邪所舍消息詮看料度腑藏獨見若神爲子條記傳與賢人

扁鵲陰陽脉法第二

○脉平旦曰太陽日中見陽明晡時曰少陽黃昏曰少陰夜半曰太陰雞鳴曰厥陰是三陰三陽時也

○少陽之脉乍小乍大乍長乍短動搖六分王十一月甲子夜半正月二月甲子王

○太陽之脉洪大以長其來浮於筋上動搖九分三月四月甲子王

○陽明之脉浮大以短動搖三分大前小後狀如斜斗甚至跳五月六月甲子王

○少陰之脉緊細動搖六分王五月甲子日申七月八月甲子王
○太陰之脉索細以長乘於筋上動搖九分九月十月甲子王
○厥陰之脉沈短以緊動搖三分十一月十二月甲子王

○厥陰之脉急弦動搖至六分已上病逕脈寒少腹痛引腰形喘者死脉緩者可治刺足厥陰入五分

○少陽之脉乍短乍長乍大乍小動搖至六分已上病頭痛脇

下滿嘔可治擾即死

亦僵可治僵即死

刺兩季肋端足少陽也

入七分

○陽明之脉洪大以浮其來滑而跳大前細后狀如科斗動搖至三分已上病眩頭痛腹滿痛嘔可治擾即死刺肺上四寸

脾下三寸各六分

○從二月至八月陽脈在表從八月至正月陽脈在裏附陽脈強附陰脉弱至則驚突則癲癇細而沈不癲癇即泄泄即煩煩即渴渴即腹滿滿即擾擾即腸澼澼即脉代乍至乍不至大而沈即欬欬即上氣上氣甚則肩息肩息甚則口舌血出血出甚即鼻血出變出寸口陰陽表裏以互相乘如風有道陰脉乘陽也寸口中前後溢者行風寸口中外實因不滿者三風四溫寸口者勞風勞風者大病亦發駛行汗出亦發寒風者上下微三扶骨是其診也表緩腹內急者寒風也猥雷

實來者飄風從陰趨陽者風邪一來調一來速鬼邪也陰緩
陽急者表有風來入藏也陰急者風已抱陽入腹上承之下
宛宛不能至陽流飲也上下血微陰強者爲漏僻陽強者酒
僻也偃偷不過微反陽滯謀也陰扶胃絕者從寸口前頭趣
於陰汗水也來調四布者欲病水也陰脉不偷陽脉傷復少
津寸口中後大前充至陽而實者僻食小過陽一分者七日
僻二分者十日僻三分者十五日僻四分者二十日僻四分
中伏不過者半歲僻敷敷不至胃陰一分飲餌僻也外勾
者久僻也內卷者十日以還外強內弱者裏大核也井浮而
弦者汁核井浮緊而數如沈病暑食粥微一作有內緊而伏麥
餅若餅寸口脉倚陽緊細以微瓜柔皮也若倚如緊者藏來
也蹠蹠無數牛肉僻也附陽者蒸肉僻也小楷生浮大如故

麥豆也

扁鵲脉法第三

扁鵲曰人一息脉二至謂平脉體形無苦人一息脈三至謂病脈一息四至謂痺者脫脈氣其眼睛青者死人一息脈五至以上死不可治也都聲一作息病脈來動取極五至病有六七至也扁鵲曰平和之氣不緩不急不滑不濶不存不亡不短不長不俛不仰不從不橫此謂平脉腎一作緊多如此一作身無苦也扁鵲曰脈氣弦急病在肝少食多厭裏急多言頭眩目痛腹滿筋攣癲疾上氣少肢精堅時時唾血咽喉中乾相病之法視色聽聲觀病之所在候脉要訣並不微乎脉浮如數熱者風也若浮而數而有熱者氣也脉洪大者又兩乳勞動脈復數加有寒熱此傷寒病也若羸長病如脈浮濶

寸口復有微熱此症氣病也如得寒又多熱在廁乍差難治
也又療無劇者易差不欬者易治也

扁鵲華佗察聲色要訣第四

病人五藏已奪神明不守聲嘶者死

病人循衣縫譖言者不可治

病人陰陽俱絕掌衣燄空妄言者死

病人妄語錯亂又不能語者不治熟病者可治

病人陰陽俱絕失音不能言者三日半死

病人兩目皆有黃色起者其病方愈

病人面黃目青者不死青如草滋死

病人面黃有白者不死白如枯骨死

病人面黃赤者不死赤如鮮血死

病人面黃目黑者不死黑如焰死

病人面目俱等者不死

病人面黑目青者不死

病人面青目白者死

病人面黑目白者不死

病人面赤目青者六日死

病人面黃目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經
膽氣妄泄目則爲青雖有天救不可復生

病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣內索面色反好急
求棺槨

病人面白目黑者死此謂榮華已去血脉空索

病人面黑目白者八日死腎氣內傷病因留積

病人面青目裏者五日死。病人者牀心痛短氣脾竭內傷百日便能起。停徨因坐於地其亡倚牀能治此者可謂神良病入面無精光若土色不受飲食者四日死。

病人目無精光及不齒黑色者不治

病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死

病人耳目及顧頰赤者死在五日中

病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顧上者亦死在五日中

病人黑氣出天中下至鼻上顧上者死

千金翼云天中者鼻上也。上在鼻上而曰側髮際鼻上在鼻上而曰側

病人及健人黑色若白色起入目及鼻口死在三日中

病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死

病人面黑目直視惡風者死

病人面黑脣青者死

病人面青脣黑者死

病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死

病人面回回直視有息者一日死

病人頭目久痛卒視無所見者死

病人陰結陽絕目精脫恍惚者死

病人陰陽絕竭目眶陷者死

病人眉系傾者七日死

病人口如魚口不能復閉而氣出多不反者死

病人口張者三日死

病人口脣青人中反三日死

病人口脣青人中反者死

病人脣口忽乾者不治

病人脣腫齒焦者死

病人陰陽俱竭其齒如熟小豆其脉歇者死

病人齒忽變黑者十三日死

病人舌卷外縮者必死

病人汗出不流舌卷黑者死

病人髮直者十五日死

病人髮如乾麻善怒者死

病人髮與眉衝起者死

病人爪甲青者死

病人爪甲白者不治

病人手足爪甲下肉黑者八日死

病人榮衛竭絕面浮腫者死

病人卒腫其面蒼黑者死

病人手掌腫無文者死

病人臍脇反出者死

病人陰囊莖俱腫者死

病人脈絕口張足腫五日死

病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死

病人目遺屎不覺者死

病人尸臭者不可治

肝病皮黑肺之日庚辛死

心病目黑腎之日壬癸死

脾病脣青肝之日甲乙死

肺病頰赤目腫心之日丙丁死

腎病面腫脣黃脾之日戊己死

青欲如蒼壁之澤不欲如藍

赤欲如帛裹朱不欲如赭

白欲如鵝羽不欲如鹽

黑欲重漆不欲如炭

黃欲如蘿裹雄黃不欲如黃土

目色赤者病在心白在肺黑在腎黃在脾青在肝黃色不可
名者病胷中

診目病赤脉從上下者太陽病也從下上者陽明病也從外
入內者少陽病也

診寒熱瘰疬目中有赤脉從上下至瞳子見一脉一歲死見
一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三

脉三歲死

診齶齒痛按其陽明之脉來有過者獨熱在右右熱在左左熱在上上熱在下下熱

診血者脉多赤多熱多青多痛多黑爲少暉多赤多黑多青皆見者寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也安卧少黃赤脉小而濡者不嗜食

扁鵲診諸反逆死脉要訣第五

扁鵲曰夫相死脉之氣如群鳥之聚一馬之馭糸水交馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也

脉病人不病脉來如壅漏雀啄者死壅漏者其來既絕而止時時復起而不相連屬也坐死者脉來甚數而疾絶止復頓來也又經言得病七八日脉如壅漏雀啄者

死
肺彈人手
如黍米也

脉來如彈石去如解索者死

彈石者僻辟急也解索者動微而隨散亂無度不外也

脉因病人脉如蟬之游如魚之翔者死

蟬游若弗弗而起奔復退沒不知所存久

乃指起起脈遲而漫太過者是也魚翔者似
與不行而已掉尾動頭身持而久住者是也

脉如懸薄卷索者死

脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌不去者死脉忽去忽來暫止復來者死脉中侈者死脉分絕者死

上下分也

脉有表無裏者死經名曰結去即死何謂結脉在指下如麻子動搖屬腎名曰結去死近也脉五來一止不復增減者死經名曰代何謂代脉五來一止也脉七來是人一息半時不復增減亦名曰代正死不疑

經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已其死生

存亡可切脉而知之邪然可具知也設病者若閉目不欲見人者脉當得肝脉弦急而長反得肺脉浮短而濇者死也病若閉目而渴心下牢者脉當得緊實而數反得沈滑而微者死病者吐血復翹劔者脉當得沈細而反浮大牢者死病若譖言妄語身當有熱脉當洪大而反手足四逆脉反沈細微者死病若大腹而濺脉當微細而濺反得緊大而滑者死此之謂也

經言形脈與病相反者死亦尙然病若頭痛目痛脉反短濇者死之

病若腹痛脉反浮大而長者死

病若腹滿而喘脉反滑利而沈者死

病若四肢厥逆脉反浮大而短者死

病若耳聾脈反浮大而濶者死

平金翼云脉大者生沈遲細者註筋

病若目聰聰脈反大而緩者死

左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此爲逆逆者死不可治脉來沈之絕濡浮之不止推手者半月死

半日

脉來微細而絕者人病當死

人病脉不病者生脉病人不病者死

人病尸厥呼之不應脉絕者死脉當大反小者死

肥人脉細小如絲欲絕者死

羸人得躁脉者死

人身體而脉來往滑者死

人身滑而脉來往澀者死

人身小而脉來往大者死

人身短而脉來往長者死

人身長而脉來往短者死

人身大而脉來往小者死

尺脉不應寸時如馳半日死

千金云尺脉上應寸口太遲者半日死

肝脾俱至則穀不化肝多即死

肺肝俱至則癰疽四肢重肺多即死

心肺俱至則癰消渴解愈心多即死

腎心俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎多即死

脾腎俱至則五藏敗壞脾多即死

肝心俱至則熱甚癰癧汗不出妄見鬼

肝腎俱至則病瘕少腹痛婦人月便不來肝滿腎滿皆實則爲腫肺之癥喘而兩胠滿肝雍溼肢滿卧則驚不得小

便腎雍脚下至小腹滿脹有大小便脈大躁易偏枯心肺滿
大癟癩筋攣肝脉小急癟癩筋攣肝脉驚暴有所驚駭脉不
至若瘡不治自己腎脉小急肝脉小急心脉小急不鼓皆爲
瘕腎脉并沈爲石水并浮爲風水并虛爲死并小弦欲驚腎
脉大急沈肝脉大急沈皆爲疝心脉搏滑急爲心疝肺脉沈
搏爲肺疝脾脉外鼓沈爲腸澼久自己肝脉小緩爲腸澼易
治腎脉小搏沈爲腸澼下血溫身熟者死心肝澼亦下血
二藏同病者可治其脉小沈濇者爲腸澼其身熟者死熱見
七日死胃脉沈鼓濇胃外鼓大心脉小緊急皆脯偏枯男子
發左女子發右不瘡舌轉可治三十日起其順者瘡三歲起
年不滿二十者二歲死脉至而搏血衄身有熱者死脈來如
懸鈎穿爲熱脉至如喘名曰氣厥氣厥者不知與人言素問
甲乙

厥脈至如數使入暴驚三四日自己脈至浮合浮合如數一息平至十至以上是爲經氣子不足也微見九十日死脉至如火新然是心精之子奪也革乾而死脉至如散棄是肝氣予虛也木葉落而死木葉落作棄華

脉至如省客省客者脉塞而鼓是腎氣子不足也懸去棄華而死脉至如泥丸是胃精子不足也榆莢落而死素問英作棄華

脉至如橫格是膽氣子不足也未熟而死脉至如弦緩是胞精予不足也病善言下霜而死不言可治脉至如交漆者左右傍至也微見四十日死甲乙作交漆脉至如涌泉浮鼓肌中是太陽氣子不足也少氣味乏英而死脉至委委土素問作之顏土狀按之不得是肌氣子不足也五色先見黑白蟲黑蟲作之發死脉至如懸雍懸雍者浮揣切之聳大是十二俞之子不足也

水凝而死脉至如偃刀偃刀者浮之小急也按之堅大急五藏死寒熱獨井於腎也如此其人不得坐立春而死脉至如丸滑不直手不直手者按之不可得也是大腸氣子不足也棄葉生而死脉至如春者令人善恐不欲坐卧行立常聽是小腸氣子不足也季秋而死

問曰嘗以春二月中脉一病久其脉反沈師記言到秋當死其病反愈到七月復病因往脉之其脉續沈復記言至冬死問曰三月中得沈脉何以故處之至秋死也師曰二月之時其脉自當濡弱而弦得沈脉到秋自沈脉見浮即死故知到秋當死也七月之時脉復得沈何以處之至冬當死師曰沈脉屬腎其藏脉也非時妄見

經言王相因死冬脉本王脉不再見故知至冬當死也然後

至冬復病正以冬至日死故知爲諦華佗倣此

新刊王氏脉經卷第五

新刊王氏脉經卷第六

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝病證第一

膽病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

病證第九

膀胱病證第十

三焦病證第十一

肝足厥陰經病證第一

○肝氣虛則恐 實則怒 肝氣虛則夢見園苑生草得其時則夢
伏樹下不敢起 肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木
○病在肝平旦慧下晡盛夜半靜

○病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一月之脾閉塞不通身痛
體重二日之胃而腹脹三日之腎少腹腰脊痛脛痠十日不
已死冬日入夏早食肝脉搏堅而長色不青當病嘔瀉若搏
因血在脇下令人喘逆若更而散其色澤者當病溢飲溢飲
者濁暴多飲而溢一作易入肌皮腸胃之外也
○肝脉沈之而急浮之亦然苦脇下痛有氣支滿引少腹而滿

時小便難苦目眩頭痛腰背痛足爲逆寒時產女人月使不來時亡時有得之少時有所墜瀆

○青脉之至也長而左右彈診曰有積氣在心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足清頭痛

○肝中風者頭目瞼脣脇痛行常僵令人嗜甘如阻歸狀

○肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤黧黧有汙膚中煩熱肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作大燥善太息膏中痛不得轉側時盜汗欬食已吐其沫肝主膏中喘怒罵其脈沈肓中火窒欲令人推按之有熱鼻窒

○凡有所墜壅惡血留內苦有所大怒氣上而不能下積於左脇下則傷肝肝傷者其人脫肉又臥日欲得張時時手足青目瞑瞳人痛此爲肝藏傷所致也

○肝脹者肠下滿而痛引少腹

○肝水者其人腹大不能自轉側而肠下腹中痛時時津液微生小便續通

○肺乘肝即爲癰腫心乘肝必吐利

○肝著者其病人常欲蹈其背上先未苦時但欲飲熟肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久不愈發欬逆痰瘡連歲月不已以季夏戊己日得之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受因留結爲積故知肥氣以季夏得之

○肝病其色青手足拘急脇下並滿或時眩冒其脉弦長此爲可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中都皆瀉之又當灸期門百

壯臂第九椎五十壯

○肝病者必兩脇下痛引少腹令人善怒虛則目睭睭無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經

○足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內脈妄變節時腫取之行間以引腸下補三里以溫胃中取血脉以散惡血取耳間青脉已去其癢足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足趺上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股入陰毛中環陰器抵少腹傍胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頸顙連目系上出額與督脈會於顛其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則憊腰痛不可以稅仰丈夫頸疝婦人少腹腫甚則嗌乾而塵脫

色是主肝所生病者嘔滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

○足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陰其別者循經上舉結於莖其病氣逆則舉腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別肝病嘔滿腸脹善恚怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不伸面目白身體滑其脉當弦長而急今反短濶其色當青而反白者此是金之刻木爲大逆十死不治

膽足少陽經病證第二

○膽病者喜太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之噬中介然數喫候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉善嘔有苦汁長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰

嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽經絡以開膽却調其虛實以去其邪也

膽脹者脇下痛脹口苦不息

厥氣客於膽則夢鬪訟

足少陽之脉起於目允眥上抵頭角下耳後循頸行

手少陽之脉前至肩上却交手少陽之後入缺盆其支者從

耳後入耳中出走耳前至允眥後其支者別允眥下大迎合

手少陽於頸一本云別允眥上迎手少陽於頸下加頰車下頸合缺盆以下

胷中貫膈絡肝屬膽循肋裏出氣街遼毛際橫入髀厥中其

直者從缺盆下腋循胷中過季脇下合髀厥中以下循髀陽

出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端不出外踝之前

循足趺上出小指次指之端其支者趺上入大指之間循大

指歧內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息
心脇痛不能反側甚則面微塵躰無膏澤足外反熱是爲陽
厥是主骨所生病者頭痛角領痛泪允皆痛缺盆中腫痛腋
下腫馬刀挾癰汗出振寒瘧月中脇肋髀膝外至肘絕骨外
踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸
口虛者則人迎反小於寸口也

心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其
時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢立
山煙火

病在心日中慧夜半甚平旦靜

病先發於心者心痛一日之肺喘數二日之肝脇痛支滿五

日之脾閉塞不通身痛體重一日不已死冬夜半寢日中
心脉搏堅而長當病舌卷不能言其更而散者當消渴而已
心脉沈之小而緊浮之不端苦心下聚氣而痛食不下喜咽
唾時手足熱煩渴時忘不樂喜太息得之憂思亦厭之至也
喘而堅訥有積氣在中時害於食名曰心癰得之外疾思
慮而心虛故邪從之

心脉急名曰心疝少腹當有形其以心爲牡藏小腸爲之使
故少腹當有形

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬於心心氣虛者
其人即畏寒作衰合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰
氣衰者即爲鬱陽氣衰者即爲狂五藏者魂魄之宅舍精神
之所依託也魂魄飛揚者其五藏空虛也即邪神居之神靈

所使鬼而下之脉短而微其藏不足則魂魄不安魂屬於肝
魄屬於肺肺主津液即爲涕泣肺氣衰者即爲泣出肝氣衰
者魂則不安肝主喜怒其聲呼

心中風者拿拿發熱不能起心中飢而欲食食則嘔

心中寒者其人病心如噉蒜狀劇者心痛徹背皆痛徹心如
蟲注其脉浮者自吐乃愈

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚恚忘善怒心傷者其人勞倦
即頭面赤而下重心中痛徹背自發煩熱當臍挑手其脉弦
此爲心藏傷所致也

心脹者煩心短氣卧不安

心水者其人身體重腫一作腫而少氣不得卧煩而躁其陰大腫

腎衆心必壅

真心痛手足清至節心痛其旦發夕死夕發旦死

心腹痛懊惱發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱苦渴涎出者是蛇咬也以手聚而堅持之毋令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲蛇咬皆不可取以小針心之積名曰伏梁起於脅上上至心大如臂父二不愈病煩心二痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心二當傳肺肺適以秋壬王者不受邪心復欲不腎二不肯受因留結爲積故知伏梁以秋得之

心病甚色赤心痛氣短手掌煩熱或啼笑驚懼悲思怨慮而赤身熱其脉洪大而數此爲可治春當刺中衝夏刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬刺曲澤皆鴻之心包絡經

心病者肾內痛脇支澑兩脇下痛膺督脊甲間痛兩臂內痛虛則脣腹大腸下與腰背相引而痛取其經手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者

邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而謂之其輸

○黃帝曰手少陰之脈獨无輸何也岐伯曰少陰者心脉也心者五臟六腑之大主也心為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能客客之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰无輸焉少陰无輸心不病乎

對曰其外經肺病藏不病故獨取其經於掌后兌骨之端也

○手心主之脉起於掌中出屬心包下膈歷絡二臟其支者循脣出脣下腋二寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入

肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攀急腰脰甚則脣脛支痛心中澹澹太動而赤目黃善笑不休是主脉所生病者煩心三痛掌中熱甚著則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

○手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣穴則心痛虛則煩心取之兩筋間

○心病煩悶少氣大熱熱上蓋心嘔吐欬逆狂語汗出如珠身體厥冷其脉當浮今反沈濡而滑其色當赤而反黑者此是水之刻火爲大逆十死不治

小腸手太陽經病證第四

○小腸病者少腹痛腰脊挾睾而痛時蹇之復耳前熱若寒甚

獨有上熱及手小指次指之間熱若脈陷者此其候也

○少腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肓結於厥作音故取之肓原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

○小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔

○小腸有宿食常暮發熱明日復止

○小腸脹者少腹脹長引腹而痛

○厥熱客於小腸則夢聚邑街衢

○手太陽之脉起之於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側筋骨之間上循臑外後廉出有鮮繞肩甲交有上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支

者從缺盆循頸上頰至目眎却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眎斜絡於顴是動則病嗌痛鎖腫不可以顧似拔膿似折是毒液所生病者耳聾目黃頰鎖腫頸有膿肘臂外後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反於寸口也

脾足太陰經病證第五

○脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹溼泄不利

○脾氣虛則夢飲食不足得其時則夢築垣蓋臺脾氣盛則夢歌樂體重手足不華厥氣客於脾則夢丘陵大澤壞室風雨○病在脾日昧慧平旦甚日中持下晡靜

○病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二日之腎少腹腰脊痛腔廩三日之膀胱督筋痛小便閉十日不

已死冬人定夏餐

○脾脈搏堅而長其色黃當病少氣其裏而散色不澤者當病足骨腫若水狀

○脾脈沈之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不嗜食食而不化大便難四肢苦痺時不得之房內月便不來來而頻併

○黃脈之至也大而虛有積氣在腹中直厥兼名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風

○寸口脉弦而滑弦則爲痛滑則爲急急則爲躁急躁相搏即脅脇擔急

○趺陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣衰微衰相搏即呼吸不得此爲脾家失度

○寸口脉雙緊即爲入其氣不出無表有裏心下痞堅

○趺陽脉微而澁微即無胃氣澁即傷脾寒在於膈而及下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胃膈上虛下實穀氣不通爲閉塞之病

○寸口脉緩而遲緩則爲陽其氣長遲則爲陰榮氣促榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必強

○趺陽脉滑而緊滑則胃氣實緊則脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此爲胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此爲胃氣不行心氣虛也得食而滿者此爲脾家不治

○脾中風者翁二發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞞瞞而短氣也

○凡有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

○脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黃赤白墨病人鼻下平者胃病也微亦

者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治脣黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治脾反出者此爲脾先落云

○脾脹者善噦四肢急體重不能衣先終一作枝

○脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

○趺陽脉浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾爲約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

○凡人病脉以解而反暮微煩者人見病者差安而強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

○脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久二不愈病四肢不收黃瘦食飲不爲肌膚以冬至癸日得之何也肝病傳脾脾當傳腎腎適以冬王王者不受邪脾復欲還肝肝不肯受因留結爲積故知痞氣以冬得之

○脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大使不利其脉微緩而長此爲可治宜服平胃丸瀉脾圓柔莫圓附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季夏刺公孫秋刺商丘皆補之又當灸章門五十壯背第十一椎百壯

○脾病者必身重苦飢足痿不收素問作善飢肉瘦足不收行薑煑脚下痛虛則腹脹腸鳴溏泄食不化取其經足太陰陽明少陰血者邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有

寒有熱皆調其三里

○足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上脣內循胫骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈夾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中是動則病舌本強食則嘔一作吐胃管痛腹脹善噫得後與氣則快然而衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘞溏瘕泄水閉黃疸好卧不能食肉脣青強立股膝內痛厥足大指不用盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實則腹中切痛虛則鼓脹取之所別

○脾病甚色黃體青失溲直視脣久張爪甲青飲食吐逆體重

節痛四肢不舉其脉當浮大而緩今反弦急其色當黃今反青此是木之刻土爲大逆十死不治

胃足陽明經病證第六

○胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里

○飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去之

○胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其硬而散者當病食脾髀痛

○胃中有癖食冷物者痛不能食食熱即能

○胃脹者脹滿胃管痛鼻聞焦臭妨於食大便難

○診得胃脉病形何如曰胃實則脹虛則洩

○病先發於胃。脈滿五日之腎少腹腰脊痛。胫瘦三日之膀胱。
背脛筋痛小便閉。五日上之脾閉塞不通。身痛體重。上之心
六日不已死。冬夜半後夏日昧作六日。脉浮而芤。浮則爲陽。
芤則爲陰。浮芤相搏。胃氣生熱。其陽則絕。

○趺陽脉浮者。胃氣虛也。趺陽脉浮大者。此胃家微虛煩渴必
日再行芤。而有胃氣者。脉浮之大而更微。按之芤。故知芤而
有胃氣也。

○趺陽脉數者。胃中有熱。卽消穀引食。趺陽脉濶者。胃中有寒。
水穀不化。趺陽脉蘿蘆而浮者。其病難治。趺陽脉浮遲者。故
久病。趺陽脉虛則遺溺。實則失氣。

○動作頭痛重熱。氣逆者。屬胃。

○厥氣客於胃。則夢飲食。

○足陽明之脉起於鼻交頰中旁約太陽之脉下循鼻外入上齒中還出俠口環脣下交承浆_目循順後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額_頭其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠脅入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下_脾歸抵伏菟下入股腋中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗上入大指間出其端是動則病悽然振寒善伸數欠顏黑病至誑人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走竄腹脹是爲肝厥是主血作胃所生病者狂瘧一作瘧溫濤汗出軼匈口喝脣緊頸腫喉痺大腹水腫膝腹痛循膺_胸斜股伏菟髀外廉足跗上居痛

中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善飢渴色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

肺手太陰經病證第七

○肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝嘯懸仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉之得其時則夢見兵戰肺氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客于肺則夢飛揚見金鑑之器等物

○病在肺下晡慧日中甚夜半靜

○病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出

○肺脉搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏汗漏一作灌至李不復散發

○肺脉沈之而數浮之而喘者洗三寒熱腹滿腸中熱小便赤
有背痛從腰已上汗出得之房內汗出當風自脈之至也喘
而浮大上虛下實驚有積氣在膏中喘而虛名曰肺脾寒熱
得之因醉而使內也

○肺中風者口燥而喘身運而重冒而脹脹

○肺中寒者其人吐濁涕

○形寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上有
肺傷者其人勞倦則欬唾血其脉細緊浮數皆吐血此爲躁
擾噴怒得之肺傷氣擁所致

○肺脹者虛而滿喘欬逆倚息自如脫狀其脉浮

○肺水者其人身體重而小便難時三天便鴨溏肝乘肺必作

○脉弱而弱弱反在閑弱反在顛浮反在上弱反在下浮則爲陽弱則血不足必弱爲虛浮弱自別浮則自出弱則爲入浮則爲出入此爲有表無裏弱則爲入不出此爲無表有裏陽出極汗齊腰而還此爲無表有裏故名曰厥陽在當汗出不汗出

○趺陽脉浮緩少陽微緊微爲血虛緊爲微寒此爲鼠乳其病屬肺

○肺之積名曰息竇在右脇下廣大如杯久不愈病酒二寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王者不受邪肺復欲還心心不肯受因留結爲積故知息竇以春得之肺病其色白自身身俱寒无熱時欬其肺微遲爲可治宜服五味子大補肺湯鴻肺散春當

刺少商夏刺魚際背鴻之季夏刺太淵秋刺經渠冬刺尺澤
皆補之又當炙腫中百壯背第二椎二十五壯

○肺病者必喘欬逆氣有息背痛汗出尻陰股膝牽髀肺脇足
皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經手太陰足太陽
之外厥陰內少陰血者

○邪在肺則皮膚痛發寒熱上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺
中外輸臂第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之缺盆
中以越之

○手太陰之脉起於中腋下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺
系橫出腋下循臑內行少陰心主之前下肘中後循臂內
上臂下廉入寸口上循魚際出大指之端其支者從腕後
直次指內廉出其端走動則病肺脹滿膨脹而喘欬缺盆中

痛甚則交兩手而欬，走爲臂厥。是王肺所生病者，欬上氣喘喝，煩心，脣滿，臍臂內前廉痛，掌中熱，氣盛者餘，則肩背痛，風汗出，小便數而少，氣虛則肩背痛寒，少氣不足以息，溺色變，卒遺失無度，盛者則寸口大三倍於人迎，虛者則寸口反小，於人迎也。

○手太陰之別名曰列缺，起於腋下三寸，分間別走陽明，其別者並太陰之經，直入掌中，散入於魚際。其實則手少陰掌起，盡則少陰小便遺數，取之去腕一寸半，肺病身當有熱，欬嗽短氣，唾出膿血，其脉當短濶，今反浮大，其色當白而反赤者，此是火之刻金，爲大逆，十死不治。

大腸手陽明經病證第八

○大腸病者，腸中切痛而鳴濯，二冬日重，感于寒則泄，當臍而

痛不能久立與胃同候取巨虛上廉腸中雷鳴氣上衝脣喘
不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里

○大腸有寒驚瘈有熱便脹垢

○太腸有宿食寒凜發熱有時如瘧狀

○大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

○厥氣客於大腸則夢田野

○手陽明之脈起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩
骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘後膕循臑外前廉
上肩出髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈
屬大腸其支者從缺盆直入上頸貫頰入下齒縫中還出俠
口交人中左之右若之左上俠臯孔是動則齒齦痛顎腫是
主津所生病者目黃口乾輒齶喉痺有前臑痛大指次指痛

不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

腎足少陰經病證第九

○腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑腎氣虛則夢見舟船溺人得其夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中

○病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜

○病先發於腎少腹腰脊痛腔瘦三日之膀胱背脂筋痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大食夏晏晡

○腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其突而散者當病少血

○腎脉沈之大而堅浮之大而緊若手足骨腫厥而陰不與脉
脊痛少腹腫心下有水氣時脹閉時泄得之浴水中身未乾
而合房內及勞倦發之

○黑脉之至也上堅而大有積氣在少腹與陰名曰腎痺得之
沐浴清水而卧

○凡有所用力牽重若入房過度汗出如浴水則傷腎腎脹者
腹滿引背央然腰髀痛

○腎水者其人腹大脅腫腰重痛不得溺陰下濕如牛鼻頭
其足逆寒大便反堅

○腎著之爲病從腰以下冷腰重如帶五千錢

○腎著之病其人身體重腰中冷如冰狀一作如水溜狀一作如坐水中形如冰狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下應從身勞汗

出衣裏冷濕故久不得之

○腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨瘦少氣以夏丙丁日得之何也脾病傳腎腎當傳心心適以夏王王者不受邪腎復欲還脾脾不肯受因留結爲積故知奔豚以夏得之水流夜疾何以故師曰未休故流疾而有聲人亦應之人夜卧則脾不動搖脉爲之數疾也

○腎病其色黑其氣虛弱吸少氣兩耳苦聾腰痛時失精飲食減少膝以下清其脈沈滑而遲此爲可治宜服內補散建中湯腎氣圓地黃煎春當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰谷皆補之夏補之夏刺然谷季夏刺大溪背鴻之又當灸京門五

○腎病者必腹大脰腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛即脅中痛
大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太陽血者

邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難
有督頸項強痛時腋取之涌泉竈籥視有血者尽取之

○足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝

之後別入跟中以上肺內出胸中內廉上股內後廉貫脊屬
腎絡膀胱其直者從肺上貫肝膈入肺中循喉嚨夾舌本其
支者從肺出絡心注腎中是動則病飢而不欲食面黑如炭
色地色作欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目睭瞑無所見心

懸若飢狀氣不足則善恐心惕二若人將捕之是爲骨厥厥
是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心

痛復疽腸澼脊股肉後瘻痛痿厥音足下熱而痛多則強

食而生害一作肉緩急被髮大杖重復而恭盛者則寸口大無倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也。

○足少陰之別名曰大鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊其病氣逆則煩悶實則閉癃虛則腰痛取之所別腎病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼少腹結痛氣衝於心其脉當沈細而滑今反浮大其色當黑而反黃此是土之刻水爲大逆十死不治

膀胱足太陽經病證第十

○膀胱病者少腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得有上熱若脉陷足小指外側反脰僵後皆熱若脉陷者取委中

○膀胱脹者少腹滿而氣壅

○病先發於膀胱者背脛筋痛小便閉五日之腎少腹脹痛

脰瘦

日之小腸脹

日之脾閉塞不通身痛體重二日不

已死冬雞鳴夏下晡

一云夕

○厥氣客於膀胱則夢遊行

○足太陽之脉起於目內眞上額交顙上其支者從顙至耳上

角其直者從顙入絡腦還出別下項循脊內夾脊抵腰中

入循督絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫腎入

腦中其支者從腰內左右別下貫髓肺一作過髀樞循髀外後

廉過一本脰中以下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外

側是動則病衝頭痛目似胞項似拔脊痛腰似折髀不可以

曲脰如結脰如列是為踝厥是主筋所生病者痔瘻狂顛疾

頭腦頂痛目黃淚出齶齶項背腰尻臍腳皆痛小指不用

盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

三 膽手少陽經病證第十

○二 膽病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便蹇急溢則爲水留則爲脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見於脉取委陽

○少腹病腫不得小便邪在三膽約取太陽太絡視其結脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

○三 膽脹者氣滿於皮膚殼然而堅不疼熱在上膽因怒爲肺痿熱在中膽因堅熱在下膽因溺血

○手少陽之脉起於小指次指之端出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間黃肘循臑外上有而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈屬胃三膽其支者從膻中上出缺盆上項夾耳後直上出耳上角以垂下額至頤其支者

從耳後入耳中出走耳前過客主人前父頰至目兌皆是
則兩耳聾蟬二焞三嗌腫喉痺是上氣所生病者汗出自目兌
皆痛頰腫耳後有膿肘臂外皆痛小指次指不用盛者則人
迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

新刊王氏脉經卷第六