

圖注脈訣辨真

圖註脉訣辨真卷之四

西晉 王叔和 撰

四明 張世賢 註

左右手診脉歌

左右須候四時脉。

凡診脉。須要先識時脉。然後及於病脉。時脉。謂春三月。六部中。俱帶弦。夏三月。俱帶洪。秋三月。俱帶毛。冬三月。俱帶沉也。

四十五動爲一息。

動。脉至也。息。脉止也。非呼吸之息也。

圖註脉訣

卷四

善成堂

指下弦急洪緊時。便是有風兼熱謂

諸陽爲熱。

熱生風也。

忽然匿匿慢沉細。冷疾纏身兼忠氣。


諸陰爲寒。

冷生氣也。

賊脉頻來問五行。屋漏雀啄終不治。

賊脉。相尅之脉也。五行。金木水火土也。屋漏雀啄。脾衰之脉也。脾屬土而居四臟之中。土行水穀之相。通灌四傍。脾衰則見是脉。人無胃氣則死。故曰終不治。

左右手診脈圖



匪匪慢沉細冷疾纏身兼虛氣

賊脈頻來問五行

崖瀉雀啄終不治

弦急洪緊時便是有風兼熱極

大部脉數通論

潔古曰。左右手各列五臟六腑之位。或有至數多。而言寒。或有至數少。而言熱。各隨部分推其傳變。逆順。是知不拘數。則爲熱。遲則爲寒。夫脉乃五行之數。各有生成之用。相尅之數。木得金而伐。火得水而滅。金得火而缺。土得木而腐。水得土而絕。五臟應五行。各有相生相勝之理。得相生者愈。相勝者死。此論若不通五臟交變。和傳及虛實逆順。無由入此理趣也。

左手寸口心脉歌

左手頭指火之子。四十五動無他事。

子當作指。恐傳寫之誤也。左手。病人之左手也。頭指。醫人右手之食指也。左按之。當頭指之下。故曰火無他事矣。其數動之法。不與肺。吸人腎與肝脾脉在而數。一動肺。二動心。三動中皆當如是之數也。

三十一動忽然沉頓。飯却來。還復此。春中診得夏須憂。夏若逢之秋絕體。秋脉如斯。又準前冬若候之春必死。

三十一動。輪在肺上。肺上見沉乃金生水。水漸盛則火滅。或春或夏或秋或冬。診而得此。不過三月而亡。三月者天道小變之節也。學者不必穿鑿細分善理。或曰沉作止非也。沉則至數尚均。但浮不如前耳。故可頓飯二字。止則脈不動矣。

左手中指肝脈歌

左手中指木相連。脈候還須來一息。二十六動沉却來。肝臟有風兼熱極。

左手關部脈也。肝屬木。故曰木相連。一息亦四十五動也。二十六動輪在肺上。肺沉則病。病則不能生水。陰木制火。故本臟風熱之極。

二十九動瀆匿匿。本臟及筋終絕塞。

肝脈瀉。二十九動輪在川。
上。肝脈見瀉。乃金來剋木。

一十九動便沉沉。肝絕未嘗人救得。

便沉沉。仰在十九動上沉也。二十九動亦在肝上。
沉脈。帖筋附骨。沉沉則又甚矣。此乃肝絕之候。故
不可救。

左手八部腎脈歌

左手腎脈指第三。四十五動無疾咎。指下急急動。弦
時。便是熱風之脈候。

急急而動。熱也。弦。風也。故爲熱風之候。

忽然來往慢慢極。腎臟敗時須且救。此病多從冷變。

來療之開破于金

上尅木腎必敗
其人脉遲身寒

二十五動沉卽來腎絕醫人無好手。努力黃泉在眼前。縱在也應終不久。

沉卽來卽在二十五動上
腎上腎脉本沉。今又曰沉
沉也。二十五動正在
脉將絕也。故曰腎絕。

右手寸口肺脉歌

右手頭指肺相連。四十五動無憂慮。

右手。病人之右手也。頭
指醫人左手之食指也。

極急明知是中風。更看二十餘七度。

極急。弦數脈也。二十七度輪在心上。心屬火。火尅金。更看火微則生。火盛則死。

忽然指下來往慢。肺冷莫。口無大故。一朝肺絕。脈沉。

沉。染病臥牀思此語。

肺主氣。氣虛則寒。脈遲肺冷。是故憂矣。肺之脈大浮。脈沉則病。沉而又浮。肺臟絕矣。

十二動而又不來。咳嗽唾膿兼難補。髮直如麻。只片

時。扁鵲也。應難救護。

十二動。輪在心上。又不來代脈也。心屬火而尅金。故云死在片時。

右手中指脾脈歌

右手第二指連脾。四十五動無諸疑。急動名爲脾熱。

梅。食不能消。定若斯。

定若斯者。指脉急動。脾熱極。而言也。因食不能消所致。

欲知疾患多爲冷。指下尋之慢極遲。吐逆不定。經旬日。胃氣冲心得幾時。

脾病多因寒。冷所致。脾脉本緩。傷於寒冷。其脉遲緩。愈甚。嘔吐咳逆。十日已上不止。胃氣必至冲心。心受傷。半日而死。

右手尺部命門脉歌


右手命門三指下。四十五動不須怕。二十九動默然沉。百死無生命絕也。

命脉。命門脉也。十九動。輪在肝上。肝屬木。木爲根。火之源。默然沉。脉不應指也。木絕則火亦絕。故曰百死無生也。

五臟輪至數之圖

醫方類聚

卷四



言身生

診雜病生死候歌

五十不止身無病數內有止皆知定。

止卽代也。經曰：人一呼脈再動，一吸脈再動，呼吸定息脈五動也。五動者一肺二心三脾四肝五腎也。一息脈五動則遍周五臟矣。一成之數十息五臟循環十次五十動而不見止脈是五臟皆平。何病之有數內五十也。皆知定盡可定其該死年分時月也。

四十一止一臟絕却後四年多沒命。三十一止卽三年。二十一止二年應十五一止一年殞。已下有止看

暴病。

五十動爲則凡少十動則絕一臟其臟絕之法。乘依天地成五行之數。先從腎而後至脾也。暴病卒

圖註脈訣

卷四

七

善成堂

暴病也。說
見下文。

五臟代脉期死之圖

四十一止四年

三	三	三	五	肺	一	九	七	三
五	五	三	六	心	二	十	八	三
三	三	三	七	脾	三	十一	九	三
六	六	三	八	肝	四	十二	十	六

三十一止二年

三	三	六	四	肺	一	七	三	三
五	三	七	五	脾	二	八	四	六

二十七十一止二年


三	三	六	六	肝	三	九	五	三
七	七	二	二	止	一	十	二	七
一	一	七	三	脾	一	五	九	三
二	二	八	四	腎	二	六	十	六

診暴病歌

兩動一止或三四。三動一止六七死。四動一止卽八朝。以次推排但依次。

脉兩動而見一代其人死期一四日間。三動而見一代死期八日。以一代死期六七日間。四動而見一代死期十日。係五行也。五行有陰陽金木水火土。陰陽各得二日。

診暴病之圖



以此推

排但依

其次也

形症相反歌

健人脈病號行屍。病人脈健亦如之。長短瘦肥竝如此。細心診候有依稀。

假如一十五動脈見一代。死期在應一年。身在天
地間。活則爲人。死則爲屍。死期在週而動履如常。
名白行屍。病人脈健者。假如人泄瀉失血。形容羸
瘦。脈見洪大而數。健者亦爲行屍。長人脈短。短人
脈長。肥人脈小。瘦人脈大。皆爲死候。

形證相反之圖

長

||
||
||
||
||

人
||
||
||
||

脉
||
||
||
||

短

健

||
||
||
||
||

人
||
||
||
||

脉
||
||
||
||

弱

瘦

||
||
||
||
||

人
||
||
||
||

脉
||
||
||
||

肥

凡形與證

相反者皆

爲死候也

診四時病五行相尅脈

春得秋脈定知死。死在庚辛申酉裏。

春旺木。其脈弦。秋旺金。其脈濇。春得秋脈。金來尅木。故知必死。庚辛申酉。金旺之日也。

夏得冬脈亦如然。還於壬癸爲期爾。

夏旺火。其脈洪。冬旺水。其脈石。夏得冬脈。水來尅火。故知必死。壬癸子亥。水旺之日也。

嚴冬診得四季脈。戊己辰戌還是厄。

冬旺水。其脈石。土旺四季。其脈緩。冬得四季之脈。土來尅水。亦爲死候。戊己辰戌。土旺之日也。

秋得夏脈亦同前。爲緣內丁相刑尅。

秋旺金。其脈濇。夏旺火。其脈洪。秋得夏脈。火來尅金。死期斷以丙丁巳午。火旺之日也。

季月萃夏得春脉尅在甲寅病應極值逢乙卯亦非
良此是五行相鬼賊

季月辰戌丑木也季夏卽未月也季月乃土寄肝
之月季夏乃五行相生土旺之時診得春脉木來
尅上謂之死候甲寅乙卯木旺
口也巳上皆五行相尅之時

診四時病五行相克之圖



診四時虛實歌

春得冬脉只是虛更兼補腎病自除若得夏脉緣心
實還應瀉子自無虞

日虛則補其
母實則瀉其子

夏秋冬脉皆如是在前爲實後爲虛

夏秋冬之所診皆如春法從前
來者爲實邪從後來者爲虛邪

春中若得四季脉不治多應病自除

春中二月分也四季脉土脉也二月分而得四季
之脉乃妻來乘夫謂之微邪况二月木居前甲之

鄉故不
治自愈

圖土脉夾

卷四

七

善成堂

診四時虛實之圖



傷寒歌

傷寒熱病同看脉滿手透關洪拍拍出至風門過大
陽一日之中見脫厄過關微有慢騰騰直至伏時重
候覓

寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷
於寒觸冒之者乃各傷寒也寒不即病者其寒毒
藏於肌膚中至夏至前變爲溫病夏至後變爲熱
病然其發起皆傷寒所致也故看脉之法相同洪
拍拍即洪驚也傷寒之病一日巨陽受之五日陰
明受之三日少陽受之四日太陰受之五日少陰
受之六日厥陰受之六日傳經已異其病當愈不
愈七日邪該復傳其脉洪大而透過三關其邪出
至風門穴而愈其脉過關微帶緩慢其邪至太陽亦
當得汗而愈其脉過關微帶緩慢其邪至太陽亦

遲日間不汗直至伏時再等候其汗也伏時卽臨臥時也承日中而言

掌內迢迢散漫行乾癢疼疥多未的大凡當日問程途遲數洪微更消息

傷寒熱病未汗脈須浮洪既汗脈當安靜散漫之脈不汗而愈其平復未可全許也

診傷寒熱病之圖

傷寒

熱病

同看脉

過關微有慢騰騰

滿手透關洪拍拍

掌後迢迢散慢行

病

直至伏時重候覓

邪出風門過太陽

目之中見脫厄

乾癢疹疔多未的

又歌曰

熱病須得脉浮洪細小徒費用神功

陽病當得陽脉陽病而得陰脉乃死症也

汗後脉靜當便瘥喘熱脉亂命應終

汗後邪退即生邪感即死

熱病之圖

熱病

須得脉浮洪

汗後

脉靜當便瘥

細小費神功

喘熱脉亂凶

陽毒歌

陽毒健亂四肢煩面赤生花作點斑狂言妄語如神
鬼下痢頻多喉不安汗出遍身應大瘡魚口開張命
欲翻有藥不辜但與服能過七日但能安

池氏曰陽症宜汗而解之如失汗則邪傳入臟瘀
熱在裏不散致病健亂煩躁面赤發狂言妄一
如見鬼神下痢瘵血如此危症病傳在裏不當汗
又加之遍身自汗口如魚口開張者死能過七日
乃過經陽熱退
方有可救之理

陰毒歌

陰毒傷寒身體重背強眼痛不堪任小腹急痛口青
黑毒氣衝心轉不禁四肢厥冷惟思吐不利咽喉脉
細沉若能速灸臍輪下六日看過見喜深

臍輪下丹田穴也速灸丹田穴回陽而
救陰過得六日陰極陽生方爲可喜

陰陽二毒之候圖
卷四
十六
善成堂

陰陽二毒之候圖

陰 陽

毒

陽毒健亂四肢煩
而赤生花作點
狂言妄語如神鬼
汗出黏多喉不安
魚口關身命欲翻

治法有藥不事但與服

能七日便安

陰毒傷寒身重
背強眼痛不堪任
小腹急痛口青黑
毒氣衝心轉不禁
四肢厥冷惟思吐
咽喉不利勢瀕死

治法必須速灸臍輪下

六口看過見深

諸雜病生死歌

腹脹浮大是出厄虛小命殂須努力

病源曰腹脹由陽氣外虛陰氣內積故也脈浮大則邪在表其危脫虛小則邪在內侵正氣減少其命危浮大當發汗是開鬼門也虛小宜利小便是潔淨府也

下痢微小却爲生脈大浮洪無瘥日

仲景曰下痢微小爲欲解也經曰病若腹大而泄者脈當微細而濇反得緊大沉者託

恍惚之病定顛狂其脈實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未聞人救得

經曰病若譫言妄語身當有熱脈當洪大反手足厥冷脈沉細而微者也

消渴脈數大者治虛小病深厄難脫

病源曰夫消渴者渴不止小便多是也

水氣忤大得延生沉細應當日死別

潔古曰在表則易在裏則難

霍亂之候脈微遲氣少不語大難醫三部浮洪必救得古今課定更無疑

病源曰人之溫涼不調陰陽清胃二氣交錯凌亂

在腸胃之間因飲食而變發則心腹絞痛其有先

利竝作挾風而實者身發熱頭痛體疼而主利虛

者吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉鯉膾生冷

過度而得或因居處不節坐臥濕他或厚風取涼

而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃冷則不消
不磨則水穀不消化水穀不消則心腹脹滿皆成
霍亂其各三一日胃反言其胃氣虛逆反吐合
也二日霍驚霍之間致撩亂也三日走補言
其哺食變少其來代者霍亂又脉代而亂
者力霍亂也霍亂脈世人者可治微逆氣息少口
不欲言者不可治

鼻衄吐血沉細宜忽然浮大卽瀕危

病源曰心主血肝藏血肺主氣開竅於鼻血得執
則散血隨氣上從鼻中出則爲衄經曰病若吐血
復衄勿血者脈當沉細生浮大而卒者死

病人脈捷不用治捷人脈病號行屍

人病脉不病者生
脉病人不病者死

心腹痛脉沉細宜浮大弦長命必殂

裏之有病其脉當沉細而應木證則愈反浮大弦長者爲相反必當死以其病與脉反故也

頭痛短濇應須死浮濇風痰必易除

頭痛陽病也短濇陰脉也陽病見陰脉者故白應須死若得浮濇其病因風痰所致治之以祛風化痰其痛卽愈

中風口噤遲浮吉急實大數三魂孤

寒則筋急筋急則口噤中風口噤診得病脉相應故言吉脉見急實大數乃風熱之極故三魂孤

魚口氣龕難得嗟面赤如赭不久居

魚口人口如魚口之張脾氣絕也氣龕肺氣絕而呼出氣驟也面赤如赭火色盛也

中風髮直日吐沫

髮乃血之餘也心不能生血髮必焦梗直涎乃脾之液脾絕則涎不收拾故涎從口中吐出也

噴藥悶亂起復蘇

起恐作豈肺范曰咽主嚥物咽爲胃之系下連胃腕爲木鼓之道路胃經爲風痰所擾亂悶藥不下咽噴吐於其外豈可望其復有蘇醒之期

咽喉拽鋸水雞響搖頭上竄氣長噓

水雞響者肺主聲其聲不清乃肺氣敗壞也上竄是上喘也氣長噓出多入少也皆真元散失之候病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠

色乃神之旌神去色亦去經曰六陽氣俱絕者則陰與陽相離陰陽相離則膝理泄絕汗乃出大如

貫珠轉出不流則氣先死

眼小目瞪不須治作汗如油不可蘇

六氣不連用也

內實腹脹痛滿盈心下牽強乾嘔頻手足煩熱脉沉

細大小便澀死多貞

陽病見陰脉者死氣和則小便利血和則大便通
大小便澀乃氣血不和池氏曰內實結絕氣不直
通

外實內熱吐相連下清注穀轉難安忽然診得脉洪
尺莫費神功定不痊

外實內熱內外皆陽也內外皆陽兼之以吐既吐不宜作瀉而反下青注谷其病難痊既瀉之後脉當細小反得洪大此爲不治之證

內外俱虛身冷寒汗出如珠微嘔煩忽然手足脉厥逆體不安寧必死拚

經曰內外皆陰服熱藥不愈經曰寒之不寒責腎之少爲無水也熱之不熱責心之虛爲無火也欬而尿血羸瘦形其疾脉大必難任

病源曰唾血則肺傷損肺者五臟華蓋易爲傷損肺爲熱氣所加則唾血如絲縷者此傷肺也脇下痛唾鮮血此傷肝也其脉沉弱則吉實大則凶

上氣浮腫肩息頻浮滑之脉卽相成忽然微細應難

救神功用盡也無生

上氣浮腫邪在表也肩息頻者喘也用葛根升麻湯解肌湯主之浮滑之脈亦在於表宜麻黃湯發表也微細則邪人內矣故難救

中惡腹脹緊細生若得浮大命遂巡

中惡腹脹乃是內傷脈宜緊細若得浮大表裏俱病必不免於死亡

金瘡血盛虛細活急疾大數必危身

金瘡刀刀所傷之瘡也血盛出血多也血既出多脈應虛細反得急疾數大風熱乘之其身必危

凡脈尺寸緊數形又似釵直吐轉增此患盡每急須

救速求坤藥命難停

欽直如轉米肝氣盛也叶轉增脾
氣衰也木如則脾絕其死定無疑

中毒洪大脈應生細微之脈必危傾

脈洪大者毒在外脈細微毒在內在
外者易治而生在內者難治而死

吐血但出不能止命應難返沒痊平

血上行而不止心肺俱死
於毒也其命莫能全矣

大凡宴看生死門太衝脈在卽爲憑若動應神魂魄
在止便干休命不停

太衝脈肝經俞穴之脈也肝藏魂可以決人死生
諸病診看太衝之脈其脈若在應神而動則魂魄
共連其人不死若止而不動魂魄離矣干無一活
木衝穴在足太指本節後二寸陷中動脈應手

此一歌叔和言雜病生死之訣開導後學其辭簡
逕其理易明今止直解不復具圖

察色觀病生死候歌

欲愈之病目背黃眼胞忽陷定知亡

眼中分屬五臟應五輪瞳人屬腎應木輪烏睛屬
肝應風輪兩背屬心應血輪兩背色黃火能生上胃
應氣將行其病故知欲愈眼胞陷者五臟之氣絕也
故知當亡素問曰目內陷者死言太陽之氣起於
目內陷者太陽絕也故死太陽主諸陽之氣故獨
之言

耳日口鼻黑色起入口十死七難當

黑者腎之色也。腎邪浸淫，各藏黑，免見於耳目。鼻舌居口內，而屬心火。黑色自外入於口內，木克火，故知十死無一生。火之成數在七，故第七日難當。

面黃目青，酒亂頻邪風在胃，衰其身。

酒乃濕熱之物，飲過多則濕熱傷乎脾胃，故面黃。脾胃積熱，則生風，故目青也。一身皆藉胃氣資養，風邪留於胃中，則播於一身。內經曰：有病身熱，懈憊汗出如浴，惡風漸，此爲何病？岐伯曰：酒中風也。

面黑目白，命門敗，困極，八日死來侵。

黑水也，目木也，白金也。命門火也，木浸淫而賊火之氣，金尅木而伐火之源，所以命門火敗，火之成數七七，日火極矣。故死於第八日也。

圖註脈訣

卷四

三 善成堂

面色忽然望之青進之如黑卒難當

潔古曰青黑之色爲肝腎色也元
青後黑是迴則不轉神去則死也

面赤目白憂息氣待過十日定存亡

息氣喘逆也赤色屬火日色蜀金火少則金必作
喘逆金之成數在九十乃王之成數也土能生金
則生不能生金則
死故曰待過十日

面赤目青衆惡傷榮衛不通立須亡

面赤火也目青木也木火色見風熱傷於五臟六
腑藏腑受傷血氣衰肌肉不滑榮衛之道瀉而不
通其死也
可立而待

黃黑日色起入目更兼口鼻有災殃

獨見者謂之正色。雜見者謂之邪色。黃黑白之三
色。雜見於面。或入於目。或入於口。或入於鼻。乃病
氣從外而之
內。故有災殃。

面青目黃中時死餘候須看兩目強

中時節午時也。午時屬火。面青目黃。肝木剋乎脾
土。到午時。木得火而不畏金。木勢愈盛。人以胃氣
爲本。土絕即死。故死在是時。其他
雜見者。遺賊旺二日。而斷其死主。

目無精光齒齲黑面白目黑亦災殃。

目無精光者。神短也。齒齲黑者。脾絕也。而白者。少
血也。口黑者。腎虛也。有是四者。則非久長之客。

口如魚口不能閉。氣出不返。命飛揚。

潔古曰。火勝迫於肺。
大喘而死。肺敗也。

圖註脈訣

卷四

三

善成堂

肩息直視及唇焦面腫蒼黑也難逃。

肩息者氣喘而兩肩動也。直視者覩物而不轉睛也。唇焦者心家熱也。而乃心之候。黑乃腎之色。上句是心絕。下句是肝絕。心肝既絕。命故難逃。

妄語錯亂及不語尸臭元知壽不高。

神亡夫守故也。

人中盡滿兼唇青三日須知命必傾。

人中屬脾上。青色屬肝木。十受木尅其絕在日之生數。

兩頰額赤人病久口張氣直命難停。

魏氏曰。眼睛下高骨之中名曰顴。顴下名而面裏名臉。面外名頰。額面頰。臉心火所屬。久病而有赤。

色無。筋神外洩。口張氣。直。脾肺已絕。故命難停。

足跖趾腫膝如斗。十日須知難保守。

脾王四肢。足跌乃胃經所行之處。脾胃將絕。則有是証。胃屬上。十日者。土之成數也。故死不過十日。

項筋舒展。定知殞。掌內無文。也不久。

項筋舒展。因督脈已絕。掌內無文。心包脈絕也。脈絕人必死。豈得久生乎。

唇青體冷。及遺尿背面。飲食四日期。

池氏曰。唇青體冷。乃真氣欲絕。遺尿不禁。乃膀胱不藏。背而飲食。乃神去不守。人之神氣生於肝。神不守。則肝絕。不出金數而死也。

手足爪甲皆青黑。能過八日。定難醫。

肝藏其充筋。其華爪。其色青。黑色屬於腎也。腎肝俱敗則木不能生木。故見是色。八日。木之成數也。脊疼。腰重。反覆難。此是骨絕五日看。

脊者。脾之候也。腰者。腎之府也。脾屬土。腎屬水。上尅水。死者五日之期。五者。土之生數也。

體重。溺出時不止。肉絕六日。便高拊。

體重。肉絕。脾也。溺出不止。腎也。土勝水。死期。故曰六日。六乃水之成數也。

手足甲青。呼罵多。筋絕九日。定難過。

肝絕。遇金而死。九日。金之成數也。

髮直如麻。半日死。尋衣語。死十知麼。

髮直如麻者。肺氣絕也。尋衣語死。神不守舍也。

五臟察色歌

肝臟歌

面腫蒼黑舌卷青四肢乏力眼如盲泣下不止是肝絕。八日應當命必傾。

青肝之色也。舌卷青者，子見母色也。四肢乏力者，筋不能維持也。肝不能含血榮目，則眼如盲。津液外泄則泣出不止。凡此數者，皆肝絕所致。金能尅木，故死於金王之日。入者從甲日數至辛日也。經曰：足厥陰氣絕則筋縮。引卯與舌卷厥陰者，肝脉也。用者筋之合也。筋者聚於陰器而絡於舌本。故脉不營節，筋縮急，筋縮急，即用卯與舌卷卯縮，此筋先死。庚日篤，辛月死。

心臟歌

面黧肩息直視看。又兼掌腫沒文斑狂言亂語身悶
熱。一日之內到冥間。

黧黃。黑色也。掌腫無文。心氣絕也。一乃水之或數
水剋火。故死在一日之內。經曰。手少陰氣絕。則脈
不通。脈不通。則血不流。血不流。則色澤去。
故面色黑如黧。此血先死。主日篤。癸日死。

脾臟歌

擠趺腫滿面浮黃。泄痢不覺污衣裳。肌肉羸澀兼唇
反。一日十二內災殃。

脾。神闕也。趺。足。肘上也。浮黃。黃腫也。經曰。足大陰
氣絕。則脈不榮。其口唇。口唇者。肌肉之本也。脈不
榮。則肌肉不滑澤。肌肉不滑澤。則肉滿肉
滿。則唇反。唇反。則肉先死。甲日篤。乙日死。

肺臟歌

口鼻氣出不復迴唇反無文黑似煤皮毛焦乾瓜枯折途程三日定知災。

氣出不復迴有呼無及也唇反上不能生金也黑似煤金不能生水也氣不流通則皮毛焦乾魂魄不連則爪甲枯折從甲至丙三日也丙屬火火克金故死在三日經曰手太陰氣絕即皮毛焦太陰者肺也行氣溫於皮毛者也氣弗管則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮毛枯折毛折者則毛先死丙日死

腎臟歌

面黑齒痛目如盲自汗如水腰折頻皮肉濡結髮無

澤四日應當命不存

面黑面如垢也。目如盲。瞳人反背也。自汗如水。火
獨炎也。腰乃腎之府。腎敗則腰似折。不能榮於骨
髓而骨肉不相親。濡肉而却不能爲五液之主。故
髮不潤澤。從甲至戊。越四日也。戊屬土。土尅水。故
命不存。經曰。是少陰氣絕。卽骨枯。少陰者。冬脉也。
伏行而溫於骨髓。故骨髓不溫。卽肌肉不著。骨
肉不相親。卽肉濡而却。肉濡而却。故齒長。
補枯。髮無潤澤。是骨先死。戊日篤。巳日死。

五臟絕死之圖



診婦人有妊娠歌

肝爲血兮肺爲氣。血爲榮兮氣爲衛。陰陽配偶不參差。兩臟通和皆類例。

肝藏血。肺主氣。血屬陰爲榮而行。脈中氣屬陽爲衛而行。脈外氣升血亦升。氣降血亦降。陰陽配偶無一毫之參差。三陰三陽舉書兩臟通和而類其例焉。

血衰氣王定無娠。血王氣衰應有體。

素問曰。金木者。生殺之本。始不多而生。台多而殺。

于微關滑尺帶數。流利往來并雀啄。小兒之脈已見帶數。月懷耽猶未覺。

女人此脉一見乃血王氣衰經
閉不行。懷孕之脉已見形也。

左疾爲男右爲女。流利相通速來去。兩手關脉大相應已形。亦在通前語。左手帶縱兩箇男。右手帶橫一雙女。左手脉逆生三男。右手脉順還三女。寸關尺部皆相應。一男一女分形證。有時子死母身存。或卽母亡存于命。往來三部通流利。滑數相叅皆替替。陽實陰虛脉得明。遍滿胸堂皆逆氣。左手太陽浮大男。右手太陰沉細女。諸陽爲男。諸陰爲女。指下分明長記取。三部沉正等無疑。尺內不止真胎婦。

三部沉正等者三部之中。
里按皆不絕而正等也。

母乘子兮縱氣露妻乘夫兮橫氣助。子乘母兮逆氣
參夫乘妻兮順氣護。

此叔和自解上文
縱橫逆順四字。

小兒日足胎成聚身熱脈亂無所苦汗出不食吐逆
時精神結備其中住

池氏曰婦人初繫胞乃天一生水。二月受火之氣
其妊婦身熱脈亂汗出不食吐逆惡阻三月受木
之氣精神結備在其中住氣和以榮其子
子氣以潤其母。而二氣榮潤其子少佳。

滑疾不散胎三月俱疾不散五月母。

滑疾不散而形始
小兒在母腹中三

成也。但疾不散。見形已成也。
月始成形。五月則形已成矣。

弦緊牢強滑者安沉

細而微歸泉路。

通津子目前有大
及此又以沉細而
妊婦之脈。或俱沉細

陰沉細之說。爲有妊平安之脈。
微爲死。肝似乎相反。蓋叔和以
滑爲平。脈其三
而微。則爲死矣。

妊娠雜病生死歌

血下如同月水來。漏極胞乾生殺胎。亦損妊母須憂慮。爭遣神丹救得回。

通津了曰。夫胎之漏者。或食動胎之物所致。或因熱毒之氣。侵損胞胎所致。或因人房室勞損所致。損輕則漏輕。損重則漏重。但漏而盡則死。然安胎有三法。因母病以動胎也。治母其胎自安。緣胎自有不堅。以致母病。但治胎則母自痊矣。

心腹急痛面自青冷。汗氣絕命必傾血。下不止胎衝土。心腹冷悶定傷身。隨胎舉重倒仆輕。致胎死在腹中。若已損未出血。不衝心悶亂母魂孤。

倒仆輕跌也。舉重轉勞傷也。

產難生死歌

欲產之婦脉離經。沉細而滑也同名。夜半覺痛應分誕來日日午定知生。

離經。離其常經也。一至一吸。三至皆日離經。

身重體執寒又痛舌下之脉黑復青。反舌上冷子當死腹中須遣母歸冥。面赤舌青細尋看。母活子死定難應唇口俱青沫又出子母俱死總高拚。面赤舌青沫出頻。母死子活定知真不信若能看應驗。尋知腎

暫不虛陳新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵若得
重沉小者吉忽若堅牢命不停寸口瀉疾不調死沉
細附骨不絕生審看此候分明記長須念取向心經

已上叔和言產
婦生死之訣也

懷妊傷寒歌

傷寒頭痛連百節氣急衝心溺如血上生斑點赤黑
時壯熱不止致胎滅嘔吐不止心煩熱腰背俱強腦
痛裂六七日來熱腹中小便不通大便結

潔古曰懷妊婦人傷寒病者須問大小
便大小便如利知不損胎黃龍湯主之

產後傷寒歌

產後因得熱病臨脉細四肢緩者生脉大忽然肢逆

冷須知其死莫畱停

熱病之脉固宜洪大但產後氣血俱虛在所不宜勿作陽病見陰脉論也

小兒生死候歌

小兒乳後嘔逆更兼脉亂無憂慮

變蒸未定氣息未調嘔逆脉亂不得爲病

弦急之時被氣纏脉緩卽是不消乳

小兒之脉弦急乃風邪寒氣所纏緩則脾病而乳食不消

緊數細快亦少苦虛濡邪氣驚風助

數而細快乃小兒平脈加之以緊亦有
些須表邪若虛而濡乃邪氣驚風之候

痢下宜腸急痛時浮大之脈歸泉路

下痢之脈不
直浮大故也

小兒外證一十五候歌

眼上赤脈下貫瞳人

池氏曰赤脈屬心瞳人屬腎乃心火勝
腎水水乾則不生木致腎所皆絕故也

額門腫起兼及作坑

熱勝則腫熱極
則陷皆熱候也

鼻乾黑燥

火也

壯大筋青

木也

目多直視覩不轉睛

經曰週則不轉是也

指甲青黑忽作鴉聲

肝絕

虛舌出口嚙嚙咬人

心腎

已絕

魚口氣急啼不作聲

魚口張而不合也是謂脾絕氣急作喘哭而無聲是謂肺絕

蛔蟲既出必是死形

蛔一生於胃中藉穀食以養胃絕而穀食不入蟲故出也

用藥速救十無一生

總結上文十五證而言也小見有是證者下中莫治其一

圖註脈訣辨真卷之四

脉訣附方

四明靜齋張世賢編次

七表脉方

浮脉

○小柴胡湯

柴胡

黃芩

去腐

五味子

半夏

製各一兩

白芍藥

人參

桑白皮

各五錢

右㕮咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至七

分去滓。食後溫服。

○地骨皮散

人參

地骨皮

柴胡

黃芪

生地黃

各一兩半

白茯苓

五錢

知母

一兩

石膏

二兩

右咬咀。每服五錢。水二盞。生薑七片。煎至七分。去滓。細細溫服。連夜頓服。○生精補腎者。地黃丸。

寸浮

○桂枝湯

治有汗脈浮緩

赤芍藥

桂枝

各六錢

甘草

四錢炙

右咬咀每服五錢水二盞加生薑三片棗二枚煎至八分溫服。

○麻黃湯

治無汗脈浮緊

麻黃

桂枝

各一兩

甘草

五錢

杏仁

五十粒

右咬咀每服五錢水二盞煎八分溫服被覆取汗出爲度。

關浮

○調中湯

製厚朴

陳皮

去白

半夏

各一兩

白朮

一兩半

人參

五錢

甘艸

三錢炙

右咬咀。每服五錢。水二盞。加生薑七片。煎至七分。去滓。食前溫服。

尺浮

○七聖丸

治風在下焦

檳榔

木香

羌活

川芎

桂 各五錢

大黃

郁李仁

各一兩

右爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服三十九。漸加之。微利爲度。生薑湯送下。食後服之。

芫脉

○加減梔子湯

芫脉在上

梔子

四箇碎

香豉

五錢

先以水二盞煮梔子至七分。入豉煮三五沸。去滓溫服。得吐止。

○猪苓湯

乳豚在下

猪苓

滑石

澤瀉

阿膠

炒各等分

右咬咀。每服水二盞。先用前三味煎至一盞。去滓。後入阿膠化開。食前溫服。

○瀉黃散

乳豚在中

藿香葉

梔子仁

甘草

各五錢

防風

三兩

石膏

一兩

右咬咀。水二盞。煎半兩。細細服。無時。

寸朮

○犀角地黄湯

血在上焦

生地黄

二兩

黃芩

一兩五錢

黃連

一兩

犀角

六錢

大黃

五錢

右咬咀。水三盞。秤一兩。煎至二盞。去滓。食後服之。

關朮

○抵當丸

大黃

水蛭

如製各半兩

蟅蟲

三錢

右爲細末。煉蜜丸。如桐子大。每服二十九。食後溫水下。以利爲度。未利加數服之。

尺朮

○桃仁承氣湯

桃仁

五錢

大黃

一兩

甘艸

二錢五分

桂

三錢

右咬咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一半。去滓。入芒硝三錢。化開。食後服。以利爲度。未利再服。又云。上焦有血。先便後血。下焦有

滑脉

血先血後便中焦有血便血齊作。用藥上焦食後下焦食前中焦徐下。食遠兩飯間也。

○加減大柴胡湯

柴胡

赤芍藥

各一兩

枳實

大黃

黃芩

各五錢

甘艸

二錢

右咬咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。去滓。溫服。臨臥以利爲度。未利再服。

○大承氣湯

厚朴

製一兩

枳實

麩炒

大黃

各五錢

芒硝

三錢

右咬咀。每用水一椀。生薑十片。先煎厚朴枳實至一盞半。再入大黃煎至一盞。去滓入芒硝化開。午食後服。未利。次日晚食後服之。

寸滑

○半夏湯

半夏

製一兩

茯苓

一兩

右咬咀。每服半兩。水二盞。生薑七片煎至一

半。去滓。食後服。不嘔吐者止。不止者。再服。

關滑

○加減小柴胡湯

柴胡

黃芩

赤芍藥

各一兩

人參

五錢

甘艸

三錢

桂

四錢

右咬咀。每服半兩。水二盞。生薑七片。煎至一盞。去滓。溫服。

尺滑

○附子四逆湯

炮薑

附子

各五錢炮

白朮

一兩

甘艸 二錢

桂 七錢

右咬咀。每服半兩。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。食前。

實脉

○藿香半夏散

藿香葉

半夏

各一兩

丁香

五錢

右爲麤末。每服三錢。水一盞半。生薑七片。煎一盞。去滓。稍熱。食前服。

寸實

○涼膈散

山梔仁

一兩

連翹

黃芩

各二兩

大黃

五錢

薄荷

一兩五錢

朴硝

六錢

右爲麤末。每服半兩。水二盞。同竹葉七片。煎至一盞。入硝。去滓。入蜜少許。食後服。

關實

○調胃承氣湯

甘艸

五錢

芒硝

九分

大黃

一兩酒浸

右咬咀。每服半兩。水一盞。先煎大黃。甘艸至七分。去滓。入硝。煎一二沸。溫服。取利為度。

尺實

○木附湯

白朮

一兩

附子

炮五錢

甘艸

炙三錢

右咬咀。每服半兩。水一大盞半。煎至一盞。去滓。食前溫服。

弦脉

○八味丸

固濟丹田

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

熟地黃

八兩

山茱萸

山藥

各四兩

附子

炮去皮臍

肉桂

去粗皮各二兩

右爲末。煉蜜丸如梧桐子大。每服十五丸。至二十五丸。溫酒下。空心食前。日進二服。久服壯元陽。益精髓。活血駐顏。強志輕身。

寸弦

○小柴胡湯

柴胡

二兩

半夏

八錢

黃芩

甘艸

人參 各七錢半

右作五服。每加生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

關弦

○附子理中丸

附子

炮去皮臍

人參

去蘆

乾薑

炮

白朮

甘艸

炙各三兩

右爲細末。煉蜜每兩作十九。每服一丸。用水一鍾化開。煎至七分。空心服。

尺弦

○朮附湯

方見尺實

緊脈

○黃連瀉心湯

黃連

生地黃

知母

各一兩

黃芩

二兩

甘艸

五錢

右咬咀每服半兩水一盞半煎服。

○小承氣湯

生地黃

一兩五錢

黃芩

山梔仁

各一兩

大黃

五錢

用前方
右咬咀水煎一兩以利爲度。

寸緊

○大柴胡湯

柴胡 二兩

黃芩 七錢五分

芍藥 三錢

半夏 六錢五分

枳實 四枚

大黃 五錢

右咬咀作三服。每加薑棗水煎溫服。

關緊

○芍藥湯

赤芍藥 二兩

甘草 五錢

桂 三錢

右咬咀水煎一兩加生薑七片溫服如實痛
加大黃。

尺緊

○桂枝芍藥湯

桂 一兩

芍藥

甘草

炙各一兩

右咬咀每服一兩入薑棗煎服。

洪脉

○大承氣湯

大黃 五錢

厚朴 一兩

枳實 五箇

芒硝

五錢

右㕮咀。水二盞半。先將厚朴、枳實煎至一盞。入大黃煎七分。去滓。入硝煎一二沸。溫服。以利爲度。未利再服。

寸洪

○連翹湯

連翹

一兩

柴胡

當歸

生地黄

赤芍藥

各五錢

黃芩

一兩

大黃

三錢

右咬咀。每一兩。水煎服之。洪在上焦。

關洪

○調中湯

大黃

比衆藥減半

葛根

黃芩

芍藥

桔梗

茯苓

藁本

白朮

甘艸

各等分

右咬咀。水煎。一兩服。不拘時候。日二三服。洪在中焦。如秋冬寒在胃中。不可用。春夏可用。胃中有餘熱也。

尺洪

○澤瀉散

澤瀉

赤茯苓

各半兩

山梔仁

桑白皮

各一兩

右㕮咀。水煎一兩服。得小便利爲度。不除者。腎氣下痛。可用大柴胡湯加大黃下之。

八裏脉方

微脉

○香芩湯

血不止者

香附 一兩

當歸

白芍藥 各二兩

川芎 五錢

右咬咀水煎一兩食前服。

○當歸芍藥湯

當歸

白芍藥

熟地黃 各二兩

乾薑

右咬咀水煎一兩食前服。

寸微

○補肺散 又治勞嗽

阿膠

一兩五錢

甘艸

三錢

黍粘子

二錢五分

馬兜鈴

炒五錢

杏仁

去皮尖七錢

右爲麤末。水煎半兩。食後溫服。加糯米煎炒。

關微

○勻氣散

丁香

檀香

木香

白豆蔻

各二兩

藿香

甘艸

各八兩

砂仁

四兩

右爲末。每服一錢。入鹽少許。用沸湯點服。不

計時候。

尺微

○二氣丹

硫黃

細研

肉桂

去皮各一分

乾薑

炮

硃砂

爲衣各二錢

附子

一箇大者炮去皮臍爲末半兩

右並研極細。用麩糊爲丸。如梧桐子大。每服三十九。煎艾鹽湯。稍溫。空心下。

沉脉

○加減八物湯

當歸

白朮

人參

乾薑

各一兩

附子

炮去皮臍

白芍藥

桂

各五錢

丁香

三錢

右咬咀水煎一兩不拘時候。

寸沉

○半夏丸

半夏

一兩湯洗焙

雄黃

三錢

白礬

一錢燒過

右爲末。生薑汁糊丸如桐子大。每服三十九。

至五十九。生薑湯食後送下。

關沉

○加味橘皮半夏湯

陳皮

去白
三兩

半夏

製

枳殼

炒各
一兩

白朮

茯苓

桂枝

各五
錢

右咬咀。每服一兩。生薑七片。水煎。食前服。

尺沉

○黃芪丸

杜蒺藜

炒去
刺

川椒

茴香

炒

川烏

炮去
皮

赤小豆

地龍

去土
炒

防風

各一兩

烏藥

二兩

右爲細末。以酒煮麩糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心及晚食前。溫酒鹽湯任下。婦人醋湯空心下。

緩脉

○枳朮湯

白朮

一兩

枳實

炒

甘艸

各五錢

右咬咀半兩。入生薑七片。水煎食後溫服。

寸緩

○加味羌活湯

羌活

升麻

黃芩

葛根

石膏

各一兩

防風

麻黃

去節湯浸焙乾

藁本

蔓荊子

細辛

各五錢

右咬咀每服一兩生薑七片水煎溫服無時

關緩

○七氣湯

半夏

製一兩

人參

官桂

甘艸

炙各五錢

右咬咀每服一兩生薑七片煎服無時不已

再服

○溫白丸

主腹痛難伸音

川烏

炮去皮臍二兩五錢

柴胡

去蘆

桔梗

吳茱萸

湯洗七次炒

菖蒲

紫苑

去苗葉及土

黃連

去鬚

乾薑

炮

肉桂

去粗皮

茯苓

去皮

蜀椒

去目及閉口炒用

人參

去蘆

厚朴

黃汁製

巴豆

去皮心膜及油研

皂莢

去皮及子各五錢

右爲細末。入巴豆勻。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三丸。食後或臨臥生薑湯下。漸加至五七丸。

尺緩

○桂枝湯加乾薑

桂枝

一斤兩

白芍藥

乾薑

各五錢

甘草

炙四兩

右咬咀加薑棗水煎服。

潤脉

○滋陰大補丸

牛膝

酒浸

山藥

各一兩半

杜仲

酒和薑汁炒去絲

巴戟

去元

山茱萸

紅者去核

肉蓯蓉

酒浸焙乾

五味子

酒洗

白茯苓

去皮

茴香

炒

遠志

甘州同煮去心各一兩

石菖蒲

枸杞子

各五錢

熟地黃

二兩

右爲末。煮紅棗取肉。和煉蜜爲丸如梧桐子。

每服八十九。淡鹽湯或溫酒空心任下。

寸瀉

○加味桔梗湯

桔梗 一兩

半夏 五錢

陳皮 三兩

厚朴 一兩

枳實 五錢

右咬咀。每服半兩。白水生薑。食後煎服。

關瀉

○溫經湯

阿膠 炒

當歸

川芎

人參

肉桂

甘艸

芍藥

牡丹皮

各三兩

半夏

二兩半

麥門冬

五兩半

吳茱萸

三兩

右咬咀。每服半兩。水一盞半。生薑七片。煎八分。空心或食前熱服。

尺瀉

○五補丸

地骨皮

白茯苓

去皮

牛膝

去苗酒浸一宿

熟地黃

人參

各三兩

右爲末。燒蜜丸如梧桐子大。每服三十九。空心食前溫酒下。

○萆澄茄散

萆澄茄

阿黎勒皮

細辛

各一兩

人參

去蘆

草豆蔻

去皮

荆三稜

煨

木香

半夏

製

五味子

高良薑

青皮

去白

甘艸

炙各五錢

白朮

大腹皮

各三錢

右咬咀。每服三錢。水一盞。生薑半分。棗一枚。

煎至六分。去滓。稍熱。不拘時服。

導赤散

○導赤散

治小腸實熱

生地黃

木通

甘草等分

右入竹葉煎

○六味地黃丸

山藥

山茱萸

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三錢

熟地黃

八錢

右爲末。煉蜜丸。如梧桐子大。每服五十九。清

湯空心下

寸遲

○朮附湯

白朮

附子

炮去
皮臍

乾薑

炮

桂

各一
兩

右咬咀如法煎一兩食前服。

關遲

○桂枝加附子湯

桂枝

附子

炮各
一兩

甘草

二錢
五分

右咬咀如法煎服。

尺遲

○附子理中丸

附子

炮去皮

人參

乾薑

炮

白朮

甘艸

炙各三兩

右爲細末。煉蜜爲丸。每兩作十九。每服一丸。用水一盞。化開煎至七分。空心服。

伏脉

○升麻湯

伏冬用

升麻

一兩

雞蘇

四兩

地骨皮

八兩

蜂房

甘松

俱去土

細辛

防風

甘艸

各二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓熟

服春夏以麻黃湯

寸伏

○沉香丸

沉香

木香

各一錢半

枳殼

麩炒

蘿蔔子

炒
二錢

右作一服水二盞。生薑三片煎至一盞。不拘時服。

關伏

○三膈寬中散

白豆蔻二兩

砂仁

青皮

陳皮去白

丁香各二兩

木香

甘艸各一兩半

香附製

厚朴製各八兩

右爲細末。每服三錢。白湯點服。無時。

尺伏

○四白湯

白朮

二兩

白茯苓

白芍藥

黃芪

各五錢

右爲麤末。每服半兩。入薑棗煎服。

濡脉

其症已危。故不立方。

寸濡

○桂枝湯

方見寸浮

關濡

○加味四君子湯

人參

五錢

白朮

茯苓

各一

甘艸

三錢

茯神

八錢

右咬咀。每服四五錢。水煎服。

尺濡

乃骨痿不能起於牀。五損至骨。故不治。

弱脉

老弱之人得此。其病自痊。少壯得此。乃危症

也。故不立方。

寸弱

○四逆湯

甘艸

一兩

乾薑

七錢

附子

半生去皮
臍六錢

黃連 五錢

右咬咀。每服三錢。水一盞半。煎至一盞。去滓。
不拘時溫服。

關務

○平胃散

蒼朮

八錢

陳皮

厚朴

製各五兩

甘州

炒三兩

右爲細末。每服三四錢。薑棗煎湯。或鹽湯調服。

尺弱、陰氣已絕。無法可治。故不立方。

九道脉方

長脉

○地骨皮散

地骨皮

茯苓

各半兩

柴胡

黃芩

生地黃

知母

各一兩

石膏

二兩

右咬咀。入生薑煎。如自汗已多。加知母。此法在五臟之標。是皮毛血脉肌肉筋骨之病。故

徐徐發者汗之緩也

短脉

○溫白丸 方見緩脉

虛脉

○加減小柴胡湯

柴胡 去苗

黃芩 各一兩

地骨皮

人參

知母

半夏 製

茯苓 各半兩

甘艸 炙三錢

白芍藥 八錢

右咬咀每服一兩薑水煎服。

代脉

漸加劑死漸息則生故不立方

和脉

宜瀉三焦之火。禁暴用寒藥急攻

代脉

○人參黃芪湯

主暴損

人參

茯苓

熟地黃

甘艸

炙

地骨皮

各五錢

黃芪

桔梗

白芍藥

天門冬

半夏

製

當歸

各一兩

陳皮

三兩白

右咬咀。入生薑十片。水煎一兩。去滓。食前服。

滋養血氣調和榮衛和順三焦通行血脉若傷寒代者灸甘艸湯。

牢脉

此係危症故不立方。

動脉

○八物湯

當歸

白芍藥

熟地黃

白朮

各一兩

人參

乾薑

炮

茯苓

桂

各半兩

右以酒阻每服一兩生薑七片水煎為前服

○茴香丸

葳靈仙

去土

川烏

炮去
及膽

陳皮

去白

防風

去苗

川練子

麥炒

草薺

各三
兩

烏藥

川椒

去目及閉口
者炒二兩

赤小豆

茴香

炒各
八兩

地龍

去土炒
七兩

右爲細末。以酒煮麩糊爲丸。如梧桐子大。每服二十九。空心及晚食前。溫酒鹽湯任下。

脉訣附方

終