

四診脉鑑大全

四診脉鑑大全卷之三

雲間廸功郎浩然王宏翰著輯

男 聖來王兆文叅較

問證詳診論

問診一端亦醫士之要務若不委曲細心先用望聞之功而卒然問之則不當或頻頻而問則病家反生疑惑而隱諱或謂醫者學問不精豈可不預習純精而臨症庶不爲愚所難也今余逐一採集靈素諸名家

之要旨臚列明白使後學有所適從也

徵四失篇黃帝曰診病不問其始憂患飲食之失節起

居之過度或傷于毒不先言此卒持寸口何病能中

妄言作名爲麤所窮

此言不問致病之由先與切脉未免模糊揣度僞指病名爲粗

人所窮必不能
切中病情也

疏五過篇黃帝曰凡未診病者必問常貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營常富後貧名曰失精五氣留連病有所并醫工診之不在藏府不變軀形診之而疑不知病名身體日減氣虛無精病深無氣洒洒然

時驚病深者以其外耗於衛內奪於營良工所失不知病情此治之一過也

言人常貴後踐者責則博榮
踐則屈辱既屈且辱則眷念

故位雖不中邪憂惶內生則心志不樂營血無生脉
氣虛減名曰脫營亦有常富後貧者富則膏梁貧則藜藿先豐後敍患傷故物藏液不生名曰失精由是
五藏之精氣鬱滯留連病因之以合併也二者得病
之初也不在藏府則藏府中無形可求不變形軀則
體中無證可驗醫診而疑不知病名難以妄擬既而
病之將久則身體因脫營而日減故氣應而無精漸
至病深則中氣怯而氣少陽衰畏寒覺洒洒然有時
而驚病深如此氣隨悉減血爲憂前故外耗于衛內
傷于薄也醫人失問其始則病從何知此治病者之一
一遇也

又曰凡欲診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦

皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脈去形愚醫治之不知補瀉不知病情

精華日脫邪氣迺并此治之二過也

此言診病者必先問其今昔飲食居處飲食有膏梁藜藿施治之不同居處有溫涼

燥潤制方之亦異苦樂宜後素暮樂則喜喜則氣緩苦則悲悲則氣消皆能傷於精氣而令形體毀沮且怒爲肝志怒則氣逆故暴怒傷陰喜爲心志喜則氣緩故暴喜傷陽陰陽受傷則厥迺之氣上行故厥滿而形血耗洩也愚醫不知喜怒哀樂之殊不諳補瀉之法固知得病之情使彼精華日脫虛則受邪故邪氣日并也此治病者之二過也

又曰善爲脉者必以比類奇恆從容知之爲工而不知道此診之不足貴此治之三過也

玄臺註曰古醫有比類奇恆從容諸

篇皆至道之要。卽如素問內第七十六篇示從容論者其大畧也。若爲脈者知之爲工。而不善脉者不知爲失。此治病者之三過也。○岐玄註曰。奇恆謂氣取奇異於極常之候也。從容謂分別臟氣虛實脉見高下。幾相似也。○鶴臯註曰。比類奇恆謂比量類例於奇異及庸常之証也。從容知之從其容之長少壯緩度而知也。王公之論雖以不同。繩繹文義皆相合。經文爲學者宜參看焉。

又曰。診有三常必問貴賤。封君敗傷及欲侯王故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋屈。瘦贊爲擊醫不能嚴。不能動神。外爲柔弱。亂志失常。病不能移。則醫事不行。此治之四過也。

問其貴賤。容苦樂也。封君敗傷謂常。封君爲事毀敗而中傷也。欲侯王謂情慕尊貴。而妄起念慮也。診脉

當用此三常之法。彼常貴之人而脫勢則憂惶。貧迫內必傷其精神。外必則敗亡其身體也。始富後貪之上失其肥甘。恐威傷內五液乾涸不榮。則皮焦筋屈痿楚為疾苦不能服成其非。竦動其神外為柔和萎弱從而順之以亂其天常之性。既以病不能核而何醫之有。此治病者之四過也。

又曰。凡診者必知終始。有知餘緒。切脈問名。當合男女。

離絕菀

音鑿
同

結憂恐喜怒。五藏空虛。血氣離守。工不

能知。何術之語。常富大傷。斬筋絕脈。身體復行。令澤

不息。故傷敗結留薄歸陽。膿積寒火

音炯

粗工治之亟

刺陰陽。身體解

解同

散四肢轉筋。死日有期。醫不能明。

不問所發。惟言死日。亦爲粗工。此治之五過也。

終始謂氣

色也。脉要精微曰：知外者終而始之。明知五色，氣終而復始也。餘皆謂病發端，病勢相因。諸凡情事，又必切其脈體，問其病名，合其男女氣血之不同，其孫真症亦當符合也。凡離間其親旁，隔絕其所懷思慮，鬱鬱積結而不解者，夫離則冤，絕則魄喪，冤則神勞，結則志苦，憂則氣塞，恐則氣下，喜則氣緩，怒則氣逆，有是八者，致使五藏空虛，血氣離守。醫不知此，何術之有？況病者膏肓大有傷損，筋若斬而脈若絕，損傷之甚者也。身體雖復舊面行而津液不能如前滋息，若故時仍損復鍛而結，或留薄歸於諸陽之原，精成積血，令人寒熱交作也。粗工不知寒熱爲腰積所生，以常善之疾，未施治之，亟刺陰陽經脉，氣奪而甚，致身體解散而不用，四肢廢運而轉筋，竟期有日矣。爲醫者不能明其病之所由，不問其病之從何而發，草率粗畧，惟判死期，真庸陋之工，此治病者之五過也。

此五者皆受術不通，人事不明也。

以上五過皆受業不精，不格，知世事

人情之變
集

啟蒙問病法

此問法雖屬粗畧庸常然初學者得以易習詳究一至學問淵深自然神

常暮發熱否

脈經曰小腸有宿食常暮發熱明日復止也

頭痛否

痛無間歇爲外感
痛有間歇爲內傷

項強否

暴強則爲風寒
久強則爲痰火

鼻有涕否

或無涕而燥或鼻塞或素流涕不止或鼻癢或酒膾

耳鳴耳聾否

或左或右久聾者不可純用補瀉之劑須兼開闔行氣之藥

嘔吐否

或仰嘔或食久乃嘔或渴嘔或乾嘔或食

口知味否

或不食亦能知味爲外感風寒或食亦不知味爲內傷飲食

有寒熱否

寒熱有間者無間爲外感有間爲內傷

午寒夜熱則爲陰虛火動

口渴否

渴飲冷木者爲熱渴飲熱木者爲虛夏月大渴好飲者爲暑

舌有胎者

或白或黃或黑或紅而裂

咽痛否

暴痛多痰熱素慣痛多下虛

手掌熱否

手背熱爲外感手掌內熱爲內傷

目紅腫否

或素疼或暴紅腫

手指稍冷否

冷則爲感寒不冷則爲傷風素清冷則爲虛矣

胸膈滿否

曾用下藥者爲結胸未下者爲邪入少陽經分爲胸滿非結胸也素慣胸滿者多陰多痰火下

虛

心煩否

或只煩躁不寧或欲吐不吐謂之嘈雜或多驚恐謂之怔忡

腹脹否

或大腹作脹或小腹作脹

脇痛否

或左或右或兩脇俱痛或一點空痛

腹痛否

或大腹痛或臍中痛或小腹痛
暴痛屬寒久痛屬火屬虛

心痛否

暴痛屬寒久痛屬火屬虛

腹有痞塊否

或臍上下有痞塊或臍左右有痞塊或臍中
之藥宜兼消導行氣之劑

肩背痛否

久痛爲太陽經火
暴痛爲外感久痛爲虛損挾鬱

手足癱瘓否

左手足臂脣不舉或痛者屬血虛有火
右手足臂脣不舉或痛者屬氣虛有痰

腰脊痛否

新爲腎志扶滯

脚掌心熱否

熱則下虛火動脚跟痛者亦腎虛有熱脚指及掌心冷者爲寒

膝痠軟否

寒酸軟則爲脚氣或胃弱久病則爲腎虛

脚腫痛否

腫而痛多屬濕不腫脹枯細而痛者爲血虛爲濕熱下注也

陰強否

陰強爲有火
陰痿爲無火

小便淋閉否

渴者爲熱
不渴爲虛

大便泄否

或瀉泄或水泄或晨泄或食後即泄或黃昏時泄一日共泄幾行

大便閉否

秘而不渴不張者爲虛

小便清利否

急爲下虛，疾在表，赤瀉爲邪在裏，須數君清利爲下虛，疾在表，赤瀉爲邪在裏，須數君急爲下虛，疾在表，赤瀉爲邪在裏，須數君

素有疝氣否

有疝氣宜兼涼肝壯氣藥，不可妄用升提及動氣之劑

素有夢遺白濁否

有遺濁爲精虛，不可輕汗下

素有便血否

有便血痔瘡不敢過用燥藥恐燥陰傷藏

有瘡疥否

有瘡疥忌發汗宜

有房室否

男子犯房則氣血暴虛，雖有外邪，戒用猛劑，攻補宜酌可也。

飲食喜冷否。

喜冷則爲中熱

飲食多少否。

能飲食者易治全不食者難治惟傷寒不食亦無害

素飲酒及食煎炒否。

酒客多疾熱煎炒犯上焦或流入大腸而爲渴熱症

飲食運化否。

能食不能化爲脾寒胃熱

有汗否。

外感有汗爲陽風無汗爲

傷寒雜症有汗爲陽虛

有盜汗否。

裏邪內傷則爲陰虛有火

夜重否。

或晝輕夜重爲血病爲氣虛

渾身骨節疼痛否。

外感則邪居表分內傷則氣血不和重痛者則痰濕氣

病經幾時否。

或幾日或幾年

年紀多少否

壯年病可耐老年病雜則元氣難當婦人
生產多年少者血雖虛氣猶盛或生產多

年又多則血氣皆少

宜補不宜攻

所處順逆否

所處順則性情和而氣血易調所處逆則氣血拂鬱須于所服藥中量加開鬱行氣

之利

曾悞服藥否

誤服藥則氣血亂而經絡雜急病隨爲調解緩病久病停一二日後藥之可也

婦人經調否

或參前爲血熱或過期爲血虛或當經行時有外感經盡則散不可妄藥以致有犯

海白

經閉否

或有潮熱或有咳嗽或有失血或有白帶否能飲食否能食則血易調而諸症自除食減漸瘦

瓦者

有癥瘕否

有腹痛潮熱而一塊結實者爲癥瘕。較比
較而稍輕。癥者堅而不移。瘕者堅而能移。

有孕能動否

腹中有一塊結實能動而無腹痛潮熱等
症。爲有孕。腹虛大腹滿。按之無一塊結實

者爲氣病。其經

水時漏滲下。

產後有寒熱否。惡露多少。否。有腹痛否。有汗否。有咳嗽

否。

寒熱多爲外感。發散兼補。惡露少則瘀血留滯。變
生諸病。腹痛多爲瘀血。或食積停滯。有汗單潮爲

氣血大虛。咳喘爲
瘀血入肺難治。

凡女人天癸未行之時屬少陰。旣行屬厥陰。已絕屬太
陰。胎產之病從厥陰。

凡婦人室女病寒。及諸寒熱氣滯。須問經事。若何。凡產

後須問惡露有無此皆要訣也

凡初症題目未定最宜詳審病者不可諱疾忌醫醫者必須委曲請問人非神聖何能一診盡悉其病情也若題目已定或外感或內傷或雜症自當斟酌前賢之法不可執泥以致偏妄也慎之戒之

四診脉鑑大全卷之四

雲間 浩然王宏翰著輯

男 聖發王兆武叅較

診脉秘要十二法

診脉之道
須調己息凡診脉之道先須調自己氣息男左女右先以中指定得掌後高骨爲關位却齊下食指無名指以接尺寸如人長則臂長臂長則下指疎排人短則臂短臂短則下指密排然後自寸關尺逐部尋究初輕按以消息之次中按以消息之次重按以消息之

一呼一吸脉行四至間以太息脉五至爲平脉也其
有太過不及則爲病脉各以其部之脉斷之也

按寸關尺法

掌後高骨爲關關上爲寸關下爲尺自關

而上至于魚際

魚際太陰穴也

掌後關上爲寸關下爲尺自關

而上至于魚際

腕中大橫紋是也

掌後關上爲寸關下爲尺自關

一寸故曰寸部

銅人寸者男左女右屬中指

量中節兩角尖紋爲一寸也寸陽也

清陽上升故曰關前爲陽陽數九故於寸內取九分
以候陽若脉上行九分之外出乎魚際則曰溢自關
而下至于尺澤

尺澤太陰經穴也

得銅人身寸之一尺故曰尺部尺陰也濁陰下降故曰關後爲陰陰

數十故於尺內取寸以候陰

從魚際穴至尺澤穴共一尺一寸

若尺

下縮于一寸之下入乎尺中則曰覆經曰關格覆溢者死言陰乘乎陽陽無所容而上溢陽乘乎陰陰無所容而深覆故覆溢是真藏脉至人雖不病而必死也

脈上魚際脉入天

澤分別平病論

上魚際之脉世人每常有之不可一

例論也有一手上魚際者有兩手上魚際者若平人神色充實而有此脉者此天稟之厚精神足旺其脉上溢於魚際其人必壽至於入尺澤之脉稟厚之人

亦常有之其人亦必壽此乃帝固根深之象故脉畏而入尺中若人素無此脉一旦上魚際或入尺澤者此病脉也醫士當詳辨而密診焉

三部脉配 上
中下三焦

寸關尺爲三部寸爲陽象天候上焦自頭

至心胸之分關爲陰陽之中候中焦自胸至臍胠脇之分尺爲陰象地候下焦自少腹腰股脰足之分

三部九候詳
診脈之法

三部之中各以浮中沉三法候之三三而

九曰九候浮者輕手取之即得脉行於皮膚之間主心肺治從標沉者重手取之始得脉行於筋骨之間

主肝腎治從本中者按指畧重乃得脈行於肌肉之間主胃氣不從標本而從乎中也脈浮則發表誤次裏則死輕則變癥壞而不救沉則攻裏誤發表則死輕則變病壞而不救中則調養將息誤攻表裏則傷胃氣胃氣傷則水穀無所主化生之本絕矣

人迎氣左手爲陽主血寸陽血尺陰血關前一分曰人迎候外感風寒暑濕燥火天之六氣淫則爲邪起居不謹則外邪迎之而入故曰人迎右手爲陰主氣寸陽氣尺陰氣關前一分曰氣口候內傷喜怒憂思悲

恐驚人之七情過則爲戾飲食勞慾不節則真氣因之以傷故曰氣口

六部驗脉
知平病法

凡六部之內大小浮沉遲數同等尺寸陰陽高下相得男女左右強弱相應司天時氣脉不相戾爲天眞委和之脉命曰平人其或一部之內獨太獨小偏遲偏疾左右強弱之相反四時男女之相背皆病脉也凡病脉之見在上曰上病在下曰下病左曰左病右曰右病左脉不和爲病在表爲陽主四肢右脉不和爲病在裏爲陰主腹藏以次推之也

察時脈
與胃脈

凡診脈先識時脉與胃脈及藏府平脉然後推之病脉時脉謂春三月六部中俱帶弦夏三月俱帶洪秋三月俱帶浮冬三月俱帶沉胃脈謂中按得之脉來和緩有神也凡藏府脉既平又得時脉與胃脉是無病者也反此者爲病脉

取脉有
綱領

取脉有取脉之道理各不同脉之形狀又各非一凡脉之來必不單至必曰浮而弦浮而數沉而緊沉而細之類將何別之大抵提綱之要不出乎浮沉遲數滑濤之六脉也浮沉之脉輕手重手取之也遲數之脉

以已呼吸察至數取之也滑濶之脉則察夫往來之形狀也浮爲陽輕手而得之也而芤洪虛散濡弦長革之八脉皆輕手而得之類也沉爲陰重手而得之也而伏短細實牢之五脉皆重手而得之類也遲者一息三至而緩結微弱之四脉皆遲之類也數者一息六至而緊動促之三脉皆數之類也尚有藏府衰憊而脉代者或曰滑類乎數濶類乎遲何也然脉雖似是而理實殊也但遲數之脉以呼吸察其至數之疎數滑濶以往來察其形狀之流滯也數爲熱遲爲

寒滑爲血多氣少。濁爲氣多血少也。

脈有表裏虛實之診 診脈須辨表裏虛實四字。表者陽也。府也。

凡六淫之邪侵襲於經絡而未及乎胃府及藏者皆屬於表也。裏者陰也。藏也。凡七情之氣鬱滯於心

腹之內不能越散。又飲食五味之傷留於府藏之間

不能通泄者皆屬於裏也。虛者藏府之氣不足精

神耗散氣力衰竭也。實者邪氣有餘之實由正氣

之本虛邪氣乘之非元氣之自實也。故虛者補其

正氣實者瀉其邪氣經所謂邪氣盛則實精氣奪則

虛此大法也。

察脈有
無神氣東垣曰不病之脉不求其神而神無不在也有病之脉則當求其神之有無謂如六數七極熱也脉中有力卽有神矣爲當泄其熱也三遲二敗寒也脉中有力卽有神矣爲當去其寒也若數極遲敗之中不復有力卽無神矣將何所持耶苟不知此而遽泄之去之人將何以依而生哉經曰脉者氣血之主氣血者人之神也善夫

診脈要明
五虛實

五虛者脉細皮寒氣少泄利前後飲食不入

也。若漿粥入胃而渴止者則生。五實者，脈盛皮熱，腹脹，前後不通，瞀悶也。若大小便通利而得汗者，則生。

男女老幼所稟不同脉各異診論

人之稟質所各不同而診脈者猶當諸曉如氣血盛則
脉盛氣血衰則脉衰氣血熱則脉數氣血寒則脉遲
氣血微則脉弱氣血平則脉治長人脉長短人脉短
性急人脉急性緩人脉緩室女尼寡則脉濡弱嬰兒
稚子則脉急脉常七至爲平男子陽氣常旺故左大
爲順女子陰氣常旺故右大爲順是以男子寸脉常
旺而尺脉常弱女子尺脉常旺而寸脉常弱此皆其
常也反之者病又有人稟雄壯而六部之脉俱細小

均等者謂之六陰脈此天稟之靜清逸之士也或六部之脉俱洪大有力相等者謂之六陽脈此稟質厚而脉亦旺乃剛強之人亦皆平脉也酒後之脉常數飯後之脉常洪久飢之脉必空遠行之脉必疾臨診者皆當詳審焉

肥盛之人雖曰氣居於表六脉每帶浮洪爲常若使肌肉過於堅厚脉之來勢不能直達於皮膚反重按乃見倘守浮洪易見之說以輕手取之則脉來模糊細小而本脉竟不能測矣瘦小之人雖曰氣斂於中

六脈每帶沉數爲常若使肌肉過於淺薄脉之來勢
呈於皮膚反輕手卽見矣。室女尼寡雖曰脉來濡
弱爲常若襟懷恬澹脉亦冲和。嬰兒氣稟純陽雖
曰脉來急數爲常倘稟弱質寒則脉亦遲緩矣。性
急之人雖曰脉數六至爲平或遇從容優逸之時亦
有舒徐之脉。性緩之人雖曰脉遲爲常偶當性惚
多事之時亦有急數之脉。北方之人每見強實爲
爲常倘累世膏梁或母係南產亦有軟弱之形。南
方之人軟弱爲常或先天稟厚亦有強實耐勞之質。

脈見壯實有力。少壯之脈大爲常。或稟弱天促者亦見虛細也。年老之脈虛軟爲常。或壯實而非躁者。此天稟之厚。肺順之徵。名曰壽脈。若脈躁疾有表無裏。此謂孤悶。五期近矣。經曰形氣相得者生。三五不調者死。此皆察脈之活法。豈可執泥拘滯爲學者。可不細心變通乎哉。

七診雖見九候皆從者不死

素問三部九候篇

岐伯曰察九候獨小者病獨大者病獨疾者病獨遲者

病獨熱者病獨寒者病獨陷下者病

言九候之中復有七診之法。有

獨見之脈與他部不同者卽察其部而知病之所在也而獨熱獨寒者謂其或在上或在下或在表或在

裏也陷下者沉伏不起也此雖以三部九候爲言而於氣口部位類推爲用亦惟此法形瘦脉

大胸中多氣者死

形體消瘦而脈反大胸中又多氣者陰精衰敗而形敗而孤陽虛炎

之勢安能久世乎形肉已脫九候雖調猶死形肉消脫大肉

肉爲五藏之本未有脾氣脫而能生者九候之七診

中雖無獨見之七診而脈雖調難免于死也雖見九候皆從者不死

從者順也謂脈順四時之氣又順五藏之常與病症爲順

四言脉金
卷之四
七
者雖有獨小獨大之七
診等脉不至死也

白診脈鑑卷之四 終

四診脉鑑大全卷之五

雲間浩然子惠源王宏翰著輯

男 聖啟王兆成叅較

五藏有四時之脉診要須明平病真藏脉法論

肺藏脉法

肺脉浮濶而短。肺合皮毛。肺循皮毛而行。持肺脉之法。下指如三菽重輕。輕按至皮毛而得者爲浮。稍稍如意力。脉道不利爲濶。不及本位爲短。此肺脉之平也。亦曰毛。○肺部不見毛而見洪大。此心火刑之也是謂。

賊邪見弦急此肝木侮之也是爲微邪見沉細此腎水乘之也是爲實邪見緩大此脾土救之也是爲虛邪

秋肺司令西方金也萬物之所以收成也其氣來虛以浮來急去散故曰浮反此者病氣來毛而中火堅兩旁虛如循雞羽此爲太過病在外氣來毛而微此爲不及病在中太過則令人逆氣而背痛慍慍然不舒不及則令人喘呼吸少氣而咳上氣見血喘而咯血肺中有聲

秋以胃氣爲本。秋胃微毛曰平。毛多胃少曰病。但毛無
胃曰死毛而有弦曰春病弦甚曰今病。

平肺脉來厭厭聶聶如循榆莢。

病肺脉來不上不下如循雞羽。

死肺脉來如物之浮如微風吹毛。

真肺脉來大而虛如以毛中人膚色赤白不澤毛折乃

死肺至懸絕十二日死。

凡浮而濶短皆肺也。肺脉搏堅而長當病吐血更而散

病灌汗。至今不復散發。

心臟脉法

心脈浮大而散心合血脉脉循血脉而行持心脈之法
下指如六菽重畧畧按至血脉而得者爲浮畧加大
脉道粗大爲軟潤爲散此心脈之平也有力爲洪
亦曰鈞○心部不見鈞而見沉細此腎水刑之也是
爲賊邪見毛濤此肺金侮之也是爲微邪見緩大此
脾土乘之也是爲實邪見弦急此肝木救之也是爲
虛邪

夏心司令南方火也萬物之所以盛長也其氣來盛去

衰故曰鈎反此者病氣來盛去亦盛此爲太過病在外也氣來不盛去反盛此爲不及病在中太過則令人身熱而膚痛爲浸淫不及則令人煩心上見咳唾下爲氣泄夏以胃氣爲本夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰病但鈎無胃曰死鈎而有石曰冬病石甚曰今病

平心脈來累累如連珠如循琅玕

病心脈來喘喘連屬其中微凹

死心脈來前曲後倨如操帶鈎

真心脉至堅而持如循薏苡子累累然色赤不澤毛折乃死心至懸絕九日死

凡洪大而浮皆鈎皆心也心脉搏堅而長當病舌卷不能言弱而散消環而已心脉急病名心疝少腹當有形也

脾藏脉法

脾脉緩而大脾合肌肉脉循肌肉而行持脉之法下指如九菽重畧重按至肌肉如微風輕颺柳稍爲緩次稍加力脈道敦重爲大此脾脉之平也亦曰弱弱○

脾脈不見弱而見弦急此肝木刑之也是爲賊邪。
見沉細此腎水侮之也是爲微邪。見毛濤此肺金乘
之也是爲實邪。見洪大此心火救之也是爲虛邪。
脾爲孤藏以貫四傍盛於長夏其脉來如水之流此爲
太過病在外如鳥之喙此爲不及病在中太過則令
人四肢不舉不及則令人九竅不通名曰重強。
長夏以胃氣爲本胃而微弱曰平弱多胃少曰病但
代無胃曰死弱而有石曰冬病石甚曰今病。
平肝脈來和柔相雜如雞踐地。

病脾脈來實而盈數如雞舉足

死脾脈來銳堅如鳥之喙如鳥之距如屋之漏如水之流

真脾脈來弱而乍踈乍數色黃青不澤毛折乃死脾至懸絕四日死

凡嘔緩皆脾也脾脈搏堅而長色黃病少氣嘔而散色不澤病足脇腫若水狀也胃脈搏堅而長色赤病折辟嘔而散病食痺實則脹虛則泄

肝藏脈法

肝脉弦而長。肝合筋。脈循筋脈而行。持肝脉之法。下指如十二菽之重重。按至筋而脈如切繩曰弦。迢迢端直而長。此肝脉之平也。○肝部不見弦而見短濶。此肺金刑之也。是爲賊邪。見緩大。此脾土侮之也。是爲微邪。見洪大。此心火乘之也。是爲實邪。見沉細。此腎水救之也。是爲虛邪。

春肝司令。東方木也。萬物之所以始生也。其氣來兾弱輕虛而滑。端直以長。故曰弦。反此者病氣來實而強。此謂太過。病在外。氣來不實而微。此謂不及。病在中。

太過則令人善怒忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸痛引背下則兩脇胠滿

春以胃氣爲本胃而微弦曰平弦多胃少曰病但弦無胃曰死弦而毛曰秋病毛甚曰今病

平肝脉來弱急迢迢如揭長竿末梢

病肝脉來盈實而滑如循長竿

死肝脉來勁急如新張弓弦

真肝脉至中外急如循刀刃責責然如按琴瑟色青白不澤毛折乃死○肝至懸絕十八日死

凡弦皆肝也。肝脉搏堅而長色不青。當病墜若搏。因血
在脇下。令人喘逆其硬而散色澤。當病溢飲溢飲者。
渴暴多飲而易入肌皮腸胃外也。

腎藏脈法

腎脉沉硬而滑。腎合骨。脈循骨而行。持腎脈之法。下指
極重。按至骨而得。曰沉無力。爲硬流利而滑。此腎脈
之平也。亦曰石。腎脈不見石而見緩大以長。此脾
土刑之也是爲賊邪。見洪大。此心火侮之也是爲微
邪。見弦長。此肝木乘之也是爲實邪。見短濤。此肺金

救之也是爲虛邪。

冬腎司令北方水也。萬物之所以合藏也。其氣來沉以搏。故曰營。反此者病。其來如彈石者。此謂太過。病在外。其去如數者。此爲不及。病在中。太過則令人解㑊。脊脈痛。少氣不欲言。不及則令人心懸。如病飢眇中清。形腰
中也脊中痛。少腹滿。小便變。

冬以胃氣爲本。胃而微石曰平。石多胃少曰病。但石無胃曰死。石而有鉤曰夏病。鉤甚曰今病。

平腎脉來喘。喘累累如鉤。按之而堅。

病腎脈來如引葛按之益堅

死腎脈來發如奪索辟辟如彈石

真腎脈來搏而絕如彈石辟辟然色黃黑不澤毛折乃死腎至懸絕七日死

凡沉滑皆營皆石皆腎也腎脈搏堅而長色黃赤病折腰更散病少血至冬不復

三因脉法論

三因者內因外因不內外因也。外傷六氣曰外因。麻
來浮緩則傷風病在衛。弦緊則傷寒病在營。虛弱則
傷暑病在氣。沉緩則傷濕病在內。長躁則傷燥病在
血。虛數則傷熱病在皮毛。此外邪所干脉見其情俱
當升散者也。內傷七情曰內因。脉來虛散喜傷心
也。弦激怒傷肝也。沉濇憂傷氣也。結滯思傷脾也。緊
促悲傷肺也。沉弱恐傷腎也。動搖驚傷胆也。此內淫
所奪脉見其情俱當平補者也。飲食勞倦損傷曰

不內外因脉來細數弦滑則傷飲短滑疾實則傷食
沉數頂指則冷積弦數弱大則勞倦極也微弱伏氣
則色慾過也沉伏滯濁抑鬱甚也此正氣之所奪脉
見其情久則變爲虛勞俱當調理者也

南政北政有不應之脉

不應者。脈來沉細不應於指。甚至極沉極細而伏。或於不可見也。第覆病者之手。而診之則見矣。凡值此不應之脉。乃歲運所至。命曰天和。非病脉也。醫不知此。若悞以病脉治之。反伐天和。以致夭亡。可不慎哉。

甲己二年爲土運。是南政蓋土位居中。如君之面南而行令也。三陰司天。則寸不應。三陰在泉。則尺不應。○如少陰司天。則兩寸不應。少陰爲君。故兩寸不應也。厥陰司天。則右寸不應。太陰司天。則左寸不應。○少陰在泉。則兩

尺不應厥陰在泉則右尺不應太陰在泉則左尺不應

乙庚丙辛丁壬戊癸八年乃金水木火之四運爲北政如臣之北而而行也三陰在上則尺不應三陰在下

則寸不應也○如少陰司天則兩尺不應厥陰司天

則右尺不應大陰司天則左尺不應○少陰在泉則

兩寸不應厥陰在泉則右寸不應太陰在泉則左寸

不應若寸當沉細而反浮大尺當浮大而反沉細尺

當不應而反浮大寸當浮大而反沉細者是爲尺寸

反經曰尺寸反者死○如右當不應而反浮大左當

浮大而反沉細，左當不應而反浮大。右當浮大而反

沉細者，是爲左右交經曰：左右交者死。

南北政者，以面南而北

之謂也。不應者，謂陰之

所在，則脉沉細而不應

也。如甲己之歲二運而

南論脉，則寸在南而尺

在北。少陰司天兩寸不

應，少陰在泉兩尺不應。

南北政司天原不應圖



乙丙丁戊庚辛壬癸之歲

四運西北論脉則寸在北

而尺在南少陰司天兩尺

不應少陰在泉兩寸不應

乃以南爲上北爲下六氣

之位則少陰在中而厥陰

居右太陰居左此不可易

者故少陰主兩尺寸厥陰

當在右太陰當在左也

北政司天脈不應圖



六氣之脉應節候之診

素問至真要大篇

厥陰之至其脉弦

此言主氣也大寒至驚蟄爲厥陰風木主之初氣也其氣之至脈來弦也

但子午之年客氣之初氣乃太陽寒水然太陽之至其脉大而長之類爲醫者學宜活潑不可拘執若由

言主氣而不言客氣恐臨診有所不應後學無所遵從也丑未之年客之初氣厥陰風木寅申之年客之初氣少陰君火卯酉之年客之初氣太陰濕土辰戌之年客之初氣少陽相火巳亥之年客之初氣陽明燥金也

少陰之至其脉鉤

春分至立夏爲少陰君火主之二氣也子午之年客之二氣厥陰風木

卽丑未之初氣也丑未之年客之二氣少陰君火卽寅申之初氣以此類推

少陽之至大而浮

小滿至小暑爲少陽相火主之三氣也如子午之年客之三氣卽寅申年客

之初氣少陰也丑未年客之三氣卽

卵酉年客之初氣太陰之類是也

太陰之至其脉沉大暑至白露爲太陰濕土主之四氣

之初氣太陰濕土丑未年客之四氣卽

卽辰戌年客之初氣少陽之類是也

陽明之至短而濶秋分至立冬爲陽明燥金主氣之五

之初氣少陽相火丑未年客之五

太陽之至大而長小雪至小寒爲太陽寒水主氣之六

之初氣陽明燥金丑未年客之六氣卽子午年

客之初氣太陽寒水之類以此而推之也

按以上六氣之脉各有其時時至則氣至氣至則脈

至所謂天和也經曰母伐天和若至而甚則失中和之氣則病如但弦無胃之類時至脈不應來氣不足也亦病時來至而脉先至來氣太過也亦病如此之

頤安可
不知也。

反關脈論

脉不行於寸口。由列缺絡於臂後手陽明大腸經也。以其不正行於關上。故曰反關。醫士反其手而診之。乃可見也。或云左手得之主貴。右手得之主富。左右俱得富而且貴之說。余初以爲實然。及後連診左手反者。其言不驗。則知此乃風鑑之說。醫與儒道合。不可泥作此言也。至於診太素脉者。定人富貴窮通灾患之說。此乃兼諸風鑑部位辨別氣色也。而彭用光著體仁集編一書。其議論雖似是而實非。余少年曾經

討究診之疾病壽夭有驗其富貴窮通實在風鑑部
位災患則在氣色若獨以脉斷驗杳無是驗矣

衝陽太谿太衝脈論

衝陽者，胃脉也，在足跗上五寸。仰脚而上骨間動脈中去陷谷三寸。蓋胃屬土，爲萬物之母。人以胃氣爲本。若病甚而衝陽脈診之不衰，則胃氣尚在。病雖危，猶可生也。然脈雖旺，又忌弦急。弦急者，肝脉也。若見此脉爲木來剋土，謂之賊邪，不治。

太谿者，腎脉也。在足內踝後跟骨上。踝骨者，仰脚後兩
骨也。在外爲內踝，在內爲外踝。動脈陷中。蓋腎爲藏精之所，元神之基。若病甚而太谿之脉不衰，猶精氣未敗，腎猶未絕。

病雖危篤尚可生也。

太衝者肝脉也。在足大指本節後二寸陷中有動脈也。蓋肝爲先生之藏。爲化液之源。註詳醫學原始。主藏魂。若病篤而此脉不衰。則生生之機尚可望也。而女人又專以此脉爲主也。

尺中神門脈非神門穴論

兩手尺中乃神門脈也。王叔和曰：神門決斷，兩在關後人無二脈，病死不敢其論。腎之虛實俱在關後尺中，神門以後驗之，蓋腎爲藏精之所，元神之本。若神門之脈一絕，卽是腎絕，而先天之根本既脫，決無回生之理也。而脈訣謂爲心脈者，誤矣。彼因手少陰經有穴名曰神門，正在小指直掌後兌骨之端，故其錯認耳。殊不知心在上焦，豈有候于尺中者乎？再按脈經診尺中，腎脉各條皆曰：左右手尺中。神門以後脉陰。

實陰虛者足少陰經也。診膀胱脉各條皆曰。左右手
尺中神門以後陽實陽虛者足太陽經也。如此則非
手少陰經神門穴明矣。

脫陰脫陽脉論

脫陰者六脈有表無裏如濡之類又名孤陽乃陰脫而止存陽故陽則孤矣脫陽者六脈有裏無表謂之陷下如弱脈之類若六脈俱絕此陰陽俱脫也經曰脫陰者目盲脫陽者見鬼陰陽俱脫者危

七衝門陰絕陽絕脉論

脣爲飛門齒爲戶門會厭爲吸門胃之上口爲賁門太倉下口爲幽門大小腸會爲闢門下極爲魄門此爲七衝門此七門者一氣貫通無有壅遏壅遏則氣閉

而絕矣。寸口之動脈應之，故寸關尺一脉貫通，無有
間絕。間絕則死。寸脈爲上，上不至關爲陽絕；尺脈爲
下，下不至關爲陰絕。陽絕死于春夏，陰絕死于秋冬。

怪絕七脉論

彈石者，脉在筋肉間舉按劈劈然而至，腎絕也。○雀啄久復來，脾絕也。謂其堅硬，如雀之啄食。○屋漏者，脈

連三五脈而忽已也。

○屋漏者，脈

在筋肉間，如殘溜之下，不能相接，良久一滴濺起無力，胃絕也。○解索者，脉如解亂繩之狀，指下散散無復次第，腎衰絕也。○鯁遊者，脉在皮膚沉時忽一浮，如蝦冉冉不動，少焉瞥然而去，久之倏爾復來，心神衰絕，心爲君火，火欲絕而忽焰之象也。○魚翔者，脉

在皮膚浮時忽一沉其本不動而末強搖如魚迷在
水中身首貼然而尾獨悠颺之狀腎絕也肺絕○金
沸者脉在皮肉有出無入涌涌如羹上之肥此陰陽
氣絕皆死脉也

怪絕七脉訣

雀啄連來三五啄屋漏半日一點落魚翔似有一似無
假遊靜中躍一躍彈石硬來尋卽散搭指觀之為解
索金沸涌出羹上肥七脉見一休難藥

諸病有宜忌之脉

傷寒未汗宜陽脉忌陰脉 已汗宜陰脉忌陽脉

中風宜浮遲忌急數 咳嗽宜浮濡忌沉伏

喘急宜浮滑忌短濶 水腫宜浮大忌沉細

頭痛宜浮滑忌短濶 心痛宜浮滑忌短濶

腹痛宜沉細忌弦長 腹脹宜浮大忌沉小

消渴宜數大忌虛小 瘰癧宜虛濡忌緊急

癰癧宜沉實忌虛弱 頗狂宜虛大忌沉細

吐血宜沉小忌實大 劍血宜實大忌沉細

日全書卷之五 諸病宜忌脉 大

脫血

宜陰脈忌陽脈

腸澼

宜沉小忌數大

下利

宜沉細忌浮大

霍亂

宜浮洪忌微遲

虛損

宜緩急忌洪大

墮胎

宜堅緊忌小弱

金瘡

宜微細忌緊數

癰疽

宜微緩忌滑數

中惡

宜緊細忌浮大

中毒

宜洪大忌微細

新產

宜沉滑忌弦緊

帶下

宜遲滑忌急疾

崩漏

宜微弱忌實大

懶食

宜虛小忌緊急

論七表八裏九道之非

戴同父曰。脉不可以表裏定名也。軒岐與越人叔和皆不言表裏。脈訣竊叔和之名。妄立七表八裏九道爲世大惑。夫脈之變化。從陰陽生。但可以陰陽對待而言。各從其數。豈可以一浮二芤爲定序。而分七八九之名乎。大抵因浮而見者。皆爲表。因沉而見者。皆爲裏。何拘于七八九哉。

滑伯仁曰。脈之陰陽表裏。以對待而爲名象也。高陽生之七表八裏。九道蓋穿鑿矣。求脈之明。爲脈之晦。

宏翰按高陽生脉訣定七表八裏九道之脉而遺失數革散脉此貽誤後世之罪豈淺哉夫浮沉遲數乃脉之綱領也而脉訣將數脉止歌子心藏而方穀脉經直指謬引叔和謂數乃弦脉之體狀若箏弦時時帶數曰弦之句謂弦卽數也數卽弦也文言有弦之處而無數弦乃數之本數乃弦之末等語此方穀不知弦數多熱弦遲多寒之義不能辨脉訣之非而反巧飾之遺禍于載可不慎哉予恐後人再爲其誤故特表而出之

用藥不可遲過論

華佗曰病有宜湯者宜丸者宜散者宜下者宜吐者宜汗者 湯可以蕩滌藏府開通經絡調品陰陽 丸可以逐風冷破堅積進飲食 散可以去風寒暑溼之邪散五藏之結伏開腸利胃 若病可下而不下使人心腹脹滿煩亂而死 可汗而不汗使人毛孔閉塞閉絕而終 可吐而不吐使人結胸上喘木食不入而死

四診脉鑑大全卷之五