

四診脉鑑大全

四診脉鑑大全卷之六

雲間浩然子惠源王宏翰著

男 聖宋王兆文

聖發王兆武

聖啓王兆成較

崑山醇菴魯一鄭 儒叅訂

內經左右寸關尺六部配合藏府之圖論
夫以左右寸關尺之六部候藏府之脈原於內經關其

與者周有扁鵲漢有仲景晉有叔和固蔑以加矣迨

高陽生撰僞訣而脉之理始晦賴元戴同父昌言闢之而得正其悖謬然自宋元以迄於茲脉書著述雖多紛然不能盡一若不折其衷而爲之定論則後學莫可適從余不揣譾陋逐一攷究內經彙羣賢之確論取瀕湖二十七脉條分縷晰詳辨而刊正發明而鑑釋庶可爲脉學之指南若神而明之則存乎其人爾今按內經左右六部配合藏府之圖開列於左

左 手 脉 圖



右 手 脉 圖



按手少陰經循手內側手太陽經循手外側手太陰經循手內側手陽明經循手外側故謂之表裏也至於脈訣配大小腸於兩寸診脈者謂心與小腸爲表

裏肺與大腸爲表裏殊不知此乃經絡之表裏而誤作藏府之表裏諸家脉書亦未辨正誤世已久余立圖於右特表而出之庶後學毋致再誤也

脉要精微篇曰尺內兩旁則季脇也

尺內者尺澤之內左右尺部也季脇

小助也在脇下盡處兩旁乃近腎之處也故季脇之下皆尺部主之

尺外以候腎尺裏

以候腹人身以背爲陽爲外以腹爲陰爲內按以候腎腹爲陰爲內凡謂腹者大小腸膀胱皆在焉故重按以候腹也○王啓玄馬玄臺吳鶴臯三人皆註尺外謂尺之外側尺內謂尺之內側也惡細詳人之脉總是一條若依三人診之則一條之脉形必

焉闊可以兩邊倒着或脉二條壅可倒診若謂診者之指則前後矣然全符文義乃舉脈體而言且診者

之左外則病者之右手矣張介賓類編註尺外謂尺之前半部尺內謂尺之後半部引易卦上三爻爲外卦下三爻爲內卦而李士材曰或謂浮取爲外沉取爲內然外以候心肺內以候胸中膻中是藏從外取府從內取則無是理不如從上下取之說爲妥士材之論雖似是則一部之脉作兩段看而六部之脉應作十二部矣但內經全部從無一言及此恐無憑據使人難診不若以輕按爲外重按爲內以候診也如仲景傷寒下證若尺脉重按無力則不可下推此一端別知重按乃按腹中病症之脉顯然明矣且內經明言背爲陽腹爲陰是以內外俱作浮沉之診爲是也

中附上左外以候肝內以候鬲

接以候肝重按以候膈中事也輕按以候肝附尺上之而居中乃關脈也

內以候脾

啓玄謂脾居中故以內候之胃爲市故以外候之也

右外以候肺內以候胸中

肺位最高肺葉近背故輕按外以候之

爲陰故重

按內以候之

左外以候心內以候膻中心居膈上膻

中者兩乳之間爲氣海當心

而

言之也

寸爲

包絡之分也

而言之也

寸爲

前尺爲後也

前以候前後以候後

此重言申明上

下內外之義統

前尺爲後也

上竟上者胸喉中事也下竟下者少

腹腰股膝脛足中事也

竟者盡也上竟上言寸之上

於胸部與喉中之事也下竟下言寸之下

盡之脉至魚際也在體則應

尺之動脈處也在體則應於少腹及下至足中之事

也推而外之內而不外有心腹積也推而內之外而

不內身有熱也

推者細行推詳而察脈也內外以表裏言也以見證之各異也舉指於皮

膚之間推而外之宜乎脉之浮也但沉而不浮是內

而不外是必心腹中有積在內故內而不外者如此

按指於筋骨之間宜乎脉之沉也但浮而不沉則外

而不內是必邪在表故身熱是以外而不內者如此

○啓玄註謂脉附臂筋取之不審推筋令遠使脉外行內而不外出者心腹中有積也脉遠臂筋推之令近遠而不近者是陰氣有餘故身有熱也鶴臯註謂脉來不直斜向於內則用指推之使外若更內而不外是心腹積也或脉來不直斜向於外則用指推之使內若更外而不內是謂身熱故脉偏於外也按二家之註各異夫啓玄以謂脉附在臂筋恐筋蒼壓以指推開臂筋令遠令近而使脉行脉或止內而不外出或止外而不入內者鶴臯又謂脉來或不直而斜向於內斜向於外用指推之使內使外或更外不內或更內不外者二論皆非切當蓋脉之部位自離骨腹後卽有此脉或係反關或係斜行或係正行定形之後乃一定之部位也豈可用指推筋相讓脉行用指推使脉之直向斜向之說此言一出反使後人性疑無所適從有歧途之數余特表而明之推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上頭項痛也

按啓玄註謂推筋按脉之而上脉上湯

盛是陽氣有餘故腰足清也。推而按之尋之而下病沉下掣是陰氣有餘故致頭項瘡地立臺註謂推而上之以指按其上部但脉止見於上部而下部則無刺氣有升無降其腰足虛而清冷也。推而下之以按其下部但脉止見於下部而上部無則氣有降而無升其頭項必不兄而作痛也鶴臯註謂或用指推而使上若更上不下陽氣升而不降或用指推而使下若下而不上陽氣滯而不利也三人之論會而觀之而啓玄之言爲當而馬吳二說皆以上下謂有脉無脈之論不合經旨殊不知此節以上下言者以有力無力或大或小之謂並非有脉無脉之義也如推而上之上而不下謂上部有力或大而下部無力或小者是脉有升無降下元虛而腰足清冷也推而下之下而不上者謂脉下部有力或大而上部無力或小者是清氣不升則上部頭項虛而作痛也按之至骨脉氣少者腰脊痛而有痺也氣血充足則脉和而有營氣血有餘則脉洪而大氣血不足則脉衰少今按之至骨脉氣

衰少者是氣血不足。腰脊虛痛而身有痠痺不仁也。
蓋榮氣虛則不仁。衛氣虛則不周。又有骨痺。筋痺。肉
痺。脈痺。皮痺之不同。其因血氣衰少則一也。

王叔和脉經曰。肝心出左肺。肺出右腎與命門俱出尺
部。魂魄穀神皆見寸口。宏翰按銅人圖。命門穴在脊
骨之下七節間。卽兩腎之中閒也。乃立命之根。精神
之舍也。其氣與腎通。故診命門脉。皆從兩尺推詳也。

故脉經謂兩尺。又曰神門也。

謂元神在腎爲根本之脉。故稱神門也。

按張路玉診宗三昧云。大小二腸之氣平居無病之時。則二腸之氣未嘗不隨經而之寸口也。以病言之。則二腸司傳化之任。病則氣化不順。而爲留滯。又必驗之於尺。路玉以無病有病而定藏府。殊爲大謬也。

藏府配寸關尺。診脈驗病乃古聖軒岐立論確有一
定之理。豈可以有病將三陽之脈。診於尺。以平居無
病者。診於寸口哉。此論似是實非。乃
起後世之疑端。不特辨而正之也。

診脉藏府部位歌

心與膻中居左寸。關候肝膽兩經證。尺中腎藏真元氣。
膀胱小腸細推認。右寸肺胸關脾胃。大腸腎脈右尺
定。命門根穴腎中間。診脈皆從兩尺尋。

二十七脉

浮 沉 遷 數 滑 濡 虛 實 長 短
洪 微 緊 緩 芤 弦 草 牢 濡 弱
散 細 伏 動 促 結 代

浮 陽

經論浮脉舉之有餘按之不足

麻經

如微風吹鳥背上毛

厭厭聳聳如循榆莢如水漂木

崔氏素問

如捻葱葉

黎氏

發明

浮脈法天有輕清在上之象

按醫學原流四元行推之而肺爲氣行但氣行之質本輕故脉來

浮也吹毛者輕浮也厭厭者和潤不變亂也聳聳者壅結不止代也榆莢輕浮和軟也漂木輕浮在

上也。捻葱上有力而下軟皆形容。

○浮脉主表而司令在秋是肺家之脉也。又曰毛者乃輕虛以浮來急去散也。若太過則脈來中堅旁虛如循雞羽病在肺也不及則氣來毛微病在中也。病在外爲氣逆爲背痛悶悶然不舒病在中爲喘息爲呼吸少氣爲咳上氣見血喘而咯血肺中有聲也。

正誤

脈訣云再再尋之如太過此浮兼洪緊之象非浮脈也其謬如此。

體象

浮脉惟從肉上行如循榆莢似毛輕三秋得令

知無恙久病逢之却可驚。

相類

浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮

是洪脉來時雖盛去悠悠○浮脉輕平是捻葱虛來

遲大舒然空浮而柔細方爲濡散是楊花無定踪

浮而有力爲洪

浮而遲大爲虛

虛甚爲散

主病

浮脉爲陽表病居遲風數熱緊寒拘浮而有力

多風熱無力而浮是血虛

分部

左寸風眩鼻塞壅虛遲氣少心煩忡關中腹脹

促胸滿

怒氣傷肝尺濁紅○肺浮風痰體倦勞涕清

白汗嗽

叨叨關脾虛滿何能食尺有風邪客下焦

浮脉主表

有力表實

無力表虛

浮遲風虛

浮數風熱

浮緊風寒

浮緩風溫

浮滑風痰

火主宿食

浮濁氣病

浮虛傷暑

浮濁陰虛

浮洪虛熱

浮微勞極

浮濁陰虛

浮微虛則

鑑釋

浮脉主臟表經絡之病。浮而有力為風。為表熱。為張。為喘。為痞。為滿。不食。浮而無力為少氣。為倦怠。為少食。為表虛。

○左寸浮傷風發熱。頭痛目眩。以及風癆。浮而虛遲。心氣不足。心神不安。浮而散。心氣耗而虛煩。浮而洪數。心經熱。關浮。腹張。浮而數。風熱入肝經。浮而促。怒氣傷肝。心胸逆滿。尺浮。膀胱風熱。小便赤澁。浮而芤。男子小便血。婦人血崩。帶下。浮而遲。冷痛。脅下痛。○右寸浮而有力。肺感風寒。咳喘。清濁浮而無力。自汗勞倦。浮而洪。肺熱咳嗽。浮而遲。肺寒喘息。關浮無力。脾虛中滿。不食。浮大有力。或謂爲宿食。浮而芤。脾胃虛。尺浮而虛。元氣不足。浮而數。下焦風熱。大便秘。

參治活法

凡始病而脈不浮。病久而脉反浮者。此中氣不足。不能內守。反見虛症之候。藥忌攻伐。宜用溫補。有寸關俱浮。其遲弱者。謂陽浮陰弱。營氣不足。虛少之病也。

○如傷寒以尺寸俱浮爲太陽經受病但以指下有力爲有餘之客邪然太陽本經風寒之邪感之有營衛之分以浮緩爲風邪傷者浮緊爲寒邪傷營用藥有麻黃湯桂枝湯之別陽明膚蒸攻脾脈浮大心下反覆者急下之謂從證不從脉也其在三陰證無浮脉惟陰盡復陽厥愈足溫而脉浮者皆爲愈證故太陰例有手足溫身體重而脉浮者少陽固有陽微陰浮者厥陰例有脉浮爲欲愈不浮爲未愈者要知陽病浮遲兼見裏證合從陰治陰病脉浮證頭陽同合養陽治而詳證辨脈纔亮難忽也

沉

陰

經論沉脉重手按之筋骨乃得脉如綿裹砂內剛外柔氏楊如石投水必極其底

發明

沉脈法地有淵泉在下之象木行之性次重故附地而在下地矣砂投石皆形容脉沉下之狀

沉脈主裏而司令在冬是腎水之脈也又曰石亦謂滑者言其脈氣之來沉以搏來去清白平脈也太過則如彈石按之益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在中也病在外爲解休爲春脉病少氣不欲言也病在中爲心懸如病飢眇中清春中痛少腹滿小便變也

正誤脈訣謂緩度三關狀如彌綿者非也此弱脈也但沉有緩數及各部之訣豈止在關乎而脈訣乃高陽生所編假王叔和之名其中舛錯甚多元末薛同父刊脈訣之誤行世已久今之庸醫仍傳誦爲家秘其錯誤不殺人者幾希矣

體象

水行潤下脈來沉筋骨之間更滑勻女子寸兮

男子尺四時如此號爲平

相類

沉帮筋骨自調勻伏則推筋着骨尋沉細如綿

真弱脉弦長實大是牢形

沉行筋間伏行骨上牢大有力弱細無力

主病 沉潛水畜陰經病數熱遲寒滑有痰無力而沉虛與氣沉而有力積併寒

分部

左寸沉寒痰飲心關沉痃癖伏寒疼尺寒腎感

腰陰痛血結

文精寒便濁頻

男○右寸虛喘緊滑嗽

細兼寒熱骨蒸皮關寒中滿吞酸飲尺水腰疼冷腹

臍

沉脉主裏又主水畜

有力裏實无力裏虛

沉遲病冷沉數內其沉滑痰食

沉明為氣

沉濤氣鬱

沉弱寒熱

沉緩寒溫

沉緊冷痛

鑑釋

沉牢冷積

沉伏霍亂

沉細少氣

沉弦癖痛

似陰其要在有力無力大小之別如陽氣衰弱不能統運營氣於表則陰寒厥逆有陽鬱內伏有熱極力者爲虛爲寒爲厥逆爲洞泄爲少氣爲痛冷如陽氣鬱伏寒邪在外不能升衛氣於外故脉沉按之有力不衰者爲實爲氣爲水爲停飲爲癰癧爲膿脹爲瘀滯也少左寸沉心內寒邪爲痛胸中寒飲脇疼關沉伏寒肝經兩脇刺痛沉弦癖內痛尺沉腎藏感寒腰背冷痛小便渴而頻男爲精冷女爲血結沉面細頸瘦陰痒溺有餘瀝右寸沉肺冷寒痰停蓄虛喘少氣沉而緊滑咳嗽沉細而滑晉蒸寒熱皮毛焦乾關沉胃中寒積中滿吞酸沉緊懸飲尺利又小便滑暗下冷痛

參治活法

夫傷寒以尺寸俱沉爲少陰經證。若始病不發熱，不頭疼，而手足厥冷，脉沉者，此直中陰經寒證也。若先曾發熱，頭疼，煩躁，至五七日，而變手足厥冷，煩躁，不寐，而脉沉者，此厥陰亦兼陽邪陷陰之熱證也。若有始本陽邪，因汗下太過，而脉變沉遲者，此陽熱去而陰寒虛證也。有太陽證，下早，胸膈痞，而關脉細沉緊者，此表邪內陷陽分，結胸也。若能食自利，乃陽邪下陷，分藏結也。有少陰病，自利，清水口乾，腹脹，不大便，而脉沉者，此陰邪陷於少陰也。有少陰病，始得之，反發熱，而脉沉者，麻黃附子細辛湯溫之。是少陰兼太陽，抑兩感也。此與病發熱，頭疼，脉反沉，身體痛，當溫之，以四逆湯之法，似是而實不同也。有寸關俱浮，而尺中沉遲者，此陽證夾陰之脈也。凡傷寒溫，熱時疫，感冒得汗後，脉沉者，此爲將愈之脉，非陽病見陰之脉也。假如內外有熱，而脉來沉伏，不緩不洪，指下濡小急疾，無論傷寒雜病，發於何時，皆爲伏熱，不可以沉伏而誤認陰寒之病也。

經論全
卷之二
遲陰

經論遲脉一息三至去來極慢

脈經

發明

遲爲陰盛陽衰故脈來不及陰盛則藏府氣虛而元陽衰故虛寒之諸症作焉當峻補其陽經

謂益火之原以消陰翳也

正誤

脈訣言重手乃得是有沉無浮也遲來一息三至甚爲易見脈訣云隱隱又曰狀且難此濟脉也其謬

如此

體象

遲來一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮沉

分表裏消陰須益火之原

相類

脈來三至號爲遲四至因而作緩持遲細而難

知是濶浮而遲大以虛推

三至爲遲。二至爲敗。一息一至。陽氣將絕。不可救也。有止爲結。薄甚爲散。浮大遲。更爲虛。

正誤

脈學言。遲而有力爲細。無力爲濶。但細有遲數之別。濶有參伍不調之象。豈可以遲之有力無力爲細爲濶。

皆宜正之。

主病 遲司藏病或多痰沉痼癥瘕仔細看。有力而遲爲冷痛遲而無力定虛寒。

分部

左 寸遲寒慄少精神。 肢冷筋拘肝脇疼。左尺腎虛兼便濶女人月信亦無音。 右 肺遲氣短涕清。

痰冷積傷脾在右關少腹寒疼腰脚重溲便不禁尺中寒。

遲脈主藏

有力冷痛

無力虛寒

浮遲表寒

沉遲裏寒

鑑釋
〔遲爲陰盛陽虧之候爲寒爲不足人迎主寒溫外足氣寒則縮血寒則凝也○左寸遲心寒精神多倦開遲筋寒急手足冷脇下痛尺遲腎虛便渴女人不月○右寸遲肺寒冷痰氣短開遲中焦寒脾胃傷冷物不食沉遲爲積尺遲爲藏寒濁泄小腹冷痛

緩柳垂

參治活法

〔遲舉爲陽氣不敷營氣自和之象然亦有熱邪內結寒氣外發而見氣口遲滑作緩者証可以遲脉舉爲

之寒乎。○如傷寒陽明症脉遲微惡寒而汗出多者爲表未解脉遲頭肢腹滿者不可下。○有陽明病脉遲有力汗出不惡寒身重喘滿潮熱便軟手足濶然汗出者爲外欲解可攻其裏。○又太陽病脉浮因誤下而脉遲脇膈痛而爲結胸以

上

皆脉遲皆熱邪內結之驗也。

數陽

經論數脉一息六至

脈流薄疾

問

經論數脉爲陽盛陰衰蒸邪流薄於經絡故脉來太過

發

則陽虛則陰府蒸極而真陰衰故陽極燥熱之諸

症作矣當補其陽而補其陰

經謂吐水之王以鎔陽光也。

正誤

浮沉遲數脈之相領素問脉經皆爲正脈脉訛

立七表八裏而遺故脉之訛于心藏其妄甚矣

體象

數脉息間常六至陰微陽極必狂煩浮沉表裏

西醫用藥 卷之六
分虛實惟有兒童作吉看

相類數比平人多一至緊來如數似彈繩數而時止名爲促數見關中動脈形

六至爲數 七至爲極 滑氏謂疾熱極之脉也
八至爲脫陽 極陰衰當急瀉其陽而峻補其陰
一息九至陽氣已絕不可救也 數而弦急爲緊
流利爲滑 數而有止爲促 數獨見於關中爲

脈動

主病 數脉爲陽熱可知只將君相火來醫實宜涼瀉
虛溫補肺病秋深却畏之

分部

左寸數咽乾口舌瘡關中目赤淚汪汪耳鳴口

苦皆肝熱左尺陰虛弱赤黃○右寸吐紅咳嗽肺癆

傷關部吞酸胃火傷右尺數來大便澁腸風熱病見

紅殃

數脉主府有力貨火無力虛火浮數表熱沉數裏熱細數陰虛氣口數實肺癆數虛

肝

痰

鑑釋

數爲陽盛陰弱之候爲火爲熱爲風熱結痰○左寸數心經熱爲煩滿爲頭疼上焦火旺關爲肝熱目赤尺數小便赤淋澁莖中痛○右寸數爲肺熱關爲脾熱口臭胃煩嘔逆尺數大便澁有力則爲痔爲渴爲渴爲腸風便血寸數氣不足尺數血不足按脈經云脉來五至爲平而滑氏謂數一息六至過平脉兩至者則四至爲平脉矣此慢寧之一失也

四言脉金
卷之二十一
三

衆治活法

數爲陰衰水弱火旺炎逆之象也。如瘦人脉數及久病脈數者皆陰虛火燄血少也。形充氣實之人脉數者乃痰濕鬱滯經絡而蘊熱也。若無故而脉數以數大更弱爲陽虛細小弱數爲陰虛非若傷寒每血脈大爲邪伏於經合用發散之比然血症脉宜細小微數者爲順若脉數有熱及實大弦動急疾者爲逆。

○如傷寒以煩躁脈數者爲傳經脉靜爲不傳以分有火無火也。如經盡欲解脉浮數按之不芤者其人不虛不戰汗出而解也。則知數而按之芤者皆爲虛也。如陽明病脉數爲熱當消穀引食而反吐者以發汗令陽氣微屬內虛脉乃數也。數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐此必數而無力也。又胃反而寸微數者爲胸中冷。又脉陽緊陰數爲欲吐陽浮陰數亦吐胃反脉數中氣大虛而見假數之象也。人見脉

數誤認爲熱殊不知亦有胃虛及陰盛拒陽之故。經曰脈至而從按之不鼓諸陽皆然若病然而脉數按之不鼓甚者乃陰盛拒陽於外而致病非熱也或形症似陰而脉按之鼓擊指下者乃陽盛拒陰而致病非

寒也。

○丹溪曰脉數盛大按之濶而外有熱症名

日中寒乃寒留血脉外症熱而脉亦數也。

滑

陽中陰

經論滑脉往來前郤流利展轉替替然如珠之應指無

漉漉如欲脫

時珍

發明

滑爲陰氣有餘故脉來流利如水脉者血之府也血盛則脉滑故腎脉宜之氣盛則脉濶故肺

肺宜

之。

正誤

高陽生脉訣云三關如珠動按之卽伏不進不退是不分浮滑沉滑尺寸之滑也

張露玉診宗三昧云滑者舉之浮緊按之滑石此乃實脉之象非滑也夫滑之一字乃脈流利如珠有浮滑沉滑之分豈可槩以

舉緊按石之體哉今並正之

體象

爲同類數脉惟看至數間

滑則如珠
數則六至

主病

滑脉爲陽元氣衰廢生百病食生災上爲吐逆下畜血女脈調時定有胎

分部

寸滑膈痰生嘔吐吞酸舌強或咳嗽當關宿食

肝脾熱渴痢癩淋看尺部

滑主痰飲

浮滑風痰

沉滑食痰

滑數痰火

滑短痰食

張寒

脈經曰開滑門熱尺滑血奇而脉訣云關滑胃尺滑膚似水與脉經之旨相反其謬如此

鑑釋

滑爲血實氣壅之候是氣不勝於血也故主嘔吐

實大心驚舌強○關滑肝熱頭目爲患尺滑小便淋漓尿赤茎中痛○右寸滑痰飲咽道滑而實肺熱毛髮焦渴壅咽喉乾痰暈日昏涕唾粘○關滑脾熱口臭及宿食不化吐逆滑實胃熱尺滑因相火炎上而引飲多作冷腹鳴或時下利婦人主血實氣壅月事不通若滑而和匀則爲孕矣○人迎浮滑爲風痰緩滑爲中風氣口滑數爲宿食緩滑爲熱中平人支體豐盛六脉更清此濕痰漸積於中外終日勞役不知倦怠若安息則重着癰疼矣

參治活法

四診脈鑑

卷之六

七

經云滑爲陰氣有餘一語此指陰邪搏陽而言豈以陰氣有餘多汗身寒之病便可目爲血多又以滑大之脈牽合無力豈可誤作內傷元氣乎此又不可不辨也。

濇

陰

經論濇脉細而遲往來難短且散或一至復來

麻衆伍

不調

素問

如輕刀刮竹

脉訣

如雨沾沙

通真子

如病聾食蒸

珍時

發明

清爲陽氣有餘氣盛則血少

故脉塞滯濇濇而肺脉宜之

脉訣言指下尋之似有舉之全無

與脉經之旨悖謬舛錯絕不如

此

體象

李時珍

細遲短濇往來難散止依稀應指間如雨沾沙

容易散病鬱食葉慢而艱

相類 參伍不調名曰濇輕刀刮竹短而難微似秒芒
微更甚浮沉不別有無間

細遲短散時一至日清 極細而更重按若絕日微 浮而柔細曰濡 沉而柔細曰弱

主病 濇緣血少或傷精及胃亡陽汗雨淋寒濕入營爲血瘀女人非孕卽無經

清主血少精傷之病是以尺脉濇則艱于子嗣女人有孕爲胎病無孕爲敗血杜光庭云濇脉獨見尺中形同代爲死脈

分部 寸濇心虛痛對胸胃虛脹脹察關中尺爲精血

俱傷候腸結洩淋或下紅

鑑釋

濇爲氣多血少之候故主少血亡血無汗傷精血

血痺痛等症也○左寸濇心神虛耗不安及冷氣

心痛

○開濇肝虛血敗肋脹脇滿身痛尺濇男子

傷精及疝女子月事虛敗若有孕主胎漏不安○右

寸濇營衛不和上焦冷痞氣短臂痛肺主氣氣爲衛

直爲營肺脉濇乃氣多血少故曰不和也○關濇脾

胃不食胃冷而嘔尺濇大便濇津液不足小腹寒

是腰逆冷若先富後貧脈亦必濇尺部見濇脈於

子嗣

參治活法

濇雖屬血少精傷之候然亦有宿食外邪阻滯而見
濇者金匱云寸口脉浮大按之反濇尺中亦微而濇
却有宿食有發熱頭疼而見浮濇數盛者陽中霧露
之氣包霧傷皮腠濕流關節總皆脉濇但兼浮數沉

細之不
同耳。

虛陰

經論虛脉遲大而更按之無力隱指豁然空麻經

發明

崔紫虛云形大
力薄其虛可知

正誤

脈訣云尋之不足舉之有
餘止言浮脈不見虛狀

楊仁齋云狀似柳絮散慢而遲滑氏曰散大而
莫三家所言皆是散脈之形非虛也今並正之

體象相類

舉之遲大按之鬆脈狀無涯類谷空莫把

芤虛爲一例芤來浮大似慈葱

虛脉浮大而連按之無力芤脉浮大按之中空
芤爲脫血虛爲血虛芤散二脉見浮脉

主病 脉虛身熱爲傷暑自汗怔忡驚悸多發熱陰虛
須早治養營益氣莫蹉跎。

分部 血不營心寸口虛關中腹脹食難舒骨蒸痿痺
傷精血卻在神門兩部居。

神門者尺部也。○經曰血虛脈虛日氣來
虛微爲不及病在內日久病脉虛者死。

鑑釋 虛爲氣血俱虛之候爲暑
爲恍惚多驚爲小兒驚風
爲食少尺脈虛防泄瀉
氣口脉大而虛爲
內傷於氣若虛大而時見一濶爲內傷瘀血。

參治活法

仲景云脉虛不可吐腹滿脉虛復厥者不可下脉陰
陽俱虛熱不止者死惟痼疾而脉虛可治者以其神

出舍空可行岐補。若脉實大爲
頑痰固結，搜滌不應爲難耳。

實陽

經論

實脉浮沉皆得，脉大而長微弦，應指幅幅

音然。脈

發明

實爲陽盛有餘，故脈來浮沉皆得。

發

正誤

脉訣言如繩應指來。
乃緊脉非實脉也。

體象

浮沉皆得，大而長應指無虛幅幅強熱蘊三焦

成壯

通腸骨子論

相類

實脉浮沉有力強，緊如彈索轉無常，須知牢脉
幫筋骨，實大微弦更帶長。

浮沉有力爲實。弦急彈人爲緊。
沈而實大微弦而長曰牢。

主病 實脈爲陽火鬱成發狂謳語吐頻頻或爲陽毒
或傷食大便不通或氣疼。

經曰血實脉實曰脈實者水穀爲病曰氣來實強是謂太過。

正誤 脈經曰尺實小腹痛小便難脈誤言尺實小便不禁與脈經相反潔舌不知其謬誤以爲虛寒

藥用蘆附其謬
愈甚可不慎哉

分部

關 脾宮中滿消中熱。左 尺 實腰腸痛。右 尺 氣墊痰壅目紅曉。右

鑑釋 貨爲三焦氣滿實熱之象主病皆邪熱蘆蓄有餘之症故爲渴爲痛爲氣塞爲腹脹爲氣聚爲食積。

爲利等病也。○左寸實心中積熱口舌瘡爛疼痛。貫大頭面熱風煩躁體倦面赤。○開實腹脇痛滿實而溝塗蒸痛赤。貫大膀胱熱溺難出實而緊腰痛。○右寸貫胸中熱痰嗽煩滿實而大肺熱消渴喘氣壅中善飢口乾勞倦。○尺實臍下痛便難或時下利。

參治活法

傷寒陽明病不大便而脈實宜下之。下後脈實大或暴發欲絕熱不止者死。厥陰病下利脈實者下之死。若消癥鼓脹堅積等病皆以脈實爲可治。若泄而腹痛及新產驟虛久病虛羸而得實大之脉者爲難治。

長

陽

經論長脉不大不小迢迢自若。朱氏如循長竿末稍爲平。

如引繩如循長竿爲病

問素

發明

長脉在時爲春，在人爲肝，平人脉長有神。此氣治而無病也。若病人脈長病雖甚而尚可治也。

○宏翰

治丹青高簡病癰疽發背諸醫治之兩月餘

仰臥死

去五日因氣未絕請余決之診其兩尺脉長余曰可治衆駭異之小思此疾因庸醫用附桂

太過助毒攻心十日前諸醫曾用犀角黃連湯而

大便泄瀉數次致死深思良久用生脉散加牛黃

四釐服之

一時則身轉倒臥兩服能言腹脹目闊

後用補氣補

脾兩月全愈

體象

過於本位脉名長弦則非然但滿張弦脉

與長爭較遠長工測度自然量

皆兼長原
皆平弦緊

主病

癲癇病卽是陽明熱勢深。

內經曰心脉搏堅而

長病舌卷不能言。

脈經云腎脈搏堅而長其色黃而赤當病折腰此非以長爲病以搏堅相合爲病也。

鑑釋

長爲有餘之病長有三部之長一部之長戴同父

長脈遇本位謂或尺或寸或關或寸遇子一指之外此各部之長若欲知其浮沉遲數大中之間求之若不大不小不浮不沉不遲不數則氣治而無病也經曰長則氣治此平脈也大槩常人病人脈長爲吉深則長壽脈也尺脉長蒂固根深心脉長神氣強壯。

短

陰

經論短脉不及本位，脉應指而廻不能滿部。脈經

發明

蘇詞父曰：短脉只見尺寸。若關中見短，上不通寸下不通尺。是陰陽絕脉必死矣。故關不診短。
黎居士云：長短未有定體。諸脉舉按之間，遇于本位者爲長。不及本位者爲短。長脈屬肝，宜于春。短脈屬肺，宜于秋。但

診肝肺長短自見。

正誤

按李辰山脈訣彙辨謂短脉滯小之狀，此是壽脈非短也。短有滑短痰食，豈可止以滑小爲短形高陽生偽訣謂中間有兩頭無

則不言尺寸，皆謬也。宜並正之。

體象相類

兩頭縮縮名爲短濤。短遲遲細且難。短濤

而浮秋喜見，三春爲賊有邪干。

清微動結。
皆兼短脉。

主病

短脉惟干 尺寸尋短而滑數酒傷神浮爲血溢

沉爲痞寸主頭疼尺腹疼

鑑釋

經曰短則氣病短主不及之病原經曰浮而短者營衛不行沉而短者有藏府病寒

洪

陽

經論

洪脉指下極大麻來盛去衰來大去長

通真子

發明

洪脉爲陽而司令在夏是心經之脉也素問謂之大亦曰鉤滑氏曰來盛去衰如鉤之曲上而

復下應血脉來去之象萬物散佈下垂之狀

正誤

居炎舉謂如環珠者非也脈訣云季夏宜之秋季冬季發汗通陽俱非洪脈所宜是謬論也

體象

脉來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時若在春秋

冬月分升陽散火莫狐疑

相類 洪脈來時拍拍然去衰來盛似波瀾欲知實脉

參差處舉按弦長幅幅堅

洪而有力爲實
實而無力爲洪

主病

脈洪陽盛血應衰相火炎炎熱病居脹滿胃翻

須早治陰虛泄痢可愁如

洪主陽盛陰虛之病。洩痢先血久者皆宜忌之。經日形瘦脈大多氣者死。日厭大則病進。

分部

左寸洪心火上焦炎右寸脉洪時金不堪。左關肺右關肝

火 右關 胃虛關內察腎虛陰火尺中看

鑑釋

洪爲榮赤大熱血氣燔灼之候故主表裏俱熱爲

赤口瘡頭瘡內煩

開洪肝熱及身熱四肢浮熱

尺洪膀胱熱小便赤澁

○右寸洪肺熱毛焦唾粘咽

乾洪而緊爲喘急

○開洪胃熱嘔吐及胃酸乾

洪而緩爲腹脹

○尺洪腹滿大便難或時下血

發治活法

若病後久虛虛勞失血泄瀉元等症皆氣血精神衰弱脉亦應細小爲是而反見洪盛之脉者則危矣或平日六部之脉皆洪大實者謂之六陽脉乃稟氣使然也亦有稟雖盛平日六部之脉皆微小者謂之六陰脉二者皆稟氣使然非病脉也若平日六陽六陰之脉而或變常者則爲病脉也脉浮而洪身清如羽石胸膈有屢下而熱勢不解脉洪不減謂之壞病不可救治洪爲陽氣滿盈陰氣垂絕之脉故蓋者爲陽結

經論

陰陽

微脉極細而柔按之如欲絕若有若無

脈細而稍

長氏

發明

素問謂之小氣
血微則脈微

體象相須 微脉輕平譬譬乎按之欲絕有如無微爲
陽弱細陰弱綑比於微略較粗

經診卽見重按如欲絕者微也往來如淺而常有者
也○仲景曰脈搏如裹上肥者陽氣微革繁如
絳者陰氣衰長病之死猝病得之生

氣血微令脉亦微惡寒發熱汗淋漓男爲勞極

諸虛候女作崩中帶下醫

微主久虛血弱之病陽微惡寒陰微發熱○
脈訣云崩中日久爲白帶漏下多時骨髓枯

正誤

按滑氏云浮而微陽不足身體惡寒沉而微陰不足藏寒下利但沉微一句猶有疑焉微脉按之如欲絕何得有沉微若沉細而莫乃弱脉矣宜詳審之

分部

右肺微氣促左心驚惕肝爲肢拘胃脹形尺部

帶崩女精血弱男惡寒消痺痛呻吟

鉗經微爲氣血俱虛之候故主虛弱少氣泄渴虛汗崩漏敗血不止等症也○左寸微心虛憂惕營血不足頭痛或病虛勞益汗開微病漏氣乏四肢惡寒拘急大微敗血不止男爲傷精尿血女爲血崩帶下○左寸微上焦寒病冷痰不化中寒不足少氣關微腎寒氣長食不化脾虛心腹冷痛尺微

藏寒泄濁
膀胱冷痛

緊

陽

經論緊脉來往有力左右彈人手素問如轉索無常仲景數

如切繩

脈經

如紡車線

丹溪

發明

時珍曰。緊乃熱爲寒束之脉。微急。

正誤

張氏云。多入尺來崔氏言。如線皆非緊狀。或以浮緊爲弦沉緊爲牢。亦近似耳。

體象

舉如轉索切如繩脉象因之得緊名。總是寒邪

來作寇內爲腹痛外身疼

相類

見弦實二脉

主病

緊爲諸痛主於寒喘嗽風癇吐冷痰浮緊表寒

須發越緊沉溫散自然安

諸緊爲寒爲痛人迎緊盛傷于寒氣口緊盛傷于食尺緊痛居其腹若中惡浮緊咳嗽沉緊皆主死症

分部

寸緊人迎氣口分當關心腹痛沉沉尺中有緊

爲陰冷定是奔豚與疝疼

鑑釋

緊爲邪風搏散伏于營衛間之候故爲痛爲寒浮緊爲傷寒身痛沉緊爲腹中有寒爲風癇

○左寸

緊頭疼目眩舌強緊而沉心中氣逆冷痛

○左寸

緊心腹滿痛脇疼肋急緊而盛傷寒渾身痛緊而寒

○左寸

緊腰脚膚下痛小便難○右寸緊鼻塞風

○左寸

緊而沉滑肺實咳嗽關緊脾腹痛吐逆緊而盛

○左寸

腹脹傷食緊下焦築痛

參治活法

病人脈陰陽俱緊
反汗出者亡陽也

緩陰中陽

經論緩脉去來小駛于遲

脉經

一息四至

戴氏

如絲在經不

卷其軸應指和緩往來甚匀

張大素

如初春楊柳舞風

之象

楊玄仁

如微風輕颺柳梢

渭伯

發明

楊玄仁

緩爲陽氣初發故脈來徐緩而司令在四季是

脾胃之脉也陽寸陰尺上下同等浮大而軟無
有偏勝者平脉也若非其時卽爲病脉緩而和匀
不沉不浮不疾不徐不微不弱者卽爲胃氣也

體象

緩脉呵呵四至通柳梢裊裊颺輕風欲從脉裏

求神氣只在從容和緩中

相類見遲脈

主病緩脉營衰衛有餘或風或濕或脾虛上爲項強下痿痺分別浮沉大小區

正誤

脉訣云緩主脾熱口臭反胃齒痛夢鬼之病不開經旨時珍謂其出自杜撰與緩無干

分部

左寸緩風邪項背拘左關爲風眩右胃家虛尺爲濡泄或風閉腎弱蹠跚足力迂

浮緩爲風

沉緩爲濕

緩大風虛

緩細溫痺

緩濶脾虛

緩弱氣虛

鑑釋

緩爲氣血向衰之候故主風濕痺痛等症在上爲

項強在下爲脾弱○心不足則左寸緩怔忡多忘

緩爲氣血向衰之候故主風濕痺痛等症在上爲項強在下爲脾弱○心不足則左寸緩怔忡多忘

亦主項背急痛○關緩風虛眩暈腹脇氣結○尺緩
腎虛冷小便數女人月事多○右寸緩肺氣浮言語
短氣○關緩腎氣弱若不沉不浮從容和緩乃脾家
平脈也○尺緩下寒脚弱風氣閉滯浮緩濕風泄惡
沉緩小腹感冷

芤陽中陰

經論芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實脉經中空外實
狀如慈葱

發明

芤慈葱之名也素問無芤名○崔榮虛云芤脉何似絕類慈葱指下成鷄有邊無中○戴同父

曰營行脉中脉以血爲形芤脉中空脫血之象也○脉經曰三部脉芤長病得之生卒病得之死正誤芤脉浮沉二候易見故曰有邊中候豁然難見故曰中空非中候絕無若泥爲絕無是無胃氣

矣舊說以爲旁實
與芤葱之義不合

脉訣云兩頭有中間無是脈斷裁矣又言主淋
濕風入小腸之病與失血之候相反誤世不小
按芤乃失血之脉非積瘀之脉也

諸家以積血爲診誤矣今正之

體象 芄形浮大硬如葱葉按易得中央空火犯陽經
血上溢熱傷陰絡下流紅

相類主病 中空無力乃爲芤浮大而遲虛脉呼芤更

帶弦名曰革芤爲亡血革虛寒

分部 寸芤失血病心忪關芤幅血腸胃癰尺部見之
多下血脫肛紅利漏崩中

鑑釋

芤爲失血之候。血脫則氣有餘。血不足則不能統氣於脈。故來虛大。中空若芤之狀也。

○左寸芤主

心血妄行。爲吐血。○右寸芤主肺家。能藏血。亦爲吐血。○右寸芤主小便血。女人月事爲病。

○右寸芤主肺家。能藏血。亦爲吐血。○右寸芤主小便血。女人月事爲病。

○左寸芤主小便血。女人月事爲病。

腸癰

下腹血及瘧。

不食。

尺芤大便血。

弦

陽中陰

經論弦脉端直以長。

素問

如張弓弦。接之不移。綽綽如

按琴瑟弦。

巢氏狀若爭弦。

脉從中直過。挺然指下。并

發明。

司空在森。是肝經之原地。若脉來輕虛緩滑者。

平實滑如循長竿者。病勢急。如新張弓弦者死。池氏曰。弦緊而數動。爲太過。弦緊而細。爲不及。太過則令人暴怒。忽忽眩冒而癲疾。不及則令人胸痛。引背下。則兩脇胠滿。

戴同父曰：弦而硬其病重，病輕弦而緩其病重。

正誤

脉訣謂弦，梁時帶數，又言脈緊狀牽繩而方

穀又謂弦卽數也，數卽弦也。有弦之處而無數

之句皆非弦脉不

合經旨今並正之。

體象

弦脉迢迢端直長，肝經木旺土應傷。怒氣滿胸

常欲叫，翳瞼瞳子淚淋浪。

按醫學原始四元行推之，肝屬氣，脾屬土。若氣行盛則土行，受氣行之侵發，鬆而不堅。肝氣旺，則脾土爲肝氣壅塞而不舒，則飲食少而胃氣衰矣。此論得格致之旨，粗淺無學者宜深詳而無忽之。

相類

弦來端直似絲弦，緊則如繩左右彈。緊言其力

弦言象牢，脈弦長沉伏，間長脈。

又見長脈

蔡西山曰：陽搏陰爲弦。陰搏陽爲緊。陰陽相搏爲動。虛寒相搏爲革。陰陽分離爲散。陰陽不續爲代。
按弦脈乃陰伏于內而陽搏于外。故雍痰寒熱之病。
多弦而緊爲陽藏于內。陰搏于外。故傷寒傷食痛症。
之麻多見緊也。

主病

弦應東方肝膽經。飲痰寒熱瘡癰身浮沉遲數

須分別大小單雙有重輕。

分部

寸弦頭痛膈多痰寒熱癥瘕察左關開右胃寒

心腹痛尺中陰疝脚拘攣

弦爲肝盛之病

浮弦支散外溢

沉弦懸飲內痛

濡脉自弦

弦數多熱

弦遲多寒

弦大主虛

弦細拘急

陽弦頭痛

陰弦腹痛

單弦飲癖

變弦寒瘡

右不食者

肝旺土衰

必難治矣

鑑釋

弦爲陰伏於陽肝旺脾傷之象或經絡間有寒所滯爲痛爲瘡爲癰爲拘急及寒熱虛盜汗病飲

勞倦等症○開前爲陽關後爲陰陽弦則頭痛陰弦則腹痛○兩手脈弦爲雙一手脈弦爲單單弦則胸

腹疾飲爲癖雙弦則陰寒痼積于內或脇急疼痛弦長爲積○左寸弦頭疼心煩勞傷盜汗乏力○開弦

胸肋痛痃癖弦緊爲痼瘕爲瘀血弦小寒癖尺弦

小腹痛弦滑腰脚痛○右寸弦肺受寒咳嗽胸中有

寒痰○開弦脾胃傷冷宿食不化心腹冷痛又爲飲尺弦脐下急痛不安下焦停水

黎治活法

弦脉之診惟在推求有胃氣與無胃氣其弦而軟微帶和緩之象乃胃氣未乏是爲可治若弦而勁細如循刀刃弦而強直如新張弓弦此乃弦而無胃氣也病雖新起亦難醫治是以虛勞之脉寸口多數大尺中弦細搏指者是爲損脈雖扁鵲亦難醫

傷寒以尺寸俱弦爲少陽經病。少陽爲樞爲陰陽交界。如弦而兼浮。兼細爲少陽之本脉。弦而兼數。兼緩是入府傳陰之脉。象若弦而兼沉。清微弱。是入陰之脉也。

傷寒脉弦細。頭痛發熱者屬少陽。此陽弦項痛也。病必見于太陽。陽脉濶。陰脉弦。法當腹中急痛。此陰弦腹痛。病必見于少腹。皆少陽部分耳。少陰病欲吐不吐。始得之。手足寒。脉弦遲者。此胸中實。當吐之。若胸上有寒饮。乾呕者。不可吐急温之。如此又不當以兼沉兼濶緊爲之証也。而傷寒以弦遲爲胸中實者。詳證合脉治法活潑。不可固執也。蓋諸病之脉。屬邪盛而見弦者。十居二三。屬正虛而見弦者。十居六七。在傷寒表邪全盛之時。中有一部。見弦。或者兼遲。兼濶。便是夾陰寒之證。客邪雖感。急宜溫散。而汗下之劑。咸非所宜。卽非時感冒。亦宜體此。至于素有動氣。怔忡。寒痛。脚氣。種種宿病。而挾外感之邪。于浮緊數大之中。委曲尋之。而弦象必應于內。多有表邪脉緊于緊脉之中。按之漸漸減小。總之不甚鼓

辨便當弦脈倒治。於浮脈之中，按之微直，滑脈之
上，按之搏指，皆當弦脈倒看。於沉脈之中，按之引
引，濶脈之中，按之切切，皆陰邪內伏，陽氣消沉，不能
調和百脉，而顯弦直之狀，良非客邪，緊盛之兆。如
腹痛、膨脹、胃反、胸痺、癥瘕、畜血、中渴、傷風、霍亂、滯下
中氣、帶結、寒熱、痞滿、種種皆有弦脈，悉由中氣不足。
士衰木賊而致。惟以弦多弦少，以證胃氣之強弱，弦
貴弦虛，以證邪氣之盛衰。浮弦沉弦，以證表裏之陰
陽。寸弦尺弦，以證病氣之升沉，無論所患何症，兼
見何脉，但以和緩有神，不乏胃氣，皆為可治也。

章陰

經論革脉弦而芤，仲景如接鼓皮。

丹溪

發明

時珍曰：革即芤弦二脉相合，故均主失血之疾。

諸家脉書，皆以為半脉，故或有革無芤，有芤無
革。混淆不辨，不知革浮，芤沉，革虛，芤形證皆異也。宜審別之。

虛

牢

言形證皆異也

宜審別之

接甲乙經曰。渾渾革革。至如湯泉。病進而危矣。變綿綿其去如弦絕者死。謂脉來渾渾革變急如涌泉出而不反也。叔和以爲溫脈與此不同。

體象主病

革脉形如按鼓皮。芤弦相合脉寒虛。女人半產并崩漏。男子營虛或夢遺。

相類見芤牢二脉

鑑釋

革爲氣血虛寒之候。○仲景曰。弦則爲寒。芤則爲虛。虛寒相搏。其名曰革。男子亡血失精。女人半產漏下。○脉經曰。三部脉革。

長病得之生。卒病得之死。

牢

陰中陽

經論半脉似沉似伏實大而長微弦

脉經

發明

扁鵲曰：牢而長者肝也。○仲景曰：寒則牢，堅有牢固之象。○沈氏曰：似沉似伏，牢之位也。實大

弦長牢

之體也。

正誤

脉訣不言形伏，但云尋之則無，按之則有。云脉入皮膚辨息難，又以牢為死脉，皆孟浪之語也。

體象相類

弦長實大脉牢堅牢位常居沉伏間草脉

芤弦自浮起革虛牢實要詳看

主病

寒則牢，堅裏有餘，腹心疼痛，木乘脾，癥瘕癩瘍

何愁也？失血陰虛却忌之。

鑑釋

牢為裏實表虛之象，故主寒實之候，如胸中氣促，木實乘脾為腹心疼痛，疝瘕癩積等症。○扁鵲曰：草為虛，牢為實，失血者脉宜沉細，反沉大而牢者，死虛病見實脉也。○宏輪曰：脉體實大，弦長而沉伏，則

製實之病宜之。故虛病

見牢麻則死。危必矣。

正誤

脉訣云。骨間疼痛。氣居于表。地

氏以爲腎傳于脾。皆謬妄不經。

濡陰

論濡脉極耎而浮細。如帛在水中。輕手相得。按之無
有。經

濡

李時珍。脈學曰。濡卽耎也。帛浮水中。重手按之。
隨手而沒。木上浮漚重按則無。皆形濡脉之象。

正誤

脉訣言。按之似有舉
還無是微脉。非濡也。

體象

濡形浮細。按須輕水面浮漚力不禁。病後產中

猶有藥平人若見是無根

相類 浮而柔細知爲濡沉細而柔作弱持微則浮微
如欲絕細來沉細近于微

浮細如絲曰濡 沉細如絲曰弱 沉而極細不微曰細

主病 濡爲亡血陰虛病髓海丹田暗已虧汗雨後來
蒸入骨血山崩倒濕侵脾

分部 左寸 心濡陽微自汗生 右寸 肺虛內熱憎寒侵
肝經力少脾胃弱腎憊腸虛泄脫精

鑑釋 濡乃氣血俱虛之象故主少血無血瘀損自汗下
冷傷濕痺等症也○左寸濡心虛易驚盜汗短氣

開濁營衛不和。精神離散。體虛少力。尺濡。男為傷精。女為脫血。小便數。自汗多病。○右寸濡。內熱。惟寒氣乏體虛。○關濁脾腎不化飲食。尺濡下元冷。懶腸虛泄渴。

弱陰

經論。弱脉極硬而沉細。按之乃得。舉手無有。脈

經

發明

弱乃濡之沉者。素問曰。脉弱以滑。是有胃氣。脉弱以濁。是爲久病。病後老弱見之。順平人少年

見之逆。

正誤

脈訣云。輕手乃得。黎氏譬如浮潤。皆是濡脉。非弱也。宜辨之。

體象

弱來無力。按之柔。柔細而沉。不見浮陽。陷入陰

精血。面白頭。猶可少年愁。

相類

見沉脈

主病

弱脈陰虛陽氣衰惡寒發熱骨筋痿多驚多汗

精神減益氣調營急早醫

仲景曰陽陷入陰故惡寒發熱又曰
弱主筋沉主骨陽浮陰弱血虛筋急

分部

左寸弱陽虛右肺氣衰左肝經筋痿右關胃虛

寒尺部冷疼兼便滑陰虛陽陷少年難

佛氏曰氣虛則脉弱寸弱

易虛尺弱陰虛關弱門虛

卷之三 脉論 脉主元氣而人體內精氣不足故脈來萎弱而不振也故主元氣虛而四肢萎弱不前痛冷虛熱洩精虛汗等症也○左寸弱陽虛心熱自汗○關弱筋痿無力婦人主產後客風而腫○尺弱小便數腎虛耳聾骨肉痠疼○右

寸弱身痛多寒胸中短氣虛食不化尺弱下焦冷痛大便滑

散陰

經論散脉大而散有表無裏脉渙散不收經渙散不收虛子無統紀無拘束至數不齊或來多去少或去多來少渙散不收如楊花散慢之象

柳氏

發明

戴同父曰心脉浮大而短氣弱脉短濟而散平脉也心脉更散征忡肺精火散汗出肝脉更散溢

飲脾脉更散脣腫病脉也腎脉更散諸病脉代散死脉也

難經曰散脉獨見則危

柳氏曰散爲氣血俱虛根本脫離之脉產婦得之生孕婦得之墮

體象

散似楊花散漫飛去來無定至難齊產爲生兆

胎爲墮久病逢之不可醫

久病得散脈乃氣血
脫散之象故主死

相類 散脈無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲大
爲虛脉芤脉中空有兩邊

主病分部 左寸怔忡右寸汗溢飲左關應戛散右關
戛散脈腫脹居兩尺魂應斷

鑑釋

散爲氣血耗散藏府氣絕之候在病脉主虛陽不
足又主心氣不足大抵非佳脉也若兩尺得散脈
乃精神衰憊魂魄將離而不救也○左寸黃心脉衰
而血少神不安而怔忡作○右寸散脈氣耗而腠理

不固故自汗。○左關裏散有溢飲在中。○右關裏散脾氣虛而足部脢附作腫。兩尺裏散精氣衰敗無發。

細陰

細脈小於微而常有。細直而硬若絲線之應指。

脉經

發明

素問謂之小王啓玄言如秀蓬。其柔矣細也。

正誤

原說言往來接續是微反大子細大與經旨相背。

體象

細來繫緊細如絲應指沉沉無絕期。春夏少年

俱不利。秋冬老弱卻相宜。

相類

見微濡。

主病

細脈繁繁血氣衰諸虛勞損七情乖若非濕氣

侵腰腎卽是傷精汗洩來

脈經曰細爲血少氣衰有此症則順否則逆故吐衄得沉細者生憂勞過度者脈亦細

分部

丹田冷洩痢遺精號脫陰

鑑釋

細爲血冷氣虛不充之候乃元氣不足乏力無精內外俱虛冷瘦弱洞泄爲憂勞過度爲傷寒爲積

爲病在內及在下

伏陰

經論伏脉重按着骨指下裁動

脉行筋下誤

正誤

脉訣言尋之似有定息全無殊爲外謬

體象

伏脈推筋着骨尋。指間裁動隱然深。傷寒欲汗。

陽將解厥逆。脣疼證屬陰。

相類

見沉脈。

主病

伏爲霍亂吐。頻頻腹痛多緣宿食停。蓄飲老痰。

成積聚。散寒溫裏莫因循。

發明

脉學曰。傷寒一手脈伏。曰單伏。兩手脈伏。曰雙伏。不可。以陽症見陰脉爲診。乃火邪內鬱。不得不發。

越陽極似陰。故脉伏必有大汗而解。正如久旱將雨。六合陰晦。雨後庶物皆甦之義。又有夾陰傷寒。先有伏陰在內。外復感寒。陰盛陽衰。四肢厥逆。

六脉沉伏。須投薑附及灸。開元脉。乃復出也。若太

谿衝陽。皆無脉者必死。

劉元賓曰。伏脈不可發汗。

正誤

脉訣云徐徐發汗潔古以附子細辛麻黃湯主之皆非也。

分部

食氣鬱胸雙寸伏欲吐不吐常兀兀當關心腹

痛沉沉關後疝癩還破腹

鑑釋

伏爲陰陽潛伏關膈閉塞之候故主積聚病衰食壅霍亂水氣及諸痛之甚爲營衛氣閉而厥逆關前得之爲陽伏關後得之爲陰伏○左寸伏心氣不足神不守常沉憂抑鬱○開伏血冷腰脚痛及膈下有寒氣○尺伏腎寒精虛疝瘕寒痛○右寸伏胸中氣滯○開伏中脘積塊作痛及胃中停滯○尺伏脾下冷痛下焦虛寒腹中痛冷。

動陽

經論動乃數脉見于上下無頭尾如豆大厥厥動搖

脉經

動陽

卷之三

仲景曰

陰陽相搏名曰動

陽動則汗出

仲景曰

陰動則發熱

形冷惡寒

此三焦傷也

成無巳曰

陰陽相搏則虛者動

故陽虛則陽動

陰虛則陰動

龐安常曰

開前三分爲陽

開後三分

爲陰

關位半陰半陽故動隨虛見

正誤

脉訣言

尋之似有

之還無不離其處不

往不來三關沉沉皆含糊謬妄殊非動脈

詹氏言其形鼓動如

鈞如毛者尤謬也

體象

動脈搖搖數在關無頭無尾豆形圓

其原本是

陰陽搏虛者搖兮勝者安

主病

動脈專司痛與驚汗因陽動熱因陰或爲洩痢

拘牽病男子亡精女子崩

鑑釋

仲景曰：動則爲痛，爲驚。素問曰：陰虛陽搏謂之崩。又曰：婦人少陰脈動甚者，妊子也。滑氏謂虛

勞體倦爲崩漏爲泄病。

促

陽

經論

促脉來去數時一止復來。

原

如蹶之趣徐疾不常。

氏黎

發明

數止爲促緩止爲結促結之止無常數。

正誤

脈訣乃云并居寸口不言時止者其謬可規

體象

促脉數而時一止此爲陽極欲亡陰三焦鬱火

炎炎盛進必無生退可生。

相類

見代脈

主病

促脈惟將火病醫其因有五細推之時時喘咳

皆痰積或發狂班與毒疽

鑑釋

從主陽獨盛而陰不能相和之象或怒逆上亦令脉促故主氣拘狂悶及瘀血發怔等症○凡氣血

全飲痰五者蓋先以氣熱脈數而五者之中或一有留滯乎其間則陽氣壅促是脉因而爲之促非惡脉也雖然加則死退則生亦可畏也

結

陰

經論

結脈往來緩時一止復來

經

發明

仲景謂繫繫如循長竿日陰結謂如車蓋日陽結○脉經言如麻子動搖旋引旋收聚散不

常者曰結主死此

三脉名同實異也

正誤

脈訣云或來或去聚而却還

之句與結脈無干宜辨之

體象

結脈緩而時一止獨陰偏盛欲亡陽浮爲氣滯

沉爲積汗下分明在主張

相類

見代脈

主病

結脈皆因氣血凝老痰結聚苦沉吟內生積聚

外癰疽癰聚爲殃病

關

越人曰結盛則積盛結微則積微
浮結外有積痛涼結內有積聚

鑑釋

結爲陰獨盛而陽不能相入之象爲癰結爲七癰所發浮結爲寒邪滯結沉結爲積氣在內

九氣

血食伏瘻五者益先以氣寒脉緩而五者之中或一有留滯于其間則陰氣結塞是脈因而爲之結也故仲景謂促結皆病脉也

代

陰

經論代脈動而中止不能自還因而復動

仲景脉至還入

尺良久方來

吳氏

體象

動而中止不能還復動因而作代看病者得之

猶可療平人若見壽相關

相類

數而時止名爲促緩止須將結脉呼止不能回

方是代結生代死自殊途

脉學曰。促結之止無常數。或二動三動一止。卽來代脈之止有常數。必依數而止。脈至良久方來。

主病

代脈藏衰危惡候。腹疼洩利下元虧。脾敗吐瀉

寒不食。三月懷胎不必醫。

發明

代主氣促脹滿喘急痰涎及洩痢脫精之候。久病脈代者死。○脈經曰。代散者死。主泄及便飧

血。

○內經曰。代則氣衰。○滑伯仁曰。代主形容羸瘦。口不能言。若不因病而人羸瘦。其脈代止。真危

亡之兆也。

若因病而氣血驟損以致元氣不續。或風家痛家。脈見代止。只爲病脈。傷寒家亦有心悸

而脉見代者。腹心痛亦有結清止代不均。蓋凡痛病

而脉見代者不可準也。又妊娠脉代者。其胎百日代之生死。

不可不辨。

辨證

五十不止身無病。數內有止皆知定。

數內者。卽五十內之

數也。知定者可定其藏氣之死期也。四十一止腎藏衰。三十一止肝氣盡。二十一止脾敗竭。十動一止心脉絕。四五動止肺經傷死。期更叅聲色證。○兩動一止三日死。三四動止五六日。五六一止七八朝。次第推之自無失。

脉經曰。一動一止二日死。二動一止三日死。三動一止四日死。四動一止五日死。五動一止六日死。六動一止八日死。七動一止九日死。八動一止十日死。九動一止十一日死。十動一止立夏死。

鑑釋

脉者。合天地大衍之數也。人之脉息盡夜循竅五藏。一動循一藏。五動循五藏。呼吸脉遍週而復始。五十動則循環五藏十次。遍則數皆均至而不見止脉者。五藏皆平。故無病也。今不滿五十動而脉見止。是一藏無氣也。凡平人一呼脉兩動。一動肺。一動心。

吸脈兩動。一動肝。一動腎。呼吸之間。一息脈五至者。
此一動是脾脉也。心與肺在上爲陽。主氣呼出也。故
云呼出心與肺。又云呼因陽出也。肝與腎在下爲陰。
主氣吸入也。故云吸入腎與肝。又云吸隨陰入也。脾
雖不主呼吸。其位居心肺肝腎之中。惟受發氣。故脈
動在四藏呼吸兩界之間。故平人脉一息五至也。假
如一呼一吸。脈四動。初動肺。二動心。三動脾。四動肝。
而止。良久却復來動者。仍從肺來也。是不至者腎也。
難經曰。脈不滿五十動而一止。腎藏先衰。謂汲不能
至腎。至肝而還。故知一藏無氣。腎氣先絕也。○脉經
曰。不滿五十動一止者。五歲死。四十動而一止者。一
藏無氣。四歲死。三十動而一止者。二藏無氣。三歲死。
二十動而一止者。三藏無氣。二歲死。十動而一止者。四
藏無氣。歲中死。○吳氏註曰。腎氣絕。期應四年而死。
三十動而見止者。是知腎肝二經無氣。期應三年而
死。二十動而止者。腎肝脾三藏無氣。期應二年而死。
十五動而一止者。腎肝脾心四藏皆無氣。期應一年而
亡也。○戴同父曰。脉經以四藏無氣。歲中死。其言

幾藏無氣以分別幾歲之死期予竊疑焉內經曰腎絕六日死肝絕八日死心絕一日死果此藏氣絕又安能待四歲三歲乎○宏翰曰夫戴氏引內經而正脈經之謬予會而詳思默悟得其機焉如某藏之氣衰弱未敗絕而見代者則死期之歲月從脉證而斷之若某藏之氣敗絕而見代者則死期之月日從內經而斷之但內經原說某藏絕而脈經當作某藏衰弱也以脉經言二十三十動一止二歲三歲無氣亦肺外證候有三歲四歲無氣能延過三四歲乎而吳氏不辨亦依釋而誤也當以五十動一止者腎氣衰四十動一止者肝氣衰三十動一止者脾氣衰然其中要分衰與敗以驗歲月之死期庶謂安當也大抵五十動者脉之大要數必候五十動不可不及五十動而速不候也或問候止從何處數起曰得止脉後即從至脉數起也但今庸醫惟賴口伎指到肺管不候五十動便云了然脉既不取又不觀色審音何能起沉疴乎後學宜詳四診而慎之毋忽焉

四診脉鑑大全卷之七

雲間浩然王宏翰著輯

王兆文

男 王兆武叅較

王兆成

關格二脉論

禁服篇曰寸口主中火迎主外兩者相應俱往俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者名曰平人此言寸口人迎之脉各有所主而合四時者爲無病寸口者在右手寸部即太

淵穴去魚際一寸故曰寸口以其爲脈氣之所會故又曰脉口又曰氣口寸口主中乃手足六陰經原所見也人迎者在左手寸口主中乃手足六陰經原所穴名而其脉則見于此故以人迎稱之以胃謂六腑之所以左寸爲外凡足手六陽經之脉必見于此右寸爲秋爲西右關爲中央爲長夏其兩尺爲北爲冬所以右寸爲內凡足手六陰經之脉必見于此然寸口之脉在內而出于外人迎之脉在外而入于內卽如人迎一動爲足少陽膽經寸口一動爲足厥陰肝經則肝與膽相爲表裏而一出一入兩經木相應也故俱往俱來若引繩齊等而春夏之時則人迎比寸口之脉爲微大於冬之時則寸口比人迎之脉爲微大乃爲平和無病之人也蓋曰微大則是平和之脉耳徐經表裏可以以須推見下文

人迎大一倍于寸口病在足少陽一倍而躁病在手少

陽人迎二倍病在足太陽二倍而躁病在手太陽人
迎三倍病在足陽明三倍而躁病在手陽明盛則爲
熱虛則爲寒緊則爲痛彈代則乍甚乍間盛則瀉之
虛則補之緊痛則取之分肉代則取血絡且飲藥陷
下則灸之不盛不虛以經取之名曰經刺人迎四倍
者其大且數名曰溢陽溢陽爲外格死不治必審按
其本末察其寒熱以驗其藏府之病六節氣象篇終
始篇五色篇四時氣有經脈等篇脉分氣口人迎義同滑伯仁謂古以火發兩旁分氣口人迎至王叔和始分左右寸部者未考諸篇故耳馬玄臺曰此言氣口人迎之脉而決其病在何經甚至脉爲關格則死也言人迎較此

寸口之脉大一倍二倍三倍四倍者可以駕足手六
陽經之病而有治之之法也人迎較寸口之脉大一
倍則病在足少陽膽經若一倍而加之躁動乃手少
陽三焦經有病也躁者一倍之中而有更躁之意下
文二倍三倍曰倍其躁可以意會較寸口之躁大二
倍則病在足太陽膀胱經若二倍而躁乃手太陽小
腸經有病也較寸口之脉大三倍則病在足陽明胃
經若三倍而躁乃手陽明大腸經有病也其各陽經
之病盛則爲熱虛則爲寒繁則爲痛痺代則病爲乍
甚乍輕抑下文之乍痛乍止然所以治之者承盃則
分經以導之脉虛則分經以稍之脉緊爲痛痺則取
其分肉之病在何經脈代則取其血絡使之出血及
飲食以調之脉陷下者則直補于中中有著血血寒
故宜灸之若不盛不虛則止以本經取之如一盛鴻
膽以補肝二盛鴻膽就以補腎之類蓋則取之于膽
而不取之肝取之膀胱而不取之腎之類也或用鍼
或用灸或用藥止在本經而不求之他經故名曰經
刺也夫治法固已如此夫人迎之脉大于寸口者甚

至四倍且大且數則脉偏盛是六陽之脈而不得通之以出于外矣故謂之外格也其證當爲死不治凡此者必宜審按其本末益先病爲本後病爲末及察其寒熱以驗其藏府之病何也

寸口大于人迎一倍病在足厥陰一倍而躁病在手心主寸口二倍病在足少陰二倍而躁病在手少陰寸口三倍病在足太陰三倍而躁病在手太陰盛則脹滿寒中食不化虛則熱中出糜少氣濁色變緊則痛痺代別乍痛乍止盛則瀉之虛則補之緊則先刺而後灸之代則取血絡而後調之陷下則徒灸之後但也

陷下者脉血絡于中中有着血血寒故宜灸之不盛
不虛以經取之名曰經刺寸口四倍者名曰內關內
關者且大且數死不治必審察其本末之寒溫以驗
其臟府之病言寸口之脈大于人迎可以驗足手六
手厥陰心包絡經有病也比人迎之脈大二倍則病
在足少陰腎經若二倍而躁乃手少陰心經有病也
比人迎之脈大三倍則病在足太陰脾經若三倍而
躁乃手太陰肺經有病也其各陰經之脉盛則爲脈
滿其胃中必寒而食亦不化虛則真陰不足故熱中
而所出之糜亦不化且氣亦少消色亦必變也脉緊
則爲痛痺脉代則爲乍痛乍止然所以治之者盛則
分經以瀉之虛則分經以補之緊則取其痛痺之分
肉在于何經先刺而後灸之代則取其血絡使之出

血及藥以調之。脉陷下者則但灸之而已。脉既陷下則血結于中。中有着血。血結故宜灸之。若不盛不虛。則以本經取之。謂取陽經者。不取陰經。取陰經。即不取陽經也。或用藥。或用鍼。或用灸。正在本經而不求之他經者。名曰經刺也。夫治法固已如此。及夫寸口之脈。大于人迎者。甚至四倍。且大且數。則六陰經偏盛。名曰內關。謂六陰關閉于內。而在外六陽之脈。而不得運之。以入于內矣。是謂之內關也。其證當爲死不可治。凡此者。必宜審按其本末。及察其寒熱。以驗其臟府之病可也。

馬玄臺曰。王冰註止引躁脉而不兼手足者非。按傷寒論云。寸口脉浮而大。浮爲虛。大爲實。在尺爲關。在寸爲格。關則不得小便。格則吐逆。趺陽脉伏而濇。伏則吐逆。水穀不化。濇則食不得入。名曰關格。夫內經諸

篇分明以左手人迎脉大自一盛以至四盛乃手足六陽經爲病其名曰格故春夏人迎微大者爲無病今仲景曰在寸爲格又曰格則吐逆是以格脉誤爲內經之膈證此事難知集李東垣宗之且曰氣口之脉大四倍于人迎則又同於難經三十七難之誤而不知內經諸篇之以人迎大于氣口者爲格脉也內經諸篇分明以右手氣口脉大自一盛以至四盛乃手足六陰經爲病其名曰關故秋冬氣口微大者爲無病今仲景曰在尺爲關又曰關則不得大小便是

以關脉誤爲內經之閉癃證此事難知集李東垣宗之且曰人迎之脉大四倍于氣口則又同于難經三十七難之誤而不知內經諸篇之以氣口大于人迎者爲關脉也朱丹溪纂要竟列關格爲病名亦曰脉兩寸俱盛四倍已上是其病名之誤同于仲景而脉以四倍已上爲說則又欲正東垣之誤而不得內經諸篇之精繙也嗚呼痛哉軒岐之旨乎秦張王李朱諸賢後世業醫者所宗尚與內經渺然者如此况能使後世下工復知關格爲脈體而非病名也哉又焉

能決關格脉之死生。治關格脉之病證。及治癰證閉
癰證而無謬也哉。噫。天人多矣。

按關格二脉。載之靈素。向無人究。至明時馬玄臺註釋
內經。大闡發其旨。辯論諸家以關格作病名之非。于
古以來。一旦卓然明白。真有功于軒岐。豈淺哉。余
是以另列關格二脉于各脈之後。使顯然明著。庶後
學有所適從也夫。

覆溢二脉論

難經曰。脉有太過有不及。有陰陽相乘。有覆有溢。有關有格。何謂也。然關之前者。陽之動也。脈當九分而浮。過曰太過。減曰不及。遂上魚際爲溢。爲外關內格。此陰乘之脉也。關以後者。陰之動也。脈當見一寸而沉。過曰太過。減曰不及。遂入尺爲覆。爲內關外格。此陽乘之脉也。故曰覆溢。是其真氣之脉。人不病而死也。脉入尺澤曰覆。覆者。上傾而下入也。脉出寸口上魚際。曰溢。溢者。下泛而上出也。謂陰乘乎陽。陽無所容。而

上溢陽乘乎陰陰無所容而深覆也故覆溢之脉是陰陽不相濟所謂孤陽獨陰致脉上下相離是謂真藏之脉無胃氣以和之人雖不病而死矣

尺寸分別陰陽當相濟而不可偏勝一有偏勝則脉有太過不及覆溢關格見焉若陰氣太甚拒陽使陽氣不得相營于下故脉上出魚際名曰溢謂之外關內格是陰太過而陽不及也若陽氣太甚拒陰使陰氣不得相營于上故脉下入尺澤名曰覆謂之內關外格是陽太過而陰不及也

奇經八脈

經論督脈 尺寸中央三部俱浮直上直下

經脉

張潔古曰督者都也爲陽脈之都綱○內經曰

督脈起于下極之腧並于脊裏上至風府入腦上顙循額至鼻柱極于上齒縫中斷交穴

主病

爲外感風寒之邪

王叔和

爲腰脊強痛不得俛仰

大人癲病小兒風癇○內經謂實則脊強反折虛則頭痛○寸關尺三部皆浮且直上直下者爲弦長之象故主外邪

經論任脈

寸口脉緊細實長至關。又曰。寸口邊龙。

經脈

任者妊也。爲陰脈之海也。○內經謂任脈起于中極之下。循腹裏由關元上咽至承漿。下斷交極。目下承泣穴爲陰脈之都綱也。

主病

男子內結七疝。女子帶下瘕聚。王叔和爲少腹

繞膀胱引陰中痛。又曰。苦腹中有氣如指上捨心不得俛仰。拘急又緊細質長者。中寒而氣結也。○寸口九九卽動脈也。狀如豆粒。厥厥動搖。故主氣上冲心也。

也。

經論衝脉

尺寸中央俱牢直上直下

半脈似沉似伏實大而長微弦

乃三謂之脉指沉有力直上直下弦實之象也

經脉

衝脉起於氣街

在少腹毛中兩旁各二寸

俠臍左右上行至

胸中而散爲十二經之根本故稱經脉之海亦稱血

海

主病

靈樞曰衝脉血盛則滲灌皮膚生毫毛女子數

脫血不榮其口唇故鬚鬚不生宦者去其宗筋傷其

衝脉故鬚亦不生○越人曰衝脉爲病逆氣而裏急

○東垣曰凡逆氣上冲或兼裏急或作躁熱皆衝脉

逆也宜補中益氣湯加知藜○王叔和曰衝脈用事則十二經不復朝于寸口其人若恍惚狂癲○衝脈與督脈無異但督脈浮而衝脈沉耳

陽蹻脉 寸部左右彈彈者繫脉之象

經脈 陽蹻脉起于足跟中上外踝循脇上肩夾口吻至目極於耳後風池穴

主病 越人曰陽蹻爲病陰緩而陽急○王叔和註曰常從外踝以上急內踝以上緩又曰寸口脉前部左右彈者陽蹻也若腰背痛癲癇僵仆惡風偏枯瘡痏

體強○左右彈卽緊脉之象

經論陰蹻脉 尺部左右彈

經脈 陰蹻脉起于足跟上內踝循陰上胸至咽極于

目內眞睛明穴

主病 越人曰陰蹻爲病陽緩而陰急叔和註曰當從

內踝以上急外踝以上緩又曰寸口脉後部左右彈者陰蹻也苦癲癧寒熱皮膚淫痺少腹痛裏急腰及
籠竈下連陰痛男子陰疝女子漏下○張潔古云蹻
者捷疾也二蹻之脉起于足使人蹻捷也陽蹻在肌

肉之上陽脈所行通貫六府主持諸表陰蹻在肌肉
之下陰脈所行通貫五藏主持諸裏

經合帶脉 關脈左右彈

經脈

帶脈起于季脇周圍一周如束帶然

主病

越人曰帶之爲病腹滿腰溶溶如坐水中

落落緩緩

貌之○明堂曰女人少腹痛裏急癰癰月事不調赤白

帶下○楊氏曰帶脈總束諸脈使不妄行如人束帶

而前垂此脈若固卽無帶下諸經之症矣

經論陰維脉

尺外斜上至寸

斜上者不由正位而上

大指名曰尺外斜

小指內
日尺內

叔和曰：寸口脉從少陽斜至厥陰，是陰維脈也。
經脈 陰維起于諸陰之交，發于內踝上五寸循股入小腹循脇上胸，至頂前而終。

主病 叔和曰：動苦癲癪，僵仆羊鳴，又苦僵仆失音，肌肉痺瘡，應時自發，汗出惡風，身洗洗然也。取陽白、金門、僕參，又曰：陰維脈沉大而實者，主胸中痛，脇下支滿心痛，脉如貫珠者，男子兩脇下實，腰中痛，女子陰中痛，如有瘡狀。

經論陽維脈

尺內斜上至寸

叔和曰寸口脉從少陰斜至太陽是陽維脈也

或言從右手手少陽三焦斜至寸上手厥陰心包之位爲陰維從左手足少陽斜至寸上手太陽小腸之位爲陽維也

經脈

陽維脈起于諸陽之會發于足外踝下一寸五

分循膝上髀厭抵少腹循頭入耳至本神而止

主病

叔和曰動苦肌肉痺瘡皮膚痛下部不仁汗出

而寒又苦顛仆羊鳴手足相引甚者失音不能言宜

取客主人○潔古云衛爲陽主表陽維受邪爲病在

表故苦寒熱營爲陰主裏陰維受邪爲病在裏故苦心痛陰陽相維則營衛和諧榮衛不諧則悵然失志不能自收持矣

人身有經脈絡脈直行曰經旁支曰絡經凡十二手之三陰三陽足之三陰三陽是也絡凡十五乃十二經各有一別絡而脾又有一大絡并任督二絡爲十五也共二十七氣相隨上下如泉之流不得休息陰脉營於五藏陽脉營於六府陰陽相貫如環無端其流溢之氣入于奇經轉相灌溉奇經凡八脈不拘制于

十二正經無表裏配合故謂之奇蓋正經猶溝渠奇經猶河澤正經之脉隆盛則溢于奇經故秦越人比之天雨溝渠溢滿濡濡河澤此靈素未發之旨也

陽維起于諸陽之會由外踝而上行于衛分○陰維起于諸陰之交由內踝而上行于營分爲一身之綱維也督帶俱陰陽相維也則知陽脉之維于頭目手足頭項肩背諸陽無一不到其脈不榮則不能維在頭目無維則眩在頭項肩背無維則僵在手足無維則仆矣則知陰脈之維于胸腹諸陰無一不到其脉不榮則不能維在胸腹弱失所維則動榮而刺痛矣是以陽維絡一身之陽陰維絡一身之陰也○

陽蹻起于跟中循外踝上行于身之左右○陰蹻起

于跟中循內踝上行于身之左右所以使機關之蹠捷也○督脈起于會陰循背而行于身之後爲陽脈之總督故曰陽脈之海○任脈起于會陰循腹而行身之前爲陰脈之承任故曰陰脈之海○衝脈起于會陰夾脅而行直衝于上爲諸脈之衝要故曰十二經脈之海○帶脈則橫圍于腰狀如束帶所以總約諸脉者也○是故陽維主一身之表陰維主一身之裏以乾坤言也○陽蹠主一身左右之陽陰蹠主一身左右之陰以東西言也○督脈主身後之陽○任脈

主身前之陰以南北言也。○帶脈橫束諸脈以六合言也。○是故醫而知乎八脈則十二經十五絡之大旨無不得也。

四診脉鑑大全卷之七

終