

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

外臺秘要方卷二十五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜惟吉

謄錄監生臣謝蓮鶚

欽定四庫全書

外臺秘要方卷二十五

唐 王燾 撰

水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虛湊理開血氣虛春傷於風邪氣
留連在肌肉之間後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故
為水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之府也為水穀之
海脾者胃之藏也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水

穀消其精化為榮衛以養其藏充實肌膚大腸肺之腑也為傳道之官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經脈其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則為風邪所傷客在肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能尅制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟取風名為胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲

不下腹脹形瘦腹大失衣則臍滿食寒則洞泄洞泄者
痢無度也若胃氣竭者痢絕即死診其脉小手足寒難
療也脉大手足溫易療也下白沫脉沉則生浮則死身
不熱脉不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之也脉絕
而手足寒晬時脉還手足溫者生脉不還者死脉緩時
小結者生洪大數者死懸絕而澁者死細微而濇者生
緊大而滑者死得代絕脉者不死養生方云秋三月此
謂容平天氣以急地氣以明早卧早起與雞俱興使志

安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬為飧洩又云五月勿食未成核果及桃李發癰瘡不爾發寒熱變黃疸又為洩痢

出第十卷中

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆 六分

白朮 五分

赤石脂 七分

厚朴 六分

乾薑 六分

熟艾 四分

龍骨 七分

甘草 四分

黃連 十分

烏梅 六分

人參 六分

當歸 五分

右十二味搗篩為末蜜丸以米飲汁服二十九如梧

桐子大日三服加至三十九

出第四卷中

集驗論黃帝問曰人若溏洩下痢者何也對曰春傷於風夏生溏洩腸澼久風亦為溏洩也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連

阿膠 炙各二兩

梔子 三十枚

烏梅 二十枚

黃蘗 一兩

右五味切以水七升煮取二升半分為再服神良 備急

同肘後名烏梅
湯療熱下蠱

又方

黃連

一升金
色者

陳米

五合

右二味以水七升煮取二升分再服

肘後丈仲同並
出第四卷中

刪繁療中焦熱水穀下痢藍青丸方

藍青

汁三
升

黃連

八兩

黃蘗

四兩

阿膠

五兩

白朮

地榆

地膚子

烏梅肉

各
三

兩

右八味擣篩為散用藍汁和微火上煎取可為丸丸

如杏子大飲進三丸

出第四卷中

崔氏療水穀痢方

乾薑 三分

雞子 二枚

小豆

二百粒炒令香

黃連 三分

右四味擣篩三味內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十九丸如小豆大旦以飲服差即

停 出第三卷中

丈仲療因仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一瀉五

六升水方

黃連 去毛

厚朴 各三兩

右二味切以水三升煮取一升頓服之

出第三卷中

必効療水穀痢方

小豆 一升

煮

蠟 二兩

煮

右二味和頓服之即愈

又方

椶蔴灰 燒灰

右一味研以水和服三方寸匕

並出第二卷中

古今錄驗療熱水穀下痢方

黃連

阿膠

各二兩

梔子

二十枚

右三味切以水七升煮取二升分為三服

又方

黃連

當歸

甘草

炙各二兩

酸石榴皮

三兩

右四味切以水三升煮取一升半分為三服

並出第十卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有
白膿日夜無節度但疑是冷悉主之方

白石脂

乾薑

各八分

右二味擣篩為末以沸湯和少許麩薄糊和藥併手
捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓

八分

白龍骨

八分

訶梨勒皮

八分

黃連 八分
酸石榴皮 八分

右五味搗篩為末蜜丸空心以飲服如梧子大三十

丸日二服差止

出第四卷中

文仲療水痢百起者馬蘭散方

馬蘭子

乾薑

黃連

原無分兩

右三味為散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神効不得輕之

又方

朽骨灰

牛骨灰 亦得

神麩 炒黃

右三味等分為散空腹飲服一方寸匕無六月六日

麩時用常麩亦得御傳

並出第三卷中

經心錄主水痢方

雞子 二枚

黃蠟 一兩

右二味熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方

黃連

倉米

各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煮赤豆作

漿粥服三十九日三服若渴但飲豆漿粥

並出第
二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間精液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑

所以因下痢而便腸垢也

出第十
七卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方

烏梅

二十
枚

右一味以水二升煮取一升頓服之

又方

石榴 一枚

右一味合皮搗絞取汁隨多少服之最良

備急療水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂

桂心

乾薑

附子

炮

右四味等分搗篩蜜丸如小豆每服三九日三服飲

下

肘後同出
第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黃連

二兩

黃蘗

二兩

阿膠

二兩
炙

右三味搗篩為散以苦酒蜜各半升煮內阿膠令烊
又內諸藥令可丸飲服三九日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故為冷
痢也凡痢色青色白色黑色皆為冷也色黃色赤並為熱
也故痢色白食不消謂之寒中也診其脈沉則生浮則

死

出第十
七卷中

廣濟療冷痢青白色腹中常鳴其痢行數甚疎出太多
此是冷痢宜服調中散方

龍骨

人參

黃連

阿膠炙

黃蘗

各一兩

右五味搗篩為散煮米飲服兩方寸匕日兩服差停

出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者為寒下方

黃連

乾薑

各三兩

右二味擣篩白酒一升半合煎令可丸飲服如梧桐子二十九忌猪肉冷水

又方

黃連 二兩

甘草 炙半兩

附子 炮半兩

阿膠 半兩

右四味切以水三升煮取一升半分再服之

又方

半夏 洗

烏頭 炮

甘草 炙各等分

右三味擣篩蜜和丸如梧桐子大飲服三九日再服

又方

生薑汁 二升

白蜜 一升半

右二味相和分再服之

又方

腥二兩切

乾薑三兩末

右二味以水六升半煮米一合煮作糜糜熟內薑一

食令盡不差更作備急同

又方

酸石榴皮

燒灰

右一味為末服方寸匕

文仲同

又方

乾薑

二兩末

雜麩

一升

右二味為燒餅熟食之盡更作不過三劑差

文仲同

又療純下白如鼻涕者方

龍骨

乾薑

附子

炮

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子大飲下五丸漸至

十九日一服

文仲同

又方

黃連

末

臘

阿膠

各一兩

右三味先以酒半升令沸下膠臘合烱乃內黃連末

頓服之

本云姚氏療卒注下竝痢血一日夕數十行

又方

灸臍下一寸五十壯良

文仲同竝出第二卷中

千金論曰凡五臟絕於內者下不自禁下甚者手足不

仁也細尋取之萬不失一下病體例畧如此耳素問曰
春傷於風夏為膿血夏多滯下也夏傷於風秋必洞泄
秋下水者患必是冷也

又療久冷痢下純白者此由積卧冷處經久病發遂令
脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡白痢
屬冷赤痢屬熱方

上好麩末

五升微
熬令香

右一味温清淳酒熱和麩末一升空腹一頓服之日

三若至食時擣蒜一升令至熟下薑椒末調如常食
法惟須稠勿加鹽以水和麩二升作索餅極熟爛煮
之乾漉熱內蒜齏中相和一頓食之少與餘食至饑
時仍準前食麩末酒比至差來少食餘食以此法療
不過二日必差

又烏梅丸療冷痢久下方

烏梅

三百粒

當歸

四兩

乾薑

十兩

桂心

六兩

附子

六兩炮

黃連

十六兩

蜀椒

汗四兩

細辛

六兩

人參 六兩

黃蘗 六兩

右十味異擣篩合治之苦酒漬烏梅一宿去核蒸之
如五斗米下擣如泥盤中搽合相得蜜和擣二千杵

食前飲服如梧子大十九日三稍增至二十九

此本仲景

傷寒
論方

又舊療痢於貴勝用健脾丸多効今療積久冷痢先以
溫脾湯下訖後以健脾丸補之未有不効者貧家難以
充辦亦不可將息溫脾湯方療積久冷痢赤白者

大黃

三兩

桂心

三兩

附子

炮

乾薑

人參

各二兩

右五味切以水七升煮取二升半分為三服日再

出並

第十五
卷中

備急葛氏療痢色白食不消者為寒下方

豉

一升
綿裹

薤白

一把

右二味以水三升煮取二升及熟頓服之陶效方云

療暴下大去血痢姚療赤白下痢并効

肘後
同

又方

牛角腮

燒灰

右一味搗篩白飲服方寸匕日三

肘後同

又方

好麩

炒

右一味搗篩煮米粥內麩方寸匕日四五云此療日

百行師不救者

肘後同出
第六卷中

古今錄驗白頭翁湯療寒急下及滯下方

白頭翁

乾薑

各二兩

甘草

灸一兩

當歸

一兩

黃連

秦皮

各一兩半

石榴皮

一兩者二兩

右七味切以水八升煮取三升分為四服

出第十卷中

近効療冷痢方

肉豆蔻

五顆合皮碎

甘草

二兩灸

右二味切以水三升煮取一升半頓服之

戶部李尚書處得云

療冷痢極者有效自用得力

又療久冷痢方

赤石脂搗作末和麩作餛飩空腹服一碗以下不
過兩頓差老人尤佳體中先熱者不可服之

以上
二方

新附

文仲治青下白下薑附散方

乾薑

附子 炮

皂莢 炙去
子

右三味等分搗篩為散飲服方寸匕不過再服即愈

亦可丸服

小品肘
後同

又治冷痢薑艾餛飩子方

乾薑末

熟艾

右二味等分作麩餛飩如酸棗大煮熟服四五十枚
日二服腹脹者炙厚朴煮汁服藥此熟服訖即須食
飯大效曾有產婦冷痢如白膏服之立差腹痛亦定
冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷及微下痢方

白朮

八兩

神麴末

炒五兩

甘草

炙

乾薑

枳實

炙各
二兩

右五味搗篩蜜和丸空腹以溫酒服如梧桐子大二
十九日二服漸加至三十九腹中痛者加當歸

出第
四卷

中

文仲華佗治老小下痢柴立不能食食不化入口即出
命在旦夕久痢神驗方

黃連末

半雞
子殼

亂髮灰

準
上

淳苦酒

準
上

蜜

準
上

白蠟

方寸
匕

雞子黃

一
枚

右六味於銅器中炭火上先內苦酒蜜蠟雞子黃攪

調乃內黃連末髮灰又攪煎視可搏出為丸久困者

一日一夜盡之可者二日盡之

肘後同出
第三卷中

延年增損黃連丸主腹內冷食不消及冷痢兼補方

黃連

黃芪

各三分

龍骨

三分

當歸

甘草

炙五分

乾薑

厚朴

炙各六分

地榆

白朮

人參

各一分

右十味搗篩蜜丸如梧子大飲酒任下服十五丸日

再服加至二十九

蔣仲璋處

又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方

地榆

六兩
炙

赤石脂

七分

厚朴

六分

白朮

五分

乾薑

六兩

龍骨

七分

黃連

十分

當歸

五分

熟艾

五分

烏梅肉

六分

甘草

四分
炙

右十一味搗篩蜜和丸如梧子大飲服二十九日二

服加至二十五丸

並出第七卷中

又深師療冷痢膿血絞臍痛食不消腹脹方

吳茱萸

乾薑

各六分

赤石脂

麴末

炒各八分

厚朴 炙

當歸 各四分

右六味搗篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十九日

再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方

吳茱萸

人參

芍藥

桔梗

甘草

炙各四分

枳實

炙三分

乾薑

十二分

附子

炮八分

麴末

二十分炒

右九味搗篩蜜和丸如梧子空腹飲下七九日二服

漸加之
文仲云温脾丸療久寒氣逆
脹滿面目痿黃食不消化

白痢方八首

病源白滯痢者腸虛而冷氣客之薄於腸間津液凝滯

成白故為白滯痢

出第十
七卷中

廣濟療白膿痢方

甘草

六分
炙

厚朴

十二分
炙

乾薑

枳實

茯苓

各八分

右五味切以水五升煮取一升六合絞去滓分為二

服日再服

又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴

灸五兩

豆蔻

五枚

甘草

灸一兩

乾薑

一兩

右四味切以水五升煮取一升五合絞去滓分為二

服日再

並出第四卷中

千金大桃花湯主冷白帶痢腸痛方

赤石脂

八兩

乾薑

當歸

龍骨

各三兩

附子

炮

牡蠣

各二兩熬

芍藥

甘草

灸各一兩

人參

一兩半

白朮 一升

右十味切以水一斗二升煮白朮取九升內藥煮取
三升分為三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮三兩
又方

龍骨

六兩

厚朴

三兩

赤石脂

五兩

當歸 一兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服日再服
熱加白頭翁十分牡蠣三兩

延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

烏梅肉

熬

熟艾

黃蘗

甘草

炙各八分

右四味擣篩蜜丸如梧子以飲服十五丸日三服忌

同前

出第七卷中

必効白痢方

麻子汁

右一味以汁煮取菘豆空腹飽服極妙

又方

黃連末

右一味以水和每服三匕即愈

並出第二卷中

古今錄驗療白帶下晝夜無復數龍骨湯下

龍骨

牡蠣

各三兩煉

烏梅肉

熟艾

白頭翁

乾薑

各一兩

女萎

黃連

當歸

各二兩

甘草

六兩炙

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一

斷便止忌同前

出第十卷十

重下方六首

病源此謂今赤白滯下也今人下部疼重故曰重下去
膿血如雞子白日夜數十行繞臍痛也

出第十
七卷中

肘後療重下方

黃連 一升

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服臍當小絞
痛則差

又方

鼠尾草

右一味以濃煮煎如薄飴糖服五合至一升日三赤

下用赤花者白下用白花者佳也

文仲備
急同

文仲隱居效驗方主下部絞痛重下下赤白方

當歸

黃蘗

黃連

乾薑

各二
兩

右四味搗篩煮取烏梅汁服方寸匕日夜若腹中絞痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑大効神良秘之

備急同出

第三卷中

備急療重下方此即赤白痢下也今人下部疼重故名

重下

葛氏方

豉

熬令少焦

右一味搗服一合日再三服又熬豉令焦水一升淋

取汁服冷則用酒淋日三服之

肘後文仲同出第六卷中

古今錄驗重下下赤者方

取獺赤糞

下白取白糞燒末

右一味以飲清旦空腹服一小杯三旦飲之即愈

又療得毒病後得重下赤白絞痛方

石鍾乳

一兩
研

黃連

防風

附子

炮

黃蘗

蜀椒 汗

當歸

乾薑

各二兩

右八味切以水六升煮取二升半分三服適寒溫服

並出第

十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金療卒暴冷下部疼悶方

燒磚令熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方

黍米 二升

臘

羊脂

膠 炙各
二兩

右四味合煮作粥一頓令盡即差

並出第十
五卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱痢者由腸胃虛弱宿有寒而為客熱所傷
冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間
則變為血痢也而冷伏腸內搏津液則變凝白則成白
滯亦變赤白痢也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今
附於後養生方導引法云泄下有寒者微一作引氣以

息內腹徐吹息以鼻引氣氣足復前即愈其有熱者微

呼以去之也

出第十
七卷中

剛繁療下焦冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方

香豉

一升

白朮

六兩

薤白

切一
升

升麻

二兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服

出第四
卷中

古今錄驗生春石榴將療熱不調下或滯或水或白青
黃者方

酸石榴

五枚

右一味合殼舂絞取二升汁分服五合稍稍服一升
盡即斷小兒以意服二三合佳千金同出第十卷中
又深師無問冷熱新舊痢方

黃連

黃蘗

乾薑

甘草

炙

艾

烏梅肉

熬各八分

附子

三枚

蠟

一雞子大

右八味擣篩以蜜和蠟於鐺中鎔之其著蜜須候蠟
鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十九日二漸加至
五六十九

近効療痢無問冷熱神驗黃連丸方

黃連

一兩

茯苓

二兩

阿膠

一兩

右三味先擣黃連茯苓為末以少許水鎔阿膠和為丸衆手丸之暴乾量患輕重空腹以飲下三四十九漸漸加至六十九不過五六服必差常用之極効又療苦下無問冷熱及膿血痢悉主之方

生犀角

屑

黃蘗

各二兩

黃連

苦參

各三兩

右四味擣篩為散以糯米煮作飲莫令生每日空腹

服一方寸匕日再服便差勿輕之

此方於度支王郎中處得曾用極效

肘後有當歸云度侍

郎家方產後彌佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并疴溫

劉秘監積年患痢每服此即愈

方

阿膠

二兩一兩炙入藥一兩消作清

黃連

一兩

乾薑

二兩

入黃無食子

二枚久痢腸滑甚者量加至三四枚

右四味搗篩為末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服

二十五丸日再漸加至三十九丸老小者以意斟酌禁

如常法

一云若冷痢以酒下熱痢以粥飲下出第三卷中

文仲治無問冷熱即五色痢入口即定方

黃連

四分

黃蘗

當歸

黃芩

各一兩

阿膠

二兩

熟艾

一兩

右六味搗篩為散以醋二升煮膠烱下藥煮令可丸

如大豆飲服七八九日二夜一服特宜老人若產

婦痢加蒲黃一兩蜜和為丸神驗

出第三卷中

熱毒痢方三首

肘後若已下色黃者協毒熱下也療之方

梔子 十四枚去皮

右一味搗篩蜜和丸如梧子飲服三九日再服

出第二卷

中

千金療熱毒痢方

苦參

橘皮

獨活

阿膠

炙

藍青

黃連

鬼箭羽

一云
鬼白

黃蘗

甘草

右九味等分搗篩以蜜烱膠和併手丸如梧子乾以

飲服十九日三稍加之卒下疰痢者大良

出第十
五卷中

文仲治熱痢久不差者黃連丸方

黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十九至二十

丸日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛

此是熱痢宜生犀角散方

生犀角

末

酸石榴皮

熬

枳實

熬令黃
各三兩

右三味各異擣篩為散以飲服兩三寸匕日再差停

熱食物

又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻

地榆

茜根

黃芩

各六分

犀角

四分

生地黄

八分

梔子

七枚
擘

薤白

八分

香豉

二合

右九味切以水六升煮取一升五合絞去滓分溫三

服日再

並出第
四卷中

千金大熱毒純血痢療不可差者方

黃連

六兩

右一味切以水七升煮取二升半夜露著星月下旦
空腹頓服之卧將息不差加黃連二兩更作服之仍
不差者以疝痢法療之佳忌如常

又療熱毒下黑血五内攪切痛日夜百行氣絕欲死方

黃連

一升

龍骨

白朮

各二
兩

阿膠

炙

乾薑

當歸

赤石脂

各三兩

附子

一兩炮

右八味切以水一斗煮取五升分為五服余以正觀三年七月十二日忽得此痢至於五日將絕處此藥

入口即定

並出第十卷中

古今錄驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方

犀角

屑

人參

當歸

各三兩

黃連

四兩

蜜

一合

右五味切以水五升煮取一升去滓內蜜煎三沸分

為三服日三忌同

出第十卷中

文仲治熱毒痢痢血犀角散方

犀角 三兩

石榴皮 三兩

燒

黃連 三兩

乾藍 二兩

地榆 二兩

右五味搗篩為散以米飲服三方寸七日二服

出第三卷

中

赤痢方四首

病源此由腸胃虛弱為風邪所傷則成痢挾熱熱乘於

血則血流滲入腸與痢相雜下故為赤痢也

出第十卷中

集驗療下赤痢方

秣米 一把

鯽魚鮓

二觔細切

薤白

一虎口細切

右三味合煮如作粥法噉之

古今錄驗同出第四卷中

千金療赤帶下方

成煎猪膏

三合清酒五合

右二味以緩火煎十沸適寒溫頓服之取差止

又論曰凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯

醬粉醎食所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷飽此
將息之大經也若將息失所聖人不救也

並出第十
五卷中

必效療赤痢方

香豆豉

半升

黃連

一兩

右二味以水一升半浸豉一日瀉取汁碎黃連薄綿
裹豉汁中煎取強半升空腹頓服即止桑泉蔣尉云

効

出第二
卷中

崔氏治赤痢黃連丸方

陳倉米

四分

黃連

四分

乾薑

四分

右三味搗篩為末，緩火炒令色變，以內二顆雞子白中熟和丸，如梧子大，空腹服五十丸，以好無灰酒溫一盞下之。至晚間痢赤色當變白，明旦即差。

出第三卷中

久赤痢方二首

病源久赤痢者，由體虛熱乘於血，血滲腸間，故痢赤。腸胃虛不平，復其熱不退，故經久不差。胃氣逆則變為嘔噦也。胃虛穀氣衰，蟲動侵食，則變為蠶也。

出第十卷中

千金療下赤連年方

地榆

鼠尾草

各一兩

右二味切以水二升煮取一升分為二服如不差取屋塵水盡去滓服一升日二服古今錄驗服屋塵汁一小杯餘同此是徐平方療下血二十年者若不止

重服即愈

肘後同

又方

鼠尾草

薔薇根

秦皮

用槲皮亦得

右三味等分水淹煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五六丸日三稍增差止亦可濃汁服半升

出第十五

中卷

卒下血方七首

深師治卒下血晝夜七八行方

黃連

黃蘗各四兩

右二味切以淳苦酒五升煮取一升半分為二服亦

療下痢

又療卒下血蒲黃散方

蒲黃 三合

當歸 一兩

鹿茸 一枚
燒

右三味擣篩為散飲服方寸匕先食日三

並出第一十六卷中

集驗療卒下血不止方

龍膽草 一握

右一味切以水五升煮取二升半分為五服如不差

更服 出第四卷中

葛氏療卒下血方

小豆 二升

右一味擣碎水三升和絞取汁飲之姚云立止

又方

黃連 半兩

黃蘗 二兩

梔子 二七
枚

右三味切以酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服之

並出

第十六

卷中

崔氏治卒下血不止方

竈突中塵 一升
黃連 五兩

地榆 三兩

右三味搗篩為散粥飲服方寸匕日再服重者夜一
近効治卒下血不問丈夫婦人立効牛角鯁灰散方

黃牛角鯁

一具燒赤色
出火即青碧

右一味為細散食前濃煮豉汁和二錢匕重者日三
神驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒乘於血滲入大腸故也血之隨氣
循環經絡通行臟腑當無停積毒熱氣乘之過腸虛者

血滲入於腸腸虛則洩故為血痢也身熱者死身寒者

生診其關上脈亢大便去血暴下血數升也

出第十
七卷中

廣濟療血痢黃連丸方

黃連

白龍骨

炙

禹餘糧

伏龍肝

各八

分

代赭

研

乾薑

各六
分

右六味搗篩蜜和丸飲服三十九如梧子漸加至四

十九差止

又療痢鮮血方

茜根

黃連

地榆

各八分

梔子

十四枚

薤白

切

香豉

各八分

犀角

屑六分

右七味切以水八升煮取二升分為三服日再

出第四卷

中

必効療患熱血痢方

粳米

一升研

右一味研碎令米盡取汁可一大升於新磁瓶中盛取油絹蜜閉頭繫內著井水中令至明飲之傳與人

無不差者

出第二卷中

古今錄驗療血痢及膿血方

黃連

三兩

右一味切以清水三升漬一宿旦煎取一升半去滓

分為二服服令須臾盡

文仲同

又療下痢鮮血方

乾地黄

犀角

屑

地榆

二兩

右三味擣篩蜜丸如彈子大每服一九水一升煎取

五合去滓溫服之

又療下血痢地膚散方

地膚

五兩

地榆根

黃芩

各二兩

右三味擣篩為散以水服方寸匕日三

並出第二卷中

久血痢方三首

病源此由體虛受熱熱折於血血入腸故成血痢熱不歇胃虛不復故痢血久不差多變嘔噦及為濕蘘

出第十七

卷中

崔氏療痢血數十年方

石灰

三大升
炒令黃

右一味以水一斗攪令澄清一服一升三服止

出第
三卷

中

小品療下血連歲不愈方

黃連

半斤

右一味擣末以雞子白和為餅微火炙令黃黑復擣
篩服方寸匕日三有効下清血痿黃失色醫不能療

者皆差

肘後同

丈仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方

人參

四分

鹿角

去皮取白作赤炒令黃

右二味搗篩為散平旦以粥清服方寸匕日再

並出第三

卷中

蠱注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脉血氣漸至於藏腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血

相搏則成血痢也毒氣侵食於藏腑如病蠱注之狀痢
血雜膿瘀黑有片如雞肝與血雜下是也

出第十
七卷中

肘後療苦時歲蠱注毒下者方

礬石

熱二
兩

乾薑

附子

炮

黃連

各二
兩

右四味擣篩為散以酒服方寸匕日三不止更服

又方

黃連

黃蘗

等分

右二味擣末蜜丸如梧子大飲服十九日四服

並出
第二

中卷

古今錄驗療純痢血如鷺鴨肝并協蠱毒方

茜根

升麻

犀角

桔梗

黃蘗

黃芩

各三兩

地榆

蓑荷根

各四兩

兩

右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未

差更作出

第六卷中

腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連
年不愈侵傷於藏腑下血雜白如病蠱之狀名為腸蠱

也

出第十
七卷中

肘後凡病下應先下白後下赤若先下赤後下白為腸
蠱方

牛膝三兩搗碎以酒一升漬經宿每服一兩杯日

二三服姚同

出第二
卷中

膿血痢方七首

病源夫春陽氣在表人運動勞役湊理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化為膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脈微濇者為內潰多下血膿又脈懸絕則死滑大則生脈微小者生實急者死脈沉細虛遲者生數急大而有熱者死

出第十
七卷中

肘後療熱病久下痢膿血藥皮湯方

黃蘗 二兩

梔子 二十枚

黃連 四兩

阿膠 炙二兩

右四味切以水六升煮取二升分為三服又一方加

烏梅二十枚

文仲同出
第二卷中

文仲治熱痢及下黃赤水及黃膿血四肢煩皮上冷者
方

黃連 八兩

熟艾 一兩

黃蘗 四兩

黃芩 三兩

右四味搗篩為末以黃蠟二兩安一升蜜中煮令消
及煖和藥白飲服六七十丸如小豆日二夜一即驗

又久下痢膿血方

赤石脂

一升

烏梅

二十個

乾薑

四片

粳米

一升

右四味切以水七升煮取令熟藥成服七合日三

後

同並出第

三卷中

刪繁療下焦熱或痢下膿血赤石脂湯方

赤石脂

八兩

烏梅

二十枚
去皮

梔子

十四枚

白朮

蜀椒

汗

麻

各三兩

乾薑

二兩

粟米

一升

右八味切以水一斗二升煮米熟去滓取七升下諸

藥煮取五合服之

出第四卷中

備急葛氏云若挾熱者多下赤膿雜血方

黃連

竈突中塵

各半兩

右二味末之酒服方寸匕日三服

肘後云以棗膏和分作三九日服一

丸姚氏同出第六卷中

古今錄驗療腸澼瀉便膿血乾薑散方

乾薑

黃連

桂心

各一分

右三味搗篩服方寸匕著糜中食日三多膿加薑多

血加桂有驗

又療中寒下痢膿血附子散方

蜀附子

一枚
炮

麴

乾薑

各三分

右三味下篩為散先食以酒服方寸匕日二并療婦

人漏下忌如前

並出第
三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入客於腸間腸虛則泄故為痢也然其痢而赤白者是

熱乘於血，血滲腸內則赤也。冷氣入腸，搏於腸間津液凝滯則白也。冷熱相攻，故赤白相雜。重者狀如膿涕，而血雜之輕者白膿。上有赤脈薄血，狀如魚腦，世謂之魚

腦痢也。

出第十卷中

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢，日五十行方。

鹿茸

二分灸

石榴皮

二兩

乾薑

二分

棗核中仁

七枚

赤地利

一兩燒作灰，肘後云赤蜀如三指

右五味搗篩為散，先食飲服方寸匕，日三夜一，若下

數者可五六服

肘後同

小品卒久赤白下方

燒馬屎一九作灰分服酒水隨意服已試良

肘後同

深師療赤白下者黃連湯方

黃連

黃蘗

乾薑

石榴皮

阿膠

炙各三兩

甘草

炙一兩

右六味切以水七升煮取二升為三服日再

出第二十卷中

延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方

黃連

六兩

乾薑

二兩

當歸

三兩

阿膠

灸三兩

右四味搗篩三年酢八合消膠令鎔和併手丸如大

豆以飲服三十九日再

肘後同出
第七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口即斷方

香豉心

豉心謂合豉其中心者熟而且
好不是去皮取心勿浪用之

右一味以取豉燂令乾香搗為末壯年者一大升豉

心為四服小兒量與之

出第九
卷中

必効主赤白痢方

黃連 二兩 阿膠 四片

右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然

後內膠令烱溫分三服

出第二卷中

久赤白痢方四首

病源久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不通故噦亦變為蠱蟲食人五藏也三月九

蟲常居人腸胃腸胃虛則動上食於五藏則心懊懣而
悶齒斷唇口並生瘡下食於腸則肛門傷爛而穀道開
也輕者可治重者致死

出第十
七卷中

崔氏馬蘭子散療赤白痢腹內疔痛并久水穀痢色白
如泔澱悉主之極重者不過三四日必差方

馬蘭子

一升
熬

地榆根皮

八分
炙

熟艾

八分

赤石脂

一升

龍骨

十分

茯苓

十分

當歸

十分

右八味搗篩為散一服方寸匕加至四五匕日再夜

一白飲服

出第三卷中

文仲療赤白痢五六年者方

燒大荆

右一味取瀝服五六合即差

肘後同

又卒腹痛下赤白數日不絕方

雞子

一枚扣頭取黃去白

胡粉末

令滿壳燒焦成齏

右二味以酒服之

肘後同並出第三卷中

近効療赤白痢日數十行無問老小方

甘草

二兩
炙

右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

疔痢方六首

必効療冷疔痢方

取葭蓉子

熬令
色黃

右一味搗為末和臘月猪脂更搗令熟為丸綿裹如棗許大以內下部因痢出即更內新者不過三度即

差

出第二
卷中

古今錄驗療五疳蒸下痢方

苦參 三兩

青箱

甘草 炙各三兩

右三味切以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服生地黃汁即差

又方

青黛

丁香

黃連 各等分

右三味搗篩用泔淀和為丸口中有瘡含之若下部有瘡以綿裹內下部日服五六十丸含之令下差

又方

丁香

麝香

別研

石黛

石鹽

山榆仁

小檗皮

桂心

乾薑

青礬石

燒

頭髮灰

右十味搗為散著瘡上乾者和臘月猪膏煖著療時
行病後食羊肉及肥膩或酒或房而得久蒸絡變為
疔必須攻下部不可輕之

又療疔濕痢方

青箱

雄黃 研

石硫黃 研

蕪荑

雷丸

各二兩

苦參

狼牙

各三兩

藜蘆

一兩炮

右八味擣篩為散取如杏仁大內下部中

又療疔濕痢神効方

黃連

三兩

零陵香

一兩半

犀角

一分

丁香

三十枚

麝香

一大豆

牛黃

一大豆

右六味以水洗黃連零陵香丁香澄取清水去滓更

以水添滿九升內黃連零陵丁香犀角煮兩沸然後

著牛黃麝香煎一沸取一升分作三服如一日服不

盡二日服

又深師以九升先以一升煮添盡九升取一大升分為三服並出第十卷中

久疔痢及久痢成疔方九首

廣濟療久患疔痢不差兀子礬散方

兀子礬

八分燒

麝香

二分研

吳白礬

六分燒

雲母粉

五分

桂心

二分

龍骨

六分

無食子

七顆燒

黃連

八分

右八味搗篩為散空腹以生薑汁和三錢匕服日再

煮薑湯下

又療積年疔痢羸瘦面色痿黃方

石硫黃 研

黃連 各一兩

艾 一兩

蜜 一升

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內石硫黃末更煮三五沸即絞去滓又內蜜更煎三五沸下分

為三服 並出第四卷中

必効療積久痢成疔灌方

樗根 一握淨洗剝白皮擣絞取汁三合取時勿令見風

麻子脂 二合燒如車脂

酢泔淀 二合

椒汗 四分

豉 二合

右五味以水六升取椒豉和煎絞取汁二升和樗汁麻油泔淀等三味分為兩分用一分灌隔一日更取餘者復灌其藥欲用時溫溫即得

又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或一二年不差變成疳所下如泔淀方

生羊肝一具

右一味取大酢一年以上者米麥並中年深者佳取羊肝則去上膜柳葉切朝旦空腹取肝手拈取酢中

出吞之覺心悶則止不悶還服之一日之間能不食
粥飯盡一具羊肝者大佳不然除飽吞已外料理如
生肝以薑齏下飯如常法食之日食一具肝不過二
三具即永差後一月不得食熱麩油膩醬猪魚雞肉
等

又療疔痢久不差羸瘦著牀欲死方

新出羊糞

一升

右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之極重者

不過三服

又療疔法丈夫婦人小兒久疔百方療不能差此方最

効

丁香

麝香

黃連

各等分

右三味擣篩為散以杏核大取竹筒吹入下部小兒
取核子量力減之不過三四迴差積年久疔疔不差

蔡光州云常用奇効

備急同並出
第三卷中

又療久疔變成疔下部竅生惡瘡惡寒壯熱者方

桃白皮

切一升

槐白皮

一升

苦參

切五合

艾

大棗

十枚

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽棗許大攪令勻取二升灌下部餘三分服

近効新附療久痢及疝痢諸方不差者此方必効

揀樗根白皮

不拘多少當取時不宜見狗及風

右一味細切擣如泥取細麩捻作餛飩如小棗勿令破熟煮吞七枚重者不過七八服皆空腹服之

又疝痢曉夜無度者方

取樗根濃汁

一雞子
壳許

右一味以和粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差

其驗若神小孩兒減半用之

醫人褚
球錄上

數十年痢方一十一首

千金療下痢丸主數十年痢下下氣消穀令人能食夏
月長時服之令人不霍亂方

黃連

黃蘗

桂心

大麥蘗

一升

半

乾薑

各三兩

吳茱萸

四兩

蜀椒

汗半兩

麴

一升熬炒

烏梅

二升半

右九味搗篩蜜和食已飲服如梧子十九日三服至

二十九亦可至三十九

又療數十年下痢消穀下氣補羸烏梅肉丸方

麴

好者一升炒

附子

炮二兩

大麥蘖

炒一升

當歸

三兩

桂心

三兩

黃連

吳茱萸

烏梅肉

乾薑

各四兩

蜀椒

汗一兩

右十味搗篩蜜和丸如梧子食已飲服十九日三

又四續丸主三十年疰痢骨立萎黃腸滑不療方

雲寶

五合

蠟

五兩
白者

附子

炮二兩

女萎

三兩

龍骨

二兩

右五味搗篩為末以蠟煎烱以丸藥如梧子飲服五

九日三不過五六服必差其雲寶熬令香

千金名
蠟煎丸

又療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢
沉重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦轉筋起

止須人扶陰冷無子椒艾丸方

赤石脂

二兩
研末

熟艾 一升

乾薑 三兩

蜀椒

三百
枚汗

烏梅

三百枚醋
浸剝取肉

右五味先搗篩薑椒為末將熟艾梅肉著一斛酒飯
下蒸令飯熟內乾薑椒末赤石脂末合搗三千杵蜜
和丸如梧子飲服十九日三不差至二十九加黃連
一升艾一斤

又療三十年痢不止方

厚朴炙

乾薑

阿膠炙各二兩

黃連五兩

石榴皮

艾葉各三兩

右六味切以水七升煮取二升分再服

又療積久三十年常下神効方

赤松木皮

去上蒼皮二斗

右一味為散麩粥和一升服之日三即止不過服一

斗永差秘方三十年痢百日服差良

並出第十卷中

古今錄驗療三十年寒下及霍亂諸藥所不能療并腸

滑若是蠱注所中方

蓼子

艾屑

各一升

龍膽

續斷

白朮

各三兩

蜀椒

汗

附子

炮

桂心

苦參

乾薑

甘草

炙

鼠尾草

各二兩

兩

右十二味擣篩蜜和一歲兒服一九如梧子三歲兒服二九五歲兒服三九大人服五九飲下療寒熱氣幅幅在胃中卒氣痛繞臍神良

療丘公療下痢三十年方

茯苓

乾薑

黃連

等分

右三味搗篩為散蜜和丸如梧子飲服之一日漸增
至百丸苦痢劇者加龍骨附子炮等分一服十九丸漸
增之以知為度

又當歸湯療三十年下痢止諸痛方

當歸

一兩

生薑

八兩

大棗

二十枚

右三味以水四升煮取一升半分作三服不差復作

之

又云吾患痢三十餘年諸療無効唯服此方得愈也

安石榴湯療大症痢及白滯困篤欲死腸已滑醫所不能療方

乾薑

二兩生薑倍之

黃蘗

一兩細切

石榴

一枚小者二枚

阿膠

二兩別研

清之

右四味切以水三升煮取一升二合去滓內膠令烊頓服不差復作療老小亦良人羸者稍稍復之不必

頓盡須臾復服石榴須預取之

肘後同一方無黃蘗用黃連並出第二卷

中

又深師療久痢方

龍骨

赤石脂

無食子

各六分

地榆

三分

熟艾

三月者良三分

椽子

黃蘗

各五分

右七味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五丸

日二服稍加至六十九

休息痢方五首

病源休息痢者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休也腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍發乍止謂之休息痢也

出第十卷中

肘後療休息痢方

黃連

切

龍骨

如鴨子大一枚

膠

如掌大炙

熟艾

一把

右四味水五升煮三物取二升去滓乃內膠膠烱分再服濃煮乾艾葉亦佳又當煮忍冬米和作飲飲之

又方

乾地榆 一斤

附子 一兩
炮

右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作

又方

龍骨 四兩

右一味搗如小豆以水五升煮取二升半冷之分為

五服又以米飲和為丸服十九

文仲同並出
第二卷中

文仲葛氏若久下經時不愈者此名為休息下療之方

取大骨

右一味炙令黃焦擣篩飲服方寸匕日三愈

肘後備急同

胡洽麴蘖丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療

虛羸方

麥蘖

炒

麴

炒各一升

附子

炮

桂心

烏梅肉

各二兩

人參

茯苓

各四兩

右七味擣篩蜜和為丸如梧子食前飲服十九日三

稍稍增之

肘後備急同並出第三卷中

腹肚不調痢一首

廣濟療冷熱不調痢膿水方

人參

乾薑

枳實

炙各四兩

厚朴

炙

龍骨

赤石脂

黃連

苦參

各六分

黃芩

五分

右九味搗篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二

漸加

出第三卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方

苦參

槲皮

獨活

阿膠

炙

芍藥

乾薑

黃蘗

甘草

炙

鬼臼

各四分

右九味搗篩蜜與膠共烱以和丸併手捻作丸如梧子暴燥以飲服十九日三不知稍加此方亦療諸症下及卒下悉効

又裨脾丸療脾胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞

痛方

附子

炮一兩

蜀椒

汗一兩

桂心

二兩

赤石脂

黃連

人參

乾薑

茯苓

大麥蘖

陳麩

炒

石櫛

當歸

各二兩

鍾乳

三兩研

右十三味搗篩蜜和以酒服十九如梧子日三稍稍

加之

出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便數至溷而不

能便日數十行劇者下血并婦女產後餘疾腹絞痛方

附子

一枚
炮

右一味以猪脂如雞子黃大煎附子裂為候削去上

黑皮擣篩蜜和丸先食服如大豆三九日三稍加可

至十九當長服之永不痢

出第三
卷中

下焦虛寒及遠血近血方二首

崔氏療下焦寒損或先見血後便此為遠血或痢不痢

伏龍肝湯方

伏龍肝

五合
研

甘草

一兩
炙

乾地黄

五兩

燒髮灰

三兩

合

黃芩

乾薑

生櫛皮

阿膠

各二兩
炙

牛膝

右九味切以水七升煮七物取三升去滓下阿膠更

煎取烱乃下髮分作三服

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此為近血或痢下或不痢好因勞冷而發續斷湯方

續斷

當歸

桔梗

阿膠

炙

桂心

灸三兩

乾薑

乾地黄

芎藭

各四兩

蒲黃

一分

甘草

二兩灸

右十味切以水九升煮八物取三升五合去滓下阿

膠更烱膠取沸下蒲黃分為三服

並出第四卷中

下痢食完出及上入下出方一首

范汪溫中湯療寒下食完出方

甘草

灸

乾薑

各三兩

蜀椒

八十枚汗

附子

一枚炮

右四味切以水二升煮取一升分為再服若嘔內橘

皮半兩小與老皆取服之良

出第十
五卷中

下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方

女萎

半夏

洗各
二兩

附子

炮

藜蘆

灸去頭
各一兩

右四味搗合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有
下者飲服三九日三不知稍稍增之

出第十
五卷中

集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆完出猪肝丸方

猪肝

一斤煮
焙乾

黃連

阿膠

炙

烏梅肉

各
二

兩

胡粉
七基子

右五味搗下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加

亦可散服

葛氏丈仲胡洽同肘後云亦可散服出第四卷中

千金療下痢絞痛腸滑不可差方

黃連
六兩

阿膠

鼠尾草

當歸

乾薑

各三兩

右五味切以酒七升煮取三升去滓溫分三服若熱

不絞痛去乾薑加當歸以水煮之

出第十卷中

大注痢及赤白困篤腸滑方二首

深師卒大注痢及赤白滯下困篤欲死腸已滑方

乾薑

二兩生者焙

黃蘗

石榴皮

各一兩

阿膠

二兩半

淡豉

一升

前胡

四兩

右六味切以水三升煮取三合去滓內膠頓服不差更作無毒宜老小羸人稍稍服之此湯兼療傷寒大

下及赤白困篤亦皆主之

出第二十卷中

范汪療得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數

十行腹中絞痛身熱如火頭痛如破其脉如濇方

黃連

四兩

苦參

二兩

阿膠

一兩

右三味咀吹以水一斗煮取二升去滓適寒溫服二合日三少少益至半升服湯盡者復合以愈為度曾

試驗

古今錄驗同

痢兼渴方二首

病源夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑藏腑虛受風邪邪入於腸胃故痢痢則津液空竭藏腑虛燥故痢

而兼渴也渴而引飲即痢不止翻溢水氣脾胃已虛不能尅消水水氣流溢浸漬肌肉則變成膿也

出第十卷中

必効療痢兼渴方

麥門冬

三兩
去心

烏梅

二大
枚

右二味以水一大升煮取強半絞去滓待冷細細咽

之即定仍含之

出第二卷中

古今錄驗療熱渴痢方

冬瓜

一枚

右一味以黃土厚一尺火炮穩約以水爛去土淨洗
絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢
有膿血相和痢者有腸澼痢其水痢者本由脾氣熱消
穀作水穀氣不得消便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣
不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸致有此
痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便

致此痢腸澼痢者由積冷在腸腸間垢涕不能自固便
有此痢色數雖多其源則一皆緣飲食不節將息失宜
也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡
唯變作水穀無期度多食多下少食少下有此伏者宜
依後黃芩等五味散服之方

黃芩

黃連

黃蘗

各五兩

黃芪

四兩

龍骨

六兩

右藥擣篩為散以飲下之初服一方寸匕日二服稍
稍加至二三匕服差乃止

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每過冷便發有
此疾候者宜依後附子等五味散主之方

附子

炮

細辛

白朮

各五兩

乾薑

四兩

神麴

一升

右藥擣篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍
稍加至二三匕良

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但兼血而
下有此患者宜依後方

犀角五味散方

生犀角

末五兩

阿膠

炙四兩

黃蘗

四兩

艾葉

乾薑

各三兩一作乾藍

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍
稍加至二三匕良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿遇冷

而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之良

麴末 一升

乾薑 六兩

丁香

豆蔻 各四兩

高良薑 五兩

右藥擣篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿血相和痢候食不甚稀每出膿血與食相兼腹亦小痛有此候者宜依後黃芪等五味散服之方

黃芪 六兩

赤石脂 八兩

厚朴 五兩

乾薑

艾葉

灸各
二兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍

稍加至二三匕良

又腸澼痢候食稀或稠便但似膿每便極滑痢有常期
有如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方

豆蔻子

丁香

各三
兩

細辛

附子

炮

乾薑

各四
兩

人參

黃芪

各五
兩

赤石脂

六
兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再稍稍

加至二三匕良

又前件諸痢患無新舊如藥療之暫差還發此疾縱以
新藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結
必須湯藥滌之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此
候者宜依後附子等六味湯以利之後服高良薑十味
散以補之方

附子

炮

細辛

甘草

炙

人參

各二兩

乾薑

三兩

大黃

五兩

右藥切以水七升煮取二升四合去滓分溫三服服
如人行十里久一服此湯當得快利利中有惡物如
魚腦狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四
日宜合後高良薑等十味散服之方

高良薑

細辛

黃芪

白朮

苦參

各五兩

丁香

二兩

人參

乾薑

各四兩

豆蔻子

三兩


赤石脂

六兩

右藥搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服之

稍稍加至二三匕

並出上
卷中



外臺秘要方卷二十五